

*image  
not  
available*

## Ueber das Dämpfe

Professor

Es ergaben sich folgende Re

- 1) Die Farbe des Holzes wird aus dunkler als sie vorher
- 2) Das gedämpfte Holz ist u auf gewöhnliche Weise be
- 3) Es zieht aus der Luft vie gewöhnliches trockenes Ho len, Schwinden, Werfen doch nur in sehr geringen
- 4) Das ausgelaugte Holz wird ni men und Wurmern angegr
- 5) Zum Zerbrechen erfordert den 10ten bis 4ten Theil durchschnittlich eben so s Bruch.
- 6) Durch Wasserdämpfe wird es im warmen Zustande in gen kann, in welcher es verbleibt. (*Polytechn. Cent*

## Goodwin's künstli

ist ein Gemenge von Thon, I Kleie und Stralsenstaub, welche wieder zum Teige angeknetet, net wird. (*Polytechn. Centralbl.*

## Dienst

Ein junger Mann von gehö zziehung, welcher Lust hat, sich det unter billigen Bedingungen beim Apotheker

Ein junger Mann, welcher und die nöthige Schulbildung in meine geschäftsreiche Apoth eintreten, und bemerke nur noc heit hat, sich in der technische Burg bei Magdeburg.

## Apotheke

Eine besonders vortheilhaft dixinalgeschäft, die einzige in e Stadt der sächsischen Herzogthü 12,000 Rthlr. zahlung erfo Alters des Be verkauft we Nähere N t hierüber

E. Grefal



August.

Es ergiebt

1) Die Feste

aus dritter

2) Das geistliche

auf geistliche

3) Es sind in

gewöhnliche

ten, Stein

doch so

4) Die Ausg

men und

5) Zum Z

den 18

durch

Bruch

6) Durch

es in

gen hat

vertheil

ARCHIV

PHARMACIE,

Zeitschrift

des

reins in Norddeutschland.

sechszwanzigsten Bandes zweites Heft.

Erste Abtheilung.

Zeitszeitung,

vom Directorio des Vereins.

reinsangelegenheiten.

Zahlwollen für den Verein.

von S. 122 Bd. XXII. 2. R. des Archivs.)

XIV.

Ein junger Rath und Medicinalrath Dr. Rudolph Brandt unter Mitwirkung des Fürstenthum Lippe wird auf seine unterm bewirkte Eingabe andurch eröffnet, dass

in Anbetracht der löblichen Zwecke der Association gebildeten Apothekervereins in Norddeutschland hierdurch die gebührende Anerkennung gegen den Anschluss der inländischen Apotheken nicht bezieht, wobei er zugleich benachrichtigt, dass eine Verordnung ergangen ist, das vom Verein der Pharmacie für die hiesige medicinische

4. Juni 1840.

Erzogl. Sächs. Landesregierung.

A. Freiherr v. Seckendorff.

Medicinalrath, Ritter

des Rothen Adlerordens

Schleife, Dr. Rudolph

in Lippe.

Eine besondere  
disinfecting  
Stadt der sächsischen  
12,000 Rthlr. Kosten  
Alters des Besizers  
Nähere Nach

11. Reihe. XXIII. Bds. 2. Hft.

Chamberlain

Per 11-11-3 11-11-3



Chenber : a

Pe 11.1.3 5 13'



**Archiv und Zeitung**  
des  
**APOTHEKER-VEREINS**  
in  
Norddeutschland.

---

Herausgegeben  
von  
Rudolph Brandes und Heinrich Wackenroder.

---

**Erster Band**  
im  
*Vereinsjahr der Jussieu's.*

---

**Hannover.**  
Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung.  
**1840.**

**ARCHIV**  
der  
**PHARMACIE,**  
eine Zeitschrift  
des  
Apotheker - Vereins in Norddeutschland.

---

**Zweite Reihe. XXI. Band.**  
**Der ganzen Folge LXXI. Band.**

---

**Herausgegeben**  
unter Mitwirkung der HH. *Baldenius, Becker, Biasoletto, Bley,*  
*Brendecke, Demong, Dierbach, Dulk, Geiseler, Göppert, Hansmann,*  
*Herberger, Jahn, Liebermann, Lübekind, Müller, Pfeiffer, Siller,*  
*Simon, Stickel, Storch, Witting*  
von

**Rudolph Brandes und Heinrich Wackenroder.**



---

**Hannover.**  
Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung.  
**1846.**





# Inhaltsanzeige.

## Erstes Heft.

### Erste Abtheilung.

#### Vereinszeitung.

1) *Vereinsangelegenheiten.* Rede, gehalten in der Jussieu-  
schen Generalversammlung des Vereins, zu Pyrmont am 21. Sept.  
1839, von Dr. Rudolph Brandes, Oberdirector des Vereins  
S. 1. — Erfreuliche Verbreitung des Vereins und Eintritt neuer Mit-  
glieder 14. — Directorialconferenz zu Herford am 21. Nov. 1839 16.  
— Directorialconferenz zu Lemgo am 21. Nov. 1839 17. — Anzeige 18.

2) *Gelehrte Gesellschaften und Lehranstalten.* Akademie der  
Wissenschaften in Berlin S. 18. — Akademie der Wissenschaften  
in Paris 18. — Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin 21.

### Zweite Abtheilung.

#### Chemie.

Seite

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Einige Worte über die Theorie der Aetherbildung; vom Pro-<br>fessor Dr. Dulk in Königsberg.....                     | 23 |
| Ueber die Milch des Frauengeschlechts und der Thiere; von<br>J. E. Herberger.....                                   | 36 |
| Beitrag zur Kenntniss thierischer Flüssigkeiten; von Dr. J.<br>Franz Simon .....                                    | 45 |
| Ueber das chemische Verhalten und die chemische Constitu-<br>tion des Eisenweinsteins; von H. Waackenroder .....    | 65 |
| Ueber die Zersetzung des Borax durch Honig und über Borax-<br>weinstein; vom Apotheker Storch in Rokitzan in Böhmen | 72 |
| Chemische Bemerkungen; vom Apotheker Demong in Sarstedt                                                             | 75 |

### Dritte Abtheilung.

#### Centralbericht.

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Das Daguerrotyp .....                                                          | 78 |
| Aetherbildung .....                                                            | 82 |
| Constitution der knallsauren Salze.....                                        | 83 |
| Knallsäure.....                                                                | 84 |
| Ueber das Pectin und die Pectinsäure.....                                      | 85 |
| Neues Vorkommen des Vanadins.....                                              | 87 |
| Reduction der Quecksilberchloride durch organische Substanzen                  | 88 |
| Zersetzungen von Sublimat .....                                                | 88 |
| Darstellung von Eisenoxydul.....                                               | 90 |
| Wirkung des Eisenoxydhydrats auf das Kupferoxydhydrat ...                      | 91 |
| Verhalten des Eisenoxyds und der Thonerde gegen kohlen-<br>saures Natron ..... | 92 |
| Scheidung des Eisenoxyds von Thonerde.....                                     | 93 |
| Neue basisch-schwefelsaure Thonerde.....                                       | 94 |
| Chlorsaures Natron.....                                                        | 94 |
| Scheidung von Baryt und Strontian .....                                        | 95 |
| Essigsaure Bleisalze und Bleioxyd.....                                         | 95 |

### Vierte Abtheilung.

#### Naturgeschichte.

|                                                                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nachforschungen, ob Pflanzen, verschiedenen Graden der Ver-<br>breitung angehörig, sich auch durch besondere chem.<br>Verhältnisse characterisiren; von E. Witting..... | 97 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|



**Fünfte Abtheilung.****Pharmakognosie.**

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ueber <i>Calamus aromaticus</i> ; vom Professor Dr. Dierbach<br>in Heidelberg ..... | 109 |
| <i>Flores Armeriae s. Statices</i> .....                                            | 110 |
| <i>Radix Lopez</i> .....                                                            | 110 |

**Sechste Abtheilung.****Allgemeiner Anzeiger.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>I. Anzeiger der Vereinszeitung. Handelsnotizen S. 111. —</i><br><i>Berg- und Hüttensegen 113. — Schwefel 113. — Zucker 113. — Ernte</i><br><i>Javanischer Producte 113. — Anzeige über Naturalienankauf 113.</i><br><i>— Das pharmaceutische Institut in Jena 115. — Verkaufs-An-</i><br><i>zeige 115. — Apothekenverkaufe 115. — Gehülfsversorgungs-Ange-</i><br><i>legenheit 116. — Notizen aus der neuesten Correspondenz des</i><br><i>Directoriums 116.</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*II. Anzeiger der Verlagshandlung S. 118.*

**Zweites Heft.****Erste Abtheilung.****Vereinszeitung.**

*1) Vereinsangelegenheiten. Einige Gedanken über einen allge-*  
*meinen deutschen Apothekerverein und darauf bezügliche Ver-*  
*vollkommnung der Pharmacie. Vortrag in der Sitzung des Apo-*  
*thekervereins in Norddeutschland zur Feier seines 19. Stiftungs-*  
*festes, den 21. Sept. 1839 zu Pyrmont, von Dr. L. F. Bley S. 121.*  
*— Hohes Wohlwollen für den Verein 130. — Ehrenbezeugung für*  
*den Verein 131. — Weitere Verbreitung des Vereins 132. — Ein-*  
*tritt neuer Mitglieder 133. — Vicedirectorium Weimar 134. —*  
*Generalkasse 134. — Vereinskapital 135. — Bucholz-Gehlen-*  
*Trommsdorffsche Stiftung zur Unterstützung armer ausgedienter*  
*und würdiger Apothekergehülfsen 135. — Todesfall 139. — Die*  
*Jussieusche Versammlung des Kreises Medebach, gehalten zu Cor-*  
*bach den 8. Juli 1839 139.*

*2) Personalnotizen S. 143.*

*3) Gelehrte Gesellschaften und Lehranstalten. Akademie der*  
*Medicin in Paris S. 144. — Gesellschaft für medicinische Chemie in*  
*Paris 145. — Pharmaceut. Gesellschaft in Paris 146.*

**Zweite Abtheilung.****Chemie.**

Seite

|                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ueber <i>Hydrargyrum ammoniato-muriaticum</i> ; von Dr. Geise-<br>ler in Königsberg i. d. Neumark.....                     | 147 |
| Ueber die Bereitung des Antimonoxyds; von Rud. Brandes                                                                     | 156 |
| Ueber das Antimonoxyd; von Julius Bouison.....                                                                             | 167 |
| <i>Tinctura Antimonii Thedenii</i> und <i>Spiritus Vini Lullianus</i> ; vom<br>Kreisphysikus Dr. Becker in Mühlhausen..... | 168 |
| Darstellung von <i>Cuprum sulphurico-ammoniatum</i> in schönen<br>Krystallen; von Ph. Lübekind.....                        | 182 |
| Ueber die Darstellung des krystallisirten Schwefelnatriums; vom<br>Apotheker Ed. Gueranger zu Mans .....                   | 183 |



|                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ueber Cudbear; vom Vicedirector Apoth. Müller in Medebach                                                                             | 185 |
| Bemerkung über das Sarsaparin; vom Apotheker Beral.....                                                                               | 187 |
| Ueber die Milch des Frauengeschlechts und der Thiere; von<br>J. E. Herberger. (Schluß der Seite 43 abgebrochenen<br>Abhandlung) ..... | 188 |
| Physiologisch-chemische Abhandlung über das <i>Smegma prae-</i><br><i>puti</i> ; von Carl Stickel, Apotheker in Kaltennordheim        | 203 |

### Dritte Abtheilung.

#### Arzneiformen.

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Noch einige Worte über <i>Emplastrum Lythargyri simplex</i> ; von<br>Edoard Siller in St. Petersburg..... | 214 |
| Ueber das <i>Unguentum plumbicum</i> ; vom Apotheker Baldenius<br>in Dessau .....                         | 215 |
| Ueber die Bestandtheile des <i>Unguenti saturnini</i> ; von Rudolph<br>Brandes.....                       | 216 |

### Vierte Abtheilung.

#### Centralbericht.

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Anwendung des Daguerreschen Verfahrens auf mikroskopi-<br>sche Gegenstände ..... | 217 |
| Verbesserung des Daguerrotyps .....                                              | 217 |
| Salpetersäure im Meteorwasser.....                                               | 218 |
| Vorkommen von Jod.....                                                           | 218 |
| Verhalten des Jodsilbers gegen Wärme.....                                        | 219 |
| Ueber das Verhalten einiger Metalle zu alkalischen Flüssigkeiten                 | 220 |
| Zusammenstellung des officinellen Schwefelkaliums.....                           | 221 |
| Ueber die Pflanzenfaser.....                                                     | 222 |
| Ueber den Stärkmehlgehalt verschiedener Pflanzen.....                            | 223 |
| Succisterin .....                                                                | 225 |

### Fünfte Abtheilung.

#### Literatur.

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Bibliographisch-kritischer Bericht..... | 226 |
|-----------------------------------------|-----|

### Sechste Abtheilung.

#### Allgemeiner Anzeiger.

I. Anzeiger der Vereinszeitung. Circulare S. 236. — Handels-  
notizen 238. — Das pharm. Institut in Jena 244. — Ankündigung  
eines Vegetabiliengeschäfts 244. — Notizen aus der Generalcor-  
respondenz des Directoriums 246. — Anzeige, vom Vicedirector  
Dreykorn 247. — Anzeige, vom Kreisdirector Upmann 247.  
— Zur gefälligen Beachtung 247.

II. Anzeiger der Verlagshandlung S. 247.



### Drittes Heft.

### Erste Abtheilung.

#### Vereinszeitung.

1) Vereinsangelegenheiten. Directorialconferenz zu Herford  
am 10. Febr. 1840 S. 249. — Eintritt neuer Mitglieder 251. —  
Generalkasse 251. — Vereinskassapital 252. — Die Versammlung der  
Mitglieder des Kreises Gotha des Apothekervereins, in Meiningen,  
am 9. Dec. 1839 252.

2) *Medicinalwesen und Medicinalpolizei.* Amtliche Verfügungen den Betrag der extrapostmäßigen Vergütung an die zu Apotheken Visitationen zugezogenen Apotheker betreffend S. 259. — Taxation der Recepte betreffend 260. — Pensions- und Unterstützungsanstalt für Wittwen und Waisen von Medicinalpersonen in Weimar 261. — Ueber tief eingerissene die ausübende Pharmacie beeinträchtigende Mißbräuche 261. — Notiz über gesetzwidrige Dispensiren von Arzneimitteln; vom Apotheker Liebermann in Grünenplan 264. — Beitrag zur Aufdeckung der Geheimmittel von Dr. Bley in Bernburg 266. — Beitrag zum Medicinalwesen in England 267. — Die Morisonschen Pillen 267.

3) *Personalnotizen* S. 268.

## Zweite Abtheilung.

### Chemie.

|                                                                                                                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Analysen des Blutes; von Dr. J. Franz Simon. (Fortsetzung von Bd. XVIII. 2. R. S. 54.) .....                                       | 2 |
| Ueber das Verfahren, die Zusammensetzung der Harnsteine zu erkennen; von A. Chevallier .....                                       | 2 |
| Ueber Bereitung, Prüfung, Ursachen des Verderbens, und zweckmäßigste Aufbewahrung der destillirten Wässer; von Fr. Brendecke ..... | 2 |
| Ueber <i>Fermentoleum Ericae vulgaris</i> ; von Dr. Bley .....                                                                     | 3 |
| Beobachtungen zur Geschichte der Weinsteinsäure; von E. Sonbeiran und H. Capitaine .....                                           | 3 |
| Darstellung von Stickgas; von Ph. Lübekind .....                                                                                   | 3 |
| Beobachtungen einer merkwürdigen Eigenschaft der Schwefelsäure; von Chr. Hansmann .....                                            | 3 |
| Leichte Darstellung einer reinen Borsäure; von H. Wackenroder .....                                                                | 3 |
| Chemische Notizen; von Rudolph Brandes .....                                                                                       | 3 |

## Dritte Abtheilung.

### Naturgeschichte.

|                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ueber den allgemeinen Character der Vegetation auf der Insel Cuba. Aus einem in der botanischen Section der Naturforscherversammlung im September 1839 zu Pyrmont gehaltenen Vortrage; von Dr. Louis Pfeiffer in Cassel ..... | 32 |
| Ueber die <i>Madia sativa</i> , eine oelliefernde Pflanze aus Chili; von H. R. Göppert, Professor in Breslau .....                                                                                                            | 32 |
| Ueber einige schädliche und verdächtige Pflanzen Istriens, nebst einigen chemischen Beobachtungen über das Oel der <i>Pistacia Lentiscus</i> und einige andere Oele; von Dr. Biasoletto in Triest .....                       | 33 |

## Vierte Abtheilung.

### Allgemeiner Anzeiger.

I. *Anzeiger der Vereinszeitung.* Notizen aus der Generalcorrespondenz des Directoriums S. 347. — Handelsnotizen 347. — Berg- und Hüttensegen 348. — Miscellen 349. — Mineralienverkauf 351. — Dienstgesuche 351.

II. *Anzeiger der Verlagshandlung* S. 352.





Nr. 1.

Vereinsjahr der Jussieu's.

1840.

**Januar.**

**ARCHIV**  
**DER PHARMACIE,**  
eine Zeitschrift

des

Apotheker-Vereins in Norddeutschland.

Zweite Reihe. Einundzwanzigsten Bandes erstes Heft.

Erste Abtheilung.

**Vereinszeitung,**

redigirt vom Directorio des Vereins.

1) *Vereinsangelegenheiten.*

**R e d e,**

gehalten in der Jussieuschen Generalversammlung des  
Vereins, zu Pyrmont am 21. Sept. 1839,

von

Dr. *Rudolph Brandes,*  
Oberdirector des Vereins.

I.

*Linné* sagt in seiner *Philosophia botanica*, das natürliche Pflanzensystem sei das letzte Ziel der Botanik. Ich führe dieses an, um gleich zu bemerken, welchen Werth der grösste Pflanzenkenner auf eine solche Anordnung legte. Wir alle erkennen diesen Werth, denn das natürliche System giebt über jede einzelne Pflanzenart, die darin verzeichnet ist, einen ganzen Complex von ihren Merkmalen, ihren Eigenschaften und Beziehungen zu den übrigen Pflanzen zu erkennen, der, wie mit der Wegnahme eines Schleiers, uns einen bedeutenden Theil

der Wesenheit dieser Pflanzenart enthüllt. Durch das natürliche System gelangt man also nicht bloß dahin, den Namen der Pflanze aufzusuchen, sondern auch zur Kenntniß ihrer Natur und ihrer Organisation, welche uns durch die Characteristika der Familie, zu welcher sie gehört, gelehrt wird. Denn das natürliche System beruht ja nicht auf einem oder einigen willkürlich gewählten Klassificationsprincipien, sondern auf der natürlichen Construction der Pflanzen. Indem diese Methode die Verwandtschaften unter den Pflanzenfamilien nachweist und die Grenzen dieser Verwandtschaften bestimmt, führt sie uns zugleich die natürlichen Verhältnisse vor Augen, welche ganze Massen von Gewächsen näher und entfernter verknüpfen. Für die beschreibende Botanik, für die Gruppierung, für die Geographie und die Physiologie der Pflanzen ist sie von einer außerordentlichen Wichtigkeit. Und wie das Licht, das von einem Theile der Naturschönheit ausgeht, zugleich mehrere andere Gebiete derselben erhellt, so hat auch die natürliche Methode auf viele andere Gebiete eine neue Fülle von Kenntnissen hervorgerufen. Weit interessanter sind die chemischen Forschungen im Gebiete der Pflanzenchemie geworden, seitdem man die Analysen der zerlegten Pflanze auf die Familie bezog, zu welcher sie gehört; als man in vielen Familien einzelne Stoffe fand, welche dieselben auch in chemischer Hinsicht als eine Familie charakterisiren. Zwar ist hier noch ein großes Feld der Forschung frei, aber es darf nicht erwartet werden, daß die kommenden Resultate dem Satz entgegenstehen werden, daß bei einer Gleichheit oder Aehnlichkeit der Merkmale und der Organisation, welche den Familiencharacter bedingen, auch eine Aehnlichkeit in der Beschaffenheit der chemischen Bestandtheile der Arten der Familie sich ergeben werde, so daß gewisse ausgezeichnete Bestandtheile oder deutlich characterisirte Stoffe in die Arten sich finden werden, entweder identisch, oder doch mit solchen Modificationen, daß sie auch in chemischer Hinsicht als Arten einer Gattung angesehen werden müssen. Der Schluss, daß eine in den Hauptbedingungen übereinstimmende Organisation auch ein gleiches oder ähnliches chemisches Bestandtheilverhältniß erwarten lassen darf, und der schon ziemlich ausgedehnte Basis gewonnen hat, dürfte, nach meiner unmaßgeblichen Ansicht, keinen bedeutenden Eintrag erleiden.

Dieses Ergebniß ist von dem größten Einfluß für die Medicin, und namentlich für die Arzneimittellehre. Es ist zu erwarten, wenn eine Pflanze ein medicinisches Interesse hat, auch andere Arten und Gattungen derselben Familie, derselben oder einen ähnlichen medicinischen Character haben werden.

Hier, wo ich vor Männern rede, die mit der Wissenschaft vertraut sind, bedarf es nicht, daß ich in größere Einzelheiten über den Werth und den Nutzen der natürlichen Methode der Klassification der Pflanzen mich einlasse. Nur diese wenigen Andeutungen habe ich mir erlaubt, und ich bin überzeugt, daß Ihnen allen das volle Gewicht des Werthes dieser Methode lebendig vor der Seele stand, schon mit der ersten Aussprache des Worts. Diese Ueberzeugung war es auch, die das Directorium unsers Vereins bestimmte, die heutige Stiftungsfeier

Institut mit dem Namen des Begründers dieser Methode zu schmücken; da aber der Name desselben mehreren grossen Gelehrten zukömmt, alle aus derselben Familie entsprossen, und die alle für denselben Wissenschaftszweig wirkten, so soll unsere Feier allen diesen hochverdienten Männern gelten und aus diesem Grunde begrüsse ich Sie mit dem Namen *Versammlung der Jussieu's* und unser nächstes Vereinsjahr mit dem Namen *Vereinsjahr der Jussieu's*. Der Name Jussieu ist ein Collectivname, um welchen die Geschichte für alle Zeiten den Lorbeer des Ruhms geschlungen hat. Vier Männer dieses Namens sind es die wir hier feiern, die drei Brüder, Anton, Bernhard und Joseph, und ihr Neffe, Anton Lorenz de Jussieu. Letzter ist zwar der eigentliche Begründer der natürlichen Methode, aber alle waren Naturforscher, alle Botaniker, alle arbeiteten zu einem Ziele in einem Geiste, und Anton und Bernhard waren zunächst die Vorgänger von Anton Lorenz. Das Leben dieser drei Männer war ruhig friedlich, frei von hervorstechenden Begebenheiten; die Wissenschaft war ihr Leben, diese einer höheren Weihe entgegenzuführen war ihre Arbeit, und so stehen sie da erhaben und ehrwürdig durch diese Arbeit, wie die Priester eines Tempels, eines Tempels der Natur, der *Scientia amabilis*.

Wir haben in den grossen Verdiensten der Jussieu's um die Botanik, und in den innigen Beziehungen dieser zu unserm Fache den gewichtigsten Grund zu der Feier dieser Männer; aber unsere Theilnahme dafür wird noch erhöht, wenn wir erwägen, daß Anton, Bernhard und Joseph, Söhne eines Apothekers sind, des geachteten Apothekers de Jussieu in Lyon, daß ihnen durch die Beschäftigungen des Vaters die Naturwissenschaften lieb und werth wurden, und so auch für sie die Pharmacie es war, die ihren Talenten Impuls und Richtung gab. Es ist auch hier, wenigstens entfernt, die Pharmacie die Quelle so vieler Erweiterungen, so vieler Entdeckungen, wozu wir in der Geschichte der Naturwissenschaften so reiche Belege finden. Diese Stellung der Pharmacie dünkt mir eine der Aufmerksamkeit im höchsten Grade würdige; sie ist die Stellung einer Pflanzschule für die nützlichsten, für die interessantesten Zweige der Wissenschaft, die dazu unmittelbar in das Leben eingreifen, und gewiss schon aus diesem Grunde sollten junge Männer der Pharmacie sich widmen, wenn sie auch die Absicht haben, eine andere naturwissenschaftliche Branche, eine technische oder gewerbliche Carriere zu ergreifen. Die eigenthümlichen Verhältnisse der Apotheker, die stete Aufmerksamkeit, die ihr Geschäft erfordert, die geistige Thätigkeit und die manuelle Fertigkeit, welche dieses in Anspruch nimmt, die Abgeschlossenheit von dem Treiben der Welt und von der Sucht nach Zerstreuungen, sind vorzugsweise geeignet, in der pharmaceutischen Laufbahn eine Vorschule der Naturwissenschaften und darauf gegründeter practischer Thätigkeiten zu bilden.

Wenn die Verdienste der Jussieu's in ehrwürdiger Erhabenheit vor uns stehen und unsere Seele bewundernd diese Grösse betrachtet, so glaube ich durch die Darlegung des Verhältnisses, in denen sie zur Pharmacie standen, diese ausgezeichneten Männer uns wiederum näher gebracht zu haben, durch das Band,



welches sie mit unserm Fache verknüpfte, ohne zu befürchten zu weit gegangen zu sein in dieser Vincidirung einiger sprüche, welche ich für die Pharmacie in Bezug auf die Geirichtung dieser Männer in Anspruch nahm.

Obwohl ich voraussetzen kann, daß Ihnen die Leberschichte unserer Gefeierten bekannt ist, so ist es doch der unsers Instituts gemäß, bei der Stiftungsfeier von dem L der grossen Männer, denen unsere Versammlung gewidmet eine kurze biographische Skizze mitzutheilen, um uns eben innig als angemessen mit ihnen zu beschäftigen, indem wir den Kreis ihres Lebens näher einzudringen suchen. Ich l zu den folgenden Skizzen vorzüglich ein kleines Werk von in Strassburg benutzt: »*Discours d'ouverture du cours de botan de la faculté de médecine, prononcé le 3 Mai 1837; ou les Jus et la méthode naturelle. Strasbourg 1837.*«

Die Familie der Jussieu's stammt aus Lyon. Laur de Jussieu war seiner Zeit einer der ausgezeichnetsten A theker dieser Stadt und Vater einer zahlreichen Familie. seiner Söhne, Anton, Bernhard und Joseph kamen na einander im Anfang des vorigen Jahrhunderts nach Paris, nahmen dort ihren Wohnsitz, wir wollen uns erst mit di beschäftigen, und dann mit ihrem Neffen, Anton Lorenz

Anton de Jussieu wurde am 8. Juli 1686 zu Lyon boren; nachdem er in seiner Vaterstadt sich ausgebildet ha ging er nach Paris, promovirte dort als Doctor der Medi und studirte besonders Botanik unter Tournefort. D war seine Lieblingswissenschaft und wurde es in solchem Gr daß er seine botanischen Excursionen durch das südliche Fra reich und einen grossen Theil von Spanien ausdehnte. Daß dabei auch über alles andere Wissenswürdige möglichst sich unterrichten suchte, beweist die Beschreibung, welche er den berühmten *Minen von Almaden* herausgab. Noch nicht Jahr alt, wurde er zum Mitgliede der Akademie der Wiss schaften in Paris erwählt und bald darauf zum Professor *Jardin des plantes*. Mit Bewunderung für seinen grossen Leh Tournefort setzte er hier dessen Pflanzensystem auseinander welches damals den grössten Beifall erhalten hatte, überall ad tirt wurde und einen wichtigen Einfluß auf die Klassificati Methode der Pflanzen ausübte. Tournefort's System war kanntlich auf die Gestalt der Blumenkrone gegründet, Cäsalp der erste Gründer eines wissenschaftlichen Pflanzensystems, rison, Hermann, Ray und Rivin hatten zwar auch ihren Systemen die Blumenkrone mit zu Grunde gelegt: d wurden diese Systeme von dem Tournefortschen, wegen sei Vollständigkeit und consequenten Durchführung, übertroffen, dieses neuen, noch naturgemässerem und constanteren Eintl lungsprincipien, als die oft abändernde Gestalt der Blume den Platz räumte. Anton Jussieu bearbeitete einen App dix zu Tournefort's *Institutiones rei herbariae* und wirkte durch für die Vermehrung der Systemkunde, er stellte ü viele einzelne Pflanzengattungen genaue Untersuchungen an, er in mehreren Dissertationen beschrieb, wie *Coffea*, *Simar Kali*, *Coriospermum* u. s. w. Neben seinen botanischen Besch tigungen wurde er auch vielfach als Arzt in Anspruch geno



men, und die natürliche Milde seines Characters machte, daß er diesen Geschäften auch gern sich unterzog. Einer der edelsten Philantropen seiner Zeit, stand er der Armuth bei, wo er konnte. Er starb im Jahr 1758, in einem Alter von 72 Jahren.

Bernhard de Jussieu war zu Lyon geboren, im Jahr 1699. Auf Veranlassung seines ältern Bruders Antoine, kam er, nach Beendigung seiner Vorstudien in seinem Geburtsorte, nach Paris, und bildete sich unter den Augen seines Bruders weiter aus. Auch ihn trieb die vorwaltende Neigung zur Botanik, er begleitete seinen Bruder nicht nur auf den Excursionen in der Umgegend von Paris, sondern auch auf der oben erwähnten Reise desselben in das südliche Europa, im Jahre 1716. Obgleich Bernhard damals erst 17 Jahr alt war, so zog er durch seine Wißbegierde und unter den Augen seines Bruders doch den größesten Nutzen von dieser Reise. Nach seiner Zurückkunft nach Frankreich begab er sich nach Montpellier, betrieb hier mit Eifer die Arzneiwissenschaften, und wurde dort 1720 zum Doctor der Medicin promovirt. Wenn er auch mit Erfolg den medicinischen Studien sich gewidmet hatte, so entsagte er doch der practischen Ausübung derselben, weil er in Folge seines tiefen Gefühls und innigen Mitleidens bei den Kranken, die seine Hülfe beehrten, stets sehr angegriffen wurde. Er gab sich dagegen ganz der Botanik hin, und kam deshalb 1722 nach Paris; er wurde Demonstrator am *Jardin des plantes* und erhielt Vaillant's Stelle. Drei Jahr darauf besorgte er eine neue Ausgabe von Tournefort's *Histoire des plantes, qui croissent dans les environs de Paris*. Hierauf und nach mehreren Mittheilungen in der Akademie der Wissenschaften wurde er 1725 zum Mitgliede derselben erwählt, und ging bald darauf nach England, wo er die klassischen Sammlungen von Hans Sloane und von Sherrard studirte.

Es war im Jahr 1738, als Linné Frankreich besuchte. Er wurde von beiden Jussieu's auf das freundschaftlichste empfangen, Bernhard namentlich kam fast nie von seiner Seite. Sie durchforschten die schönen Gegenden von Saint-Germain und Fontainebleau, sowie von Meudon, wo Linné besonders an der schönen *Ophrys* sich erfreute, die in Schweden nicht vorkommt. Sie besuchten den Garten von Trianon, der damals durch Anton Richard, dem Großvater von Achill Richard, der gegenwärtig Professor der Botanik an der medicinischen Fakultät zu Paris ist, verwaltet wurde. Beide große Botaniker verknüpfte die innigste Freundschaft.

Nach dem Tode Antoine's de Jussieu wurde Bernhard dessen Nachfolger, und 1755 beauftragte ihn ein unmittelbarer Befehl von Ludwig XV., alle Culturpflanzen Frankreichs in dem Garten zu Trianon zu vereinigen. Er ordnete diese nach einem natürlichen System in fünfundsechzig Familien.

Bernhard de Jussieu schrieb wenig, aber, ähnlich wie Werner in Freyberg, übte er einen bedeutenden Einfluß auf die Fortschritte seiner Wissenschaft aus. Indem er die große Kunst verstand, die Wissenschaft liebenswürdig zu machen, öffnete er eine neue Bahn in derselben, welche seine Zuhörer mit Eifer betraten und verfolgten. Er starb 1777 in einem Alter von 78 Jahren, zwei Monate vor Linné. Man sagt von Bernhard

de Jussieu, daß er während seines langen Lebens nur Nebenbuhler hatte, dessen hohe Achtung er aber besaß, keinen einzigen Feind.

Der dritte Bruder, Joseph de Jussieu, hatte zwar den Einfluß auf die Naturwissenschaften wie Anton und Bernhard, doch können wir nicht umhin, auch seiner hier zu denken. Joseph wurde 1704 zu Lyon geboren; auf Veranlassung seines Bruders Anton kam auch er, wie Bernhard, nach Paris; er war ein geschickter Arzt, und griff fleißig auch die Studien seiner Brüder ein. Er hatte sich zwar erst der Medicin gewidmet, verließ sie aber bald, um ganz den Naturwissenschaften zu leben. Dieses geschah mit solchem Erfolg, daß er deshalb und in Betracht seiner umfassenden allgemeinen Kenntnisse ausersehen wurde, La Condamine und die übrigen französischen Astronomen, welche von der Akademie beauftragt waren, eine Gradmessung in Peru vorzunehmen, zu begleiten. Als diese Commission nach Beendigung ihrer Arbeiten nach Frankreich zurückkehrte, zog Jussieu es vor, in Peru zu bleiben. Dieses merkwürdige Land hatte seine Aufmerksamkeit sehr gefesselt, daß er Europa darüber vergaß, Peru in allen Richtungen durchstreifte, Karten und Pläne aufnahm und eine Menge Beobachtungen darüber sammelte. Durch die Ausübung der Medicin verschaffte er sich viele Hülfsmittel, die Peruaner bewunderten seine Talente und suchten mehr als einmal seine Abreise zu verhindern, die er indess im Jahr 1771 ausführte, nachdem er 36 Jahre in Peru zugebracht hatte. Zurückgekehrt nach Europa, hoffte er den Rest seines Lebens mit dem Ordnen seiner Manuscripte zuzubringen: aber seine Kräfte waren plötzlich so erschöpft und seine Geistesfähigkeiten nahmen so ab, daß er sein Gedächtniß verlor; er starb 1779 in einem Zustande voller Hinfälligkeit. 40 Jahre lang war er Mitglied der Akademie der Wissenschaften gewesen.

Und nun komme ich zu Anton Lorenz de Jussieu, dem vierten ausgezeichneten Gelehrten dieses Namens, den eigentlichen Begründer der natürlichen Methode. Er war ein Neffe der vorigen und 1748 ebenfalls in Lyon geboren. Nach Beendigung seiner Studien in seiner Vaterstadt wurde er 1765, kaum 17 Jahr alt, von seinem Onkel Bernhard nach Paris gerufen. 1770 erwarb er sich die medicinische Doctorwürde und schon 1773 wurde er zum Mitgliede der Akademie der Wissenschaften ernannt. Er hatte damals eine Abhandlung über die Familie der Ranunculaceen geschrieben. Bei dieser Arbeit durchdrang ihn der Beruf zum Botaniker durch und durch. Mit einer Tiefe und Fülle der Ansichten bewies er in dieser Arbeit die Wichtigkeit der natürlichen Charactere und verkündigte dadurch die Reformation des botanischen Systems. In der That schlug er auch bald darauf der Akademie vor, den botanischen Garten in Paris nach seiner neuen Methode einzurichten, da die Tournefortsche nicht mehr genügend sei. Sein Onkel Bernhard billigte diesen Plan und so wurde er von ihm, mit Beihülfe des Obergärtners, Andreas Thouin, ausgeführt.

Diese von ihm allein geleiteten bedeutenden Reformen des Gartens verhinderten ihn nicht, mit unermüdlichem Eifer an der Vervollkommnung der natürlichen Methode zu arbeiten.

zurückgezogener Stille wurde das Werk vollendet, welches der einst der Wissenschaft als Basis zu dienen bestimmt war. Diese große Arbeit erschien 1789 unter dem Namen: *Genera plantarum*, ein Werk, das zu den wichtigsten Erscheinungen der Literatur am Ende des vorigen Jahrhunderts gehört; es bezeichnet eine Epoche in der Wissenschaft.

Während der Revolution von 1790 bis 1792 bekleidete Jussieu den Posten eines Administrators der Pariser Hospitäler. 1793 beschäftigte er sich mit einer Reorganisation des *Jardin des plantes*, welcher jetzt den Namen *Muséum d'histoire naturelle* erhielt. Er war unablässig mit der Erweiterung dieses großen Etablissements beschäftigt; schon im Jahr 1777 war er zum Administrator desselben ernannt worden; 1804 trat er als Professor der Botanik in die Pariser medicinische Facultät ein. Bei der Restauration verlor er seine Stelle, 1830 aber wurde er in seine Functionen wieder eingesetzt. Unablässig strebte er in der Erforschung seiner Wissenschaft, bis er schmerzlos und sanft und im ungestörten Besitze seiner Geisteskräfte verschied am 15. Sept. 1836, im hohen Alter von 89 Jahren.

Eine zweite Ausgabe seiner *Genera*, die so oft gewünscht wurde, hat er nicht erscheinen lassen. In dem *Dictionnaire des sciences naturelles*, sowie in den *Annales du Muséum d'histoire naturelle* hat er aber eine große Reihe von Artikeln niedergelegt, in welchen er nach und nach jede von ihm gegründete Familie einer strengen und sorgfältigen Kritik unterwarf. Es würde gewiß ein wichtiges und würdiges Unternehmen sein, diese trefflichen Documente für eine zweite Ausgabe der *Genera plantarum* zu benutzen.

So war das Leben dieser Jussieu's, ein Leben im Tempel der Wissenschaft. Wenige Gelehrten machten mit so geringen, vielmehr mit gar keinen Widerwärtigkeiten ihre Laufbahn. Kaum 25 — 27 Jahr alt, wurden sie Professoren und Mitglieder der Akademie der Wissenschaften, Stellen und Würden gingen von einem zum andern über, nicht minder wie die Talente und Verdienste, deren gerechte Anerkennung diese Würden waren.

Wenn auch vor und mit den Jussieu's viele Botaniker strebten, ein natürliches System zu gründen, so bleibt die Verwirklichung der natürlichen Methode doch das Verdienst von Bernhard von Jussieu; den Werth der Merkmale für die Abtheilungen des Systems, die relative Wichtigkeit für die höheren oder niederen Ordnungen desselben, den großen Einfluß der Analogien erkannte keiner vor ihm, wie er. Magnol hatte schon von den Affinitäten der Gewächse geredet, aber er kannte die Organe noch nicht, auf welche sie sich stützen. Ray hatte die Existenz der Cotyledonen dargethan, die Ausdrücke *Monocotyledonen* und *Dicotyledonen* geschaffen, aber den Einfluß dieser Embryonalblätter auf den ganzen Pflanzenorganismus hatte er noch nicht eingesehen. Tournefort, Haller, Linné, Batsch hatten natürliche Gruppen gebildet, indeß die Grundlage dieser philosophischen Klassification hatten sie nicht gefunden; Adanson hatte vieles geleistet, aber die Principien der Methode vergebens gesucht. Aus der Liste der 65 Familien von Bernhard von Jussieu, nach der Einrichtung des Gartens von Trianon sieht man, daß Bernhard nicht bloß die in

diesem Garten cultivirten Pflanzen, sondern das ganze Pflanzreich umfassen wollte. Sucht man die Theorie ausfindig zu machen, nach welcher er seine Familien anordnete, so ersieht sich, daß er zwar die Wichtigkeit der Cotyledonen bei der Anordnung erkannte, aber weit entfernt war, den großen Einfluß zu schätzen, den die Zahl der Cotyledonen auf die allgemeine Structur der Pflanzen ausübt; auch war damals die Wichtigkeit der Cotyledonen bei vielen Pflanzen nicht bekannt, weshalb manche Familien der Dicotyledonen bei Monocotyledonen stehen. Doch ist die Bildung vieler Familien so vollendet, daß sie im Laufe der Zeit wenig oder gar nicht modificirt worden sind, und deren Gattungen noch jetzt denselben Platz einnehmen, so z. B. die Familie der Orchideen, der Canneen, der Palmen, der drei Familien der Compositen, der Familie der Rubiaceen, der Umbelliferen, der Solaneen, der Juncaceen, der Apocynaceen, der Labiaten, der Cruciferen, der Veraceen u. s. w.

Aber ohnerachtet dieses, selbst nach der Einrichtung des Gartens zu Trianon, existirte die wahre natürliche Methode nicht, Bernhard de Jussieu hatte sie geahnet, aber Anton Lorenz von Jussieu entdeckte und proclamirte sie.

Die zufälligen Gruppierungen von Familien oder gewisshinreichend nahe stehenden Gewächsen, die schon in alten Werken vorkamen, kann man nicht als Vorläufer dieser Methode betrachten, sondern zu solchen muß man zählen diejenigen Arbeiten, welche das Kenntniß der Organe der Gewächse förderten, als das wahre Fundament der natürlichen Methode. Als Cäsalpini die Radikulation des Embryo und die Zusammensetzung der Frucht studirte, Morison die Zahl der Blumentheile, Ray die der Cotyledonen bestimmt, Rivin die Wichtigkeit der Corolle für die systematische Aufstellung dargethan, Tournefort sein auf die Corolle basirtes System, Linné das Sexualsystem bekannt gemacht, Adanson die Wichtigkeit des Perisperms als Familiencharakter erkannt hatte, so waren darin wesentliche Vorarbeiten der natürlichen Methode gegeben; sie war nahe daran, gegründet zu werden: aber sie war es noch nicht. Der Leuchtturm war errichtet: aber noch niemand hatte das Licht auf demselben angezündet. Diese Ehre war Anton Lorenz de Jussieu vorbehalten, seine Forschungen waren es, durch die von der Höhe des Pharos die Gebiete der Botanik erleuchtet wurden.

Die Grundlage seiner Methode stellte Jussieu in einigen besonders Werken auf, was bemerkenswerth ist durch die Präcision der Kunstaussprüche und durch das klassische Latein, worin es geschrieben ist, wodurch es durch alle Theile der gebildeten Welt verbreitet wurde. Durch Anton Lorenz von Jussieu hat die Wissenschaft einen großen Schritt gethan, viel bleibt darin noch zu entdecken, aber von ihm an datiren wir eine neue Periode des Fortschritts, und darin sind wir alle einig, daß der Name der Jussieu's glänzt bei denen von Tournefort und Linné.

Ich kann mir nicht erlauben, hier die Principien der natürlichen Methode zu entwickeln, hier, wo, wie ich schon anführte,



vor Männern rede, die damit vertraut sind \*). Durchdrungen aber von der Wichtigkeit derselben, und namentlich auch für unser Fach, betrachte ich mich hier als beauftragt von unserm Vereine, dem Andenken der Jussieu's den Tribut der Verehrung einer dankbaren Nachwelt in unserer Genossenschaft darzubringen, und in diesem Gefühl ihren Namen hier in unserer Versammlung zu verkünden, als ein leuchtendes Gestirn, das über den Arbeiten unsers nächsten Vereinsjahrs seine Strahlen aussenden wird. Der Name der Jussieu's wird uns für immer ehrwürdig sein, er wird überall für alle Zeiten ehrwürdig sein, wo die Wissenschaften, insbesondere Botanik, Medicin und Pharmacie, betrieben werden.

## II.

Der Zustand unsers Vereins gewährt ein so erfreuliches Bild, daß es mir das innigste Vergnügen macht, darüber heute das Wesentlichste Ihnen vorzulegen.

Die Jahre des Friedens haben die geistigen und materiellen Kräfte zum Anbau jener schönen Felder geführt, die dem menschlichen Geiste die würdigsten Ernten gewähren. Künste und Wissenschaften, die Industrie mit ihrem ganzen Gewerbreichthum, haben ausgezeichnete Höhenpunkte erreicht. Die Hineinleitung der vereinzeltten Kräfte zum gemeinschaftlichen Zusammenwirken ist mit die Ursache der eminenten Fortschritte, welche die neueste Zeit in den oben benannten Fächern gewonnen hat. Unser Fach ist nicht zurückgeblieben, die Mitglieder desselben haben es in dem ganzen Umfange des Werths erkannt, wie groß die Vortheile solches gemeinsamen Zusammenwirkens sind. Der Verein ist die Folge davon. Und wenn derselbe in diesem Jahre bis zu fast 700 wirklichen Mitgliedern sich vermehrt hat, so ist dieses eben der vollwichtigste Beweis von der Erkenntniß der Wahrheit des oben Ausgesprochenen.

Wir haben die Verpflichtung, in unserer Generalversammlung Ihnen die Generalrechnung des Vereins vorzulegen, und zwar die von 1837, die zum Abschlufs gebracht worden ist. Zu besonderer Freude gereicht es dem Directorium, daß die Direction der Generalkasse auch die von 1838 vorlegen und zum Abschlufs bringen kann.

Das Vereinskapi tal hat jetzt eine namhafte Höhe erreicht, und in seinem Zinsertrage, wie durch die Eintrittsgelder neuer Mitglieder, eine für seinen Zweck nicht unbedeutende Quelle der Vermehrung, auch wird es mitunter von wohlwollenden Gönnern der Anstalt freundlich bedacht.

Aus der Generalrechnung werden Sie ferner ansehen, daß der Gehülfen - Unterstützungs - Angelegenheit stets die sorgfältigste Beachtung zu Theil wird, und durch die Verbindung mit der Bacholz - Gehlen - Trommsdorffschen Stiftung eine bedeutendere

---

\*) S. Jussieu's u. Decandolle's Pflanzensysteme nach ihren Grundsätzen entwickelt, und mit den Pflanzenfamilien von Agardh, Batsch, Linné u. s. w. von C. Fuhlroth. Mit einer Vorrede von C. G. Nees von Esenbeck, Bonn 1829. Vergl. *Principes de la méthode naturelle des végétaux* par Mr. L. de Jussieu. Paris 1824.

Wirksamkeit erreicht hat. Die Unterstützungen werden so gewissenhaft als möglich ausgetheilt, und die Würdigkeit der um solche Nachsuchenden wird so genau ermittelt, als es sein kann und nicht anders die Pension bewilligt, als nach Einsendung aller Documente, die in dem Statute der Anstalt vorgeschrieben sind. Die vermehrte Zahl der Bedürftigen hat es nothwendig gemacht, daß die Pensionen bis jetzt nur eine kleine Summe für jeden Einzelnen betragen, und doch ist dadurch mancher Sorge, mancher Kummer gestillt worden. Mehre, die der Tod vom Leben abrief, haben dankend auf dem Sterbebette die Anstalt gesegnet, die ihnen ihre letzten Lebensjahre erleichterte. Nehmen sie, verehrte Collegen! diesen Dank, diesen Segen, als den schönsten Lohn für Ihre Mitwirkung, jenen Männern die Beschwerden ihrer letzten Lebensjahre gemildert zu haben.

Im gegenwärtigen Jahre ist die Zahl der Kreise des Vereins 46, und die der Mitglieder, soweit solche sich nach unsern Listen schon jetzt bestimmen läßt, 681.

Die neuen Kreise, welche in diesem Jahre eintraten, sind der Kreis Brandenburg, durch Hrn. Geiseler begründet; wir dürfen hoffen, daß dieser Kreis bald sich vermehren wird, der Kreis Conitz, durch Hrn. Kreisdirector Schultz, der Kreis Jena, durch Hrn. Kreisdirector Dreykorn in Neustadt an der Orla, der Kreis Lissa, durch Hrn. Kreisdirector Lipowitz, der Kreis Saalfeld, durch Hrn. Kreisdirector Grefslers, und der Kreis Siegen, durch Hrn. Kreisdirector Posthoff.

Was einige einzelne Kreise betrifft, so muß bemerkt werden, daß es wünschenswerth sein dürfte, den Kreis Braunschweig wegen seiner großen Zahl an Mitgliedern in 2 Kreise zu theilen. Dasselbe gilt für den Kreis Gotha. Die Herren Vicedirectoren Herzog und Dr. Bucholz werden, wenn sie dieses angemessen finden, die dazu erforderlichen Anordnungen treffen. Die Kreise Achen und Gummersbach haben sich so vermehrt, daß der Vorschlag der Herren Vicedirector Schlmeyer und Kreisdirectoren Dr. Marder und Dr. Voget, diese Kreise nicht zu vereinigen, im Interesse der Mitglieder gern angenommen wurde.

Der Kreis Osnabrück, der unter der Mitwirkung des Hrn. Kreisdirectors Upmann neu organisirt worden ist, hat sich bedeutend vergrößert, und ist durch die Thätigkeit des Hrn. Collegen Upmann in geregelter Ordnung, wozu auch die HH. Apoth. Meyer und Kemper in Osnabrück und Hr. Apotheker Müller in Lingen thätig mitwirkten. Für die Kreise des Vicedirectoriums am Niederrhein, Mühlheim an der Ruhr, Schwelm und Xanten, sind die Herren Vicedirector Klönne und Kreisdirectoren Schmithals und Weber sehr thätig gewesen; in dem Kreise Schwelm wurde der Lesezirkel wieder eingerichtet und in den Kreisen Xanten und Mühlheim wird solches auch für das nächste Jahr, wie wir hoffen, bewerkstelligt werden. In den kleineren Kreisen des Vicedirectoriums Cassel hat eine Vereinigung zu einem Lesezirkel Statt gefunden, bis genannte Kreise wieder an Mitgliedern sich vermehrt haben, wozu hinzuwirken wir die dortigen verehrten Herren Vereinsbeamten recht sehr ersuchen.

Was die Bücher der Lesezirkel betrifft, so sind solche an-

geschäft in Verhältniß zu der Zahl der Mitglieder der einzelnen Kreise, so daß diejenigen mit einer größeren Mitgliederzahl auch mehrere Journale halten. In dieser Beziehung ist es von Vortheil und ganz in ihrem Interesse, wenn die Kreise 15 bis 20 Mitglieder zählen, weil sie dann um so mehr Zeitschriften für die Lesezirkel anschaffen können. In mehreren Kreisen ist der Verkauf der aus der Circulation zurückgekommenen Bücher bewerkstelligt worden. Wir ersuchen die sämtlichen Kreisdirectoren, diesen Verkauf vorzunehmen und dabei nach ihrem besten Ermessen zu verfahren. Der Ertrag dafür wird der Vereinskasse zugesandt, und, soweit es möglich, dem Vereinskapitale zugerechnet, welches dadurch um so eher zu einer Wirksamkeit für den Verein kommen wird.

Und nun statt' ich allen verehrten Herren Mitgliedern, Namens des Directoriums, den innigsten Dank ab für das Vertrauen, das Sie uns stets erwiesen haben, und was sich auf eine Weise ausgesprochen hat in der Zustimmung, die sie den neuen Einrichtungen des Instituts angedeihen ließen, die für uns so ehrenvoll als belohnend ist, gewiß, es giebt keinen schöneren Lohn, als ein solches Vertrauen. Die Art, wie Sie diese neuen Einrichtungen aufgenommen haben, und wie die sämtlichen Herren Vereinsbeamten uns zu deren Einführung ermunterten und unterstützten, hat uns mit dem freudigsten Muth beseelt, das anfangs mit so vielen Schwierigkeiten verbundene Unternehmen ins Werk zu setzen. Bereitwillig haben wir dazu alles aufgeboten, als wir Ihrer Zustimmung gewiß waren, nun ist es ins Leben treten: — es ist Ihr aller Werk. Erhalten Sie uns dieses Ihr Vertrauen, das ist es, das uns jede Arbeit für die Anstalt gern vollbringen läßt, und uns Muth und Kraft dazu verleiht.

Wir glauben zu solcher Bitte Anspruch zu haben, in Betracht der neunzehnjährigen Führung der Vereinsangelegenheiten. Der Vortheil, den die neuen Einrichtungen des Vereins für die wirklichen Mitglieder gewähren, wird überall gerühmt. Die Verbindung des Archivs mit der Vereinszeitung, die rasche Förderung der Zeitschrift durch directen Postenlauf an jedes einzelne Mitglied für einen unbedeutenden Preis, was nur in Verbindung mit der so thätigen, bedeutenden und alles Gute uneigennützig fördernden Verlagshandlung ausgeführt werden konnte, hat außer den damit verknüpften Vortheilen der raschen Mittheilung aller Vereinsangelegenheiten an jedes Mitglied, der wissenschaftlichen Arbeiten und Bereicherungen, der Privatbekanntmachungen u. s. w., den unschätzbaren Vortheil, ein gemeinsames Band für alle Mitglieder begründet zu haben. Recht sehr erwünscht, und der Ehre der Anstalt entsprechend ist, wenn Sie Ihre wissenschaftlichen und practischen Erfahrungen dafür uns reichlich mittheilen, sowie es auch allen Mitgliedern unentgeltlich offen steht, für Bekanntmachungen in ihrem Interesse, Kauf- und Verkaufsgegenstände u. s. w. betreffend, die dadurch in kurzer Frist zur Kunde so vieler Collegen gelangen.

Auch das Rechnungsgeschäft ist nun bedeutend geregelter geworden, und wenn es freilich auch sehr vermehrt worden ist, so hat es auf der andern Seite durch die größere Ordnung auch an Annehmlichkeit gewonnen. Wir müssen, um diese Ordnung zu erhalten, dringend bitten, daß die Beiträge stets zu

der festgesetzten Zeit eingezahlt werden, um unserm würdigen Collegen, Dr. Aschoff, diese schwierige Branche der Vereinsverwaltung möglichst zu erleichtern.

Die Anerkennung, welche die neuen Einrichtungen des Vereins auch höhern Ortes gefunden hat, muß uns ein Streben sein, dieselben zu erhalten und wo möglich zu vervollkommen. Wie erfreulich hat sich der hochverehrte Hr. Protector des Vereins, des Geh. Staatsministers v. Altenstein Excellenz gleich zu Anfang dieses Jahrs darüber ausgesprochen, wie dieses in dem Februarhefte dieses Jahrganges des Archivs den Mitgliedern bekannt gemacht wurde. Kürzlich hat auch der hochverehrte Hr. Protector dem Directorio ein Document zuzusenden geruhet, in welchem amtlich die Stiftung und der Bestand des Vereins unter dieser hohen ehrenvollen Protection beglaubigt worden ist. Hochfürstlich Lippische Regierung hat gleichfalls ebenfalls ein Document über die Stiftung und Anerkennung des Vereins uns zu ertheilen die Gnade gehabt. Beide Anstalt ehrenvolle Documente lege ich Ihnen hiermit im Original vor. Den hohen Regierungen der Staaten, in welchen der Verein sich ausbildete, haben wir von den Fortschritten und von dem Bestande desselben in unterthänigster Berichterstattung die schuldige Anzeige gemacht, und die Zwecke des Vereins und seine Bestrebungen haben überall die erfreulichste Wirkung erhalten, wie solches erweisen die hohen Erlasse

- 1) aus dem Cabinette Sr. Majestät des Königs von Hannover d. d. Hannover, den 12. Aug. 1839;
- 2) des hohen Kurhessischen Ministeriums des Innern, d. d. Cassel, den 13. Juli 1839;
- 3) einer hohen Großherzoglich Sächsischen Landesdirection mittelst hochgewogentlicher Benachrichtigung durch Hr. Geh. Hofrath Dr. Vogel, d. d. Weimar, den 5. Juli 1839;
- 4) einer hohen Anhalt-Bernburgischen Regierung, d. d. Bernburg, den 20. Juli 1839;
- 5) einer hohen Herzogl. Anhalt-Dessauischen Regierung, d. d. Dessau, den 3. Aug. 1839;
- 6) einer hohen Herzogl. Sachs-Coburg-Gothaischen Regierung, d. d. Coburg, den 22. Juli 1839;
- 7) einer hohen Herzogl. Braunschweigischen Regierung, d. d. Braunschweig, den 5. Aug. 1839.

Diese hohen Erlasse sind ebenfalls zu Ihrer Einsicht hienach aufgelegt.

Zu besonderm unterthänigsten Danke verpflichtet uns 8) das auf Allerhöchsten Befehl Sr. Königl. Hoheit des Durchlauchtigsten Herrn Großherzogs von Mecklenburg-Strelitz ausgefertigte Schreiben, über die Anerkennung des Vereins und die demselben bereits 1825 bewilligte und fernerweit zugestandene Portofreiheit in den Großherzoglichen Landen.

Nicht nur in den Königl. preussischen Staaten wird auf hohe Anordnung des Hrn. Geh. Staatsministers v. Altenstein Excellenz, das Archiv von den sämtlichen Medicinalcollegien gehalten, so wie auch von Hochfürstlich Lippischer Regierung solches geschieht, sondern dasselbe wird nun auch auf höchste Verordnungen gehalten von der Großherzoglichen Landesdirection in Weimar, von dem Medicinalcollegium in Neu-



Strelitz, von der hohen Herzogl. Sachs-Coburg. Landesregierung, von der Herzogl. Anhalt-Bernburgischen Medicinalcommission, von der Herzogl. Anhalt-Dessauschen Medicinalbehörde.

Gewiss werden so hohe Beweise von Anerkennung ein Sporn für alle Mitglieder des Vereins sein, für die Ehre der Anstalt nach Kräften zu wirken. Indem wir den hohen Regierungsbehörden, wie dem hohen Protector unseres Vereins, den ehrerbietigsten Dank dafür darbringen, dürfen wir gern der Hoffnung uns hingeben, daß dieses hohe Wohlwollen ferner der Anstalt hochgeneigst erhalten bleibe.

Mit dem innigsten Danke verehren wir die vielfachen Beweise hoher Theilnahme, die der Hr. Oberpräsident von Westphalen, Freiherr von Vincke, Excellenz, stets der Anstalt so gütig erwiesen hat.

Eine wichtige Angelegenheit haben wir für den Verein zu erreichen das Glück gehabt, was für die Hrn. Mitglieder im Bereich Hochfürstl. Thurn- und Taxischer Posten von bedeutendem Nutzen ist. Des Hrn. Fürsten von Thurn und Taxis hochfürstl. Durchlaucht haben nämlich geruhet, dem Vereine dieselbe Portovergünstigung gnädigst zu gewähren, die wir im Königreich Preussen genossen. Für einen kleinen Beitrag werden daher gedachte Mitglieder vom nächsten Jahre an das Archiv so wie die Bücher der Lesezirkel postfrei erhalten. Dieser neue bedeutende Vortheil, so hoffen wir, wird ein Beweggrund für viele Collegen werden, dem Vereine sich anzuschließen. Dem durchlauchtigsten Fürsten aber, der so sehr die Zwecke der Anstalt durch die gnädigste Gewährung unserer Bitten förderte, widmen wir den ehrerbietigsten Dank.

Erfreulich ist es, daß auch in diesem Jahre in mehreren Kreisen Versammlungen Statt haben. Unser thätiger College, Hr. Vicedirector Müller, hatte eine Versammlung in Wildungen veranlaßt, Hr. Kreisdirector Giseke eine Versammlung des Mannsfelder Kreises in Eisleben. In Meiningen wird eine Versammlung Statt finden, eine andere in Eilenburg, so wie in Neustadt a. d. O. die Mitglieder des Kreises Jena sich versammeln werden. Möchten solche in noch mehreren Kreisen veranlaßt werden; fördernd und erhebend ist das Gute in ihrem Gefolge.

Mit der pharmaceutischen Gesellschaft in Rheinbaiern haben wir fortwährend freundlichen collegialischen Verkehr unterhalten, ebenso mit der pharmaceutischen Gesellschaft in Paris. Die kaiserl. Russ. pharmaceutische Gesellschaft in Petersburg hat uns ihre innige Theilnahme an unserer Anstalt bethätigt, und auch mit der pharmaceutischen Gesellschaft in Lissabon haben wir eine nähere Beziehung angeknüpft, um das freundliche Entgegenkommen derselben zu erwiedern.

Mit diesen Gesellschaften, wie mit denen in Baiern und Württemberg schon früher Statt fand, haben wir einen Austausch unserer Zeitschriften begonnen; wenn es Zeit und Umstände erlauben, werden auch mit den verwandten Gesellschaften anderer Länder derartige Beziehungen eingeleitet werden.

Eine folgenreiche Thätigkeit in unserm Fache muß durch alle diese Vereine für Wissenschaft und Praxis gewonnen werden, und wie sie dem Einzelnen nützen, fördern und tragen sie das

Ganze. Unsere Collegen in Baiern haben eine Versammlung Bamberg in diesem Jahre gehalten, unter dem Vorsitze des wüthen Th. Martius von Erlangen. Sie haben dort ein pharmaceutisches Correspondenzblatt gegründet für Süddeutschland, und werden im nächsten Jahre eine Zusammenkunft in München veranstalten. In Stuttgart ist, wie bereits in unserer Vereinszeitung berichtet worden, eine Zusammenkunft veranlaßt, und dort die Bildung eines größeren süddeutschen pharmaceutischen Vereins zu bewirken. In Darmstadt beabsichtigt man einen besonderen Verein der Apotheker des Großherzogthums Hesse zu stiften. Wahrlich diese Bestrebungen sind erfreulich; sie sind ein Beweis, wie allgemein unter allen unseren Collegen die Wichtigkeit und die hohe Bestimmung unseres Berufs erkannt wird, wie freudig alle darnach streben, um die Pharmacie zu vervollkommen und die Arzneimittel so zu dispensiren, daß sie untadelhaft und den ihnen unterliegenden Absichten entsprechen, und wie sie, um solches auszuführen, eifrigst sich angelegen sein lassen, mit der Wissenschaft fortzuschreiten.

Dieses Bestreben liegt laut ausgesprochen in allen diesen Schritten vor Augen. Möge man auch höheren Ortes, wenn von Seiten der Apotheker alles aufgeboten wird, ihren Pflichten mit rühmlichstem Eifer nachzukommen, auch bald die mannichfachen Verhältnisse, die jetzt unser Fach drücken, einer Revision unterwerfen, und diese zu einer solchen Lage zurückführen, auf die dasselbe gerechte Ansprüche zu machen vollkommen berechtigt ist. Lassen Sie uns hoffen, daß dieser Zeitpunkt nicht mehr fern ist, lassen Sie uns wirken, durch treue Pflichterfüllung dieser unserer gerechten Ansprüche uns fortdauernd werth zu halten. Lassen Sie alle uns wachen für den Flor unserer Anstalt, und nehmen Sie, verehrte Hrn. Beamten derselben und alle Mitglieder, die so kräftig dafür arbeiteten, den herzlichsten Dank entgegen, den ich Ihnen im Namen des Instituts darzubringen für meine schönste Verpflichtung erachte. Mir aber, und darum bitte ich mit vollem Herzen, erhalten Sie Ihre Freundschaft, Ihre Mithülfe. Die Erfüllung dieser Bitte werden Sie mir nicht versagen.

### Erfreuliche Verbreitung des Vereins und Eintritt neuer Mitglieder.

In Folge des hohen Wohlwollens Sr. Excellenz des Hrn. Oberpräsidenten Freihrn. von Vincke, sowie der ermunternden Theilnahme des Königl. Medicinal-Collegii zu Münster, sind fast die sämtlichen Apotheker des dortigen Regierungsbezirks dem Vereine zugetreten. Dankbar erkennen wir insbesondere hierbei an die gütige Mitwirkung des Hrn. Medicinalraths Dr. Busch und des Hrn. Dr. Schmedding in Münster, die, überzeugt von den schönen Folgen des Vereins, die Begründung desselben in dortiger Gegend erzielten. Es ist hierauf ein besonderer Kreis Münster gebildet worden, und auf den Wunsch unserer Herren Collegen daselbst, hat Hr. Dr. Schmedding, Privatdocent an der dortigen Akademie, das Amt eines Kreisdirectors zu übernehmen die Güte gehabt.

Die Mitglieder des neuen Kreises sind bis jetzt folgende:

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Hr. Dr. Schmedding,                  | Kreisdirector, |
| „ Apotheker Aulicke in Münster,      |                |
| „ „ Greve das.,                      |                |
| „ „ Henkenius das.,                  |                |
| „ „ Hackebrom in Dülmen,             |                |
| „ „ Albers in Lengerich,             |                |
| „ „ Brefeld in Telgte,               |                |
| „ „ Koch in Ibbenbüren,              |                |
| „ „ Sluiter in Cappeln,              |                |
| „ „ Laar in Harsewinkel,             |                |
| „ „ Henke in Lüdinghausen,           |                |
| „ „ vom Berge in Werne,              |                |
| „ „ Engeler in Horstmar,             |                |
| „ „ Vaessen in Borken,               |                |
| „ „ Helmke in Beckum,                |                |
| „ „ Libcon in Wadersloe,             |                |
| „ „ König in Sendenhorst,            |                |
| „ „ Unkenbold in Ahlen,              |                |
| „ „ König in Steinfurt,              |                |
| „ „ Tosse in Buer,                   |                |
| „ Provisor Homann in Recklinghausen, |                |
| „ „ Horn in Dorsten.                 |                |

Den verdienstlichen Bemühungen des Hrn. Collegen Dreykorn in Neustadt a. d. Orla ist es gelungen, die Bildung eines andern Kreises zu bewirken, und zwar des Kreises Weimar. Die Mitglieder dieses Kreises sind bis jetzt:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Hr. Hofapotheker Knauer in Weimar,  |  |
| „ Apotheker Brenner in Blankenhain, |  |
| „ „ Wernicke in Berka,              |  |
| „ „ Hänert in Buttstädt,            |  |
| „ „ Münzel in Buttstädt,            |  |
| „ „ Silchmüller in Sulza,           |  |
| „ „ Suthau in Eckartsberge,         |  |
| „ „ Grimm in Rathenburg,            |  |
| „ „ Hoffmann in Neumark,            |  |
| „ „ Kanoldt in Großrudestätt,       |  |
| „ „ Engelhardt in Vieselbach.       |  |

Hr. Hofapotheker Knauer in Weimar ist zum Kreisdirector des neuen Kreises Weimar erwählt worden.

Durch die schöne Thätigkeit, mit welcher Hr. Vicedirector Dr. Grischow für den Verein wirkt, und die Unterstützung, welche Hr. College Hollandt in Güstrow dabei leistete, ist ein neuer Kreis in dem Vicedirectorium Mecklenburg entstanden. Dieser zählt vorerst folgende Mitglieder:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Hr. Apotheker Brun in Güstrow, |  |
| „ „ Prätorius das.,            |  |
| „ „ Hollandt das.,             |  |
| „ „ Bahlmann in Schwerin,      |  |
| „ „ Hesse in Bützow,           |  |
| „ „ Bösefleisch in Goldberg,   |  |
| „ „ Block in Krakow,           |  |
| „ „ Nerger in Tessin,          |  |
| „ Provisor Passow in Laage.    |  |

Der neue Kreis ist mit dem Namen des Kreises Güns bezeichnen und Hr. Apotheker Hollandt zum Kreisdirector selbst erwählt worden.

Wir heißen die Mitglieder der oben benannten neuen Kreise herzlich willkommen und erlauben uns, auf die genaue Beachtung der Statuten aufmerksam zu machen, dann wird die Anstalt auch allen den Nutzen haben, den sie zu leisten bestimmt ist.

Hr. Apotheker Gödeke in Warburg und Hr. Apotheker van Nuyfs in Lichtenau sind, nach Anmeldung durch den Kreisdirector Müller in Driburg, als wirkliche Mitglieder des Vereins in den Kreis Paderborn wieder eingetreten.

Desgl. Hr. Apotheker Schultz in Glandorf und Hr. Administrator Stisser in Quakenbrück, nach Anmeldung durch den Kreisdirector Upmann in Neuenkirchen, in den Kreis Oldenburg eingetreten.

Desgl. Hr. Apotheker König in Lönningen, nach Anmeldung durch den Vicedirector Dugend, in den Kreis Oldenburg, und Hr. Apotheker König in Cloppenburg, bereits früher Mitglied des Vereins, ist in den Kreis Oldenburg wieder eingetreten.

Der Oberdirector des Vereins  
Brandes.

## Directorialconferenz zu Herford am 21. Nov. 1833

I. Hr. Geiseler, früher Apotheker in Brandenburg, jetzt in Berlin privatisirend, zeigt an, daß er die bisher von ihm geführte Verwaltung des Kreises Brandenburg nicht wohl mehr führen könne, aber recht sehr wünsche, dem Vereine als wirkliches Mitglied zu verbleiben. Dem Hrn. Geiseler ist für die Thätigkeit, welche er der Begründung des Vereins in der dortigen Gegend widmete, der aner kennendste Dank dargebracht worden und sein Wunsch, fernerhin dem Vereine als Mitglied anzugehören, mit herzlicher Freude erfüllt. Vielleicht dürfen wir hoffen, daß Hr. Geiseler auch das Kreisdirectorium noch fortführen wird.

II. Die Anzeige der Bildung eines neuen Kreises in Mecklenburg, auf Antrag von Hrn. Dr. Schmedding daselbst, sowie die eines andern neuen Kreises im Mecklenburgischen, auf Antrag des Hrn. Vicedirectors Dr. Grischow, und eines dritten neuen Kreises im Großherzogthum Weimar, auf Antrag des Hrn. Kreisdirectors Dreykorn, wurden mit Vergnügen entgegengenommen.

III. Der Antrag des Hrn. Vicedirectors Dr. Grischow, dem verarmten und invaliden Gehülfen, Hrn. Brackenfeld aus Groß-Freienholz bei Rostock, eine Unterstützung aus der Buchholz-Gehlen-Trommsdorffschen Stiftung zu Theil werden zu lassen, wurde nach Einsicht der übersandten Zeugnisse bewilligt.

IV. Desgleichen der Antrag des Hrn. Vicedirectors Müller in Medebach, die Unterstützung des verarmten und invaliden Gehülfen Hrn. Hilbertz in Neuhaus bei Paderborn betreffend.



V. Da die Kosten der Expedition und des Portos des Archivs bis zum Kreisdirector nach den Vorlagen der Verlags- handlung nicht von dieser getragen werden können, sondern nach dem frühern Beschlufs der Generalversammlung in Pyrmont (S. dieses Archiv 2. R. Bd. XX. S. 122) von der Generalkasse übernommen werden müssen, so hat sich die Deckung dieser Ausgabe nicht anders ausmitteln lassen, als durch Erhöhung des Beitrags zur Generalkasse von 12 Ggr. auf 16 Ggr.

VI. Die Anzeigen, welche Mitglieder in der Vereinszeitung bekannt zu machen wünschen, konnten oft in dem laufenden Hefte des Archivs nicht mehr aufgenommen werden, wenn sie nach dem Druck der Zeitung oder der ersten Bogen jedes einzelnen Heftes eingingen, und mußten dann bis zum nächsten Hefte liegen bleiben. Zur Beseitigung dieses Uebelstandes wird, vom nächsten Jahre an, jedem Hefte des Archivs ein *allgemeiner Anzeiger* beigegeben werden, welcher jene Bekanntmachungen enthält, und zwar als letzte Abtheilung eines jeden Heftes. Dieser Anzeiger soll zwei Abtheilungen erhalten, die erste als *Anzeiger der Vereinszeitung* nimmt die oben erwähnten Bekanntmachungen der Vereinsmitglieder unentgeltlich auf, die zweite, *Anzeiger der Verlagshandlung*, ist für Ankündigungen dieser bestimmt.

VII. Da aus mehreren Kreisen gegründete Klagen über ungebührliche Zurückhaltung der Bücher der Lesezirkel weit über die festgesetzte Zeit hinaus eingelaufen sind, namentlich aus dem Vicedirectorium Oldenburg, den Kreisen Herford, Eimbeck, Hannover u. a., und der Zweck der Lesezirkel durch solche Unordnungen größtentheils vereitelt wird, so wird hiermit an den früheren Beschlufs erinnert, daß der betreffende Kreisdirector solche Mitglieder, die auf mehrmalige Erinnerung ferner solche Unordnungen sich zu Schulden kommen lassen, dem Director der Bibliothek anzeige, welcher bei dem Oberdirector auf deren Streichung aus der Liste der Mitglieder antragen wird, da aus der Nichtbeachtung der Circulationsordnung den sämtlichen Mitgliedern eines Kreises Nachtheil erwächst, und dadurch dem Ganzen geschadet wird. Wir wissen recht gut, daß nur Nachlässigkeit und Uebersehen der Grund dieses Uebels ist, wenn man aber bedenkt, daß man nicht sich, sondern andern Collegien und einer ganzen Anstalt dadurch Schaden zufügt, so sollte man, zur Vermeidung dieses, doch auch der festgesetzten Ordnung, die ja überall zum Gedeihen nothwendig ist, die gebührende Aufmerksamkeit schenken. Wir bitten recht sehr darum.

Der Oberdirector: R. Brandes.

Die Directoren: Dr. E. F. Aschoff. Overbeck. Wilken.

Die Assessoren: L. Aschoff. Faber.

Directorialconferenz zu Lemgo am 21. Nov. 1839.

I. Der Druck neuer Formulare für die Rechnungen und Beiträge zum Verein, sowie der Circulationszettel für die Lesezirkel wurde angeordnet.

II. Die Wahl der Bücher für die Lesezirkel für 1840 v. festgestellt, und werden vom Director der Bibliothek den einsbeamten darüber die nöthigen Mittheilungen zukommen wird gewünscht, daß so viel wie möglich diese Vorschläge berücksichtigt werden, da sie im Interesse des Ganzen ges. sind. Sollte man statt der gewählten Bücher andere wünsch. so wird um Anzeige darüber an die Direction der Bibliothek ersucht.

III. Es sind von mehreren Kreisdirectoren Anzeigen ergangen über den Verkauf der aus der Circulation zurückgenommenen bei ihnen seit Jahren aufgehäuften Bücher der Lesezirkel, um solche in der Vereinszeitung mitzutheilen. Das erlaubt der Raum derselben nicht. Es ist jedem Kreisdirector überlassen, auf die ihm angemessenste Weise den Verkauf bewerkstelligen und darüber den Mitgliedern seines Kreises erforderlichen Anzeigen zu machen, sowie wir auch die Mitglieder auffordern, die das eine oder andere Journal zu kaufen wünschen, dieserhalb an ihren Kreisdirector sich zu wenden.

Dr. E. F. Aschoff. Brandes. Overbeck.

### Anzeige.

1) Die Herren Vereinsbeamten, welche ihre Abrechnung 1839 noch nicht eingesandt haben, werden um deren baldmöglichste Einsendung, zugleich mit den noch bei ihnen befindlichen Cassenbeständen für 1839, recht sehr ersucht.

2) Die Herren Mitglieder des Vereins werden ersucht, Beiträge zur Generalkasse des Vereins, die für jedes Mitglied Bereich Königl. Preuss. und Fürstl. Thurn- und Taxischer 6 Rthlr. 4 Ggr., für jedes andere Mitglied 5 Rthlr. 16 G. betragen, zu der festgesetzten Zeit ihrem Kreisdirector einzusenden.

Die Direction der Generalkasse  
Dr. E. F. Aschoff.

## 2) Gelehrte Gesellschaften und Lehranstalten.

### Akademie der Wissenschaften in Berlin.

Sitzung der mathematisch-physikalischen Klasse am 20. J. 1839. Prof. Kunth: Ueber die Blütenentwicklung der Gattung *Roxburghia* und Bemerkungen über die Familie der peracoen.

### Akademie der Wissenschaften in Paris.

Sitzung am 6. Mai 1839. Ein Schreiben Dutrochet's über die Wärme der Blumen. Die Wärme des obern Theils

Spadix von *Arum maculatum* erreicht das Maximum der Wärme während des Aufbrechens, zugleich haben dann die männlichen und weiblichen Blüthen ihren höchsten Wärmegrad, der etwas geringer ist, erreicht. Die Wärme des obern Theils des Spadix verschwindet in der nächsten dem Aufbrechen desselben folgenden Nacht; die der männlichen und weiblichen Blumen bleibt während der Nacht, aber nimmt ab, am folgenden Morgen nimmt sie wieder zu und verschwindet dann nach und nach völlig. Diesen täglichen Wechsel der Temperatur haben auch Brogniart, van Beck und Bergsma beobachtet. — Ein Schreiben von Donné über Bildung von oxalsaurem Kalk in der thierischen Oekonomie. Es reicht hin, Sauerklee zu essen, um die Bildung einer Menge schöner Krystalle dieses Salzes im Harn zu beobachten, sie erscheinen als viers. Doppelpyramiden. Während des Frühlings liefs sich dieser Umstand beim Harn fast aller Kranken wahrnehmen. Viele Exitantien, worauf man meist wenig achtet, als Kaffee, Thee, selbst Tabacksrauch, begünstigen die Production der Harnsäure, die darnach bald in gelben rhomboidalen Plättchen aus dem Harn sich absondert. Es ist daher nicht unnütz, bei zu Gries und Harnsteinen von oxalsaurem Kalk und von Harnsäure disponirten Patienten hierauf Acht zu haben; eine überschüssige Menge letzter Substanz kann vielleicht auch als Diagnose von Krankheiten des Magensystems dienen.

Matteucci theilt die Resultate einer Abhandlung über Electrochemie mit. Er behauptet in dem ersten Theile, dafs die electriche Kraft wächst wie der Strom, die Vermehrung mag man in einer Vergrößerung der Oberflächen der Elemente, oder in andern Dispositionen, die eine gröfsere Menge El. hervorgerufen, begründet sein. Der zweite Theil begreift die Beziehung zwischen der chemischen Action des Stroms und den Substanzen, die er zersetzt, wobei vorzüglich Folgendes zu merken: 1) Wenn ein Strom durch eine Flüssigkeit geht, die aus zwei andern zersetzbaren gemengten, aber nicht verbundenen Flüssigkeiten besteht, so ist die Summe der beiden zersetzten Quantitäten chemisch äquivalent der Quantität, welche eine andere Verbindung direct durch denselben Strom in derselben Zeit gegeben haben würde. Z. B. wenn ein Strom durch Wasser geht, darauf durch ein Gemenge von Chlorwasserstoffsäure und einem Chlorür, so ist die Summe des zersetzten Chlorürs und der Säure dem des für sich zersetzten Wassers äquivalent. 2) Die binären Verbindungen der ersten Ordnung, wie die Oxyde, Chloride und Jodide werden auf dieselbe Weise zersetzt, als wenn sie in den Zustand einer höheren Verbindungsordnung übergegangen sind; man erhält nämlich dieselbe Menge Metall am negativen Pole, man mag Bleioxyd oder das Acetat, das Jodür, das Borat, das Chlorür oder das Nitrat u. s. w. dieses Metalls zersetzen. Die zersetzten Quantitäten sind, in Betreff des erhaltenen Metalls, äquivalent dem in derselben Zeit zersetzten Wasser. Der dritte Theil dieser Arbeit handelt von den Verhältnissen zwischen der Quantität des Stroms und den chemischen Äquivalenten der zersetzten Substanzen. 1) Das Gesetz der entschiedenen chemischen Action des Voltaischen Stroms bewährte sich nur in den Verbindungen, die aus einem Äquivalent einer Substanz mit einem Äquivalent einer andern Sub-

stanz bestehen,  $A + B$ . 2) Wenn eine dieser Substanzen mehr Aequivalente hat, wie  $A + B + B$ , so ist die Menge der zersetzten Substanz stets geringer als bei einer aus einfachen Aequivalenten bestehenden. 3) Diese Verringerung der Menge der zersetzten Substanz nimmt schneller zu als die Zahl der Aequivalente.

*Sitzung am 25. Juni.* Fremy zeigt an, daß es ihm gelungen ist, den Zucker in Milchsäure umzuändern, dadurch, er ihn mit einer Kalbsmagenhaut in Berührung liefs.

*Sitzung am 1. Juli.* Gay-Lussac zeigt brieflich an, in vielen Fällen Milchsäure sich bilde durch den Contact animalischen und vegetabilischen Materie, und daß Zucker und andere vegetabilische Producte, in Berührung mit animalischen Stoffen, nicht nur die Bildung von Milchsäure bestimmten, sondern auch ihre Fäulniß ziemlich lange aufhielten und da zur Conservation animalischer Substanzen dienen könnten. Gay will mit diesen Bemerkungen der schönen Beobachtung Fremy's nichts von ihrem Werth nehmen, sondern nur zeigen, daß Milchsäure sehr leicht sich bildet durch die Einwirkung des Zuckers auf viele organische Materien.

*Sitzung am 8. Juli.* Savarèse zeigt der Akademie, daß er zur Solidification der Kohlensäure ein einfacheres Mittel entdeckt habe, als das, welches Thilorier anwendet.

*Sitzung am 15. Juli.* Milon theilt eine Arbeit, eine neue Theorie über die Oxyd-Chlorüre oder hypochloritsauren Salze mit. Man nimmt behufs ihrer Bildungen an, daß das Chlor einen Theil des Sauerstoffs der Base aufnimmt und zu Hypochloritsäure wird, und diese dann mit unzersetzt gebliebener Base sich vereinigt. Milon bezieht den Vorgang auf die Substitutionstheorie, und das Verhalten wäre ganz einfach hiernach analog dem bei einer Verbindung eines Oxydes, z. B. des Kaliums mit einer neuen Quantität Sauerstoff, um ein Bioxyd zu bilden. Das Chlor, welches sich mit dem Kalk verbindet, spielt hier die Rolle eines neuen Antheils Sauerstoff, so daß statt ein Bioxyd, zusammengesetzt aus 1 At. Calcium und 2 At. Sauerstoff, man ein Oxyd erhält, in welchem ein At. Chlor das eine Sauerstoff ersetzt.

*Sitzung am 22. Juli.* Selligie zeigt an, daß mehrere Arbeiter in den Brüchen des bituminösen Schiefers im Dep. Saône und Loire, die von der Krätze befallen waren, ohne alle andere Mittel und ohne Ansteckung eines ihrer Mitarbeiter, davon befreit wurden. Diese Leute werden so zu sagen mit dem bituminösen Schieferöl imprägnirt, und ohne Zweifel liegt hierin der Grund ihrer Heilung und des Schutzes der übrigen. — Peligot überreichte eine Arbeit über die braune Materie, welche das Resultat spontaner Zersetzungen von Vegetabilien ist. Die analytischen Resultate, welche er darüber erhalten hat, weichen von den bisher bekannt gewordenen sehr ab; statt 57 hat er darin 73 Proc. C. gefunden. Er fand außerdem, daß man bei Behandlung der Faser mit kaustischem Kali je nach der Temperatur zwei verschiedene Substanzen erhält. Die Bildung der Ulminsäure leitete man von einer Abscheidung von Wasserstoff und Sauerstoff, im Verhältniß der Wasserbildung, aus der Faser an, da Peligot nun in der Ulminsäure einen Ueberschuß von Wasserstoff fand, so ist die gleichzeitige Bildung eines compl



manifiren Körpers, welcher mehr Sauerstoff enthält, wahrscheinlich, dieser ist Ameisensäure, Oxalsäure oder Kohlensäure, je nach den Phasen der Operation. — Payen las eine Abhandlung über die chemische Constitution der Faser, wonach er seine früheren Analysen bestätigt, und die Identität der Zusammensetzung dieses Gewebes in den verschiedensten Pflanzen darthut. Was die Chemiker bisher Faser nannten, enthält nicht weniger als vier verschiedene Substanzen, deren Eigenschaften und Elementar-Zusammensetzung interessante Resultate ergeben. Die eigentliche Substanz des Gewebes ist die einzige, welche direct Zucker und farbloses Dextrin giebt. Die andern nehmen bei ihrer Auflösung in Schwefelsäure sehr ausgezeichnete Farben an. Die eine dieser scheint die Rolle einer Base zu spielen, die andern beiden verbinden sich mit Basen. — In Bezug auf die Heilung der Krätze durch Schieferöl ward ein Brief von Fournel vorgelesen, welcher anzeigt, daß diese Eigenschaft schon den Alten bekannt war. Plinius (*Hist. nat. lib. XXXV. Cap. XV.* sagt vom Petroleum von Sicilien: »*Utuntur eo ad lucernarum lumina, olei vice, item ad scabiem jumentorum.*« Vor ihm bemerkt schon Vitruv, daß die Afrikaner ihre Thiere in einer bituminösen Quelle bei Carthago badeten. Franz Ariost heilte Menschen und Thiere von der Krätze durch das von ihm am Berge Zibio im Herzogthum Modena entdeckte Petrol, Agricola empfiehlt dessen Anwendung zur Heilung der Krätze bei Thieren (*De natura, quae effluviunt ex terra, lib. II. 115. Basil. 1546*); ein gewisser Engrinis endlich verkaufte 1721 ein Oel, welches er aus dem Asphaltstein von *Val de Travers* bei Neuchatel in der Schweiz bereitete, als wirksames Krätzmittel. — Robiquet las über die Wichtigkeit des *Polygonum tinctorium* als Indigopflanze. Der Indig befindet sich gegen andere Ansichten in dieser Pflanze im blauen Zustande, denn 1) löst Aether durch einfache Maceration Indigotin daraus auf, 2) wenn die färbende Materie auch ursprünglich in den Bläschen des Zellgewebes enthalten sein konnte, so ist sie es doch nicht mehr beim Zustande der Reife, denn wenn der Aether in diese eindringen müßte, um das Indigotin aufzulösen, so würde er daselbst auch Chlorophyll antreffen. Es ist folglich wahrscheinlich, daß dann die färbende Materie, wenn nicht gänzlich, doch größtentheils im Außern der Blätter sich befindet, wo sie durch eine rothe harzige Materie, wie durch einen Firniß befestigt ist. — Arago machte Mittheilungen über den artesischen Brunnen von Grenelle. Die darüber angestellten thermometrischen Beobachtungen ergaben, daß die Temp. um einen Grad C. zunimmt ohngefähr für 29 Meter Tiefe; als Ausgangspunct nahm man die Temp. des Kellers des Observatoriums, 11,7° C. Bei der Tiefe von 481 Meter fand man die Temp. des Wassers 27,5° C., diejenige eines Thermalwassers.

## Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin.

Sitzung am 16. Juli 1839. Prof. G. Rose zeigte interessante Mineralien vor, die Hr. Swetsoff, Director der Demidoffschen Werke in Nischnei-Tagilsk im Ural, der zugleich als Gast

zugegen war, mittheilte, namentlich ein großes Stück Chrom-  
eisenstein, mit eingewachsenem gediegenen Platin, ein andere  
mit eingewachsenem gediegenen Gold, und ein kleineres Stück  
mit ansitzender Bergart, die Serpentin ist, sämmtlich aus der  
Platinseifen von Nischnei-Tagilsk. Das Vorkommen des Platins  
mit Chromeisenstein dürfte beweisen, daß die ursprüngliche  
Lagerstätte des Platins wahrscheinlich Serpentin ist, worin  
Chromeisenstein gewöhnlich eingewachsen vorkommt, und der  
auch die umgebenden Höhen der Platinseifen von Nischnei-Ta-  
gilsk bildet. Das Gold hat im Ural gewöhnlich eine ganz an-  
dere ursprüngliche Lagerstätte, und findet sich, wie auch in den  
meisten übrigen Gegenden, auf Quarzgängen; das Vorkommen  
des Chromeisensteins mit dem Golde zeigt indessen, daß es sich  
zuweilen auch auf der Lagerstätte des Platins finden muß.

*Sitzung am 20. Aug. 1839.* Professor Link: Mikroskopische  
Zeichnungen über das Keimen der *Orchideen*, woraus hervorgeht,  
daß ihre Samen mehr den Namen einer Knolle verdienen. Sie  
enthalten keinen Embryo, sondern bestehen aus Parenchym, mit  
einem Bündel von Spiralgefäßen in der Mitte, und entwickeln  
sich sogleich in Blätter, wie Knospen und Knollen; schon in den  
Testen sind solche Knollen. — Prof. G. Rose: Ueber den *Chrysoberyll*  
in den Smaragdbrüchen des Urals, wovon der Collegienassessor  
Kämmerer aus Petersburg der Königl. Mineraliensammlung  
Exemplare übergeben. Der Chrysoberyll vom Ural unterschei-  
det sich von den übrigen bekannten Abänderungen, z. B. dem  
brasil., durch seine grüne Farbe, die Abends gegen Licht ganz  
roth erscheint, durch die GröÙe seiner Krystalle, die oft mehr  
als 2 Zoll beträgt, und durch seine Form, die das Ansehen sechs-  
seitiger Pyramiden mit abgestumpften Endspitzen hat, da er  
stets in Gruppierungen von drei regelmäÙig\* durcheinander ge-  
wachsenen Individuen vorkommt. Er kommt im Glimmerschie-  
fer mit Smaragd und Phenakit vor. — Prof. Magnus: Ueber  
die Wirkung, welche Bündel von Eisendraht beim Oeffnen der  
galvanischen Kette ausüben, und über die Zuckungen, welche  
sie hervorbringen. — Es wurde ein Brief vom Prof. Wieg-  
mann in Braunschweig an Prof. Lichtenstein vorgelesen,  
worin derselbe über die Unfruchtbarkeit bei Bastardpflanzen  
dahin sich ausspricht, daß Bastardpflanzen, in welchen die Form  
der Natur der Stempelpflanze (Mutterpflanze) oder der Pollen-  
pflanze (Vaterpflanze) vorherrscht, Pollenschläuche zu entwickeln  
und demnach durchgängig fruchtbar zu sein scheinen. Un-  
fruchtbarkeit scheint nur denjenigen Bastarden eigen, welche  
zwischen beiden Elternpflanzen vollständig die Mitte halten.  
Die Ursache der Unfruchtbarkeit bei Bastardpflanzen ist allein  
im Pollen zu suchen. Die Pollenkörner zeigen nämlich 1) we-  
der in Form noch in GröÙe dieselbe Beständigkeit, welche bei  
dem reifen Pollen der elterlichen Pflanze angetroffen wird;  
2) sie sind haufenweise mit einer anscheinend gummiartigen  
Feuchtigkeit, die als Tropfen oder Streifen auf dem Objectträger  
des Mikroskops wahrgenommen wird, zusammengeklebt; 3) ent-  
wickeln sich aus ihnen, nachdem sie vorher mit Pflanzennectar  
befeuchtet worden, nie Schläuche.

## Zweite Abtheilung.

---

### Chemie.

---

#### Einige Worte über die Theorie der Aetherbildung;

vom

Professor Dr. *Dulk* in Königsberg.

---

**D**abit hatte zwar angegeben, daß nach der Aetherdestillation aus dem Gemische von Schwefelsäure und Alkohol die in der Retorte zurückbleibende Masse eine Säure enthalte, die keine Schwefelsäure sei, die jedoch Schwefel zu enthalten, und vielleicht eine niedrigere Oxydationsstufe als die Schwefelsäure zu sein scheine, indessen zeigte erst später Sertürner aufs Entschiedenste, daß schon bei dem Aufeinanderwirken der Schwefelsäure und des Alkohols eine eigenthümliche Säure gebildet werde, durch welche die Aetherbildung bedingt sei. Diese Säure nannte er bekanntlich Schwefelweinsäure. Sertürner erklärte, auf zahlreiche Versuche gestützt, die bisherige Annahme, daß bei der Aetherbereitung die Schwefelsäure durch den Weingeist gar nicht verändert werde, für irrig, und daher entstanden, daß man sich begnügt hatte, die Sättigungsfähigkeit der Schwefelsäure gegen Basen vor der Vermischung mit Alkohol und nach der Aetherdestillation auszumitteln; man erhalte ein ganz anderes Resultat, wenn man die Sättigungsfähigkeit der Schwefelsäure ausmittele, während sie sich noch mit dem Weingeist vermischt befinde; sie erfordere dann eine bedeutend geringere Menge Base zur Neutralisation, eben weil eine neue



Säure gebildet worden. Diese Untersuchungen haben den bedeutendsten wissenschaftlichen Einfluß auf Theorie der Aetherbildung; sie sind die Basis der weiteren Untersuchungen, die mit dem größten Eifer den ausgezeichnetsten Chemikern über den Aetherbildungsproceß angestellt worden sind und so viel Licht über denselben verbreitet haben.

Als Resultat aus diesen zahlreichen Untersuchungen ist die Gewißheit gewonnen worden, daß durch die Wirkung der Schwefelsäure auf Alkohol aus demselben eine Kohlenwasserstoffverbindung gebildet wird, welche gegen Säuren sich wie eine Base verhält, und auf die Erzeugung des Aethers beruht, wenn das Gemisch aus Schwefelsäure und Alkohol der Destillation unterworfen wird, und daß man statt der Schwefelsäure auch sehr concentrirte Phosphorsäure und Arsensäure, Zinnchlorür, Zinnchlorid, Fluorbor- und Fluorsiliciumgas anwenden könne. Alle geben einen von der angewandten Säure freien Aether, doch kann mit Vortheil nur die Schwefelsäure angewandt werden. Aus den von Mitscherlich über den Hergang bei der Aetherdestillation angestellten Untersuchungen ergibt sich, daß das aus Aether und Wasser, mit beigemischtem unzersetzten Weingeist, überdestillirende Gemisch genau ein dem angewandten Weingeist gleiches specif. Gewicht hat, daß also die Bestandtheile des Alkohols wieder erhalten sind, und nichts davon zurückgehalten worden ist.

Das bei der Bildung des Aethers aus dem Alkohol entstandene Wasser destillirt zugleich mit dem Aether über; es kann also eine Verwandtschaft der Schwefelsäure zum Wasser nicht als die Ursache der Aetherbildung angenommen werden. Auch geht, wenn eine sehr ve



dicke Säure angewandt worden, zuerst ein verdünnter Weingeist über; es destillirt in einem weit größeren Verhältniß Wasser als Weingeist über; dieser also und nicht das Wasser wird von der Schwefelsäure zurückgehalten, und in dem Verhältniß, in welchem nach und nach das spec. Gew. des übergehenden Alkohols geringer, in welchem er also weniger wasserhaltig wird, vermehrt sich auch die Menge des erzeugten Aethers. Aber auch die Menge des selbst wasserfreien Weingeists muß nicht zu groß sein, weil dann die Schwefelsäure, in einer großen Masse Weingeist vertheilt, und hiedurch in ihrer Wirksamkeit geschwächt, nicht umbildend auf die Elemente des Alkohols einwirken kann, dieser also aus dem bei niedrigeren Temperaturgraden, als bei denen die Aetherdestillation vor sich geht, kochenden Gemisch unzersetzt überdestillirt. Die Umbildung des Alkohols in Aether und Wasser wird von Mitscherlich und Berzelius einer unbekannten Kraft, der katalytischen Kraft, zugeschrieben. Mit dem Namen *katalytische Kraft*, *Katalyse*, wird von Berzelius bekanntlich diejenige unbekannte Kraft bezeichnet, vermöge welcher ein Körper einen anderen umzugestalten vermag bloß dadurch, daß er da ist, sich gleichsam neben ihm befindet, ohne eine chemische Verwandtschaft auf ihn auszuüben, wobei er selbst unverändert bleibt. Auf dieser Kraft beruht z. B. die Verwandlung der Stärke in Zucker durch die Schwefelsäure, weil hier eine chemische Einwirkung der Schwefelsäure auf die Stärke, oder vielmehr eine hervorgebrachte chemische Verbindung gar nicht nachweisbar ist. Es ist indessen ersichtlich, daß der Name Katalyse nur eine Bezeichnung für eine gewisse Klasse von Erscheinungen, nicht aber eine Erklärung über

den Hergang der Sache ist, und dafs wir zu derselben eben nur dann unsere Zuflucht nehmen dürfen, wenn eine Sacherklärung für jetzt unmöglich ist. Dies möchte aber in Hinsicht des Aetherbildungsprocesses nicht so entschieden der Fall sein, dieser vielmehr sich an die allgemeinen Grundsätze der elektrochemischen Theorie zurückführen lassen.

Nach den Grundsätzen der elektrochemischen Theorie strebt ein negativ elektrischer Körper dahin, sich mit einem positiv elektrischen zu verbinden, und je mächtiger, je vorwaltender das negativ elektrische Verhalten des ersteren Körpers hervortritt, um so mehr wird der mit ihm in chemische Berührung kommende Körper genöthigt, das positiv elektrische Glied der neuen chemischen Verbindung zu werden, selbst wenn er im Allgemeinen mehr zu einem negativ elektrischen Verhalten geneigt sein sollte. So wird z. B. der beim Reiben mit Wolle negativ elektrische Schwefel, wenn er dem stärkeren negativ elektrischen Sauerstoff entgegentritt, genöthigt, positiv elektrisch zu werden, so dafs er in den verschiedenen chemischen Verbindungen des Schwefels mit dem Sauerstoff den positiv elektrischen Bestandtheil ausmacht, wogegen derselbe Schwefel, wenn er sich mit dem Wasserstoff oder den Metallen verbindet, Schwefelwasserstoff oder Schwefelmetalle bildet, der negative Bestandtheil der Verbindung ist. Dasselbe Verhalten zeigen die zusammengesetzten Substanzen, und dieselben Metalloxyde, wie Bleioxyd, Antimonoxyd, Silberoxyd, Kupferoxyd u. s. w., welche gegen Säuren entschiedene Basen sind, werden mit stärkeren Basen, wie den Alkalien und alkalischen Erden, in Verbindung gebracht zu Säuren. Das elektrische und chemische Verhalten eines Körpers wird also schon oft

durch die Beschaffenheit des ihm entgegentretenden Körpers bestimmt; ob ein zusammengesetzter Körper sich wie eine Base oder wie eine Säure verhalten soll, hängt davon ab, ob derjenige zusammengesetzte Körper, mit dem er eine chemische Verbindung eingeht, eine stärkere Säure oder eine stärkere Base als er selbst ist. Bei den organischen Substanzen, die meistens sehr leicht Umbildungen und Zersetzungen unterworfen sind, werden diese durch starke chemische Agentien sehr häufig hervorgebracht, und auf die chemische Beschaffenheit der neuen Gebilde muß die chemische Beschaffenheit der einwirkenden Substanz wesentlichen Einfluß haben. So wird der Weingeist durch die Alkalien in Essigsäure, Ameisensäure und eine harzartige den Säuren nahe stehende Materie umgebildet, mit welcher sich die Alkalien zu verbinden streben. Sind es dagegen mächtige Säuren, welche auf den Alkohol einwirken, so muß das Bestreben dieser Agentien dahin gerichtet sein, den Alkohol in eine basische Substanz umzubilden, um mit dieser sich chemisch vereinigen zu können, und daß dieses wirklich geschieht, haben die vielfachen Untersuchungen bis zur völligen Evidenz dargethan, wie denn auch alle Chemiker jetzt darin übereinstimmen. Ueber die chemische Beschaffenheit dieser basischen Substanz sind aber die Meinungen lange getheilt gewesen, und sind es zum Theil jetzt noch.

Dumas und Boullay d. J. betrachteten bekanntlich den Aether als das erste, und den Alkohol als das zweite Hydrat einer dem ölbildenden Gase entsprechenden Kohlenwasserstoffverbindung. Dieser Kohlenwasserstoff,  $C_2H_6$ , wurde von ihnen als das allgemeine Radical mit basischen Eigenschaften bezeichnet, welches eben so eine Salzbasis sei, wie das Ammoniak, und in allen Verbin-

dungen eine ganz gleiche Sättigungscapacität zeigt dieses, auch alkalisch reagiren würde, wenn es, wie Ammoniak, in Wasser auflöslich wäre. Der Unterschied bestehe darin, daß das Ammoniak aus Stickstoff und Wasserstoff,  $N_2 H_6$ , dieser aber aus Kohlenstoff und Wasserstoff,  $C_4 H_8$ , bestehe. Die säurehaltigen Aetherarten, wie Essigäther, Salpeteräther u. s. w., sind demnach Salze von basischen mit den darin enthaltenen Säuren, und sowohl diese Salze, welche das Ammoniak mit den Sauerstoffverbindungen bildet, Krystallwasser enthalten, von dem sie nur schwerlich (oder vielmehr gar nicht) befreit werden können, so haben die Verbindungen des ölbildenden Gases mit den Sauerstoffsäuren dieselbe Eigenschaft, die säurehaltigen Aetherarten sind Verbindungen des ölbildenden Gases mit Säure und Wasser. Sowie, das Ammoniak sich mit den sogenannten Wasserstoffsäuren verbindet, wasserleere Salze entstehen, ebenso das ölbildende Gas mit den Wasserstoffsäuren wie freie Aetherarten, wie Chlorwasserstoffäther, Jodwasserstoffäther.

Hennel bezeichnete die in dem Gemisch aus Schwefelsäure und Alkohol enthaltene Säure mit dem Namen Weinschwefelsäure, und betrachtete sie als eine Verbindung der Schwefelsäure mit dem Kohlenwasserstoff,  $C_4 H_8$ , von gleicher procentischer Zusammensetzung wie das ölbildende Gas. Das bei fortschreitender Destillation des Gemisches neben schwefeliger Säure übergehende ölige Liquidum betrachtete er als die centrale Verbindung des basischen Kohlenwasserstoffs mit der Schwefelsäure, was durch die späteren Untersuchungen von Serullas und von Liebig dahin berichtet worden ist, daß diese Verbindung noch Wasser



hält. Das in derselben gefundene Verhältniß der Bestandtheile entspricht nämlich der Formel  $2\text{C}_4\text{H}_8\ddot{\text{S}} + \text{H}_2\text{O}$ , die sich auch bezeichnen läßt als  $\text{C}_4\text{H}_8\ddot{\text{S}} + (\text{C}_4\text{H}_8\ddot{\text{S}} + \text{H}_2\text{O})$ , d. h. als eine Verbindung des von H ennel angenommenen Kohlenwasserstoffs mit Schwefelsäure ohne Wasser, vereinigt mit der Verbindung des ersten Hydrats von dem Kohlenwasserstoff, dem Aether, mit Schwefelsäure. Das eine Atom der Schwefelsäure ist hiernach mit einem Körper verbunden, der keinen Sauerstoff enthält,  $\text{C}_4\text{H}_8$ , offenbar aber gegen die Säure sich wie eine Base verhält, da er von anderen stärkeren Basen angetrieben und als eine ölige Flüssigkeit abgeschieden wird. Wenn man nämlich das neutrale schwefelsäurehaltige, ölige Liquidum in einer Schale mit Wasser gelinde erwärmt, so zerlegt es sich in eine oben aufschwimmende ölige Flüssigkeit, den flüssigen Kohlenwasserstoff  $\text{C}_4\text{H}_8$ , und in die sogenannte Wein- oder Aetherschwefelsäure,  $\text{C}_4\text{H}_8\ddot{\text{S}}_2 + \text{H}_2\text{O}$ . Nimmt man die ölige Flüssigkeit mittelst einer Saugröhre, Pipette, ab, und bringt sie in eine Schale, so scheidet ein krySTALLISIRBARER Theil, von Liebig *Aetherin* genannt, sich aus, und kann durch ein angefeuchtetes kalt gehaltenes Filtrum von dem flüssigen Theil, dem *Aetherol*, geschieden werden. Beide sind jedoch gleich zusammengesetzt.

Nach einer anderen Ansicht, die von Berzelius aufgestellt worden, ist der Aether das Oxyd einer noch nicht für sich dargestellten Chlorwasserstoffverbindung  $\text{C}_4\text{H}_{10}$ , welche von Liebig *Aethyl* genannt worden ist, so daß der Aether als Aethyloxyd durch die Formel  $\text{C}_4\text{H}_{10} + \text{O}$  bezeichnet werden müsse. Dieses Aethyloxyd äußert freilich eben so wenig, wie der Kohlenwasserstoff  $\text{C}_4\text{H}_8$  basische Reactionen, indessen besitzt es das Vermögen, mit Sauerstoffsäuren sowohl

neutrale als saure Verbindungen zu bilden, und den Wasserstoffsäuren der Salzbilder seinen Sauerstoff gegen den Salzbilder auszutauschen, ganz so wie das unorganisches Oxyd, wiewohl das Spiel der Verwandtschaften hier nicht so rasch und unmittelbar vor sich geht, wie bei den mit stärkeren Verwandtschaften begabten unorganischen Körpern. Diese letztere Ansicht ist ziemlich allgemein angenommen, jedoch auch die erstere noch nicht völlig aufgegeben worden.

Bei der ersteren Ansicht ist die große Analogie zwischen den Verbindungen des Ammoniaks, die schon Dumas und Boullay hervorgehoben haben, nicht zu verkennen. Sowie Ammoniak,  $N_2 H_6$ , wenn es sich mit Wasserstoffsäuren zu Salzen verbinden soll, durch Aufnahme der Bestandtheile von 1 At. Wasser,  $H_2 O$ , zu Ammoniumoxyd  $N_2 H_8 O$ , werden muß, so muß das Aetherol oder Aetherol,  $C_4 H_8$ , zu  $C_4 H_{10} O$  werden. Wie H. Rose gezeigt hat, daß trocknes Ammoniakgas,  $N_2 H_6$ , sich mit wasserfreier Schwefelsäure,  $\ddot{S}$ , unter starker Erhitzung zu einem weißen pulverigen Körper vereinigt, der in Wasser aufgelöst und aus der Auflösung wieder in kleinen Nadeln krystallisirt, ohne Wasser aufgenommen zu haben, erhalten werden kann, und nach einiger Zeit aber in das gewöhnliche schwefelsaure Ammoniumoxyd,  $N_2 H_8 O + \ddot{S}$ , übergeht, und daß eine entsprechende wasserleere Verbindung mit der Kohlensäure  $N_2 H_6 \ddot{C}$ , dargestellt werden kann, so hat Regnard ein ganz ähnliches Verhalten für die Kohlenwasserstoffbindung  $C_4 H_8$  nachgewiesen. Schwefelsäure und Aetherin, beide als wasserleere Gase in Berührung gebracht, treten unter starker Temperaturerhöhung zu einer weißen krystallinischen Substanz zusammen, welche bei  $+64^\circ R.$  schmilzt, und beim Erkalten aufs Neue

zu einer krystallinischen Masse erstarrt. Sie ist  $C_4 H_8 + \ddot{S}$ . In Wasser ist sie leicht auflöslich, nimmt dabei, wie das schwefelsaure Ammoniak, jedoch hier sogleich, 1 At. Wasser in die Constitution auf, und wird zu Isaethionsäure. Schwefelsaures Ammoniumoxyd und die isaethionsauren Salze geben nun das in ihre Constitution aufgenommene 1 At. Wasser bei keiner Temperatur mehr ab. Wollen wir aber auch der Analogie, welche das Aetherin mit dem Ammoniak hat, den Vorzug geben, so können wir doch den Aether nicht als das Hydrat des Aetherins, als  $C_4 H_8 + H_2 O$ , bezeichnen, so wenig wie wir für das Ammoniumoxyd die Formel  $N_2 H_6 + H_2 O$  wählen können, und es fällt dann die Ansicht im Wesentlichen mit derjenigen zusammen, welche Berzelius und Liebig den Vorzug geben, denn die Formel des Aethyloxydes  $C_4 H_{10} O$  wird auch nach der zweiten Ansicht für den Aether nothwendig.

Es steht hiernach erfahrungsgemäß fest, daß durch die Einwirkung der Schwefelsäure auf den Alkohol ein mit basischen Eigenschaften begabter Körper gebildet wird, welcher, obgleich an und für sich flüchtig, durch die chemische Verwandtschaft der bei weitem minder flüchtigen Schwefelsäure zurückgehalten wird. Sowie die Ammoniaksalze, welche eine nicht flüchtige Säure enthalten, durch Hitze zersetzt werden, indem die flüchtige Base davongeht, ebenso beruht das Ueberdestilliren des Aethers aus einem Gemisch von Schwefelsäure und Alkohol auf einer durch die Hitze bewirkten Zersetzung des schwefelsauren Aethyloxydes, welches letztere, der Aether nämlich, im ungebundenen Zustande zwar schon bei  $+ 28^\circ R.$  ins Kochen kommt und überdestillirt, mit der Schwefelsäure verbunden aber eine Temperatur

von fast  $120^{\circ}$  R. erfordert, um durch diese hohe Temperatur der Säure entrissen und verflüchtigt zu werden. Befindet sich die Säure nicht in dem erforderlichlich überwiegenden Verhältniß gegen den Alkohol, so vermag sie nicht auf diesen zersetzend einzuwirken, und ihn in eine Substanz mit basischen Eigenschaften umzubilden; wird aber durch Abdestilliren die Menge des Weingeistes vermindert, wobei zugleich der Siedepunct des Gemischs steigt, so tritt nun, sobald das gehörige Verhältniß erreicht ist, mit diesem der erforderliche Siedepunct erreicht ist, die Aetherdestillation ein, und dauert unverändert fort, so lange die Bedingungen nicht geändert werden. Wird die Destillation plötzlich in einer Zeit unterbrochen, wo die Mischung bei dem erforderlichen Temperaturgrade noch mehr Aether ausgegeben haben würde, als jene schwefelsaure Verbindung fertig gebildet enthalten mußte, so wird doch, wenn nach dem Erkalten die Mischung durch Wasser verdünnt worden, bei einer erneuten Destillation jetzt nicht Aether, sondern Weingeist überdestilliren, weil die mit Wasser verdünnte Säure den basischen Körper nur mit geschwächten Verwandtschaftskräften bindet, so daß dieser, durch die einwirkende Wärme getrieben, durch Aufnahme von Wasser zu Aetherhydrat, d. h. zu Weingeist, wird, und als solcher bei einer Temperatur überdestillirt, welche niedriger ist, als diejenige, die der um vieles flüchtigere Aether erforderte. Je mehr aber die Säure in Folge der Destillation wieder an Concentration gewinnt, desto mehr nimmt ihre Verwandtschaft zu dem basischen Körper zu, so daß ihr dieser nur durch eine bis zu einem gewissen Grade gesteigerte Hitze entzogen werden kann, was jedoch niemals vollständig gelingt; je concentrirter die Säure wird, desto fester hält sie die Base



chemisch gebunden, bis endlich die Temperatur so hoch steigt, daß die Säure mit der Base zusammen als neutrale Verbindung überdestillirt, wobei die Base aber zum Theil schon eine Zersetzung erlitten, nämlich Wasserstoff und Sauerstoff in dem Verhältniß, wie sie Wasser constituiren, verloren hat, so daß das neutrale Destillat  $C_4 H_8 \ddot{S} + C_4 H_{10} O \ddot{S}$  ist. Die Schwefelsäure ist hier also zum Theil durch die Kohlenwasserstoffverbindung neutralisirt, welche, wie Regnault's Versuche gelehrt haben, auch sich unmittelbar mit wasserleerer Schwefelsäure vereinigen, aber nicht durch Aufnahme von Wasser in Aether übergehen kann, wogegen der andere Theil der Schwefelsäure mit dem Aethyloxyd zu einer gleichfalls neutralen Substanz vereinigt ist. Da nun das Aethyloxyd, der Aether, durch Aufnahme von Wasser zu Weingeist, jene Kohlenwasserstoffverbindung aber nicht unter gleichen Bedingungen zu Aether wird, so ist zwar der Weingeist das Hydrat des Aethers, nicht aber der Aether das Hydrat der Kohlenwasserstoffverbindung, des ölbildenden Gases; der Aether ist nicht  $C_4 H_8 + H_2 O$ , sondern  $C_4 H_{10} O$ . Wird die Destillation des Gemisches zur Aetherbereitung noch weiter fortgesetzt, und leitet man die übergehenden Dämpfe in ein stark abgekühltes Gefäß, so verdichten sich dieselben neben Aether und Wasser zu einer öligen Flüssigkeit, welche neben dem bereits erörterten schwefelsauren Aetherin einen an Wasserstoff ärmeren Körper zu enthalten scheint, denn mit Kalkmilch umdestillirt giebt sie das eigentlich sogenannte Weinöl, *Oleum vini*, welches nach Liebig's Versuchen der Formel  $C_4 H_8$  zu entsprechen scheint. Gleichzeitig aber mit den sich verdichtenden Dämpfen geht ölbildendes Gas in großer Menge über, und wenn die Temperatur

bis auf  $160^{\circ}$  R. gestiegen ist, so wird der Alkohol hauptsächlich in ölbildendes Gas und Wasser zersetzt, und die Schwefelsäure, welche bei niedrigeren Temperaturen durch die flüchtige Base, mit der sie sich in chemischer Verbindung befand, mit hinübergeführt wurde, jetzt, dieser Base beraubt, zurückbleibt. Mehrt man gleich anfangs die Menge der Schwefelsäure, so daß man zu 4 Th. derselben 1 Th. Alkohol zusetzt, so bekommt man zwar beim Beginnen der Destillation auch etwas Aether und Weinöl, bald aber steigt der Siedpunkt des Gemisches auf  $160^{\circ}$  R., und hiermit beginnt eine lebhafte Entwicklung des ölbildenden Gases. Mit geringen Mengen von Aether und Weinöl gemischt. Im Anfange der Destillation wird also das durch die Wirkung der Schwefelsäure aus dem Alkohol gebildete basische Aethyloxyd durch die Wärme von der Säure getrennt, und destillirt unzersetzt als Aether über, ähnlich, wie z. B. beim Erhitzen des phosphorsauren Ammoniumoxydes, das Ammoniumoxyd sich verflüchtigt und die nicht flüchtige Säure zurückbleibt. Wird aber das Verhältniß der Säure noch mehr überwiegend, so ist ihr Bestreben, die Base zurückzuhalten, eben dadurch stärker, so nimmt die Base bei dem jetzt höheren Siedpunkte des Gemisches die Säure mit hinüber, und das Destillat besteht aus der oben erwähnten neutralen Verbindung; steigt endlich das Verhältniß der Säure zur Base noch mehr, wird die letztere von der Säure durch die noch stärkeren Verwandtschaftskräfte zurückgehalten, so wird durch den hohen Temperaturgrad bei dem jetzt die Mischung siedet, die salzartige Verbindung wieder aufgehoben, und die Base in Gas verflüchtigt, so daß dieselbe als Kohlenwasserstoff entweicht. Diese Erfolge sind hiernach denen g

gleich, welche die Wärme auch bei anderen chemischen Verbindungen hervorbringt, so daß sich die Theorie der Aetherbildung auf die überhaupt für chemische Prozesse gültigen Gesetze zurückführen läßt. Zwar kann sich das von der Säure abgeschiedene Aethyloxyd nicht mehr mit der Säure, wenigstens nicht ohne theilweise Zersetzung vereinigen; indessen ist es ja auch von vielen andern Körpern bekannt, daß sie nur in *statu nascenti* sich mit einander verbinden können, und aus dieser Verbindung ausgeschieden, sich direct nicht mehr vereinigen lassen.

Die sogenannte Schwefelweinsäure, Weinschwefelsäure oder Aetherschwefelsäure, ist also nicht eine eigenthümliche Säure, sondern die acide Verbindung des mit basischen Eigenschaften begabten Körpers, des Aethyloxydes nach Berzelius und Liebig mit Schwefelsäure,  $C_4 H_{10} \ddot{S} + H_2 O \ddot{S}$ , aus welcher das basische Wasser aus dem zweiten Atom Schwefelsäure durch eine stärkere Base ausgetrieben werden kann, wodurch wirklich Doppelsalze entstehen. Die Base bildet aber auch, wenngleich nicht mit allen, mit Sauerstoffsäuren neutrale Salze von ätherartigem Geruche, von denen mehrere flüssig und flüchtig, wie Essigäther, Ameisenäther, Salpeteräther u. s. w., andere krystallisirbar sind, wie die Verbindungen des Aethyloxydes mit Schleimsäure, Talgsäure und Margarinsäure.



# Ueber die Milch des Frauengeschlechts und der Thiere;

von

*J. E. Herberger.*

(Nach einem in der Brandes'schen Centralversammlung d. pharmac. Gesellschaft Rheinbaiern's gehaltenen Vortrage.)

**D**as Thatsächliche eines Theiles der nachstehenden Untersuchungen fällt in frühere Jahre zurück. Es gewährt mir Freude, den Manen meines zu frühe verbliebenen Freundes, Dr. Müller, hier ein Wort des Dankes darbringen zu können für die Bereitwilligkeit durch welche allein ich in den Stand gesetzt worden bin, eine Reihe von Versuchen zu unternehmen, deren *Object* mindestens die Aufmerksamkeit des gebildeten Publicums verdient, was auch die *subjective* Behandlung dieses hochwichtigen Gegenstandes zu wünschen übrig lassen möge.

Ich habe vor mehreren Jahren im *Journ. f. pract. Chemie*, VI. 270. ff., Untersuchungen über eine krankhafte *Frauenmilch* niedergelegt. Man wird die besonderen Schwierigkeiten derartiger Versuche ermessen können, wenn man bedenkt, daß zur Erreichung von der Wahrheit am nächsten stehenden Ausdrücken die Beobachtung folgender, auf gesunde, wie auf krankhafte, Frauenmilch bezüglicher Momente unabweisbar gehört:

- a) Ohngefähre Kenntniß der Lebensjahre;
- b)       »               »               »       Zahl aller vorhergegangenen Geburten;
- c)       »               »               »       Zeit nach der jeweiligen Entbindungsperiode;



- |    |                                   |                                               |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| d) | Ohngefähre Kenntniß des Nahrungs- | } Zustan-<br>des der<br>Frauens-<br>personen. |
| e) | » » » Gesundheits-                |                                               |
| f) | » » » Gemüths-                    |                                               |

In jüngerer Zeit sind von Schwarz, F. Simon, Henry und Chevallier, Donné, Henle u. A. sehr gründliche, und zum Theil sehr stoffreiche Untersuchungen über menschliche und thierische Milch bekannt gemacht worden. Auch diese neuen Untersuchungen haben indessen erwiesen, daß die Bestandtheile aller Milcharten nicht sowohl generisch oder specifisch, als vielmehr hauptsächlich den *Quantitätsverhältnissen* nach, verschieden sind. Die Bestandtheile einer *jeden* gesunden Milch sind: Wasser, flüchtiges Princip, Butter, Käsestoff, Zucker, Osmazom, speichelstoffartige Materie, dann schwefelsaure \*), milchsaure, kohlensaure, salzsaure, phosphorsaure etc. Salze u. s. w. Die *allgemeinen* physischen und chemischen Unterschiede der verschiedenen, bisher genauer geprüften, Milcharten sind folgende:

Jegliche gesunde, somit normale, Milch stellt, mikroskopisch untersucht, eine trübliche Flüssigkeit dar, erfüllt von rundlichen, losen Fett- (Butter-) Kügelchen. Der Durchmesser dieser Kügelchen ist verschieden; im Allgemeinen ist er bei den Kügelchen der Frauenmilch größer, als bei jenen der Ziegenmilch, kleiner noch sind die Kügelchen der Kuhmilch, und in ganz normaler Hunde- und Stutenmilch fand ich die Fettkügelchen nicht nur kleiner und minder zahlreich, sondern auch weniger lose, weniger ihren eigenen Umfang

---

\*) Es ist jedoch wahrscheinlich, daß, den Erfahrungen von Berzelius und F. Simon entsprechend, die oben ange deuteten *Sulphate Producte* der Einäscherung sind, und daß sich der Schwefel in der Milch im Zustande einer organischen Verbindung befindet.

selbstständig beschreibend. Ein geübtes Auge gewal unter einer sehr starken Augenwaffe, daß diese Fe kügelchen analog den Stärkekügelchen construiert sind, daß sie somit aus einer Hülle bestehen, die wahrscheinlich Käsestoff ist, und aus eigentlichem, von dieser Hülle umschlossenem, Fette \*).

Die normale Milch des Menschen reagirt alkalisch. Wenn d'Arcet und Petit, mit mir, nicht selten d Gegenheil an Frauenmilch beobachtet haben, so geschah dieses gewiß nur in Folge irgend eines störenden Umstandes. (Man begreift leicht, daß eine sauer reagirende Milch, wenn auch der Consistenz nach scheinbar regelmäßig beschaffen, von den Kindern dennoch nicht leicht vertragen werden kann, weshalb sie fast immer wieder ausgebrochen wird. Die Therapie wird aus dieser — von Henry und Chevallier besonders unterstützten — Beobachtung Nutzen ziehen können. Da nämlich doppeltkohlensaure Alkalien bei Säugenden in die Milch übergehen: so wird eine jeweilig Gabe von Natronbicarbonat, den Müttern gereicht, in der Mehrzahl der Fälle zweckdienlicher sein, als ein gleiches, auf die Säuglinge angewandtes Verfahren).

Die Milch der Ziegen und Kühe reagirt in der Regel schwächer alkalisch; bei Hunde- und Stutenmilch

---

\*) Diese Thatsache erklärt z. B. die Erscheinung des Gerinnens der Milch durch Säuren, welche auf die Käsestoffhüllen lösend einwirken; ein Proceß, der in ähnlicher Weise auch beim sogenannten Sauerwerden der Milch eintritt. Koch man Alkohol (oder Aether) mit Milch, so wird nach und nach ein Sprengen der Hüllen, und somit ebenfalls flockige Ausscheidung erfolgen. Henle, der diese Thatsachen berichtet, sagt, daß Alaunlösung die Fettkügelchen nicht verändere; es ist aber nur etwas anhaltende Digestion von Nothen, um auch hier die erwartete Wirkung eintreten zu sehen.

scheint die alkalische Reaction fast ganz zu verschwinden; an *Eselsmilch* ist sie jedoch wahrnehmbar \*).

Von der eigentlichen *Milch* ist aber chemisch das *Colostrum* zu unterscheiden. Diese Flüssigkeit könnte, so wie sie in den allerersten Tagen nach der Niederkunft sich entleert, als eine Art von noch im Entwicklungsprocesse begriffener Milch betrachtet werden. Sie ist meistens schmutzig-gelblich, manchmal von bitterlichem Geschmacke, und enthält *vorwaltenden* Käsestoff und Zucker nebst einem stickstoffhaltigen Principe, das Einige für Eiweißstoff erklären, das aber nach meinen Versuchen alle Eigenschaften des *Speichelstoffes* darbietet. Ich fand sie meistens sauer, — nur ausnahmsweise, und wenn die Wöchnerin krankhaft afficirt war, alkalisch reagirend, mehr oder weniger zähe, manchmal fadenziehend, dichter und schwerer, als eigentliche Milch, und äußerst leicht gerinnbar. Ein paar Tage nach dem Wochenbette pflegt sich, — in Uebereinstimmung mit Simon's Angabe, — der Zuckergehalt des Colostrums sehr zu vermindern, während

---

\*) D'Arcet und Petit behaupten, die Milch aller Kühe, welche im *Stalle* gefüttert werden, reagire sauer, während die Milch der im Freien weidenden Kühe alkalisch reagire. Diese Beobachtung ist jedenfalls zu *exclusiv* festgestellt. Ich glaube es für entschieden halten zu dürfen, daß weniger die Gestattung freier, willkürlicher Bewegung, als vielmehr die Darreichung guten, nahrhaften, zur Säurebildung nicht allzu sehr geneigten Futters die normale Beschaffenheit der thierischen Milch bedinge. Ich habe in dieser Hinsicht aus einer hier befindlichen Schweizerei, in welcher die Stallfütterung ausschließend beibehalten ist, zu wiederholten Malen Milch geprüft, und fast immer alkalische Reaction daran wahrnehmen können; gegen Ende des Winters jedoch reagirten mehre Proben schwach sauer, was durch etwa gefütterten Branntweinspülicht etc. herbeigeführt worden sein dürfte.

der Fettgehalt wächst; später jedoch, nachdem das Colostrum zur eigentlichen Milch potenziert geworden tritt auch der Zuckergehalt wieder in gehöriger Masse auf \*).

Kehren wir nun zur Betrachtung der Milch zurück. Sie gehört zu denjenigen Säften des menschlichen und thierischen Körpers, welche nicht selten die Störungen der organischen Verrichtungen mit empfinden. Die Verschiedenheit der Nahrung, des Gesundheitszustandes, der körperlichen Erschöpfung u. s. w., bewirken an ihr mannigfache Modificationen \*\*).

---

\*) Ein ziemlich stark bewaffnetes Auge erblickt im Colostrum sparsamere, mehr oder weniger conglutinirende Fettkügelchen, an denen jedoch die ihnen eigenthümliche Construction ziemlich wahrnehmbar ist. Donné spricht von eigentlichen Schleim- und Colostrumkügelchen, von denen Henle nur die letzteren bezüglich normaler Milch bestätigend anerkennt. Nach ihm haben sie keine Hülle, sind durch ein Bindemittel verbunden, das von Essigsäure aufgelöst werden kann, wodurch die kleinen Kügelchen frei werden, lösen sich in Aether ganz auf, und werden durch sehr verdünnte Salzsäure, Essigsäure und Ammoniak, Donné's Angabe entgegen, nicht verändert. Diese Beobachtung ist nach meinen Erfahrungen vollkommen begründet; ob es aber gestattet sein kann, die sogenannten Colostrumkügelchen als *eigenthümlich* — wenn ich so sagen darf — *organisiert* zu betrachten, ist eine andere Frage. Die meist säuerliche Reaction des Colostrums bringt es schon mit sich, daß die Hüllen der Fettkügelchen sich entweder nicht auszubilden, oder, zum Theil wenigstens, nicht zu bestehen vermögen; dieser Meinung zufolge wären die sogenannten Colostrumkügelchen somit entweder als Uebergangsbildungen, oder als in Folge eines in stetem Wechsel begriffenen Bildungs- und Auflösungsprocesses entstandene Zersetzungsgebilde zu betrachten. H.

\*\*) Dieser Behauptung wird durch F. Simon's werthvolle Untersuchungen anscheinend vielleicht, jedoch nicht in Wirklichkeit widersprochen. Simon konnte zwar an der Milch einer früher syphylitisch gewesenen Frau mit



Die *Nährmittel* zunächst verändern die Milch in qualitativer sowohl, als quantitativer Beziehung. Bei *Hausthieren* z. B. beobachtet man, daß die Fütterung *frischer Kräuter* nicht nur größern Reichthum an Milch, sondern auch butterreichere, consistentere Milch erzeuge, als diejenige zu sein pflegt, welche von Thieren stammt, die ausschliessend, oder doch größtentheils, trocknes Futter erhalten. So ist, der allgemeinen Annahme zu Folge, die Milch von Thieren, die mit Rüben gefüttert werden, kräftiger, emulsiver, als jene der mit Heu, Kartoffeln u. a. m. ernährten Geschöpfe; aber sie erlangt dabei nicht selten Eigenthümlichkeiten, welche die Gernchs- und Geschmacksorgane vieler Menschen unangenehm afficiren.

Der, gewiss größtentheils durch Nahrungsverhältnisse bedingte *Gesundheitszustand* der Thiere übt häufig den mächtigsten Einfluß auf dieses kostbare Erzeugniß aus. Ich brauche hier nicht an die bekannten Fälle von eiter- und blutführender Milch u. a. m. zu erinnern, welche der medicinischen Gesetzgebung schon längst anheimgefallen sind; ich will diese Behauptung dafür durch

---

mehren scrophulösen Kindern, an jener einer Amme, die früher des Kindes wegen Calomel und Goldschwefel längere Zeit hindurch gebraucht hatte, an der Milch einer Frau, die, während sie mit der einen Brust säugte, an der Andern mit einem Abscesse behaftet war, u. s. w., auch bei fortgesetzter vergleichender Beobachtung keine *große* Unterschiede wahrnehmen, welche die Schwankungen übertroffen hätten, die jede, auch normale Milch täglich bei fortgesetzten analytischen Versuchen darbietet; aber diese Erfahrungen scheinen nur vor der Hand zu beweisen, daß unsere chemischen Hülfsmittel zur Zeit zur mathematischen Feststellung solcher Abnormitätsgrößen nicht ausreichen. Uebrigens hat auch F. Simon in Folge psychischer Eindrücke Anomalieen eintreten sehen. H.

einen, der jüngsten Zeit entnommenen, Beweis stützten.

Wie in den Nachbarstaaten, so auch in un Lande, war im abgewichenen, und zum Theil noch diesem Jahre die Klauenseuche eingebrochen. Ich die Aerzte darüber entscheiden lassen, in welche die hie und da vielleicht von derartig erkrankten ren genossene Milch krankhafte Phänomene an Menschen wirklich zur Folge hatte: aber aus den Ergebnissen meiner chemischen Versuche geht wenigstens so hervor, daß der Verkauf einer solchen Milch unbedingt zu gestatten sein dürfte. Milch von zwei Kühen aus verschiedenen Ställen im ersten und zweiten Stadium der Krankheit bot schon den physischen Merkmalen nach auffallende Wahrnehmungen dar. Im ersten Stadium *erschien* sie bloß wässriger; durchs Mikroskop war nicht gerade eine *Verminderung* der festen Bestandtheile zu bemerken, aber die *Abgeschlossenheit* der Kügelchen war verloren gegangen, sie flossen gleich in einander über, es war eine Art von *Continuität, Uebergangsverhältniß* zum zähflüssigen Zustande zu beobachten. Ihr Geschmack verrieth übrigens nichts Krankhaftes; ihr Alkaligehalt aber hatte sich etwas vermehrt, so daß sie durch Kälberlab nur mehr *unvollkommen* Gerinnen gebracht werden konnte. — In jener Milch, welche von im zweiten Stadium der Krankheit betroffenen Individuen gesammelt worden war, waren mit Hülfe des Mikroskops nur dürftig mehr *gesonderte* Kügelchen zu bemerken, sie hatte einen etwas putzigen Geruch und Geschmack, eine schleimig-zähe Beschaffenheit angenommen, reagierte sehr merkbar alkalisch, konnte durch Kälberlab nur *sehr unvollkommen* ins Gerinnen gebracht werden. In beiden Fällen hatte

das spec. Gew. der Milch im Verhältnisse zu jenem einer völlig normalen *vermindert*. Die chemische Prüfung ergab für Milch aus dem *ersten* Stadium der Krankheit eine Verringerung des Zucker- und Käsestoffgehalts; der Salzgehalt hatte gewonnen, wobei die Gegenwart von bisher allwärts unbeachtet gebliebenem *kohlensauren Ammoniak* nachgewiesen werden konnte. An der aus dem *zweiten* Stadium der Krankheit herrührenden Milch konnten diese Verhältnisse in aufsteigendem Grade beobachtet werden \*). (S. folgende Seite.)

Es unterliegt somit keinem Zweifel, daß auch bezüglich solcher als untergeordnet erscheinender Seuchen der chemische Maafsstab den Arzt und Gesetzgeber einigermaassen wird leiten können \*\*).

---

\*\*) Diese Meinung wird ganz besonders durch die mir von einem sehr erfahrenen Thierarzte kund.gegebene Mittheilung unterstützt: daß Milch von in obiger Art erkrankten Kühen bei Schweinen, denen sie gereicht worden war, sogleich dieselbe Krankheit hervorrief. H.

(Schluss im folgenden Hefte.)

Das *Eiweiss der Vogeleier* umgiebt bekanntermassen den Dotter, ist von einer Membran umschlossen und es scheint, von sehr feinen Membranen zellenartig gezogen, welche beim Verdünnen mit Wasser unlösliche Flocken und Häutchen bilden, die sich leicht in Kali und Essigsäure lösen. Wird dieses Eiweiss Zeit sich selbst überlassen, so nimmt es keinen Geruch, eben so wenig den nach Ammoniak, es trocknet endlich ein und stellt eine spröde, gummiartige, gelbe, durchsichtige Masse dar. Das *Eiweiss des Blutes* sondert sich aus dem von Faserstoff nicht freitem Blute ab, wird aber selten auf diese Art rein erhalten, da fast immer einige Blutkügelchen suspendirt sind, die ihm eine mehr oder weniger röthliche Farbe ertheilen. In grosser Menge, aber auch ganz frei von suspendirten Blutkörperchen kann man es oft aus geschlagenem Blut kranker Thiere, besonders kachektischer Pferde erhalten, aus dem sich die Blutkörperchen sehr leicht senken. Beide Eiweissarten werden alkalisch, und sie verdanken diese Reaction einen Antheil Natron, der darin enthalten ist. Ob dieses Natron mit Eiweiss verbunden und als Albuminat die alkalische Reaction bewirke, oder ob es als kohlensaures Natron zu betrachten sei, welches nur einen geringen Antheil Eiweiss gelöst enthält, das war bis jetzt nicht ermittelt. Ich habe einen Versuch gemacht, der die Richtigkeit der letzten Ansicht sehr wahrscheinlich macht. Wenn man ein mit gut eingeschliffenem Stöpsel versehenes Krystallglas, wie man es etwa zum Bestimmen des spec. Gewichts benutzt, behutsam so mit Wasser mittelbar aus dem Ei fließenden Eiweiss etwa zur Hälfte füllt, dass keine Luftblase mechanisch mit eingeschlo-



wird, hierauf mit derselben Behutsamkeit verdünnte Essigsäure so viel nachgießt, daß man mit dem Glasstöpsel einen vollkommenen Abschluß der Luft bewirken kann, so erhält man die Flasche mit Eiweiß und Essigsäure gefüllt, ohne daß ein Luftbläschen darin zu bemerken wäre. In dieser Flüssigkeit bilden sich aber in kurzer Zeit eine ziemliche Menge Luftblasen, die von Puncten ausgehen, wo sich Eiweiß und Essigsäure berühren und die nach 12 — 24 Stunden bedeutend sich vermehrt haben. Würde man eine Flasche zu diesem Versuche wählen, deren Hals an dem vom Stöpsel nicht ausgefüllten Theile genau graduirt wäre, so könnte man aproximativ die Quantität des gebildeten Gases bestimmen, wenn der Druck, unter dem die Bildung vor sich geht, berücksichtigt wird. Ich habe diese Luft nicht näher untersucht, indessen können die Blasen nicht wohl etwas anderes als Kohlensäure sein und diese ist mit Recht an Natron gebunden zu denken. Es wäre demnach kein eigentliches Albuminat des Natrons, welches sich im Eiweiß befindet, sondern eine einfache Lösung von Eiweiß im kohlens. Natron. Es findet bei einer Vermischung des Eiweißes mit kohlens. Natronlösung keine Veränderung Statt, die etwa auf eine Unlöslichkeit schließen liefse, im Gegentheil wird das Eiweiß klarer und die Flocken, welche früher darin zu bemerken waren, verschwinden. Nicht so vollkommen klar bleibt das Eiweiß in einer concentr. Lösung des Bicarbonats von Natron, es scheiden sich immer eine gewisse geringe Menge Flocken aus. Wird aber durch eine vollkommen klare Lösung des Eiweiß so lange Kohlensäure geleitet, welches Gas im Anfange ziemlich begierig absorbiert wird, als noch davon aufgenommen wird, so

geschieht jedesmal eine Abscheidung von Flocke wohl beim Eiweiss der Eier als des Blutes.

Das Verhalten des Eiweiss der Vogeleier und Blutes gegen Reagentien habe ich genau geprüft im Allgemeinen in der Mehrzahl Uebereinstimmung mit den schon bekannten Erscheinungen gefunden.

Von den Säuren ist es eigentlich nur die Salpetersäure, die sowohl das Eiweiss der Hühnereier als das des Blutes auf eine Weise, dass man sich der Säure zur Erkennung des Thierstoffs bedienen kann, fällt. Der durch die ersten Tropfen Salpetersäure erzeugte Niederschlag löst sich in einem Ueberschuss Eiweiss wieder auf. Die endlich bleibende Fällung sich in der Hitze nicht wieder. Wenn eine Quantität Eiweiss durch Salpetersäure nicht sogleich gefällt wird, so tritt doch die Verbindung nach einiger Zeit ein, die ganze Masse wird trübe, fast gelatinös.

Die Chlorwasserstoffsäure bewirkt in geringer Menge keine Trübung, im Gegentheil klärt sich dies nicht vermischt mit liquide Eiweiss dadurch. In grösserer Menge zugesetzt, erzeugt sie einen starken, im Ueberschuss Salpetersäure und durchs Erhitzen nicht löslichen Niederschlag. Dies Verhalten ist gegen Bluteiweiss dasselbe.

Die verdünnte Schwefelsäure trübt oder fällt Eiweiss in geringer Menge nicht, die concentrirte gleich. Wenn von geringen Mengen Schwefelsäure eine Quantität Eiweiss nicht sogleich gefällt wird, tritt die Verbindung nach einiger Zeit sehr vollkommen ein. Die Flüssigkeit trübt sich und wird, wie bei der Salpetersäure, fast gelatinös.

Die gewöhnliche Phosphorsäure fällt beide Eiweissarten, selbst im Ueberschuss hinzugesetzt, nicht, bei

Erhitzen bildet sich eine Trübung. Dafs die gegläute Phosphorsäure Eiweifs fällt, ist bekannt.

Die Essigsäure fällt unter keinen Bedingungen eine der Eiweifsarten, im Gegentheil wird das nicht vollkommen liquide Eiweifs klar und trübt sich auch beim Kochen nicht.

Von den Salzen wirken nur einige sehr spec. auf Eiweifs, es sind dies Sublimat, salpeters. Quecksilberoxydul, essigs. Blei und Kaliumeisencyanür.

Der Niederschlag durch Sublimat erzeugt, wird weder durch einen Ueberschufs von Sublimat, noch von Eiweifs gelöst. Er löst sich leicht in Essigsäure, wird durch Kali wieder gefällt und im Ueberschufs desselben von neuem gelöst. Er löst sich ferner in Ammoniak und diese Lösung wird durch Schwefelwasserstoffwasser gelb gefärbt; endlich löst er sich selbst in dem blofsen Schwefelwasserstoffwasser mit gelber Farbe. Die durch Essigsäure bewirkte Lösung des durch Sublimat in Eiweifs erzeugten Niederschlags wird durch Salpetersäure gefällt; ferner durch Schwefelcyankalium weifs, welche Farbe sich auch in der Hitze nicht verändert, durch Kaliumeisencyanid grüngelb, beim Erhitzen wird der Niederschlag blau; durch Kaliumeisencyanür gelb, durch Erhitzen grünlich werdend.

Salpetersaures Quecksilberoxydul erzeugt in sehr verdünnter EiweifsLösung einen schmutzig weissen, in concentrirter einen grauen Niederschlag. Diese Farbe bleibt noch, wenn auch die alkalische Reaction des Eiweifs völlig abgestumpft ist. Der Niederschlag im frischen Bluteiweifs gleicht ganz dem, welcher im Eiweifs der Eier hervorgebracht wird.

Die Fällung durch Kaliumeisencyanür ist bekannt, es mufs jedoch stets die alkalische Reaction des Eiweifs

vorher abgestumpft sein, sonst erscheint die Fällung nicht oder unvollkommen, weil sie in freien und lensauren Alkalien leicht löslich ist.

Essigsaures Blei, und besonders das basische, das Eiweiß weifs, und selbst aus ziemlich verdünnter Lösung. Die Fällung ist im Ueberschufs von Eiweiß wie im Ueberschufs von essigs. Blei löslich, wovon man sich überzeugt, wenn man zu einer gröfseren Quantität Eiweiß oder essigs. Bleilösung wenige Tropfen des einen oder andern Stoffes zusetzt, wo dann beim Umschütteln der Niederschlag verschwindet. Wenn man den Niederschlag lange mit destillirtem Wasser wäscht, verschwindet er. Das Waschwasser reagirt sehr schwach alkalisch; es trübt sich nicht beim Erhitzen, noch durch Zusatz von Sublimat oder Essigsäure und Kaliumcyanür, aber es färbt sich schwach braun durch Schwefelwasserstoffwasser. Es ist daher zu vermuthen, dass durch anhaltendes Auswaschen der Niederschlag zerfällt und sich essigs. Blei löst, vielleicht ein basisches Albuminat von Blei zurückbleibt. Wird der Niederschlag durch Schwefelwasserstoffgas zerlegt, so erhält man das Eiweiß mit allen dem ungeronnenen Ei zukommenden Eigenschaften wieder.

Fügt man zu durch Wasser verdünntes Eiweiß aus Eiern eine Lösung von jodsaurem Natron und darauf einige Tropfen Essigsäure, so erzeugt sich sogleich eine gelbröthliche Trübung, die sich nach und nach vermehrt, bisweilen selbst die Flüssigkeit zum Gelatiniren bringt. Ist das Eiweiß in sehr verdünntem Zustande, so tritt erst in der ersten Zeit die Flüssigkeit gelblich und später trübt sie sich. Diese Erscheinungen sind auch bei dem Eiweiß des Blutes. Eiweiß von Pferdeblut, welches ich auf gleiche Weise behandelte, trübte



nicht, es trat nur die rothe Färbung ein, selbst mit nur wenig Wasser verdünntes Bluteiweiß verhält sich so. Diese Trübung löst sich fast gänzlich in kaustischem Ammoniak, kann aber durch Essigsäure wieder hervorgerufen werden. Diese Beobachtung machte ich zu spät, um sie auch am Eiweiß von Kalbsblut und Menschenblut zu prüfen; aber wahrscheinlich ist es, daß die Jodsäure auf das Eiweiß der Eier und das des Blutes verschieden wirkt.

Die anderen Salze geben weniger interessante Erscheinungen, die meistentheils schon bekannt sind. Alaun fällt Eiweiß nicht.

Daß das kaustische Kali und Natron, so wie das Ammoniak das Eiweiß lösen und selbst in der Wärme flüssig erhalten, ist bekannt.

Alkohol fällt das Eiweiß sowohl der Vogeleier als des Blutes.

Aether mit Eiweiß geschüttelt, macht das der Vogeleier gerinnen, indem das Eiweiß zu einer Gallerte geseht, die in Wasser zertheilt, sich ganz wie geronnenes Eiweiß verhält. Das Eiweiß des Blutes gerinnt nicht durch Schütteln mit Aether. Diese Unterscheidung des Eiweiß der Eier von dem des Blutes hat zuerst Gmelin beobachtet.

Gallustinctur fällt das Eiweiß reichlich und selbst aus ziemlich verdünnter Lösung; der Niederschlag löst sich in freien Alkalien und in Essigsäure, wird aber durch Neutralisation wieder hervorgerufen.

Durch frischen Kälbermagen gerinnt Eiweiß nicht.

Werden fette Oele oder auch Terpentinöl mit Eiweiß geschüttelt, so wird das Oel in feine Kügelchen zertheilt, die nicht oder der geringsten Menge nach wieder zusammenfließen, sondern selbst, wie ich dies

beim Terpentinöl beobachtete, nach 8 Tagen noch selbe Verhalten zeigen, woraus zu schließen, daß jedes Kügelchen umgebende Eiweißhülle coagulirt. Man kann daher den Oelen wohl die Eigenschaft zuschreiben, das flüssige Eiweiß in coagulirtes zu wandeln.

Aus meinen Untersuchungen ergeben sich an vorzüglichsten Reagentien auf Eiweiß der Sublimasalpetersaure Quecksilberoxydul, basisch-essigsäures Blei, die Hitze, das Kaliumeisencyanür, Gallustinctur und Jodsäure.

Bei einer solchen Verdünnung des Eiweißs, etwa 1 Theil trockenem Eiweiß in 500 Wasser zu rechnen sei, trübt sich die Flüssigkeit beim Erhitzen noch stark und es scheiden sich spärlich Flocken ab. Bei einem Verhältniß von 1 Theil trockenem Eiweiß zu 1000 Wasser zeigt sich beim Erhitzen eine schwache Trübung. Sublimat erzeugt in solcher Flüssigkeit eine Trübung; salpeters. Quecksilberoxydul eine sehr trübende Trübung und basisch-essigsäures Blei eine sehr trübende Trübung. Das Verhältniß von 1 Theil trockenem Eiweiß zu 5000 Wasser scheint die Grenze der Fällbarkeit zu sein. Durch Erhitzen und Sublimat entsteht eine kaum wahrnehmbare Trübung, etwas deutlicher durch salpetersaures Quecksilberoxydul. Nur das basisch-essigsäure Blei trübt eine Verdünnung von 1:10,000. Es ist doch aller Wahrscheinlichkeit nach die Reaction schwächer dem Eiweiß als der Kohlensäure des Natrons zuschreiben.

Das Verhältniß, in dem das trockne Eiweiß in flüssigen enthalten ist, habe ich durch mehrere Versuche genau zu ermitteln gesucht. Das spec. Gew. des Eiweißs aus verschiedenen Hühnereiern war 1,031 — 1,030 — 1,029

Das des Eiweifs aus Kalbsblut 1,030, aus Ochsenblut 1,031, das aus Menschenblut 1,029 und 1,028, aus Pferdeblut von einem rotzigen Pferde 1,031, von einem gleichfalls rotzigen Pferde, nachdem es in 8 Tagen nur 10 Pfd. Heu erhalten hatte, 1,034.

An festen, vollkommen trocknen Rückstand erhielt ich:

*Eiweifs aus Hühnereiern:*

|                     |                      |                     |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1,                  | 2,                   | 3,                  |
| 4 Grm. gaben 0,395. | 2,8 Grm. gab. 0,278. | 10 Grm. gab. 1,080. |

*Bluteiweifs:*

|                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1,                                                | 2,                                       |
| 3 Grm. Eiweifs aus Kalbsblut hinterliessen 0,300. | 5,7 Grm. Eiweifs aus Menschenblut 0,585. |

Es ergibt sich aus diesen Resultaten, die übrigens mit denen von anderen Seiten beobachteten, sehr gut übereinstimmen, ein ziemlich constantes Verhältniß für die Quantität trocknen Eiweifs in dem flüssigen, und zwar würde man es in der Mittelzahl mit 10 Procent ausdrücken können.

Eine wichtige, und auch schon mehrfach angeregte Frage ist die, wie sich überhaupt das Eiweifs gelöst befindet, ob der Eiweifsstoff als solcher in Wasser löslich sei, oder ob er nur mit Hülfe der Salze, die er enthält, gelöst erhalten wird. Schon oben habe ich gezeigt, daß das alkalisch reagirende Natron, welches sich in dem Eiweifs befindet, als kohlensaure Verbindung anzusehen sei die zwar etwas Eiweifs gelöst enthält, das aber nicht chemisch damit verbunden ist. Diese Quantität Eiweifs ist jedoch äußerst gering. Nach meiner Untersuchung wurden, um in 10 Grm. Eiweifs des Eies das Natron zu sättigen, 3 Tropfen einer Essigsäure erfordert, von der 25 Tropfen 5 Gran kohlens. Kali sättigen. Um in 12 Grm. Eiweifs des Blutes das Alkali

zu sättigen, wurden 4 Tropfen derselben Essigsäure erfordert. Es erschien hierbei die Reaction noch schwach alkalisch, nachdem noch ein Tropfen Säure hinzugefügt worden war, schwach sauer. Jedenfalls verbrauchte hier das Bluteiweiß mehr Säure zur Sättigung als das Hühner-Eiweiß. Bei dieser Gelegenheit muß ich bemerken, wenn dieser Versuch nachgemacht werden soll, daß man aus mit möglichst frischem Bluteiweiß gearbeitet haben muß, da sich beim längeren Stehen sehr bald kohlens. Ammoniak in demselben entwickelt. Man kann also in 100 Theilen Eiereiweiß etwa 0,37 kohlens. Natron und in 100 Theilen Bluteiweiß etwa 0,4 kohlens. Natron berechnen. Hiermit ist die Angabe von Seimer's: daß  $\frac{1}{2}$  Unze Blut 10 Tropfen destillirten Wassers zur vollkommenen Sättigung verlangen, nicht gut vereinbar.

Die sehr geringe Quantität Eiweiß, welche durch kohlens. Alkali gelöst ist, verschwindet aber gegen die Menge, dessen Lösung nicht durch jenes Mittel erreicht werden kann. Würde dieses löslich sein, auch wenn es von seinem milchsauren, salzsauren und phosphorsauren Natron, Kali und Eisenverbindung getrennt wäre? Ich habe einen Versuch gemacht, diese Frage zu beantworten und hoffe nicht ohne Erfolg.

Das Eiweiß von mehreren Eiern wurde gemischt mit Wasser geschüttelt, um die Flocken zu sondern, dann filtrirt. Ein Theil desselben wurde zur vollkommenen Trockne gebracht und verbrannt. 0,360 Grm. trockenes Eiweiß gaben 0,025 einer auf das Platinblech anschmelzenden, schwarzgrauen, wie ich später zeigen werde vorzugsweise aus Natronsalzen bestehenden Asche. Der andere Theil des Eiweiß wurde mit Bleiessig gelöst und der Niederschlag anhaltend ausgewaschen, bis kohlens.



Reaction auf Eiweiß bemerkbar war. Hierauf wurde derselbe mit Schwefelwasserstoffgas zersetzt, und das wieder abgeschiedene Eiweiß durch anhaltendes gelindes Erwärmen und Filtriren vom Schwefelblei getrennt.

Wie schon früher erwähnt, hatte dieses Eiweiß alle Eigenschaften des frischen Eiweiß. Es wurde durch Hitze coagulirt und vollkommen ausgetrocknet. 0,500 Grm. dieses trocknen Pulvers gaben beim anhaltenden Glühen nur 0,008 Grm. einer weißen, lockeren, nicht anschmelzenden Asche, die aus Kalksalzen bestand. Hieraus glaube ich folgern zu dürfen, daß die Salze des Eiweiß zur Löslichkeit desselben nichts beitragen oder gar dieselbe bedingen und daß, wie es scheint, nur die Kalksalze zur wahren Constitution des Eiweiß zu gehören scheinen, worin es dann mit dem Käsestoff und Faserstoff Analogie zeigte. Uebrigens kann man auch durch Alkohol aus dem Eiweiß Salze ausziehen, aber freilich bleibt hierbei auch der Einwurf, daß alsdann das Eiweiß coagulirt ist. Daß Wasser aus dem coagulirten und vollkommen trocknem Eiweiß Salze auszieht, ist schon früher beobachtet worden.

Wenn das Eiweiß durch chemische Mittel gefällt wird, so verbindet es sich mit diesen Mitteln chemisch; solche Verbindungen sind z. B. die mit Salpetersäure, die mit Bleiessig und die mit Sublimat. Wichtig ist die Frage, ob das Eiweiß in diesen Verbindungen in dem Zustande eingeht, wie wir es als coagulirtes kennen, oder in dem Zustande, wie es sich als gelöst befindet. Beide Zustände sind offenbar verschieden. Meine Versuche machen es nicht unwahrscheinlich, daß beide Fälle möglich sind. Die oben erwähnte Zerlegung des Bleialbuminats mit Schwefelwasserstoffgas zeigte, daß sich das Eiweiß in dem Zustande wieder abscheiden

läßt, in welchem es sich gelöst befindet. Zwar reagirt die durch Behandeln des Bleialbuminats mit Schwefelwasserstoffgas erhaltene Eiweißlösung, wenn auch sehr schwach, aber doch erkenntlich sauer, aber das freie Kali giebt in ihr, behutsam zugesetzt, keinen Niederschlag und sie gerinnt in der Hitze wie das ganz reine Eiweiß, folglich kann die Lösung nicht durch die freie Säure bedingt sein. Das durch Schwefelsäure gefällte und gewaschene Eiweiß mit Kalkmilch digerirt, giebt die Flüssigkeit Eiweiß ab. Diese trübt sich zwar nicht beim Kochen, aber sie scheidet eine geringe Menge Flocken von coagulirtem Eiweiß ab.

Wird im Hühnereiweiß durch freie Essigsäure das Natron abgestumpft, so daß eine vollkommen neutrale Reaction erzeugt wird, darauf filtrirt und das klare neutrale Eiweiß längere Zeit mit Kohlensäure in Berührung gebracht, so trübt es sich und es setzt sich ein Niederschlag ab. Wird zu neutralisirtem und darauf filtrirtem Eiweiß Essigsäure im Ueberschuß zugesetzt, so bleibt es klar, stumpft man darauf die Essigsäure durch reines Kali ab, so trübt es sich schon vor der vollkommenen Neutralisation und klärt sich nicht durch einen geringen Ueberschuß des reinen Kali, sondern erst bei vermehrtem. Filtrirt man, nachdem durch Kali das Eiweiß abgeschieden aber nicht wieder gelöst ist, und setzt hernach zur filtrirten klaren Lösung von neuem Kali, so bleibt sie klar, wird dann wieder das Kali durch Essigsäure abgestumpft, so wird von neuem eine Trübung hervorgerufen. Man kann dieses wechselseitige Fällern fortsetzen und nach und nach alles Eiweiß abscheiden. Das so abgeschiedene Eiweiß löst sich nicht im Wasser, es löst sich aber mit Leichtigkeit in Essigsäure und freiem Kali. Setzt man zu neutralisirtem

und darauf filtrirtem Eiweiß Salpetersäure, so wird der durch wenige Tropfen erzeugte Niederschlag immer wieder aufgelöst, bis zu einem Punkte, wo das Eiweiß sehr stark reagirt und auch stark sauer schmeckt. Es bildet sich dann eine Trübung. Stellt man das Gefäß, ohne weiter Salpetersäure zuzusetzen, hin, so wird nach kurzer Zeit die Trübung immer stärker, und endlich bildet sich in der ganzen Flüssigkeit ziemlich rasch ein Niederschlag, der sie, wenn das Eiweiß nicht zu verdünnt war, fast zum Gelatiniren bringt. Dieser Niederschlag verschwindet nicht, wenn man kohleens. Natron selbst in nicht unbedeutendem Ueberschuß zusetzt; er verschwindet früher, wenn reines Kali zugesetzt wird. Der Niederschlag durch Salpetersäure erscheint auch in dem in Essig gelösten Eiweiß und nur eine sehr große Menge der Säure verhindert ihn.

Wird Eiweiß mit einer solchen Menge reinen Kalis erhitzt, daß es nicht dabei recht gelatinirt und nach der Abkühlung der Flüssigkeit irgend eine Säure zugesetzt, so wird ein sehr copiöser und massenhafter Niederschlag erzeugt, zugleich entwickelt sich ein starker Geruch nach Schwefelwasserstoffgas \*).

Alle diese Untersuchungen machen es im Widerspruch mit dem am Bleialbuminat angestellten, wahrscheinlich, daß das Eiweiß in dem Zustande, wie wir es als coagulirtes kennen, abgeschieden wird.

Solch doppeltes Erscheinen hätte gar nichts Auffallendes, wenn wir nur überhaupt wüßten, auf welche

---

\*) Es ist dies ein sehr schlagender Beweis von der Gegenwart des Schwefels im Eiweiß, welcher Stoff aber nur in sehr geringer Menge anwesend ist. Schwefelsäure wird durch ein Barytsalz in dem frischen klaren Eiweiß nicht angezeigt.

Art das Coaguliren vor sich geht, und was die bedingende Ursach desselben ist, wie sich überhaupt chemisch das coagulirte Eiweiß von dem uncoagulirten unterscheidet. Diese Frage ist oft aufgeworfen worden und selbst die Untersuchungen der berühmtesten Chemiker haben nur zu Vermuthungen geführt. Wie wichtig aber die Erörterung dieses Gegenstandes ist, liegt der Hand, denn mit dem Aufschluß über das Wesen der Coagulation des Eiweiß würden wir zugleich auch über das Wesen der Coagulation des Käsestoffs durch Kälberlab und über das des Faserstoffs erhalten.

Die Temperatur, bei welcher das Eiweiß gerinnt, wird nicht ganz übereinstimmend von verschiedenen Chemikern angegeben, sie schwankt zwischen  $63 - 75^{\circ}$ . Nach meinen Versuchen tritt das vollkommene Gerinnen bei  $65^{\circ}$  C. ein. Welches ist die Ursach des Gerinnens? Ich muß gestehen, daß die Versuche, welche ich angestellt habe, noch zu keiner Lösung dieser wichtigen Frage geführt haben.

Läßt man das Eiweiß der Eier in einer Porzellanschale gerinnen, so wird es nie so fest, als wenn es mit seiner natürlichen Schale in kochendes Wasser gebracht wird. Es bleibt noch immer eine geringe Menge Flüssigkeit, die sich durch ein leinen Tuch bei vorsichtigem Pressen entfernen läßt, alkalisch reagirt und beim erneuten Erhitzen nicht vollkommen coagulirt. Legt man das ausgepresste coagulirte Eiweiß auf geröthetes Lackmuspapier, so reagirt es noch alkalisch. Eine irgendwie erzeugte freie Säure kann also nicht Ursach des Gerinnens sein. Uebrigens rührt die sehr feste Consistenz, welche das Eiweiß annimmt, wenn es in dem unversehrten Eie erhitzt wird, daher, daß durch die Eischale hindurch, obgleich das ganze Ei von Wasser bedeckt sein kann



Wasserdämpfe entweichen. Es ist klar, daß, wenn dies nicht der Fall wäre, die Schale des Eies reißen würde. Ich nahm eine sehr starke weiße Glasflasche, welche ein Loth Wasser faßte, füllte sie etwa zu  $\frac{5}{6}$  mit frischem Eiweiß, band einen dicht schließenden Stöpsel darauf fest und liefs sie 20 Minuten unter kochendem Wasser. Das Eiweiß war hierauf coagulirt und über demselben stand eine geringe Menge einer vollkommen klaren Flüssigkeit, welche sehr schwachsalzig schmeckte und schwach alkalisch reagirte. Das coagulirte Eiweiß selbst war fest, aber feuchter und weicher, als ein im Ei 12 Minuten in kochendem Wasser erhitztes.

Mit Berücksichtigung auf die chemischen Verbindungen, welche das Eiweiß mit mineralischen Stoffen eingeht, konnte es wahrscheinlich sein, daß es in diesem im wasserfreien Zustande sich befindet, und ein Hydrat ist, wenn es gelöst erscheint; auf analoge Weise dürfte man das coagulirte Eiweiß für ein wasserfreies oder doch für eine andere Hydratstufe halten wie das gelöste, und hierin die Ursache der Coagulation suchen. Versuche, die ich hierüber anstellte, gaben ein negatives Resultat. Zwei gleiche Quantitäten Eiweiß eines und desselben Eies wurden, die eine coagulirt und getrocknet, die andere bei 35—40° C. getrocknet, und dann beide so lange weiter der Wärme des Kochsalzbades angesetzt, bis sich kein Verlust mehr zeigte. Beide Rückstände wogen genau gleich viel; dieser Versuch ist schon früher von Chevreul mit demselben Erfolge angestellt worden.

Es bleibt kaum etwas anderes für die Erklärung dieser Erscheinung übrig, als Analogien dafür zu suchen und finden sich solche, aus diesen eine Erklärung zu entwickeln. Die Kieselsäure und das Zinnoxid, gewis-

sermaßen auch die Zirkonerde und die schwefel Thorerde sind ebenfalls zweier Zustände fähig. diesen Körpern ist man geneigt, die eingetretene Veränderung in einem veränderten Aggregatzustand zu setzen. Nichts hält uns ab, die ähnliche Erscheinung bei Eiweiß auf gleiche Weise zu erklären, und es ist nichts, was dieser Erklärung widerspräche. Indes ist es auch nothwendig, für diesen veränderten Aggregatzustand einen Grund zu suchen. Zunächst muß Wärme dafür genommen werden; es ist nicht überflüssig, die Wärme solche Wirkungen hervorbringen zu sehen, wenn man bedenkt, daß Wärmeströmungen stets mit elektrischen Strömungen verbunden sind, daß die elektrischen Ströme die polare Lagerungstellung der einzelnen Atome bedingen. Sollte nun in manchen Fällen durch erhöhte Wärmeströmungen ein Abweichen der elektrischen Strömungen bewirkt werden, so müßte dadurch auch eine Abweichung in der polaren Lagerung der Atome und also eine Veränderung in den physikalischen Eigenschaften des Körpers zu erfolgen.

Durch sehr feine Instrumente ist nun aber nachgewiesen worden, daß oft durch die geringsten Veränderungen, welche mit einem Körper vorgenommen werden, elektrische Ströme erzeugt werden, so durch Erwärmung, Stoß, Druck, Ritzen etc. Es ist dies zwar kein Beweis, aber es macht es höchst wahrscheinlich, daß ein imponderables Fluidum alle Körper durchdringt und in ihnen mit derselben Leichtigkeit, wie im Aether oder der Luft schwingt, und es ist gewiß von hoher Wichtigkeit, auf die Gegenwart, auf die Wirkung dieses solchen Fluidums die genaueste Rücksicht zu nehmen. Bei Gelegenheit, wo ich über das Blut im

meinen spreche, werde ich versuchen, diese Ansicht in Bezug zum Organismus durchzuführen, und ich hoffe, alles das, was uns unter Bezeichnung dynamisch bisher unerklärlich war, auf diese Weise wohl anschaulicher zu machen.

Galvanische Ströme, welche ich durch Eiweifs leitete, boten mir übrigens keine anderen Erscheinungen als diese schon bekannt sind. Eine sehr schwache Säule (der Dübeneinsche Apparat) bewirkte keine Coagulation; eine Kette aus 50 anderthalbzölligen Plattenpaaren, welche recht empfindliche Stöße ertheilt, coagulirte auch rasch und zwar an beiden Polen das Eiweifs, wodurch die Gmelin'sche Beobachtung bestätigt wird. Eine sehr interessante Erscheinung bietet das Eiweifs dar, welches durch Zersetzung des Bleialbuminats mittelst Schwefelwasserstoffgas erhalten wird und frei von Kochsalz und milchsauren Salzen ist. Man beobachtet nämlich, wenn dieses Eiweifs galvanisirt wird, die von Dutrochet zuerst beschriebenen und von J. Müller\*) bestätigte gefundenen Wellen, welche an beiden Polen anstehen und in ihrer Berührungslinie coagulirtes Eiweifs absetzen.

Coagulirtes Eiweifs ist in Wasser nicht löslich. Zwar nimmt das Wasser, wenn es lange mit coagulirtem Eiweifs in Berührung steht, geringe Mengen Eiweifs auf, es sind dieses aber diejenigen, die durch das kohlensa. Natron während der Erhitzung gelöst bleiben und sich nach und nach auswaschen. Alkohol anhaltend mit Hühnereiweifs erhitzt, entzieht diesem Salze und extractive Materie, aber kein Fett. Ich bestimmte die Menge dieser, durch Alkohol ausziehbaren Materien mit

\*) J. Müller's Physiologie. B. 1. p. 139.

0,02 in 1,5 trockenem Eiweiß, was etwa 1,33 Procent entspricht.

Aether entzieht dem coagulirten Bluteiweiß Fett, starker Alkohol nimmt den Speichelstoff, die extractive Materie und mehrere Salze daraus auf. Durch Wasserverdünnter Alkohol extrahirt aus dem Bluteiweiß keinen Käsestoff, wenn es frei von Blutkörperchen war; enthält das Eiweiß Blutkörperchen suspendirt, was häufig der Fall und an seiner röthlichen Farbe oder mit dem Mikroskope erkannt werden kann, so färbt sich der Alkohol beim Kochen mit dem coagulirten Bluteiweiß röthlich und enthält Käsestoff und Blutroth.

In ätzendem Kali löst sich das geronnene Eiweiß sowohl das des Blutes als das der Eier unter Anwendung von Wärme leicht auf, wobei sich die Flüssigkeit grünlich oder bräunlich färbt. Entwicklung von Ammoniak habe ich dabei nicht beobachten können, wohl aber bemerkt man beim Füllen durch eine Säure stets den schon erwähnten Geruch nach Wasserstoffgas.

Concentrirtes Ammoniak löst ebenfalls aber langsam das coagulirte Eiweiß.

Concentrirte Schwefelsäure löst das coagulirte Eiweiß mit brauner Farbe; Wasser fällt daraus wenig gefärbte Flocken, wie dies Link beobachtet hat.

Concentrirte Salzsäure löst in der Kälte das coagulirte Eiweiß auf, wobei sie sich schön blau färbt. Die Menge der Säure darf nicht zu gering sein. Der Lösung, welche nach einigen Tagen erfolgt, geht ein Erweichen und Quillen des Eiweißes voran. War wenig Eiweiß genommen, so ist die Färbung wenig intensiv, das Eiweiß verschwindet fast ganz. War mehr Eiweiß genommen, so ist die Färbung dunkeler, es bleiben violette Flocken am Boden des Glases zurück. Nach



10 bis 12 Tagen geht die Farbe in die Violette und endlich in die schmutzig Braungelbe über, wobei die dunklen Flocken sich vermehren. Die so gefärbte Säure mit Ammoniak abgestumpft, läßt keinen Niederschlag fallen. Kochende concentrirte Salzsäure löst das coagulirte Eiweiß mit violetter oder rothbrauner Farbe.

Concentrirte Salpetersäure löst das coagulirte Eiweiß nicht in der Kälte, sondern färbt es intensiv gelb, selbst die gelbe Farbe annehmend; beim Erhitzen löst sie es leicht mit starker Gasentwicklung.

In concentrirter Essigsäure quillt das coagulirte Eiweiß stark auf, besonders beim Erwärmen. Das Eiweiß des Blutes zeigt diese Erscheinung in einem höhern Grade als das der Eier. Wird das so gewissermaßen gelatinirte Eiweiß mit warmem Wasser behandelt, so löst es sich. Ganz so hat schon früher Berzelius die Einwirkung der concentrirten Essigsäure beschrieben. Ist die Essigsäure verdünnter, so findet zwar noch ein Aufquellen, aber keine Lösung mehr in Wasser Statt.

Sehr concentrirte, so wie verdünnte Oxalsäure scheinen nicht auf das coagulirte Eiweiß einzuwirken.

Bei der Behandlung des coagulirten Eiweiß mit Metall- und anderen Salzen habe ich keine bemerkenswerthe Erscheinungen beobachtet.

Diese Untersuchungen über das coagulirte Eiweiß bestätigen vollkommen die schon früher von andern Chemikern über diesen Stoff gemachten Erfahrungen.

Was die Salze des Eiweiß anbetrifft, so stimmen meine Beobachtungen nicht ganz mit denen anderer Chemiker überein. Ich fand, daß sowohl das Eiweiß der Eier wie das des Blutes vorzüglich Alkalisalze und nur

in geringer Menge Kalksalze, das Bluteiweiß auch Spuren von Eisen enthielt, wenn dieses nicht durch eine geringe Menge suspendirter Blütkörperchen zu erklären. Die Kohle, welche beim Verbrennen zurückbleibt, ungemein schwer einzuäschern und selbst beim anhaltendsten Glühen bleiben noch Spuren der Asche beigemischt. Diese Asche schmilzt, was eine Asche, die Kalksalze enthält, nicht thut. Die Quantität feuerbeständigen Rückstandes bestimmte ich auf nahe an 4 Procent und selbst bei einigen Versuchen darüber. Faserstoff und Käsestoff geben viel weniger, Farbstoff aber mehr als die Asche. Die Bestandtheile der Asche waren Natron, Kalium vorherrschend, Kalk untergeordnet, Kohlensäure, Phosphorsäure, Chlorwasserstoffsäure. Eine genaue Untersuchung werde ich an dem Orte, wo ich über die feuerbeständigen Salze des Blutes spreche, mittheilen.

Das erste Heft des neunten Bandes von *Berzelius' Chemie*, welches ich beim Beendigen dieses Aufsatzes erhielt, verbreitet sich über die neuesten chemischen Thatsachen in Bezug zum Blute. Die vortreffliche Entdeckung Mulder's und seine Arbeit über Protein, sowie viele andere wichtige Beobachtungen, die zum Theil mit den meinigen übereinstimmen, zum Theil abweichen, sind darin zusammengestellt. Ich kann natürlich dem Leser, der sich für den Gegenstand interessirt, nur darauf aufmerksam machen.

(Fortsetzung folgt.)



# Ueber das chemische Verhalten und die chemische Constitution des Eisenweinsteins;

von

*H. Wackenroder.*

Die atomistische Zusammensetzung der weinsteinsäuren Doppelsalze ist immer ein Problem gewesen für den Scharfsinn der Chemiker. Man hätte glauben sollen, daß nach Wallquist's u. Brandes's Analysen des Brechweinsteins und Dulk's ausführlichen Untersuchungen über die weinsteinsäuren Salze (*Dissertatio de nonnullis tartaribus* 1831; im Auszuge in *Schweigger-Seidel's Journ. für Chemie und Physik*, Bd. 64.) dieser Gegenstand seine Erledigung gefunden hätte. Gleichwohl sehen wir keine durchgreifende Uebereinstimmung in den Ansichten der Chemiker über diese Salze. Bei Berzelius (*Lehrbuch* Bd. IV. 1835) finden sich die *globuli tartari martiati* als weinsaures Kali-Eisenoxydul und der *tartarus ferruginosus* als weinsaures Kali-Eisenoxyd aufgeführt, während Dulk, wie es scheint, aus seinen analytischen Untersuchungen gefolgert hatte (*Journ. für Ch. u. Ph. a. a. O.* pag. 213), daß diese beiden Präparate weinsteinsaures Eisenoxydkali seien, und durch die Formel  $4(KO, \bar{T}) + (Fe_2O_3 \bar{T})$  repräsentirt werden, daß aber die von Geiger aufgestellte Hypothese, nach welcher der Eisenweinstein aus weinsteinsaurem Eisenoxyd und Eisenoxydkali bestehe, für unbegründet zu halten sei.

Ich habe indessen seit längerer Zeit die Ueberzeugung gewonnen, daß keine dieser Ansichten ganz richtig ist, da die *globuli tartari martiati* eben sowohl, als der *tartarus ferruginosus* Eisenoxydul und Eisenoxyd zugleich enthalten. Man darf der wässrigen Auflösung

der *globuli tartari martiati* nur etwas Salzsäure und dann theils Kaliumeisencyanid, theils Kaliumeisencyan hinzufügen, um sich auf der Stelle zu überzeugen, daß beide Oxyde des Eisens in diesem Präparate zugegen sind. Das quantitative Verhältniß beider Oxyde muß ein variables sein; daß aber von einer bloß geringfügigen Beimengung des einen oder des andern Oxydes nicht die Rede sein könne, das geht augenscheinlich hervor aus der Menge des Niederschlages von Berlinerblau, welche beide Doppelcyanüre hervorbringen. In der That, es liefs sich auch nichts anderes erwarten, da die Eisenoxydulsalze mit nicht flüchtigen Säuren nur bis zu einem gewissen Grade an der Luft in Eisenoxydsalze übergehen \*). Dasselbe Gemenge von beiden Oxyden des Eisens findet sich auch in den *globul. tartar. martiatis*, welche man mit Hülfe von Salpetersäure leicht bereiten kann. Fügt man nämlich einem mit Wasser angerührten Brei von 10 Grm. feiner Eisenfeile und 40 Grm. gepulverten gereinigten Weinstein einige Tropfen, im Ganzen 20 bis 25 Tropfen Salpetersäure in längere Zwischenräumen hinzu, so wird bei gelinder Digestion schon innerhalb ein Paar Tagen ein Eisenweinstein erzeugt, welcher dem gewöhnlichen nur durch langwierige Digestion hervorzubringenden Präparate ganz gleich ist. Während der Digestion verschwindet aus demselben die Salpetersäure bis auf eine unbedeutende Spur. Daß man übrigens bei Bereitung des Eisenweinsteins die Eisenfeile nicht durch den schwerlöslichen Eisen

---

\*) Eine wässrige Auflösung des Eisenvitriols wird schon seit 9 Jahren in einer leicht verkorkten Flasche von mir aufbewahrt, und dennoch befindet sich in der über dem ockergelben Bodensatze stehenden dunkelbraunen Flüssigkeit neben dem Eisenoxyd eine gute Menge von Eisenoxydul.



hammerschlag ersetzen kann, wie Dörffurt vorschlug, ist bekannt genug.

Höchst auffallend ist aber der Umstand, daß, wie es scheint, ganz dieselbe Mischung von weinsteinsaurem Eisenoxyd, Eisenoxydul und Kali entsteht, wenn Eisenoxydhydrat mit *cremor tartari* digerirt wird, gemäß der Vorschrift zur Darstellung des *tartarus ferruginosus* in der Preuß. und Sächs. Pharmacopöe. Bei genauer Befolgung der erwähnten Vorschrift erhält man *tartarus ferruginosus* an Gewicht  $\frac{1}{16}$  mehr, als der angewendete *cremor tartari* betrug. Es darf jedoch die Digestion des Gemenges aus gepulvertem gereinigtem Weinstein, Eisenoxydhydrat und Wasser nicht länger fortgesetzt werden, als bis die Masse eine weiche Extractconsistenz angenommen hat.

Dieser *tartarus ferratus* von dunkelgrüner, nach dem Zerreiben von gelbgrüner Farbe, löst sich leicht und völlig klar in kaltem Wasser auf. Die verdünnte Auflösung besitzt eine gelblich-grünliche, die concentrirte eine dunkelgelbgrüne Farbe. Sie rüthet das Lackmuspapier stark. — Aetzkali färbt die Auflösung dunkelbraun, beim Erhitzen der Flüssigkeit bis zum Kochen entsteht aber ein voluminöser Niederschlag und das Eisen scheidet sich vollständig ab. War die Auflösung verdünnt, so besteht der Niederschlag fast ganz in Eisenoxydhydrat, war sie aber concentrirt, so ist derselbe von schwarzbrauner Farbe, ähnlich dem durch Fällung hervorgebrachten *Aethiops martialis*, und besteht aus Eisenoxyd und Eisenoxydul. Die Fällbarkeit des Eisenoxyds aus dem Eisenweinstein durch Kali wird zwar, wie ich glaube, allgemein nicht angenommen; nichtsdestoweniger beruht diese Annahme auf einem gründlichen Irrthum. — Kohlensaures Natron färbt die Auf-

lösung grünlich-braun. — Aetzammoniak bringt beim Kochen keine Trübung hervor, sondern die Flüssigkeit behält ihre braune Farbe und ihre Klarheit. Ein geringer Zusatz von Salzsäure zu der erwärmten Flüssigkeit bringt jedoch einen Niederschlag von der Farbe des Eisenoxydhydrats hervor, der aber auf Zusatz von mehr Salzsäure verschwindet. Es ist möglich, daß derselbe basisches weinsteinsaures Eisenoxydhydrat ist, wie Dulk glaubt. — Essigsaures Natron färbt die Flüssigkeit dunkelrothbraun, bewirkt aber auch beim Kochen keine Trübung, selbst wenn eine kleine Menge von Salzsäure hinzugefügt worden. — Phosphorsaures Natron neutralisirt die Auflösung vollkommen, färbt sie gelblicholivengrün, trübt sie jedoch nicht, selbst beim Kochen nicht. Fügt man aber nun noch essigsaures Natron zu, so entsteht ein grünlich-weißer Niederschlag, keine Spur von Eisen bleibt in der Flüssigkeit zurück. Versetzt man die Auflösung des *tartarus ferratus* mit phosphorsaurem Natron und dann mit ein wenig Salzsäure, so schlägt sich besonders beim Erwärmen sofort ein weißer, voluminöser Niederschlag von phosphorsaurem Eisenoxyd zu Boden, ganz in derselben Weise, wie dieses geschieht, wenn eine saure Auflösung des phosphorsauren Eisenoxyds mit essigsauren Alkalien gemischt wird (vergl. dieses Archiv Bd. 16. 2. R. pag. 100). Fügt man der Auflösung des *tartarus ferratus* ziemlich viel phosphorsaures Natron und Salzsäure und dann die nöthige Menge von essigsaurem Natron hinzu, so setzt sich beim Kochen alles Eisenoxyd als weißes phosphorsaures Eisenoxyd ab, und in der Flüssigkeit bleibt alles Eisenoxydul als phosphorsaures Eisenoxydul aufgelöst. Letzteres ist in der filtrirten Flüssigkeit leicht zu erkennen, an dem allmählig sich bildenden grünlichen

Niederschlag durch Aetzkali, an dem hellblauen durch Kaliumeisencyanür, an dem Klarbleiben der mit Schwefelwasserstoffwasser vermischten sauren Flüssigkeit, an der geringen rothen Färbung derselben durch Schwefelkohlenstoff nach vorangegangenen Zusätze von Salzsäure u. s. w. — Kaliumeisencyanid erregt in der Auflösung dieses eisenhaltigen Weinstens sofort einen starken Niederschlag von Berlinerblau, welcher jedoch auf Zusatz von einigen Tropfen Salzsäure sich noch vermehrt und schneller absetzt, während die Flüssigkeit eine gelbgrünliche Farbe annimmt. — Kaliumeisencyanür bringt nur eine grüne Färbung der Auflösung hervor. Indessen bildet sich auf Zusatz von etwas Salzsäure sogleich ein starker Niederschlag von Berlinerblau, dessen Volumen, nachdem er sich aus der fast farblosen Flüssigkeit abgeschieden hat, ungefähr  $\frac{1}{4}$  mehr beträgt, als das Volumen des durch Kaliumeisencyanid hervorgerufenen Berlinerblaus. — Gallusaufguss färbt die Auflösung dunkelblau und macht sie undurchsichtig. Sie klärt sich auch nicht auf Zusatz von Essigsäure, selbst nicht nach mehreren Tagen. — Schwefelwasserstoffwasser erregt in der Auflösung sogleich eine grauschwarze Trübung. Hineingeleitetes Schwefelwasserstoffgas bringt, wie immer, in den Auflösungen des Eisens in organischen Säuren, einen reichlichen schwarzen Niederschlag hervor, jedoch ist, wie ich wenigstens in Bezug auf das saure Eisenoxyd in *Bd. 16. a. o. O.* dieses Archivs gemerkt habe, die Fällung des Eisens niemals vollständig.

Aus diesen Reactionen des *tartarus ferruginosus* geht klarlich hervor, daß ein guter Theil des Eisenoxyds während der Digestion desselben mit Weinstein zu Oxidul reducirt wird. Dieses kann aber nur auf Kosten der Weinsteinsäure geschehen, und so entsteht die Frage,

welche Veränderung die Weinsteinsäure dabei erleidet. Es scheint nicht werthlos, dieser muthmaßlichen Umformung oder morphose der Weinsteinsäure weiter nachzuforschen. Hr. Eder aus Leipzig, welcher auſser mehreren andern Mitgliedern des pharmaceutischen Instituts, vorzüglich Theil hat an diesen Untersuchungen, hat mehrere derartige gerichtete Untersuchungen unternommen, deren Resultate im günstigen Falle demnächst mitgetheilt werden sollen.

Obgleich mir längst wohl bekannt war, daß *globuli tartari martiati* im Ganzen dasselbe Verhalten zeigen, wie es von uns jetzt bei dem *tartarus ferrosus* gefunden worden, so haben wir dennoch auf einige vergleichende Versuche angestellt, und zwar sowohl mit frisch bereiteten *globulis tartari martiatis* einer Apotheke, als auch mit solchen, die vor 15 Jahren sorgfältig bereitet und während dieser ganzen Zeit in einem nur mit Papier verbundenen Glase als Muster meiner Sammlung aufbewahrt wurden. Der Hauptunterschied beruhet nur in dem angewendeten rohen Weinstein und in der fast unvermeidlichen Beimengung metallischem Eisen in den Stahlkugeln. Dieses zeigt sich in einem grauen schleimigen Rückstand von weinsteinrem Kalk hinterbleibt beim Zerreiben der Weinsteinkugeln mit kaltem Wasser. War bei der Bereitung der *globul. tart. mart.* die Digestion mit Eisen nicht lange genug fortgesetzt worden, so bleibt eine große Menge metallischen Eisens zurück beim Auflösen des Präparats in kaltem Wasser, und die Flüssigkeit girt stark sauer. Im entgegengesetzten Falle zeigt sich nur eine schwach saure Reaction. Nach dem Verhalten der Berlinerblau - Niederschläge zu urtheilen, welches Kaliumeisencyanür und Kaliumeisencyanid in beiden A



lösungen hervorbringen, enthält, wie man kaum voraussetzen durfte, das stark saure Präparat ungefähr dieselben Mengen von Eisenoxyd und Eisenoxydul, wie das schwach saure und wie der mit Eisenoxydhydrat bereitete *tartarus ferruginosus*. Jene ersteren Präparate sind daher dem letztern sehr ähnlich, wo nicht mit demselben identisch. Nur darin, daß die gut gesättigten *globuli tartari martiati* wenig oder gar keine freie Säure enthalten und daher mit Kaliumeisencyanid nicht geradezu einen Niederschlag von Berlinerblau geben, dürfte der vorzüglichste Unterschied liegen. Uebrigens verhält sich die wässrige Auflösung der Weinsteinisenkugeln ganz so, wie die Auflösung des *tartar. ferruginosus*. Beim Kochen mit Aetzkali wird ebenfalls alles Eisen vollkommen niedergeschlagen als Eisenoxyd-Oxydul-Hydrat. Die Flüssigkeit läuft zwar bräunlich durchs Filtrum, allein diese Farbe rührt nur von den fremden organischen Theilen aus dem rohen Weinstein her. Diese theilen auch der wässrigen Auflösung des Präparats eine dunklere Farbe, als die Auflösung des *tartarus ferruginosus* besitzt.

Jedenfalls ist es bemerkenswerth, daß man nach beiden Vorschriften unserer Pharmakopöen immer ein vierfaches Salz von weinsteinsaurem Eisenoxydul-Kali und weinsteinsaurem Eisenoxyd-Kali, und zwar anscheinend von derselben atomistischen Zusammensetzung erhält. Während in dem einen Falle das entstehende weinsteinsaure Eisenoxydul durch die atmosphärische Luft theilweise zu weinsteinsaurem Eisenoxyd höher oxydirt wird, wird in dem andern Falle das weinsteinsaure Eisenoxyd durch die Weinsteinensäure selbst theilweise zu Eisenoxydulsalz reducirt.

---

# Ueber die Zersetzung des Borax durch Honig und über Boraxweinstein;

vom

Apotheker *Storch* in Rokitzan in Böhmen.

Wenn man Borax in Honig auflöst oder bereitet in Wasser aufgelöst mit Honig vermischt, so reagirt diese Vermischung, wenn nicht ein überaus großes Verhältniß von Borax genommen wurde, sauer. Da diese Reaction zuerst bei der Auflösung des Borax in Pfingstrosenhonig, dessen Farbe dadurch intensiver wurde beobachtet habe, so hielt ich, sowie nach einem späteren Versuche mit Rosenhonig, die Säuren dieser Blätter für die Ursache derselben; allein hiedurch zu mehrfachem Versuchen veranlaßt, überzeugte ich mich, daß weder der Aufguss von Rosen noch Pfingstrosenblätter den Borax zersetzt, wohl aber der Honig, und wie es scheint in der Art, daß die Borsäure ausgeschieden wird, während die Humussäure (?) des Honigs sich mit dem Natron des Borax verbindet. Der Geschmack wird deutlich säuerlich, und übergießt man eine solche Auflösung mit etwas Alkohol, so röthet in Kurzem dieser blaue Lackmusstreifen; gießt man ihn ab und setzt einen Tropfen verdünnte Schwefelsäure hinzu, so wird auch Kurkumäpapier roth gefärbt. Letztere Reaction tritt selbst ohne Zusatz von Schwefelsäure besonders deutlich hervor an aufgeschabter Kurkumawurzel. Ist nicht ein jeder Honig einen gleichen Gehalt der ihm eigenthümlichen Säuren besitzt, so ist auch dessen Fähigkeit zu besagter Zersetzung ungleich. Dies mag die Ursache sein, daß solche beim böhmischen Honige um die Hälfte geringer war als beim gereinigten des Ha-

dels; denn während 20 Gran des ersten 13,6 Gran Borax zu zersetzen vermochten, war dieselbe Quantität des letzten fähig 26 $\frac{2}{3}$  Gran Borax zu zerlegen, indem erst von diesem Punkte an der Borax seine alkalische Reaction behielt. Ebenso folgt daraus, daß nur jener Rosen- oder Pfingstrosenhonig in dieser Hinsicht auf den Borax eßiger einwirken kann, zu welchem, wie von Einigen wegen Erhöhung der Farbe geschieht, eine Mineralsäure, gewöhnlich verdünnte Schwefelsäure, zugesetzt worden ist. Liegt nun dem Arzte daran, den Borax unverändert — nämlich mit seiner alkalischen Eigenschaft — in einem Linctus aufgelöst zu wissen, so müßte dieser nur im einfachen Zuckersyrup, welcher nach meiner Erfahrung gegen den Borax indifferent ist, verordnet werden.

Diese Erfahrung von der so leichten Zersetzbarkeit des Borax im nassen Wege regte mich zur Nachforschung der chemischen Constitution des *Boraxweinsteins* an. Ich ging die Arbeiten von Dulk, Duflos u. Berzelius durch, und überzeugte mich bei Wiederholung der Duflosschen Versuche, daß, so gering auch die Löslichkeit des Boraxes und noch weit geringer die des Weinsteins für sich im Wasser von gewöhnlicher Temperatur ist, sie jedoch bedeutend größer wird, wenn beide Salze zusammengemischt werden, denn indem einzeln vom Borax nur  $\frac{1}{11}$ , vom Weinstein gar nur  $\frac{1}{135} - \frac{1}{150}$  kalt auflösbar ist, löst kaltes Wasser durch 12stündige Digestion von den genannten im Verhältniß von 1 : 3 zusammengemischten Salzen  $\frac{1}{5}$  auf. Steigert man die Temperatur, so wird dieses Vermögen erhöht, und man erhält, wenn der Weinstein rein war, bei hinreichend vorhandenem Wasser, eine klare Auflösung, welche, zur Trockne abgedampft,  $\frac{7}{8}$  eines weißen sauer reagirenden im gleichen

Gewichte kalten Wassers auflöslichen Salzes — den Boraxweinstein — liefert. Aus Duflos's Versuchen geht hervor, daß der Borax nur allein sein dreifaches Gewicht Weinstein auflösen vermag. Betrachten wir das Verhältniß und den stöchiometrischen Werth der fraglichen Salze, dann deren Wassergehalt, und vergleichen jenen des producirten Boraxweinsteins, so wird man versucht bei dem bekannten Streben der Weinsäure nach complicirten Verbindungen und der Eigenschaft der Borsäure zuweilen in basischen Rollen aufzutreten, sich vorzustellen, als habe das krystallisirte Kalibitartrat sich mit dem wasserfreien Natronbiborat verbunden, denn bei der neuen Verbindung findet nur der Wasserverlust des Borax Statt, weil beide Salze in dem Verhältnisse von 1 : 3 zusammen 13 Atome Wasser enthalten, von welcher der erzeugte Boraxweinstein nur allein 3 Atome aufnimmt, während 10 Atome desselben, = dem Wassergehalte des Borax, ausgeschieden werden, wie folgt:

$$\begin{array}{l} 1 \text{ At. Borax (Na } \ddot{\text{B}}_2 + 10 \text{ Aq.)} = 2388,10 \text{ (dessen Wassergeh.} = 1124,80 \\ 3 \text{ At. Weinst. (K } \overline{\text{T}}_2 + \text{Aq.)} = 7091,46 \text{ (dess. 3fach. Wasserg.} = 337,44 \\ \hline \text{zusammen} = 9479,56 \end{array}$$

$$\text{hievon} \quad \underline{1124,80} = 10 \text{ At. Wassers des Borax}$$

$$\text{bleiben} \quad 8354,76 \text{ als Zahl für den Boraxwein}$$

stein mit 3 At. Wasser (= 337,44). Die Formel für diesen wäre



und 100 Gewichtstheile beständen aus: 15,03 Borax

81,20 Weinstein

3,77 Wasser

100.

Vertheilt man die einzelnen Bestandtheile, so sind in 100 Gewichtstheilen enthalten: Natron 4,65, Borsäure 10,38, Kali 21,28, Weinsäure 59,92 und Wasser 3,77 = 100. Aus der Eigenschaft des Borax aber, auf nassem Wege leicht zersetzt zu werden, dann aus jener



des Boraxweinsteins, wo ein Zusatz von Weinsäure aus demselben Weinstein fällt, läßt sich, übereinstimmend mit den obzwar schwierig unternommenen Analysen folgern, daß beim Zusammentreffen des Weinstein mit dem Borax auf nassem Wege, erster zu einfach-weinsaurem Kali sich reducirt; der zweite Antheil Weinsäure ist auch in zureichender Menge vorhanden, um mit dem Natron des Borax einfach-weinsaures Natron zu bilden und die isolirte Borsäure zu sättigen. Diese Doppelsäure nun ist so fest gebunden, daß sie vom Weingeiste nicht aufgelöst wird, sowie überhaupt der Boraxweinstein im Alkohol unlöslich ist, beim Sättigen mit kohlensäuerlichem Ammoniak aber sich sehr leicht auflöst; vom Wasser gehen nur bloß 3 Atome mit in die neue Verbindung und man muß von 20 Gewichtstheilen Borax und 60 Gewichtsth. Weinstein, zusammen 80, auch 70, oder  $\frac{7}{8}$  Boraxweinstein erhalten.

Die Formel für dieses Präparat wäre daher ähnlich der von Duflos:



und der stöchiometrische Werth = 835,477 (O = 10), welcher auch dem nach der ersten Ansicht gefolgerten gleich ist; in 100 Gewichtstheilen wären daher enthalten:



## Chemische Bemerkungen;

vom

Apotheker *Demong* in Sarstedt.

### I. Ueber Bittermandelwasser.

Nach der vom Hrn. Dr. Geiseler in dieser Zeitschr. 2 A. Bd. X, 50. bekannt gemachten Methode zur Berei-

tung der *Aquae amygdalar. amarar. concentratae*, welche darin besteht, die vom Oel durchs Auspressen befreiten bitteren Mandeln zuvor mit Wasser und der nach der Pharmakopöe vorgeschriebenen Menge Weingeist bei 30 bis 40 Grad Réaumur einige Stunden hindurch digeriren und darauf die Masse in das in der Blase vorher kochend gemachte Wasser zu schütten, worauf dann die Destillation bei mäßigem Kohlenfeuer sofort langsam vorgenommen wird, habe ich stets ein sehr wirksames Bittermandelwasser von vorschriftsmäßigem Blausäuregehalt erhalten, welches, in ganz damit angefüllten Gläsern aufbewahrt, sich lange Zeit unverändert erhält ohne Flocken oder einen Bodensatz abzuscheiden, was immer der Fall war mit dem nach der Hannov. Pharm. bereiteten Bittermandelwasser.

Uebrigens bin ich der Meinung, daß die von Wöhler und Liebig ertheilte Vorschrift zur Bereitung des Bittermandelwassers aus Amygdalin und Mandel-Emulsion, vor allen übrigen Preparationsmethoden den Vorzug und daher die Beachtung der Aerzte im hohen Grade verdient, zumal da die Darstellung des Amygdalins gar keine Schwierigkeiten hat, wenn man nur hinreichend starken Alkohol zum Extrahiren der vorher vom fetten Oel befreiten bitteren Mandeln anwendet.

## II. Ueber Zinkoxyd.

Das Verfahren vom Hrn. C. Fredeskind in Riga zur Bereitung eines reinen Zinkoxyds, welches darin besteht, der sauren Auflösung des schwefelsauren Zinkoxyds, nachdem aus derselben mittelst Schwefelwasserstoff das Cadmium gefällt worden, chloridsaures Natrium zuzusetzen, und die Mischung unter öfterm Um-

rühren 24 Stunden stehen zu lassen, worauf durch vorsichtiges Zusetzen von kohlensaurem Natron das Eisenoxyd vollkommen gefällt wird, welches man dann durch Absetzen und Filtriren trennt, habe ich ebenfalls sehr zweckmäfsig gefunden.

Ich habe auf diese Weise aus der seit längerer Zeit gesammelten Flüssigkeit aus der Döbereinerschen Zündmaschine, welche etwa 12 bis 15 Pfund schwefelsaures Zinkoxyd enthalten mochte, 4 Pfd. des reinsten völlig eisenfreien Zinkoxyds erhalten.

Die Methode, durch Chlor das Eisen aus der schwefelsauren Zinkauflösung abzuscheiden, ist jedoch nicht neu, indem ich schon im Jahre 1818, während meiner Anwesenheit in Berlin, im Hause meines verewigten Freundes und Lehrers, des Obermedicinalassessors Schrader, auf Veranlassung desselben, Chlorgas zu diesem Zwecke anwandte, was indessen nicht so zweckmäfsig, wie chlorichtsaares Natron der sauren Flüssigkeit hinzugesetzt, sich bewährte.

### III. Prüfung auf Salpetersäure.

Vor Kurzem habe ich Gelegenheit gehabt, von der zweckmäfsigen Methode nach Angabe von Desbassins de Richemont, kleine Mengen von Salpetersäure und salpetersaurer Salze vermittelst Schwefelsäure und Eisenvitriolanflösung zu entdecken, welche vom Hrn. Hofrath Brandes und Hrn. Wessel wiederholt und bestätigt wurde, mich zu überzeugen. (S. diese Zeitschr. 2. R. Bd. V, 51.)

Es wurde mir nämlich von Seiten des Amts Ruthe im Auftrage Königl. Landdrostei Hildesheim ein Pulver, welches von einer Quacksalberin einer kranken Frau, die zwei Tage nach dem Gebrauche desselben starb, gereicht

schweflichtsauren Natron getaucht und mit dest. Was abgewaschen, worauf die Arbeit fertig ist.

Wir wissen, daß Chlorsilber, Jodsilber, viele Farbstoffe und andere organische Substanzen durch das Licht Veränderungen ihrer Farbe und Zerlegungen erleiden, durch das Daguerrotyp aber hat die Physik ein Reagenzglas für die Lichteinflüsse erhalten, das, nach Gay-Lussac, für die Intensität und die Erscheinungen des Lichts ist, was das Mikroskop für kleine Gegenstände ist, und zu neuen Versuchen und neuen Entdeckungen führt wird. Basreliefs, Statuen, Monumente, die Perspective von Straßsen, überhaupt alle todten Gegenstände, selbst der Zug, den das Auge nicht mehr erreicht, werden mit der äußersten Genauigkeit auf dem Bilde wiedergegeben.

Die Theorie über diese Zeichnungsmethode, wo die Sonne an der Staffelei sitzt, ist noch wenig erforscht. Wir wollen die Hauptmomente darüber kurz vorlegen und über das Weitere auf den Aufsatz von Arago in den *Annales de Chimie et de Physique* und verschiedene Uebersetzungen davon, sowie auf den von Cap in *Journ. de Phys.* XXV, 725. und auf den Aufsatz in *Buchner's Repert.* LXVII, 332, wo auch die historischen Momente angegeben sind, verweisen.

Bei dem Verfahren wird die Platte mit der mit kleinen Nägeln daran befestigten Languette und das Schälchen mit dem Jod mit einem Metallnetze versehen, das mit der Joddampf gleichförmig über die Platte sich verbreitet. Die gelbe Decke, welche dadurch gebildet wird, ist so dünn, daß sie, nach Dumas, nicht über ein Milliontheil eines Millimeters beträgt, sie muß gleichförmig über die Tafel verbreitet sein. Die Languette, welche die Platte umgiebt, verhindert, daß sich nicht mehr Jod am Rande, als in der Mitte absetzt; die physikalische Wirkung derselben läßt sich aber noch nicht genügend erklären. Eben so wenig der andere Umstand, daß zur Erreichung des Maximums die Platte unter einem Winkel von  $45^\circ$  geneigt sein muß, während sie den Quecksilberdämpfen ausgesetzt wird.

Was die Erklärung der chemischen Erscheinungen betrifft, so scheint nach dem ersten Anblick, daß das Licht in der *Camera obscura* die Verdampfung des Jods überall da bewirkt, wo es die gelbe Platte trifft und so das Metall bloßlegt; in dem zweiten Theile der Operation wirkt der Quecksilberdampf auf diese entblößten Stellen und erzeugt ein weißes und mattes Amalgam.



von Silber und Quecksilber. Das Abwaschen mit unterschweflichtsaurem Natron hat den Zweck, von allen den Theilen das Jod wegzunehmen, wo dieses nicht durch das Licht geschehen ist, und diejenigen Stellen bloßzulegen, die dunkel werden müssen. Nach dieser Theorie lassen sich aber die unzähligen und so wunderbar abgestuften Halbtinten der Daguerreschen Bilder nicht erklären. Auch beweist folgende einzige Thatsache, daß das Verhalten nicht so einfach ist. Das Gewicht der Kupferplatte wird durch die Bildung der gelben Joddecke nicht merklich vermehrt; dagegen durch die Einwirkung des Quecksilberdampfes sehr merklich. Nun hat Pelouze gefunden, daß die Platte, nach dem Abwaschen in dem unterschweflichtsauren Salze, *weniger wiegt als vor dem Beginn der Operation*. Das unterschweflichtsaure Salz nimmt also Silber weg, und die Untersuchung der Flüssigkeit zeigt, daß es sich so verhält.

Donné hat gefunden, daß die Joddecke dem Silber so fest anhängt, daß sie sich mit dem Finger nicht von der Platte abreiben läßt, ehe sie dem Lichte ausgesetzt wurde; nach der Einwirkung des Lichts die Adhäsion aber so geschwächt ist, daß die leichteste Reibung hinreicht, sie von dem Metall zu entfernen. Donné schließt hieraus, daß auf den erhellten Theilen des Bildes die Decke des Jodsilbers, da sie mit der Platte nicht mehr adhärirt, das Silber auch nicht vor der Einwirkung des Quecksilbers schützt; auch sieht man deutlich nach der Operation das Quecksilber durch das Mikroskop zu kleinen Tröpfchen condensirt auf allen den vom Licht getroffenen Stellen, während auf den Schattenparthien die Joddecke festhaftet und die Fixirung des Quecksilberdampfes hier verhindert. Es würden nach dieser Ansicht also hervorgebracht die hellen Stellen des Bildes durch das darauf in Kügelchen verdichtete und wahrscheinlich mit dem Silber amalgamirte Quecksilber, und die dunklen Stellen bloß durch die Bräunung des Silbers allein, durch die bloßgelegte Metallfläche, ohne einen Niederschlag einer andern Substanz auf derselben. Wenn daher nach der Operation die Spuren des zurückgelassenen Jodürs mit der Lösung des unterschweflichtsauren Natrons weggenommen sind, so werden die dunklen Parthien bloßgelegt und reflectiren das Licht wie polirte oder brunirte Körper und Spiegel, während die hellen Punkte mit einer graulich-weißen, leicht abreibbaren Decke überzogen sind, worin man durch das

Mikroskop eine Menge von Quecksilberkugeln deckt.

Wir übergehen mehre andere über diese wie Entdeckung aufgestellte Theorien; es bedarf noch Versuche, um diese mysteriösen Erscheinungen zu hellen.

Schließlich verweisen wir noch auf die Anleitung Papier zu Lichtbildern mittelst Chlorsilber zu ber die Hr. Schlesinger in Inspruck in *Buchner's R LXVII*, 343 bekannt gemacht hat.

## Aetherbildung.

Wenn Alkohol mit Zinkchlorid einer Destillation unterworfen wird, so erzeugen sich Massen Aether süßes Weinöl, wie bei der Destillation von Alkohol Schwefelsäure. Bei 170 ° C. destillirt gewöhnlich Aether, mit etwas Chlorwasserstoffsäure und viel Alkohol gemengt, mit dem Steigen der Temp. vermindert sich die Menge des Wassers, welches den Aether begleitet, bei stärkerm Erhitzen erscheint süßes Weinöl, welches sich bis zu 220 ° C. fortbildet. Die Masse des Rückstands bleibt als Hydrat zurück, gemischt mit Zinkchlorid. Marchand hat dieses bestätigt gefunden, und zugleich, daß das Zinnchlorür dieselbe Eigenschaft besitzt. Es ist aber schwieriger, mit dem Zinnchlorür Aether darzustellen, weil die Masse außerordentlich leicht übersteigt. In beiden Fällen wird Aether erzeugt, und Chlorwasserstoffäther, welcher letztere bekanntlich durch die Einwirkung mehrer anderer Chlormetalle, wie des Eisenchlorid, Zinnchlorid u. a. m., entsteht.

Marchand hat ferner gefunden, daß auch durch die Einwirkung von Fluorkiesel auf Alkohol Aether entsteht. Seit Desfosses entdeckte, daß durch Einwirkung von Fluorkiesel auf Alkohol Aether sich bildet, haben auch mehre Chemiker auch die Einwirkung des Fluorkiesels auf den Alkohol untersucht, jedoch bemerkten Berzelius, Liebig und Wöhler hierbei keine Aetherbildung, dies liegt aber nach Marchand nur darin, daß die Einwirkung des Gases nicht lange genug dauerte. M. ließ 16 Stunden lang Fluorkieselgas durch Alkohol gehen, als die Flüssigkeit mit unzersetztem Gase gesättigt war, rauchte sie stark und hatte sich durch Abscheidung von Kieselsäure verdickt. Jetzt der Destillation unterworfen, gab sie durch Wasser abscheidbaren Aether.

Wir haben also zwei Körperklassen, welche das Vermögen der Aetherbildung besitzen. Zur ersten gehört die Schwefels., die Phosphors., die Arseniks.; die Fähigkeit dieser Körper, den Alkohol in Aether zu verwandeln, beruht auf der Eigenschaft, eine zusammengesetzte Aethersäure zu bilden. Zur zweiten Klasse gehört das Fluorbor, das Fluorkiesel, das Zinkchlorid und das Zinnchlorür; die Einwirkung dieser Körper beschränkt sich auf eine Wasserzersetzung. (*Journ. f. pract. Chemie* XIII, 499).

---

## Constitution der knallsauren Salze.

---

Nach der von Liebig entwickelten Ansicht über die Constitution der Salze<sup>\*)</sup>, nach welcher sie Verbindungen sind von Metallen mit gewissen Radikalen, welche durch Hinzutreten des Sauerstoffs der Basis zu den Bestandtheilen der als wasserfrei betrachteten Säuren, in dem Augenblick entstehen, wo die Basis sich mit der Säure verbindet, folgt von selbst, daß, wenn die Säure nicht mit einem Metalloxyde, sondern mit einem Aequivalent Wasser zu einem Hydrate vereinigt ist, dieses Wasser nicht als solches darin angenommen werden kann, daß der Sauerstoff desselben, als mit den Elementen der Säure zu dem nämlichen Radikal verbunden, sein Wasserstoff also außerhalb dieses Radikals, mithin ersetzbar durch Aequivalente von Metall gedacht werden muß. Wenn die Metalloxyde durch wasserfreie Säuren zerlegt werden, so setzt diese Zerlegung voraus, daß die Verwandtschaft der Elemente der wasserfreien Säure zu dem Sauerstoff der Basis, welche zusammen das Radikal bilden, größer sein muß als die Verwandtschaft des Metalls zu dem nämlichen Sauerstoff, mit dem es Oxyd gebildet hatte; es folgt daraus, daß gewisse Säuren mit gewissen basischen Metalloxyden, die ihren Sauerstoff schwach gebunden enthalten, Salze bilden werden, in denen die Verwandtschaft des Radikals zu dem Metall, oder was das Nämliche ist, die der Basis zu der Säure, größer ist, als bei Verbindungen der nämlichen Säuren mit andern Metalloxyden, in denen die Anziehung des Metalls zu dem Sauerstoff, mit dem es Oxyd bildete, stärker ist. Hieraus folgt demnach, daß in den Verbindungen

<sup>\*)</sup> Vergl. diese Zeitschr. 2. R. Bd. XVII, 87.

dieser Klasse von Säuren mit leicht reducirbaren Oxyden, deren gegenseitige Verwandtschaft stärker sein muß, als wenn sie mit schwer reducirbaren Oxyden, wie mit Kali und Natrium verbunden werden. Es erklärt sich daraus, warum gewisse Säuren keine Art von Verbindungen mit gewissen schwer reducirbaren, wenn auch starken Basen, eingehen vermögen, eben weil die Verwandtschaft des Metalls zu dem damit verbundenen Sauerstoff überwiegt, und das Oxyd nicht reducirt werden kann.

Die interessantesten Beispiele dieser Klasse von Salzen liefern die Verbindungen der Knallsäure mit den Metalloxyden. Liebig bemerkt darüber Folgendes: Die festeste unter diesen Verbindungen ist das knallsaure Silberoxyd, in diesem Salze kann das Silberoxyd nur zum Theil vertreten werden durch ein schwer reducirbares Metalloxyd, durch Kali, Baryt; knallsaures Kali, knalls. Baryt existiren im reinen Zustande nicht, selbst lösliche Chlormetalle zeigen in den Doppelverbindungen der Knallsäure, welche Silber enthalten, das Silber nicht an. Knallsaures Zinkoxyd kann dargestellt werden, es zerlegt sich aber bei der schwächsten Temperaturerhöhung, schon beim Abdampfen in gewöhnlicher Temperatur. Die herrschenden Ansichten geben kein Licht über ein so ungewöhnliches Verhalten, wir haben aber Verbindungen genug, die ihnen ähnlich sind. Namentlich gehören hierher alle Salze, welche das Platinoxyd bildet, sie können durch die Alkalien nicht zersetzt werden; es schlägt sich nur die Hälfte des Platinoxydes nieder, und es entstehen Doppelsalze, die durch überschüssige Alkalien keine Veränderung erleiden. (*Annal. der Pharm.* XXVII, 133).

## Knallsäure.

Die Knallsäure, welche bekanntlich noch nicht isolirt in reinem Zustande dargestellt worden war, soll nach E. Davy nach folgender Methode, in Verbindung mit Wasser, wenn auch nur für kurze Zeit beständig, erhalten werden. Knallsaures Zinkhydrat wird durch Barythydrat zersetzt, und der erhaltene knalls. Baryt durch verdünnte Schwefelsäure zerlegt. Nach Versuchen von H. Fehling fällt aber Baryt aus dem knallsauren Zink nur einen Theil des Zinkoxyds; in der Auflösung bleibt ein Doppelsalz von Zink und Baryt mit Knallsäure, woraus



Schwefelsäure den Baryt abscheidet, und die Auflösung hierauf nur saures knalls. Zinkoxyd ist, aber keine reine Koallsäure. (*Annal. der Pharm. XXVI, 131.*)

## Ueber das Pectin und die Pectinsäure.

In *LXVII. Bde. S. 63.* dieses Archivs haben wir eine Reihe von Versuchen von Regnault über die Gallert- oder Pectinsäure mitgetheilt. Eine frühere Arbeit von G. J. Mulder, die uns jetzt bekannt geworden ist, bietet ein mehrfaches Interesse dar, so daß wir deren Darlegung nicht übergehen dürfen. Das Pectin findet sich nach Braconnot bekanntlich in den meisten Früchten und Rinden von Bäumen, und die Pectinsäure in mehren Wurzeln, Stengeln und Blättern krautartiger Gewächse. Durch Kochen mit Alkalien soll sich das Pectin in Pectinsäure verwandeln. Indessen ergiebt die Untersuchung Mulder's, daß Pectin und Pectinsäure nur dadurch sich unterscheiden, daß beides Verbindungen von Pectinsäure mit einer alkalischen Basis, aber in verschiedenen Mengen sind. Was man bisher als Pectin und Pectinsäure unterschieden hat, sind demnach pectinsaure Salze auf verschiedenen Stufen der Sättigung. Pectinsäure aus Aepfeln, Rüben und Möhren hat dieselbe Zusammensetzung, sie erscheint aber als saurer und zwar als dreifach, vierfach oder fünffach pectins. Kalk, und kann nicht als reine Pectinsäure betrachtet werden.

Behufs der Darstellung der Säure wurden die vegetab. Substanzen zerkleinert, mit Wasser gewaschen, bis dieses farblos abließ, dann der Brei ausgepresst, der Rückstand mit Wasser gekocht, unter Zusatz der zur Sättigung der Säure erforderlichen Menge Kali, und die nun abfiltrirte Auskochung durch Salzsäure gefällt.

War die Säure gefärbt, wie die aus den Möhren bereitete durch das Carotin, oder die aus den Aepfeln besonders den süßen, durch Gerbstoff, so wurde sie mit Alkohol behandelt; die aus den Rüben dargestellte Pectinsäure ist völlig farblos.

Aus den ausgepressten und filtrirten Säften wurde das Pectin durch Fällen mit Alkohol dargestellt und der Niederschlag mit siedendem Alkohol behandelt, um den Zucker, die Aepfelsäure und den Gerbstoff der Aepfel oder das Carotin der Möhren zu entfernen.

Das auf diese Weise aus süßen Aepfeln dargestellte Pectin gab beim Verbrennen eine Asche, die fast reinem Kalk mit etwas Eisenoxyd und Kieselerde stand, und 5,91 Proc. betrug und vom Pectin aus sauren Aepfeln 9,33 Proc. Die Elementaranalysen dieses Pectins, nach Abzug des Kalkgehaltes, der darin als Bleisalz enthalten, ergab für Pectin:

|                | aus süßen<br>Aepfeln | aus sauren<br>Aepfeln | aus der Blei-<br>verbindung |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Kohlenstoff... | 45,198               | 45,853                | 45,608                      |
| Wasserstoff... | 5,352                | 5,479                 | 5,376                       |
| Sauerstoff.... | 49,450               | 48,668                | 49,922                      |
|                | 100                  | 100                   | 100.                        |

Die Pectinsäure aus Möhren gab 4,17 Proc. Kalk als Aschenrückstand. Die Zusammensetzung dieser Säure ergab sich zu:

|                       |          |       | Versuch |
|-----------------------|----------|-------|---------|
| 12 At. Kohlenstoff... | 917,244  | 45,47 | 45,473  |
| 16 „ Wasserstoff...   | 99,837   | 4,95  | 5,270   |
| 10 „ Sauerstoff....   | 1000,000 | 49,58 | 49,257  |
|                       | 2017,081 | 100   | 100.    |

Das Pectin und die Pectinsäure sind also offenbar keine verschiedene Körper; das Pectin ist pectinsaure Kalk und die Pectinsäure, wie sie gewöhnlich dargestellt wird, saurer pectinsaure Kalk. Es gelingt, alle Kalk mittelst einer Säure aus derselben abzuscheiden.

Eine Auflösung von neutralem pectinsaurem Kalk, die Säure aus Möhren bereitet, wurde mit neutralem essigsauren Bleioxyd zersetzt. Nach der Analyse des so erhaltenen pectins. Bleioxydes verbinden sich 100 Pectins. mit 7,11 Bleioxyd = 5,099 Sauerstoff =  $\frac{1}{10}$  des Sauerstoffs der Säure. Das Atomgewicht der letzteren ist hiernach 1960. Das pectins. Kupferoxyd, ebenfalls mittelst der Säure aus Möhren dargestellt, gab analysirt für das Atomgewicht der Säure 2277. Die Elementaranalysen dieser Salze zeigten für die Zusammensetzung der darin enthaltenen Säure dieselbe Zusammensetzung als die bereits angeführte. Da die sogenannte reine Pectinsäure saurer pectins. Kalk ist, so muß dieselbe durch ihre Neutralisation mit Kali kein bloßes Kalisalz, sondern ein Doppelsalz mit Kalk und Kali zur Basis liefern.

Die Pectinsäure, wie sie aus den süßen Aepfeln dargestellt wird, hält ebenfalls Kalk zurück, und ist dreifach pectins. Kalk; die Säure selbst, so wie das pectins.

Kupferoxyd, geben bei der Analyse Resultate, die mit dem oben angegebenen übereinstimmen. Ebenso verhält sich die Pectinsäure aus Rüben, welche übrigens die reinste Säure geben.

Es läßt sich sonach schliessen, daß das Pectin und die Pectinsäure nur durch die damit verbundenen unorganischen Körper sich unterscheiden; daß die Pectinsäure der Aepfel, Rüben und Möhren dieselbe Zusammensetzung hat, aber als dreifach, vierfach oder fünffach pectins. Kalk und nicht als reine Pectinsäure zu betrachten ist. Die Pectinsäure besteht aus  $C_{12} H_{16} O_{10}$ ; sie enthält 4 At. H weniger als der Zucker, der  $C_{12} H_{20} O_{10}$ , und 2 At. O weniger als die Faser, deren Zusammensetzung  $C_{12} H_{16} O_9$  ist. Es ist wahrscheinlich, daß in der Oekonomie der Pflanzen die Pectinsäure verwendet wird, um die Faser in Zucker umzuwandeln. Die allgemeine Verbreitung des Pectins in den zuckerhaltigen Pflanzen spricht dafür. (*Erdmann's Journal XIV. 277.*)

## Neues Vorkommen des Vanadins.

Das Vanadin ist bis jetzt nur in Mexiko, Schottland und im östlichen Rußland als vanadinsaures Bleioxyd gefunden worden. Das seltene Vorkommen dieses Metalls ist kürzlich durch einen neuen Fundort bereichert. H. Hefs in Petersburg erhielt nämlich durch den Leibmedicus Dr. Rauch aus den Kupfergruben des Kammerherrn von Solomirsky, zwischen Miask und Katharinenburg, ein Mineral, welches, statt arsenik- oder phosphorsauren Kupferoxydes, vanadinsaures Kupferoxyd war. Es bildet kleine büschel- und kugelförmig vereinigte Krystalle, ist gelbgrün oder gelb, von 3,5 spec. Gew. Es ist in Wasser unauflöslich; löst man etwas in Salpetersäure auf, so setzt sich nach einiger Zeit ein ziegelrother Niederschlag ab, der sich wie Vanadinsäure verhält; in Wasser ist dieser Niederschlag etwas löslich; er ertheilt demselben eine schöne hellgelbe Farbe; mit Schwefelwasserstoff-Ammoniak bildet sich die dem Schwefelvanadin eigenthümliche bräunliche Färbung. In Borax und Phosphorsalz löst sich das Mineral vor dem Löthrohr mit grüner Farbe auf. Ist die Perle nicht zu sehr mit dem Stoff gesättigt, so läßt sich mit Phosphorsalz auf Platindraht die der Vanadinsäure eigenthüm-



liche Reaction deutlich erkennen, daß man nämlich Willkür, je nachdem man die Oxydations- oder Reductionsflamme gebraucht, die Perle gelb oder grün sen kann. Ist zu viel von der Probe zugesetzt, so die Perle im Oxydationsfeuer einen Stich ins Stahlgrün im Reductionsfeuer ist sie braun, so lange sie heiß und wird erst beim Erkalten schön chromgrün. hat dieses Mineral mit dem Namen *Volborthit* bezeichnet. (Erdmann's Journ. XIV, 52.)

## Reduction der Quecksilberchloride durch organische Substanzen.

Die Beobachtung von West, Lehrer der Chemie an der med. Schule zu Leeds, daß durch Erhitzen Quecksilberchlorür (Calomel) mit organischen Substanzen Quecksilber sublimirt werde, veranlaßte Johnsons, über dieses Verhalten einige Versuche anzustellen. Quecksilberchlorür und Quecksilberchlorid gehen durch Erhitzen mit organischen Substanzen, wie Zucker u. s. w., in einem Probierröhrchen über einer Weingeistlampe metallisches Quecksilber aus, unter Entwicklung von Chlorwasserstoffsäure. Dieses ist aber nicht der Fall durch Erhitzen der beiden Chlorverbindungen auf reiner Kohle, wohl aber, wenn die Kohle mit etwas Citronöl oder auch mit bloßem Wasser befeuchtet ist. Es scheint daher, daß nur der Wasserstoff, sei er aus Wasser oder aus einer andern Wasserstoffverbindung abgeschieden, diese Reduction bewirkt, und nur im *Stadium nascenti*; denn als ein Strom Wasserstoffgas über reines oder mit Kohle vermisches und erhitztes Quecksilberchlorür geleitet wurde, fand keine Zersetzung des letztern Statt. (*The Lond. and Edinb. Philos. Magaz.* 3. Ser. XIII, 431.)

## Zersetzungen von Sublimat.

Das *Pulvis alterans Plumeri*, ein Gemenge aus gleichen Theilen Goldschwefel und Calomel, verliert bekanntlich nach und nach seine Pomeranzenfarbe und wird endlich schwarz, wobei es in Chlorantimon und Schwefelquecksilber sich verwandelt, wie bereits Vogel gezeigt.



hat Weniger bekannt ist das Verhalten des Sublimats (Quecksilberchlorid) zum Goldschwefel. Pagenstecher in Bern hat über diesen Gegenstand Versuche angestellt. Diese ergeben, daß bei der Berührung beider Körper, mit oder ohne Wasser, eine gegenseitige Aufeinanderwirkung ihrer Bestandtheile Statt findet, wobei der Sublimat durch Abtretung einer Hälfte seines Chlors an das Antimon des Goldschwefels in Calomel sich umwandelt, während der Goldschwefel gleichzeitig in  $1\frac{1}{2}$  Chlorantimon und Schwefel zerfällt. Wenn nun, wie beim Uebergießen des Goldschwefels mit einer Sublimatauflösung, hinlänglich Wasser vorhanden ist, so wird das entstandene Chlorantimon in Algarotpulver und Salzsäure zerlegt, und die Producte der Wechselwirkung beider Körper sind daher: Salzsäure, Antimonoxyd, Schwefel und Calomel.

**Sublimat- und Pflanzenstoffe.** Auch über das Verhalten des Sublimats zu mehreren Pflanzenstoffen hat Pagenstecher neue Versuche angestellt, die sehr die Beachtung der Aerzte verdienen. Es ergiebt sich daraus, daß je nach der Natur der Pflanzen und deren Producte das Verhalten derselben zum Sublimat sehr verschiedenartig sein kann, so daß sie entweder keine, oder eine geringe, eine allmälige oder eine schnelle Zersetzung bewirken.

Zucker, Gummi, Quittenschleim, Brodkrume und Seifenwurzel bringen keine Zersetzung hervor; Althäurzel, Bitternüss, Süßholzwurzel, Lakritzensaft, Columbo, Eichenrinde, Sarsaparille, Quassia, Graswurzel, Gentiana, Guajakharz und holländischer Syrup eine geringe und allmälige, wogegen Opium und Chinarinde aber eine plötzliche Zersetzung bewirken.

Die Veränderungen, welche hierbei der Sublimat erleidet, bestehen entweder in einer Umwandlung in Calomel, oder in einer neuen Quecksilberoxyd-Verbindung, welches letzte besonders bei Opium und China der Fall ist.

Holländischer Syrup, Graswurzel, Gentiana, Süßholzwurzel und Lakritzensaft bewirken besonders leicht die Umwandlung des Sublimats in Calomel, eben so das Guajakharz, welches indessen unter Umständen mit Sublimat gereinigt werden kann, unter denen keine Calomelbildung Statt findet, nämlich wenn beide Körper in einer alkoholischen Auflösung sich befinden.

Reiner Zucker, Quittenschleim, arabisches Gummi, Brodkrume, Quassienholz und Seifenwurzel, die keine oder nur eine geringe und langsam erfolgende Wirkung auf

den Sublimat ausüben, würden daher vorzugsweise geeignet sein, bei der ärztlichen Anwendung des Sublimats als Vehikel zu dienen.

Bemerkenswerth ist noch, daßs mit Zucker, Gummi oder Quittenschleim versetzte Sublimatauflösungen durch Kalkwasser nicht gefällt werden, sondern nur einen Stich ins Gelbe erhalten und dabei lange klar bleiben, dann aber einen grauen Niederschlag von regulinischer Quecksilber ausscheiden; eine Thatsache, die noch für gerichtliche Untersuchungen wichtig ist, als sich daraus ergibt, daßs, wenn in einem Vergiftungsfalle das vorhandene *Corpus delicti*, nach Versetzung in den gehörigen Reactionszustand, durch Kalkwasser nicht gefällt oder nicht merklich getrübt wird, man noch nicht auf Abwesenheit von Sublimat schließen kann. (*Buchner Repert. LXII, 25. u. 77.*)

## Darstellung von Eisenoxydul.

Eine zufällige Beobachtung über das Verhalten des metallischen Eisens zu in Wasser suspendirtem Eisenoxyd veranlaßte J. Preuß zu folgender Vorschrift zur Darstellung von Eisenoxydul (*Annal. der Pharm. XXVI, 96*). 5 Eisenoxyd und 4 gepulvertes Eisen werden mit der 2 — 3fachen Menge Wasser digerirt, mitunter bis zum Sieden erhitzt. Unter Entwicklung einer ekelhaft metallisch riechenden Gasart entsteht bald eine schwarze Färbung der Masse, und wenn die Gasentwicklung aufhört und die Flüssigkeit schnell und klar vom schwarzen Niederschlage sich absondert, schlemmt man das entstandene Eisenoxydul von dem überschüssigen metallischen Eisen ab, sammelt es auf einem Filter und trocknet es schnell in erhitzter Luft. Das so dargestellte Eisenoxydul ist ein intensiv schwarzes lockeres Pulver; es löst sich in Säuren ohne Gasentwicklung, wird aus der Auflösung durch Alkalien schwarz gefällt und dürfte dem durch Glühen von Eisenoxyd mit kohlenhaltigen Körpern gewonnenen vorzuziehen sein.

## Wirkung des Eisenoxydhydrats auf das Kupferoxydhydrat.

Die Eisenoxydsalze werden bekanntlich durch Kupferchlorür zu Eisenoxydulsalzen reducirt, während das schwefelsaure Eisenoxydul keine Wirkung auf die Kupfersalze ausübt. Es scheint daher, als müßte man dem Kupferoxydul eine größere Anziehung zum Sauerstoff beilegen als dem Eisenoxydul. Indefs ist diese Folgerung nicht richtig, wie sich aus nachfolgenden Versuchen von Levöl ergibt\*). Die Auflösungen von schwefelsaurem Kupferoxyd und schwefelsaurem Eisenoxydul reagiren zwar nicht auf einander, fällt man sie aber durch ein Alkali, so besteht der Niederschlag nicht aus Eisenoxydul und Kupferoxyd, sondern aus Kupferoxydul und Eisenoxyd, so daß also das Eisenoxydul durch das Kupferoxyd auf eine höhere Oxydationsstufe gebracht wurde.

Die Verwandtschaft der beiden Oxyde zur Schwefelsäure, die Unmöglichkeit der Bildung eines schwefelsauren Kupferoxyduls und selbst die Existenz des Kupferoxyduls in Gegenwart der Schwefelsäure sind ohne Zweifel die Ursachen, welche der Reaction der Oxyde in den beiden Salzen sich widersetzen.

Die obige Reaction ergiebt sich sehr deutlich, wenn man in eine Auflösung gleicher Atome beider Salze Ammoniak gießt, und fest verschließt; der Niederschlag besteht aus Eisenoxyd und enthält kaum eine Spur Kupfer; die farblose Flüssigkeit ist eine Auflösung von Kupferoxydul in Ammoniak, an der Luft färbt sie sich sogleich blau.

Für die Anwendung des Ammoniaks als Reagens ergiebt sich aus dem Vorstehenden, daß die Gegenwart von Kupfer dabei ganz übersehen werden kann, wenn die Flüssigkeit ein Eisenoxydulsalz enthält. Man muß, um das Kupfer in solchem Falle zu erkennen, das Eisen zuvor auf eine höhere Oxydationsstufe bringen, wie es bei der quantitativen Analyse geschieht, sowohl um es als Oxyd zu bestimmen, als weil das Ammoniak das Eisenoxydul auflöst.

Das Nickel, welches nur ein basisches Oxyd hat, kann natürlich nicht dieselbe Reaction erzeugen und eben so wenig reducirt werden. Es folgt hieraus ein

\*) Annales de Chim. et de Phys. LXV.



neues Mittel, es als ammoniakalisches Doppelsalz von den analogen Kupfersalzen zu unterscheiden. Es ist dazu nur nöthig, ein Eisenoxydulsalz im Ueberschuss zuzusetzen, wodurch das Kupfersalz sogleich entfärbt wird, nicht aber das Nickelsalz, wenn man den Zutritt der Luft vermeidet.

## Verhalten des Eisenoxyds und der Thonerde gegen kohlen-saures Natron.

Die Verschiedenheit der Temperatur übt bekanntlich einen bedeutenden Einfluss auf die chemische Anziehung aus, so dass Substanzen, die in gewöhnlicher Temp., z. B. als Säuren, kaum Wirkung besitzen, bei höheren Temperaturen mit Basen sich verbinden und die stärksten aber flüchtigen Säuren davon abscheiden. Die Kieselerde kann z. B. in hoher Temp. selbst schwefels. Salze zerlegen, und schmelzendes kohlen-s. Kalium wird von Kupferoxyd zerlegt. Eine interessante Berechnung dieser Klasse von Verbindungen verdanken wir Grafen F. Schaffgotsch, über das Verhalten von Eisenoxyd und Thonerde gegen kohlen-s. Natron.

Es wurden bestimmte Mengen kohlen-saures Natron geglühet, nach dem Erkalten wieder gewogen, hierauf mit reinem frisch geglühetem Eisenoxyd gemengt, und dieses Gemenge wieder so lange geglühet, bis bei wiederholten Wägungen kein Gewichtsverlust durch entweichende Kohlensäure mehr entstand. Eben so wurde der Versuch mit kohlen-saurem Natron und Thonerde angestellt. Die Verbindungen, welche hierdurch entstanden, von *Eisenoxydnatron* wie von *Thonerdenatron* enthielten natürlich noch kohlen-s. Natron eingemengt, weil dieses im Ueberschuss angewendet wurde. Das Eisenoxydnatron wird durch heisses Wasser zersetzt, es wird ihm dadurch alles Natron entzogen. Das Thonerdenatron ist farblos, emailartig, von muschlichem Bruch, im frischen Zustande in kaltem Wasser leicht löslich, an der Luft zieht es Kohlensäure an, und wird dadurch zersetzt, indem es sich mit einer Efflorescenz von kohlen-s. Natron bedeckt. Die obigen Versuche ergeben in Bezug auf die Zusammensetzung dieser Verbindungen, dass das Eisenoxydnatron  $\text{Na O} + \text{Fe}_2 \text{O}_3$  (28,55 Natron + 71,45 Eisenoxyd) das Thonerdenatron  $\text{Na O} + \text{Al}_2 \text{O}_3$  (37,83 Natron + 62,17 Thonerde) ist.



Es verdient nicht übersehen zu werden, daß in den natürlich vorkommenden Verbindungen, in welchen Eisenoxyd und Thonerde den electro-negativen Bestandtheil ausmachen, dieselbe Sättigungscapacität sich zeigt; außer den durch ihre Isomorphie ausgezeichneten Ferraten und Aluminaten, dem Magneteisenstein, Franklinit, Ceylanit, Gahnit, Spinell, ist auch der Diaspor hier wohl zu beachten, welcher  $H_2O + Al_2O_3$  ist, also dieselbe Formel für die Verbindung der Thonerde mit Wasser, als die mit den anderen Basen.

Nach Versuchen von Mitscherlich wird auch das klossaure Doppelsalz von Eisenoxyd und Kali durch Glühhitze so zersetzt, daß die beiden Basen frei zurückbleiben, und zwar, wie aus der Zusammensetzung des Doppelsalzes erfolgt, in einem der obigen Natronverbindungen analogen Sättigungszustande. Auch hat H. Rose schon früher auf gleiche Weise die Verbindungsverhältnisse von Zinnoxid, Titansäure und Kieselsäure mit Natron bestimmt; das zinnsaure und titansaure Natron bestehen wie das Eisenoxyd- und Thonerdenatron aus gleichen Atomen ihrer Bestandtheile, während das Natronsilicat aber davon abweicht, indem es auf 3 Atome Natron 2 Atome Kieselsäure enthält. (*Poggend. Annal.* XLIII, 127).

## Scheidung des Eisenoxyds von Thonerde.

Nach N. Gräber läßt sich die Scheidung des Eisenoxyds von Thonerde vereinfachen, und doppeltes Sammeln und Auswaschen der Niederschläge, was immer mit einigem Verlust verbunden ist, vermeiden, wenn man den gemischten Niederschlag in Chlorwasserstoffsäure auflöst, die Auflösung in zwei Theile theilt, die eine Hälfte mit Ammoniak fällt, den Niederschlag, der nicht ausgewaschen zu werden braucht, sammelt, glühet und so das Gesamtgewicht des Gemenges von Eisenoxyd und Thonerde bestimmt, und darauf die andere Hälfte mit kautischem Kali übersättigt, so daß die anfänglich mitgefällte Thonerde wieder aufgelöst wird und dann das Eisenoxyd sammelt, glühet und dessen Gewicht ebenfalls bestimmt. Werden die Gewichte doppelt genommen, so erhält man nach Abzug des Gewichts des Eisenoxyds von dem des Gemenges auch das Gewicht der Thonerde.

## Neue basisch-schwefelsaure Thonerde.

Die Schwefelsäure giebt bekanntlich mit der Thonerde zwei basische Salze, ein *halbbasisches*,  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SO}_3$ , welches gummiähnlich und durch Digestion aus dem neutralen Salze mit dem folgenden erhalten wird, und ein *zweifachbasisches*,  $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SO}_3$ , welches pulverförmig und sich beim Kochen der Auflösung des vorigen sowie durch Zersetzung des neutralen mittelst Ammoniak bildet, und natürlich als *Aluminat* vorkommt. Bauhaus hat nun beobachtet, daß eine möglichst gesättigte Auflösung von Thonerdenhydrat in verdünnter Schwefelsäure, die mehrere Jahre in einem verschlossenen Glasgestanden, Krusten eines Salzes abgesetzt hatte, das nach einer Untersuchung von Rammelsberg eine basische Verbindung ist. Die Krusten bestehen aus einem Aggregat kleiner durchsichtiger prismatischer Krystalle. Das Salz ist in 144 Wasser mittler Temp. und in 30,8 siedendem Wasser löslich, wodurch es sich sowohl von dem neutralen als von den oben erwähnten beiden basischen Salzen unterscheidet, sowie auch von dem Salze, welches Phillips erwähnt\*), das sich ebenfalls in einer Auflösung von schwefels. Thonerde abgesetzt hatte, aber gallertartig und unauflöslich war, und ungefähr die Zusammensetzung des Aluminits hat.

Die Zusammensetzung des neuen basischen Salzes ist

|       |                 | Versuch |
|-------|-----------------|---------|
| 3 At. | Alaunerde.....  | 26,375  |
| 4 „   | Schwefelsäure.. | 27,439  |
| 30 „  | Wasser .....    | 46,186  |
|       | 100.            | 100.    |

Die zweckmässigste Formel für diese Verbindung würde sein  $(\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{SO}_3) + (2\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SO}_3) + 30\text{H}_2\text{O}$  (Poggend. Annal. XLIII, 583.)

## Chlorsaures Natron.

Nach Wittstein ist der von Hopfer de l'Orme angegebene Weg zur Darstellung des chlorsauren Natrons der beste, nämlich zweifach-weinsteins. Natron durch chlors. Kali zu zersetzen. Es werden zu dem

\*) Annals of Philos. IV, 280.

Ede 9½ Unze Weinsteinsäure und 9 Unzen Soda in 48 Unzen heissem Wasser aufgelöst, man setzt dann 8 Unzen chlors. Kali zu und läßt das Ganze 24 Stunden an einem kalten Orte stehen, sammelt den ausgeschiedenen Weinstein, der nach Auswaschen und Trocknen 11 Unzen beträgt. Die abfiltrirten Flüssigkeiten geben dann durch Verdunsten 7½ Unzen kryst. chlors. Natron. Dieses Salz ist nicht so leichtlöslich in Alkohol, als einige Angaben behaupten; 1 Theil kryst. Salz erfordert 34 Alkohol von 83 Proc. zur Auflösung bei 16° C. Heißer Alkohol nimmt mehr auf, der Ueberschuß scheidet sich beim Erkalten wieder aus. Eine Trennung des chlors. Natrons und Chlornatriums durch Alkohol, wie einige angeben, ist daher nicht thunlich; überhaupt möchte jede Bereitungsart von chlors. Natron, wobei Chlornatrium ins Spiel kömmt, zu umgehen sein.

Chlors. Kali und schwefels. Natron zersetzen sich nicht. 1 Th. chlors. Kali löst sich in 120 Th. Weingeist von 83 Proc. bei 16° C. auf. (*Buchner's Repert.* LXIII, 217).

## Scheidung von Baryt und Strontian.

Die von J. D. Smith angegebene Methode, Baryt und Strontian mittelst neutralem chromsauren Kali zu scheiden, indem der chroms. Baryt in Wasser unlöslich, der chromsaure Strontian aber in einer grossen Menge Wasser sich auflöst, hat Marchand geprüft, und sie auch bewährt gefunden, aber nur, wenn man eine grosse Menge Wasser anwendet, weil sonst mit dem chroms. Baryt immer etwas chroms. Strontian niederfällt. Als eine Auflösung von 1,243 Grm. kohlen. Baryt und 0,962 Grm. kohlen. Strontian in Salzsäure angewendet wurde, waren 3 Liter Wasser nöthig, um allen durch das chroms. Kali gebildeten chroms. Strontian in Auflösung zu halten. Die beste Trennungsmethode ist immer die von Berzelius angegebene mit Kieselfluorwasserstoffsäure. (*Journ. f. practische Chemie* XIII, 441.)

## Essigsaure Bleisalze und Bleioxyd.

Aus einer ausführlichen Untersuchung über essigs. Bleioxyd zieht Payen folgende Schlüsse:

Das neutrale essigs. Bleioxyd krystallisirt auf selbe Weise sowohl aus reinem Wasser, als aus Wasser, welches mit seinem gleichen Volum Alkohol oder Holzgeist verbunden ist. 100 Wasser von  $+12^{\circ}$  löst davon 59 auf.

Im trocknen luftleeren Raume verlieren die Krystalle ihre 3 At. Wasser und das wasserfreie Salz löst sich in der Wärme in abs. Alkohol auf, und krystallisirt beim Erkalten heraus, in sechsseitigen Prismen. Auch der abs. Alkohol entzieht dem neutralen essigs. Bleioxyde sein Krystallwasser. Das auf beide Weisen erhaltene Salz nimmt beim Auflösen in Wasser sein Krystallwasser wieder auf.

Wird das neutrale essigs. Blei in der Kälte mit einem geringen Ueberschuß von Ammoniak zersetzt, wird es in dreifach bas. essigs. Bleioxyd und in essigs. Ammoniak umgeändert.

Die Anwesenheit des essigs. Ammoniaks macht das dreifach bas. essigs. Bleioxyd beständiger. Der Ueberschuß von Ammoniak kann je nach seiner Menge das Gleichgewicht halten oder sie überwinden. Im ersten Fall kann die Auflösung dazu dienen, das Bleioxyd mit gewissen organischen Stoffen, die eine geringe Verwandtschaft besitzen, bis zur Sättigung zu verbinden. Im letzteren Falle scheidet sich das basische Salz von dem Bleioxydhydrat in Form von Octaedern oder kurzen vierseitig zugespitzten Pyramiden ab.

Das krystallisirte dreifachbasisch-essigs. Bleioxyd zeigt dieselbe Krystallisation, es mag durch Ammoniak durch Bleioxyd oder durch Concentration, Erkalten oder Fällung mittelst Alkohol oder Holzgeist erhalten worden sein, lange nadelförmige, sehr feine und kleine Prismen. 100 Th. kochendes Wasser lösen 18 d. dreifachbasischen Salzes auf; auch ist es in verdünntem Alkohol und verdünntem Holzgeist löslich.

Wenn man die Auflösung des neutralen essigs. Blei mit keinem zu grossen Ueberschuß von Ammoniak versetzt hat, so scheidet sich Bleioxyd ab, und dreifachbasisch-essigs. Bleioxyd bleibt gelöst, was man direct oder durch Alkohol abscheiden kann. Das wasserhaltige Bleioxyd hat die Zusammensetzung  $3 \text{ Pb O} + \text{H}_2 \text{ O}$ ; es bildet farblose durchscheinende octaedrische Krystalle, die ein bedeutendes Brechungsvermögen besitzen. Je nach den Mengen und der Temp. kann man wasserhaltige oder wasserfreie Krystalle bekommen. Das wasserfreie Bleioxyd zeigt sich in der Flüssigkeit in rhombischen



bischen durchscheinenden Platten von grünlicher oder orangegelber Farbe.

Aus der Verbindung von einem Atom dreifachbasisch-essigs. Bleioxyd mit drei Atomen neutralem essigs. Bleioxyd entsteht ein intermediäres essigs. Bleioxyd,  $3\text{PbO} + \text{H}_2\text{O} + 2\text{C}_8\text{H}_6\text{O}_3$ , welches sich von den beiden anderen und von dem neutralen wasserfreien Bleisalz besonders durch seine augenblickliche Umwandlung in eins der beiden anderen unterscheidet, je nachdem man eine Base oder eine Säure zusetzt. Es löst sich in Alkohol auf ohne sein Atom Wasser zu verlieren. Durch die Bildung dieses Salzes erklären sich viele Anomalien, die bei der Krystallisation des neutralen essigs. Bleioxyds beobachtet worden sind. (*Annales de Chim. et de Phys.* Sept. 1837. 37.)

---

#### Vierte Abtheilung.

---

### Nat u r g e s c h i c h t e.

---

Nachforschungen, ob Pflanzen, verschiedenen Graden der Verbreitung angehörig, sich auch durch besondere chemische Verhältnisse characterisiren;

von

E. Witting.

---

A. Welche chemische Substanzen scheinen durch besondere Localverhältnisse dem Vegetationsprocesse mitgetheilt zu werden?

Es kann wohl nicht in Abrede gestellt werden, daß der Boden, auf dem die Pflanzen gedeihen, eben so wie auch seine näheren Umgebungen einen sichtbaren Einfluß auf die Bestandtheile derselben ausüben. Verfolgt man die Verhältnisse dieser Art, so bieten sich dem Forscher interessante Erscheinungen dar, und ich

bemerke nur, daß seit längerer Zeit eine Reihe von Beobachtungen dieserhalb von mir verfolgt wurden. In dieser Uebersicht versuche ich, nachfolgende Körper hiermit in Einklang zu bringen:

1) Unter den *Haloiden*:

*Jod*- und *Chlor*-Verbindungen. Alle Arten des Fucogeschlechts characterisiren sich durch den Gehalt an Jodverbindungen, die sie durch den Lebensproceß aus dem Meerwasser entnehmen. Ihnen folgen in dieser Beziehung mehrere Zoophyten. — Es ward mir Gelegenheit, mehrere Gewächse am Strande der Nordsee, den *Fucus vesiculosus* L. begleitend, zu untersuchen, in denen kein Jod ermitteln konnte, obschon geringe Quantitäten der eingeäscherten Fucusarten, sowie es auch bei der verkohlten *Spongia marina* unserer Officinen der Fall ist, unter Mitwirkung der conc. Schwefelsäure und des Mangansuperoxyds in der Wärme, die eigenthümliche Reaction auf Amylum deutlich ausüben. Andere Pflanzen, welche sowohl dem Littoraie als den Salzquellen angehören, wohin z. B. *Salicornia*, *Salsola*, *Glaux* u. d. zählen sind, habe ich bei Salzquellen gesammelt, gleichfalls der Untersuchung auf Jod unterworfen, jedoch keine Spur darin entdecken können, obgleich sie am Meeresstrande wachsend Jodverbindungen enthalten. Ihr vorherrschender Bestandtheil ist aber Chlornatrium, welches um so interessanter bei *Salsola Kali* hervortritt, da bekanntlich auch in den sandigen Gegenden der Mark Brandenburg, entfernt von der Ostsee, diese Pflanze, isolirt dastehend, dennoch Chlornatrium enthält und der Beweis liefern dürfte, wie durch die Art auch gewisse Bestandtheile beibehalten werden können. — Daß man in Pflanzen, dem Torfmoore eigenthümlich, Jod entdeckt haben will, ist eben so bekannt, als später manche Irr-

thümer hierüber aufgedeckt wurden. Ich habe deshalb Versuche mit Arten von *Eriophorum* und *Sphagnum* angestellt, jedoch in der Asche derselben jenen Bestandtheil eben so wenig als im Torf unserer Gegend entdecken können. Vielleicht, daß Torfmooren in der Nähe des Meeres belegen, durch gewisse Ueberschwemmungen solche Haloide zugeführt wurden. — Jedenfalls können wir, als bemerkenswerthes Beispiel, die Gegenwart des Jods in einigen Pflanzen als abhängig vom Einflusse des Meerwassers herleiten, sowie das Chlornatrium sich auch auf solche der Salinen ausdehnt. — Wir hätten mithin zugleich diese beiden Bestandtheile in einer unbegrenzten Ausdehnung unsers Planeten zu verfolgen.

2) Unter den *Metallverbindungen*:

a) *Natrium-Oxydsalze* und *Haloide*. Ihre Gegenwart ist mit den vorigen in Verbindung zu setzen; und so findet sich *Chlornatrium* prävalirend in den Pflanzen am Meeresgestade wie auch an Salinen. Dahingegen finden wir *schwefelsaures Natron* als einen nähern Bestandtheil der Seestrandsgewächse, wie denn auch die Anfertigung der Soda, durch den Combustionsproceß, hauptsächlich von jener salinischen Verbindung abhängt.

b) *Kaliverbindungen*. Obgleich das Kali vorzugsweise vor anderen Metalloxydverbindungen in der Asche der meisten Vegetabilien als kohlensaures Kali aufgefunden wird, indem durch den pyrochemischen Proceß die Verbindungen desselben mit vegetabilischen Säuren, namentlich Oxal-, Weinstein-, Citronen- und Aepfelsäure ~~volchergestalt~~ modificirt werden: so ist dennoch nicht zu leugnen, daß auch hier öfters der Boden einen größern Kaligehalt der Pflanzen veranlaßt. Gewisse Arten von humushaltiger Erde, verwitterte Feldspathmassen scheinen nicht selten hierauf einen bedeutenden Einfluß

auszuüben; und so ist denn auch der Vegetationsproceß mancher Vegetabilien, z. B. *Fumaria*, *Absynthium*, mit in Combination zu setzen, die unmittelbar kohl. Kali absorbiren dürften.

c) *Talciumoxydverbindungen*. Dürften sich hauptsächlich nur auf die Pflanzen am Littorale erstrecken — Wenn auch die gewöhnliche Pottasche, aus der Asche solcher Pflanzen, die dem tiefer gelegenen Lande angehörig sind, Talkerdeverbindungen enthält, so findet man es zugleich mit anderen Salzen, z. B. schwefelsaurem Natron, schwefelsaurem Kalk u. s. w. Statt, welche gegen die Kalisalze bei solchen Gewächsen im Hintergrund stehen.

d) *Calciumoxydverbindungen*. Eine Reihe von Versuchen hat mich belehrt, daß Pflanzen als Bewohner des Gypslager in ihrer Asche eine bedeutende Menge Schwefelcalcium (bekanntlich erleidet der schwefelsaure Kalk durch Verbrennen unter Mitwirkung der Kohle die Veränderung) als andere davon entfernt stehende, enthalten. — In der Nähe von Höxter am Sollinge ist ein beträchtlicher Gypsbruch; selbst einige Flechten, die auf darauf ruhenden Sandsteinmergel bedecken, zeigten nach ihrer Einäscherung, mit Säuren behandelt, den Schwefelwasserstoffgeruch. Kalkverbindungen im untergeordneten Verhältnisse sind übrigens noch vielen anderen Vegetabilien eigenthümlich.

Sehr bemerkenswerth bleibt es jedoch, daß bei gewissen modificirten Pflanzenüberresten das Kali oft ganz schwindet und der Kalk prävalirend hervortritt, so in den älteren Steinkohlenflötzen. — In den Braunkohlen dem jüngsten aufgeschwemmten Lande angehörig, finden wir jedoch das vegetabilische Alkali gegen Kalk vorherrschen.



Können wir theilweise noch manche Zoophyten, als der Mitte beider organischer Reiche angehörig, hier anführen, so tritt bei ihnen vorzugsweise der kohlensaure Kalk hervor.

e) Andere Verbindungen von Erden erscheinen, so wie diess auch schon vom Kali gesagt worden, mehr unabhängig vom Einflusse des Bodens, hierher sind zunächst Kiesel- und Thonerde zu zählen, denn sie finden sich untergeordnet in der Asche des größten Theils unserer Gewächse. Doch erleidet dieses für die Kiesel-erde für die heißeren Climata eine Abänderung, sie scheint für eine gewisse Zone vorzugsweise in den Vegetationsproceß mit einzugehen.

B. Welchen Pflanzenfamilien scheinen besondere chemische Charaktere durch das Klima veranlaßt eigenthümlich zu sein?

Die Eintheilung der verschiedenen Zonen, ihrer Temperatur nach, ist bekannt. Die Aequitoriallinie begreift das heiße Klima in sich, während unter den Wendekreisen ein warmes, zwischen denselben und den Polarkreisen ein kaltes herrscht, auch zuletzt den Polarkreisen zu sich das Maximum der Kälte unter allen Breiten vordringt. — Wir wissen, daß die Temperatur einen bedeutenden Einfluß auf die Entwicklung der Pflanzenorgane selbst ausübt, und in dieser Beziehung mehrere Familien charakteristisch dastehen, während andererseits nicht in Abrede gestellt werden kann, daß unter einer und derselben Zone nicht selten Pflanzen von verschiedenen Character ihrer Form nach hervortreten, wobei ohne Zweifel der Boden und meteorische Einflüsse kräftig einwirken dürften. — Eigenthümlich zeigen sich unter dem Aequator vorzugsweise die Floren von Süd-

Amerika, vom südlichen Afrika und von verschiedenen Coralleneilanden der Südsee, wohin auch der nördliche Theil von Australien zu zählen ist; denn während die Palmenvegetation in ersteren Ländern am reichlichsten und mannichfaltigsten hervortritt, finden wir in dem dritten gedachten Welttheile die höchst charakteristische Flora der myrtenähnlichen Bäume, unter denen die Geschlechter von *Melaleuca* und *Metrosideros* an der Spitze stehen.

Kehren wir endlich zur Hauptfrage unserer Abhandlung: »Ob gewisse chemische Charactere als Begleiter der Pflanzenfamilien verschiedener Zonen auftreten, so dürften hier zunächst Substanzen, die den Pflanzenreiche selbst angehören, zu rechnen sein. Wir wollen versuchen, diese und die organischen der Reihe nach, die sie im phytochemischen Gebiete einnehmen, aufzuführen und zugleich die Familien namhaft zu machen, denen sie angehören.

#### 1) Substanzen des *Pflanzenreichs*:

a) *Gummiharze*. Wenngleich noch ein Dunkel über die Mutterpflanzen einiger officinellen Gummiharze herrscht, so scheint es doch einem geringeren Zweifel unterworfen zu sein, daß auch diese, wie *Ammoniacum* etc., den *Umbelliferen* zugerechnet werden müssen. Sie sind vom 30° bis 70° nördlicher Breite erstreckend, treten jene Pflanzen, welche wirklich Gummiharze liefern, hauptsächlich in der warmen Zone nur hervor und hier sind diese Producte characteristisch mit ätherischen Oelen verbunden.

b) *Gummi*. Wir wissen, daß die Familie der Leguminosen sich zwar von der wärmern bis zur gemäßigten Zone hin erstreckt, jedoch diejenigen Pflanzen namentlich von Ehrenberg als solche bestimmt, welche

das arabische Gummi liefern, nur der heisseren und wärmeren Zone angehören. So finden wir die *Acacia tortilis* Forskal et Seyal, *A. Arabica*, *A. nilotica* unmittelbar vom Innern Afrikas bis zum nördlichen Arabien hin verbreitet, und das Gummi sowohl von hier aus als vom Senegal in Handel gebracht.

c) *Salinische Gummiharze*. Vorzugsweise ist hier *Euphorbium* von der *Euphorbia officinarum* und anderen Species der Euphorbiaceen ausschliesslich der heissen Zone angehörig zu nennen.

d) *Tragantstoff*. Tragantschleim von *Astragalus* *rerus* Olivier, aus der Familie der Papilionaceen als Unterabtheilung der Leguminosen, gehört der warmen Zone an. Es werden sich dieser auch die übrigen Arten von *Astragalus*, welche Traganth liefern sollen, anschliessen. Der Schleim der Salep ist hier wohl nicht zu berücksichtigen, indem die verschiedenen Species der Orchis sich durch mehrere Zonen erstrecken.

e) *Balsame*. Der heissen Zone angehörig, namentlich, wenn Benzoessäure und Zimmtsäure darin vorherrschen. Die Familie der Cassiaceen, den Leguminosen angehörig, ist hier zuvörderst namhaft zu machen, *Myrrorhynchum peruiiferum* und *toluiferum*.

f) *Harze*. Man muss hier eine gewisse und scharfe Gränzlinie beobachten. — So gehört eine Abtheilung derselben der gemässigten und kältern, die andere der warmen Zone an. Die erstere Reihe beschränkt sich auf die Coniferen, das Harz und Balsamharz verschiedener Species von *Pinus*, denen sich das Mastix von *Pistacia lentiscus* (Familie Juliferae) und Sandarak von *Callitris articulata* (Familie der Cupressinae) im griechischen Archipelagus und nördlichen Afrika anschliesst. Die andere Abtheilung begreift eine grössere Reihe von

Familien. Hierhin zu zählen ist u. a. Copal, den Cistaceen angehörig, von *Hymenaea*, Takamahak aus der Familie der Guttiferae in Ostindien und Madagaskar, von einigen Species von *Calophyllum* herstammend, wie *Sanguis Draconis*, aus der Palmenfamilie.

g) Zucker. Vorherrschend in seiner Eigenschaft krystallisirbarer Rohzucker gehört er den tropischen Gegenden an, und hier den Gramineen, *Saccharum officinarum* L., dann noch einigen Palmenarten. — Andere Arten des Zuckers verbreiten sich bekanntlich durch mehrere Gegenden unsers Erdballs.

h) Das *Amylum*, was in einer Beziehung dem Zucker und Gummi nahe steht, theilt einigermaassen rücksichtlich seiner Verbreitung die Verhältnisse der letzteren Zuckerarten (des Trauben- und Schleimzuckers). Wir finden es in den heißen und gemäßigten Zonen, selbst in einer modificirten Gestalt in den kalten Zonen in den Lichenen. Obgleich es im untergeordneten Verhältnisse einen Bestandtheil vieler Pflanzen ausmacht, so ist es prävalirend für die warmen Zonen in der Familie der Gramineae, hier in *Zea Mays* L., in den Euphorbiaceen in *Mandioca utilissima* Pohl, in den Convolvulaceae in *Ipomoea Batatas* Roemer, in *Arum maculatum* u. A. verbreitet, — dahingegen finden wir es für die gemäßigte Zone vorzugsweise in den angebauten Cerealgewächsen und in der Familie der Solaneen, in *Solanum tuberosum*.

i) Oele. Erstens, ätherische. — Es dürfte schwierig sein, hier eine Gränzlinie zu ziehen, wenn nicht gewisse Bestandtheile derselben berücksichtigt würden. — Man kann annehmen, daß solche, die vorzugsweise eigenthümlich kampferähnlich sind oder Stearopten enthalten, wohin z. B. *Ol. Cinnamomi*, *Sassafras*, *Cajeputi*, *Nuc. moschatae*, *Caryophyllorum*, der Kampher selbst,



gehören, dem heißen Klima zuzuzählen sind, wie die *Laurinae* (*Persea Camphora*, *Sassafras*, *Cinnamomum Spr.*), ferner die *Myristiceae* (*M. Moschata Thunb.*) mit ihren Species, *Myrtaceae* (*Melaleuca*). — Andererseits giebt uns die Familie der Labiaten, namentlich das Genus *Mentha*, *Thymus*, *Melissa*, ein Beispiel, daß eine besondere Gattung der ätherischen Oele auch der gemäßigten Zone angehört, die sich durch gröfsere specifische Leichtigkeit auszeichnet.

Zweitens, *fette Oele*. Sie sind vorzugsweise der gemäßigten Zone in den Familien der *Papaveraceae*, *Urticeae* (*Cannabis*), *Euphorbiaceae* (*Ricinus*), *Oleinae*, *Laurinae*, *Amentaceae*, und bis zur kälteren hinauf, *Cruciferae*, eigenthümlich, insofern namentlich viele der technischen Anwendung wegen gebaut werden. — In der heißen Zone finden wir einige Palmefamilien damit versehen.

k) *Wachs*. Der heißen Zone, vorzugsweise einer Palmenart (*Ceroxylon Andicola Humb.*) in der gemäßigten, einigen Species von *Myrica* (*M. cerifera* und *pennsylvanica*) angehörig, findet es sich bis zur kälteren hinauf und zwar in den Pflanzen allgemein, jedoch nur spärlich vertheilt.

l) *Pflanzensäuren*. Von diesen dürften als eigenthümlich für gewisse Zonen erwähnt werden:

*Benzoessäure* und *Zimmtsäure*. Der heißen Zone vorzugsweise angehörig: so in der Familie der *Orchideae*, in der *Vanilla arom. Sw.*; im Balsam einiger Species von *Myroxylum*, im *Styraxharz* u. s. w. reichhaltig. — dagegen in der gemäßigten Zone nur spärlich bei einigen *Gramineae*, z. B. *Anthoxanthum*, *Holcus* oder *Papilionaceae* — wie *Melilotus*.

*Ozalsäure* — aus der Familie der *Oxalideae*, vorzugs-

weise der *Oxalis acetosella*, daher der *gemäßigster* angehörig, obgleich andere Arten von *Oxalis*, ohne prävalirenden Gehalt der Säure sich über Zonen hinaus erstrecken.

*Citronensäure.* Verschiedenen Species von der Familie *Aurantiaceae* angehörig, der warmen gemäßigten Zone eigenthümlich, findet sich nur letzteren mit anderen Säuren, wie Aepfel- und steinsäure, welche letztere sich über alle Zonen in verschiedenen Gewächsen verbreiten.

*Meconsäure.* Eigenthümlich dem *Papaver somniferum* L., Familie der *Papaveraceae*. Die Species erreicht das Maximum ihres Gehaltes an Meconsäure in der gemäßigten Zone.

*Chinasäure.* Characteristisch der Gattung *Cinchona* aus der Familie der *Rubiaceae* in der Tropenzone Amerikas.

*Strychnossäure* (Igasursäure) ist gleichfalls für die heisse Zone Asiens verschiedenen Species der Gattung *Strychnos*, aus der Familie *Strychnaceae*, eigenthümlich.

*Gallussäure.* So weit es die Untersuchung reicht, ist den warmen Zonen eigenthümlich, dahingegen der Gallussäurestoff in den Familien der *Ericaceae*, *Amentaceae*, *Rosaceae*, *Dryadeae* u. s. w. sich über alle Zonen erstreckt.

m) *Alkaloide.* Das Maximum der festen Alkaloide scheint den wärmeren Zonen eigenthümlich, wie in der Familie der *Rubiaceae*, und unter diesen sind die Gattungen *Cinchona*, *Coffea*, *Richardsonia*, *Cephaelis*, *Chotria*, alle dem wärmeren Amerika und Arabien angehörig, anzuführen. Analog ist es mit *Thea* aus der Familie der *Camelliaceae* im wärmeren Asien. Es gehören sich diesen meist krystallisirbaren Substanzen in denselben Gattungen noch Strychnin, Brucin, Morphin,

cotin u. a. m. an, die als wirkliche Pflanzenbasen bekannt sind. — Dahingegen sind gewisse Pflanzenstoffe, keine eigentlichen Alkaloide, der gemäßigten Zone eigen, dieser gehören auch die sogenannten flüchtigen Alkaloide, welche eine flüssige Form besitzen.

n) *Pigmente*. Sie gehören im Durchschnitt der gemäßigten Zone an und nur wenige Ausnahmen sind hier namhaft zu machen, nämlich das Pigment der *Indigofera tinctoria* (Familie der Papilionaceae) und die Färbehölzer des wärmeren Amerika, und zwar solche, die vorzugsweise ein technisches Interesse berühren. Letztere gehören gleichfalls den Leguminosen (den Crassiaceen) an. Ihre Genera sind *Caesalpinia* und *Haematoxylum*.

## 2) Substanzen des Mineralreichs:

Im Nachweise dieser herrscht noch eine bedeutende Lücke in unsern Kenntnissen und es sind nur wenig Substanzen namhaft zu machen, die durch den Einfluss einer geographischen Verbreitung gewissen Familien angehören. — Anzuführen dürften sein:

a) *Siliciumsäure*. Es reihen sich in Bezug hierauf mehre Versuche an, welche ich neuerdings zu ihrer Ermittlung unternahm. Damit beschäftigt, das specifische Gewicht der meisten bekannten Holzarten aller Zonen zu erforschen, hatte ich mein Augenmerk besonders auf diejenigen gerichtet, welche schwerer als Wasser sind und wohin namentlich das Eben- und Guajakholz zu zählen sind. Ersteres von *Diospyros Ebenum* — den Ebenaceae — auf Zeylon und Madagaskar, und letzteres von *Guajacum officinale* L., der Familie Zygophylleae, auf den Antillen heimisch, angehörig, zeigten in ihrer Asche einen bedeutenden Gehalt von Kieselerde, dem

sich auch das *Metrosideros*, aus der Familie der *Myrtaceae*, von Neuhollland anschliesst.

Ob nun gerade das hohe spec. Gew. dieser Holzarten von der Gegenwart der Kieselerde abhängt, dürfte einer besonderen Frage unterworfen sein, indem auch mehrere Species von *Equisetum* sich allerdings als sehr kieselerdehaltig erweisen in ihrer Asche; doch habe ich zufolge einer grossen Reihe von Versuchen gefunden, dass die Holzarten unserer gemässigten Zone im Durchschnitt  $\frac{1}{3}$  Theil weniger Siliciumoxyd enthielten als die oben genannten.

b) *Calciumoxyd* in seiner kohlensauren Verbindung dann nur vom Klima oder vielmehr von gewissen Breitengraden abhängig, der warmen Zone, können wir mit Bestimmtheit nach bisherigen Erfahrungen nur in einigen Classen der Zoophyten nachweisen, insofern auch diese den Pflanzen zugezählt werden sollen. — Die gigantischen Gebirge der Corallenthierchen der Südsee sowie der antillischen Gewässer, sind hier vorzugsweise namhaft zu machen.

c) *Kaliumoxydverbindungen*. Sie scheinen sich allerdings auf gewisse Breitengrade zu beschränken und ihr Maximum in der gemässigten Zone zu erreichen. Es würde übrigens sehr interessant sein, die Untersuchungen über den Kaligehalt der Pflanzen bedeutend zu erweitern. Wir wissen bis dahin, dass einige unserer gewöhnlichsten Gewächse, der Familien der Elichryseeen hier *Artemisia Absinthium*, sowie *Fumaria off.*, den *Fumariaceen* angehörig, in ihrer Asche den meisten Kaligehalt nachweisen, und derselbe in der ganz kalten Zone nach und nach schwindet, sich auch in der Asche der Pinusarten bis kaum  $\frac{1}{2}$  Procent zeigt, während die vorgedachten Pflanzen im eingeäscherten Zustande an koh-



leisaurem Kali 70 — 80 Proc. enthalten. — Es scheint ausgemacht, daß das Kali ursprünglich weniger mit Kohlensäure als mit anderen Säuren verbunden zugegen ist.

---

## Fünfte Abtheilung.

---

# Pharmakognosie.

## Ueber *Calamus aromaticus*;

vom

Professor Dr. *Dierbach* in Heidelberg.

Bereits im Jahre 1828 schrieb ich eine kleine Abhandlung über das aromatische Rohr (*Calamus aromaticus*) älterer und neuerer Aerzte (*Archiv für Pharmacie* Bd. 25. p. 159 u. s. f.); ich suchte damals aus ältern griechischen und römischen Schriftstellern darzuthun, daß der wahre *Calam. arom.* des Alterthums nicht wohl etwas anderes als eine gewürzhafte indische Grasart sein könne, und siehe da, diese Grasart ist nun wirklich gefunden worden, es ist:

*Andropogon Calamus aromaticus*, *Royle, essay pag. 34.*

auch ist es nach Lindley diese Species, und nicht *Andropogon Ivarancusa*, welche das auch nach Deutschland gekommene fragrante Grasöl liefert, es ist demnach ebenfalls unrichtig, wenn dasselbe von deutschen Pharmakologen dem *Andropogon citratus* Link oder *A. Schoenanthus Flemming* zugeschrieben wird.

## Flores Armeriae s. Statices.

**D**ie Blumen von *Statice Armeria* Lin., *Armeria vulgaris* Willd. empfiehlt Dr. Ebers in Breslau als höchst wirksames Diureticum in Form eines Infusum. Die Gattungen *Statice* und *Armeria* gehören zu den Plumbagineen, sie sind adstringirend, während die Gattung *Plumbago* durch brennende Schärfe sich auszeichnet. Wahrscheinlich wird auch die *Armeria* Gerbsäure enthalten, da die Wurzel von *Statice limonium* ehedem unter dem Namen *Radix Behen rubri* und die Wurzel und grasartigen Blätter von *Statice Armeria* L., *Radix* und *Folia Statices*, als adstringirende Mittel in Gebrauch waren. (*Casper's Wochensch. für d. ges. Heilk.* 1847 No. 40., *Buchn. Repert.* LXII, 275.)

## Radix Lopez.

**D**ie *Rad. Lopez* hat Dr. Roder in Rostock und mehrere andere dortige Aerzte schon seit mehreren Jahren mit dem besten Erfolge gegen chronische Durchfälle, besonders scrofulöser Kinder, gebraucht. (*Rust's Mag.* LI, 360.)

### Textverbesserung.

Bd. XX. H. 2. pag. 207 Zeile 16 statt Firnis lies Eiweiß.  
 „ XXI. „ 1. „ 13 „ 27 „ treten „ getreten

## Sechste Abtheilung.

# Allgemeiner Anzeiger.

## I. Anzeiger der Vereinszeitung.

### Handelsnotizen.

Bericht aus London vom 1. November 1839.

Obwohl seit unserm jüngsten Bericht vom 4. v. M. hin und wieder noch einige Hoffnung gehegt wurde, daß die gänzliche Unterbrechung des chinesischen Handels vielleicht noch verhindert werden möchte, so hat sich diese Hoffnung nun doch zer schlagen, da hier vorgestern über Land via Egypten, Marseille etc. wieder Depechen und Briefe von Ostindien etc. späten Datums eingetroffen sind, nämlich von Canton bis 25. Juni, Singapore 25. Juli, Calcutta 24. August, Madras 2. Sept. und von Bombay bis 13. Sept., zufolge denen, nachdem alle englischen Konsulate und der Superintendent, Capit. Elliot, von Canton nach der *Portugiesischen Besitzung Macao* abgegangen und von da aus einige Arrangirung mit den chinesischen Autoritäten versucht, selbes unmöglich gefunden hatten und selbes auch für die Folge so viel schwieriger geworden war, da die Chinesen die saisirten 20,253 Kisten *Opium* sämmtlich zu verbrennen und zu zerstören beschlossen und selbes bereits größtentheils ausgeführt hatten, — demzufolge dann der dafür schuldigen Restitution oder Vergütung fast unüberwindliche Schwierigkeiten bei nachheriger Unterhandlung würden in den Weg gelegt und die baldige Beilegung der Streitigkeiten nicht zu erwarten sein, da übrigens auf die noch unbekannte Entscheidung des hiesigen Gouvernements, so erst vorige Woche Depechen dahin gesandt hat, gewartet werden mußte und auch die Art der Arrangirung, wenn die Aussichten sich verschlimmert hatten, sehr langwierig und ungewiß sein dürfte und wohl sehr lange ausgesetzt werden mußte, obwohl man auf Schinuggeleien mancher Art Bedacht zu sein schien, und daß vielleicht den Amerikanern einige Vortheile eingeräumt werden dürften, bis unsere Regierung etwa offensive Maafsregeln ergreift, als worüber man noch lange Zeit in Ungewissheit bleiben dürfte! nämlich ob man blofs zu langweiligen und ungewissen Unterhandlungen oder zur Blockade des Canton-Reviere etc. (welche Maafsregel von den Meinen allhier als die zweckmäfsigste gehalten wird) schreiten dürfte, um dadurch einen etwaigen zwargefährlichen und langweiligen Alleinhandel den Amerikanern zu verhindern, denn deren waren am 20. Juni schon 2 Schiffe bis Lintin im chinesischen Revier vorgerückt, um Thee zu laden, während alle nach Europa bestimmten engl. Schiffe sich von da entfernt und abgesehrt waren, die nach Canton bestimmt gewesen aber nur

bis Macao wagen möchten, da übrigens mit selbigen aller Verkehr von den chinesischen Autoritäten an ihren eigenen Landfahrzeugen aufs strengste verboten worden war. — Inzwischen sind von denen nach England abgesegelten Schiffen bereits 5 allhier, Liverpool, Bristol und Cork angekommen, bloß *Thee* und etwas *Seide* mitbringen, aber gar nichts Droguerien, sowie auch von denen von Canton nach Newyork und Boston bestimmten Schiffen, von denen 6 wir die *Cassia* gesehen haben, nur 2 etwas *Cassia lignea* und *Ol. cassia*, sonst aber bloß *Thee* und *Seide* geladen haben, und welches wohl der Fall mit fast allen übrigen von den zu erwartenden Schiffen sein wird, denn soviel wir nach allen sorgfältigst gezogenen Nachrichten in Erfahrung bringen können, war nichts Droguerien, als *Rhabarber*, *Moschus*, *Campher*, nichts weiter schiffbar oder vorrätig gewesen, als was wir in unserm Bericht vom 4. v. M. erwähnten, worunter ein Kistchen *Moschus* war, so aber doch bei dem nun bereits angelangten Schiffe *Prætor* nicht geladen ist, wahrscheinlich aber doch mit einem folgenden Schiffe verladen sein wird.

Von *Campher* war aus Mangel an Vorrath nichts weiter zu laden, und dürfte dieser Artikel, wovon die bloß noch vorhandenen 105 Kisten steif auf 14 Pf. St. gehalten werden, einer fernern Erhöhung unterworfen sein, da in Amerika und alle überhalb die Vorräthe sehr klein und Preise im Steigen sind.

Das Schiff *St. Vincent* mit den 259 Kisten *Rhabarber* kann wie es jetzt scheint, vor Ende dieses Monats schwerlich zu erwarten werden und sodann die Waare nicht vor Mitte December und vielleicht erst später in Auction kommen; dieser Aufschub wird sehr bedauert, da man auch hier um *Rhabarber* sehr verlegen wird, daß außer einigen Kisten ord. Waare zu 2 sh. 9 d. 3 sh. bloß 2 Kisten  $\frac{1}{4}$  geschälte Mittelwaare zu 6 sh. noch vorrätig sind, demzufolge manche schon auf jene erwartete Zufuhr gehandelt haben und für die 229 Kisten  $\frac{1}{4}$  geschälte auf Lieferung schon  $\frac{5}{6}$  d. geboten und refusirt sein soll, während die übrigen 30 Kisten ganzgeschälte schon zu 7 bis 8 sh. verkauft sein sollen, ebenfalls auf Lieferung, und die Waare falls wie sie wolle. — Fast unerwarteter Weise sind nun seit voriger Woche von *Russischer* oder *Moskowitischer Rhabarber*, deren noch 40 Kisten zu erwarten sind, bereits 90 Kisten von Petersburg hier angelangt, heute zum Theil geöffnet und von uns untersucht; die Waare ist indessen nicht schön frisch und von lebhafter, sondern als etwas alt nur von mittelmäßiger Farbe aber sehr gut conservirt, ganz gesund oder ungestockt und im Bruch sehr gut marmorirt, allein da alles an ein Haus gekommen ist, so sollen selbige nicht unter 12 sh. verkauft werden, wozu schon ein Theil übernommen worden und das Uebrige am 14. d. in Auction gebracht, aber auch nicht niedriger erlassen werden soll. — Unter den umstehend erwähnten Umständen ist mit den mehrsten anderen chin. Artikeln angenehm und manche sehr rar, denn außer *Rhabarber* und *Tonq. Moschus*, wovon gar wenige Waare gern mit 60 bis 70 sh. bezahlt werden würde und gesucht ist, fehlt es uns jetzt auch gänzlich an chin. *Zinnob. Rad. Chinae* u. *Galanga*, sowie auch chin. *Curcuma*, *Cassia lignea*.



und *Blüthe*, *Ol. Cassiae*, *Ol. Anisi* und *Sternanis* sehr rar ist, und kürzlich höher gegangen sind.

### Berg- und Hüttensegen.

Die Ausbeute des *Goldsandes* im Ural von der Aufnahme der Arbeiten im Jahr 1814 an bis zum 1. Jan. 1836 lieferte etwa 3500 Pud Gold, welche aus 1500 Billionen Pud Sand ausgewaschen wurden. Im Altai wurden bis zum Jahr 1835 im Ganzen 17 Mill. 191.326 Pud Sand ausgewaschen, und 41 Pud 18 Pfd. Gold gewonnen.

Auf den Ländereien der Tagilskischen Bergwerke im Ural ist, 40 Werst von Nischnei-Saldnisk, am Bache Nodporoschnaja, welcher in den Tagil fällt, eine Quarzader mit Spuren von Gold entdeckt, und der Anfang mit der Ausbeute dieses Metalls gemacht worden.

### Schwefel.

Laut Nachrichten aus Messina vom Sept. v. J. soll die neapolitanische Regierung die Absicht haben, das *Schwefelmonopol* abzuschaffen. Man ist sehr gespannt darüber, da diese Maafsregel für die Insel von der grössten Wichtigkeit ist.

### Zucker.

Die Fabrikanten Sabalow, Tamanschew und Ter-Gukassow haben unweit Tiflis eine Zuckerfabrik angelegt, welche seit Monat März 1839 in voller Thätigkeit ist. Sie haben auch einen Versuch mit *Anpflanzung des Zuckerrohrs* im Chanat Talyschin gemacht, der eine ergiebige Ernte verspricht.

### Ernte Javanischer Producte.

Nach den neuesten englischen Nachrichten über den steigenden Flor der Colonie Java hat die Regierung den bisher verbotenen Anbau aller Gewürze freigegeben, was ein harter Schlag für Polo-Pinang ist, da man auf Java die Gewürze weit wohlfeiler bauen kann, als auf dieser Insel. Im Jahr 1839 betrug die *Zuckernernte* auf Java 1 Mill. Pikuls, die an *Kaffee* 75,000 Pikuls, die an *Zimmt* 40,000 und wird für das nächste Jahr auf 30,000 angeschlagen, an *Indigo* waren 12,000 Factorei-Maunds gewonnen.

### Anzeige über Naturalienankauf.

Dr. Kraufs von Stuttgart hat die Anerbietung des Banquiers Baron v. Ludwig auf dem Cap der guten Hoffnung, ihn auf seiner Reise nach dem Cap zu begleiten, im Spätjahr 1837, angenommen und befindet sich seit dem Mai 1838 in dem Cap.

lande, das er bereits bis Uitenhagen an der Gränze des Kaffelandes durchforscht hat, und noch auf einer zweiten Reise, er wohl schon angetreten hat, bis über den Orangefluß zu ziehen die Absicht hatte. Die Ergebnisse seiner emsigen Sammlungen von der ersten Reise sind nach seinen neuesten Berichten bereits auf dem Wege nach Europa. Sie bestehen aus ca. 10,000 Exemplaren getrockneter Pflanzen und Früchten, Samen, Zwiebeln, Thierbälgen, besonders von Vögeln und Schlangen, Nattern, Skeletten, Crustaceen, Kerfen, namentlich Schmetterlingen, Conchylien, Zoophyten, Gebirgsarten, Versteinerungen des Meereskalks vom Cap Laguillas u. a. Seine weiteren Sammlungen wünscht nun Kraufs nach den ihm etwa noch zukommenden Bestellungen einzurichten, daher ich wünsche, von den Bestrebungen dieses jungen Reisenden Kenntniss zu geben, und dem Beifügen, daß ich gern bereit bin, Bestellungen mit oder ohne Angabe der Preise, an Kraufs gelangen zu lassen. Der zweite Auftrag von Seiten des würtemb. botan. Reisevereins trifft die Reise des Dr. Schimper in Abyssinien. Dieser, wie schon in öffentlichen Blättern bekannt gemacht wurde, während seines nun 3jährigen Aufenthalts in Abyssinien, das Thal Takaze, das Küstenland u. die Umgegend von Adoa, unter den größten Mühseligkeiten, Gefahren und Entbehrungen durchforscht und eine sehr reiche Ausbeute, mit der er glücklich im letzten Frühjahr in Massowa am rothen Meere angekommen, ist die Frucht seiner Anstrengungen. Die Zahl der gesammelten Pflanzenarten, und darunter eine Menge Neues, beläuft sich auf 200 und es handelt sich nun noch darum, diese Schätze nach Europa zu bringen. Der Verein hat den Pränumerationspreis der Centurie zu 15 fl. gestellt, wobei diejenigen Pränumeranten, welche auf 6 Centurien pränumerirt haben, den Vortheil eines bedeutend ermäßigten Preises für die ihre Pränumeration übersteigende Portion ihrer Bestellungen genießsen sollen. Der Reiseverein wünscht hierdurch gleichsam die Loskaufung Schimper's, der nur noch auf die ihm nöthigen Gelder wartet, zu wirken. Zwei andere Reiseunternehmungen sind bereits begonnen; erstere durch Hrn. Th. Kotschy nach Senaar und Gondofan, welcher diese Reise schon einmal gemacht und sie nun im Auftrag des Vereins zum zweitenmale unternimmt, die andere durch Dr. Welwitsch nach den Azoren und Capverdenischen Inseln; für die erstere Sammlung beträgt die Pränumeration 30, für die letztere 24 fl. — Ein dritter Auftrag ist folgender. Schon zu Prag und zu Hamburg hatte ich bei der Vorphammlung der Naturforscher, und zwar der geognostischen Section, Zeichnungen von den Knochenresten des bei Guildorf in Württemberg gefundenen räthselhaften *Mastodonsaurus salamandroides* vorgelegt, eines riesenhaften *Batrachiers* der Vorwelt, dessen Osteologie nun zum größten Theil vollständig vorliegt. Ich habe Schmidt in Mohrungen bei Urach, ein sehr eifriger Sammler, hat von dem Kopf, dem Atlas und den hauptsächlichsten Theilen des übrigen Skeletts sehr gelungene Abgüsse gemacht und kann dieselben zu 6 Brab. Thaler das Exemplar abgeben.

Prof. Plieninger in Stuttgart.

## Das pharmaceutische Institut in Jena.

In dem *pharmaceutischen Institute* zu Jena beginnen bald nach Ostern die Vorlesungen und practischen Uebungen für das Sommerhalbjahr 1840. Die Einrichtung und die Leistungen dieser seit elf Jahren wirksam gewesenen Lehranstalt sind in dem *fünften* Berichte (s. *dieses Archiv Januar 1839*) angegeben worden. Nähere Aufschlüsse ertheilt der unterzeichnete Director des Instituts, an welchen auch Anmeldungen zur Theilnahme an dieser Lehranstalt möglichst frühzeitig zu richten sind.

Jena,  
im Januar 1840.

Dr. H. Wackenroder,  
Hofrath und Professor.

## Verkaufs-Anzeige.

Eine schöne Schmetterlingssammlung, nach Ochsenheimer und Preischke geordnet und bestimmt, meistens Europäer, sämmtlich aus Raupen gezogen, sachgemäß gespannt, fast durchgehends Mann und Weib, bestehend in:

1) Papiliones circa 160, 2) Sphinges 80, 3) Bombyces 150, 4) Noctuae 200, 5) Geometrae 100, 6) Pyralides 12, 7) Portrices 30, 8) Pineae 40, 9) Alucitae 6.

Die Sammlung enthält sehr viele Seltenheiten, z. B. ein schöner *Paris* aus Java, *Sph. Nerii* 1 Paar, und mehrere Pracht-exempl. von *Sph. Atropos* u. a., *Bomb. Caecigena* 1 schönes Paar, *B. Arctii* u. a., *Noct. Scite*, *Alchimistae* u. v. a. ad 1 Paar. Auf Verlangen wird ein genaues Verzeichniß geliefert. Die Schmetterlinge befinden sich in fünf großen schönen Glaskasten, deren Boden sauber mit schönem Kork gefüttert sind, und stecken auf guten Nadeln, so daß die Kästen recht gut versandt werden können. Ich bin geneigt, diese kostbare Sammlung mit Kästen für die runde Summe von 100 Rthlr. Pr. Ct. abzulassen.

Briefe und Gelder müssen portofrei eingesandt werden. Emballage für die Schmetterlinge muß besonders vergütet werden.

Alfeld, im Königr. Hannover.

J. H. Schwacke. •

## Apothekenverkaufe.

Die bedeutendste Apotheke in einer der größten und zugleich am schönsten belegenen Städte Thüringens, reines Medicinalgeschäft und mit einem Realprivilegium versehen, zu deren Uebernahme eine baare Anzahlung von circa 12 — 16,000 Rthlr. erforderlich ist; ferner die einzige Apotheke in einer lebhaften Stadt der Sächsischen Herzogthümer, reines Medicinalgeschäft mit Privilegium, zu deren Annahme eine baare Anzahlung von 7000 Rthlr. gehört; ebenso die einzige Apotheke, reines Medicinalgeschäft, einer in sehr wohlhabender bevölkerter Umgegend in der Preuss. Provinz Sachsen belegenen Stadt von circa 2000 Einwohnern, und die einzige Apotheke, mit Realprivilegium versehen, in einer Großherzogl. Sachsen-Weimarischen



Stadt, zu deren Annahme circa 3000 Rthlr. erforderlich  
sollen verkauft werden. Nähere Nachricht hierüber ertheilt  
der Apotheker E. Grefslor zu Saalhausen  
in Thüringen.

---

### **Gehülfenversorgungs - Angelegenheit.**

Die Herren Collegen, welche mir Mittheilung in den  
Versorgungs - Angelegenheiten machen wollen, belieben mir die  
recht zeitig gefälligst zugehen zu lassen.

Der Apotheker E. Grefslor zu Saalhausen  
in Thüringen.

---

### **Notizen aus der neuesten Correspondenz des Directoriums.**

Hr. Professor Dr. Martius in Erlangen übermacht uns die  
ersten Nummern des »Pharmaceutischen Correspondenzblattes  
für Süddeutschland,« eine neue Zeitschrift, in welcher besprochen  
die Zustände der Pharmacie in Süddeutschland besprochen  
werden sollen. Diese ersten Nummern enthalten Belege, wie  
wenig auch dort die Verbesserung der jetzigen Verhältnisse  
ist, die so nachtheilig und niederdrückend auf unserm Gewerbe  
lasten.

Hr. Geh. Regierungs- u. Medicinalrath Dr. Wegeler übersendet  
dem Verein für das Jahr 1854 Seitens der Anstalt übermachte  
Gewünschteschreiben zu seinem Jubiläum ein verbindliches  
Schreiben. Erfreulich spricht in diesem Schreiben der  
geehrte Arzt und Medicinalbeamte uns an, wie derselbe  
in den großen Werth hervorhebt, welchen das collegiale  
Verhältniß zwischen Arzt und Apotheker habe, und wie  
wichtig gemeinsame Berathungen oder Besprechungen derselben  
die pharmaceutischen Verhältnisse der Arzneimittel hauptsächlich  
auch für den Arzt seien.

Hr. Vicedirector Müller in Medebach: Ueber Gehülfs-  
unterstützungs - Angelegenheiten. Hr. College Müller hat  
ehrenwerthe Absicht, ein von ihm verfaßtes prosodisch-  
technisches Wörterbuch zum Besten des Unterstützungsinstituts  
auszugeben, worauf wir vorläufig aufmerksam machen.

Hr. Apotheker Dr. Meurer in Dresden: Die Anzeige, daß  
die sämmtlichen Herren Apotheker Dresdens und der Umgegend  
dem Vereine beitreten würden, mit Einsendung des Verzeichnisses  
der Anmeldungen. — Hr. Apotheker Kirsch in Leipzig: Ueber  
denselben Gegenstand und weitere Verbreitung derselben  
eins in anderen Theilen des Königreichs Sachsen. — Das  
Directorium theilt vorläufig diese erfreuliche Nachricht mit.  
Es findet in diesem Anschlusse der verehrten Herren Collegen  
in Sachsen eine schöne Anerkennung des Nutzens des Vereins  
der in der Mitwirkung dieser neuen Mitglieder gewiß auch  
Neue gefördert wird. — Hr. Vicedirector Dr. Bley in  
Burg: Ueber eine nach Vereinbarung mit Hrn. Kreisdi-



haben vorstehend vorgenommene bessere Vertheilung der Mitglieder der Kreise Bernburg und Luckau; ferner Gehülfsunterstützungs-Angelegenheit. — Hr. Vicedirector Dr. Bucholz in Gotha: Ueber die bewirkte Eintheilung des dortigen Kreises in zwei Kreise. — Hr. Medicinalrath Dr. Kleemann in Marienwerder: Ueber den Nutzen des Vereins in der dortigen Gegend. — Hr. Kreisdirector Dreykorn in Neustadt a. d. Orla: Ueber die Bildung eines neuen Kreises Weimar. — Hr. Kreisdirector Grefslar in Saalfeld: Ueber Verbreitung des Vereins in Sachsen und in der Umgegend von Naumburg. — Hr. Vicedirector Dr. Herzog in Braunschweig: Ueber Angelegenheiten des dortigen Vicedirectoriums. — Hr. Vicedirector Dr. Grischow: Ueber Angelegenheiten des dortigen Vicedirectoriums und Gehülfsunterstützungssachen. — Hr. Vicedirector Bucholz in Erfurt: Ueber denselben Gegenstand. — Hr. Kreisdirector Geiseler in Berlin: Ueber Angelegenheiten des Kreises Brandenburg. — Hr. Assessor Faber: Ueber Angelegenheiten des Kreises Minden. — Hr. Kreisdirector Upmann: Ueber solche des Kreises Osnabrück. — Hr. Kreisdirector Jonas: Ueber solche des Kreises Eilenburg. — Hr. Hofapotheker Rüde in Cassel: Ueber Gehülfsunterstützungs-Angelegenheit. — Hr. Apotheker Sparkuhl in Andreasberg: Ueber Verbreitung des Vereins in dortiger Gegend. — Hr. Kreisdirector Schmithals: Ueber Angelegenheiten des Kreises Xanten. — Hr. Kreisdirector Schultz: Ueber solche des Kreises Conitz. — Hr. Kreisdirector Müller in Driburg: Ueber solche des Kreises Paderborn. — Hr. Rath und Ritter Siller in Petersburg: Mittheilungen der dortigen pharmaceutischen Gesellschaft und Uebersendung von Ehrendiplomen derselben an mehrere verdiente Beamten unsers Vereins. — Hr. Kreisdirector Muth: Ueber Angelegenheiten des Kreises Arnswalde, die Beiträge für unsern durch Feuersbrunst heimgekehrten Collegen Lincke in Neustadt, und Ersuchen an die Mitglieder des dortigen Kreises, um pünctliche Absendung der Bücher des Lesezirkels, da solche theilweise zum Sonnenburger Kreise übergehen müssen.

Beiträge fürs Archiv gingen ein von Hrn. Apotheker Cerutti in Camburg, Hrn. Kreisdirector Jahn in Meiningen, Hrn. Apotheker Hansmann zu Atens, Hrn. Apotheker Hedrich in Moritzburg bei Dresden, Hrn. Kreisdirector Jonas in Eilenburg, Hrn. Assessor Aschoff in Bielefeld, Hrn. Dr. Schlottbauer in Driburg, Hrn. Dr. Bley in Bernburg, Hrn. Apotheker Baldenius in Dessau, Hrn. Prof. Dr. Dierbach in Heidelberg, Hrn. Apotheker Arcularius in Horn.

## II. Anzeiger der Verlagshandlung.

(Inserate werden mit 1½ Ggr. pro Zeile mit Petitschrift, oder für den Raum derselben, berechnet.)

Wir machen Freunde der Botanik und Mineralogie auf folgende, aufs günstigste beurtheilte Werke ergebenst aufmerksam:

Hochstetter, Prof. M. Ch. F., populäre Botanik, oder factische Anleitung zur Kenntniß der Gewächse, besonders in Deutschland und in der Schweiz am häufigsten wildwachsenden Arten, wie auch der deutschen Culturpflanzen und der merkwürdigsten Gewächse der wärmern Länder. Zweite, mit besonderer Rücksicht auf Norddeutschland und die Schweiz vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 3 schwarzen und 1 gemalten Tafeln. gr. 8. 1837. geh. 7 fl. oder 4 Rthlr.

— — populäre Mineralogie, oder die Gebirgs- und Fossilienkunde für alle Stände, insbesondere für die Jugend und für die Lehrer an Real-, Gewerbs- und Volksschulen, auch für Pharmaceuten etc. Mit 12 Tafeln. gr. 8. 1836. geh. 3 fl. 24 kr. oder 2 Rthlr.

Verlagsbuchhandlung von Joh. C. Mäcken jun.  
in Reutlingen.

Bei Ernst Schulze in Gelle ist erschienen:

Dr. Aug. Jul. du Menil, Gedanken über mancherlei Gegenstände der Welt- und Menschenkunde. 2r Bd. 14 Ggr.  
Ist in allen Buchhandlungen zu haben. (Der dritte Bd. unter Kurzem)

In der Lehnhold'schen Buchhandlung in Leipzig ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

### Dr. Filz's Allgemeine Toxikologie

oder Abhandlung von den Giften des Mineral-, Pflanzen- und Thierreichs in physiologischer, pathologischer und gerichtlich-medizinischer Hinsicht. Ein practisches Handbuch für Aerzte, Apotheker und diejenigen Staatsbeamten, welche gerichtliche Untersuchungen zu leiten haben. Nach der neuesten verbesserten und vermehrten Auflage deutsch herausgegeben von Dr. Otto Bernhard Kühn, Prof. der Medicin. 2 Bde. Wohlfeilere Ausgabe. gr. 8. (80 B.) br. 4 Rthlr.

### Anleitung

zu qualitativen chemischen Untersuchungen,  
von Dr. Otto Bernh. Kühn, Prof. der Med. in Leipzig  
Wohlfeilere Ausgabe. gr. 8. br. 8 Ggr.

**Practische Anweisung,**

die in gerichtlichen Fällen vorkommenden  
**chemischen Untersuchungen**

angeführt. Herausgegeben von Dr. Otto Bernh. Kühn,  
Prof. der Med. u. Wohlfeilere Ausgabe. gr. 8. (18 $\frac{1}{2}$  B.)  
br. 16 Ggr.

In der Balz'schen Buchhandlung in Stuttgart ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands und der Schweiz vorräthig zu haben:

**Der angehende Chemiker**

oder

**Einleitung in die technische Chemie**

mit Angabe der interessantesten Experimente.

Zum Gebrauch für Alle, welche sich mit der Chemie nach ihren Gesetzen und deren Anwendung im Leben beschäftigen oder bekannt machen wollen.

Von

**Dr. Döbereiner.**

20 Bogen Belinpapier. 8. geh. 1 Rthlr. oder 1 fl. 30 kr.

**Herabgesetzte Preise!**

Nachstehendes Werk haben wir, so weit der noch sehr geringe Betrag reicht, um  $\frac{2}{3}$  des Ladenpreises herabgesetzt:

Graumüller, Dr. Chr. Fr., Handbuch der pharmaceutisch-medicinischen Botanik, für angehende Aerzte, Veterinärärzte, Apotheker, Droguisten, Kaufleute etc. gr. 8. 6 Bde. Ladenpreis 11 Rthlr. 16 Ggr.

Herabgesetzter Preis 4 Rthlr. Pr. C.

Ferner haben wir folgende zwei Werke auf die Hälfte des Preises herabgesetzt:

Graumüller, Tabellarische Uebersicht des alten Linné'schen Pflanzensystems und des verbesserten von Thunberg, so wie auch der natürlichen Systeme von Jussieu und Patsch. gr. 4. jetzt 5 Ggr.

Dessen Diagnose der bekanntesten, vorzüglich europäischen Pflanzengattungen, nach dem verbesserten Linné'schen System, zum analytischen Gebrauch bei Vorlesungen und zum Selbstunterricht. gr. 8. jetzt 1 Rthlr. 6 Ggr.

Alle Buchhandlungen Deutschlands und der Schweiz können obige Bücher für den herabgesetzten Preis liefern.

**Schöne'sche Buchhandlung in Eisenberg.**

Unter der Presse befindet sich:

Dr. Aug. Jul. du Menil, Reagentienlehre für die Pflanzenanalyse. Zweite stark vermehrte Auflage.

Ernst Schulze'sche Buchhandlung in Celle.

Bei G. A. Rehner in Mitau ist so eben erschienen und bei Buchhandlungen zu beziehen:

**Flora**  
der deutschen Ostseeprovinzen  
**Esth-, Liv- und Kurland,**  
bearbeitet von  
**Dr. Joh. Gottl. Fleischer.**  
Herausgegeben von  
**Emanuel Lindemann.**

Mit dem Bildnisse des Verfassers. 8. 1839. geh. 1 Rthlr. 1

**Populäre Experimental-Physik**

zum Gebrauch

gemeinsamer Vorträge und zum Selbstunterricht für die Freunde der Naturwissenschaft und gebildete Gewerbetreibenden aller Klassen.

Von Dr. Theodor Friedleben.

Zweite, nach dem neuesten Standpunct der Physik gänzlich umgearbeitete, durchaus verbesserte und vermehrte Auflage.

Mit 12 Steintafeln.

30 Bogen in gr. Verkonformat. 2 Rthlr. oder 3 fl.

Indem wir die zweite Auflage dieses geschätzten Hand- und Lehrbuchs, welches nicht nur viele technische und Gewerbschulen wie zu Göttingen u. s. w. als Unterrichtsbuch anwenden, sondern auch Gewerbetreibende zur Art zum Selbststudium und Nachschlagen mit Nutzen gebrauchen, das betreffende Publikum ankündigen; machen wir besonders auf die vielen neuen Zusätze und Bereicherungen (eine ganz ausführliche Beschreibung der galvanischen Zelle beweist, daß die neuesten Erfahrungen in der Naturgeschichte darin aufgenommen wurden) wie überhaupt auf die inneren und äußeren Verbesserungen des Buchs aufmerksam, und empfehlen es in dieser Gestalt Allen, welche über den Gegenstand lehren oder belehrt sein wollen.

J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M.

**Anzeige.**

In Beantwortung vielfacher Anfragen zeigen wir hiermit an, daß wir so eben das ganze Manuscript zum 1sten Bande von **Bosse's, J. F. W.,** (Großherzogl. Hofgärtner u. s. w. in Kassel) vollständigem Handbuche der Blumen- und Obstgärtnerei. Zweite verbesserte und sehr vermehrte Auflage in 3 Bänden

von dem Herrn Verfasser eingesandt erhielten und daß dieser 1ste Band nunmehr in einigen Monaten zuverlässig erscheint. Der 2te und 3te Band werden baldigst nachfolgen.

Bestellungen auf das obige, als das vorzüglichste in diesem Fache der Literatur bereits hinlänglich anerkannte und jetzt noch wesentlich verbesserte und vermehrte Werk werden bei uns und in allen Buchhandlungen angenommen.

Hannover, am 20. Jan. 1840.

Hahn'sche Hofbuchhandlung.



№2

Vereinsjahr der Jussieu's.

1840.

Februar.

**ARCHIV**  
**DER PHARMACIE,**  
eine Zeitschrift

des

Apotheker-Vereins in Norddeutschland.

Zweite Reihe. Einundzwanzigsten Bandes zweites Heft.

Erste Abtheilung.

**Vereinszeitung,**

redigirt vom Directorio des Vereins.

*1) Vereinsangelegenheiten.*

**Einige Gedanken**

über einen allgemeinen deutschen Apothekerverein  
und darauf bezügliche Vervollkommnung der  
Pharmacie.

Vortrag in der Sitzung des Apothekervereins in Nord-  
deutschland zur Feier seines 19ten Stiftungsfestes, den  
21. Sept. 1839 zu Pyrmont,

von

**Dr. L. F. Bley.**

Mit dem frohen Gefühle inniger Gemeinschaft ha-  
ben wir uns heute hier versammelt an dem Orte der  
Zusammenkunft deutscher Naturforscher und Aerzte, zu-  
gleich einen Theil dieser Gesellschaft bildend. Was  
könnte eine schönere Zierde unserer Vereinszusammen-

kunft sein, als die Theilnahme derjenigen Männer, welche jener große Verein der Naturforscher und Aerzte hier zusammenführte, die wir mit aufrichtigem Danke erkennen. Es gilt hier nicht, ein Fest zu feiern gewöhnlicher Art, an dem das Herz und der Geist wenig theil nähme. Nein, wir feiern heute ein Fest der Wissenschaft und des thätigen heilbringenden Wirkens! Es ist nicht zu läugnen, daß die Feier der Feste, die bei allen Nationen, selbst den rohesten und ungebildeten antreffen, einen wohlthätigen Einfluss auf den Geist und das Gemüth ausüben kann, wenn sie rechter ist. Wenn wir nach dem Ursprunge der Feste sehen, so sehen wir bald, daß meistens besonders wichtige Begebenheiten die Veranlassungen dazu waren: weder die Jahrestage wichtiger Ereignisse in der Geschichte der Völker, als großer Siege in dem Kampfe für Freiheit oder des errungenen Friedens nach langjährigem Streite, oder das Aufhören verheerender Kämpfe, oder die Verleihung wichtiger Gesetze und Einrichtungen, oder die Wiederkehr des Wiegenfestes besonders einflussreicher Wohlthäter des Menschengeschlechtes. Die Festtage sollen dem Menschen dienen zur Erinnerung, zur Erhebung seines Geistes, zur Stärkung seines Glaubens, zur Nacheiferung der Tugenden derjenigen, welchen die Feste gelten, oder als Opfer der Dankbarkeit für die empfangenen Wohlthaten. Und so ist denn auch mit dem heutigen Feste. Es ist das Stiftungsfest des Apothekervereins Norddeutschlands. Vor Jahren traten in diesen Tagen in dieser Gegend mehrere verdiente Männer unsers Fachs zusammen. Glücklicherweise war der Gedanke, welcher den Keim des Vereins umfaßte, glücklich die Ausbildung, die Bewahrung, die Pflege desselben. Darum Dank, innigen Dank jenen Männern, allen Pflegern, Gönnern und Beförderern der Anstalt! Was der Verein wirkte, habe ich nicht weitläufig hier erörtern, theils hat der edle Stifter desselben, Hofrath Brandes, darüber in seinen alljährigen Berichten Mittheilung gemacht, theils aber hat unser verehrter Freund Dr. Geiseler vor nicht langer Zeit in dem Archiv des Vereins auf eine Weise hierüber sich ausgesprochen, daß ich nicht im Stande sein würde, etwas Besseres, Gediegeneres und Würdigeres anzuführen, dahingegen sei denn nur kürzlich erwähnt, daß der hellere Geist, welcher die Pharmacie jetzt belebt, der Geist der Erhellung, der Tracht, des collegialischen Zusammenwirkens, der Geistes der Wissenschaftlichkeit zum Theil mit schöne Früchte

des Vereins sind. Denn wenn auch hochverdiente Männer dieser vor der Begründung des Vereins das Wort redeten, wenn durch sie der Boden urbar gemacht, die erste Saat gestreut ward, wie wir bei einer andern Gelegenheit zu erweisen bemüht waren, so war es doch der Verein, welcher die Collegen einander näherte und in welchem des Stifters und mancher andern trefflichen Glieder würdiges Beispiel beachtet und anerkannt ward, und zum Muster diente. »Der Verein ist das Werk seiner Mitglieder, seine Blüthe die Frucht seines gemeinsamen Strebens,« sagt Freund Brandes so bescheiden als ehrend für ihn und den Verein. Heute sei es unsre Aufgabe, zu untersuchen, wie der Verein noch wohlthätiger, heilbringender wirken könnte.

Nachdem unser Verein schon manches Jahr bestanden hatte, wie auch der in Baiern, entstanden der pharmaceutischen Vereine mehre, so in Württemberg, Baden, Rheinbaiern. Was sie leisteten, beweiset für den Verein in Baiern unsers verehrten Buchner's Repertorium, für den in Württemberg desselben eignes Correspondenzblatt, für letztern das Jahrbuch der practischen Pharmacie von Herberger und Winckler.

Es ist eine alte Wahrheit: »Einigkeit macht stark!« Das haben die Stifter und die Mitglieder der Vereine gefühlt: dahin haben sie gestrebt, stark zu werden in ihrem Wissen, in ihrem Wirken. Aber wenn auch das Wissen allgemein wurde, so war doch ihr Wirken noch nicht verbreitet genug. Man empfand dieses von Seiten manches geschätzten Collegen, so entstand der Gedanke unsers zu früh vollendeten Geiger's, bei dessen Namen wir mit Dankbarkeit seiner großen Verdienste uns erinnern, und seiner würdigen Freunde Liebig und Merck, einen süddeutschen Apothekerverein zu gründen. Sei es nun, daß dieser Plan noch nicht zeitgemäß war, sei es, daß diese Männer nicht Zeit fanden, sich umfassend mit dieser Angelegenheit zu beschäftigen, kurz der Plan kam nicht zur Ausführung. Kürzlich ward diese Angelegenheit von einem ehrenwerthen Collegen, Hrn. Apotheker Zeller in Nagold, wieder angeregt und in diesen Tagen sind die Collegen jener südlichen Gegenden in Stuttgart bemüht, dieselbe weiter zu beraten.

Der achtungswerthe College Zeller hat als Mittel zum Zweck jenes süddeutschen Vereins angegeben:

1) Zweckmäßige Organisation der Gesellschaft. Hierbei scheint es mir, können recht wohl die Statuten des

Vereins in Norddeutschland angenommen werden dem Zwecke ganz entsprechend sind.

2) Eine die Verbindung der Mitglieder vermittelnde Zeitschrift. Sehr wünschenswerth würde ein Ansehen an das Repertorium Buchner's oder an das Buch Herberger's und Winckler's sein, besser und wünschenswerther dürfte es sein, die deutschen Zeitschriften für Pharmacie zu vereinigen, 1) damit die Besitzer leichter etwas Vollständiges säßen, 2) damit man nicht nöthig hätte, in den meisten Zeitschriften ein und dieselbe Arbeit doppelt und vielfach anzuschaffen, 3) damit eine solche Zeitschrift desto sichere Dauer hätte, was um so mehr der Fall sein dürfte, wenn, wie im norddeutschen Vereine, jedes Mitglied dieselbe erhält, 4) damit und dies möchte das Wesentlichste sein, das Band zwischen den einzelnen Vereinen ein recht festes, sicheres würde, wodurch sie gleichsam zu einer grossen Kette vereinigt werden könnten.

3) Alljährliche Plenar- und Partikularversammlungen. Auch diese bestehen im norddeutschen Vereine. So wäre es, wenn die Hauptversammlungen sich zuweilen mit den Versammlungen der Naturforscher und Aerzte vereinigen liessen. Es findet sich unter den Apothekern heutiges Tages eine ansehnliche Zahl solcher, welche auch den strengsten Anforderungen der Statuten entsprechen dürften, wenn nicht bekannt wäre, mit welcher Humanität auch denjenigen Antheil an den Versammlungen gestattet ist, welche nicht eigentlich Mitglieder sein könnten. Wie sollten auch die Naturforscher, deren Beschäftigung sie zu den Quellen des ersten Geschenks der Gottheit, der Humanität, hinführt zu der Erkenntniß der Werke des Schöpfers nämlich welche uns hinweisen auf seine Grösse, seine Vollkommenheit, und unsere Ohnmacht und unser Stückwerk Wissen, wie sollten sie, sage ich, nicht die Beweise des Besitzes dieser edlen Tugend gegen die geben, welche kamen an die, von den Heroen der Wissenschaft genetzten Quellen wissbegierig zu schöpfen, um wiederum für die edelsten Zwecke, Leben und Gesundheit, da sie als Mitwächter berufen sind, nützliche Anwendungen zu machen! Nach dem, was die Pharmacie der Menschheit leistete, dürfte es nicht von geringem Nutzen für die Aerzte, sich auch ihrerseits mit den Arbeitern der Pharmaceuten zu befreunden, da sich immer mehr herausstellt, daß nur da eine glückliche, segensreiche



Praxis bei den Aerzten gefunden werden kann, wo sie mit den naturforschenden Wissenschaften stets Hand in Hand gehend, deren unerschöpfliche Ausbeute sich nutzbar zu machen wissen!

4) Lesegesellschaften. Ohne diese kann natürlich kein wissenschaftlicher Verein, unserer Art, in dieser Zeit mehr bestehen.

5) Anlegung von Sammlungen, ein schönes Mittel zur Ausbildung der jungen und alten Pharmaceuten. Leider sind aber umfassende vollständige Sammlungen nur wenigen zugänglich und wie wenige solcher Sammlungen existiren auch bis dahin? Ausser den Universitätsstädten und Orten, die sich des Welthandels, z. B. Hamburg, rühmen dürfen, wo es mir vor 9 Jahren in diesen Tagen vergönnt war mit den Meistern unsers Fachs, Trommsdorff, Geiger, Brandes, die dasigen interessanten Sammlungen zu besichtigen, fast keine. Es wäre sehr wünschenswerth, dass in Anlegung möglichst vollständiger Sammlungen etwas geschehen könnte. Alle Regierungen sollten dazu die Hand bieten, dass wenigstens an den Sitzen der Medicinal-Collegien vorzügliche pharmakognostische Sammlungen vorhanden wären. Aber diese müßten natürlich dann in den Händen von Männern sein, welche sie den zugänglich machten, die da lernen wollten und ihnen wo möglich die Benutzung durch den Schatz ihrer Kenntnisse noch erspriesslicher werden lassen.

Wenn Hr. College Zeller nun

6) Das Hinwirken auf die pharmaceutische Gesetzgebung durch gemeinschaftliche Bitten und Eingaben bei den Regierungsbehörden als Mittel bezeichnet, so möchte das fürs erste, meiner Ansicht nach, noch als Zweck des Vereins bezeichnet werden müssen. Allerdings wird der Zweck hernach wiederum ein Mittel des Näheraneinanderschliefens, und das um so mehr, als es stets wünschenswerthe Verbesserungen geben dürfte.

Uebrigens ist mir diese Ansicht Zeller's ganz aus der Seele geschrieben: denn nach vielfältigen Bemühungen Seitens mehrerer verehrten Collegen, welche sich für die Verbesserung der pharmaceutischen Gesetzgebung interessirt haben und von welchen ich nur Trommsdorff, Geiger, Rüde, Buchner, Biltz, Brandes, Häule, Trautwein, Schiller, Hornung, Geisseler, Hopf, Probst nenne, welche bis dahin zum Bestehen aller wohlgesinnten Pharmaceuten noch so wenig Einfluss gehabt haben, bleibt nichts anderes übrig, zur

Erreichung eines guten Zwecks, als die gemeinsame Verbindung aller deutschen Apotheker zur Ergreifung aller gesetzlich zulässigen Maafsregeln, jene Verbesserungen wo möglich, noch zu verwirklichen!

Diese Eingaben und Bitten müßten sich vorzüglich beziehen :

a) Auf Einführung einer gemeinschaftlichen Pharmakopöe. Ich habe nicht nöthig, über diesen Gegenstand, der auch die Aerzte mitberührt, in Details einzugehen. Es ist dieses bereits früher von Hrn. Geh. Medicinrath Professor Harless in Bonn und in einer besonderen Rede, bei Gelegenheit der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Bonn, vom verstorbenen Professor Geiger aus Heidelberg geschehen. Nicht minder wichtig aber als die Einführung gleichen Maaßfusses, gleichen Maaßes und Gewichtes und gemeinsamer Handelsinteressen, welche bereits Gegenstände der Erwägung der meisten deutschen Regierungen geworden sind, dürfte die Gleichheit eines medicinisch-pharmaceutischen Gesetzbuchs, der Pharmakopöe nämlich, sein.

b) Auf Einführung gleichmässiger Taxen. Es ist ein bedeutender Uebelstand in der Verschiedenheit der Arzneitaxen, welcher von den Apothekern oft drückend empfunden wird, besonders an den Grenzen und bei Reisen, die verschiedene Staaten berühren. Es ist über diesen Gegenstand bereits so vieles von Krügelstein, Westrumb, Meyer, Schiller, Nolde, Flachsland, Frank, Momberger, Buchner, Geiger, Razen, Schultes, Martius, von Bergen, Jobst, Kittel, Rumpf, Räßple, Biltz, Hänle, Link, Wunderlich, Trautwein, Hopf, Probst geschehen, auch der Verfasser dieser Mittheilung hat seine Ansichten darüber veröffentlicht, so daß nach allen diesen vollkommen hinreichende Materialien vorliegen und es hier der weitem Auseinandersetzung nicht bedürfen möchte. Mir scheinen vorzüglich die Arbeiten von Link, Buchner, Geiger, Kittel, Trautwein, Martius, Bergen und Probst Beachtung zu verdienen. Die Ansichten eines Schultes und Wunderlich sind Beweise von der Unkenntniß ihrer Verfasser mit dem Standpunkte der Pharmacie, und zeigen recht eigentlich, wie selten der Arzt im Stande ist, über diese Angelegenheit vollgültige Urtheile zu fällen; sie beweisen aber auch, wie sehr es an der Zeit sein möchte, der von Geiseler und mir weiter beleuchteten Nothwen-

keit der Vertretung der Pharmacie in den Medicinalbehörden ein geneigtes Gehör zu schenken.

c) Auf gesetzliche Beschränkung des Ausbietens und Verkaufs von Geheimmitteln aller Art zu medicinischen Zwecken.

Man sehe nur die täglichen Anpreisungen in den Zeitungen, die, wie das Directorium unsers Vereins in der Nachschrift zu meiner Abhandlung »Ueber die Nothwendigkeit der Vertretung der Pharmacie etc.« sagt, 50 Quadratmeilen Zeitungspapier bedecken. Man prüfe die angebotenen Mittel und überzeuge sich, wie so häufig dieselben schädlicher Natur oder auch wie nichts wirkend sie sind, man vergleiche die Kosten derselben mit den übertriebenen Preisen der Geheimniskrämer und gebe dann zu, daß solches Treiben mit einer guten medicinischen Polizei völlig unverträglich ist.

Das Königl. Württembergische Staatsministerium hat in einem Erlaß vom October 1837 eine weise Beschränkung solcher Geheimmittel eintreten lassen und den Verkauf der geprüften zulässigen den Apothekern zugewiesen, das Ausbieten aber nur bedingungsweise erlaubt. Möchte es überall so sein!

Nicht allein, daß jenes Treiben den Apotheker in seinem Einkommen schmälert, der in unsern Zeitverhältnissen nichts entbehren kann, wenn er fortgehen soll mit der Wissenschaft, wenn er Genüge leisten soll den großen Anforderungen, die die Gesetze und eben jene Fortschritte der Wissenschaft an ihn machen, nein, nicht dieses allein ist es, was den rechtlich gesinnten Arzt und Apotheker drückt: sondern vorzüglich auch die dadurch der Pfscherei geöffnete breite Bahn, die so große Nothwehr gegen die Pfscher selbst, während man den Arzt und den Apotheker unter so strenge Controle stellt und mit allem Recht. Jene Mißbräuche können wahrlich nicht günstig für die Handhabung einer guten Medicinalverwaltung sprechen. Ich glaube nicht zu viel zu sagen, daß man tausend Beweise für dieses gränzenlose Unwesen beizubringen sich anheischig machen könnte. Der Apotheker verlangt in der That nichts Unbilliges, nur Gerechtigkeit, aber diese ganz! Ist das etwa zu viel? Wagt nicht jeder Staatsbürger diese fordern! Ist sie nicht die Basis jeder guten Staatsverwaltung? Möchte denn die so sehr zu wünschende Handhabung der vollkommenen Gerechtigkeit sich auch erstrecken auf die gleich unten näher zu bezeichnenden anderweitigen Eingriffe in die Rechte der Apotheker. Bis dahin aber, wo

dieses geschehen sein wird, können Apotheker, so rücksichtlich der Geheimmittel, manches thun, die Unwesen zu steuern, wenn sie solche genauen Prüfungen unterwerfen und die Resultate bekannt machen, wie es schon häufig nicht ohne guten Erfolg geschehen.

d) Auf die Eingriffe Seitens der Kauf- und Handelsleute, denen z. B. durch die neuere preussische Bestimmung der Verkaufsartikel der Apotheker mehr eingeräumt ist, als dem gedrückten Apothekerstande erspriechlich sein kann. Was hilft es, wo die eine Hand giebt und die andere nimmt! Ferner auf die Eingriffe der Thierärzte, Homöopathen und Aetherärzte, welche befugt und unbefugt selbst dispensiren. Der Handel mit Arzneiwaaren gehört, wie unser Directorium in der oben gedeuteten Schrift anführt, von Rechtswegen nur dem Apotheker. Er ist Sachkenner und Bewahrer der Stoffe, er hat zugleich die Verpflichtung, diese Stoffe nicht allein aus dem Gesichtspuncte der Handelswaare zu betrachten, er hat auch die Pflicht, sie in gehöriger Güte abzugeben und kann diese eher beurtheilen, als der Arzt, Thierarzt oder gar der Laie.

Und wie steht es denn häufig mit der Gewissenhaftigkeit der selbstdispensirenden Aerzte? Die so genau und vorsichtig sein wollenden homöopathischen Aerzte, welche angeblich nur deshalb die Arzneien ihren Kranken selbst bereiten, weil sie dem Apotheker nicht Vertrauen genug schenken zu können meinen, (man höre und halte dagegen die gewiss bekannte Pflichttreue der meisten Apotheker) geben z. B. kleine Pülverchen von 2, 3 und 4 Gran Gewicht, welche oft untereinander sehr weit im Gewicht differiren, wovon ich mich hinlänglich überzeugt habe, daß dieses gänzlich mit jener gerühmten Gewissenhaftigkeit streitet, die ich eher Gewissenlosigkeit nennen möchte. Denn die dem Apotheker nicht überlassene Arzneibereitung wird hier häufig von Mägden und Tagelöhnern betrieben, ob der neuen Heilmethode zur Ehre oder der Medicinalverfassung, die dieses nicht erlaubt hat und deren Handhabung es doch zuläßt, zur Schande, will ich hier nicht weiter erörtern! Kurz und gut, dieses sind Thatsachen! Nicht zu gedenken, daß die gegebenen Heilmittel häufig gar nicht das enthalten, was sie enthalten sollen? Oder hat man Beweise der medicinischen Einwirkung von Stoffen auf den menschlichen Körper, die durch chemische Reagentien nicht mehr entdeckt werden können? Ich bescheide mich hier als Laie des gründlichen medi-



cinischen Urtheils. Aber mir fällt hier das Wort des Gabriel Wagner's ein: »Der Wahrheit Thür, Ursprung und Boden sind die Sinne,« mit welchen allen hier keine medicinische Kraft wahrgenommen werden kann. Mir scheint aber, daß zur Behauptung der Einwirkung solcher für die Sinne und die chemische Einwirkung nicht mehr wahrnehmbarer Stoffe, man einer ziemlich starken Einbildungskraft bedürfen werde, die freilich Wunder sehen kann, wo keine sind.

Aber wie nahe liegt hier die Meinung, daß jene Arzneigaben nur zum Schein gegeben werden, um doch theure Liquidationen machen zu können! Zwar sollen einzelne dieser Aerzte unentgeltlich selbst dispensiren, aber sie wissen sich auf solche Weise schadlos zu halten, daß die armen Kranken, wenn auch nicht aller Krankheit doch alles Geldes los und ledig werden! Doch genug!

Aber auch Seitens der Apotheker könnte durch *Vereinbarung* manches geschehen, was ihnen förderlich sein möchte.

Hierher rechne ich, mit Zeller, die wissenschaftliche und sittliche Ausbildung der Lehrlinge und Gehülften.

Wer derselben bedarf, weiß, wie öfters man leider unter letzteren noch auf solche stößt, die weder von wissenschaftlicher Seite, noch von sittlicher, dem Stande Ehre machen, wenngleich ich nicht verkenne, daß die Mehrzahl achtungswerth und brav ist! Aber der Apotheker kleiner Städte, an den sich nicht immer die vorzüglichsten zu wenden pflegen, hat oft seine Noth mit ihrer geringen wissenschaftlichen Bildung, mit ihrer Anmaßung, denn Stolz und Dummheit sind ja so oft mit einander verschwistert! mit ihren rohen Sitten.

Das könnte und es müßte anders und besser werden:

a) dadurch, daß nur sittliche Jünglinge von tüchtiger Vorbildung als Zöglinge angenommen würden.

b) Daß man ihnen überall mit gutem Beispiele vorgehe und sie selbst in allen Zweigen unterrichtete.

c) Daß man den abgehenden Zöglingen, wie Gehülften, nur durchaus der Wahrheit getreue Zeugnisse ausstelle, in welchen nicht das Ungünstige mit Stillschweigen übergangen werden müßte.

Wichtig würden diese Mittel wirken auf sittliche und wissenschaftliche Ausbildung und gute Früchte würden sich bald zeigen!

Ueber alle einzelnen Punkte darf ich mich länger verbreiten, wenn ich nicht den Vorwurf, ermüden, auf mich laden will.

Wenn ich mir so mit Gegenwärtigem erlaube Ihnen einige Gedanken in Bezug auf das auszusprechen was der Pharmacie nützlich sein könnte, so glaube noch einmal auf das Motto

*»Einigkeit macht stark!«*

zurückkommen zu dürfen, mit dem Wunsche, daß *Ein Apothekerverein* in ganz Deutschland sich begreife wie es *Ein Zweck* ist, den die Pharmacie hat, nämlich

»für Menschenwohlfahrt zu arbeiten und die besten Güter der Erde, Leben und Gesundheit zu wahren und herstellen zu helfen!«

Lassen Sie uns die Schwierigkeiten dieses Ziels, verehrten Herren Collegen, nicht läugnen, Sie uns aber auch nur den guten Willen haben dann den Gesamtkräften vertrauen; denn der Sucher ist auch der sichere Finder! und wir werden die Schwierigkeiten besiegen und herrliche Früchte dieser vereinten Arbeit erndten!

### Hohes Wohlwollen für den Verein.

In Verfolge der im *LXX. Bande S. 109 u. 22 Vereinszeitschrift* gemachten Mittheilungen legen noch folgende hohe Erlasse den verehrten Herren gliedern vor:

#### IX.

Wir haben die von Ihnen als zeitigem Oberster des Apothekervereins in Norddeutschland u. 8. Juni d. J. anher überreichte Eingabe erhalten, sind in Anerkennung der wohlthätigen wissenschaftlichen Wirksamkeit des Vereins, gern bereit, demselben sich die Gelegenheit dazu bieten wird, förderlich zu sein. Es ist deshalb dem Herzogl. Ober-Sanitätskollegium hierneben aufgegeben, Uns in den vorkommenden Fällen die geeigneten Vorschläge zu machen und uns zu veranlassen, dieser Behörde zu Ende die etwaigen Wünsche mitzutheilen.

Braunschweig, am 5. August 1839.

Herzogl. Braunschweig-Lüneburg. Staatsminister  
Schulz.

An den Hrn. Hofrath und Medicinalrath Dr. Brandes zu Salzuflen.

## X.

Ew. Wohlgeboren gefälliges Anschreiben vom 18. Juli d. J. wegen höchster Anerkennung des Apothekervereins in Norddeutschland in den diesseitigen Herzogl. Landen haben wir erhalten und verfehlen nicht, für die damit eingesandten Druckschriften hierdurch unsern ergebensten Dank dafür auszudrücken und Ew. Wohlgeboren dabei zugleich bemerklich zu machen, daß unsererseits der weitem Ausbreitung dieses Vereins im hiesigen Herzogthum keine Schwierigkeiten entgegengestellt werden sollen, wir derselben vielmehr gern förderlich sein wollen, auch die Herzogl. Medicinalbehörde zur Anschaffung des Archivs der Pharmacie für ihre Bibliothek veranlaßt haben, da wir uns von demselben einen wesentlichen Nutzen, namentlich für die rücksichtlich der literarischen Hilfsmittel sehr beschränkten Apotheker in den kleineren Städten unsers Landes versprechen dürfen.

Dessau, am 3. August 1839.

Herzogl. Anhalt. Cammer.

Mohs.

An den Hrn. Hof- und Medicinalrath Dr. Brandes.

### Ehrenbezeugung für den Verein.

Der Hr. Geh. Obermedicinalrath Professor Dr. Wurzer in Marburg hat sein neuestes Werk: »Medicinisch-pharmaceutische Receptirkunde für angehende Aerzte und Wundärzte u. s. w. Marburg, bei Chr. Garthe. 1839.« den sämmtlichen Herren Mitgliedern des Apothekervereins in Norddeutschland zum Zeichen seiner innigsten Verehrung gewidmet. Dieses Zeichen der Anerkennung von einem so hochverdienten und hochgefeierten Manne muß allen Mitgliedern höchst erfreulich sein. Es liegt deutlich darin der Ausspruch, daß das Streben des Vereins nicht ohne Erfolg ist. Für so wohlwollende Gesinnungen bringen wir dem hochverehrten Jubelgreise im Namen aller Mitglieder des Vereins den innigsten, den gefühltesten Dank dar.

Das Directorium des Vereins.

Aschoff. Brandes. Du Menil. Overbeck.  
Wilken. Witting.  
L. Aschoff. Faber.

### Weitere Verbreitung des Vereins.

Dem Directorio des Vereins gereicht es zur größten Freude, hiermit anzuzeigen, daß auch mehrerer verehrten Herren Collegen in Berlin dem Verein beitreten werden, und daß durch die erfolgreichen Bemühungen des Hrn. Apothekers Dr. Meurer in Dresden und gleichgesinnter Collegen der Verein mehr auch im Königreich Sachsen eine erfreuliche Aufnahme gefunden hat. Durch den Beitritt unserer verehrten Collegen in Sachsen hat die Anstalt eine Erweiterung erhalten, die allen Mitgliedern ehrenvoll ist, eine neue Theilnahme, eine neue Mitwirkung zu ihren schönen Zwecken, woraus gewiß Resultate hervorgehen werden, die für das Ganze nützlich und lohnend sind. Die bis jetzt beigetretenen Collegen aus Dresden und der Umgegend sind:

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hr. Apotheker | Dorn in Dresden,                |
| »             | » Ficusin daselbst,             |
| »             | » Gros das.,                    |
| »             | » Gruner das.,                  |
| »             | » Hoffmann das.,                |
| »             | » Dr. Meurer das.,              |
| »             | » Dr. Struve das.,              |
| »             | » Wetzels das.,                 |
| »             | » Abendroth in Pirna,           |
| »             | » Hederich in Moritzburg,       |
| »             | » Schmidt in Potschappel,       |
| »             | » Opitz in Haynchen,            |
| »             | » Dohmke in Meissen,            |
| »             | » Rouanet in Wormsdorf,         |
| »             | » Kluge in Dippoldiswalde,      |
| »             | » Scheitz in Grossenhayn,       |
| »             | » Neuppert in Zittau,           |
| »             | » Vogel in Kötzschenbrode,      |
| »             | » Wiedemann in Freiberg,        |
| »             | » Fischer in Colditz,           |
| »             | » Gruner in Tharandt,           |
| »             | » Adler in Riesa,               |
| »             | » Kriebel in Hohnstein,         |
| »             | » Urban in Brandt bei Freiberg, |
| »             | » Leuthold in Bischoffswerda,   |
| »             | » Wolff in Neukirch,            |
| »             | » Seele in Neusalze,            |
| »             | » Strasser in Lengfeld,         |
| »             | » Töpfer in Zschopau,           |



Hr. Apotheker **Klaucke** in Bautzen,  
»       »       **Just** in Herrenhuth,  
»       »       **Hennig** in Weissenberg,  
»       »       **Schönfelder** in Bernstädt,  
»       »       **Erselius** in Grossschönau,  
»       »       **Busse** in Dohna.

Sobald die noch ferner zu erwartenden Anmeldungen eingegangen sind und darnach die Organisation des Vereins im Königreich Sachsen geordnet ist, wird darüber weiter Bericht erstattet werden.

Der Oberdirector des Vereins.  
**Brandes.**

---

### **Eintritt neuer Mitglieder.**

---

Die Herren, Apotheker **Dr. Erdmann**, Apotheker **Günther** und Apotheker **Kunde** in Berlin sind, nach Anmeldung durch **Hrn. Kreisdirector Geiseler**, als wirkliche Mitglieder des Vereins in den Kreis Berlin aufgenommen worden.

Hr. Apotheker **Bender** in Spangenberg ist, nach Anmeldung durch **Hrn. Vicedirector Müller**, als wirkliches Mitglied des Vereins in den Kreis Medebach aufgenommen worden.

Desgl. Hr. Apotheker **Karth** in Rheinberg, nach Anmeldung durch **Hrn. Kreisdirector Schmithals**, in den Kreis Xanten.

Desgl. Hr. Administrator **Werner** in Braunschweig, nach Anmeldung durch **Hrn. Vicedirector Herzog**, in den Kreis Braunschweig.

Desgl. Hr. Apotheker **Weiss** in Strasburg, nach Anmeldung durch **Hrn. Vicedirector Bolle**, in den Kreis Angermünde.

Desgl. Hr. Apotheker **Lutterkorth** in Briesen, Hr. Apotheker **Taubert** in Tütz, Hr. Apotheker **Vinsky** in Schlappe, Hr. Provisor **Caspari** in Hammerstein, nach Anmeldung durch **Hrn. Kreisdirector Schultze**, in den Kreis Conitz.

Desgl. Hr. Apotheker **Kupffender** in Bromberg, nach Anmeldung durch **Hrn. Vicedirector Weiss**, in den Kreis Bromberg.

Desgl. Hr. Apotheker **Schreiber** in Melle, nach Anmeldung durch **Hrn. Kreisdirector Upmann**, und an die Stelle des zum Drogueriefach übergegangenen **Hrn. Krebs**, in den Kreis Osnabrück.

Desgl. Hr. Apotheker **Schöpff** in Hirschberg a. d.

Saale, nach Anmeldung durch Hrn. Vicedirector Dreykorn, in den Kreis Jena.

Der Oberdirector des Vereins  
Brandes.

---

### Vicedirectorium Weimar.

---

Die erfreuliche Theilnahme, welche der Verein im Großherzogthum Weimar gefunden hat, ist die Veranlassung geworden, dort ein besonderes Vicedirectorium zu begründen. Unser verehrter Hr. College Dreykorn, der um den Verein schon so viele Verdienste erworben hat, ist zum Vicedirector für das Vicedirectorium Weimar erwählt worden, und hat auf unsern Wunsch dieses Amt angenommen. Das Vicedirectorium Weimar besteht aus den drei Kreisen Weimar, Jena und Saale.

Der Oberdirector des Vereins  
Brandes.

---

### Generalkasse.

---

1) Die Abrechnungen vom Jahre 1839 gingen ein. Hrn. Vicedirector Dugend in Oldenburg, Hrn. Vicedirector Dreykorn in Neustadt a. d. Orla, Hrn. Vicedirector Tren in Stendal, Hrn. Vicedirector Dr. Feller in Cassel und Hrn. Kreisdirector Jonas in Oldenburg. Nach Rechtsbefund ist Decharge darüber ertheilt worden.

2) Die Herren Mitglieder, welche ihre diesjährigen Beiträge zur Generalkasse, die für jedes Mitglied im Bereich Königl. Preuss. und Fürstl. Thurn- und Taxischer Posten 6 Rthlr. 4 Ggr., für jedes andere Mitglied 5 Rthlr. 16 Ggr. betragen, noch nicht eingesandt haben, werden um deren baldigste Einsendung nachmals ersucht.

3) Die betreffenden Herren Vereinsbeamten werden ersucht, von den bereits eingegangenen diesjährigen Beiträgen der Generalkasse vorläufige Einsendungen zu machen, damit dieselbe schuldige Zahlungen zu bewerkstelligen im Stande ist.

Die Direction der Generalkasse  
Dr. E. F. Aschoff.

---

## Vereinskapiial.

---

Die Eintrittsgelder gingen dazu ein:

Aus dem Vicedirectorium im Königreich Sachsen:  
von den sämtlichen oben angeführten Mitgliedern des-  
selben.

Aus dem Kreise Jena: von Hrn. Apotheker Schöpff  
in Hirschberg an der Saale.

Die Verwaltung des Vereinskapiitals.  
Brandes. Aschoff. Overbeck.

---

Bucholz - Gehlen - Trommsdorff'sche Stiftung zur  
Unterstützung armer ausgedienter und würdiger  
Apothekergehülfen.

---

### I.

Der Fond unserer Stiftung, welcher, laut Mitthei-  
lung im Märzhefte des Vereinsarchivs für 1839, in dem  
Jahre 1838

= 14,636 Thlr. 9 Sgr. 3 Pf. =

betrug, ist nach dem diesjährigen Abschlusse vom 31.  
December 1839 und einschliesslich des *Trommsdorff'schen*  
*Stipendiums*, welches sich durch Ansammlung von Zin-  
sen um 100 Thaler vermehrt hat, sowie der Schröder-  
schen und Schmidt'schen Vermächtnisse, auf

= 15,198 Thlr. 18 Sgr. 3 Pf.

angewachsen. Es hat sich derselbe also in diesem Jahre um

= 562 Thlr. 9 Sgr. =

vermehrt, durch milde Beiträge und Zinsen.

### II.

Folgende würdige und hülfbedürftige Pharmaceu-  
ten wurden im Laufe des Jahrs 1839 unterstützt:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Hr. Beez in Winkel   | mit 30 Thlr. |
| » Hintze in Berlin   | » 30 »       |
| » Heller in Gorlosen | » 25 »       |
| » Röder in Gebesen   | » 25 »       |
| » Flohr in Stollberg | » 30 »       |
| » Kalbe in Templin   | » 30 »       |
| » Bleisch in Glatz   | » 30 »       |
| » Uffeln in Medebach | » 20 »       |

---

Uebertrag 220 Thlr.

(letztere aus dem Tromms-  
dorff'schen Stipendium.)

|                                 |           |     |       |
|---------------------------------|-----------|-----|-------|
|                                 | Uebertrag | 220 | Thlr. |
| Hr. Schwarz in Bernburg         | mit       | 25  | »     |
| » Meißner in Ziesar             | »         | 25  | »     |
| » Hummel in Rossenfelde         | »         | 25  | »     |
| » Möhring in Werningerode       | »         | 22  | »     |
| » Polnow in Lenzen              | »         | 25  | »     |
| » Zickner in Dardesheim         | »         | 25  | »     |
| » Karbe in Königsb. i. d. Neum. | »         | 25  | »     |
| » Crowecke in Nemitz            | »         | 25  | »     |
| » Lohmann in Goslar             | »         | 20  | »     |
| » Koch in Höxter                | »         | 15  | »     |
| » Stertel in Cassel             | »         | 10  | »     |
| » Peithmann in Volkmarsen       | »         | 15  | »     |
| » Renner in Warstade            | »         | 20  | »     |
| » Hilberts in Soest             | »         | 25  | »     |

Zusammen 522 Thlr.

### III.

An milden Beiträgen sind im Laufe des Jahrs bei uns eingegangen:

|                                               |                |                    |       |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------|-------|
| Durch Hrn. Apotheker Riedel in Berlin:        |                |                    |       |
| von Hrn. Medicinalrath Staberoh in Berlin 10' |                |                    |       |
| »                                             | »              | Apotheker Appelius | » » 3 |
| »                                             | »              | » Bärwaldt         | » » 3 |
| »                                             | »              | » Becker           | » » 3 |
| »                                             | Frau Wittwe    | Behrens            | » » 1 |
| »                                             | Hrn. Apotheker | Blell              | » » 1 |
| »                                             | »              | Bernard            | » » 5 |
| »                                             | »              | Bolle              | » » 2 |
| »                                             | »              | Beyrich            | » » 2 |
| »                                             | »              | Danneel            | » » 3 |
| »                                             | »              | Erhard             | » » 2 |
| »                                             | »              | Günther            | » » 2 |
| »                                             | »              | Hertz              | » » 5 |
| »                                             | »              | Jaenike            | » » 5 |
| »                                             | »              | Jung               | » » 2 |
| »                                             | »              | Dr. Koblack        | » » 3 |
| »                                             | »              | Luchtz             | » » 2 |
| »                                             | »              | Lourde             | » » 5 |
| »                                             | »              | Lange              | » » 1 |
| »                                             | »              | Dr. Lucä           | » » 3 |
| »                                             | »              | Meyerhoff          | » » 2 |
| »                                             | »              | Riedel             | » » 5 |
| »                                             | »              | Ring               | » » 1 |
| »                                             | »              | Rose               | » » 5 |
| »                                             | »              | Schacht            | » » 2 |
| »                                             | »              | Schmeißer          | » » 2 |



|                    |               |           |         |
|--------------------|---------------|-----------|---------|
| von Hrn. Apotheker | Simon         | in Berlin | 3 Thlr. |
| » » »              | WVallmüller   | » »       | 1 »     |
| » » »              | WVoltersdorff | » »       | 2 »     |

Ferner wurde eingesandt:

|                      |             |               |                 |
|----------------------|-------------|---------------|-----------------|
| von Hrn. Apotheker   | Heller      | in Lenzen     | 1 »             |
| » » »                | Frobenius   | in Suhl       | 1 »             |
| » » »                | WViewiger   | in Zeulenrode | 1 »             |
| » » Gehülfen         | Fischaupt   | in Voehle     | $\frac{1}{2}$ » |
| » » Apotheker        | Hartmann    | in Magdeb.    | 1 »             |
| » » »                | Faber       | » »           | 1 »             |
| » » »                | Reibe       | » »           | 1 »             |
| » » »                | Käufsmacher | » »           | 1 »             |
| » » »                | Kostenoble  | » »           | 1 »             |
| » » »                | Kleinau     | » »           | 1 »             |
| » » Apoth. u. Viced. | Müller      | » Medeb.      | 3 »             |

Durch Hrn. Medicinalrath Dr. Fiedler in Cassel:

1) Von den Herren Aerzten in Cassel:

|                           |                     |         |
|---------------------------|---------------------|---------|
| von Hrn. Ob.-Med.-Direct. | Ritter Dr. Heräus   | 1 Thlr. |
| » » Geh.Ob.-Med.-R.       | Ritter Dr. Waldmann | 1 »     |
| » » » » »                 | Dr. Harnier         | 1 »     |
| » » » » »                 | Dr. Mangold         | 1 »     |
| » » » » »                 | Stracke             | 1 »     |
| » » Med.-Rath             | Dr. Wehr            | 1 »     |
| » » » » »                 | Valentin            | 1 »     |
| » » Stadtphysikus         | Dr. Wagner          | 1 »     |
| » » Med.-Rath             | Dr. Schuchardt      | 1 »     |
| » » Hofmedicus            | Dr. Galland         | 1 »     |

2) Von den Herren Apothekenbesitzern und andern Wohlthätern in Cassel:

|                        |             |         |
|------------------------|-------------|---------|
| von Hrn. Med.-Rath     | Dr. Fiedler | 3 Thlr. |
| » » Ober-Med.-Assessor | Dr. Wild    | 3 »     |
| » » Hofapotheker       | Rüde        | 6 »     |
| » » Apotheker          | Krüger      | 2 »     |
| » » »                  | Braun       | 1 »     |
| » » »                  | Lippe       | 2 »     |
| » » »                  | Scherb      | 1 »     |
| » » »                  | Gläfsner    | 1 »     |
| » » »                  | Schwarzkopf | 2 »     |
| » » »                  | Seitz       | 1 »     |
| » » Fabrikant          | Habich      | 1 »     |
| » » Droguist           | Escherich   | 1 »     |
| » » »                  | Helmuth     | 1 »     |

3) Von Wohlthätern aus der Umgegend von Cassel:

|                          |               |            |         |
|--------------------------|---------------|------------|---------|
| von Hrn. Ob.-Med.-Rath   | Dr. Schneider | in Fulda   | 1 Thlr. |
| » » Med.-Ass., Univ.-Ap. | Riepenhausen  | in Marburg | 4 »     |

|          |           |                                |                    |   |
|----------|-----------|--------------------------------|--------------------|---|
| von Hrn. | Med.-Ass. | Ap. R u p p e r s b e r g      | in Marb.           | 3 |
| »        | »         | Hofapotheker H e f s           | daselbst.....      | 3 |
| »        | »         | Rathsapotheker B e t h e       | in Clausthal....   | 4 |
| »        | »         | Apothekergehülften L e n z e r | daselbst...1       |   |
| »        | »         | »                              | Link daselbst..... | 1 |
| »        | »         | »                              | Braun in Eschwege  | 1 |

#### 4) Von den Herren Apothekergehülften in Cassel

von Hrn. Nagel .....1 Thlr.

» » Quiring .....1 »

» » Werneburg...1 »

» » Lohrey .....1 »

» » Weber.....1 »

» » Höne .....1 »

» » Riepenhausen.1 »

» » Statsmann.....1 »

» » Hofmann .....1 »

von den Mitgliedern des Apothekervereins im nördlichen  
Deutschland zusammen.....315Thlr.

von Hrn. Kreisph. Dr. Wittcke in Erfurt 2 » 22 Sgr

von den sechs Apothekern Erfurts.....12 »

Indem wir obiges Resultat unseres diesjährigen Wirkens und diese Listen der edlen Geber hiermit Oeffentlichkeit übergeben, können wir nicht unterlassen denselben auf das herzlichste für diesen abermaligen weis Ihrer innigen Theilnahme an dem Bestehen und allmäligen Erweiterung eines Institutes zu danken, welches so viel schon zur Linderung des Elendes unserer nothleidenden Gehülften beitrug, und welches nach vorliegenden Bedürfnisse und der jährlich sich mehr den Zahl der Hülfbedürftigen einer sich steigern Theilnahme bedarf, wenn die noch immer niedrigen Zahlen unserer baaren Unterstützungen nach und nach sich höher stellen sollen, um im Sinne der Humanität im treuen Dienste ergrauten oder verunglückten Gehülften so zu stellen, daß er ohne bange Sorgen seinem Alter leben kann.

Möchten daher — wir wiederholen unsere jährlichen Wünsche auch dieses Mal — alle Begüterten unseres Faches sich der guten Sache annehmen, möchten Sie durch namhafte Jahresbeiträge die von uns verwalteten Fonds vermehren helfen, hierdurch die Ehre und Würde unserer Pharmacie befördern, und dem Andenken unserer unvergeßlichen Stifter den dauernden Denkstein setzen.

Die mit unterzeichneten Apotheker Erfurts sind jederzeit bereit, die zur Verwaltung der Stiftung ge-

igen Bücher, Rechnungen und Belege den verehrlichen  
Gebem vorzulegen.

Erfurt, den 31. December 1839.

Der Vorstand der Bucholz-Gehlen-Trommsdorff'schen  
Stiftung zur Unterstützung armer ausgedienter und  
würdiger Apothekergehülften.

Der Vorstand der Stiftung  
in Erfurt.

Der Vorstand der Stiftung  
Seitens des Apothekerver-  
eins in Norddeutschland.

Koch, Lucas. Bucholz.  
Frenzel, Trommsdorff.  
Stumme.

R.Brandes. E.F.Aschoff.  
Overbeck.

### Todesfall.

Am 9. December Abends 5 Uhr entschlummerte Hr.  
Apotheker Aug. Merkel, Provisor der Kurfürstlich-  
Hessischen Hospitalapotheke in Haina, Mitglied unsers  
Kreises, im 26. Jahre zu einem bessern Leben.

Medebach,  
den 9. Dec. 1839.

Müller,  
Vicedirector.

Die Jussieusche Versammlung des Kreises Mede-  
bach, gehalten zu Corbach den 8. Juli 1839.

Wenngleich im verflossenen Jahre die Döbereiner-  
sche Versammlung zu Wildungen den Beschluß gefaßt  
hatte, sich auch in diesem Jahre wieder in jenem Orte  
zu vereinigen, so hatte doch der Zutritt sehr vieler  
neuer Mitglieder, so wie andere eingetretene Verhält-  
nisse von verschiedenen Seiten es höchst wünschenswerth  
gemacht, einen anderen zweckmäßigen Ort zur dies-  
jährigen Feier zu wählen. Als ein solcher wurde fast  
von sämtlichen Mitgliedern, nach vorhergegangener  
Einladung — Corbach — die Hauptstadt des Fürsten-  
thums Waldeck bezeichnet, wo man sich an dem fest-  
gesetzten Tage in dem für die Versammlung bestimmten  
Locale des Hofes von England freundlich begrüßte.

Außer den anwesenden Mitgliedern des Kreises  
hatten auch mehrer Gäste sich eingefunden, wie Hr.  
Kreisdirector Dr. Ruwe, Gymnasiallehrer Schotte,  
Gymnasiallehrer v. Rheins u. a.

Nachdem der Vicedirector Apotheker Müller der  
Versammlung eröffnet, daß die diesmalige Stiftungsfeier

dem Andenken der grossen französischen Botaniker, Jussieu's, gewidmet sei und die grossen Verdienste die Ehrenmänner geschildert hatte, hielt derselbe einen Vortrag über die Entstehung der Pharmacie, die Geschichte derselben und über die grossen Leistungen der Pharmaceuten in den neuesten Zeiten.

Hr. Apotheker K ü m m e l hatte einen neuen Apparat zur Entwicklung von Arsenikwasserstoffgas construiert, welcher allgemeinen Beifall erhielt, so wie die mit angestellten Versuche für die Versammlung höchst interessant und belehrend waren.

Hr. Apotheker K u n k e l überreichte ein Verzeichnis der in der Umgegend von Corbach wachsenden Pflanzen. Diesem war eine vollständige Sammlung von getrockneter Exemplare beigelegt, woraus überhaupt hervorging, dass neben manchen seltenen Pflanzen die Gegend von Corbach reich an Orchideen ist.

Apotheker M ü l l e r sprach sodann über die Bedeutung des Polychroms und zeigte die schillernden Eigenschaften desselben durch angestellte Versuche, wobei besonders das Verhalten der Schwefelsäure zu demselben Erwähnung verdient. Eine Auflösung des Polychroms in Wasser wird nämlich seiner schillernden Eigenschaften durch Zusatz von Schwefelsäure ganz beraubt. Setzt man indessen die zugefügte Säure wiederum mittelst Alkalien, so wird nicht allein das Schillernde der Flüssigkeit von neuem wieder hervorgerufen, sondern es entstehen auch die verschiedensten Farbennüancen.

Hr. Apotheker Heinzerling sprach über die Bildung einiger neuen Kreise im Großherzogthum Hessen, wozu demselben die thätigste Mitwirkung von allen Seiten zugesichert wurde.

Hr. Apotheker K ü m m e l überreichte der Versammlung nach verschiedenen Methoden bereitetes Amygdalin und machte dieselbe durch sehr belehrende Versuche mit den Eigenschaften des Amygdalins bekannt.

Die Droguisten Rofs & D ö p p e r in Duisburg hatten zu unserer Versammlung einige recht ausgezeichnete Waaren eingesandt, als:

*Ost- und Westindischen Copal, Rad. Rhei et Jalapae, Colocynthides, Canella alba, Fol. Senn., Gummi arabicum, Ammoniacum, Myrrha, Mastiche, Crystall. Tart., Olibanum, Amylon, Tragacantha u. s. w.,*

welche wegen ihrer vorzüglichen Güte allgemeine Anerkennung fanden.

Apotheker M ü l l e r zeigte noch Inulin, Hippursäure



Harnstoff, Kleber nach Beccaria dargestellt, Leinsamenschleim, Althaegummi, Goldfirnis vor, wobei zugleich die Darstellungsmethoden und Eigenschaften derselben angeführt wurden.

Hr. Apotheker Kunkel hatte von Hrn. Jobst in Stuttgart ausgezeichnete Rhabarber und Weinstein erhalten, welche derselbe zur Ansicht vorlegte. Ferner wurde von demselben Kupfervitriol, Kupferkiese und noch andere Mineralien überreicht, worüber derselbe Analysen angestellt hatte, und welche von demselben vorgetragen wurden.

Hr. Apotheker Kümmel hielt alsdann einen Vortrag über *Resina Jalap.*, durch die Verdrängungsmethode bereitet, über kleeaures Chromoxydkali, durch Versuche erläutert, und zeigte alsdann noch ausgezeichnete Krystalle von Kupfervitriol, rohen Kampfer, gekörnten Storax und Sarsaparille vor.

Nachdem der Apotheker Müller einige Proben von sehr sauber aus Ahornholz gearbeiteten Büchsen vorgezeigt hatte, machte derselbe noch Mittheilungen über die von ihm angestellten Versuche des Verhaltens des Menschenbluts und Thierbluts, um solche bei gerichtlichen Untersuchungen anwenden zu können, deren Resultate später fürs Archiv übersandt werden sollen.

Hr. Apotheker Roeseler in Winterberg, verhindert zu erscheinen, hatte uns interessante Beobachtungen über das Gefrieren von Mandelöl bei großer Kälte schriftlich mitgetheilt. Ferner bemerkte derselbe, daß, da man jetzt so sehr schlechte, ihre Dienste stets versagende und sehr theure Blutegel halten müsse, wobei man nie die Auslagen wieder erhalte, es höchst zweckmässig sein würde, einen Blutegelteich in Benninghausen bei Lippstadt, als den nach seiner Ansicht geeigneten Ort, anzulegen. Dieser Vorschlag wurde höchst günstig aufgenommen und bedurfte es demnach zur Realisirung eines solchen Unternehmens des Beitritts der anderen Herren Collegen in den Kreisen Arnberg, Lippstadt und Siegen.

Hr. Apotheker Niemann in Bigge brachte die Gewerbesteuerpflichtigkeit der Apotheker zur Sprache, welche nach der Ansicht aller Collegen nur als höchst drückend, ja sogar herabwürdigend angesehen werden muß; denn erwägt man nur allein, aller andern Verhältnisse nicht gedenkend, die Anforderungen, welche man von Seiten des Staats jetzt an den Apotheker macht, die ihn dem Arzte wohl ganz gleich stellen, so wird es

che  
macht,  
wird es a

gleich einleuchtend, daß dieses Gesetz auf unrichtigen Principien über die Stellung des Apothekers zum öffentlichen gewerbtreibenden Publicum beruht.

Auch das immer noch vorkommende Selbstsüßsiren mancher Aerzte, der Handel mit Arzneiwaaren Krämern, so wie der homöopathische Unsinn, wo der Apotheker selbst bei den gewagtesten Schritten geschützt wird, wurde vom Hrn. Apothekermann berührt. Wir wollen hoffen, daß bald der richtige Zeitpunkt erscheinen möge, wo man die widerdrückenden Verhältnisse der Pharmaceuten erleichtern, die großen, besonders in der letzten Zeit geschafften Leistungen derselben anerkenne, so wie die Stellung derselben im Staate einer gerechten Beurtheilung unterworfen wird.

Da das Fürstenthum Waldeck in naturhistorischer Hinsicht noch wenig bekannt und um überhaupt Liebe und Wißbegierde für gemeinnützige Gegenstände der Naturkunde im Allgemeinen durch reges Zusammenwirken zu wecken und zu befriedigen, schlug Apotheker Müller vor, in diesem Fürstenthum einen naturwissenschaftlichen Verein zu gründen, welcher allgemeinen Anklang fand, und wurde beschlossen, diesen Plan Höhern Orts vorzutragen und alsdann in Ausführung zu bringen.

Der Apotheker Müller machte ferner die versammelten Herren auf das unserm Collegen Linke in Neustadt betroffene Brandunglück aufmerksam, worüber im *zweiten Hefte des 18. B., 2. R., unseres Archivs* S. 10 die Rede ist und bat, nach Kräften mitzuwirken zur Linderung der großen Noth dieses braven Collegen, welchem Wunsch man denn auch gern entgegen kam.

Hier möchte es denn auch am Orte sein, die Bitten des Hrn. Collegen des Vicedirectoriums ergebenst bitten, Unterstützungen diesem Hülfbedürftigen zu leisten zu lassen, welche ich gern für denselben in Empfang nehmen werde; denn nicht genug ist es, daß man solche Aufforderungen liest und dann ohne zu wirken bei Seite legt. Wir sind als Mitglieder des Apothekervereins in Norddeutschland dazu verpflichtet, nach Kräften da Hülfe zu leisten, wo es die Noth erfordert: können doch auch ähnliche Unglücksfälle über uns herebrechen, und wie sehr würde es uns dann betrüben können, wenn wir von unsern Collegen vergessen würden.

Es wurde nun noch von demselben ein Verzeichnis der Pflanzen seines Herbariums vorgelegt, um dadurch

den andern Herren Gelegenheit zu geben, mit ihm einen Tausch gegen andere Pflanzen zu treffen, worauf man sich zu einem recht fröhlichen Mahle vereinigte und wobei unter andern hochgestellten Männern besonders des Stifters unsers Vereins, Hrn. Hofrath Medicinalrath Dr. R. Brandes gedacht und ihm die erste Huldigung dargebracht wurde.

Nach Beendigung desselben schritt man zur Wahl des Versammlungsortes im künftigen Jahre, wobei beschlossen wurde, dafs nur diejenigen Mitglieder künftig Stimme in dieser Beziehung haben sollten, welche wirklich der Versammlung beiwohnten und wurde von sämmtlichen Herren wieder Corbach gewählt, wo man sich im Juli künftigen Jahres unter noch später näherer Bestimmung des Tages wieder zu vereinigen gedenkt.

Einer Einladung von Seiten der Hrn. Apotheker Kümmer und Krüger, eine recht reichhaltige Conchylien- und Droguensammlung, so wie noch eine Auswahl von Apparaten in Augenschein zu nehmen, folgte man noch gern, worauf man sich, unter dem allseitigen Versprechen, für den Verein nach Kräften fortzuarbeiten, trennte.

Müller.

## 2) Personalnotizen.

Se. Majestät der König von Preussen haben dem Geh. Obermedicinalrath Professor Dr. Wurzer in Marburg den rothen Adlerorden dritter Klasse verliehen.

Hr. Professor Dr. Wöhler in Göttingen, Hr. Professor Dr. Mirbel in Paris und Hr. Prof. Dr. Dove in Berlin, sind von der Akademie der Wissenschaften in München zu auswärtigen Mitgliedern erwählt worden.

Hr. Geh. Rath Prof. Dr. Osann in Berlin, und Hr. Prof. Dr. C. Ritter daselbst, haben die Schleife zum rothen Adlerorden 3r Klasse erhalten.

Hr. Medicinalrath Dr. Zenzen in Mainz hat den rothen Adlerorden 3r Klasse und Hr. Prof. Agassiz in Neuchâtel denselben Orden 4r Klasse erhalten.

Hr. Dr. Eduard Rüppell zu Frankfurt ist von der botanischen Gesellschaft auf Java zum correspondirenden Mitgliede erwählt worden.

Hr. Prof. Dr. Dieffenbach in Berlin ist zum Geheimen Medicinalrath ernannt worden.

Der Magistrat zu Salzburg hat dem practischen Arzt

Dr. Lessing in Berlin, auf Anlaß der von ihm in einer besondern Schrift übernommenen Ehrenrettung des berühmten Paracelsus, der als Bürger von Salzbach verstarb, das Ehrenbürgerrecht dieser Stadt ertheilt; darüber ausgefertigte Diplom ist von der Kais. Oest. Regierung bestätigt worden.

Die pharmaceutische Gesellschaft zu St. Petersburg hat den Hrn. Hofrath und Professor Dr. Wackenroder in Jena zum Ehrenmitgliede erwählt.

Der Großherzogl. Badische Verein für Naturkunde in Mannheim hat Hrn. Apotheker Müller in Medebach Vicedirector unsers Vereins, zum Mitgliede erwählt.

Die pharmaceutische Gesellschaft in St. Petersburg hat die Herren: Obermedicinalassessor Dr. Fiedler in Cassel, Apotheker Dr. Herzog in Braunschweig, Apotheker Bucholz und Apotheker Trommsdorff in Erfurt, Apotheker Jonas in Eilenburg, Hofapotheker Dr. Bucholz in Gotha, Apotheker Jahn in Meiningen, Apotheker Bolle in Angermünde, Apoth. L. Aschmann in Bielefeld, Medicinalassessor Dugend in Oldenburg, Hofapotheker Sehlmeier in Cöln, Apotheker Müller in Medebach, Apotheker Dr. Voget in Heinsberg, Apotheker Dr. Marder in Gummersbach, Apotheker Geiseler in Königsberg in der Neumark, Apotheker Overbeck in Lemgo und Apoth. Wilken und Apoth. Faber in Minden, zu Ehrenmitgliedern erwählt.

Se. Majestät der König von Preussen haben dem Hofrath und Medicinalrath Dr. Brandes den rothen Adlerorden 3r Klasse mit der Schleife zu verleihen geruht.

### 3) Gelehrte Gesellschaften und Lehranstalten.

#### Akademie der Medicin in Paris.

*Sitzung am 21. Mai 1839.* Henry las einen Bericht über das Mineralwasser von Saint Galmier (Loire) über die Thermen von Algier und über die Mineralquellen von Vic. — Lodibert: officielle Berichte über Geheimmittel; er zeigt, daß die dem Minister eingesandten Arcana nichts seien als unbedeutende, meist auf bekannte oder veraltete Heilmittel sich beziehende Formeln.

\*) Das ist schon so viel erwiesen, und doch wird das Unwissen damit noch geduldet. Br.



*Sitzung am 11. Juni.* Double machte über das neue Maafs- und Gewichtssystem für Aerzte und Apotheker nach amtlicher Aufforderung folgende Vorschläge: 1) vom Januar 1840 an werden die Verordnungen der Aerzte nach dem neuen Decimalsystem für Gewicht und Maafs verschrieben; 2) die Aerzte können ihre Verordnungen auch nach dem alten System verschreiben, und dem Apotheker die Sorge überlassen, die Reduction auf das Decimalgewicht vorzunehmen; 3) alle Professoren der Medicin und Pharmacie des Königreichs dürfen bei ihrem Unterricht keine anderen Formeln als nach dem neuen Decimalsystem anwenden; eben das gilt in den Schriften der Aerzte und Apotheker. Folgende Tabelle zeigt die Verhältnisse des alten Gewichts zum neuen.

## I.

| Altes Gewicht : | Genauer Werth :                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Pfund           | $\frac{1}{2}$ Kilogrm. oder 500 Grm., |
| Unze            | 3 Decagrm. und 11 Gran,               |
| Drachme         | 4 Grammen weniger 3 Gran,             |
| Gran            | 5 Centigr. und $\frac{1}{7}$ Gran.    |

## II.

| Altes Gewicht : | Sehr annähernder Werth :              |
|-----------------|---------------------------------------|
| Pfund           | $\frac{1}{2}$ Kilogrm. oder 500 Grm., |
| Unze            | 3 Decagrm. oder 30 Grm.,              |
| Drachme         | 4 Grammen,                            |
| Gran            | 5 Centigrm.                           |

Nach einer langen Discussion wurde der Bericht genehmigt.

*Sitzung am 9. Juli.* Lecanu: Ueber den Harn im normalen und krankhaften Zustande.

*Sitzung am 16. Juli.* Orfila: Von den Mitteln, um sich zu überzeugen, daß der Arsenik, den man bei gerichtlich-chemischen Versuchen erhalten hat, nicht von den dabei angewandten Reagentien und Gefäßen herrührt.

## Gesellschaft für medicinische Chemie in Paris.

*Sitzung am 1. Juli 1839.* Beral überreichte zwei Instrumente zum Einathmen von Kampfer- und Aetherdunst. — Guibourt machte mehre Mittheilungen aus dem Archiv der Pharmacie des Apothekervereins in Norddeutschland. — Lassaigne: Ueber die chemische Zusammensetzung der Guttural-Ganglien des Pferdes. — Bouis von Perpignan, übersandte eine Tabelle über den Alkoholgehalt der Weine im Dep. der Pyrenäen. —

**Grimaud von Poitiers**, einen Aufsatz über die Färl des Arseniks.

*Sitzung am 5. Aug.* Es gingen folgende Mittheilungen ein: **Poumaredé**: Ueber Vergiftung mit safters. Silber. — **Vadamme** zu Harzebruk und **Chevallier** zu Amiens: Ueber Hederin, eine neue Pflanzsubstanz. — 4) eine Abhandlung über Vergiftung Crotonöl.

---

### Pharmaceutische Gesellschaft in Paris.

---

*Sitzung am 3. Juli 1839.* **Filhol**: Ueber die Wirkung der Chlorwasserstoffsäure auf jodsaure Alkalien und des Chlors auf Jodüre. — **Soubeiran** und **Capitaine**: Ueber die Wirkung mehrerer einfachen Körper auf die Quecksilber-Chlorüre. — In Bezug auf den Bericht **Double's** über die neuen Medicinalgewichte und Maasse, schlägt **Bussy** vor, eine besondere Commission zur weiteren Prüfung desselben zu ernennen, was angenommen wurde; zur Commission wurden bezeichnet **Bussy**, **Guibourt**, **Planche**, **Cap** und **Dubail**. **Bussy** zeigte an, daß er in den Steinkohlen aus den Gruben von Neris jodwasserstoffsäures Ammoniak und auch Schwefelarsenik gefunden habe.

*Sitzung am 6. Aug.* **Denis**: Ueber das Eiweiß und die dasselbe begleitenden anorganischen Substanzen. **Malagutti**: Ueber das Vermögen gewisser Flüssigkeiten, die chemischen Wirkungen des zerstreuten Lichts zu verlangsamen. — **Chevallier**: Ueber Arsenikwasserstoff und die Anwendung des Apparates von **Mars**. — **Quevenne**: Ueber die Honigzubereitungen. Die gelbe Materie des Honigs wirkt nicht abführend, besteht aus Pollen und gelbem Wachs.

---

## Zweite Abtheilung.

**C h e m i e.****Ueber *Hydrargyrum ammoniato-muriaticum*;**

von

**Dr. Geiseler**

in Königsberg in der Neumark.

Der im 13. Jahrhundert von Raimund Lull entdeckte weisse Quecksilberpräcipitat wurde von ihm durch Niederschlagung aus einer Auflösung von salpetersaurem Quecksilberoxyd und Salmiak durch kohlensaures Kali bereitet. Im Laufe der Zeit veränderte sich diese Bereitungsart, namentlich durch Lemery, dahin, daß das genannte Präparat aus dem Alembrothsalze durch Präcipitation mittelst kohlensauren Natrons dargestellt wurde, und späterhin gab man als die zweckmässigste Darstellungsweise die Niederschlagung aus Quecksilberchloridlösung durch Aetzammoniak an. In der neuesten Pharmakopöe finden wir von den letztgenannten Vorschriften bald die eine, bald die andere, die Preussische Pharmakopöe giebt als gesetzliche die erste an.

Die chemische Constitution des weissen Quecksilberpräcipitats erklärte Berzelius früher als die eines basischen Salzes, das aus Quecksilberchlorid und Ammoniak bestehe, Trommsdorff betrachtete denselben als ein aus 1 At. Quecksilberchlorid und 3 At. Quecksilberoxydammoniak bestehendes Doppelsalz, Hennel, der davon ausging, daß das Quecksilberchlorid bei der Auflösung in Wasser in salzsaures Quecksilberoxyd übergehe, fand, daß die Niederschlagung des weissen Präcipitats aus derselben gerade so viel Ammoniak erfor-

derte, als nöthig war, um alle Salzsäure des salzsauren Quecksilberoxyds in neutrales, salzsaures Ammoniak zu verwandeln, daß aber in der vom Niederschlage getrennten Flüssigkeit nur die Hälfte des gebildeten Salzes vorhanden war, und daß also das Quecksilber des Quecksilberchlorids als Quecksilberoxyd in dem Niederschlage mit salzsaurem Ammoniak verbunden sein mußte. Diese Ansicht, welche nur in sofern eine Aenderung erfuhr, als später allgemein angenommen wurde, daß Chlorometalle sich unverändert in Wasser auflösen, und das Entstehen des Quecksilberoxyds durch Wassertrennung erklärt wurde, bei der das Ammoniak durch den Wasserstoff des Wassers zu Ammonium metallisch sich mit dem Chlor des Quecksilberchlorids zu Chlorammonium verbindet und der Sauerstoff des zersetzten Wassers das Quecksilber oxydirt, galt bisher als die richtige und auch die Preuss. Pharmakopöe trat derselben bei, indem sie dem *Hydrarg. ammon. muriat.* auch die Namen *Hydrochloras ammonicus cum Oxydo hydrargyri* und *Chloretum Ammonii cum Oxydo hydrargyrico* beilegte, und also das in Rede stehende Präparat als eine Verbindung von Quecksilberoxyd mit salzsaurem Ammonium oder Chlorammonium bezeichnete. Unterdessen war aber Kane durch die aufgestellte interessante Theorie der Amide veranlaßt, die oft genannte Verbindung näherer Betrachtung zu ziehen, und, nachdem er durch auf verschiedene Weise wiederholte Versuche und Analysen die Bestandtheile des Präcipitats genau ermittelt hatte, dafür die Formel  $(2\text{Cl} + \text{Hg}) + (2\text{NH}_3 + \text{H})$  statt der bisherigen  $2\text{HgO} + 2(\text{ClNH}_4)$  aufzustellen und so den weißen Quecksilberpräcipitat als eine Verbindung von Quecksilberchlorid mit Quecksilberamid zu bezeichnen (*Archiv der Pharm.* 2. R. VIII, 24). Die



Bezug hierauf von Ulgreen unter Berzelius's Leitung angestellten weiteren Versuche (*Arch. der Ph. 2. R. XVIII, 96*) beweisen nun auch unwiderleglich, daß der weiße Präcipitat Amid und keinen Sauerstoff enthält, und daß die Kanesche Formel für ihn die richtige ist. Da aber die von Kane und Ulgreen angestellten Versuche mit dem Präparate angestellt sind, welches durch Präcipitation einer reinen Quecksilberchloridlösung mit Ammoniak gebildet ist und dieses in seinem Verhalten doch einige Verschiedenheiten zeigt von dem nach der Preuss. Pharmakopöe bereiteten Präcipitate (*Archiv d. Ph. 2. R. XVIII, 101*), so fühle ich mich um so mehr bewogen, nachstehende, zur Ermittlung der bei verschiedenen Bereitungsarten verschiedenen Ausbeuten unternommenen Versuche hier mitzutheilen, als sie eine chemische Verschiedenheit beider Präparate von einander in der That zu begründen scheinen.

1) 100 Gran Quecksilberchlorid wurden in 2000 Gran destillirten Wassers aufgelöst und diese Auflösung so lange mit Aetzammoniakflüssigkeit von 0,965 spec. Gew. versetzt, als noch ein Niederschlag entstand. Es wurden dazu 220 Gran Aetzammoniakflüssigkeit verbraucht. Der blendend weiße, auf einem Filtrum gesammelte und wohl ausgesüßte Niederschlag wog, so lange in gelinder Wärme getrocknet, als er noch an Gewicht verlor, 94 Gran; er verflüchtigte sich in einem Platinlöffel erhitzt, indem er, ohne zu schmelzen, sich etwas gelblich färbte, schnell und vollständig. Die von dem Niederschlage abfiltrirte und mit dem Aussüßwasser vermischte Flüssigkeit wurde zur Fixirung des etwa darin enthaltenen Quecksilbers mit Schwefelsäure angesäuert und im Dampfbade bis auf 1 Unze evaporirt; sie gab dann mit Salzsäure und Zinnchlorür eine kaum bemerkbare

Trübung, die nach einem Zusatz von noch mehr Säure und Erwärmung so unbedeutend blieb, daß kaum auf Spuren von vorhandenem Quecksilber nachgesehen liefs.

2) 100 Gran Quecksilberchlorid und 100 Gran Ammoniak wurden nach Vorschrift der Preuss. Pharm. in 1200 Gran destillirten Wassers aufgelöst und die Präcipitation mit einer Auflösung von reinem kohlens. Natron in dem Verhältnifs von 1 Th. kryst. kohlens. Natron auf 4 Th. dest. Wasser vorgenommen. Es wurde von dieser Auflösung 960 Gran, also 192 Gran kohlens. Natron verbraucht. Beim Zusatz der 100 Tropfen der Natronlösung entstand kein Niederschlag mehr, es zeigte sich aber auch keine gelbe Färbung des Niederschlages, sondern es war nur der Geruch des entweichenden Ammoniak bemerkbar. Der auf dem Filtrum gesammelte und wohl ausgesüfste, reine Niederschlag hatte nach dem vollständigen Trocknen ein Gewicht von 104 Gran und schmolz, im Platintiegel erhitzt, zu einer klaren gelben Flüssigkeit, die sich bei weiterer Erhitzung unter Blasenwerfen vollständig verflüchtigte. Als die abfiltrirte und mit dem Aussüfser vermischte Flüssigkeit mit Schwefelsäure angewandt wurde, entwich Kohlensäure, ein Beweis, daß kein Ammoniak gebildet sein mußte. Die stark angesäuerte Flüssigkeit bis auf 1 Unze im Dampfbade evaporirt und mit Salzsäure, Zinnchlorür u. s. w. behandelt, so zeigte sich eine starke Trübung zu erkennen, die bei fernerm Zusatz von Salzsäure sich schwärzte und in einen dicken Niederschlag überging, der nochmals mit Salzsäure gewaschen ein Quecksilberkugeln von 1,5 Gran Gewicht bildete.

3) Aus dem Verhalten der kohlens. Natronlösung zu der Auflösung des Quecksilberchlorids und Salzsäure

unter 2 ging hervor, daß der entstandene Niederschlag selbst dann noch nicht gelb gefärbt wurde, als kohlens. Natron in einer größern Menge, als zur Erzeugung des Niederschlags nöthig war, zugesetzt wurde. Um nun zu erfahren, wie viel kohlens. Natron erforderlich sei, um diese gelbe Färbung hervorzurufen, wurde der Versuch 2 wiederholt mit dem Unterschiede, daß kohlens. Natron allmählig in größerer Menge der Auflösung von 100 Gran Quecksilberchlorid und eben so viel Salmiak zugesetzt wurde. Nachdem 200 Gran kohlenaures Natron verbraucht waren, trat der Geruch nach Ammoniak sehr deutlich hervor und vermehrte sich noch bei dem weitem Zusatz des kohlens. Natrons, die gelbe Färbung des Niederschlages aber erfolgte selbst dann noch nicht, als bereits 450 Gran kohlenaures Natron zugemischt waren. Da nun auch später, als immer mehr und mehr kohlens. Natronlösung in die Flüssigkeit getropfelt wurde, die gelbe Färbung des Niederschlages sich noch immer nicht zeigen wollte, so wurde, als 960 Gran kohlens. Natron verwendet waren, der Niederschlag, der seine bläuliche weißse Farbe jetzt in eine weniger weißse verändert hatte, auf einem Filtrum gesammelt, und hieran zeigte sich, aber auch erst nach dem Aussüßen mit Wasser, die gelbe Färbung auf der Oberfläche, die durch Auswaschen mit Salmiakwasser wieder verschwand. Die vom Niederschlage abfiltrirte Flüssigkeit roch stark nach Ammoniak.

Wenn nun allerdings aus diesen Versuchen hervorgeht, daß unter Befolgung der von der Preuss. Pharmacopoe gegebenen Vorschrift eine größere Menge des weißen Präcipitats erhalten wird, als wenn man eine Quecksilberchloridlösung durch Ammoniak präcipitirt, so muß man durch dies verschiedene Verhalten beider Zubereitungen

in der Hitze und durch die Verschiedenheit der Ausfällung unter Anwendung gleicher Mengen von Quecksilberchlorid schon zu der Vermuthung geleitet werden, beide Präparate wirklich wesentlich verschieden sind. Dies wird um so unzweifelhafter, wenn man in Erfahrung zieht, daß bei Darstellung des Präcipitats Versuch 2 an Quecksilber 1,5 Gran weniger in den Niederschlag übergegangen sind, als bei Bereitung des Präcipitats nach Versuch 1 und daß dennoch der Niederschlag 2 ein größeres Gewicht hat, als der Niederschlag 1.

In dem Niederschlage 1 von 94 Gran Gewicht ist alles Quecksilber von 100 Gran Chlorid, also 74,091 Gran Quecksilber, in dem 104 Gran wiegenden Niederschlag 2 sind dagegen nur 74,091 — 1,5, also 72,591 Gran Quecksilber enthalten. Berechnet man den Quecksilbergehalt auf 100 Theile, so zeigt der Niederschlag 1 einen Gehalt von 78,820 Quecksilber in 100, der Niederschlag 2 dagegen nur 69,790 Quecksilber in 100 und auf die Zusammensetzung des letzteren ist weder die alte Formel ( $2\text{HgO} + 2[\text{ClNH}_4]$ ), noch die neue Kane'sche Formel ( $[2\text{Cl} + \text{Hg}] + [2\text{NH}_2 + \text{Hg}]$ ) anwendbar, denn wenn man 69,790 metallisches Quecksilber sich in Oxyd verwandelt denkt, so hat man, da 1 At. Quecksilber (1265,6) mit 1 At. Sauerstoff (100) verbunden sein müßte, 76,790 Quecksilberoxyd, das, weil nach der alten Formel 2 Chlorammonium (669,604) vereinigt sind, 18,42 Chlorammonium aufgenommen haben müßte und nur 75,10  $76,790 - 18,42 = 58,37$  weissen Präcipitat hätte bilden können während nach dem Versuch 2) 100, also ein Plus von 41,63 erhalten ist. Noch viel weniger paßt aber die Kane'sche Formel; 69,79 Quecksilber könnten nach



12,19 Chlor und 5,54 Amid aufnehmen, also nur  $12,19 + 5,54 = 17,73$  Präcipitat liefern, der Versuch 2 aber hat 100, also sogar ein Plus von 12,48 ergeben. Ganz anders und fast genau der Formel von Kane entsprechend, ist die Menge des Quecksilbers von 79,82, welche in 100 des nach 1 bereiteten Niederschlages enthalten ist. Es ergeben nämlich die hier in Rechnung kommenden gleichen Atome Quecksilber (200,52), Chlor (221,325) und Amid (100,9976) einen Gehalt von 79,73 Quecksilber in 100 Präcipitat und dies stimmt auch ziemlich genau mit dem gefundenen Resultate von 78,820 überein. Sonach dürfte es denn als erwiesen betrachtet werden, daß der aus dem Alembrothsalze durch kohlens. Natron erhaltene Präcipitat *ammonogidentisch* ist mit dem Niederschlage aus einer Quecksilberchloridlösung durch Ammoniak und daß über die chemische Constitution des ersten eine genaue Zerlegung in alle seine Bestandtheile erst Rechenschaft gegeben kann. Der Umstand, daß bei der Präcipitation einer Auflösung des Alembrothsalzes durch kohlens. Natron sich Quecksilberoxyd bilden kann, welches in dem dabei ebenfalls gebildeten kohlens. Ammoniak enthalten ist, also auch in eine Verbindung mit ihm eingehen kann, könnte vielleicht darauf deuten, daß bei dem auf diese Weise bereiteten weißen Präcipitate eine Verbindung von kohlens. Ammoniak mit Quecksilberoxyd enthalten ist. Es scheint dafür auch die Thatsache zu sprechen, daß nach Versuch 3 die gelbe Färbung des Präcipitats erst nach dem Aussüßen mit Wasser erfolgte, also erst dann, als mit dem Niederschlage eine Flüssigkeit in Berührung kam, die das kohlens. Ammoniak seiner Verbindung mit dem Quecksilberoxyde entziehen konnte.

Es beweist aber auch ferner die bei Versuch 1 machte Erfahrung, daß die verbrauchten 220 Gran Ammoniakflüssigkeit fast genau die nach der Kan es Formel nöthige Menge Ammoniak enthalten, um Verbindung von Quecksilberchlorid und Quecksilberamid zu erzeugen. Es enthalten nämlich, (da Dalton 100 Gran Ammoniakflüssigkeit von 0,965 s Gew. 5,88 Gr. reines Ammoniak enthalten) 220 Gran Ammoniakflüssigkeit 12,94 Gran reines Ammoniak und nun das Quecksilberchlorid aus 1 Atom Quecksilber (1265,822) und 2 Atomen Chlor (442,650) bestehend 1 Atom des darin enthaltenen Chlors, nämlich von 220 Gran Quecksilberchlorid 12,955 Gran Chlor abgiebt, Chlorammonium zu erzeugen und dazu 1 Atom Ammonium (113,476) bedarf, die hier in Betracht kommen 12,955 Gran Chlor, also 6,65 Gran Ammonium erfordern, so zeigt sich, daß die Hälfte des verwandten Ammoniaks, nämlich 6,47 Gran Ammoniak zu Ammoniummetallisirt, wobei 1 Atom Wasserstoff (6,2398) mit 1 Atom Ammoniak (107,237) in Verbindung tritt, 6,83 Gran Ammonium liefern und so eine mit der Rechnung außerordentlich nahe Uebereinstimmung einerseits bieten, anderseits aber auch die Menge des in dem Precipitate enthaltenen Amids nachweisen; denn, daß das Ammoniak metallisirende Wasserstoff dem zweiten Atome, also hier der anderen Hälfte des angewendeten Ammoniaks entzogen und dadurch das Amid gebildet werden muß, mit dem das seines Chlors beraubte Quecksilber, also die Hälfte des im Quecksilberchlorid enthaltenen Quecksilbers sich einigt und daß das so erzeugte Quecksilberamid mit dem unzersetzten Quecksilberchlorid die in Rede stehende Verbindung darstellt ist einleuchtend.

Was endlich die Bereitung des weissen Quecksilberpräcipitates nach Vorschrift der Preuss. Pharmacopöe noch betrifft, so geben die Versuche 2 und 3 hinreichenden Aufschluss über das dabei zu beobachtende Verfahren. Es geht aus ihnen hervor, dass ein Gelbwerden des Niederschlages selbst unter Anwendung einer zur Präcipitation mehr als nöthigen Menge kohlen. Natron so leicht nicht zu befürchten ist, dass die beginnende Entwicklung von Ammoniak ein Beweis davon ist, dass kohlen. Natron in hinreichender Menge zugesetzt ist und dass eine etwa eintretende Färbung durch Aussüßen des Niederschlages mit schwacher Salmiaklösung sogleich aufzuheben ist. Wie der Versuch 3 zeigt, erfolgt selbst bei der Anwendung eines sehr grossen Ueberschusses von kohlen. Natron nur eine kaum bemerkbare Färbung; ich habe früher, so oft ich auch den weissen Quecksilberpräcipitat nach der Preuss. Pharmacopöe bereitete, eine gelbe Färbung desselben im Präcipitirgefässe selbst nur einmal bemerkt, als ich kohlen. Natronlösung noch heiss der Alembrothsalzlösung zugemischt hatte. In Folge dieser Erfahrung habe ich denn bei Bereitung des weissen Präcipitates eine höhere Temperatur der Flüssigkeiten, als  $+18^{\circ}$  R. immer vermieden und nur zuweilen auf dem Filtrum den Niederschlag sich gelb färben sehen, wenn das Aussüßen mit Wasser zu früh vorgenommen wurde. Auf Vermeidung einer zu hohen Temperatur sowohl der Alembrothsalzlösung als auch der kohlen. Natronlösung, so wie darauf, dass das Auswaschen des Niederschlages auf dem Filtrum erst dann vorgenommen wird, wenn die Flüssigkeit, aus der er präcipitirt ist, fast ganz abgelaufen ist, wäre nachträglich noch in Bezug auf die

Darstellung des weissen Quecksilberpräcipitats nach  
 schrift der Preuss. Pharmakopöe aufmerksam zu m

---

## Ueber die Bereitung des Antimonoxyds

von

### *Rudolph Brandes.*

---

**D**ie Bereitung des Antimonoxyds nach der Pharmakopöe, sowie nach mehreren chemischen Lehrern, beruhet bekanntlich auf Oxydation des Antimonmetalls mittelst Salpetersäure. Die Vorschrift besagt, daß 4 Unzen käufliches Antimonmetall mit 8 Unzen Salpetersäure, die mit 32 Unzen Wasser verdünnt sind, bei 55 — 60 Grad zwei Stunden lang digerirt werden sollen, oder so lange, bis die Entwicklung von Salpetergas aufgehört hat, auf den Rückstand von der sauren Flüssigkeit gewaschen und mit 1½ Unzen kohlensaurem Natronwasser aufgelöst, gekocht und dann ausgewaschen. Diese Bereitungsmethode stützt sich auf hohe Autoritäten, demohnerachtet glaube ich nicht, daß sie zweckmäßig ist, wenigstens habe ich seit Jahren bei öfterer Wiederholung derselben nie der Erwartung entsprechende Resultate erhalten, auch habe ich von mehreren meiner Freunde dasselbe erfahren. Diese Bereitungsmethode ist auch nicht eben von anderen Pharmakopöen empfohlen worden.

Die *Hannoversche Pharmakopöe* läßt *Liquor Antimonii muriatici* mit Wasser fällen und das erhaltene Antimonpulver mit kohlensaurem Kali zersetzen; auch giebt sie eine zweite Vorschrift, Antimonmetall mit 2 Th. St



*oxydatum album ablutum* zu schmelzen, die geschmolzene Masse auszugießen und das Oxyd von dem nicht oxydirten Theil des Metalls zu trennen. Diese Vorschriften sind gewiß sehr zweckmäfsig.

Die *Sächsische*, die *Hessische* und die *Schleswig-Holsteinische Pharmakopöe* haben nur das *Stibium oxydatum fuscum*, den sogenannten *Crocus metallorum*, und die *Hamburger Pharmakopöe* von 1835 hat sowohl den *Crocus metallorum* als das *Stibium oxydatum griseum* nach der oben erwähnten Vorschrift der Preuss. Pharmakopöe aufgenommen. Die *Französische Pharmakopöe* giebt zwei Vorschriften zur Darstellung des Antimonoxyds auf trockenem und auf nassem Wege; im ersten Fall läßt sie Antimonmetall unter einer Muffel oxydiren, im zweiten Algarotpulver durch doppeltkohlensaures Kali zersetzen.

Bei den oben angeführten ungünstigen Resultaten, welche die Vorschrift der Preuss. Pharmakopöe liefert, suchte ich den Grund davon hauptsächlich in der Temperatur, bei welcher die Oxydation vor sich geht, und da ich statt des Antimonoxyds fast immer Gemenge von Antimonoxyd, Antimonichtsäure und Antimonsäure erhalten hatte, so hielt ich es für wahrscheinlich, daß bei der Einwirkung der Salpetersäure auf das Metall eine zu hohe Temperatur geherrscht habe. Zur Untersuchung dieses Umstandes und des Werths der Methode für die pharmaceutische Praxis überhaupt, liefs ich in meinem Laboratorium folgende Versuche anstellen, die größtentheils durch meinen Schüler, Hrn. Müller aus Arnsherg, ausgeführt wurden.

#### I.

200 Gran fein gepulvertes und geschlämmtes Antimonmetall wurden mit 400 Gran Salpetersäure und der

vorschriftsmässigen Menge Wasser unter öfterm schütteln einige Tage in Berührung gelassen. Nach Tagen war das Metall noch unverändert und wurde hier der Versuch abgebrochen.

## II.

200 Gran Antimonmetall wurden mit 800 Gran petersäure und der achtfachen Menge Wasser, nach Vorschrift der Pharmakopöe bei einer Wärme von bis  $60^{\circ}$  R., unter öfterm Umschütteln digerirt, der Kolben stand in einem Wasserbade, die Temperatur wurde durch ein in den Kolben gestelltes Thermometer wahrgenommen, und wenn sie höher stieg als  $60^{\circ}$  R., wurde durch Zusatz von kaltem Wasser in das Wasserbad regulirt. Nach 2 Stunden war die Oxydation wenig fortgeschritten, nach 4 Stunden war das Metall erst unmerklich verändert. Nachdem die langsam fortschreitende Digestion drei Tage lang unterhalten war, wurde der Kolben genommen, die Masse auf einem Filter gesammelt, gewaschen und getrocknet. 100 Gran dieser Masse wurden mit 160 Gran Weinsteinsäure und 2 Unzen Wasser einige Stunden gekocht, die oxydirte Masse war vermindert, die davon getrennte weinsteinsaure Auflösung wurde durch Schwefelwasserstoffgas gefällt und dadurch 15 Gran Schwefelantimon erhalten. Der Rückstand wurde nochmals mit Weinsteinsäure, wie oben behandelt, die Auflösung lieferte 10,5 Gran Schwefelantimon. Bei einer zum drittenmale wiederholten Aufkochung war kein Antimonoxyd mehr aufgelöst. In erhaltenen 25,5 Schwefelantimon sind gleich 22 Antimonoxyd. Während jener mehrtägigen Einwirkung der petersäure war also nur ohngefähr  $\frac{1}{4}$  des Metalls in Antimonoxyd umgewandelt worden.

Der von der Weinsteinsäure ungelöst gebliebene

Rückstand, der eine schmutzig-weiße Farbe besaß und noch unoxydirtes Antimon enthielt, wurde aufs Neue mit 100 Gran Salpetersäure, die mit der 8fachen Menge Wasser verdünnt wurde, zwei Tage lang bei 30 — 60 ° R. digerirt, die Säure darauf abgegossen und der Rückstand mit Weinsteinsäure und Wasser ausgekocht. Die weinsteinsäure Auflösung gab durch Schwefelwasserstoff 32 Gran Schwefelantimon; bei nochmaliger Behandlung des ungelösten Rückstandes mit Weinsteinsäure, und der entstandenen Auflösung mit Schwefelwasserstoffgas wurden noch 4,5 Gran Schwefelantimon erhalten. Es waren also im Ganzen durch die zweite Behandlung mit Salpetersäure noch 36,5 Schwefelantimon gewonnen, die 31,5 Gran Antimonoxyd entsprachen.

Der nach der zweiten Behandlung mit Salpetersäure in Weinsteinsäure ungelöst gebliebene ziemlich weiße Rückstand wurde nochmals mit der vorschriftsmäßig verdünnten Salpetersäure behandelt und dann, nach Entfernung der sauren Flüssigkeit mit Weinsteinsäure, wie oben. Die weinsteinsäure Auflösung gab durch Schwefelwasserstoffgas keinen Niederschlag. Der ungelöste Rückstand wog 56 Gran.

Es waren also im Ganzen erhalten 53,5 Gran Antimonoxyd und 56 Gran Antimonsäure. Dieser Versuch ergibt deutlich, daß bei der Einwirkung der Salpetersäure nach Vorschrift der Preuss. Pharmakopöe die Oxydation sehr langsam Statt findet, daß nur ungefähr die Hälfte des Metalls dabei zu Antimonoxyd wird, während die andere Hälfte sich höher oxydirt; daß diese Methode daher nicht practisch ist, und am wenigsten auch das darnach dargestellte Oxyd zur Bereitung des Brechweinsteins sich eignet, obwohl solcher nach der

Preuss. Pharmakopöe mittelst des darnach bereit  
*Stibii oxydati* dargestellt werden soll.

### III.

Um den Erfolg zu beachten, den eine höhere Temperatur auf die Oxydation des Antimons ausüben würde, liefs man  $\frac{1}{4}$  Unze Antimonmetall mit der vorgeschriebenen Menge Salpetersäure und Wasser kochen. Kochen wurde 12 Stunden lang unterhalten, unter setzen des verdunsteten Wassers, die oxydirte Masse dann auf einem Filter gesammelt, ausgewaschen und trocknet.

100 Gran des so erhaltenen Oxyds wurden mit 100 Gran Weinsteinsäure und Wasser ausgekocht, und der Auflösung durch Schwefelwasserstoff 30 Gr. Schwefelantimon erhalten. Der ungelöst gebliebene Rückstand wurde nochmals mit Weinsteinsäure ausgekocht, und aus der Flüssigkeit noch 7 Gran Schwefelantimon durch Schwefelwasserstoff gefällt. Bei einer dritten Auskochen mit Weinsteinsäure hatte sich in derselben nicht mehr aufgelöst. Den oxydirten Rückstand liefs man nochmals mit verdünnter Salpetersäure kochen, um allenfalls dabei noch befindlichen Theil von Metall zu oxydiren. Es wurde darnach derselbe wieder mit Weinsteinsäure gekocht, aber diese hatte keine Spur von Antimonoxyd mehr daraus aufgenommen. Der Rückstand, der also aus den höheren Oxydationsstufen des Antimons bestand, wog 80 Gran. Die Menge Oxyd, welche sich bei diesem Versuch gebildet hatte, beträgt nach dem sämmtlichen Schwefelantimon, 37 Gran, berechnet: 32 Gran.

Bei der Einwirkung einer höheren Wärme, des Siedpuncte des Wassers, ist die Oxydation mithin nicht nur rascher, sondern es wird auch noch mehr Antimon



nur und noch weniger Antimonoxyd gebildet, als bei einer niedrigeren Temp. von  $50 - 60^{\circ}$  R.

## IV.

Es wurde jetzt die Einwirkung des Königswassers auf das Antimon einer weiteren Untersuchung unterworfen. 100 Gran Antimonmetall wurden mit 200 Gran Königswasser (aus 2 concentr. Salzsäure und 1 conc. Salpetersäure) hingestellt. In der Kälte fand keine merkliche Einwirkung Statt.

## V.

100 Gran Antimonmetall wurden mit 200 Gran Königswasser und 800 Gran Wasser hingestellt. Nach 24 Stunden schien das Antimon völlig oxydirt zu sein, die Masse wurde auf einem Filter gesammelt, getrocknet und die abfiltrirte Flüssigkeit mit kohlenst. Kali übersättigt, wodurch ein geringer Niederschlag von Antimonoxyd entstand, der 2 Gran betrug, es hatte sich unter diesen Umständen mithin nur wenig Antimon aufgelöst.

Von dem oxydirten Metall wurden 50 Gran mit 200 Gran Weinsteinssäure und Wasser gekocht, und der auf einem Filter gesammelte Rückstand, der jetzt eine schwärzlichgraue Farbe besaß, nochmals mit Weinsteinssäure behandelt, worauf ein Rückstand von reinem nicht oxydirten Antimon hinterblieb, welcher 13 Gran wog. Die davon abfiltrirte weinsteinsaure Auflösung gab durch Schwefelwasserstoff 44 Gran Schwefelantimon, die 37,97 Gran Antimonoxyd anzeigen.

## VI.

100 Gran Antimonmetall behandelte man wie zuvor mit 200 Gran Königswasser, das nur mit 400 Gran Wasser verdünnt war. Die Einwirkung war hierbei rascher. Die abfiltrirte Flüssigkeit gab durch kohlen-saures Kali

einen Niederschlag, der 4 Gran wog. 50 Gran des oxidirten Metalls wurden mit Weinsteinsäure behandelt, wodurch bis auf einen Rückstand von nur 3 Gran Antimonmetall das Ganze sich auflöste. Die weinsteinsäure Auflösung gab durch Schwefelwasserstoffgas 56 G Schwefelantimon, die 48,3 Antimonoxyd entsprechen.

Dieser Versuch ergibt, daß man auf eine leichte Weise, darnach das Antimonoxyd darstellen kann, und daß folgende Verhältnisse dazu am angemessensten sein möchten. Es werden 100 Antimonmetall mit 200 Scheidewassersäure und 100 Salzsäure und Zusatz von 400 Wasser in mäßiger Wärme digerirt. Nach vollendeter Oxydation gießt man die Flüssigkeit ab, wäscht das Oxid aus, schlämmt es ab, wenn noch Spuren von nicht oxidiertem Metall dabei sich zeigen sollten, und läßt es mit etwas kohlensaurem Kali in Berührung, um den Rest von Säure daraus zu entfernen, und nach neuem Auswaschen läßt man das Präparat trocknen.

#### VII.

100 Gran Antimonmetall wurden jetzt mit Königswasser im Wasserbade erhitzt, wodurch die Oxydation rasch erfolgte; es waren zur völligen Auflösung 2½ Unzen Königswasser erforderlich. Die filtrirte Auflösung wurde mit kohlensaurem Kali neutralisirt, einen Niederschlag, der nach Auswaschen, Trocknen und schwachem Erhitzen 120 Gran wog.

#### VIII.

Ich habe schon früher auf die Anwendung eines reinen guten Schwefelantimons zur unmittelbaren Benutzung auf Antimonoxyd u. s. w. aufmerksam gemacht. Folgender Versuch wird dieses näher ergeben.

100 Gran fein gepulvertes Schwefelantimon wurde mit 2 Unzen Königswasser mäßig erwärmt. Unter Ab-

scheidung von Schwefel entstand völlige Auflösung des Metalls. Es wurde nun noch mehr Schwefelantimon zugesetzt, um die Auflösung so reich an Antimon zu erhalten, wie möglich. Man konnte noch 100 Gran Schwefelantimon zusetzen. Die von dem ausgeschiedenen Schwefel abfiltrirte saure Auflösung wurde mit Wasser gefällt und der Niederschlag, der mäßig getrocknet gegen 180 Gran wog, mit in einigen Unzen Wasser gelösten kohlensaurem Kali digerirt, darauf auf einem Filter gesammelt und schwach erhitzt, wodurch 153 Gran Antimonoxyd erhalten wurden. Da die von dem Niederschlage durch Wasser abfiltrirte saure Flüssigkeit noch Antimon aufgelöst halten mußte, so wurde sie, um dessen Menge zu bestimmen, durch Schwefelwasserstoff gefällt, wodurch man 19 Gran Schwefelantimon erhielt, die 16,5 Gran Antimonoxyd anzeigen. Es waren im Ganzen sonach 165,5 Gran Antimonoxyd erhalten, die angewandten 200 Gran Schwefelantimon entsprachen 172,6 Antimonoxyd, und es läßt sich mithin auch ein gutes Schwefelantimon auf diese einfache Weise zur Darstellung des Antimonoxyds benutzen.

## IX.

Durch Glühen eines Gemenges von Antimonsäure und Antimonmetall entsteht bekanntlich eine Reduction der Antimonsäure zu Antimonoxyd, und das Metall wird durch den Sauerstoff, welchen erstere abgegeben hat, ebenfalls zu Antimonoxyd. Es war die Absicht, zu versuchen, in wiefern die Bildung des Antimonoxyds auf diesem Wege durch Einwirkung von Antimonmetall auf Antimonsäure Statt finden möchte.

Es wurden 100 Gran Antimonmetall und 200 Gran *Antimon. diaphoret.* der Preuss. Pharmakopöe mit Wasser zu einem Brei angerührt und dieser 2 Tage lang

der Wärme eines Wasserbades ausgesetzt, und da noch einige Stunden lang auf einem Sandbade gekocht unter Ersetzen des verdampfenden Wassers, und endlich völlig eingetrocknet. 20 Gran dieses Rückstandes von einer schmutzig-grauen Farbe wurden mit 40 Gran in 2 Unzen Wasser gelöster Weinsteinssäure ausgekocht, dann abfiltrirt und diese Auskochung nochmals wiederholt. Die filtrirten Auflösungen wurden mit Schwefelwasserstoff behandelt und dadurch ein Niederschlag erhalten, der 9,5 Gran wog, und also 8,3 Gran Antimonoxyd anzeigt. Ohngefähr die Hälfte des Gemenges also bei diesem Versuche in Antimonoxyd umgeändert.

## X.

Man behandelte jetzt 54 Gran metallisches Antimon und 106 Gran Antimonsäure auf dieselbe Weise wie vorigen Versuche. Aus der dabei erhaltenen Auflösung von der Behandlung von 20 Gran des Rückstandes Weinsteinssäure u. s. w. wurden durch Schwefelwasserstoff 9 Gran Schwefelantimon erhalten, die 7,7 Gran Antimonoxyd anzeigen. Das Resultat war folglich wesentlich dem des vorigen Versuches gleich.

## XI.

Um zu versuchen, ob bei einer gleichzeitigen Mithinwirkung von Weinstein die Oxydbildung mittelst Antimonmetall und Antimonsäure leichter bewirkt werden würden 54 Gran Antimon, 106 Gran Antimonsäure und 106 Gran feingepulverter Weinstein mit Wasser zu einem Brei angerührt, dieser 24 Stunden lang der Wärme eines Wasserbades ausgesetzt, und dann noch einige Stunden gekocht. Die Masse wurde hierauf erst mit 8 und dann noch mit 4 Unzen Wasser ausgekocht, die filtrirte Auflösung verdampfte man zur Trockne, und liefs den zerriebenen Rückstand mit der funfzehnfachen



Menge kalten Wassers unter öfterm Umschütteln stehen. Die Auflösung wurde dann von dem ungelöst gebliebenen Weinstein abfiltrirt und verdampft. Man erhielt 156 Gran reinen Brechweinstein, die 80 Gran Antimonoxyd entsprachen. Unter diesen Umständen war also die Hälfte des Gemenges von Antimon und Antimonsäure in Antimonoxyd umgewandelt. Der Versuch wurde wiederholt, in der Art, daß man das Gemenge, unter Ersetzung des verdunstenden Wassers acht Tage lang der Wärme eines Wasserbades aussetzte; der Erfolg war wesentlich derselbe.

## XII.

Kürzlich hat J. Preußs, in den *Annalen der Pharm.* XXXI, 197, Versuche über Darstellung von Antimonoxyd mitgetheilt, bei denen er ebenfalls die Darstellung des Oxids mittelst Salpetersäure verwirft, und dagegen folgende als vortheilhaft empfiehlt. 3 At. Antimonmetall ( $18\frac{1}{2}$  Gew. Th.),  $1\frac{1}{2}$  At. Salpeter ( $9\frac{1}{2}$  Gew. Th.) und 1 At. doppeltchwefelsaures Kali ( $8\frac{1}{2}$  Gew. Th.) werden gemengt löffelweise in einen rothglühenden Tiegel getragen, nach dem Abbrennen unterhält man die Masse noch eine kurze Zeit glühend, nach dem Erkalten erscheint sie weiß und zusammengesintert, und das Antimonoxyd erkennt man darin in glänzenden nadelförmigen Krystallen. Die Salzmasse wird mit Wasser unter Zusatz von etwas verdünnter Schwefelsäure ausgekocht, und dann getrocknet. Das so dargestellte Antimonoxyd ist frei von Arsen, nur nicht ganz frei von Eisen, es erscheint nach dem Trocknen helllichtbraungelb. Wird es mit  $1\frac{1}{2}$  Th. Weinstein digerirt und dann mit heißem Wasser behandelt, so giebt die Auflösung Brechweinstein in so reichlicher Menge, daß man fast das summarische Gewicht beider angewandten Substanzen erhält. Man kann

den Brechweinstein gleich bei der ersten Krystallisation rein erhalten, wenn man die Lauge einigemal mit Zusatz von Knochenkohle auskocht; dadurch wird Eisengehalt entfernt, welcher jedoch ohne das unbleibt, wenn man keinen Ueberschuss von Weinstein gewandt und nicht zu lange gekocht hat. Ich habe diesen Versuch wiederholt und wesentlich dasselbe Resultat erhalten. 6 Unzen des so erhaltenen Oxyds, welche eine schmutzig-braungelbe Farbe besaß, löste sich in der nöthigen Menge Weinstein behandelt, auf, und wurden  $13\frac{1}{4}$  Unzen Brechweinstein erhalten.

### *R e s u l t a t e .*

1) Die Darstellung des Antimonoxyds mit Salpetersäure liefert, nach den Vorschriften der Preuss. Pharmakopöe, kein befriedigendes Resultat. Es wird nicht bloß Antimonoxyd, sondern auch Antimonichlorid und Antimonsäure gebildet.

2) Concentrirtes Königswasser übt in der Kälte keine Wirkung auf das Antimonmetall aus; verdünnt aber bewirkt die Oxydation, wobei sich, wenn man 1 Th. Metall nur 2 Th. Säure anwendet, nur wenig Oxyd auflöst, sondern das meiste ungelöst bleibt. Für die völligen Auflösung des Metalls sind 10—12 Th. Königswasser erforderlich.

3) Das Schwefelantimon läßt sich mit Vortheil anwenden zur Darstellung des Algarotpulvers und Antimonoxyds. Es erfordert ungefähr 5 Th. Königswasser und liefert  $\frac{3}{4}$  Th. Antimonoxyd.

4) Antimonsäure und Antimonmetall bewirken auf nassem Wege die Bildung von Antimonoxyd, und mit Zusatz von Weinstein kann man damit unmittelbar Brechweinstein darstellen, doch ist dies Verfahren nicht vortheilhaft.

5) Beabsichtigt man die Darstellung eines Antimonoxys, das nur zur Basis des Brechweinsteins dienen soll, so läßt sich dasselbe auf verschiedene bekannte Weisen darstellen, die durch Oxydation mit Salpeter u. s. w. oder durch Oxydiren durch den Sauerstoff der Luft ausgeführt werden.

6) Ein reines Antimonoxyd ist am zweckmässigsten durch Oxydiren des Metalls oder des Schwefelantimons mit Salpetersalzsäure u. s. w. (s. Versuch VI. VII. VIII.) darzustellen, und als solches muß es dann auch die Farbe des reinen Oxyds und keine graue oder braune Farbe besitzen.

---

## Ueber das Antimonoxyd;

von

*Julius Bouison.*

---

Die Darstellung des Antimonoxys nach Berzelius durch Behandeln des Metalls mit verdünnter Salpetersäure u. s. w. gab mir ein Product, welches nicht die characterischen Eigenschaften des Antimonoxys besaß, nämlich beim Rothglühen in Fluß zu gerathen und darauf sich zu verflüchtigen. Ich versuchte dieses Verfahren mit möglichster Aufmerksamkeit und nahm dazu Antimon, welches durch Reduction des Chlorürs mittelst Zink erhalten war, um die möglichst günstigste Bedingung eines fein zertheilten Zustandes zu benutzen.

Ich behandelte einen Theil dieses Metalls mit schwacher, einen andern mit starker Salpetersäure. Beide Producte wurden im Wasserbade getrocknet und mit Antimonoxyd vergleichend geprüft, welches durch Zersetzen des Chlorürs mit Wasser und Behandeln des Nieder-

schlags mit kohlensaurem Natron dargestellt war. Letztes kam vor dem Löthrohr bald in Flu verflüchtigte sich, während die beiden ersten weder i kamen, noch sich verflüchtigten, beim Erhitzen in Porcellanretorte aber eine große Menge Sauersto wickelten, ohne eine Spur nitröser Dämpfe. Bei geringeren Hitze verloren sie nur Wasser und den gelb. Man erhält also nach diesem Ver kein Antimonoxyd, sondern Antimonsäure. Wahrlich bediente sich Berzelius eines nicht fein gepulverten Antimonoxys, wobei das Innere des M nicht angegriffen wurde und das Product ein Ge von Antimonmetall und Antimonsäure war. Dieschm weisse Farbe, welche er dem Oxyd zuschreibt, m dafür sprechen. (*Annales de Chim. et de Phys.* LXX.



## *Tinctura Antimonii Thedenii und Spir Vini Lullianus;*

vom

Kreisphysikus Dr. *Becker* in Mühlhausen

**T**heden gab 1782 in seinen »*Bemerkungen Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarzneikunst* Th. II. p. 84. Nachricht von einer besondern Spießg tinctur, die er nach Anleitung einer alchemistis Schrift auf folgende Art bereitete:

Zwei Pfund Spießglanz wurden mit sechs F Kali zu einer Leber zusammengeschmolzen, und mit concentrirtem Weinessig gesättigt, es waren 13 Berliner Quart nöthig. Die Masse wurde Trockne abgedampft, mit Alcohol Vini versetzt und



Wasserbade destillirt. Der übergegangene Weingeist wurde auf die Masse zurückgegossen, von neuem abgeseigt und dies mit Ersetzung des verloren gegangenen dreisigmal wiederholt. Es waren 16 Quart Alcohol darauf gegangen, und wurden kaum zwei Pfund Tinctur erhalten. Diese wurde drei Monate lang im Aschenbade, den ersten Monat mit einem, den zweiten mit zwei und den dritten mit drei Lampenfeuern digerirt, wonach noch ein Pfund übrig blieb.

Er gab diese Arznei bei Drüsenverstopfungen sowohl an äußern als innern Theilen, und die Wirkung übertraf seine Erwartung. Täglich zu 8 bis 10 Tropfen genommen, bewirkte sie Schweiß und stärkern Abgang des Urins, und die Vergrößerung der Dosis weichen Stuhlgang, auch wohl ein gelindes Laxiren. Sie nahm gichtische Schmerzen hinweg, und leistete bei verstopften Eingeweiden die besten Dienste; was sie aber besonders schätzbar machte, war, daß sie beim verborgenen Krebse in drei Fällen gänzliche Zertheilung zu Stande brachte, und in zwei anderen guten Erfolg hoffen ließ.

Theden's Name diente dem Mittel zur besondern Empfehlung, indess bei den Chemikern hatte es kein gutes Schicksal. Es ging damit, wie es bei uns überhaupt leicht zu gehen pflegt; die Erklärung, die Theorie ist die Hauptsache, sie muß das Factum heben und tragen, und wenn sie ungenügend ausfällt, so verliert es seine Bedeutung und gilt für Täuschung. Die neue Arznei hieß Spießsglanztinctur, die chemische Untersuchung zeigte aber, daß kein Spießsglanz darin enthalten war. Das war schon ein schlimmer Umstand, überdem war der Proceß unerklärlich weitschweifig und kam von der Alchemie, die in der Chemie so anrücklich

ist wie der Mysticismus in der Theologie. Gren sagt es ist eine Auflösung der Blättererde in Weingeist die wenigen Spießsglanztheilchen, die sie ja enthalten möchte, sind der mühsamen Bereitung nicht werth. Dörffurt nannte es eine mit unbedeutenden Spießglanztheilen verunreinigte Auflösung dieses Salzes, nach Westrumb war es nichts anders, als eine Auflösung des durch das lange Martern mit Feuer branngewordenen essigs. Kali. In der Meinung, daß Spießglanz hineingehöre, weil der Name darauf lautete, wußten manche helfen, und bereiteten es auf eine Weise, daß welches hinein kam, aber das war nun nicht das Mittel, womit Theden so glücklich operirt hat. Der berühmte Wichmann schätzte es sehr in der Brustbräune; der einzige Kranke, den er von dieser schweren Krankheit völlig herzustellen das seltene Glück gehabt hatte, war durch einen halbjährigen Gebrauch desselben und zwei Fontanellen an den Schenkeln gerettet worden. Gegen die Beweise der Chemiker konnte er zwar nichts anbringen, nur meinte er, wenn auch noch so wenig Spießsglanz darin sei, so könnte es doch wohl auf eine andere Art wirken. Indess vor dem Fortschritt der damaligen Chemie war die Sache verloren. Nicht ohne Spott sagt Elfes, es sei um so weniger in den Apotheken zu finden, je mehr chemische Kenntnisse der Apotheker besitze, und in *Trommsdorff's Journ.* wurde geradezu gesagt, diese unwirksame Tinctur verdiene doch wohl einmal aus den Apotheken verwiesen zu werden — was denn auch geschehen ist.

Erst die neuere Zeit giebt Aufschluß über das Wesen dieses Arzneimittels, indem sie, was man bereits schon einmal vom 13. bis ins 17. Jahrhundert wußte, von Neuem lehrt, nämlich: daß bei der Destillation essig-

seiner Salze sich neben Essigsäure ein besonderer Alkohol (Essiggeist) und ein ätherisches Oel bildet, und das ist es, was Theden neben freiem Kali als Hauptbestandtheile in seiner Tinctur hatte.

Da die alten Nachrichten diesen Punct hinlänglich aufklären dürften, so gebe ich folgende Zusammenstellung über den

*Spiritus Vini Lullianus sive philosophicus.*

Die Geschichte der Chemie berichtet, daß Raimundus Lullius (geb. 1235) den Weingeist gekannt und vielfach angewandt habe; aber der Weingeist, den Lullius meint, der bei den Adepten so hoch gepriesene *Spiritus Vini Lullianus s. philosophicus*, womit sie ihre geheimen Arzneien bereiteten, ist nicht unser gewöhnlicher Weingeist, sondern etwas ganz anders. Seger Weidenfeld, der in seiner Schrift: *de secretis Adeptorum s. de usu Spiritus Vini Lulliani* eine vollständige Sammlung der berühmtesten alchemistischen Vorschriften giebt, deren Basis überall der *Spiritus Vini philosophicus* ist, sagt, daß die Bereitung desselben immer geheim gehalten, und erst von Georg Ripley (geb. 1425) offenbart worden sei. Was er von diesem beibringt, ist freilich auch noch dunkel genug, aber wenn man sich mit der Schulsprache der Adepten bekannt gemacht hat, läßt sich der Schleier wohl zurückschlagen. Weidenfeld verspricht seine ganze Wissenschaft mitzutheilen, aber er schließt sein Buch, ohne die Hauptsache zu verrathen, und verweist auf einen Nachtrag, der alles deutlich machen soll, aber nicht erschienen ist.

Was auf diese Weise Eigenthum der geheimen Chemie blieb, wurde indess im Laufe der Zeit von Aerzten und Chemikern theilweise für sich entdeckt. Der erste, der von diesen Präparaten mit klaren Worten spricht,

ist Agricola, der in seinen Anmerkungen zu Popp chemischen Processen die Producte der trocknen Destillation von essigsaurem Kali und essigsaurem Blei beschreibt, und den *Spiritus Saturni* das sicherste Mittel in der Nierenschwindsucht nennt.

Mit einem andern Salze kam Zwelfer ans Ziel. Er war 16 Jahr Apotheker gewesen, und hatte sich da der Medicin gewidmet. Er ist voll Freude über seinen Fund, deutet ihn aber nur durch die bildliche Bezeichnung an: man solle die Venus mit einem gewissen vegetabilischen Saft von ihren Unreinigkeiten abwaschen und mit Bacchus berauschen (*Animadvers. in Pharmacop. August. p. 449*). Doch ist er zu ehrlich, um in seine Schweigen fortwährend zu beharren, und im *Append. Animadvers. p. 51, 52* offenbart er vollständig sein geheimes Auflösungsmittel — es ist *Spiritus Aeruginis*.

Das neueste Zeugniß in der Sache, ohne die Bereitung zu lehren, gab Pott 1716 (*Exercit. chemic. p. 2*) mit folgenden Worten: Es giebt ein unbenanntes und unbekanntes, ganz sonderbares Auflösungsmittel, wovon bis jetzt kein Chemiker offen und deutlich gesprochen hat. Es ist eine klare, flüchtige, reine Flüssigkeit wie Weingeist, sie brennt mit heller Flamme, hat einen satten Geschmack wie starker Essig, geht bei der Destillation wie Schneeflocken über, greift in der Digestion und Cohobation alle Metalle, besonders die calcinirten an, zieht auch das Gold hochroth aus, und wenn das Auflösungsmittel abgezogen wird, so bleibt eine Tinctur von harzartigem Aussehen zurück, die sich gar leicht in Weingeist auflöst und ihn tiefroth färbt mit Zurücklassung einer schwarzen Golderde, die sich nicht reduciren läßt. Dies Auflösungsmittel vermischt sich mit Wasser und Oelen gleichmäfsig und vollständig



Nach die Korallen zu einem meergrünen Saft auf, und ist, wenn die Ahaung ausgesprochen werden darf, das wahre Auflösungsmittel Weidenfeld's, der *Spiritus vini philosophicus*. Hiermit steht in Verbindung, wie Pott (*ibid. p. 20*) auch anführt, daß nach Künstel zur Bereitung der *Essentia dulcis Halensis* ein Auflösungsmittel angewandt werde, welches weder sauer, noch scharf sei, und in seiner Flüchtigkeit und Reinheit dem *Spiritus vini rectificatissimus* sehr nahe stehe; der Goldkalk werde damit sehr lange digerirt, und gehe in eine harzartige Substanz über, die in Weingeist ganz zerfließe.

Die Bereitung des *Spiritus Vini Lulliani* war eine Hauptarbeit der geheimen Chemie. Die Aufgabe derselben war, einen geheimen Stoff durch sehr verwickelte und langwierige Operationen zur höchsten Feinheit ausarbeiten, wo er den Namen Tinctur oder *Lapis philosophicum* erhielt. Der geheime Stoff, die *Materia lapidis*, die nie bei ihrem wahren Namen genannt wurde, war ein Metall oder ein Mineral mit metallischer Grundlage. Dies wurde in Säuren aufgelöst, coagulirt, calcinirt, und hieß dann das philosophische Subject: *Antimonium philosophicum, Plumbum philosophicum etc., Leonidris, Sericon (Ripley)* u. s. w. Die weitere Arbeit damit bestand bei den Adepten, die sich mehr oder weniger deutlich darüber ausgelassen haben, wie bei Raimund Lull, Rupescissa, Graf Bernhard, Ripley, Basilus Valentinus, Isaak Hollandus, Paracelsus und Respur in Behandlung mit destillirtem Essig und Bereitung zu essigsauren Salzen, woraus dann das geheime Auflösungsmittel dargestellt wurde.

1) Raimundus Lullius. (*de quinta Essentia. Seger Weidenfeld p. 1.*)

Das essigsaure Salz (*Vinum rubeum vel album*) wird *Essentia.*  
*bum*) wird

destillirt, und das Destillat 3.—4mal oder so weit rectificirt, daß es angezündet ganz verbrennt. Diese rectificirte *Aqua ardens* wird in einem hermetisch versetzten Gefäße in ununterbrochener starken Digestionswärme gehalten, wodurch sich die Quintessenz absetzt und oben aufschwimmt. Wenn die Digestion geraume Zeit gedauert hat, so öffnet man das Gefäß und wenn ein so wunderbarer Wohlgeruch herauskommt, daß kein Duft der Welt damit verglichen werden kann, und jeder, wer kommt, wie durch eine unsichtbare Gewalt dahingezogen wird, und die Vögel danach fliegen, dann ist die Quintessenz zu Stande gekommen. Wenn dieser Wohlgeruch nicht wahrgenommen, so muß die Digestion so lange fortgesetzt werden, bis dies Zeichen erscheint.

Ueber diesen Wohlgeruch stimmen mit Raimond überein: Rupescisso, Christoph von Paris, Bernhard, Isaak Holland, Respur u. viele andere.

2) Ripley. (*Vademecum. Seger Weidenfeld p. 100*)

Sein Verfahren ist sehr complicirt, kommt aber in der Hauptsache auf Folgendes hinaus:

1) Die Retorte mit dem essigsauren Salze wird langsam erhitzt, bis alles Wasser übergegangen ist. Sobald weiße Dämpfe erscheinen, wird ein Recipient vorgelassen und stufenweise das Feuer verstärkt, bis ein reichlicher Dampf aufsteigt. Dies stärkere Feuer wird erhalten, bis rothe Tropfen kommen oder die Dämpfe aufhören, auf man das Feuer allmählig abgehen läßt, und das Destillat sorgfältig aufhebt.

2) Der schwarze Rückstand in der Retorte wird ausgebreitet und mit einer glühenden Kohle angezündet. In einer halben Stunde wird das Feuer alles durchgebrannt und zu einer gelben Asche calcinirt haben. I

weil mit destillirtem Essig zur Salzmasse gemacht und wie sub 1) destillirt.

3) Die beiden Destillate werden zusammengegossen, 14 Tage digerirt und dann bei mäßiger Wärme destillirt, wodurch man die *Aqua ardeys* erhält, welche 7mal rectificirt werden muß, und wobei ein oben aufschwimmendes weißes und ein am Boden bleibendes gelbes Oel sich abscheidet.

### 3) Isaak Holland. (*Opus Saturni.*)

Man destillirt Bleizucker mit immer stärkerm Feuer, bis die Materie übergeht so roth wie Blut, dick wie Oel, süß wie Zucker und mit einem himmlischen Geruche.

### 4) Vigenere. (Vom Feuer und Salz p. 146.)

Man legt die Retorte mit essigsauerm Blei offen in den Ofen, und treibt mit schwachem Feuer die überschüssige Feuchtigkeit heraus. Sobald weißse Dämpfe erscheinen, legt man einen großen Recipienten vor, luftirt alle Fugen wohl zu, und verstärkt das Feuer immer mehr, bis die Retorte ganz mit Kohlen bedeckt ist, so wird sich ein hyacinthfarbiges Oel, an Geruch wie Spiköl, in der Vorlage sammeln. Man unterhält nun das Feuer, so lange noch etwas übergeht, läßt es sich hernach setzen und eine ganze Nacht ruhig stehen. Dieses Oel, welches Raimund Lull seinen Wein nennt, bringt man in einen kleinen Kolben auf ein Marienbad, so wird der Geist in kleinen Faden aufsteigen gleich dem Weingeist. Man zieht so lange ab, bis große Tropfen im Reine erscheinen, welche anzeigen, daß nun bloßes Nitre kommt; am Boden bleibt das kostbare Oel liegen, woraus Raimund sein *Aurum potabile* bereitet, und womit er sich neu belebte, als er vor Alter dem Tode nahe war.

5) Beguin. (*Tyrocin. chym. C.IV. p. 139.*)

Man destillirt essigsaures Blei aus einer gut luteten Retorte. Der Geruch ist so wohlriechend, daß das ganze Zimmer erfüllt, und übertrifft den Wohlgeruch aller Vegetabilien. In dem Destillat schwimmt gelbes Oel oben auf, und ein blutrothes Oel setzt sich zu Boden. Durch wiederholte Destillationen scheiden man das Phlegma ab, und hebt den sehr wohlriechenden Geist auf.

## 6) Agricola. (Chirurgie p. 169.)

Man destillirt Bleizucker mit allmählig verstärktem Feuer, so wird erst ein gelbes, dann ein rothes Oel übergehen. Diese Destillation will aber in Acht genommen sein, denn es geschieht zuweilen, daß man im Anfang zu geschwind treibt, so bekommt man kein Oel, sondern nur einen Spiritus.

Poterius (*Opp. omn. p. 604*) erhielt aus 1 Pfund Bleizucker etwas mehr als zwei Drachmen Oel.

## 7) Derselbe. (Anmerk. zu Popp's chem. Prodr. I. p. 222.)

Man digerirt Bleizucker 4 Wochen lang in Weingeist, und zieht dann den Spiritus so weit ab, daß ein dicker Liquor bleibt. Dieser wird mit reinem Salpeter versetzt, und in einer Retorte *per gradus* destillirt, so erhält man einen weissen Spiritus, ein gelbes, und ein rothes Oel. Der Spiritus und die Oele müssen zusammen rectificirt und von einander geschieden werden. Diese Rectification wird in einer Glasretorte im Dampfbade vorgenommen. Erst geht der Spiritus nur tropfenweise, und man sieht keine Adern oder Streifen; dann kommt ein gelbes Oel, da muß man einen andern Rezipienten vorlegen und gut lutiren; sonst geht der feine spiritualische Geruch, lieblicher als Ambra und Moschus



verloren. Nach diesem Oel kommt das Phlegma mit vielen schneeweissen Striemen und zuletzt ein schönes rothes Oel.

8) Kunststücke etc. Zittau 1789. I. p. 149.

Man füllt eine gläserne Retorte bis zum vierten Theil mit Bleizucker, und destillirt aus einer Sandkapselle *gradatim*. Zuerst kommt ein sehr saurer Spiritus; wenn dieser vorbei ist, wechselt man die Vorlage und verstärkt das Feuer. Dann kommen braune, stinkende Tropfen, die müssen auch vorbei und gehen so lange, bis alle Feuchtigkeit ausgetrieben ist. Unterdeß wird sich die Materie in der Retorte ziemlich aufblähen und ganz schwarz geblättert aussehen wie ein hohles Wespennest. Wenn diese Tropfen vorbei sind, verstärkt man das Feuer noch mehr, dann erscheinen rubinrothe, wie Ambra wohlriechende, zuckersüße Tropfen, und man treibt mit solchem Feuer *gradatim*, bis alle wohlriechende Tropfen über sind. Bei dieser Arbeit war die Retorte gesprungen, so daß sehr wenige Tropfen erhalten wurden, aber das ganze Haus und die Straßse war mit dem schönen balsamischen Geruche erfüllt.

#### 9) *Tinctura Corallorum*.

Paracelsus hat dies Mittel berühmt gemacht; es reinigt das Blut so vollständig, daß es alle Ausschlüge, Geschwüre, Fisteln und Krebs zur Heilung bringt. Die Kraft liegt bloß im färbenden Princip, dies allein soll genommen und zur höchsten Exaltation gradirt werden. Die Vorschrift dazu ist, wie gewöhnlich, nur angedeutet. Das färbende Princip, die Tinctur, soll mit Spiritu vini ausgezogen, sechszehnmahl in offnem Feuer und sechsmahl in *balneo* destillirt, und das Oel zum Gebrauch behalten werden.

Eine deutlichere Vorschrift giebt Kunrath (*Medull.*

*destill. 1594. p. 44.*) Man löst die Korallen in Essig auf, dampft ab, wäscht den Rückstand mehrmals mit destillirtem Wasser aus, und erhält so das weisse Korallensalz. Dies wird mit Weingeist übergossen und eine Zeit digerirt; dann wird es sechsmal destillirt, fünften Destillation zeigt sich die Röthe, und sechsten bleibt es wie ein dickes blutrothes Bodensatz.

Genauer ist die Vorschrift von Beguin (*Chem. p. 376.*) Das mit destillirtem Essig bereitete Korallensalz wird in gelinder Wärme erhitzt, bis es schwärzt, und einen stechenden Geruch ausstößt. Auf thut man es noch warm in eine Retorte, und destillirt bis weisse Dämpfe erscheinen, dann legt man einen andern Recipienten vor, und giebt stärkeres Feuer. Der Spiritus und ein rothes Oel wie Blut übergangen sind. Dieser wohlriechende und wie Brandwein brennende Spiritus muß noch einmal rectificirt werden, so daß nur das rothe Oel zurückbleibt.

In ähnlicher Weise verfährt Poterius (*Opp. p. 612.*) Das Korallensalz wird erst mit gelindem Feuer destillirt, um das Wasser zu entfernen, dann giebt man stärkeres Feuer und gewinnt den wohlriechenden Spiritus mit einem sehr geringen Antheile des wohlriechenden rothen Oels.

10) *Tinctura Veneris.* (*Schröder's Pharm. med. chem. L. III. p. 64.*)

Essigsaures Kupfer wird mit allmählig verstärktem Feuer destillirt; zuerst geht ein weißer, dann allmählig gelblicher und röthlicher Spiritus über. Das Destillat wird bei mäßigem Feuer, damit nichts gelbes oder rothes übergehe, bis zur Trockenheit rectificirt. Aus dem Rückstande zieht man mit rectificirtem Weingeist die Tinctur.

aus, welche einigemal bis zur Honigconsistenz cohobirt wird. Sie soll ein ganz vorzügliches Mittel gegen Epilepsie sein.

11) *Oleum Mercurii diaphoreticum dulce.*  
(Schroder Pharm. med. chem. L. III. p. 87.)

Essigsaurer Quecksilber wird mit Weingeist digerirt, und dann mit starkem Feuer destillirt. Es geht eine Flüssigkeit wie Milch über. Diese gießt man auf den Rückstand zurück und destillirt wieder; so geht ein weißes und wohlriechendes, nicht scharfes Oel über. Es wird innerlich und äußerlich zur Heilung bösartiger Geschwüre, besonders der Nieren und Blase empfohlen.

12) *Oleum Martis* (*Agricola Chirurgia parva* p. 233.)  
Eisenfeile wird in Essig aufgelöst, die Auflösung zur Flüssigkeit verdampft und mit Weingeist digerirt. Die rothgefärbte Tinctur wird im Dampfbade eingedickt und mit starkem Feuer destillirt, so steigt es über wie ein Blut. Es dient äußerlich zur Heilung der Wunden, innerlich gegen Ruhren und Durchfälle.

13) Zink (*Respur vom Mineralgeist* p. 117.)  
Erdestillirte essigsaurer Zink. Zuerst ging Phlegma über, dann folgte ein dickes und röthliches Wasser, darauf blähte sich bei stärkerm Feuer die ganze Masse auf, und es erhob sich daraus ein Geist wie ein Schnee in großer Menge, legte sich Daumens stark an, und fiel manchmal seiner Menge wegen herunter. Was durch die Fugen drang, gab einen so guten Geruch, daß er sich darüber vermunderte. Nach dem Erkalten fand sich rings herum ein zarter silberweißglänzender Körper, von Geruch wie Campher.

14) Kali (*Agricola Anmerk. zu Popp. II. p. 15.*)  
Man knetet essigsaurer Kaliflüssigkeit mit Thon zu Kugeln, und läßt sie trocknen; dann destillirt man sie.

Es geht ein scharfer, aber sehr wohlriechender über, weiß wie Molken, und legt sich allenthalben den Seiten des Recipienten an wie ein *Sal volati Cervi*. Man läßt es 24 Stunden ruhig stehen, es sich in ein gelbes klares Oel auf.

Dies sind die vorzüglichsten Vorschriften, aufgefunden habe. Sie ergänzen sich unter einander und wenn sie hin und wieder in den Resultaten stehen, so mag die Schwierigkeit der Darstellung Weidenfeld *opus difficilimum* nennt, den größtheil daran haben.

Was die *Tinctura Antimonii Thedenii* betrifft, ihrem Wesen nach hierher gehört, so dient es zu Bestätigung und Erläuterung, hier andere ähnlichen Vorschriften, wobei der Weingeist mit zur Bereitung gehört, aus der Literatur jener ältern Epoche mitzutheilen.

1) *Oleum Stibii Rogeri Baconis* (*The Triumphwagen Antimonii Basilii Valentini p. 270.*)

Essigsaures Spießsglanz wird mit rectificirtem Weingeist übergossen, und 40 Tage in Digestion gestellt. Sobald eine klare Auflösung wird bei gelinder Wärme destillirt, bis übergegangene Spiritus wieder zurückgegossen, von neuem abgezogen, und dies so oft wiederholt, bis er in verschiedenerlei Farben über den Helm steigt. Dann ist ein starkes Feuer zu geben, er wird roth in den Helm zu steigen, und wie ein bluthrothes Oel in die Vorlage zu fließen. Den Spiritus zieht man bei ganz gelinder Wärme ab. Es ist ein edles, wohlriechendes, kräftiges Oel, welches bei dunkler Nacht wie eine glühende Kohle leuchtet. Es wird in den schwersten Krankheiten empfohlen, merkwürdig ist, was von seinem Gebrauche gegen die *dagra* gesagt wird. Man giebt bei den ersten Zeichen des Anfalls drei Tropfen in Wein nüchtern ein,



Es so den zweiten und dritten Tag. Den ersten Tag lindert es alle Schmerzen, und verhütet die Anschwellung; den andern Tag bewirkt es einen dicken, klebrigen, stinkenden, sauren Schweiß, besonders in den Gelenken, den dritten Tag erfolgt, wenn auch nichts eingenommen worden ist, ein beschwerdeloses Purgiren.

2) *Quinta Essentia Antimonii.* (Basil. Valentini *Triumphwagen Antimonii* von Kerkring p. 147.)

Man löst essigsaures Antimon in Weingeist auf, und läßt es einen ganzen Monat digeriren. Dann destillirt man es mit einem besondern Handgriff, und erhält eine liebliche süße Arznei in Form eines schönen rothen Oels. Kerkring macht hierbei die Anmerkung, daß er diesen besondern Handgriff nach vieljährigen Versuchen gefunden habe, er entdeckt ihn aber nicht offen, sondern durch ein Räthsel, was seine Auflösung noch erwartet. Von der Wirkung dieses Oels sagt er, den ersten Tag wirkt es nur wenig auf die Haut, den zweiten Tag folgt gelinde Ausdünstung, den dritten Tag ziemlich starker Schweiß, aber den vierten und die folgenden Tage schwimmt man gleichsam in Wasser, so daß endlich der Schweiß durch das Bett auf den Boden tröpfelt. Aber, setzt er hinzu, hier ist ein verständiger Arzt nöthig, denn die Keule des Herkules wird nicht viel nützen, wenn sie nicht auch in der Hand eines Herkules ist.

3) *Spiritus salis Tartari.* (Lancilot's *brennender Salamander* p. 295.)

Man behandelt essigsaures Kali wiederholt mit rectificirtem Weingeist. Diesen cohobirt man 15mal und mehr oder so lange, bis röthliche Tropfen mit übergehen; dann destillirt man die rückständige Flüssigkeit mit verstärktem Feuer, so geht der *Spiritus salis Tartari*

**Krystallisation.** Anstatt, daß zu wenig Schwefelwasserstoff, wie man anfangs vermuthen sollte, in die Natronlösung geleitet worden wäre, hat man also zu viel eingebracht. Dieses zeigt sich auch dadurch, daß, wenn man jener Flüssigkeit Natron zusetzt, auch dann reiche Bildung von Krystallen und das Verschwinden des stinkenden Geruchs erfolgt.

Wenn also der neue Codex angiebt, daß in die Natronauflösung so lange Schwefelwasserstoff strömen soll, *bis dieses Gas nicht mehr absorbirt wird*, so wird der Sättigungspunct überschritten und die Flüssigkeit liefert keine Krystalle; man muß erst durch Erhitzen den Ueberschuß von Schwefelwasserstoff entfernen, wodurch die Bildung einer höhern Verbindung bewirkt.

Ein zweiter bei der Vorschrift des Codex zu berücksichtigender Umstand betrifft die Natronlösung, die sein soll, um nach schicklicher Sättigung mit Schwefelwasserstoff Krystalle zu liefern; man wendet sie am zweckmäfsig concentrirter an, 29 bis 30°; 36° wie Berzelius vorschlägt, wende ich nicht an, weil sonst leicht die ganze Flüssigkeit zu einer krystallinischen, schwärzlich abtropfenden Masse geseht.

Nach vielen Versuchen über diesen Gegenstand habe ich folgendes Verfahren am zweckmäfsigsten gefunden.

Zur Entwicklung des Schwefelwasserstoffs nimmt man 2 Pfund Eisenfeile und 1 Pfund Schwefel in einem eisernen Pfanne mit Wasser zu einem Brei, und erhitzt unter stetem Umrühren bis zum Kochen, es entwickelt sich dann viel Wärme, man läßt die Masse erkalten und bringt sie in das Gasentwicklungsgefäß, bedeckt es einen Zoll hoch mit Wasser, befestigt eine gerade Röhre in das Gefäß, die eben in dieses Wasser taucht, um die Schwefelsäure eingießen zu können, und eine zwe-

gebümmte Röhre, welche das Gas in die Natronauflösung führt, von der man 10 Pfd. von 29° B. nimmt. Man entwickelt dann durch verdünnte Schwefelsäure das Gas, wobei es zweckmässig ist, dieselbe im Verlauf der Operation weniger verdünnt anzuwenden, so dass z. B. erst eine mit 8, später nur mit 4 Th. Wasser verdünnte Säure erhalten wird. Wenn die Entwicklung des Gases nachlässt und durch Zusatz frischer Säure nicht mehr sich vermehrt, so muss man das Entwicklungsgefäss auf einem Sandbade erwärmen, worauf sich neue Quantitäten Gas entwickeln, die man noch durch Zusatz frischer Säure vermehrt.

Nach beendigter Operation stellt man die Natronflüssigkeit an einen kühlen Ort; nach 2—3 Tagen, je nach der Temp., haben sich darin ohngefähr 4 Pfd. Krystalle abgeschieden, die man auf einem Trichter abtröpfeln lässt, man muss sie mit Vorsicht behandeln, weil Haut und Nägel davon angegriffen werden. Die Mutterlaugen setzen in verschlossenen Gefässen nach einiger Zeit noch Krystalle ab. (*Journ. de Chim. med. 2. Ser. V, 49.*)

---

## Ueber Cudbear;

vom

Vicedirector Apotheker *Müller* in Medebach.

---

Hr. Apotheker Dr. Voget in Heinsberg legte bei der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Pyrmont mehrere Proben eines Farbestoffs, welcher unter dem Namen *Cudbear* im Handel bekannt ist, vor. Derselbe hatte die Ansicht, dass dieser Farbestoff vielleicht durch Einwirkung von kohlensaurem Kali, Natron,

Salmiak oder Säuren auf Abkochungen von Fernambukholz erzeugt würde, die Flüssigkeit eingedunstet, das trockne Extract mit Pulver von den Cacao-Schalen gemischt in den Handel gebracht würde.

Man stimmte damals allgemein der Ansicht des Dr. Voget bei und wünschte, daß eine vollständige Analyse dieses Farbestoffs bewirkt würde, welche Hofrath Professor Dr. Wackenroder in Jena ausführen die Güte haben wird.

Es kann nun nicht im entferntesten meine Absicht sein, einem so rühmlichst bekannten Chemiker, wie Hofrath Dr. Wackenroder, vorzugreifen, sondern laube mir nur, in wenigen Worten meine Ansicht über diesen Farbestoff auszusprechen.

Nachdem ich durch mehrere Häuser in Besitz mehrerer Proben von Cudbear gekommen, verfehlte ich nicht, gleich vergleichende Versuche anzustellen. Ich verfertigte mir mehrere Decocte von Fernambuck- und Cudbearholz, und liefs die oben angeführten Salze, so wie Säuren, darauf einwirken, wo ich allerdings ebenfalls ähnliche Farbestoffe erhielt, welche sich indess sehr von Cudbear unterschieden. Auch wurde zur Vergleichung eine wässrige Abkochung von Cudbear von Orseille, beide in ziemlich concentrirtem Zustande, gefertigt.

Mit sämmtlichen tief violettrothen Flüssigkeiten wurden die Versuche angestellt und habe ich gefunden, daß die Unterscheidung dieses Farbestoffs von anderen, Schwefelwasserstoffgas das sicherste Reagens ist. Leitet man nämlich in eine Abkochung von Cudbear anhaltend Schwefelwasserstoffgas, so wird binnen kurzem die schön violettrothe Farbe zerstört, man bekommt eine wasserhelle Flüssigkeit, und kann durch kein Reagens, so vi



Welche ich auch anstellte, die Farbe wieder hergestellt werden. Diese Farbenzerstörung findet ebenfalls bei einer Abkochung von Orseille statt, nicht aber bei Decocten von Ternambuck - und Campecheholz, obgleich allerdings auch eine Farbenveränderung statt findet, und zwar wird die rothe und violette Farbe in eine hellbräunliche mehr oder weniger umgeändert. Dieses eigenthümliche Verhalten des Cudbears und der Orseille bestimmt mich dazu zu glauben, daß Cudbear ein der Orseille gleicher Farbestoff ist und vielleicht aus *Lichen tartareus* durch eine Art von Gährung erzeugt wird, und kann nach der Meinung des Hrn. Dr. Voget allerdings mit Cacao-Schalenpulver zur Vergrößerung der Masse vermischt werden.

Das Verhalten des Schwefelwasserstoffgases gegen pflanzliche Farben ist eigenthümlich und habe ich mich durch diesen Versuch bestimmen lassen, die Einwirkung dieses Gases auf mehrere Pflanzenfarben zu beobachten, und werde ich die Resultate darüber später mittheilen.

## Bemerkung über das Sarsaparin;

vom

Apotheker *Beral*.

Die Sarsaparille giebt durch Behandlung mit kaltem Wasser einen weit stärker schmeckenden Auszug als mit kochendem, und wenn mitunter gerühmte Wirkungen dieses Mittels in Zweifel gezogen wurden, so liegt es gewiß mit daran, daß man in dem einen Falle einen

mit kaltem oder mit mäßig warmem, in dem einen mit kochendem Wasser bereiteten Auszug wandt hatte. Die eigenthümliche Substanz der Sarsaparille, das Sarsaparin, welches eine bedeutende harntreibende Kraft besitzt, gewiss auch die Bitterkeit der Sarsaparille, ist aber flüchtig. Daraus erhellt, daß man zur Extraction der wirksamen Theile der Sarsaparille die Wärme möglichst zu vermeiden muß. Ein bei mäßiger Wärme bereitetes Sarsaparin enthält indeß noch immer eine bemerkliche Menge Sarsaparin. Ich habe daraus Sarsaparin dargestellt. Ausziehen der Wurzel mit mit Weingeist vermischtem Wasser, Abdestilliren des Spiritus und Filtriren des Rückstands nach einiger Ruhe. (*Journ. de Chim. med.* V, 134. *Auszug.*)

## Ueber die Milch des Frauengeschlechts und der Thiere;

von

*J. E. Herberger.*

Schluss der Seite 43 abgebrochenen Abhandlung

Nächst der *Nahrungsweise* und dem relativen *Gesundheitszustande* der Thiere wird die Beschaffenheit ihrer Milch noch influenzirt durch die *Anstrengungen*, denen menschliche Gelüste und Bedürfnisse sie aussetzen. Es fehlt mir nicht an thatkräftigen Belegen auf diese Art von Wahrnehmungen. Ich habe mehr als 1000 Milch geprüft, von Kühen in Mitte ihrer Anstrengung.

men. Stets fand ich sie dicklicher und relativ ärmer, dabei mitunter von eigenthümlichem, meist dem Gaumen nicht befreundetem Geschmacke. Neuere Beobachtungen der Herren Henry und Chevallier stehen in vollem Einklange mit meinen Angaben; doch hauptsächlich (worüber *eigene* Erfahrung mir mangelt) diese wichtigen Chemiker gerade das Gegentheil von der Milch der Lelinnen, die, von erschöpften Thieren gewonnen, als wässerig und käsestoffarm beschrieben wird.

Was hier nun vom Einflusse der Nahrungsmittel, des jeweiligen Gesundheits-Zustandes u. s. w. auf die chemische Milch behauptet worden ist, hat, und zwar in vielfältiger Art, auch bezüglich der *Frauenmilch* seine volle Bedeutung \*).

Was spricht sich z. B. schon in der so häufig geschehenen Wahrnehmung aus, daß erkrankende Mütter und Ammen auf die Säuglinge nachtheiligen Einfluß ausüben, wofür, aufer andern ursächlichen Momenten, als Hauptgrund eine in Folge der Krankheit eingetretene mehr oder minder große Veränderung im chemischen Bestande der Milch wohl ohne Täuschung angenommen werden dürfte. Es hält zwar unendlich schwer, sich von erkrankten Wöchnerinnen Milch in hinreichender Menge Behufs chemischer Untersuchungen zu verschaffen; wenn es aber erlaubt ist, von einigen wenigen Erfahrungen in diesem Gebiete einen allgemeinen

In dieser Beziehung ist eine von F. Simon angeführte Analyse höchst bemerkenswerth, wonach eine nothdürftig genährte Frau eine äußerst butterarme Milch lieferte, die bei gebesserter Nahrung, wieder völlig normaler Beschaffenheit erlangte.

Schluss zu abstrahiren, so mögen vielleicht folgende Thatsachen, zu welchen ich nur durch Vermittlung meines Freundes Dr. Müller gelangen konnte, von Interesse sein.

Eine Frau von 38 Jahren, von lymphatischer Constitution, zum vierten Male Wöchnerin, hatte seit Jahren an Flechten auf der rechten Seite des Nackens gelitten. Während ihrer letzten Schwangerschaft waren die Flechten verschwunden, kurz nach erfolgter Entbindung kamen sie wieder zum Vorschein. Diese Frau hatte sich früherhin gegen das erwähnte Uebel einer Sublimatlösung als Waschmittel, und zwar mit temporär günstigem Erfolge, bedient, und ohne sich in ihren nunmehrigen Verhältnissen bei einem Arzte Rathes zu erholen, griff sie zur alten Phiole, worin noch Sublimatlösung vorhanden war, und wusch sich zu wiederholten Malen auf gewohnte Weise. Es stellte sich bald darauf ein heftigster Schmerz in den Brüsten ein, und zugleich begannen die unteren Gliedmaßen anzuschwellen. In diesem Zustande traf sie der Arzt. Er drang vor Allem auf Entwöhnung des Kindes, und nahm durch mechanische Hülfe einen Theil der reichlich fließenden Milch ab. Es gelang ihm, Mutter und Kind zu retten.

Die mir sogleich zugestellte Milch war dicklich schleimig, unter dem Mikroskope sich ziemlich normal verhaltend, jedoch einen unnatürlichen zähen Zustand und eine beginnende Continuität darbietend, wie sie gewöhnlich nicht statt findet. Sie reagirte sehr stark alkalisch, und besaß einen eigenthümlichen, fast etwas fauligen Geruch, ohne jedoch bei vorsichtiger Destillation Ammoniak zu entwickeln. Ein eigenthümliches flüch-



das Princip konnte nicht abgesondert werden. Ihr spec. Gew. unterschied sich kaum von jenem einer normalen Milch, aber der Zuckergehalt derselben war größtentheils vermindert, während die übrigen Bestandtheile in etwas höherem Verhältnisse zugegen waren. Quecksilber konnte nicht aufgefunden werden \*).

Der zweite, hier in Kürze zu berührende Fall ist folgender:

Ein Mädchen von 23 Jahren, welches 2 Jahre hindurch von einem auswärtigen Arzte an Syphilis mit dem besten, und wie es schien, gänzlichem Erfolge behandelt worden war, gebar ein todttes Kind. Die Brüste der Mutter flossen reichlich bis zum siebenten Tage, nach welchem sie, in Folge einer Erkältung, die heftigsten Schmerzen in denselben fühlte. Es trat sogenanntes Kindbettfriesel hinzu, und die linke Brust bereitete sich zu einem Abscesse vor, während nun die rechte Brust sich mit einer großen Menge Milch anfüllte, die häufig abgenommen, und zu meiner Disposition gestellt wurde. Es ist mir unbekannt, welche anderweitige Krankheitsverhältnisse noch hinzugegetreten sein mögen, das Mädchen genas erst nach langem Krankenlager wieder.

Diese Milch nun reagirte spurweise sauer, die Consistenz der Fettkügelchen war an ihr unter dem Mi-

\*) Die erhaltenen Zahlenergebnisse waren:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Wasser u. fl. Th. .... | 88,01   |
| Zucker.....            | 1,93    |
| Fett.....              | 3,63    |
| Küsestoff etc.....     | 4,32    |
| Salze.....             | 2,10    |
|                        | <hr/>   |
|                        | 100.    |
| Spec. Gew.             | 1,0338. |

kroskope nicht mehr bemerkbar, sie besaß einen schen, eigenthümlichen Geruch, war etwas ins Gelbliche ziehend, von 1,031 spec. Gew., und gerann durch verdünnte Säuren, Gallustinctur, und Kälberlab auflöslich und vollkommen. Die chemische Analyse verzeigte zunächst sehr verminderten Gehalt an Fett nach \*).

Die Zahl der einer Niederkunft bereits früher erfolgten vorhergegangenen Geburten, die Grösse der mit der Entbindungsacte verbundenen Anstrengungen u. s. w. sind meistens als untergeordnete, in der Mehrzahl der Fälle auf eines der vorher entwickelten Momente, oder auf Complicationen derselben, zurückführbare Punkte zu betrachten.

Wenn es mir nun aber unbegreiflich dünkt, wenn einst ein gelehrter Chemiker die *exclusive* Behauptung aufstellen mochte, daß, aller Krankheitsumstände ungeachtet, Veränderungen im Zustande der Milch nicht nachgewiesen werden können: so würde mir jetzt eine analoge Behauptung noch viel paradoxer erscheinen, wenn man von dem *Gemüthszustande* säugender Frauen geltend zu machen versuchen wollte, nachdem es mir während längerer Zeit durch Vermittelung des sel. Dr. Müllers gelungen ist, zu schlagenden Gegenbeweisen zu gelangen.

Eine Frau in einem Dorfe am Rheine, in der Blüthe der Jahre, sanguinischen Temperaments, gesund, kräftig, ward zum dritten Male Mutter. Sie hatte ihr Kind stets und mit Erfolg gesäugt, sie erfüllte die Muttersorge an ihrem neugeborenen, gesunden und kräftigen Kinde.

---

\*) Die Zahlenergebnisse vermag ich hier nicht mit der erforderlichen Genauigkeit anzuführen, da mir bei diesen Versuchen der hiezu bestimmte Antheil von Milch gegen das Ende der Operation verloren ging. Der Wassergehalt betrug übrigens im Mittel 90,03. H.

tigen Mädchen wieder. Ihr Wochenbett ging glücklich über. Aber nach 3 Wochen vernahm sie plötzlich die Kunde von dem Tode ihres nach Amerika ausgewanderten einzigen Bruders, dem sie mit ihrer Familie späterhin nachzufolgen beschlossen hatte. Sie bekam die heftigsten Krämpfe, und ihre Milch versiegte für die volle Hälfte eines Tages; dann trat sie wieder auf, — aber ganz von den *Eigenschaften des Colostrums!* Binnen 13 Stunden, während welcher das Kind Ziegenmilch erhalten hatte, worauf es wieder unwohl ward, kehrte mit der Gemüthsruhe der Mutter auch die bessere Beschaffenheit der Milch wieder. Dies dauerte über 3 Monate. Mit einem Male kehrt nach Mitternacht ihr Gatte, ein Schmuggler jener Zeit, dessen nächtliche Reizen ihr, der Gattin, längst fremd zu sein aufgehört hatten, im vollsten Wahnsinne der Trunkenheit, von zweien Männern getragen, nach Hause. Die Sonne stahl sich am frühen Morgen nur in die Kammer, um ein trauriges Bild häuslichen Unfriedens zu beleuchten. Der mißhandelte Gattin versiegte zum zweiten Male die Milch; nach einem Tage trat sie nochmals colostrumartig auf, aber sie floss nie mehr reichlich, und erhielt, auch bei geeignetem ärztlichen Einflusse, ihre normale Beschaffenheit nicht wieder. Mutter und Kind begannen zu kränkeln; später wanderte die Familie aus; ich habe nicht wieder von ihr gehört.

Etwas Aehnliches mag auch im Thierreiche sich ereignen, wenn die säugenden Weibchen in gereizte oder beängstigte Zustände gelangen. Aber die Erforschung derartiger Analogieen wäre nun von untergeordnetem Interesse, da unsere friedlicheren Hausthiere, deren Milch wir zu genießen pflegen, von ähnlichen Affecten wohl meistens befreit bleiben.

— ra-  
sthiere,  
ähnlichen

Es sei mir gestattet, hier noch auf eine frühere Äußerung zurückzukommen. Ich habe nämlich von der in der Regel *qualitativ* gleichartigen Constitution der Frauen- und der thierischen Milch gesprochen. Der Unterschied in den *quantitativen* Verhältnissen verdient jedoch auch unsere vollste Berücksichtigung. Warum, frage ich, entspricht z. B. die Frauenmilch am besten den Bedürfnissen der Säuglinge? *Deshalb*, weil ihr überwiegender Alkaligehalt sie vor zu schneller Verderbniss zu schützen vermag, und weil in ihr der Zuckergehalt mehr als in andern Milcharten hervortritt. Die Milch der Ziege bildet ein Analogon zur Milch des Frauengeschlechtes; jene empirische Anpreisung der Ziege als der besten Säugamme, wovon die Annalen der Medicin zu erzählen wissen, beruht somit mindestens auf einer naturgemässen, wenn auch unklaren Begründung. Die Milch der *Eselinnen* endlich hat, anderweitigen Angaben zu Folge, gleichfalls grosse Aehnlichkeit mit der Milch des Menschen. Sollten in diesem chemischen Aehnlichkeitsverhältnisse nicht Gründe verborgen liegen für das therapeutische Verfahren bei Schwindsüchtigen u. s. w. \*)?

---

\*) Das Mittel von zehn zu verschiedenen Zeiten angestellte Untersuchungen der Milch einer und derselben robusten vollblütigen, wohl genährten, zum zweiten Male säugenden 28 Jahre alten Bauerfrau war nach meinen Erfahrungen

Wasser u. fl. Theile.....86,93

Fett..... 4,83

Käsestoff etc..... 3,10

Zucker..... 4,87

Salze..... 0,22

---

100.

Spec. Gew. 1,0341.

Mit diesen Beobachtungen stimmen die Erfahrungen v



An diese Beobachtungen knüpfen sich noch andere von der äussersten Bedeutung über »den Einfluss der Arzneistoffe auf die Zusammensetzung der Milch.«

Es bedarf keines Commentars, daß *Anzeigen* hiefür schon in den Wahrnehmungen des Einflusses der *Nahrungsmittel* gegeben sind; aber die Zahl und Mannigfaltigkeit der *Arzneistoffe* ist unendlich gröfser, und es läfst sich somit aus jenen Beispielen noch keine allgemeine gültige Folgerung abstrahiren.

In der That hat Dr. F. Simon gezeigt, daß Eisen-*cyankalium*, Jodkalium, Bittersalz etc. *nicht* in die Milch übergehen; nach Henry und Chevallier gilt dasselbe vom Salpeter, den Chininsalzen, den Schwefelverbindungen, und, wie es scheint, auch von den Quecksilberverbindungen; bezüglich des Jodkaliums widersprechen jedoch ihre und meine Erfahrungen den Angaben meines deutschen Landsmannes. *Aufgenommen* werden nach Henry und Chevallier ferner: Kochsalz, doppeltkohlensaures Natron, Glaubersalz, die Oxyde des Eisens und Zinks, basisches Wismuthnitrat, und eine Menge organischer Stoffe, durch deren Gegenwart u. A. nicht selten die gelbe und blaue Farbe der Milch, sowie

F. Simon, Henry und Chevallier u. A. sehr annähernd zusammen.

Die von mir erhaltenen Resultate zweier Analysen von *Zugmilch* sind folgende:

|                                      | 1     | 2     | Im Mittel. |
|--------------------------------------|-------|-------|------------|
| Wasser nebst eigenth. Geruchsprincip | 85,90 | 85,73 | 85,815     |
| Fett.....                            | 5,02  | 5,10  | 5,060      |
| Kleinstoff etc.....                  | 3,05  | 3,00  | 3,025      |
| Zucker.....                          | 4,60  | 4,24  | 4,420      |
| Salz.....                            | 1,43  | 1,93  | 1,680      |
|                                      | 100.  | 100.  | 100.       |
|                                      |       |       | H.         |

deren eigenthümlicher Beigeschmack bedingt ist. A das doppeltkohlensaure Kali, die löslichen Verbindungen des Zinns und des Antimons, können nach meinen an Thieren gemachten Erfahrungen, in die Milch übergehen. Von Kalk- und Barytsalzen gilt dieses nur sehr untergeordnetem Grade; ich selbst kann den Uebergang solcher in die Milch nur von den Chloriden Calciums und Baryums *erfahrungsgemäßs* bestätigen.

Versuche dieser Art an *Menschen* zu machen, können nur in sehr seltenen Fällen gestattet sein, und Angaben, am Thierreiche erworben, scheinen mir im Allgemeinen nichts weniger als *positive*, auf das menschliche schlecht mit Gewissenhaftigkeit übertragbare, Folgerungen zu gestatten.

---

Bevor ich zum Schlusse dieses Vortrages übergehe, muß ich eine Eingangs gemachte Bemerkung nochmals ins Auge fassen. Dort sagte ich nämlich, daß die Milch des Menschen von jener der Thiere nicht sowohl qualitativer, als vielmehr in quantitativer Beziehung verschieden sei. Diese Aeußerung darf jedoch nicht mißverstanden werden, was um so eher der Fall sein könnte, nachdem man F. Simon's sehr werthvolle Schrift »*Die Frauenmilch etc.*, Berlin 1838, 8.« gelesen hat. Dieser geschickte Chemiker hat bei vergleichender Prüfung der einzelnen gleichnamigen Bestandtheile der Frauen-, Kuh-, Hunde- etc. Milch ganz bemerkenswerthe Differenzen beobachtet, die ich in Kürze namhaft machen werde.

Den *Käsestoff* anlangend, so zeigt unter allen in der Frauenmilch enthaltene die relativ größere Passivität gegen Gerinnungsmittel. Das vollständigste Fällungsmittel ist *Gallustinctur*, welche zugleich bewirkt

der Fettgehalt vom Käsestoffe mit niedergerissen  
 1. Jenes eigenthümliche Verhalten des Frauenmilch-  
 stoffes ist jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach  
 durch das in der menschlichen Milch in höherem Grade  
 vorhandene Alkali bestimmt. Dadurch wird jedoch die  
 Thatsache nicht genügend aufgehehlt, daß z. B. Frauen-  
 milch durch *Kälbermagen* nur sehr unvollkommen, durch  
*Kindermagen* dagegen weit reichlicher coagulirt wird,  
 während umgekehrt *Kälbermagen* für Kuhmilch zu  
 demselben Behufe geeigneter ist als *Kindermagen*. In  
 dieser Hinsicht müssen die Wechselbeziehungen beider  
 Stoffe noch näherer Erforschung anheim gegeben werden.

Der Zuckerstoff der Frauenmilch schien Simon sü-  
 ßer zu sein, als jener der Kuhmilch. Bei gleicher  
 Krystallform war ersterer löslicher in Wasser als letz-  
 terer, auch gab jener ihm mittelst Salpetersäure weni-  
 ger Schleimsäure aus. Ich habe bei meinen Versuchen  
 diese Unterschiede nicht beobachten können. Durch  
 Simon's Andeutungen aufmerksam gemacht, suchte ich  
 Frauen- und Kuhmilchzucker, durch Wasser, Alkohol,  
 Aether und verdünnte Essigsäure gereinigt, vergleichend  
 zu prüfen. Meine Ansichten sind durch die zuletzt er-  
 haltenen Ereignisse nicht geändert worden; der Unter-  
 schied in der Löslichkeit beider Zucker differirte im  
 Hundert um 0,05; die Ausbeute an Schleimsäure betrug  
 in meinen Versuchen beim Frauenmilchzucker um 0,01  
 — 0,02 weniger als beim Kuhmilchzucker. Der Zucker  
 der Ziegenmilch verhielt sich jenem der Frauenmilch  
 analog. Man sieht, die hier obwaltenden Unterschiede  
 sind zu klein, um sie vorläufig nicht von geringen Bei-  
 mischungen fremdartiger Stoffe abzuleiten.

Vom *Hundemilchzucker* belehrt Simon uns eines  
 Andern; dieser ist nur *extractives* Süßs.

Die *Butter* der Frauenmilch kann man die *reine* aller Butter nennen. Sie übertrifft alle anderen Butterarten an Consistenz und Geruchlosigkeit. Wenn in unter den Bestandtheilen der Milcharten *specifische* Unterschiede obwalten, so ist es bezüglich der Butter der Fall, da die aus Frauenmilchbutter gefertigte Seife ihrer Zersetzung, zum Unterschiede von allen anderen Butterarten, den Geruch der Buttersäure *in der Regel* d. h. wenn die Milch eine ursprünglich gesunde (nach Simon's und meinen, durch ihn hervorgerufenen Erfahrungen) nicht zu entwickeln pflegt. Ihr Schmelzpunkt liegt im Verhältnisse zu ihrer festern Consistenz höher, als jener anderer Butterarten; ich fand ihn  $+ 27^{\circ},5$  bis  $+ 27^{\circ},7$  R.; Simon bestimmt ihn auf  $28^{\circ}$  R. In kaltem Alkohol und Aether ist sie kaum löslich; auch wird sie weit minder leicht rancid, als andere Butterarten. Bei trockner Destillation giebt sie vornehmlich ein flüssiges und ein starres saures Fett, aber keine Butyrinsäure aus.

Was nun die in der Milch enthaltenen Salze anlangt, so bleibt den von Simon gemachten Beobachtungen nichts hinzuzusetzen übrig. Die meisten Salze umhüllt der Käsestoff, die wenigsten das Fett. Die Differenzen in den Eigenschaften des Zuckers der verschiedenen Milcharten erklären sich vielleicht durch denselben, den Zuckern nämlich, beigemischten verschiedenen Salzmen gen.

---

Es bleibt mir zum Schlusse nur noch übrig, die Voranstehenden einige Bemerkungen über sachgemäße Prüfung der Milch, vom diätetischen und medicinisch-policeilichen Gesichtspuncte aus, beizufügen. Die c



die Analyse \*) ist hier zu schwierig ausführbar und unständlich, um nicht den Wunsch nach einer andern Prüfungsweise zum Bedürfnisse zu erheben.

Bei Milchprüfungen kann es sich meistens nur um die Bestimmung

- 1) des Fett- und Käsestoffgehaltes,
- 2) des süßenden Princips,
- 3) der etwaigen Farbstoffe,
- 4) des etwaigen Zusatzes von Stärkmehl-, Gummi- und Eisenhaltigen Stoffen, endlich
- 5) der Salze, handeln, die vielleicht hinzugefügt wurden, um die Milch vor schneller Verderbnis zu schützen, oder die durch unreinliche Behandlung und Aufbewahrung hinzugekommen sein mögen.

Der Gehalt an Rahm (Fett) und überhaupt an festen Bestandtheilen im Allgemeinen pflegt durch s. g. *Galactometer* (von Cadet de Vaux, Bancks, Dinocourt, Lavoisier, Néandre, Collardeau, Henry und Chévallier u. s. w., — man vergl. die umfassende, hier häufig benutzte Abh. der Letzteren im *Journ. de Pharm.*, 1839, Juni und Juli) ermittelt zu werden. Das demselben zu Grunde liegende Princip ist das eines Aërometers. F. Simon hat zu diesem Behufe, wie ich bereits oben angedeutet habe, *Gallustinctur* vorgezogen, welcher die Eigenschaft zukömmt, den Käse-

\*) Ich habe bei meinen Versuchen keine Veranlassung gefunden, von meiner im *Journ. für pract. Chemie a. a. O.* angegebenen Analysirmethode abzugehen, es sei denn bezüglich der Bestimmung des Käsestoffs, die ich, wie Simon, durch Alkohol erstrebte und erreichte. Nur bei Kälbermilch wandte ich, der Vergleichung wegen, hie und da auch Kälberlab als Fällungsmittel an. Im Uebrigen stimmt auch das von Simon beobachtete Verfahren wenig zu wünschen übrig.

H.

und Fettgehalt zu fällen \*). Es leuchtet von selbst, daß dieses Verfahren leicht zu den sichersten und allen wird ausgebildet werden können. Das etwa fälschlich zugesetzte *Versüßungsprincip* ist nach letztem Verfahren am leichtesten erkennbar in der vom Kasein und Buttergehalte befreiten Flüssigkeit, während Butter selbst dem Gesamtniederschlage durch Kochen mit Alkohol oder Aether ziemlich vollständig entfällt und sodann für sich bestimmt werden kann. Hat man, was möglichst zu vermeiden ist, zu viel Gallustinctur hinzugefügt, so ist es rathsam, den Ueberschuß an Gerbe- und Gallussäure durch Bleioxyd, oder, nach Analogie des von Winckler bezüglich der Tanninge-

\*) Um dieser Verfahrensweise Folge zu geben, sind zunächst zwei Dinge ins Auge zu fassen:

- 1) Eine Gallustinctur von *genau gekanntem* Gehalte. Simon empfiehlt dazu eine Lösung von alkalischem, zur staubigen Trockne reducirtem, Galläpfelextracte in Weingeist. Nach meinen Versuchen denselben Zweck gleich vollkommen und vielleicht noch sicherer durch *Gallussäurelösung* erreicht (*Gerbesäure* ist hiezu nicht geeignet), schlage ich die Anwendung dieser um so lieber vor, dieselbe nunmehr schon billiger im Handel zu beziehen ist, und zu dem fraglichen Behufe ohnehin nur in kleinen Quantitäten verbraucht zu werden braucht. Die Herstellung dieser Lösung oder jener Tinctur, geschieht unter Anwendung eines hiezu besonders und mit Genauigkeit hergerichteten Volumenmaasses.
- 2) Die Anfertigung einer galactometrischen Skale. Die läßt sich, mit Simon zu reden, sehr leicht dadurch construiren, daß man mittelst frischer, kräftiger Milch eine durchschnittliche Normalgröße ausmittelt, und fort an Mischungen solcher Milch mit aufsteigenden Wassermengen die fortlaufende Gradation bewerkstelligt.

Uebrigens läßt sich auch das von Fuchs bei der Biereprobe mit Glück in Anwendung gebrachte Princip, unter einigen Modificationen, auf die Prüfung der Milch übertragen.

sare empfohlenen Verfahrens, durch Eisenoxyd, zu entzünden, und die übrige Flüssigkeit alsdann weiterer Prüfung anheim zu geben. Gährungsversuche dürften hinsichtlich des Zuckergehaltes nicht vollkommen entscheiden, da Hefz auch der, übrigens noch keineswegs unwidersprechlich erwiesenen, Gährungsfähigkeit des Milchmachers das Wort gesprochen.

Die Untersuchung der Milch auf Farbstoffe zerfällt in eine mikroskopische und in eine chemische. Erstere gestattet unschwer die Erkennung etwa beifindlicher Blut- oder Eiterkügelchen. Künstliche anorganische Farbstoffe entschlüpfen nie der Hand des Chemikers, aber für organische Farbstoffe lassen sich auf chemischem Boden nur unvollkommene Beweise erzielen.

In großen und auch wohl in kleinen Städten wird die Milch häufig mit Wasser verdünnt, jedoch nicht immer mit reinem, sondern mit Kleien-, Reis- oder Gummiwasser, wodurch nach Henry und Chevallier, denen wir hierüber treffliche Aufschlüsse verdanken, die Milch eine zähere dickflüssigere Consistenz gewinnt, die ich am meisten mit derjenigen vergleichen möchte, welche man unter gewissen Umständen an Weinen »lang« zu nennen pflegt. In solchen Fällen kann durch Jodwasser entweder in der Flüssigkeit unmittelbar, oder in dem in der Milch nach einiger Zeit sich bildenden Niederschlage eine mehr oder weniger blaue Färbung erzeugt, oder das hinzugemischte Gummi aus der von Käse und Butter befreiten Flüssigkeit durch Alkohol in weißlichen Flocken niedergeschlagen, und an seinen übrigen Merkmalen erkannt werden. Wäre eine Milch mit Eiweiß, Eigelb oder dergl. vermischt worden, so gerinnt sie augenblicklich beim Erwärmen, und die abgewanderten Flocken besitzen den faden Geruch des

geronnenen Eiweißstoffes. Betrügereien anderer Art, wie Zusätze von Eibischwurzelauflösung, Hanfsaamen Mandelmilch u. s. w. sind, — trotz mehrfältiger Anzeigen — um so weniger glaubwürdig, als sie theils wenigstens gar keinen finanziellen Vortheil zu bieten vermögen, theils aber auch, ihren chemischen Beziehungen mit gewöhnlicher Milch sich weder bei erhöhter, selbst bei gewöhnlicher Temperatur vertragen, und derselben auch wohl einen völlig heterogenen Geschmack verleihen würden.

Was nun endlich Salzbeimischungen anbelangt, in der Absicht geschehen sein können, die Milch vor früherem Verderbniss zu schützen, so befolgt man, nach Henry und Chevallier, in Amerika ein höchst werthloses Verfahren, darin bestehend, daß man die Milch in Zinkgefäßen aufbewahrt, wodurch u. A. unstreitig lösliches milchsaures Zinkoxyd entsteht. Milder ist das in unsern Städten hie und da eingeführte Versetzen der Milch mit etwas doppelt- (oder anderthalb-) kohlensaurem Natron. Eine solche Milch gerinnt weit schwieriger als jede normale, unversehrte Milch, und ist ganz und gar ungeeignet dazu, spontan zu stocken, und s. g. Käse oder Zieger abzusondern. Auf die Gesundheit dürfte ein ganz geringer Zusatz dieses Salzes wohl nicht nachtheilig einwirken; doch ohngeachtet möchte ich doch nicht rathen, eine derartige Pseudoverbesserung gesetzlich zu sanctioniren, es sei denn — ausnahmsweise — bezüglich solcher Gegenden, wo nothdürftige Stallfütterung (s. o.) unabweislich geworden ist, wie z. B. in Paris u. a. O.

Andere durch Unreinlichkeit oder Nachlässigkeit oder platte Unkenntniß in die käufliche Milch übergegangene salzige und metallische Verunreinigungen ge-

seiner Natur und Mannigfaltigkeit nach, nicht in Reihe der bei gegenwärtiger Veranlassung aufzutretenden Stoffe.

---

## Physiologisch-chemische Abhandlung über das *Smegma praeputii*;

von

Carl Stickel,

Apotheker in Kaltennordheim.

---

Wenn es uns gelingt, irgend einen Stoff, sei es ein einfacher oder zusammengesetzter, der früher noch nicht ermittelt worden war, an einem leblosen Körper zu finden, so ist dieses für die Wissenschaft interessant, für das Leben oft nutzenbringend. Gehört aber dieser Stoff dem lebenden und insbesondere dem menschlichen Organismus an, dann hat er alsbald mehr Bedeutsamkeit für Medicin und Physiologie, und es lassen sich aus den oft unscheinbarsten Thatsachen, wichtige Folgerungen über die Functionen ganzer Organe und die Entstehungen von Krankheiten daraus entnehmen.

Wie aber die chemische Constitution so mancher Theile des menschlichen Körpers noch gar nicht genau bekannt ist — wovon jedoch Blut, Milch, Harn u. dgl. nur durch die neuerlichst darüber erschienenen Arbeiten eine rühmliche Ausnahme machen — so war es bisher mit dem *Smegma praeputii*.

Das Wort *Smegma* kommt von dem griechischen *σμήγμα* und bedeutet das Schmieren, Mittel zum Einreiben. Im Neugriechischen heisst es nach Lande-Peri's Berichten, ein Streupulver. Plinius erwähnt



es als Reinigungsmittel. *Smegma praeputii* ist also Schmiere der Vorhaut.

Da dieser Stoff bei der Zergliederung des menschlichen Körpers in Betracht kommt und die Organe berücksichtigen sind, welche ihn ausscheiden, so will

I. die anatomische Untersuchung desselben mittheilen.

Diejenige Verdoppelung der Haut, welche die gl des *penis* locker umfaßt, heißt *Vorhaut*, *praeputium*. Genauer betrachtet besteht sie aus einer dreifach geteteten Haut. Deren *äußeres* Blatt, mit der Epider vergleichbar, ist *rauh*, das *mittlere* mehr *feucht* und *innere* enthält sich öffnende Wärzchen, *papillae*, die bei manchen Thieren sogar stachelartig entwickeln. Vor allem waren diese Wärzchen oder Papillen genau zu untersuchen, da sie das abzuhandelnde *Smegma* sondern. Die Untersuchung selbst wurde mir durch meinen hochverehrten Lehrer, Hrn. Hofrath Huschke Professor der Anatomie in Jena, erleichtert, der ein Stück *praeputium* von einem frischen menschlichen Cadaver genau präpariren und mir zukommen ließ.

Erwähntes Stück *praeputium*, der Vergrößerung wegen unter eine mit Wasser angefüllte Glaskugel gebracht, zeigte 9 Drüsen von rundlicher Gestalt, und wie es schien, hohl. Von jedem ihrer Befestigungspunkte aus, lief eine kleine Furche auf der Haut fort. Eine dieser Drüsen, die den Namen *Glandulae Tyssonianae* führen, unter das Mikroskop geschoben, schimmert hornähnlich, hatten eine schmutzig gelblich-weiße Farbe und besaßen entweder die Form eines Hammerkopfs oder eines Blatts oder auch eines griechischen kleinen Gammas; in der Mitte besaßen diese Gestalt schwarze Pünctchen oder aderähnliche Verästelungen.

Was die *Würdigung* dieser Drüsen betrifft, so stehen sie nach Dr. Burckhardt auf einer höhern und zusammengesetztern Stufe der Entwicklung als die *Glandulae sebaceae* und *mucosae*. — Hat dieses aber nur Bezug auf Anatomie, so wollen wir sehen, welchen Werth das chemische Verhalten des Stoffes besitzt, den diese Drüsen ausscheiden, und so

## II. das Chemische des *Smegma* darstellen.

Frisch entnommenes *Smegma* ist ein gelblich-weißer Stoff, der mit den Fingern zerrieben sich fettig anfühlt und an Consistenz der Käseplatte völlig gleicht. Der Geruch ist eigenthümlich durchdringend stark; zwischen die Zähne gebracht, entsteht ein Gefühl, wie wenn man geronnenes Eiweiß kaut, übrigens völlig geschmacklos. Die Ermittlung des spec. Gewichts konnte nach der gewöhnlichen Methode nicht ausgeführt werden, weil eine einmalige Absonderung zu wenig Masse bietet; ich suchte es deshalb annähernd auf die Weise zu erforschen, daß ich einige Klümpchen *Smegma* in Mohnöl, einige in Terpentinöl warf. Aufersterem schwamm es, in letzterm sank es unter. Die Eigenschwere desselben ist also zwischen 0,870 und 0,929. — Ueberläßt man das *Smegma* in einer Glasröhre einige Tage sich selbst, so geht es rasch in thierische Fäulniß über und bedeckt sich mit langhaarigem Schimmel. Es verliert hierdurch seine Eigenthümlichkeiten so schnell, daß es für chemische Untersuchungen ein großer Unterschied ist, ob man es mit frischem oder altem zu thun gehabt hat. Das frische zeigt eine Einwirkung auf Curcumäpapier nicht; Lackmus wird dagegen *fast immer* geröthet. *Fast immer*, sage ich, weil zu Zeiten beide Papiere sich indifferent verhalten.

Was die *Literatur* des Smegma in chemischer Beziehung betrifft, so habe ich bis jetzt noch gar Nichts darüber finden können; es müßte denn sein, daß im Verlauf eines Jahres (seit welcher Zeit ich leider vom literarischen Verkehr durch die Ortslage sehr abgeschnitten bin) ein neues zoochemisches Werk dasselbe abgehandelt hätte. Auch in den Lehrbüchern der Anatomie und Physiologie erblickt man nur sehr kurze und kärgliche Beschreibungen des Smegma. Fast alle sagen: »eine dickliche, übelriechende, fettige Feuchtigkeit, Hautschmiere ähnlich.«

Der Gang der chemischen Untersuchung und die Resultate waren folgende:

A. Verhalten gegen Wasser.

Frisch entnommenes Smegma mit *kaltem* destillirtem Wasser geschüttelt, schwimmt anfangs in diesem, setzt sich aber nach kurzer Zeit zu Boden. Das überstehende Wasserhelle durch ein Leinwandläppchen abgoss und bis zum Sieden erhitzt, schied *thierisches Eiweiß* nicht aus; auch brachten Aetzkali, Gallustinctur, Quecksilberchlorid und Alkohol eine bemerkenswerthe Erscheinung nicht hervor. Nur essigsaures Bleioxyd brachte eine in Essigsäure leicht löslichen, und salpeters. Quecksilberoxydul einen kaum merklichen Niederschlag hervor.

Smegma mit destillirtem Wasser *gekocht*, lagerte auf der Oberfläche des Wassers fettige Tropfen ab, die aber nach dem Erkalten wieder zu Boden fielen. Die abgossene wasserhelle Flüssigkeit verhielt sich gegen die genannten Reagentien wie obige; ausgenommen daß Alkohol geringe Trübung bewirkt.

Mit Wasser verdünntes Smegma in einem Glasretortchen der *Destillation* unterworfen, gab ein geruchlos und geschmackloses Product, das bloß mit essigsauren

Silberoxyd einen in Salpetersäure löslichen Niederschlag hervorbrachte.

Aus diesem Verhalten gegen Wasser läßt sich folgern, daß unser Stoff von thierischem Eiweiß und Gallerte völlig frei ist, dagegen *thierisches Gummi* und eine *freie Säure* enthält, die noch genauer erörtert werden wird.

#### B. Verhalten gegen Alkohol.

Kalter Alkohol, der mit Smegma in Berührung gesetzt, abfiltrirt und durch Verdampfung concentrirt worden war, reagirt auffallend sauer und gab mit Quecksilberchlorid, Gallustinctur, Chlorbaryum, salpeters. Silberoxyd keine Trübung; essigs. Kalk dagegen brachte einen starken Niederschlag hervor. Außerdem hatte er das durchdringend übelriechende Geruchsprincip des Smegma in hohen Grade in sich aufgenommen. Indessen theilte sich dieses dennoch, so wie auch freie Säure, dem auf den Rückstand gebrachten und *bis zum Sieden erhitzten* Alkohol mit. Zudem hatte dieser erhitzte Alkohol eine nicht unbedeutende Menge Fett dem Smegma entnommen, das sich beim Erkalten mit gelblicher Farbe ablagerte.

Bemerkenswerth ist noch, daß wenn Smegma mit Weingeist geschüttelt und das Filtrat mit wenig Essigsäure vermischt wurde, Trübung entstand, und daß sich beim Verdampfen dieser Flüssigkeit *Häutchen* bildeten, deren Eigenthümlichkeit später erwähnt werden wird.

Aus dem Verhalten des Smegma gegen Alkohol ergibt sich also, daß die freie Säure als Milchsäure betrachtet werden kann; daß das Geruchsprincip unsers Stoffes in Alkohol löslich und daß es außer thierischem Fett noch etwas Eigenthümliches enthält.

## C. Verhalten gegen Aether.

Der Aether wirkt schnell auf das Smegma ein, weicht es breiartig und zieht Fett aus, das sich den Alkalien nicht verseifen läßt.

## D. Verhalten gegen Säuren und Alkalien.

Der Rückstand, welcher nach der Anwendung Wasser, Alkohol und Aether geblieben, wurde durch Aetzammoniak nicht angegriffen. Aetzkali löste ihn gegen durch Kochen auf und bezeichnet so die Natur des *Fibrin*. Durch Salpetersäure wurde er gelb, durch concentrirte Schwefelsäure braunroth gefärbt.

## E. Bestandtheile der Asche.

In eine Glasröhre gebrachtes Smegma, mittelst Löthrohrs erhitzt, entwickelte die beim Verbrennen thierischer Stoffe bekannten übelriechenden Gasarten und zeigte außer der Bildung von Wassertröpfchen nichts Besonderes. Die Asche lieferte *milchs. Ammoniumphosphors*. Kalk mit Spuren von *Chlornatrium* und *schwefels. Natron*.

Blicken wir nochmals auf den *Ursprung* des Smegmas zurück, so haben wir es als einen Ausscheidungsstoff der Drüsen kennen gelernt, welcher Milchsäure in sich enthält und suchen wir nun nach einer Analogie zwischen der von den weiblichen Brustdrüsen ausgeschiedenen Milch und der Flüssigkeit der Thymusdrüse, so würde diese vollkommen gefunden sein, wenn auch noch *Käsestoff* im Smegma nachgewiesen werden könnte.

Von diesem Gesichtspunkte ausgehend und wissend, daß der Käsestoff in vielen thierischen Flüssigkeiten früher gar nicht beobachtet, neuester Zeit aber vielfach nachgewiesen wurde, unternahm ich noch nachfolgende Versuche:



1) *Smegma* mit wässrigem Weingeist in Verbindung gebracht, das Helle abfiltrirt und auf einem Uhrglase gelinde verdampft, zeigte die schon erwähnten Häutchen, welche nach Simon das charakteristische Kennzeichen des Käsestoffs sind.

2) Der wässrig-weingeistigen *Smegmatinctur* ein wenig Essigsäure zugemischt, zeigte Flocken von Käsestoff. Die mit starkem Alkohol bereitete Tinctur liefs sich nicht wahrnehmen. Diese Erscheinung spricht für die schon aufgestellte Bemerkung, daß vegetabilische Säuren den Käsestoff aus alkoholischen Lösungen nicht fällen.

3) Aetzammoniak, durch das der Käsestoff aufschwillt, zertheilt auch *Smegma* theilweise auf und wird dadurch dickflüssiger. Essigsäure schied jedoch das Gelöste nicht ab, was aus, welche Eigenschaft dem Käsestoff zugeschrieben wird.

Sprechen die unter 1) und 2) angeführten Untersuchungen schon hinreichend für das Vorhandensein des Käsestoffs im *Smegma*, so bezeugt sich dieser Stoff auch noch vorzüglich durch des *Smegma* Eigenschaft, schnell zu faulen, durchdringenden Käsegeruch zu entwickeln, oder chemisch gesprochen, Aposepedin zu bilden.

Als Resultat dieses chemischen Theils tritt nur hervor, daß das *Smegma praeputii* folgende Bestandtheile enthält:

- Wasser,
- thierisches Gummi,
- Fett,
- Eigenthümliches Geruchsprincip, dem Alkohol sich mittheilend,
- Milchsäure;
- Käsestoff,

Fibrin,  
 milchsaures Ammoniak,  
 phosphorsauren Kalk,  
 Chlornatrium,  
 Schwefelsaures Natron.

Fragen wir nun, an welcher Stelle das Smegma den chemischen Lehrbüchern abzuhandeln sei, so es dem quantitativen Verhältniß seiner Bestandtheile nach, bei dem *thierischen Gummi* angeführt werden. Nun 5 Arten desselben bis jetzt unterschieden worden, nämlich: Speichelstoff, Spermatin, Gummi der Speicheldrüsen (Käseoxyd (Aposepedin) und Moschussubstanz, so möchte es zwischen Käseoxyd und Moschussubstanz seinen Ort finden.

Ich könnte vielleicht das Eigenthümliche des Smegma, welches in Weingeist löslich ist, und ihm den eigenthümlichen Geruch mittheilt, sich auch von dem Kalkstoff dadurch unterscheidet, daß die ammoniakalische Lösung nicht gefällt wird, *Smegmin* nennen. Es ist aber jetzt eines Theils schon eine Unmasse von neuen Namen in den Journalen aufgenommen worden; andern Theils ist eine solche Sucht von Namentaufer in unserer chemischen Wissenschaft eingerissen, daß man sich recht leicht wissenschaftlich zeigen kann. Wollte ich z. B. das Eigenthümliche des Smegma auf die Weise benennen, daß es aus Aldehyd aus Alkohol dehydrogenisirt entstanden ist, würde der Name *Smegmamonaacet*, d. h. Smegma, welches in Ammoniak löslich, aber durch Essigsäure gefälltbar ist, entstehen!

### III. Physiologische Betrachtungen.

Die Absonderung des Smegma läßt sich erst in den Knabenjahren deutlich beobachten und nimmt mit an-

der Pubertät zu. Höchst merkwürdig ist, daß hier-  
in ein gewisser *Periodismus* statt findet; denn obgleich  
die Ausscheidung desselben ununterbrochen fortgeht, so  
ist sie doch nach gewissen Zeiträumen auffallend stär-  
ker. Dreijährige ununterbrochene Beobachtungen lehr-  
ten mich, daß innerhalb eines Jahrs 10. solcher Perioden  
eintraten; die sich durch ein Gefühl von Jucken und  
Druck an der *corona glandis* zu erkennen gaben.

Ob dieser *Periodismus* mit der Menstruation ver-  
glichen werden darf? Diese Frage greift zu tief in die  
Studien der Physiologie ein, als daß sie sogleich bejaht  
oder verneint werden könnte.

In *medizinischer* Beziehung hat das *Smegma* einen  
dreifachen Nutzen:

1) Schützt es die sehr empfindliche Eichel und Ober-  
haut, damit diese beim Ausfluß des Urins durch seine  
Schärfe nicht leide.

2) Verhütet es Reibungen zwischen *glans* und *prae-*  
*putium*.

3) Verhindert es die Verwachsung beider Theile.

Das *Smegma* kann aber auch *nachtheilig* auf den  
Organismus einwirken, und es lassen sich hierbei für  
Pathologie 3 Fälle unterscheiden:

1) Es verliert seine *fettige Beschaffenheit*, wird  
dünnflüssiger und jauchig, wirkt fressend auf die Schleim-  
häute der umliegenden Theile ein und kann Entzündun-  
gen veranlassen.

2) Wird es in zu *geringer Menge* abgesondert, so  
schützt es die umliegenden Theile nicht gehörig vor der  
Schärfe des Urins und es können hierdurch ebenfalls  
Entzündungen veranlaßt werden.

3) Wird es zu *reichlich abgesondert* und nicht ge-  
hörig entfernt, so verdickt es sich und bildet einen festen

Ring um die Eichel, der leicht zu Phimosi oder Entzündungen Gelegenheit geben kann.

Zuweilen können aber auch wirkliche *Verhärtungen* entstehen, wie mir ein auf dem anatomischen in Jena befindliches Präparat bewies. Bei diesem merkwürdigen Stück hatte sich das Smegma in artigen auffallend grossen Täfelchen verhärtet, krystallinisch die Eichel umlagerten und dieser förmige Gestalt ertheilten.

Da bei südlicheren Völkern die Absonderung des Smegma viel reichlicher von statten gehen soll, so ist das *praeputium* bei diesen sich sehr entwickelt, so leicht, um die genannten Krankheitsfälle zu vermeiden, der Gebrauch der Beschneidung eingeführt worden.

Wenn uns der chemische Theil dieser Art die einzelnen Bestandtheile des Smegma aufführte, so würde dem Schluß berechtigte, daß es dem thierischen angehöre, so stellt sich dieses anders vom physikalischen Standpunkte aus dar. Wir gehen hierberger auf die Menge, als auf die Arten der Stoffe, die wir betrachten hierbei neben den physischen Eigenschaften der Körper auch die Organe, welche sie absondern und können so noch verschiedene Ansichten über die Natur des Smegma gewinnen. Wir können es mit dem dringend riechenden Absonderungen, wie Bibergeich, Moschus, vergleichen; noch eher aber nach Vergleich mit der Hautschmiere, oder auch mit der *Vernix*, welche die Haut des noch im Mutterleibe befindlichen Fötus salbenartig bedeckt. Die chemischen Untersuchungen dieser Stoffe von Frommherz, Gugert und Quelin gestatten diese Ansicht.

Ich selbst halte das Smegma in seiner ursprünglichen

ern für eine *Milch* und glaube diese Ansicht durch folgende Thatsachen rechtfertigen zu können:

1) *Smegma* ist ein von Drüsen ausgeschiedener Stoff; ebenso die *Milch*.

2) Ist es eine emulsivische Verbindung von Fett und Käsestoff, wie *Milch* aus Butter und Käsestoff.

3) *Smegma* reagirt säuerlich, gleich der frischen *Milch*. Der Grund liegt im Milchsäuregehalt beider.

4) Wird *Smegma* älter, so nimmt es härtere Consistenz an, wird käseartig und faulig riechend. Dieselbe Erscheinung bietet die *Milch* beim Gerinnen und bei der Käsebildung.

Die noch nöthige Nachweisung von Milchzucker war, wegen zu wenig Vorrath an *Smegma*, nicht möglich, und muß bis zu der Zeit problematisch bleiben, wo eine erforderliche Menge, vielleicht von einem Pferde, erhalten werden kann.

Aus allem diesen läßt sich aber der wunderbare Schluß machen, daß auch wir Männer milchabsondernde Geschöpfe sind, und daß wir das *Smegma praeputii* anstatt *Schmiere* der Vorhaut, richtiger *Männermilch*, *ἀνδρική*, nennen können.





## Dritte Abtheilung.

**A r z n e i f o r m e n .****Noch einige Worte über *Emplastrum thargyri simplex*;**

von

***Eduard Siller* in St. Petersburg.**

**I**ch habe mich überzeugt, daß, wenn man Bergglättpflaster durch Wasserdampf bereiten will, am besten durch Umgeben des Arbeitsgefäßes mit Dampf, unter Zusatz von 2 Unzen Wasser auf jedes Pfund Pflastermasse geschehe; nicht als ob dadurch das Pflaster selbst besser werde, als durch Hineinleiten des Dampfes in die Masse, sondern die Arbeit geht ruhiger, gleichmäßiger und sicherer von statten. Man verfährt wie folgt.

In einem tiefen kupfernen Kessel mit sphärischem Boden, der von den darin zu kochenden Stoffen mehr als zur Hälfte gefüllt wird, und der entweder ein hölzernes Gefäß eingehängt und durch das aus einem Dampfkessel in dieses Gefäß geleitete Dampfrohre Wasser umgeben wird, oder mit übergebogenem Dampfrohr in einen andern tiefern das kochende Wasser enthaltenden Kessel eingehängt wird, mischt man im gehörigen Verhältniß die beliebige Menge höchst feinst pulverte Bleiglätte mit Baumöl und Wasser, auf ein Pfund Pflastermasse 2 Unzen, zusammen, und umgibt das Gefäß entweder durch Oeffnen des Dampfahns, durchs Kochen des Wassers im größern Kessel, mit Dampf. Unter fortwährendem Umrühren mit einem hölzernen Spatel läßt man die Hitze des Dampfs so

und die Mischung lebhaft einwirken, bis diese sich vollkommen zum Pflaster vereinigt hat und gar keine Silberglättspünctchen mehr bemerken läßt, was unter gewöhnlichem Aufschäumen der Masse, die dann etwa das Fache ihres vorigen Volums einnimmt, in ungefähr 3 Stunden, bei einer Menge von 50 Pfund erfolgt sein wird.

Es braucht nicht bemerkt zu werden, daß das Umspritzen, Anbrennen und Uebersteigen der Mischung auf diese Weise unmöglich statt finden kann.

## Ueber das *Unguentum plumbicum*;

vom

Apotheker *Baldenius* in Dessau.

Ueber das Gelbwerden der nach der Preuss. Pharmacopoe bereiteten Bleisalbe ist schon Vieles geschrieben worden. Ohne auf die Erörterung der Ursache des Gelbwerdens dieser Salbe mich einlassen zu wollen, erlaube ich mir nur ein Verfahren mitzutheilen, wodurch diese Salbe gleichförmig und haltbar erhalten wird.

Statt reinen Schweinsfetts, wie die Preuss. Pharmacopoe zur Bereitung des *Ungt. simplicis* vorschreibt, nehme ich gleiche Theile Schweinsfett und reines gemischtes Provenceröl, schmelze beides mit der vorgeschriebenen Menge Wachs zusammen, colire und giesse nun sogleich, ehe es erkaltet, die Menge Brunnenwasser mit dem Bleiessig vermischt darunter; hierauf wird die Salbe so lange agitirt, bis sie erkaltet ist. Eine so bereitete Bleisalbe sieht anfangs etwas gelblich aus, was sich aber bald verliert. Statt daß die nach der gewöhnlichen Vorschrift zubereitete Salbe mit der Zeit gelb erscheint, wird die auf hier angegebene Art erhaltene weißer; diese hält sich mindestens 3 bis 4 Monat lang, und wenn sie gut gemischt und anhaltend ohne Unterbrechung agitirt worden ist, so wird sich von dem Wasser und dem Bleiessig nichts abscheiden, welches bei der gewöhnlichen Zubereitung immer der Fall war.

# Ueber die Bestandtheile des *Ungu saturnini*;

von

*Rudolph Brandes.*

Ich wurde vor längerer Zeit veranlaßt, eine Versuche darüber anzustellen, ob in dem *Unguent.* dem sogenannten *Cerat. Saturni*, eine Austauschungsbestandtheile des Bleiessigs mit denen des Fettes stattfinden, nämlich ob sich dabei fettsaures Bleioxyd und essigsaurer Glycerin, oder glycero-fettsaures Bleioxyd bilden möchte.

Es wurden zu dem Ende 4 Unzen der Sall *Axung. porci* (bereitet) einigemal, jedesmal mit 4 Wasser, gekocht, nach dem Erkalten die Flüssigkeit abgesondert und mit Schwefelwasserstoff der Blei derselben entfernt, worauf sie filtrirt und dann verdunstet wurden, es blieb aber nur eine unbedeutende Gran betragende braune extractive Masse zurück, die etwas salzig bitterlich schmeckte, aber durchaus nicht süßlich.

Dieser Versuch wurde mit frischer wie mit Monat alter Salbe, angestellt, mit demselben Erfolge keinem Falle wurde Glycerin erhalten.

Es wurde ferner  $\frac{1}{2}$  Unze der Salbe mit dem Wasser unter häufigem Umrühren so oft ausgekocht, bis die letzten Auskochungen durch Schwefelwasserstoff nicht mehr gefärbt wurden. Etwas der ausgekochten Salbe wurde mit Wasser geschüttelt, wurde durch Schwefelwasserstoff nicht verändert, die Salbe selbst aber wurde geschwärzt. Sie enthielt wirklich noch etwas Elei. Die ganze Masse der Salbe wurde daher verkohlt und verbrannt, und hinterließ etwas Bleioxyd, dessen Menge jedoch kaum 1 Gr. trug und wahrscheinlich von nur eingemengtem, an Bleiessig abgesetztem Bleioxyde herrührte.

Es ist also ersichtlich, daß, wie auch wohl zu erwarten war, in der in Rede stehenden Bleisallzäure Bleioxyd nicht zersetzt wird, und weder fettsaures Bleioxyd noch essigsaurer Glycerin darin enthalten ist.



## Vierte Abtheilung.

### Centralbericht.

#### Anwendung des Daguerreschen Verfahrens auf mikroskopische Gegenstände.

Die Herren Gebauer, Director der Baukunst- und Handwerkschule in Breslau und Prof. Dr. Göppert haben nach dem Daguerreschen Verfahren mittelst des durch das Drummondsche Licht beleuchteten Mikroskops auch von mikroskopischen Gegenständen fixirte Lichtbilder erhalten und in der allgemeinen Sitzung der schles. Gesellschaft eine Probe davon vorgelegt. Vielleicht dürfte auch weitere Anwendung dieser Methode Naturforschern ein Theil des mikroskopischen Zeichnens erspart werden.

#### Verbesserung des Daguerrotyps.

Hr. Dr. Lucanus in Halberstadt bemerkt, daß man selbst mit den besten Daguerrotypen, welche der Händler liefert, und deren achromatisches Objectivglas 9 Zoll Weite und am Rande  $\frac{3}{8}$ , in der Weite  $\frac{5}{8}$  Zoll Dicke hat, nicht im Stande sei, von den Gegenständen in den Linien richtige Bilder aufzunehmen, welche weniger als etwa 30 Schritte entfernt sind. Durch das Verschieben oder Zusammenschieben der *Camera obscura* kann man zwar für jede Entfernung den richtigen Fototyp finden, aber nicht von zu naheliegenden Objecten. Am auffallendsten ist das Verkrümmen der inneren Linie bei Aufnahme innerer Ansichten von Zimmern, noch mehr bei denen von Kirchen, Pfeilerreihen u. dgl. Bringt man aber im Innern der *Camera obscura* ein Hauptobjectivglas ziemlich nahe, ein zweites Objectivverglas an, so wird dadurch eine künstliche Entfernung (durch nochmaliges Verkleinern) bewirkt und ein richtiges Bild erzielt. Kirchen, Thürme, Straßen, Pfeiler, Plätze, von welchen die einfache *Camera obscura* wegen zu nahem Standpunkte, nur theilweise Nachbildungen liefern kann, lassen sich durch diese



Vorrichtung vollständig geben. Auch Portraits g  
auf diese Weise weit besser, als bei Aufnahmen  
einfachen *Camera obscura*.

## Salpetersäure im Meteorwasser.

In einem mit Graupeln vermischten Regen  
welches bei einem heftigen Gewitter am 15. M.  
in Freiburg niederfiel, hat Lampadius die Geg-  
von Salpetersäure bestimmt nachgewiesen. Das  
dieses Gewitterregens enthielt 0,3 Gran Salpete  
Es ist hierdurch dargethan, daß bei der E  
eines starken Gewitters die Auffindung der dur  
electrischen Funken in der atmosphärischen Lu  
zeugten Salpetersäure möglich wird. (*Erdmann's*  
*XIV*, 56.)

## Vorkommen von Jod.

An einigen Puncten der Steinkohlengrub  
Commentry (Dep. Allier) die größtentheils im  
bruch betrieben werden, sieht man häufig durch E  
kung der Luft auf Schwefelkies Entzündungen ents  
und in Folge derselben Spalten, aus welchen sich  
liche Dämpfe entwickeln, die nach Schweflichtsäur  
auch nach Salzsäure riechen. Die Condensation  
Dämpfe veranlaßt auf der Oberfläche des Bodens  
gelbliche und röthliche Efflorescenzen, letztere be  
aus Schwefel und rothem Schwefelarsenik, erster  
Salmiak. Bussy hat in diesem auch jodwasser  
*Ammoniak* nachgewiesen. Löst man den Salmiak  
lich in Wasser, setzt eine Auflösung von Stär  
hinzu und dann einige Tropfen Chlorwasser, so ei  
sogleich die blaue Farbe der Jodreaction. An de  
färbt sich das Salz etwas durch Zersetzung de  
wasserstoffsäure und nach und nach verschwind  
Jod daraus völlig. Zur Prüfung auf Jod muß m  
her solche Exemplare wählen, die der Luft nich  
gesetzt waren. Es ist gewiß interessant, auch b  
dern Steinkohlengruben derartige Efflorescenzen a  
zu prüfen, da ohne Zweifel diese Art des Vorkor  
nicht auf die Gruben zu Commentry beschränkt



Der Ursprung dieses Jods ist wohl nicht so leicht nachzuweisen. Bussy glaubt, daß der Salmiak und das Wasserstoffs. Ammoniak in Folge der Einwirkung durch Verbrennen von Kiesen entstehender Schwefelsäure auf in den Kohlen vorhandenes Kochsalz sich bilden. Da die Chlorüre der Alkalimetalle meist von Jodüren begleitet sind, so ist vielleicht das Jod als Jodkalium in den Steinkohlen vorhanden, und da auch das Brom ein so häufiger Begleiter des Chlors ist, so wird man auch dieses vielleicht noch in den genannten Efflorescenzen finden. (*Journ. de Pharmac. XXV, 729.*)



## Verhalten des Jodsilbers gegen Wärme.

Das Jodsilber wird bekanntlich in der Wärme dunkler. Talbot hat hierüber einige interessante Beobachtungen mitgetheilt\*). Bestreicht man einen Streifen weißes Papier mit einer Auflösung von salpeters. Silber und darnach mit einer Auflösung von Jodtinctur in Wasser, so nimmt es durch die Bildung von Jodsilber eine blafsgelbe Farbe an, in der Nähe des Feuers eine dunkelgelbe Sonnenblumenfarbe, die nach Entfernung vom Feuer in einigen Secunden verschwindet. Diesen Farbenwechsel kann man durch Erhitzen und Abkühlen nach Belieben hervorbringen und verschwinden lassen, da das Jodsilber keine chemische Veränderung dabei erleidet. Drückt man mit dem Finger oder einem kalten Körper auf das Papier, während es noch warm und braungelb ist, so entsteht ein fast weißer Fleck; schon die bloße Berührung eines kalten Körpers bewirkt dieses. Die Ursache liegt allein darin, daß der eine Körper die Wärme von der betreffenden Stelle des erwärmten Papiers besser ableiten kann als die atmosphärische Luft. Es scheint deshalb auch das Jodsilber durch die Schnelligkeit, mit welcher es unter den angeführten Umständen seine Farbe ändert, zu Versuchen über Leitung und Strahlung der Wärme geeignet zu sein.

Durch Ammoniak wird das Papier weiß und hat dann die Eigenschaft, seine Farbe zu ändern, eingebüßt, ist das Ammoniak aber verdunstet, so erhält es diese Eigenschaft wieder. Kali und Natron wirken ähnlich,

\*) The Lond. and Edinb. philos. Magaz. 3. Ser. XII, 122.

geben aber weisse Verbindungen, die bleibend sind durch Wärme nicht verändert werden. Aus di Grunde darf man nur eine verdünnte Auflösung Jodkalium anwenden, weil bei einer concentrirten weisse Färbung des Papiers entsteht, die in der Ww unveränderlich ist.

Erdmann bemerkt,\*) daß Papier zu diesen suchen nicht gut sich eignet, weil die Temperatur, bei das Jodsilber das tiefste Gelb annimmt, dem zündungspuncte des Papiers zu nahe liegt, auch Gelb fast augenblicklich verschwindet, wenn das Pa nicht auf erwärmter Unterlage liegt; besser eignet daher Porcellan.

## Ueber das Verhalten einiger Metalle alkalischen Flüssigkeiten.

**B**ei, vor mehreren Jahren angestellten Versuc Eisen und Stahl durch schwache alkalische Laugen gen das Rosten zu schützen, fand Payen, daß Ww welches  $\frac{1}{1000}$  bis  $\frac{1}{300}$  Kali enthält, dazu am tauglich sei, zugleich bemerkte er, daß kohlen. Natron, B und Kalkwasser, letztes selbst noch mit dem dreifac seines Volums Wasser verdünnt, ganz wie Kali Eisen sich verhalte.

Da eine Kaliauflösung aus dem Wasser, womit sie vermengt, Luft austreibt, und das Kali auch der in dem Wasser etwa vorhandenen Kohlensä sich verbindet, so hielt P. dafür, daß diese Befrei der Flüssigkeit von Luft die Conservation des Metalls wirke; später glaubte er jedoch, daß dieser Schutz ge das Rosten als eine den Alkalien zukommende Eigensch zu betrachten sei.

Vogel in München hat eine neue Reihe von V suchen über diesen Gegenstand angestellt \*\*). Es erg sich aus diesen:

1) Daß Eisen und Stahl in einer schwachen A lösung von kaustischem Kali oder Natron ihren meta schen Glanz auf unbeschränkte Zeit behalten.

2) Daß die Stahlstangen auch mit einander in rührung stehen können, ohne daß dabei die Gefahr Rostens zu befürchten ist.

\*) Journ. für pract. Chem. XIV, 123.

\*\*) Daselbst XIV, 105.

3) Dafs die Abwesenheit der Luft in einer alkalischen Flüssigkeit nicht die ausschließliche Ursache sein kann, warum Stahl oder Eisen in jenen Auflösungen mit ihrem Glanze sich conserviren.

4) Dafs Antimon und Nickel ihren metallischen Glanz in den alkalischen Flüssigkeiten ebenfalls nicht verlieren, obgleich sich in der Auflösung eine Spur von Antimon, aber kein Nickel befindet.

5) Dafs das Wismuth in der alkalischen Flüssigkeit erst messinggelb und dann purpurfarbig wird, ohne daß sich dabei Wismuthoxyd in der Flüssigkeit auflöst.

6) Dafs Zink und Kadmium in der alkalischen Flüssigkeit ihren Glanz verlieren, wobei das Zink grau, das Kadmium aber schwarz wird.

7) Dafs Blei und Zinn von der alkalischen Flüssigkeit angegriffen werden und dafs sich im ersten Falle basisches Blei bildet, im letzten nur Zinnoxid, aber kein Zinnorydul in der Flüssigkeit sich aufgelöst befindet.

8) Dafs das Kupfer schneller von der schwachen alkalischen Flüssigkeit angegriffen wird als jedes andere Metall, und dafs dessen Oxydation in einer concentrirten Auflösung noch mehr beschleunigt wird, wiewohl es in Kalkwasser und in basisch-kohlens. Kali seinen Glanz nicht verliert.

9) Dafs Messing in der alkalischen Flüssigkeit schwarz wird, dahingegen Argentan keine Veränderung in derselben erleidet.

10) Dafs Kali und Natron in ihren verdünnten Auflösungen bei der Oxydation des Kupfers einen katalytischen Einfluß auszuüben scheinen.

11) Dafs so wie Eisen oder Stahl durch die kausischen Alkalien gegen Rost geschützt, das Kupfer durch dieselben broncirt oder platinirt werden kann.

## Zusammensetzung des officinellen Schwefelkaliums.

Die Bildung des officinellen Schwefelkaliums wird meist dadurch erklärt, dafs bei Einwirkung des Schwefels auf basisch-kohlens. Kali dreifach Schwefelkalium und schwefels. Kali sich erzeugen; allein wenn man beide Stoffe sorgfältig erhitzt, nicht mehr als die Verbindung erfordert, und die Entzündung sorgfältig ver-

mieden wird, so entsteht, eben so wie beim Ko von Kali, Schwefel und Wasser, neben dem Schw kalium kein schwefels. sondern unterschweflichts. Winckler hat dieses durch Versuche aufser Z gesetzt. Auch macht er derauf aufmerksam, daß den Vorschriften der Pharmakopöen das Verhältniß Schwefels zum basisch-kohlens. Kali zu gering Durch sorgfältiges Zusammenschmelzen von 905 G Th. krystallisirten, bei 80° R. getrocknetem kohl Kali mit 518 Gew. Th. gewaschener Schwefelblu über schwachem Kohlenfeuer in einem mit Lehm schlagenem Kolben, der nach der Operation zersch gen wurde, erhaltenes Schwefelkalium zeigte folgende Zusammensetzung:

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| dreifach - Schwefelkalium .....   | 53,29 |
| unterschweflichtsaures Kali ....  | 29,46 |
| schweflichtsaures Kali .....      | 6,86  |
| schwefels. Kali, als Beimengung   | 0,77  |
| bas. kohlens. Kali, als Beimeng.. | 2,88  |
| Verlust.....                      | 6,74  |

---

100.

Es erzeugen sich bei sorgfältiger Operation also die niederen Oxydationsstufen des Schwefels. Daß größerer Hitze und besonders wenn das Gemisch s entzündet, unterschweflichts. und schweflichts. Kali schwefels. Kali übergehen, ist bekannt. Wenn Schwefelkalium daher unvorsichtig bearbeitet wurde, wird man in dem Präparate aufser dem schwefels. K welches in dem kohlens. enthalten sein konnte, st mehr oder weniger schwefels. Kali finden, welches al keineswegs als wesentlicher Bestandtheil anzusehen i dagegen dürfte das Verhältniß des unterschweflichts. u schweflichts. Kali, auch bei aller Sorgfalt, wohl im ein wechselndes sein. Zur Darstellung des rein Schwefelkaliums kann man die Menge des Schwel noch um 2 Gewichtstheile vermehren, für die der wöhnlichen Schwefelleber ist sie hinreichend, da d dazu verwendete kohlens. Kali immer fremde Salze e hält. (*Jahrb. f. d. pract. Pharmacie* I, 283.)

---

## Ueber die Pflanzenfaser.

**D**ie Faser in den verschiedenen Theilen der ph nerogamischen Pflanzen, wenn sie von allen fremd

Substanzen völlig befreit ist, hat nach Payen stets dieselbe Zusammensetzung, sie ist isomerisch mit der des Stärkmehls; die Spiralfaser des Bananenbaums (*Musa sapientum*) hat nach Payen ebenfalls dieselbe Zusammensetzung.

Das Zellgewebe der Cryptogamen ist sehr schwer von den ihm anhängenden fremden Materien, färbenden, zotisirten und fetten Stoffen, Wachs, Salzen u. s. w. zu befreien. Nach Behandeln mit Natron, Chlor, Chlorwasserstoffsäure, Aether, Alkohol und Wasser zeigt das farblose und durchsichtige Gewebe der Conferven, Schwämme, Flechten und der Chara ebenfalls dieselbe Zusammensetzung. Die besondern Namen, womit das Zellgewebe gewisser Pflanzen belegt wurde, dem man eine eigenthümliche Zusammensetzung zuschrieb, wie z. B. dem *Fungin*, kann nicht mehr statt finden.

Das Inulin schlägt sich aus seiner heißen Auflösung beim Erkalten in durchsichtigen zusammengehäuften Sphäroiden nieder. Unterhält man es einige Zeit im Schmelzen bei einer Temperatur von  $168^{\circ}\text{C.}$ , so wird es in einen isomerischen Körper umgeändert, der in Wasser und selbst in Alkohol löslich ist. Das Zellgewebe, Stärkmehl, Dextrin, das Inulin und das geschmolzene Inulin, sind also fünf merkwürdige Fälle von Isomerie. (*Journ. de Chem. med.* 2. Ser. V, 473.)

## Ueber den Stärkmehlgehalt verschiedener Pflanzen.

Ueber mehre ausländische Gewächse hat Avequin Versuche angestellt zur Ermittlung ihres Stärkmehlgehaltes.

Die auf Domingo cultivirt werdende *süße Batate* (*Convolvulus Batata*), die weiße mit gelblicher Haut, giebt einen sehr hellen und sehr süßen Saft, von 10 Pfd. Wurzeln 4 Pfd. Diese Menge Saft lieferte 4 Unzen 6 Drachmen Syrup von  $38^{\circ}$ , und nur 36 Gran krystallisirten Zucker. Der von den Krystallen getrennte Syrup wurde jetzt bei  $89^{\circ}\text{R.}$  gekocht, nach Erkalten gestand die ganze Masse zu Krystallen, die nach Abkühlen des Syrups dem gewöhnlichen Rohzucker ganz gleich war und  $1\frac{1}{2}$  Unze wog. Wenn nach Henry die um Paris cultivirte rothe Batate keinen krystallisirbaren Zucker enthält, so kann die unter den Tropen cultivirte

gan  
Henry di  
llisirbare  
a cultivirt



Batate also krystallisirbaren Zucker liefern, wenn in zu geringer Menge, um Gegenstand der Ausfi zu sein.

In Bezug auf den Gehalt an Stärkmehl geht aus den Versuchen hervor, daß die auf den Antillen cultivirte Batate 22 — 23 Proc. enthalte, die in Louisiana cultivirte 16 — 17 Proc., während nach Payen und F die um Paris cultivirte nur 13 Proc. liefert.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich deutlich der Einfluß des Klimas auf die Bestandtheile der Pflanze.

Die auf den Antillen cultivirte *Cucurbita polycarpa* ist ganz dieselbe Varietät wie die in Louisiana gezeigte. Die Kürbisse der Antillen sind aber trocken und hart und beim Kochen dehnt sich ihr Fleisch sehr an. In Folge ihres grossen Gehalts an Stärkmehl. Ein zu Paris im Jahre 1830 geernteter 5 Pfd. schwerer Kürbis gab 4½ Unze schönes weisses Stärkmehl. Ein Korn von dem nämlichen Kürbisse, welches nach Louisiana gebracht wurde und dort in altes Land gepflanzt wurde, brachte Kürbisse, die auch Stärkmehl gaben, aber in weit geringerer Menge, und die in frischem Land gezogenen waren zwar gröfser, aber enthielten gar kein Stärkmehl.

Der Tayo, *Arum esculentum*, Malanga, Karaibi oder Karibische Kohl, enthält viel Stärkmehl. 10 Pfd. von der Wurzel befreiter Tayo wurden zerrieben, und ein zäher klärender Brei erhalten, wegen dieser zähen Beschaffenheit setzt sich auch die Stärke in dem Auswaschwasser gut ab; man war genöthigt, dieses Wasser in Gährung zu setzen, um die klebrige Beschaffenheit zu zerstören, die thierische Materie, die sich während der Gährung zersetzt, verbreitet dabei einen Geruch nach faulen Eiern. Besser ist es, die klebrige Materie vor dem Auswaschen des Breis schon durch Gährung zu zerstören. 10 Pfd. Tayo gaben 40 — 48 Unzen, in einem andern Versuche 25 Pfd. Tayo 7 Pfd. 8 Unzen Stärkmehl.

Der frische Ingwer liefert ein sehr schönes Stärkmehl. 4 Pfd. der frischen Wurzel gaben 3 Pfd. 4 Unzen Stärkmehl, der Rückstand wog nach dem Trocknen 8½ Unze und lieferte durch Auswaschen 7½ Unze Stärkmehl.

1½ Pfd. noch grüner Bananen (*Musa paradisiaca*) wurden zerrieben einen zähen gelblichen Brei, aus welchem durch Auswaschen u. s. w. 6¼ Unze Stärkmehl erhalten wurde.

Die Bananenfeige (*Musa sapientum*) enthält im reifen Zustande eine kleine Menge Stärkmehl, im unreifen keine Spur. 7 Pfd. unreifer lieferten 4 Unzen 6 Drachmen Stärkmehl.

Stärkmehl, das aber wie das vorige nicht ganz rein ist, einer sauren Gährung unterworfen werden muß, um von den anhängenden zuckrigen und schleimigen Theilen zu befreien. In einem andern Versuche mit Bananen, die vier Tage später gepflückt worden waren, wurde kein Atom Stärkmehl mehr gefunden.

Während der Reife der Bananenfeige schwellen die Stärkmehlkörner auf, ihre Hüllen reifen, und das Stärkmehl verschwindet gänzlich; man findet nun eine große Menge Gummi und Zucker. Auch bei der Banane (*Musa paradisiaca*) ist diese Umwandlung sehr merklich. Bei einem gewissen Grade des Wachstums, aber noch grün, bildet sie, geschält, eine feste weiße, zuckrige und wenig schmeckende, aber sehr nahrhafte Substanz. In diesem Zustande in Scheiben zerschnitten, in der Sonne getrocknet und dann gepulvert, ist darin Stärkmehl enthalten. Läßt man die Banane reifen, so bildet sich darin eine glutinöse Materie, welche als Basis des Farbe-, Geruchs- und Geschmacksprincips dient, und das Innere in eine weiche pulpöse Substanz umändert, die sehr süß schmeckt. Alles Stärkmehl ist aber aus dem daraus verschwunden, dagegen kann man einen Rohrzucker darstellen, der in seinen Eigenschaften mit dem Rohrzucker übereinkömmt. (*Journ. de Pharmacie*, XXXV, 556.)

## Succisterin.

Unter den Producten der trocknen Destillation des Bernsteins fanden Pelletier und Walter eine weiße krystallinische, in Alkohol und Aether schwer lösliche Substanz, welche durch Schwefelsäure intensiv blau wird. Ihre Zusammensetzung ist:

|                      |      | Versuch |
|----------------------|------|---------|
| 3 At. Kohlenstoff... | 94,9 | 95,69   |
| 1 „ Wasserstoff...   | 5,1  | 5,64    |
|                      | 100. | 100.    |

Diese Substanz, *Succisterin* genannt, hat also dieselbe Zusammensetzung wie das Idrialin, ob sie damit identisch oder nur isomerisch ist, kann erst eine vergleichende Untersuchung beider Körper ergeben, die aber wegen der großen Seltenheit des Idrialins noch nicht ausführbar war. (*Compt. rend.* VI, 915.)

## Chrysen.

**D**urch Destillation organischer Substanzen in h. Temp., die sehr reich an Kohlenstoff sind, hat A. Laurent einen neuen Kohlenwasserstoff erhalten, und Chrysen benannt, wegen seiner schönen gelben Farbe. Es ist schmelzbar, lässt sich unzersetzt sublimiren und det beim Erkalten nadelförmige Krystalle. Es ist dem Idrialin isomerisch und hat daher auch dessen mel  $C_{24}H_{12}$ , unterscheidet sich aber davon durch s Farbe, und sein Verhalten gegen Schwefelsäure; Idrialin wird dadurch blau, das Chrysen aber grün.

### Fünfte Abtheilung.

## L i t e r a t u r.

### Bibliographisch - kritischer Bericht.

**D**ie Pharmakopöen sind die Codices über die Arzneimittel welche in den Officinen enthalten sein müssen, sie schreiben Beschaffenheit jener Mittel vor, und wenn sie einer fernern Zu reitung bedürfen, geben sie die Methode an, die dazu befo werden soll. Ein weiteres wissenschaftliches Eingehen über Natur, die Bildung, Zusammensetzung u. s. w. des Arzneimitt liegt heutiges Tages außer dem Gebiete der Pharmakopö. Vor funfzig und mehr Jahren gab es genug Apotheken dem Lande und auch in Städten, wo man außer der Pharm kopöe kaum noch ein wissenschaftliches pharmaceutisches W antraf, und wo die Pharmakopöe fast das einzige Buch war, der Apotheker benutzte. Damals war es nothwendig, daß Pharmakopöen eine andere Einrichtung hatten. Diese Zeit ist nicht mehr. Die Ausbildung der Pharmaceuten ist eine dere geworden; der Staat fordert eine wissenschaftliche Aus dung, die täglichen Fortschritte der Kenntnisse erheischen denselben zu folgen, und auch dem unbemittelten Apothek machen, wenigstens in Deutschland, die pharmaceutischen V eine es möglich, die Mittel dazu auf eine nicht kostspiel Weise zu beschaffen. Dagegen ist es ein verdienstliches W wenn für eine in einem Staate gesetzlich eingeführte Pharm kopöe ein wissenschaftlicher Commentar vorhanden ist, welcher diejenigen Seiten der Arzneimittel, welche dem Apotheker wissen nöthig sind, auf eine angemessene Weise darstellt. Ein solches Werk ist für die Preuss. Pharmakopöe der bekannt

Comentar von unserm hochverdienten Dulk. Von diesem mit so vielem Beifall aufgenommenen Werke ist so eben die vierte vermehrte und verbesserte Auflage erschienen. Sie führt den Titel:

*Pharmacopoea borussica.* Die Preuss. Pharmakopöe, übersetzt u. erläutert von Dr. Fr. Ph. Dulk. Erster Theil. Einfache Mittel. S. xx u. 1171. Zweiter Theil. Zusammengesetzte Mittel. S. vi u. 1074 in gr. 8.

Aus den früheren Ausgaben ist die Einrichtung des Werks, sowie dessen treffliche Ausführung hinreichend bekannt. Wir beschränken uns daher darauf, die Ausgabe der neuen Auflage anzuzeigen und zu bemerken, dass dieselbe mit allen wichtigen Erfahrungen und Entdeckungen bereichert worden ist, welche die neueste Zeit zu Tage gefördert hat.

Die Beschaffung einer *Pharmacopoea universalis* ist in neuern Zeiten vielfach zur Sprache gekommen. Es lässt sich nicht verkennen, dass eine solche, sollte sie auch nur für Deutschland allgemein sein, eine grosse Reihe von Vortheilen darbietet, diese sind zu vielfach ausgesprochen, als dass es noch nöthig wäre, sie hier zu detailliren. Die Anfertigung einer solchen Universal-Pharmakopöe hat ihre grossen Schwierigkeiten, diese aber sind nicht unüberwindlich. Geiger hat durch sein Werk:

*Pharmacopoea universalis. Pars prim. Simplicia cruda et praeparata mercabilia. Pars secunda. Composita,*

wovon der erste Theil 1836 erschien, gezeigt, was hier geleistet werden kann. Leider starb Geiger vor der Vollendung seines Werks; von dem zweiten Theil hat er nur eine Lieferung noch bearbeitet. Das Unternehmen aber ist von Dr. Mohr ganz in Geiger's Sinne fortgeführt, und so eben die zweite Lieferung, von Mohr bearbeitet, ausgegeben worden. Die Geigersche *Pharm. univ.* wird also vollendet. Das davon Erschienene ist mit einer ausserordentlichen Umsicht bearbeitet. Es sind darin alle Arzneistoffe und alle Präparate verzeichnet, eine Masse alter, auch veralteter und neuer Magistralformeln; die Zubereitungsmethoden der Präparate und Compositionen sind nach den gebräuchlichen Pharmakopöen angegeben, und dabei ist eine treffliche, auf Versuche und Beobachtungen gestützte Kritik angeführt, und die beste Vorschrift aufgestellt. Von Geiger waren zahlreiche Versuche unternommen, um diese besten und dann zu recipirenden Darstellungsmethoden zu ermitteln; auf diesem Wege hat Dr. Mohr fortgearbeitet. Wo über die Methoden Zweifel waren, sind sie nach experimentaler Prüfung ausgewählt. Dieses bezieht sich nicht nur auf chemische Präparate, sondern auch auf Compositionen, wie Pflaster, Salben u. s. w. Wir werden also bald im vollständigen Besitz einer *Pharmacopoea universalis* sein. Nun würde es sich um die Einführung derselben handeln, und da dürften unter den jetzigen Verhältnissen die Schwierigkeiten, die derselben sich entgegenstellen, nicht sobald zu beseitigen sein. Auch liefse sich gegen die vorliegende *Pharmacopoea universalis* in Bezug auf die practische Brauchbarkeit als eingeführter Codex manches erinnern, so dürfte die Menge der darin enthaltenen veralteten Magistralformeln für die Pharmakopöe



nicht passend sein, sondern für ein Buch über medicinische Receptformeln gehören. Wie dem aber auch sei: es hat das Werk einen entschiedenen Werth als ein treffliches Repertorium, und wegen der ausgezeichneten Kritik, womit es ausgestattet ist, verdient es die grösste Aufmerksamkeit aller Medicinalbehörden, denen die Ausführung von Pharmakopöen obliegt. Es würde von bedeutendem Nutzen sein, wenn diese, wo es irgend angeht, für die darin gegebenen Vorschriften entschieden. Es ist in diesem Werke eine Grundlage für Ausarbeitung der Pharmakopöen gegeben, wie wir sie sonst nicht besitzen.

Im XVIII. Bande 2. R. dieser Zeitschrift S. 91 haben wir die Verhältnisse der organischen Chemie in Bezug auf die systematische Anordnung der dahin gehörigen Körper einige Bemerkungen gemacht, an diese erinnernd, zeigen wir folgendes Buch an:

**Die Pflanzenchemie.** Handbuch für Aerzte und Apotheker. Unter theilweiser Zugrundelegung von Thomson's *Organic Chemistry* und mit Benutzung der besten Quellen, bearbeitet von Dr. A. Weinlig. Leipzig 1839. Bei Fr. Chr. W. Vogel. S. xiv u. 833 in gr. 8.

In der Einleitung wird über die wichtigsten Theorien der organischen Chemie gehandelt, als über die der Amide, Benzoyls und analoge, des Aethers, der Brenzsäuren, über Substitutionstheorie, über die organischen Radikale und organischen Säuren. In der ersten Abtheilung folgen die einzelnen Pflanzenstoffe, die in Säuren, Alkaloide und indifferente Stoffe eingetheilt werden. Die zweite Abtheilung beschäftigt sich mit der Zerstörung der Pflanzenstoffe durch chemische Potenzen, Katalyse, Gährung und Fäulnis; die dritte Abtheilung mit Pflanzenphysiologie und die vierte handelt von den einzelnen Theilen der Pflanzen. Die Vorrede giebt die Verhältnisse an, in welchen dieses Buch zu dem auf dem Titel bemerkten Werke von Thomson steht; es ist sehr gut bearbeitet und zeitgemäss. Man wird darin über die Darstellung und die Eigenschaften aller bis jetzt bekannten organischen Substanzen eine so weit als möglich gehende Belehrung finden, und wird es deshalb wegen namentlich auch den Pharmaceuten willkommen sein.

Ein ausgezeichnetes Werk, welches unsere Literatur bereichert hat, und zwar über einen höchst wichtigen practischen Zweck, ist folgendes:

**Die chemischen Heilmittel und Gifte, oder practische Anleitung zur Erkennung und Prüfung ihrer Eigenschaften.** Für Aerzte, Physiker und Apotheker, alphabetischer Ordnung, entworfen von Adolph Duflos. S. 8 u. 362 in gr. 8.

Es führt auch den zweiten Titel:

**Handbuch der pharmaceutisch-chem. Praxis.** Zweiter Theil. Enthaltend die Anleitung zur Erkennung und



**Prüfung der chemischen Heilmittel und Gifte, nach ihren Eigenschaften. Breslau. Bei Ferd. Hirt. 1839.**

Es umfaßt die Lehre von den Reagentien, welche bei poliklinischen, analytisch-chemischen Untersuchungen unentbehrlich sind, mit Hinweisung auf die verschiedenen im Werke selbst vorkommenden Anwendungen, ferner eine Darstellung der verschiedenen analytischen Verfahren bei Untersuchungen von unbestimmten Arzneimischungen, Giften und sonstigen verdächtigen Substanzen, der Prüfung der Arzneimittel, worauf die Arzneikörper und Gifte selbst einzeln in alphabetischer Folge abgehandelt werden. Bei den Giften sind die Reactionen, welche sie mit Reagentien, sowohl im reinen als gemengten Zustande, darbieten, angeführt.

Allen, denen es um gründliche Kenntniß in der Art und Weise, wie Prüfungen von Arzneikörpern und Giften angestellt werden müssen, zu thun ist, gewährt dieses Buch eine vorzügliche Unterweisung, und der verehrte Verf. hat dadurch neue Ansprüche auf unsere Dankbarkeit sich begründet.

Der angehende Chemiker oder Einleitung in die technische Chemie, mit Angabe der interessantesten Experimente. Zum Gebrauch für alle, welche sich mit der Chemie nach ihren Gesetzen und deren Anwendung im Leben beschäftigen oder bekannt machen wollen. Von Dr. Fr. Döbereiner, Assistenten des physikalischen Cabinets und chem. Laboratoriu auf der Universität Halle u. s. w. Stuttgart, 1839. Balz'sche Buchhandlung. S. 12 u. 306 in kl. 8.

Auf dem Wege des Experiments, und zwar durch gut ausgewählte, leicht anzustellende und nach ihren Erscheinungen in die Augen fallende und somit geeignete Anhaltspuncte bildende Versuche, werden die Gesetze der allgemeinen Chemie, soweit sie für eine allgemeine populäre Belehrung passend sind, so wie die im gewöhnlichen Leben am häufigsten in Betracht kommenden Verhältnisse, in diesem Buche dargelegt, und die wichtigsten Verbindungen der metallischen Stoffe, sowie die der Alkalien und Erden, oder der Oxyde der leichten Metalle. In der zweiten Abtheilung werden die schweren Metalle abgehandelt und es dürften dann auch wohl die organischen Stoffe ebenfalls einer Berücksichtigung verdienen, da sie eine so große Zahl wichtiger Materiale darbieten, die in directer Beziehung zur menschlichen Gesellschaft stehen. Lehrer der Chemie an Gewerbs- und Realschulen werden in diesem Werkchen eine gute Auswahl für Experimente bei ihren Vorträgen finden. Die physikalische Literatur ist seit kurzem durch mehrer Lehr- und Handbücher bereichert worden. Wir führen davon auf:

Lehrbuch der Physik zum Gebrauch bei Vorlesungen und beim Unterricht, von W. Eisenlohr, Professor der Mathematik und Physik am Großherzogl. Lyceum in Mannheim. Mit 10 Tafeln. Zweite sehr verm. u. verb. Auflage. Mannheim. Verlag von H. Hoff. 1839. S. VIII u. 647 in gr. 8.

**Populäre Experimentalphysik zum Gebrauch gefaslicher Vorträge und zum Selbstunterricht denkende Freunde der Naturwissenschaft und gedete Gewerbtreibende aller Klassen.** Von Dr. Friedleben. Lehrer der physikal. Wissenschaft in Frankfurt etc. Zweite, nach dem neuesten Standpuncte der Physik gänzlich umgearbeitete, durch verb. u. verm. Auflage. Mit 12 Steintafeln. Frankfurt a. M. Bei Sauerländer. 1840. S. xii u. 478 in 8.

**Lehrbuch der Experimentalphysik und der Meteorologie.** Von Pouillet. Nach der dritten Originalausgabe aus dem Franz. übers., mit Zusätzen und Ergänzungen versehen von Dr. C. H. Schnuse. Erster Band. Mit 18 Tafeln Abbild. Quedlinburg Leipzig. Bei G. Basse. 1839. S. xviii u. 524 in 8.

**Die Physik in ihrer Beziehung zur Chemie, oder diejenigen Lehren der Physik, welche der Chemie Grundlage dienen.** Von M. Fr. W. Thieme. Leipzig. Verlag von G. Wigand. 1840. S. viii u. 277.

Der Werth der beiden ersten Werke, der von Eisenblum und Friedleben ist schon durch ihre wiederholte Auflage ausgesprochen, und namentlich hat das von Friedleben die Bezeichnung *populäre Experimentalphysik* ein begründetes Recht. Die Physik von Pouillet ist in Frankreich sehr geschätzt, und ihre Uebertragung ins Deutsche ist sehr zu begrüßen. Pouillet ist als ausgezeichnete Physiker berühmt; seine Vorlesungen in Paris sind sehr besucht und werden von zahlreichen Experimenten durch einen bedeutenden Apparat unterstützt. Das französische Original führt den Titel: *Éléments de Physique expérimentale et de Météorologie.* Die deutsche Uebersetzung haben wir damit verglichen, und sie zwar nicht vollständig wörtlich, indess wesentlich treu und dem Geist der deutschen Sprache angemessen gefunden. Das kleine Werk von Thieme können wir den Schülern der Pharmacie, denen die Verhältnisse der Physik, die sich auf die Chemie beziehen, besonders wichtig sind, und die hier sehr verständlich vorgelegt werden, zum Selbststudium sehr empfehlen.

**Naturschilderungen.** Eine Reihe allgemein faßlicher Vorlesungen, von J. F. Schouw, Prof. der Botanik an der Universität zu Kopenhagen. Mit 2 Steindrucktafeln. Aus dem Dänischen. Kiel. Universitätsbuchhandlung. 1840.

In diesen Schilderungen führt uns Schouw, dem wir kanntlich über die Pflanzengeographie und Climatologie so viele treffliche Mittheilungen verdanken, einzelne allgemein interessante Gegenstände aus dem Gebiete der Naturwissenschaft vor, über Regen, Eis, die Pflanzen der Vorwelt, die Palmen, Alpenpflanzen, Gebirgswanderungen im Norden und Süden, die Aetna, die Natur in Nordafrika und Südafrika, den Kaff

den Theestrauch, das Zuckerrohr u. s. w. Eine anziehende und einfache, aber dabei lebendige Schilderung, worin die wichtigsten Beziehungen des Gegenstandes aufgefaßt sind, führt durch das ganze Buch. Es werden hier aus dem großen Bereiche der Natur eine Reihe Gemälde gleichsam aufgestellt, die wir nicht um so größerm Vergnügen betrachten, als nicht nur ihre Farbengebung sehr ansprechend gewählt, sondern auch ihre Composition so geordnet ist, daß ein schönes Ganze dadurch entsteht, was dem Gedächtniß sich selbst, und was sich daran knüpft, gern und leicht einprägt.

**Repertorium der Naturwissenschaften oder Abriss der Physik, Chemie, Botanik, Zoologie und Mineralogie für Studirende der Medicin.** Von Dr. W. Bernhard. Berlin, 1839. Verlag von Bechtold u. Hartje. S. iv u. 534 in gr. 8.

Als Hilfsmittel bei Repetitionen, wenn man kein tiefes Einengen in den Gegenstand sucht, brauchbar, sonst zu dürftig und mangelhaft, namentlich in chemischer, mineralogischer und pharmaceutischer Beziehung.

**Die Heilquellen Europas mit vorzüglicher Berücksichtigung ihrer chemischen Zusammensetzung nach ihrem physikalischen und medicinischen Verhalten,** dargestellt von Dr. J. Franz Simon. Berlin, 1839. Verlag von Albert Förstner.

Die Bearbeitung dieser lexicographisch geordneten Uebersicht der Heilquellen Europas ist mit außerordentlichem Fleiß und vielfacher Mühe ausgeführt. Der Verf. hat die bedeutende Arbeit nicht gescheut, die Resultate der Analysen, die für die festen Bestandtheile hier in Granen, dort in Grammen oder nach anderen Gewichtsbestimmungen angegeben sind, sämmtlich auf Grane im Pfunde zu 16 Unzen zu berechnen und dadurch erst eine allgemeine wahre und gründliche Vergleichung möglich gemacht. Für den practischen Gebrauch war es gewiß vorzuziehen, die festen Bestandtheile auf Grane im Pfunde zu 16 Unzen des Wassers festzusetzen, und nicht sie auf Tausendtheile zu bestimmen, dem Arzte wird jedenfalls erstere Bestimmung willkommen sein, denn wenn letztere auch dem wissenschaftlichen Chemiker mehr zusagt, so wird ohne Zweifel dieser Gegenstand vorzüglich vom Arzte practisch benutzt.

Der eigentlichen Uebersicht geht eine tabellarische Zusammenstellung der Zahl der Mineralquellen in den verschiedenen Ländern Europas voran, sowie eine allgemeine Classification der Quellen. Dann folgt die eigentliche Darstellung der Bestandtheile der verschiedenen Mineralwässer, nach dem Namen der Oerter tabellarisch geordnet; es sind 1045 Mineralquellen aufgeführt. Es ist leicht möglich, daß bei einer solchen bedeutenden Arbeit die eine oder andere Quelle übersehen werden konnte, wie wir denn z. B. die Therme von Lippespringe bei Paderborn und die Soolbäder von Unna darin nicht finden, auch bei Bath haben wir Daubeney's neue Versuche über den Gasgehalt der dortigen Therme nicht bemerkt, sowie

bei Ueberdingen die Analysen von Herberger nicht aufgeführt sind, indess wird man selten eine Mineralquelle auch ausser Deutschland vergebens darin suchen, wenn eine einigermaassen eingehende Analyse darüber vorhanden ist. Die Tabellen sind geordnet, am Fusse derselben findet man Bemerkungen zu den einzelnen Daten der Angaben. So übersichtlich diese Tabellen auch ist, so würden wir für den Zweck über die einzelnen Quellen, über die man Aufklärung suchen will, und wozu eigentlich dieses Buch bestimmt ist, eine specielle Untereinanderstellung der Resultate der Analyse bei den alphabetisch geordneten Quellörtern vorgezogen haben, in der Art ohngefähr, wie H. seine Zusammenstellung bearbeitet hat; und wir möchten verdienstvollen Verfasser aufmerksam machen, diesen Wink einer zweiten Auflage seiner so sehr verdienstlichen Arbeit benutzen. Er wird später gewiss selbst finden, dass beim Gebrauch die gewählte Tabellenform nicht die leichte und anschauliche Uebersicht der Bestandtheile der Quelle gewährt, als welche wir so eben andeuteten.

Zu den pharmacologischen Tabellen von Dr. Schwartz, die sich bekanntlich durch ihre sorgfältige Beschreibung der Arzneimittel auszeichnen, hat der Verfasser einen zweiten Theil geliefert, welcher allein der Heilquellenlehre gewidmet ist, deshalb als für sich bestehendes Werk auch den besondern Theil führt:

**Allgemeine und specielle Heilquellenlehre, oder hydrolog. und balneograph. Tabellen, von Dr. G. Schwartz, pract. Arzte zu Leipzig, Mitglied d. G. Leipzig, 1839. Verlag von J. A. Barth. S. 1 u. 339 in gr. fol.**

Dieses Werk ist das vollständigste, was die Literatur über Heilquellen überhaupt besitzt. Es ist ein Werk, was nicht nur ein vieljähriges Studium und bedeutende Vorarbeiten erfordert, sondern auch ein tiefes Eindringen in den Gegenstand und eine practische Durcharbeitung desselben, und Mühen und Ausdauer in hohem Grade in Anspruch nahm, wenn es das werden soll, was es wirklich darbietet. In der ersten Abtheilung, welche die allgemeine Heilquellenlehre behandelt, sind die wichtigsten Verhältnisse dieser Naturproducte, ihre Bildung, ihre Bestandtheile, ihre medicinische Wirkung und Anwendung im Allgemeinen behandelt, und in der Abtheilung, welche die specielle Heilquellenlehre einnimmt, sind diese Verhältnisse an allen bekannten Heilquellen auseinandergesetzt, soweit sie erforscht sind. Man kann sagen, dass dieses Werk den Zustand unserer Kenntnisse über die Mineralwässer bis zu dem Tage seines Erscheinens so vollständig darlegt, wie es nur möglich sein konnte, und der Verfasser damit ein Verdienst sich erworben hat, das wir die vollste Anerkennung darbringen.

Unter den neuen mineralogischen Handbüchern ist das folgende:

**Grundriss der Mineralogie mit Einschluss der Geognosie und Petrefactenkunde. Für höhere Lehranstalten und zum Privatgebrauch. Von E. Fr. Glockner.**

Mit 8 Kupfertafeln. Nürnberg, 1839. Verlag von J. L. Schrag. S. xxxiv u. 988.

Das wahrhaft übersichtliche systematische Darstellung der gesamten Mineralogie auf der gegenwärtigen Stufe ihrer Ausbildung. Die Einleitung behandelt den Begriff und Gegenstand, sowie die Geschichte und Literatur der Mineralogie. In der Oryctognosie oder der Mineralogie im engeren Sinne sind die mechanisch einfachen Mineralien aufgestellt. In dem allgemeinen Theile der Oryctognosie, welcher die Lehre von den sogenannten äußeren Kennzeichen enthält, ist die Krystallographie sehr ausführlich behandelt, so zwar, daß man diesen Abschnitt als ein Lehrbuch derselben betrachten kann. In der speciellen Oryctognosie, welche die Grundsätze der Classification und die systematische Aufstellung und Beschreibung der Mineralien umfaßt, sind die Beschreibungen derselben präcis, die Aufstellung der Familien ist wohl gegliedert, und gewiß hat sich Glocker durch diese Aufstellung ein großes Verdienst um die Systematik erworben. Einen besondern Werth hat dieses Handbuch dadurch, daß es auch die Geognosie und Petrefactenkunde behandelt.

Dr. Dav. Dietrich. *Synopsis plantarum seu enumeratio systematica plantarum plerumque adhuc cognitarum cum differentiis specificis et synonym. selectis ad modum Persoonii elaborata, Tom. I. sect. prima — Classis I. — V. Vimariae apud B. F. Voigt. 1839.*

Vorliegender erster Band dieses Werks enthält auf 53 eng gedruckten Bogen fast alle bisjetzt bekannten Pflanzen, welche in die erste bis fünfte Klasse, letztere bis zur zweiten Ordnung reichend, gehören. Das Ganze wird die Einrichtung von Persoon's *Synopsis* erhalten. Die Pflanzen sind nach dem Linneischen System aufgestellt und durch kurze Beschreibungen erläutert. Ein Clavis der Gattungen steht vor jeder Klasse, was lobenswerth ist. Die Diagnosen der Arten scheinen theils wörtlich aus anderen botanischen Schriften entlehnt, theils auch da, wo sie zu ausführlich, oder zu unvollkommen schienen, vom Verfasser selbst gefertigt zu sein. Auf die wichtigsten Synonyme, sowie auf die vorzüglichsten Kupferwerke ist Rücksicht genommen; letzteres verdient in sofern Beachtung, indem oft auch nur eine nicht gelungene Abbildung bei zweifelhaften Fällen zur wahren Kenntniß der Pflanzen führt.

Dem so wenig vermissen wir die Höhe, Blütenfarbe, Dauer u. s. w. Ausser allen deutschen Pflanzen, bei welchen Reichenbach's *Flora excursoria* und bei den späteren Bogen Koch's *Synopsis* benutzt zu sein scheint, sind die meisten bisjetzt bekannten, in den Floren des Auslandes, sowie in einzelnen Monographien beschriebenen Pflanzen aufgeführt; jedoch scheint hier einiges unbenutzt geblieben zu sein, was namentlich bei den Pflanzen Amerikas der Fall ist, doch ist dies wohl zu entschuldigen, wenn man bedenkt, daß mehre Tausende dazu gehören, um nur zu einer mittelmäßigen botanischen Bibliothek zu gelangen. Zu wünschen wäre aber, daß in den, in der Vorrede versprochenen bald folgenden Nachträgen alles nur Mögliche



benutzt würde. Wir vermissen ferner z. B. Kunth's *Cygraphia*, wahrscheinlich waren die Bogen der Gattungen *Cyrtus*, *Isolepis* u. s. w. nach A. Dietrich bearbeitet, schon gedruckt, so daß auf Kunth nicht Rücksicht genommen werden konnte. Sämmtliche bekannten Gräser sind in der zweiten und dritten Klasse, nach Kunth's *Agrostographia* bearbeitet, aufgestellt, obgleich *Oryza*, *Bambusa* u. s. w. in andere Klassen des Linneischen Systems gehören; wahrscheinlich ist dies aus dem Grunde geschehen, um eine natürliche Zusammenstellung sämmtlicher Gräser zu bewerkstelligen. Es wäre dem Verfasser zu wünschen, daß, wenigstens für Anfänger, die in andere Klassen gehörenden Gräsergattungen daselbst erwähnt würden. In dem ersten Theile, gleich, namentlich in den früheren Bogen, sich zum Theile wesentliche Errata befinden, so gestehen wir doch gern, daß die späteren Bogen an Correctheit sehr zugenommen haben, was in einem solchen Werke nur zu wünschen ist.

Am Schlusse dieses Bandes befindet sich ein Register der Gattungen, sowie ein Verzeichniß der wesentlichsten Drucker. Eine Erklärung der Abkürzungen, wie eine Uebersicht der Gattungen, nach natürlichen Familien aufgestellt, verspricht der Verfasser am Schlusse des Werks. Möchte Dietrich den folgenden Bänden seine ganze Thätigkeit widmen, damit sie so schnell, als bei einem so bedeutenden Werke möglich ist, erscheinen; möchten ihn auch dabei die Herren Botaniker mit ihren Hilfsmitteln, namentlich mit Beschreibung neu entdeckter Pflanzen unterstützen, denn dann erst kann ein solches, der jetzt mangelndes Handbuch einer systematischen Beschreibung aller bekannten Pflanzen einer Vollkommenheit sich nähern. Die Ausstattung des Werks von Seiten des Hrn. Verlegers verdient rühmliche Anerkennung.

Wenn wir in diesem Werke eine systematische Uebersicht des ganzen Gewächsreiches erhalten, eine Uebersicht, die die vielfachen Bedürfnisse abhelfen wird, so haben wir auch ein paar andere Werke anzuzeigen, die dem speciellen Studium der Pflanzen einer einzelnen Gegend gewidmet sind.

**Preussens Pflanzengattungen nach Familien geordnet**  
von Dr. E. H. F. Meyer, Prof. der Botanik. Königsberg, 1839. Bei Gräfe u. Unzer.

Diese Uebersicht hat der Verfasser zwar zunächst seinen Zuhörern gewidmet; aber sie ist nicht allein für sie bestimmt. Wir müssen dieselbe den jungen Pharmaceuten ganz besonders empfehlen. Wer das Studium der Botanik beginnt, muß zugleich mit den Pflanzen sich bekannt machen, die in seiner Gegend wachsen, diese liefern ihm den nächsten Stoff zu seinen Beobachtungen. Er muß aber nicht sich begnügen, diese in ihrem Namen nur zu kennen, er muß die Gattungen auch mit den Familien zu beziehen wissen, und dadurch den höheren Zusammenhang derselben unter einander, der nicht bloß das Wesen des specifischen Characters in sich faßt, sondern auf das Studium aller wesentlichen Details der Pflanzen beruht, erkennen. Dieses Buch gewährt ihm dazu einen vorzüglichen Führer.

Ueber die Flora der Lausitz haben wir durch Rabenhof eine Aufstellung erhalten. Nämlich:

*Flora lusatica* oder Verzeichniss und Beschreibung der in der Ober- und Niederlausitz wildwachsenden und häufig cultivirten Pflanzen, von L. Rabenhorst, Apotheker erster Klasse, Vicedirector des Apothekervereins in Norddeutschland, mehrer gelehrten Gesellschaften Mitglieder. Erster Band. Leipzig. Verlag von E. Kummer. 1839.

Hr. Rabenhorst drückt sich in der Vorrede über diese seine Arbeit sehr bescheiden aus: »Ich beabsichtigte aber bei dieser Zusammenstellung auch nichts weiter, als den Freunden der Botanik, besonders der Jugend, die sich jetzt so eifrig dieser Wissenschaft zuwendet, bei ihren Wanderungen einen treuen Führer an die Hand zu geben.« Der würdige Verf. hat aber zwei schöne Zwecke mit der Bearbeitung dieser Flora erreicht, er lehrt uns den Pflanzenschmuck der Lausitz kennen, und giebt uns einen Wegweiser, für angehende Botaniker einen trefflichen Lehrer. Die Pflanzen sind nach dem Linneischen System geordnet, voraus aber geht eine Uebersicht der Pflanzen der betreffenden Flora nach natürlichen Familien, systematisch geordnet und mit einer genauen Charakteristik der Familien, worunter die Gattungen namentlich aufgeführt sind, die aus der betreffenden Familie in der Lausitzer Flora vorkommen. Der *Conspectus generum* nach dem Linneischen System ist sehr vorzüglich geordnet. Die Linneischen Ordnungen der Syngenesia sind nicht beibehalten, sondern folgende aufgestellt: Corymbiferae, Cynarocephalae, Cichoraceae. Möchte der Verf. uns bald mit dem zweiten Bande seiner sehr schätzbaren Arbeit erfreuen.

*Genera plantarum florum germanicarum iconibus et descriptionibus illustrata. Auctore Th. Fr. Lud. Nees ab Esenbeck, post ejus mortem continuavit Fr. Carol. Leop. Spenner. Fasciculus XVII. Bonnae sumptibus Henry et Cohen.*

Das Werk, welches unser zu früh uns entrissene Th. Fr. L. Nees so vortrefflich begonnen und bis zu 16 Lieferungen fortgeführt hatte, war wegen seiner genauen und naturgetreuen Darstellungen der wesentlichen Charactere der Gattungen und Familien der deutschen Pflanzen eine vortreffliche Illustration der *Flora germanica*; und dabei eines der lehrreichsten Hilfsmittel für ein gründliches Studium der Gewächse. Es wäre ein wahrer Verlust gewesen, wenn dieses Werk nicht fortgeführt wäre. Daß diese Fortsetzung durch Spenner ausgeführt wird, der ein so genauer Kenner der *Flora germanica* ist, hat uns mit wahrer Freude erfüllt, und die vor uns liegende von demselben bearbeitete 17te Lieferung liefert den Beweis, daß dieses vortreffliche Werk ganz entsprechend den von seinem Begründer bearbeiteten Lieferungen wird fortgesetzt werden. Diese 17te Lieferung enthält die Gattungen der Familie der Boragineen. Die Analysen der Blumen- und Fruchtheile möchten wohl kaum etwas zu wünschen übrig lassen.

## Sechste Abtheilung.

**Allgemeiner Anzeiger.****I. Anzeiger der Vereinszeitung.****Circulare.**

Hochgeehrte Herren Collegen!

Die Nothwendigkeit der geringen Erhöhung des Jahrestrages für die Vereinskasse ist zwar nach der Bestimmung Generalversammlung in Pyrmont bereits im November- und Decemberhefte des Archivs vorigen Jahrganges nachgewiesen worden, da indess einige der Herren Kreisdirectoren darüber besonders anfragen, so wurde in heutiger Directorialconferenz beschlossen, diese Bestimmungen den verehrten Herren Mitgliedern durch nachfolgende Darstellung nochmals zu erläutern.

Bei der Begründung der neuen Einrichtungen des Vereins ließen sich die dadurch entstehenden Kosten im Voraus auf das Genaueste feststellen; dieses war erst mit Ablauf des Jahres 1839 möglich. Die Berechnungen der Verlagshandlung über das Archiv, die in der Jussieu'schen Generalversammlung vorgelegt wurden, ergaben, daß der Preis von 2 Rthlr. 4 Ggr. für das Exemplar des Archivs nicht ausreichte, weshalb ein Zuschuß von 8 Ggr. für das Exemplar beantragt und von der Generalversammlung bewilligt wurde, da man eine gegentheils nöthige Reducirung in der Ausstattung der Zeitschrift für angemessen hielt, vielmehr dankbar die Uneigennützigkeit der Verlagshandlung wie der Redaction anerkannte, wodurch allein die Ausführbarkeit dieser den Mitgliedern so nützlichen Angelegenheit möglich geworden war. Dagegen hatte die Verlagshandlung sich bereit erklärt, mit einer Erhöhung des Verkaufspreises der Zeitschrift von 6 auf 7 Rthlr. für den Buchhandel, den Umfang jedes Heftes von 6 — 7 auf 7 — 8 Bogen zu vermehren. Für die nothwendig gewordene geringe Erhöhung wurde zugleich also auch das Journal noch erweitert worden.

Sollte die Vereinszeitschrift ihren Zweck erfüllen, ein verbindendes Band zwischen allen Vereinsmitgliedern zu sein, so muß dieselbe auf die schnellste Weise, gleich nach dem Erscheinen eines jeden Heftes den Mitgliedern zukommen; dieses ging durch directen Postenlauf. Diese Versendung begreift zwei Abschnitte in sich: 1) Die Einsendung der für jeden Kreis erforderlichen Exemplare an den Kreisdirector von der Verlagshandlung aus, und 2) die Zusendung der Exemplare an jedes einzelne Mitglied von dem Kreisdirector aus. Für diese letztere Versendung bestimmte das Königl. hohe Generalpostamt in Berlin eine Erhöhung des bisherigen Averss für die Portovergünstigung Lesezirkel von 8 auf 12 Ggr. Hochfürstlich Thurn- und Taxische Generalpostdirection hat für denselben Beitrag die postfreie Versendung der Bücher der Lesezirkel wie des Archivs bewilligt.

zuzut. Da nun jedes Mitglied im Bereich dieser Postbezirke einen Antheil an der Portovergünstigung hat, so wurde die im Directorium beantragte Festsetzung des Beitrags für die nächste Portovergünstigung auf 12 Ggr. in der Generalversammlung zu Pyrmont angenommen.

Die Kosten der Expedition und des Portos für die Versendung des Archivs von der Verlagshandlung zum Kreisdirectorium von der Generalverwaltung getragen werden. Diese Kosten betragen circa 200 Rthlr. Die stehenden Ausgaben der Generalverwaltung betragen aber schon circa 200 Rthlr. und für die Rechnungsführung 80 — 90 Rthlr. incl. des Gehalts des Rechnungsführers, dazu kommen noch Druckkosten und die Bestreitung anderer nicht vorauszusehender Ausgaben, so daß die Ausgabe der Generalverwaltung für deren Ausgaben im Ganzen auf 300 — 350 Rthlr. zu rechnen ist. Mit der Uebernahme jener 200 Rthlr. würde die Ausgabe auf 500 — 550 Rthlr. steigen. Da nun die von der Generalverwaltung festgesetzte Quote jedes Mitgliedes 12 Ggr. beträgt, so liegt auf der Hand, daß damit die in der Regel stehenden Unkosten nicht gedeckt werden können. Wir haben versucht, in einer gehorsamsten Vorstellung bei Sr. Excellenz dem wickl. Geh. Staatsminister und Generalpostmeister Wagner eine Herabsetzung des Aversis, dessen Summe für die Ausgaben des Lesezirkels und des Archivs für 1839 auf 350 Rthlr. festgestellt worden war, zu erbitten. Wir haben uns aber um so mehr entschließen müssen, daß dieses nicht hat gewährt werden können, indem Sr. Excellenz bemerkten, daß das Aversum bereits niedriger als möglich normirt worden sei, um dem Vereine in Betracht seiner achtbaren Resultate jede mögliche Unterstützung zu gewähren, was daraus sich werde entnehmen lassen, daß die Portokosten der Journalsendungen im Jahr 1839 allein für den Lesezirkel 840 Rthlr. würden betragen haben. Rechnen wir dazu die Portokosten der Archivsendungen zu den Kreisdirectoren und den einzelnen Mitgliedern, so wird diese Summe auf 1500 Rthlr. betragen, wogegen das Aversum von 350 Rthlr. ein sehr mäßiges Aequivalent ist. Wir fühlen uns veranlaßt, diese den geehrten Herren Mitgliedern mitzutheilen, als einen Beweis des hohen Wohlwollens, welches unserer Anstalt die statt findende Portovergünstigung zu Theil wird.

Der bisherige Beitrag für die Generalkasse des Vereins betrug 1 Rthlr. 4 Ggr., und mit Einschluss des Beitrags für die Portovergünstigung im Königreich Preußen 5 Rthlr. 12 Ggr. Der Beitrag hat nun nach Vorstehendem im Ganzen um die Hälfte Minderkeit von 12 und resp. 16 Ggr. erhöht werden müssen, und beträgt sonach im Bereich Königl. Preuss. und Königl. Thurn- und Taxisscher Posten 6 Rthlr. 4 Ggr., und für die übrigen Mitglieder 5 Rthlr. 16 Ggr., wobei wir bemerken, daß Mitglieder erwähnter Postbezirke, die in Orten wohnen, wo noch keine Post geht, auch nur 5 Rthlr. 16 Ggr. zahlen.

Die Nothwendigkeit der vorstehenden Festsetzung der Beiträge für die Generalkasse wird hiernach jedem Mitgliede einleuchtend. Nach diesen Bestimmungen aber glauben wir den Zweck des Vereins so geordnet, daß alle Verbindlichkeiten erfüllt sind, welche die Einrichtungen desselben erfordern. Diese Aussicht giebt uns freudigen Muth, der Anstalt



ferner, wie bisher, alle unsere Kräfte zu widmen, und hoffen wir vertrauensvoll zu unseren Collegen, daß auch für den Flor der Anstalt freudig mitwirken werden, wie bisher so ausgezeichnet geschah.

Directorialconferenz zu Herford, am 11. Febr. 1840.

Der Oberdirector: Dr. R. Brandes.

Die Directoren: Dr. E. F. Aschoff. Overbeck. Wilk

Die Assessoren: L. Aschoff. Faber.

### Handelsnotizen.

*London, den 10. Januar 1840.* Gerade vor Anfang der Tensionen gestern waren sehr wichtige Nachrichten von China gelangt, was wohl zum Theil die Ursache war, warum die *chinesische Rhabarber* per St. Vincent, welche dann in Auction kam, zu so hohen Preisen zurückgezogen wurde. Diese Nachrichten sind über Calcutta, und von da durch die Communion über Egypten angelangt, und sind vom 6. und 9. Sept. Hong Kong datirt. Die Substanz derselben ist folgende: bekannt, waren die Engländer im letzten Mai, nachdem sie gesperrt worden, und das *Opium* abgeliefert hatten, nachgegangen, welches den Portugiesen gehört. Im August 1839 mehrere englische, amerikanische und chinesische Seeleute Streit, und ein Chinese kam dabei um sein Leben. Der chinesische Gouverneur forderte nun den Mörder, der englische Superintendent konnte ihn aber um so weniger abliefern, nicht bekannt ist, wer es war. Der Gouverneur gab darauf Befehl, daß alle Engländer Macao innerhalb 12 Stunden verlassen mußten. Obschon Macao den Portugiesen gehört, so habe doch nur wenige hundert Mann dort, so daß der portug. Gouverneur gerade thun mußte, wie ihm befohlen war. Die Engländer wurden also fortgetrieben. Einer derselben aber ein Ostindier (englische Unterthanen) wurden auf ihrer Passage mehreren chin. Booten angefallen, mehrere wurden getödtet, andere die andern halbtodt und einer mit abgeschnittenen Gliedern gerettet wurden. Am 4. Sept. schickte der engl. Superintendent 2 Schiffe (1 Schooner und 1 Cutter) nach dem Meerbusen Coloons in China um Provision für die Schiffe. Diese ihnen anfangs zugesagt, bald darauf aber kam eine Order vom Gouvernement, welche die Ablieferung untersagte. Ein Streit entstand daraus, der zu Schlägereien führte, in welchen 6 Chinesen und 1 Engländer umkamen. Am 6. Sept. machte der Superintendent eine Art Proclamation, worin er sagt, daß er gewisse Nachricht habe, daß die chinesischen Autoritäten sich damit beschäftigten, Feuerschiffe zu bereiten, um die Schiffe in Brand zu stecken. Die engl. Schiffe (mit Ausnahme von 2 kleinen Gouvernementsschiffen, alle nur Kauffarthenschiffe) bereiteten sich dann, den Feind zu empfangen. Kriegsschiffe von welchen nun ferner 2 von Portsmouth aus nach Ostindien beordert sind, konnten nicht vor December oder Januar anlangen.

Diese Woche kamen folgende Waaren in Auction vor:  
55 Fässer *Bals. Cop.* schön 2 sh. 6 d., zweifelhaft 1 sh. 10 d.  
61 Kisten *Borax ost.* halbraff. 49 sh.



- 90 Colli *Aloes Cap.* fein 85 sh., zurückgezogen, gut 68 — 69 sh., mittel und ord. 60 — 67 sh.
- 91 Colli *Card. Malab.* kurz 2 sh. 6 d., kurzlang 2 sh. — 2 sh. 1 d.
- 92 Sacke *Cubeben* sehr stielicht 50 sh., avarirt 40 — 47 sh.
- 93 Colli *Grana Paradisi* schön 35 sh.
- 94 Colli *Gum. Arabic. ost.* gut in Sorten 54 sh., in Säcken mit viel klein 39 — 40 sh., kirschroth 30 sh., Parva 38 sh.
- 95 Kisten *Gum. Asa foetida* fest mittel 50 — 60 sh., mitunter weich 40 — 48 sh., sehr ord. 30 — 38 sh.
- 96 Kisten *Gum. Benzoes Siam* glasichte Massa 30 Pfd. 7 sh. — 33 Pfd. 10 sh., zusammenhängende helle reine Thränen 20 Pfd., dunkel und unrein 5 Pfd. 15 sh. — 7 Pfd. 15 sh.
- 97 Kisten *Gum. Benzoes Sumatra* dunkel aber rein 5 Pfd. 10 sh. bis 5 Pfd. 15 sh.
- 98 Kisten *Gum. Copal* geschabt gelb,  $\frac{1}{2}$  dunkel gemischt, mittel Stücke 5 Pfd. 10 sh. — 5 Pfd. 17 sh. 6 d., sehr dunkel 5 Pfd. 2 sh. 6 d., gewaschen  $\frac{1}{2}$  klein u.  $\frac{1}{2}$  mittel Stücke gelb 5 Pfd. bis 5 Pfd. 2 sh., klein gelb eckig 90 sh. — 92 sh. 6 d.
- 99 Kisten *Gum. Guttä* ganz schwer u. ord. 9 Pfd. 10 sh.
- 100 Sacke *Gum. Stocklac* sehr ord. 30 — 35 sh.
- 101 Kisten *Gum. Myrrhæ*  $\frac{3}{4}$  elect. 14 Pfd., sehr klein schön 10 Pfd. 10 sh., ord. 45 — 55 sh.
- 102 Kisten *Gum. Olibanum* mittel in Sorten 38 sh. 6 d. — 40 sh., ord. 27 sh. — 32 sh. 6 d.
- 103 Kiste *Gum. Sang. Drac.* in Massa extrafein 34 Pfd.
- 104 Kisten *Gum. Sang. Drac.* in Schill ord. 5 Pfd.
- 105 Schachteln *Gum. Scamoneum d' Aleppo* fein 34 sh. 3 d. — 26 sh., mittel, dunkel, schwer 20 — 22 sh., ord. 15 — 16 sh.
- 106 Kisten *Gum. Schellac* mittel orange etwas rauh 90 sh., Block 70 — 74 sh., leberorange mit etwas Block 48 — 56 sh. 6 d., Block 45 — 46 sh., egal mittel leberfarb 44 — 45 sh., Block 37 sh., rothbraun mit etwas Block 44 sh., harter Block 34 sh. 6 d. — 35 sh.
- 107 Kisten *Gum. Tragacanth.* elect. fein weiß 20 Pfd.
- 108 Ballen *Kreutzbeeren Pers.* fein 18 Pfd. 5 sh.
- 109 Tonnen *Lignum Sassafras* 13 — 13 Pfd. 5 sh.
- 110 Canist. *Moschus* ganz ord. 7 sh. 6 d. — 20 sh.
- 111 Ctr. *Ol. Cassiae* mittel vom Geschmack 8 — 9 sh.
- 112 Bost. *Ol. croton. tiglit* gut 14  $\frac{1}{2}$  d.
- 113 Kisten *Ol. menthae pip. am.* fein 13 sh., gering 12 sh.
- 114 Kiste *Ol. menthae crispae* gering 13 sh. 6 d.
- 115 Ctr. *Ol. Ricini* weißlicht 6  $\frac{1}{2}$  d., gelblicht 5  $\frac{1}{2}$  — 6 d., braun 3 — 3  $\frac{1}{2}$  d.
- 116 Kisten *Ol. rosarum* fein 13 sh. 6 d.
- 117 Körbe *Orlean Para* mittel 2 sh. 6 d.
- 118 Sacke *Rad. Chinae nod.* gut mit circa 10 % dünn 32 — 36 sh.
- 119 Sacke *Rad. Colomboa*  $\frac{1}{2}$  hell und  $\frac{1}{2}$  dunkel und wurmig 25 sh.
- 120 Sacke *Rad. Curc. Beng.* gut aber etwas dunkel gemischt 22 sh.
- 121 Samen *Rad. Ipecacuanhae* brauchbar mittel 1 sh. 6 d.
- 122 Sacke *Rad. Ratanhiae* gut 3  $\frac{1}{2}$  d.
- 123 Kisten *Rad. Rhei* ganz mund. u. 227 Kisten halb mund., neue Zufuhr per St. Vincent wurde zu folgenden Preisen zurückgekauft, ein Theil aber fand nach der Auction Liebhaber.

- 1) ganz mund. matt von Ansehen und etwas wurmig, 9 sh. 3 d., rund 9 sh.
  - 2) halb mund. theils zart theils rauh von aussen, hier und mit einem Wurmstich versehen, im Bruch  $\frac{1}{2}$  fein,  $\frac{1}{2}$  mit  $\frac{1}{2}$  gering, flach 8 sh. 3 d., rund 8 sh.
  - 3) halb mund. rauher von aussen, etwas mehr wurmig nicht so gut im Bruch, flach 7 sh., rund 6 sh. 9 d.
  - 4) halb mund. Ausschufs flach 4 sh. 6 d., rund 5 — 5 sh. 3 d.
- 14 Kisten *Rad. Rhei* halb mund. (von New-York) sehr graulend, zurückgekauft zu 7 sh. 6 d. und 5 sh. 4 d. — 5 sh.
- 39 Kisten *Rad. Rhei* halb mund. (von Livorno) sehr wurmig ord. unverkauft flach 2 sh. 9 d., rund 2 sh. 3 d.

*Bremen, im Januar 1840.* Im Allgemeinen dürfen wir das vergangene Jahr für den Drogueriwaarenhandel wohl zu den besten zählen, da sich die Preise der meisten Artikel nicht nur behielten, sondern es mit vielen bedeutend höher ging. Andere noch einer Besserung fähig, und würde diese auch nicht laß auf sich warten lassen, wäre die Geldklemme, die die größten Handelsstaaten England und Nord-Amerika heimsucht, nicht Wege. Zufuhren sind im Ganzen nicht so häufig eingetroffen und da sich in manchen Artikeln wirklicher Mangel fühlbar macht, so wären solche hin und wieder erwünscht. Von Artikeln, die eine Hauptrolle spielen, stehen jene, die uns China liefert, als: *Campher*, *Cassia lign.*, *Cond. zinziber.*, *flor. cass.*, *Moschus*, *Ol. cassiae*, *Rad. galanga*, *Rhabarber*, *Sem. anisi* etc. oben an. Die Differenz der Engländer mit den Chinesen, durch das Einschmuggeln des *Opiums* erzeugt, scheint sehr ernst zu sein, und da demnach der Handel nach dort so lange unterbrochen bleiben kann, so ist nicht abzusehen, wann die Preise der chin. Producte ihren Culminationspunct erreicht haben. Würde aber auch im günstigsten Fall der Streit beendet, so bleibt der Handel dorthin mit *Opium*, worin der Hauptgewinn lag, wenn nicht für immer verloren, doch sehr erschwert, und demzufolge lassen sich die chin. Producte nicht mehr so billig als vordem herlegen. Von *Campher* sind die Vorräthe in Europa wohl selten so klein gewesen als gegenwärtig und ebenso ist in Amerika Mangel. *Moschus* in guter Qualität selbst zu enormen Preisen nicht anzuschaffen. Nach langem Ausbleiben ist dieser Tage endlich einmal wieder in London eine kleine Parthie im Ganzen 30 Kisten ganz mund. *Rhabarber* gekommen. Die Hälfte ward davon bereits vor Ankunft gekauft zu sehr hohen Preisen; der Rest wird ebenfalls hoch gehen. Halbgeschälte *Rhabarber* ist auch außerordentlich theuer. Die übrigen chin. Artikel genießen nicht minder lebhaften Verkehr. Ferner sind bei beschränkten Vorräthen gesucht: *Aloe*, *Gum. arab.*, *Damar.*, *mastix*, *guajac.*, *Ol. olivar.*, *Ol. petraeae*, *Piper alb.*, *Sassaparill. hond.*, *Rad. senegae*, *serpentar. virg.*, *Schier* *Sem. cynae lev. in gran.*, *Sem. licopod.*, *Schwefel* und *Schwefelblüthe*, *Tartar. crud.* und *depur.*, wie auch *Vanille*. So laß jedoch unsere noch billigeren Vorräthe von diesen Artikeln nicht einräumen. Der Ertrag der letzten Ernte vom *Gum. mastix* von der türk. Regierung an einen Speculanten verkauft, der weit höhere Preise hält, als wir notiren. *Ol. olivar.* steht

allen Bezugsquellen sehr hoch. Schwefel und Schwefelblüthe ist Hauptrol einer Compagnie Kaufleute geworden, die selbst bei den erhöhten Preisen ihre Rechnung nicht findet. Von Tartar. dper. müssen die Engländer außerordentliche Quantitäten gebrauchen, denn die Fabriken in Italien haben von denselben immer so viele Aufträge, daß man nur durch Lieferungskäufe seinen Bedarf decken kann. Die Franzosen liefern zu hohen Preisen sehr geringe Waare, die unsern verehrten Abnehmern nicht genügt. Von Vanille kommen gar keine Zufuhren und Gummi dems fehlt fortwährend.

Ihrer gef. Beachtung empfehlen ferner: frisches *Aqua naphae genui. tripl.*, ächten *Bals. copaiv. et de peru*, *Cantharides rec.*, *Castor angl.* ausgesuchte große Beutel, *Cariophyll. arom.*, *Colocynthides* große Aepfel, *Cort. aurant.* neue *Mallaga*, *Cort. cascarill.* billiger, *Crocus gatin.* neuer, *Extract. ratanhiae ver.*, *Far. verbasci citrin.*, *Gallae nigr.*, *Gum. ammon.*, *asa foetid. et galban. in gran.* schöne Auswahl, *Oliban extroff.*, *Schellack* sehr billig, neue *russ. Pottasche*, *Oxalium*, *Natr. carbon. acid.*, *Ol. jecor. can.* hell und dunkel, *Ol. ricini rec.*, *Rad. liquirit.* frisch, *Rad. rosea flor.*, *ratanhiae*, *Tamarinden*, billiger als seither, *Amygdal. amar. et dulc.*; letztere besitzen in hübscher frischer Waare, mittelgroßen Kern, billig, sonst berechnen sich die süßen Mandeln sehr hoch. *Fol. sennae alex.* so schön und billig, als solche nur zu liefern. *Manna*, die Ernte ist weit unter Erwartung zurückgeblieben, Preise fest. *Mel alb. de Cuba*, wir besitzen sehr schöne dunkle Waare. *Ol. bergamott. et de Cedro* erhielten wieder eine Sendung extra feine Qualität direct von der Quelle. An Mitteln kann man häufig billiger kaufen, wir können uns hierzu aber nicht entschließen. Bei dem Mangel an ganz mund. chin. *Rhabarber* kam uns eine Sendung neuer *russ. Kron-Rhabarber* sehr gelegen, wir können solche billiger geben, als sich die chinesische berechnen würde. Halb mund. *Rhabarber* schwacher Vorrath *Opium*, bei den jetzigen Preisen können die Anbauer in der Levante nicht bestehen, dieser Artikel wird sich daher bald erholen. Die Preise von *Quecksilber* und *Mercurialien* bleiben fest.

*Cina regia* und *Chinin* halten sich auf ihrem hohen Stand, werden aber wenig beachtet.

Coblenz, im Januar 1840. Unter allen Drogen haben die chinesischen, namentlich *Rhabarber*, *Campher*, *Moschus*, sowie auch *Thee*, *Sternanis*, *Zimmt*, *Zimmtblüthe* u. *Zimmtöl* etc., durch die Ereignisse in Canton und die daraus entstandenen Verwickelungen, welche immer schwieriger werden und nunmehr eine gänzliche Unterbrechung des Handels mit dem himmlischen Reiche auf längere Zeit als gewiß voraussetzen lassen, die merkwürdigsten Preisveränderungen erlitten.

*Rhabarber*. Bei dem bisherigen gänzlichen Mangel der mund. chin. haben wir getrachtet, uns um so besser mit moscow. zu versorgen, was uns jetzt um so lieber ist, da wir so eben die Nachricht erhalten, daß eine unbedeutende Parthie mund. chin. *Rhabarber*, welche bei dem Ausbruch der Streitigkeiten in Canton noch in der Eile von dort verschifft wurde, zwar glücklich in England angekommen, dort aber in einer gleich damit veranstalteten Auction so enorme Preise erlangt hat, daß sie selbst

gan-  
zücklich  
mit ver-  
sie selbst

über dem Stande der moscow., und eine frische halb mün 6 Sgr. per Pfund billiger als diese bezahlt wurde, wora die moscow. von neuem gestiegen ist. Der Artikel wird mein rar und theuer werden.

*Moschus* fehlt eigentlich in wirklich feiner Waare Bezugsplätzen gänzlich, und ist selbst für die höchsten kaum noch etwas zu haben.

*Campher*, bei äußerst kleinem Vorrath davon in Europ jede Post von den Bezugsplätzen höhere Preise.

*China regia* und *Chinin*. Wenn beide seit den zuletzt getheilten Veränderungen ohne eine weitere Erhöhung l so liegt die Ursache davon nur in den ungünstigen Ver sen für den Handel überhaupt, womit das vergangene Jahr namentlich in den vielen politischen Verwickelungen, Lage Englands, den kritischen Verhältnissen Amerikas u allgemeinen Geldnoth, wodurch größere Speculationen ge wurden. Hie und da hörte man Behauptungen, als sei d fuhrverbot aufgehoben, und bald wieder billigere Vorrät China aus dem Lande zu erwarten. Dies beruht in v Beziehung auf gänzlich ungegründeten Voraussetzungen wird noch mehr durch eine ganz neue Nachricht vom 1 aus Lima widerlegt, wonach Santa-Cruz wieder zum Pr ten von Bolivia erwählt worden ist. Dies wird den Zw am Bestehenden eine andere Meinung beibringen und sich bald in den Chininpreisen auch fühlbar machen.

*Cristalli tartari*, stets gesucht zu erhöhten Preisen.

*Folia sennae alex.* Die neuern Zufuhren sind wieder gering ausgefallen.

*Gum. arabic.* blieb bisher rar und theuer bei überall ge ten Vorräthen.

*Manna*. Von der neuen ist bisher weder etwas Sch noch etwas Billiges zum Vorschein gekommen.

*Opium* steht sehr niedrig, doch ist gutes ägyptisches ra das neue Smyrnaer sehr feucht und weich.

*Rad. jalappae, seneca, Sarsaparill.* und *Vanille* sehr rar, *Rad. serpentar.* gestiegen.

*Rad. ipecacuanhae*, äußerst niedrig, à 24 Sgr., bei 10 22½ Sgr.

*Rotterdam*. Die Totalvorräthe von Zucker an den 7 I märkten Europas waren ult. December:

|                         | 1837.                | 1838.                | 183     |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------|
| Rotterdam u. Amsterdam. | 16,000,000 $\bar{u}$ | 23,000,000 $\bar{u}$ | 27,000  |
| Antwerpen .....         | 5,500,000            | 7,000,000            | 7,500   |
| Hamburg .....           | 9,700,000            | 13,000,000           | 11,500  |
| Triest .....            | 7,800,000            | 15,000,000           | 23,000  |
| Havre .....             | 1,000,000            | 7,000,000            | 6,000   |
| England .....           | 73,000,000           | 11,000,000           | 13,000  |
|                         | 113,000,000          | 175,000,000          | 205,000 |

Die Vorräthe von Kaffee an den 7 Hauptmärkten Eu waren am letzten December:

|                         | 1837.                | 1838.                | 1839.                |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Amsterdam u. Rotterdam. | 19,000,000 $\bar{u}$ | 17,000,000 $\bar{u}$ | 15,000,000 $\bar{u}$ |
| Antwerpen.....          | 10,000,000           | 7,000,000            | 7,400,000            |
| Hamburg.....            | 14,000,000           | 10,000,000           | 8,600,000            |
| Trerest.....            | 6,000,000            | 8,500,000            | 9,200,000            |
| Nevers.....             | 3,000,000            | 3,500,000            | 1,800,000            |
| England.....            | 16,000,000           | 7,000,000            | 20,000,000           |
|                         | 68,000,000           | 63,000,000           | 62,000,000           |

Die Kaffeeproduction auf Java und den übrigen Holländisch-Ostindischen Besitzungen ist stets im Zunehmen. Aufser nach Europa haben sich in neuester Zeit nach England via Cap und nach Nordamerika bedeutende Abzugsquellen für die ostind. Laufen gebildet. In Brasilien wird der Anbau gleichfalls eifrig betreibend betrieben. Die letzte Ernte soll 100 — 110 Mill. Pfd. ergeben haben, wovon die eine Hälfte ohngefähr nach Nordamerika und den westlichen Theilen dieses Welttheils geht, die andere Hälfte in verschiedenen Richtungen nach Europa. Der brasil. Kaffee ist daher der Haupttrival des Java-Kaffees. Auf Havanna und St. Domingo hat die Production längst ihr Ubergewicht verloren.

Die Zufuhren an *Reis* in Rotterdam waren im letzten December:

| 1836.             | 1839.               |
|-------------------|---------------------|
| 1900 Fäss. Carol. | 4300 Fäss. Carol.   |
| 61,000 Ball. Java | 167,000 Ball. Java. |

Die Ausfuhr von Java ist in bedeutendem Steigen. Der Vorrath von Gewürzen bei der Maatschappij ist: *Muscadine* 440 Fässer, *Macis* 282 F., *Nelkenpfeffer* 2250 B. Durch die Unterwerfung der feindlich gesinnten Völkerstämme an der Westküste Sumatras, dem Hauptproductionslande des Pfeffers, haben die Zufuhren von Pfeffer sehr zugenommen. *Sumatra-Pfeffer* 14 Ctr., *Muscadine* 170 — 200 Ctr., *Amboina-Nelken* 57 Ctr., *Jambou-Piment* 22 Fl., *China-Piment* 42 Ctr., *Macis* vernachlässigt.

*Hamburg.* Die Preise von *Olivöl* waren im vorigen Jahre bei häufigen Zufuhren steigend. Der nachgebliebene Vorrath im Dec. war nur 250,000 Pfd. Die Frühjahrssendungen dürften eine Preiserniedrigung bewirken. Die Einfuhr von *Thran* betrug:

|                      | 1836. | 1837. | 1838. | 1839.      |
|----------------------|-------|-------|-------|------------|
| Blanker.....         | 7300  | 4800  | 6660  | 8460 Tonn. |
| Braun- u. Leber..... | 12800 | 11800 | 12500 | 7460 „     |
| Südsee.....          | 1830  | 3350  | 4100  | 2130 Fäss. |

*London.* *Salpeter* behauptet sich im Preise. Bei der Verlagerung von *Thee* am 9. Jan. wurden steigende Preise bewilligt. *Congo* war zu 2 sh. 10 d. gesucht. Am 10. waren die Preise: für *Tonkay* 2 sh. 11 d., bessere Sorte von *hellem Blatt* 3 sh. 1 d., für *Congo* 2 sh. 10 d., mit *schwärzlichem Blatt* 3 sh. 1 d., *Gunpowder* Mittelqualität 5 sh. 6 d., *Haysan best.* 7 sh. 6 d., *mittel* 5 sh.

*Hamburg.* Seit den kriegerischen Nachrichten aus China ist das Geschäft in *Thee* lebhafter. *Cassia lignea* ist auf 8 fl. und *Campier* auf 58 fl. gestiegen. *Talg* ist weniger begehrt, hiesiger 14 Mk. pro 250 Pfd.

*Mainz.* Die Fabrikation des *Champagners* nimmt jährlich



zu, man will sogar aus dem Rheinwein bessern erzielen, Champagne selbst erzeugt.

*Cöln*, den 18. Jan. *Rüböl* 31 Rthlr. 7½ Sgr. pr. 232

*London*. Am 17. Jan. kamen 114 S. *Piment*, 265 S. und 800 Beutel *Ingwer* zur Auction. In Folge der höhern und Kaffeepreise war nach *Cacao* vermehrte Frage, u. Waare aus brit. Pflanzungen war um 1 sh. höher. In *The* Verkäufe, besonders in *Congo* zu erhöhten Preisen von 3 *Salpeter* fest im Preise. *Talg* lebhaft begehrt. *Thran* u. dagegen ohne Veränderung.

*Rio-Janeiro*. Die Ausfuhr im Monat October 1839 b. 87,137 S. *Kaffee*, 2224 Kisten und Fässer und 232 S. 2 15,151 *Häute*, 753 *Ochsenhörner*, 288 *Pipen Rum*, 1679 *Robak*, 4199 S. *Reis*, 9 Colli *Ipecacuanha*, 10 Fässer *Tapioca* 161 *Jacarandabretter*.

*London*, Ende Decembers. *Sumatra-Pfeffer*, *Talg*, *span. Blei* und *Zink* waren sehr begehrt.

*Mainz*. Aus *Rheinbaiern* ging viel *Rüböl* ein Ende D. 10 Rthlr. circa 100 Pfd. Vorzügliches *Liller Mohnöl* zu 22. *Baumöl* und *Mandeln* sind in *Italien* etwas höher gegangen.

*Stettin*. *Rüböl* wird auf 10 Rthlr. gehalten.

*London*. Zu der Auction am 6. Jan. waren in *London* 6 Colli oder 6,436,584 Pfd. declarirt, davon sind 37,020 Colli 4,517,463 Pfd. *Congo* und 17,214 Colli oder 886,107 Pfd. *T* circa 260,000 Pfd. *Souchong* und circa 313,000 Pfd. *Haysan* zeigt sich vermehrte Kauflust. Zu dem nämlichen Tage noch 5330 Kisten *Thee* declarirt. Die *Indigopreise* sind niedriger. Bei der Auction am 21. Jan. waren 6400 Kisten gekündigt.

Die Zufuhren an *Zucker* im Jahr 1839 in *Hamburg* b. gen ca. 85,000,000 Pfd., der Vorrath besteht aus ca. 11,000,000

Für die nächste *Indigauction* in *London* sind 6538 K. declarirt.

## Das pharmaceutische Institut in Jena.

In dem *pharmaceutischen Institute* zu *Jena* beginnen bald Ostern die Vorlesungen und practischen Uebungen für das merhalbjahr 1840. Die Einrichtung und die Leistungen d. seit elf Jahren wirksam gewesenen Lehranstalt sind in fünften Berichte (s. dieses *Archiv Januar 1839*) angegeben. Nähere Aufschlüsse ertheilt der unterzeichnete Director des Instituts, an welchen auch Anmeldungen zur Theilnahme an dieser Lehranstalt möglichst frühzeitig zu richten sind.

Jena,  
im Januar 1840.

Dr. H. Wackenroder,  
Hofrath und Professor.

## Ankündigung eines Vegetabiliengeschäfts.

Es dürfte mehren der Herren Collegen eine Einrichtung nützlich und zweckmäfsig erscheinen, mittelst welcher sie Vorrath sämtlicher inländischen Vegetabilien frisch gesamt

gut getrocknet, eben so die aus frischen Vegetabilien herzustellenden Präparate frisch bereitet, beziehen können. Der Umstand, begünstigt durch die an officinellen Vegetabilien so reiche Umgegend von Saalfeld und die unmittelbare Nähe des Thüringer Waldes mit seinem vielfältigen Ertrage an solchen officinellen Gegenständen, er bietet sich daher, alle inländischen officinellen Vegetabilien jeder Art, Kräuter, Wurzeln, Blumen, Rinden, Samen u. s. w. in schöner durchaus tadelloser Beschaffenheit, im Laufe desselben Jahrs, für welches die Bestellungen lauten, frisch gesammelt, zweckmäfsig und gut getrocknet, so wie die aus frischen Vegetabilien zu bereitenden Präparate, als Extracte, Syrupe, Wässer u. s. w. in jeder grössern oder kleinern Quantität, zu liefern, wenn die Bestellungen dieselben vor oder mindestens zu der Zeit, wo die Vegetabilien einzusammeln sind, bei ihm eingegeben werden.

Hinsichtlich der Wässer bemerke ich, dafs *Aq. Flor. Aurant.*, *Aq. Flor. Tiliac* und *Aq. Rubi Idaei*, in dreifacher Stärke auf 5 Unzen haltende Gläser verpackt, *Aq. Lauro-Cerasi* aber, nach der in der Preuss. Pharmacopöe — welche auch bei uns Landespharmacopöe ist — vorgeschriebenen Stärke, geliefert werden.

Die narkotischen Kräuter werde ich nicht allein in der gewöhnlichen Form, sondern wenn es ausdrücklich verlangt wird, auch vorsichtig und rasch ausgetrocknet, gröblich gepulvert und luftdicht verschlossen, liefern.

Die aus frischen Vegetabilien nach Vorschrift der *Pharmacopoea Borussic. edit. V.* mit Spiritus zu bereitenden Extracte werden ganz mit der Umsicht und Sorgfältigkeit hergestellt werden, die diese wichtigen Heilmittel verlangen, und nicht allein durch innere Güte, sondern auch durch äusseres schönes Aussehen sich auszeichnen. Im Falle Extracte nach der ältern Vorschrift, durch Auspressen und Eindicken des Saftes bereitet, verlangt werden, bitte ich dieses ausdrücklich zu bemerken.

Ich werde dann die bestellten Gegenstände so bald als irgend möglich, zweckmäfsig und billig verpackt, und möglichst billig berechnet, liefern. An Gelegenheit zur Versendung nach allen Gegenden fehlt es hier nicht.

Diese Einrichtung bietet den Vortheil, dafs nur wirklich frisch gesammelte Vegetabilien, oder die aus ihnen frisch bereiteten Präparate, schön und billig geliefert werden, und trägt, da das ganze Geschäft von der Einsammlung bis zur Absendung der Waaren meist durch nur eine Hand, und zwar die eines Apothekers, geht, eine Bürgschaft in sich, dafs jeder bezogene Gegenstand, rohes Vegetabil oder Präparat, vorschriftsmäfsig und nach Wunsch beschaffen ist. Drogueriehandlungen, so zuverlässig und solide viele derselben auch sind, können unmöglich diese Gegenstände so sicher und in allen Fällen frisch liefern, weil sie nicht darauf eingerichtet sind, die Vegetabilien nur auf vorher eingegangene Bestellungen einzusammeln und zu liefern. Jedem Hrn. Collegen aber ist viel daran gelegen, alle Vegetabilien, die im Laufe des Jahrs gebraucht werden, und die aus den frischen Vegetabilien herzustellenden Präparate, insoweit sie solche nicht selbst einsammeln, oder zubereiten können oder wollen, frisch, schön und vorschriftsmäfsig, und dabei

in-n.  
en kön-nö  
und dabei

billig zu beziehen, deshalb belieben die, welche mit mir die halb in Verbindung treten wollen, einen Ueberschlag des was sie im Laufe des Jahrs brauchen, zu machen, und mir stellung darauf zeitig genug zugehen zu lassen, und einer prompten gewissenhaften Ausführung derselben versichert zu sein. Ein Näheres in jeder Beziehung besagen die Preislisten.

Der Apotheker E. Gressler zu Saal  
in Thüringen.

### Notizen aus der Generalcorrespondenz des Directoriums.

Se. Excellenz der Hr. Geh. Staatsminister v. Altenstein: Verwendung für die Portovergünstigung des Vereins in Preuss.

Hr. Dr. Schmidt in Sonderburg: Wunsch, daß auch Apotheker Holsteins sich anschliessen möchten. Die Hrn. Vicedirectoren Dr. Fiedler, Bucholz in Erfurt, Herzog Braunschweig und Dr. Bley in Bernburg: Ueber die Nothwendigkeit der nicht zu umgehenden Erhöhung der Beiträge der Generalkasse; letztere beiden auch über Gehülfs-Unterstützungsangelegenheit. — Hr. Vicedirector Dreykorn: Ueber die Eintheilung der Kreise des Vicedirectoriums Weimar. Hr. Apotheker Oberdörffer in Hamburg drückt dem Verein die freundschaftlich-collegialischen Gesinnungen des Hamburger Apothekervereins aus. — Die Herren Kreisdirectoren Weber in Schwelm, Jahn in Meiningen, Jonas in Eilenburg, Rabenhorst in Luckau: Ueber Angelegenheiten ihrer Kreise. — Hr. Ap. Bärwinkel in Leipzig: Ueber den Anschluß der Apoth. im Königreich Sachsen an den Verein; fortgesetzte Bemühungen in dieser Sache. — Hr. Dr. Meurer in Dresden: Ueber denselben Gegenstand, und Bestimmung mehrerer Kreise und Kreisdirectoren. — Hr. Dr. Bley: Ueber die Feier des 25-jährigen Doctorjubiläums des Hrn. Hofraths Dr. Heinecke in Bernburg. — Hr. Vicedirector Müller in Medebach: Ueber Gehülfs-Unterstützungsangelegenheit und die Herausgabe seines bot. Wörterbuchs zum Besten des Unterstützungs-Instituts.

Hohe Herzogl. S.-Meiningensche Landesregierung: Wohlwollende Anerkennung des Vereins.

Se. Excellenz der Geh. Staatsminister und Generalpostminister Freiherr v. Nagler: Hochgeneigte Bewilligung der Portovergünstigung für 1840.

Dankschreiben für die Ehrenmitgliedschaft des Vereins gingen ein: von Hrn. Professor und Hofapotheker Dr. Landers in Athen, Hrn. Professor Martens in Löwen, Hrn. Prof. I. Bruns in Braunschweig, Hrn. Medicinalrath Dr. Kindt in Oldenburg, Hrn. Kreisphysikus Dr. Wittcke in Erfurt, Hrn. Bredecke in Braunschweig, Hrn. Dr. Steetz in Hamburg.

Beiträge zum Archiv gingen ein: von Hrn. Apoth. Oberdörffer in Hamburg, Hrn. Professor Dr. Tognio in Pest, Hrn. Apotheker Richter in Delitzsch, Hrn. Apotheker Baldernius in Dessau, Hrn. Apotheker Müller in Medebach, Hrn. Dr. Pfeiffer in Cassel, Hrn. Dr. Bley in Bernburg, Hrn. Dr. Siller in Petersburg, Hrn. Apotheker Albers in Lengerich.

Da ich Endesunterzeichneter die Apotheke zu Bürgel bei Jena gekauft habe und anfangs Mai d. J. zu übernehmen gedenke, so ersuche ich die betreffenden Herren Mitglieder des Vereins, Zusendungen von Briefen oder Büchern an mich, nach jener Stadt nach Bürgel bei Jena zu adressiren.

Neustadt a. d. Orla, im Januar 1840.

C. E. Dreykorn, Vicedirector.

Jemand, der seit 5 Jahren eine Apotheke administrierte, sucht in Hannoverschen eine Apotheke zu kaufen, pachten oder anderweitig zu administriren; auch sucht ein Gehülfe auf Ostern d. J. eine Stelle. Ueber beide zu Empfehlende ertheilt nähere Auskunft

Nydenkirchen bei Melle,  
im Januar 1840.

der Kreisdr. H. Upmann.

Der Empfehlung des Hrn. Collegen Upmann kann ich mit Zustimmung beistimmen.

Brandes.

### Zur gefälligen Beachtung.

Es sind mehrmals Bekanntmachungen für den Anzeiger eingebracht, mit der Bemerkung, daß das Directorium, die Redaction oder die Verlagshandlung des Archivs die desfallsigen Anfragen beantworten würden. So gern wir auch den Mitgliedern in jeder Beziehung gefällig sind, so ist es uns doch rein unmöglich, eine solche Correspondenz übernehmen zu können. Bei allen mit dergleichen Anfragen verbundenen Anzeigen muß daher die Angabe einer bestimmten Adresse verbunden sein, wonach die Anfragen zu richten sind. Gegentheils können die Anzeigen in dem Anzeiger nicht aufgenommen werden.

## II. Anzeiger der Verlagshandlung.

(Tarate werden mit 1½ Ggr. pro Zeile mit Petitschrift, oder für den Raum derselben, berechnet.)

Bei J. G. W. Vogel in Leipzig ist erschienen:

Die Pflanzenchemie. Ein Handbuch für Aerzte und Apotheker. Mit theilweiser Zugrundelegung von »Thomson's organic chemistry« und mit Benützung der besten Quellen bearbeitet von Dr. A. Weinlig. 53 Bogen. gr. 8. 1839. Preis 4 Rthlr.

Dieses Werk enthält eine bis auf die neueste Zeit fortgeführte möglichst vollständige systematische Darstellung der Pflanzenchemie nach ihrer gegenwärtigen Gestaltung. Uebersichtliche Vereinigung und kritische Ordnung der in Journalen zerstreuten, mit besonderer Berücksichtigung der für den Praktiker wichtigeren Momente war der Zweck des Verfassers — eine Uebersetzung konnte und durfte das Buch nicht sein.

Dr.  
igung beid  
erfassers —



Bei Aug. Hirschwald in Berlin ist so eben erschienen in allen Buchhandlungen zu haben:

Schultze, A. G. R. (approb. Apoth.) *Compendium officinellen Gewächse nach natürlichen Familien genet. Nebst einer gedrängten Uebersicht der botanischen Terminologie und Systemkunde.* Für Pharmakuten und Mediciner bearbeitet. gr. 8. geh. 1½ Rthlr.

Wir machen Freunde der Botanik und Mineralogie aufgenbe, aufs günstigste beurtheilte Werke ergebenst aufmerksam:

Hochstetter, Prof. M. Ch. F., populäre Botanik, oder liche Anleitung zur Kenntniß der Gewächse, besonders in Deutschland und in der Schweiz am häufigsten wildwsenden Arten, wie auch der deutschen Culturpflanzen und merkwürdigsten Gewächse der wärmern Länder. Zweite, besonderer Rücksicht auf Norddeutschland und die Schvermehrte und verbesserte Auflage. Mit 3 schwarzen und gemalten Tafeln. gr. 8. 1837. geh. 7 fl. oder 4 Rthlr.

— — populäre Mineralogie, oder die Gebirgs- und Fossilkunde für alle Stände, insbesondere für die Jugend und die Lehrer an Real-, Gewerbs- und Volksschulen, auch Pharmaceuten &c. Mit 12 Tafeln. gr. 8. 1836. geh. 24 fr. oder 2 Rthlr.

Verlagsbuchhandlung von Joh. C. Mäcken in Reutlingen.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

**P r a k t i s c h e s**

**Haushaltungs- und Kochbuch**

oder die wohlerrfahrene Lehrerin im Haushalte und in der Küche von

**Auguste Gercke.**

Dritte, vielfach verbesserte und abermals stark vermehrte Auflage. gr. 8. Hannover, in der Hahn'schen Hofbuchhandlung.

Druckpap. elegant geh. 1½ Rthlr.

Unter den zahlreichen Haushaltungs- und Kochbüchern hat sich obige Werk eine so allgemeine Verbreitung dadurch erworben, daß gänzlich auf der langjährigen eigenen Erfahrung der Frau Verfasserin beruht und sich daher durch möglichste Zweckmäßigkeit, Deutlichkeit und wirkliche praktische Anwendbarkeit allen angehenden wie auch schon geteren Hausfrauen und Wirthschafterinnen jeden Standes jetzt um so mehr empfiehlt, da diese abermalige dritte, vielfach verbesserte und stark vermehrte Auflage die größte Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit in allen Theilen der Haushaltsführung und Kochkunst darbietet. Die Gesammtzahl aller Recepte und Vorschriften beträgt jetzt gegen 2000.

➡ Hierneben zwei Anzeigen von Barth in Leipzig und Bieweg & Sohn in Braunschweig.



N<sup>o</sup> 3. Vereinsjahr der Jussieu's. 1840.

M ä r z.

**ARCHIV**  
**DER PHARMACIE,**  
eine Zeitschrift

des

Apotheker-Vereins in Norddeutschland.

Zweite Reihe. Einundzwanzigsten Bandes drittes Heft.

Erste Abtheilung.

**Vereinszeitung,**

redigirt vom Directorio des Vereins.

*1) Vereinsangelegenheiten.*

Directorialconferenz zu Herford am 10. Febr. 1840.

1) Es wurde vorgelegt ein Schreiben Herzoglicher hoher Regierung in Meiningen, über die beifällige Anerkennung des Vereins in den Herzoglichen Landen.

2) Die Verhandlungen über die Organisation des Vereins in dem Großherzogthum S.-Weimar und in den Sächs. Herzogthümern wurden durchgenommen. Für das Großherzogthum Weimar ist Hr. Ap. Dreykorn, der der Begründung des Vereins daselbst so viele Theilnahme gewidmet, als *Vicedirector* erwählt worden. Das Vicedirectorium Weimar besteht nunmehr aus den Kreisen Weimar, unter Leitung des Hrn. Kreisdirectors Hofapothekers Knauer, Jena, unter Leitung des Hrn. Vicedirectors und Kreisdirectors Dreykorn, und Saalfeld, unter der Leitung des Hrn. Kreisdirectors Grefslers. Das Vicedirectorium des Vereins in den Sächsischen Herzogthümern wird von Hrn. Vicedirector Dr. Buchholz in Gotha verwaltet. Es besteht nunmehr aus den beiden Kreisen, Gotha und Meiningen, erster unter Leitung des

Hrn. Vicedirectors und Kreisdirectors Dr. Bucholz, letzter Leitung des Hr. Kreisdirectors Jahn in Meiningen.

3) In Bezug auf die Organisation des Vereins im König Sachsen wurde vorgelegt, dass Hr. Dr. Meurer in Dresden Vorsteher der Marienapotheke daselbst, zum Vicedirector ernannt sei. Zu Kreisdirectoren sind ernannt worden: Hr. Ap. Fick in Dresden (Altstadt), Hr. Apotheker Dorn in Dresden (Altstadt) und Hr. Apotheker Paessler in Bautzen. Die definitive Kreiseintheilung soll vorläufig ausgesetzt bleiben, weil ein zahlreicher Beitritt unserer dortigen verehrten Herren zu erwarten ist, wonach dann die Bildung der Kreise zweckmässigsten für die Mitglieder zu bewerkstelligen ist.

4) Da der Druck einer neuen Auflage der Statuten des Vereins bald nothwendig wird, und das Directorium wünscht dieselben möglichst zu vervollkommen und nach den Wünschen und Ansichten der Mitglieder einzurichten, soweit es nur irgend thunlich ist, so werden alle Mitglieder ersucht, welche zur Vervollkommnung dieser Statuten Vorschläge oder Anträge zu machen wünschen, dieselben ihren Kreisdirectoren mitzutheilen; diese aber würden solche spätestens binnen vier Monaten dem Oberdirectorio einsenden.

5) Dem Hr. Vicedirector Müller in Medebach wurde ein beifälliges Schreiben über die Herausgabe seines botanischen Wörterbuchs zum Besten der Gehülfen-Unterstützungskasse übersandt. Das Directorium wünscht, dass diejenigen Herren Collegen und Fachgenossen, denen die so wichtige Förderung der Gehülfen-Unterstützungskasse nicht gleichgültig ist, und deren Umstände es vermögen, durch zahlreiche Subscriptionen die edle Absicht unseres Hr. Collegen Müller fördern mögen. In dem Beirath des Vereins werden die Herren Kreisdirectoren gern die Subscriptionen annehmen und solche baldigst an Hr. Vicedirector Müller in Medebach (Reg.-Bez. Arnshagen) befördern.

6) Hr. Director Overbeck überreichte 12 Louisd'or als Geschenk der Herren Apotheker in Bremen für die Gehülfen-Unterstützungskasse. Namens der Bucholz-Gehülfen-Trommsdorffschen Stiftung wurde den verehrten Gebern ein Dankschreiben für diese reiche Spende übersandt.

7) Der Oberdirector übermächte zu gleichem Zweck 3 Reichthalter als Beitrag von einem Gehülfen, aus Dankbarkeit für eine von ihm gewordene gute Stelle, mit ausdrücklicher Bemerkung, dass sein Name nicht genannt werde.

Die Mitglieder des Vereins und einzelne andere menschenfreundliche Collegen und Wohlthäter geben jährlich ihre Spenden zu der wohlthätigen Stiftung, die nun den Namen ihres edlen Urheber trägt und schon so vieles geleistet hat. Die öffentlichen Rechnungsablagen geben darüber den besten Beweis. Aber die Ansprüche an das Institut vermehren sich weit mehr als die Mittel desselben reichen, die Bedrängten zu unterstützen. Möchten denn diejenigen unserer Collegen, welche nicht Mitglieder des Vereins oder im Vereinsbezirke nicht wohnsässig sind, namentlich in größeren Städten, sowie auch die Gehülfen, deren Mittel es erlauben, alljährlich der Stiftung einen Beitrag spenden. Auch kleine Gaben sind willkommen und vereint wachsen sie zu einer Summe, und auch auf ihnen ruht

der dankbare Segen der Unterstützten. Möchten unsere Bitten Herz und Hand öffnen, und die Stiftung dadurch im Stande sein, diesen schönen Zweck reichlich zu erfüllen.

5) Die von Hrn. Vicedirector Dr. Bley ordnungsmäßig beantragte fernere Unterstützung der Herren Meißner in Ziesar und Schwarz in Bernburg für das Jahr 1840 wurde Namens der Buchholz-Gehlen-Trommsdorffschen Stiftung bewilligt.

9) Auf die Anzeigen und Anträge einiger Herren Kreisdirectoren wird bemerkt:

dass diejenigen Mitglieder im Bereich Königl. Preuss. und Fürstl. Thurn- und Taxisscher Posten, wohin erweislich keine dieser Posten gehen, den halben Thaler Beitrag für die Portorecognition nicht zu zahlen haben, und daher nur den Jahresbeitrag von 5 Rthlr. 16 Ggr. entrichten. Zugleich soll das ganze Schverhältniß über die Beiträge den Mitgliedern noch einmal ausführlich im Februarheft des Archivs laufenden Jahrs auseinandergesetzt werden. (NB. Ist geschehen, s. S. 236. Br.)

10) Hr. College Faber in Minden ist zum Kreisdirector des Kreises Minden erwählt worden, da die 1839 vorgenommene Vereinigung der beiden Kreise Minden und Herford wegen zu vieler Störungen in der Circulation der Bücher nicht beibehalten werden konnte.

Der Oberdirector: Dr. R. Brandes.

Die Directoren: Dr. E. F. Aschoff. Overbeck. Wilken.

Die Assessoren: L. Aschoff. Faber.

## Eintritt neuer Mitglieder.

Hr. Apotheker Höhn in Cöln ist, nach Anmeldung durch Hrn. Vicedirector Sehlmeier, als wirkliches Mitglied des Vereins in den Kreis Cöln aufgenommen worden.

Deagl. Hr. Apotheker Koch in Runderath, nach Anmeldung durch Hrn. Kreisdirector Dr. Voget, in den Kreis Aachen.

Deagl. Hr. Apotheker Krämer in Kirchen, nach Anmeldung durch Hrn. Vicedirector Müller und Hrn. Kreisdirector Posthof, in den Kreis Siegen.

Deagl. Hr. Apotheker Paulsen in Großneuhäusen, nach Anmeldung durch Hrn. Vicedirector Dreykorn und Hrn. Kreisdirector Knauer, in den Kreis Weimar.

Deagl. Hr. Apotheker Preufs in Hoyerswerda, nach Anmeldung durch Hrn. Kreisdirector Rabenhorst, in den Kreis Luckau.

Deagl. Hr. Apotheker Barkhausen in Lügde, nach Anmeldung durch Hrn. Kreisdirector Müller in Driburg, in den Kreis Paderborn.

Der Oberdirector des Vereins.  
Brandes.

## Generalkasse.

1) Die Abrechnungen vom Jahre 1839 gingen ein: von Hrn. Kreisdirector Rabenhorst in Luckau, Hrn. Kreisdirector Gei-

seler in Berlin, Hrn. Kreisdirector Upmann aus dem Osnabrück, und von Hrn. Vicedirector Müller in M. Nach Rechtsbefund ist Decharge darüber ertheilt worden.

2) Abschlägliche Zahlungen für das Jahr 1840 wurden gesandt: von Hrn. Director Dr. Du Menil, von Hrn. Director Jonas in Eilenburg und Hrn. Kreisdirector Upmann in Neuenkirchen.

3) Die Herren Mitglieder, welche ihre Beiträge für das laufende Jahr noch nicht eingesandt haben, werden um die baldige Einsendung dringend ersucht. Desgl. die betreffenden Vereinsbeamten um baldige Einsendungen derselben in die Generalkasse, damit diese ihre schuldigen Zahlungen leisten kann.

Die Direction der Generalkasse  
Dr. E. F. Aschoff.

Hölzerman

### Vereinskapital.

Die Eintrittsgelder gingen dazu ein: von den Herren Apothekern Deseneßs, Renzel, Schneider und Schöner in Potsdam, ferner von den Herren: Apotheker Lohse in Rathenow, Bückling in Zehdenik, Kunde, Günthert in Berlin, Dr. Erdmann in Berlin.

Aus dem Kreise Weimar: von Hrn. Apotheker Bräuer in Blankenhain; aus dem Kreise Oldenburg: von Hrn. Apotheker König in Löhningen; aus dem Kreise Luckau: von Apotheker Preuß in Hoyerswerda; aus dem Kreise Paderborn: von Hrn. Apotheker Barkhausen in Lügde; aus dem Kreise Osnabrück: von Hrn. Apotheker Schreiber in Melle; aus dem Kreise Cöln: von Hrn. Apotheker Höhn; aus dem Kreise Bonn: von Hrn. Apotheker Koch in Runderath; aus dem Kreise Bielefeld: von Hrn. Apotheker Wedel daselbst.

Die Verwaltung des Vereinskapitals  
Brandes. Aschoff. Overbe

### Die Versammlung der Mitglieder des Kreises des Apothekervereins, in Meiningen, am 9. Dec.

Zur diesjährigen Feier war bekanntlich schon im Jahre 1840 wiederum Meiningen gewählt worden. Die Anwesenden waren: Dr. Bucholz, Hofapotheker Löhlein aus Hofapotheker Lützelberger und Springmühl aus Hildesheim, Apotheker Simon aus Dermbach, Stickel aus Nordheim, Biedermann aus Schweina, Motschmann aus Schleusingen, Neddermann aus Schwarza, Moritz aus Meiningen, Oberbibliothekar Bechstein, Medicinalrath Jahn, Apotheker Jahn aus Meiningen, ebendaher noch Dr. Büchler, Apotheker Baumann jun. und Hofapotheker Treiber. Einiges Mißverständniß in Betreff des zur Zusammenkunft bestimmten Tages war Professor Bernhardt aus Dreißig

erschienen, doch erfreuten sich die anwesenden Mitglieder am Abend des Tages seiner Gesellschaft.

Dr. Buchholz eröffnete die Versammlung mit einer Anekdote über das Leben und der Verdienste des berühmten Botanikers Anton Lorenz von Jussieu, mit dessen Namen die heutige Versammlung bezeichnet wurde. Buchholz sprach aus, daß die rein pharmaceutische Botanik so wenig mehr in pharmaceutischen Zeitschriften berücksichtigt werde und wie es ihm zu wünschen sei, daß das Archiv des Vereins die Verbreitung des pharmaceutischen Wissens mit mehr Sorgfalt als bisher betriebe. Wenn nämlich auch für die meisten officinellen Pflanzen sichere Kriterien zur Unterscheidung von anderen verwandten Gewächsen in botanischen Handbüchern gegeben sind, so wird es doch nicht schaden, wenn für manche charakteristische Gewächse, wie z. B. für *Lactuca virosa*, für *Aconitum* und für manche andere Pflanzen genauere Unterscheidungsmerkmale, als die bis dahin aufgestellten, hervorgesucht würden, indem nach diesen die Unterscheidung, namentlich der letzterwähnten Pflanze, über deren Eigenschaften die Meinungen der Verfasser der Pharmakopöen nicht übereinstimmen, wenn zum Vergleich nicht zugleich die ähnlichen Arten derselben Gattung sämtlich vorliegen — schwer ausfällt.

Dr. Buchholz zeigte darauf Amygdalin, aus Pfirsichkernen erhalten, in sehr schönen voluminösen federartigen Krystallen. Die Ausbeute war nach seiner Angabe reichlicher als aus gewöhnlichen Mandeln ausgefallen. Auch hatte derselbe den von Weichsel und Kirschlorbeerblättern aufgefundenen und darin ebenfalls des Amygdalins vertretenden Bitterstoff dargestellt, der sich von harzähnlichen Eigenschaften, die, von ziemlich rein bitter, nicht im entferntesten der Blausäure und dem Bittermandelöl, dagegen der Weidenrinde ähnlichen Geschmack und von bräunlichgelber Farbe, ganz schnell, ebenso wie das Amygdalin in Berührung mit dem Emulsin der Mandeln, den charakteristischen Geruch und Geschmack verbreitet, und also, wie das Amygdalin in Blausäure und Bittermandelöl verwandelt wird. Es zeigte den Anwesenden das Verhalten dieses Stoffs und des Amygdalins durch Vermischen desselben mit einer Süßmandelöl-Emulsion anschaulich gemacht, indem 17 Gran von einem wie oben andern in einer Unze Emulsion aufgelöst wurden. Der Geruch und Geschmack nach Blausäure an diesem Bitterstoff war so schnell als bei gleicher Behandlung des Amygdalins, allein er war doch nicht so intensiv, wie an dem Amygdalin, und an diesem wieder nicht so stark, als an wirklichen Bittermandelwasser\*), jedenfalls weil er vermischt wurde durch die anderweitigen in der Emulsion noch vorhandenen Beimischungen.

Der Apotheker Stickle von Kaltennordheim (früher in Jena) zeigte die Analyse des *Smegma praeputii* vor, wodurch er auf das dem Käsestoff so ähnliche Verhalten dieses Stoffs

hingewies, gleich dieses, nach der Preufs. Pharm. bereitet, nur die Hälfte des Gehalts einer solchen Auflösung an Blausäure enthält, wie die angestellte Berechnung nachweist.



gestützten Beweis zu liefern suchte, daß die Entstehung Smegmas der milchartigen Drüsenabsonderung zuzuschreiben.

Der Unterzeichnete gab darauf, auf den Wunsch mehr Anwesenden, über die von ihm bis dahin mit einem negativen Resultate unternommenen Versuche, aus dem Guajakholz die Guajaksäure, wie sie von ihm als Bestandtheil desselben betrachtet wird, auszuscheiden, Nachricht, sowie eine Notiz, daß die in den Deckblättern der unreifen Haselnüsse befindliche Säure Aepfelsäure von ihm erkannt worden sei.

Buchholz berührte dann noch mehrere Gegenstände, die den Pharmaceuten von Interesse sind, vielleicht auch in Zukunft zum Theil bei Abfassung einer neuen Pharmakopöe zu berücksichtigen wären. Nach seinen Versuchen sei allerdings auch wie dies schon Otto erörtert habe, das zwischen 0,965 — 0,975 sich bewegende spec. Gew. des *Liquor Ammonii caustici* zu schwankend, als daß man einen solchen Liquor zur Bereitung des *Ammonii acetici* empfehlen dürfe, der daraus gefertigte Liquor besitze oft  $\frac{1}{4}$  trocknen Salzgehalt mehr, wenn er von 0,975, wenn er von 0,965 angewendet werde. — Stickel bemerkt dabei, daß nach früherer Vorschrift dies Präparat (bei der Bereitung aus kohlensaurem Ammoniak, wenn es nach bewirkter Neutralisation nicht noch erhitzt werde) kohlenensäurehaltig und deshalb jedenfalls von anderer Wirkung sei, als das Präparat der Pharmakopöe — was aber wohl nur in der ersten Zeit nach der Fertigung, also wenn es nicht in zu großer Quantität vorrätig gehalten und dann besonders der Fall sein würde, wenn der Liquor in völlig damit gefüllten Flaschen aufbewahrt wird, indem sonst jedenfalls die Kohlensäure so gut, wie in reinem kohlensauren Wasser, oder was noch weniger denkbar sein sollte, aus alkalischen Flüssigkeiten, wie es z. B. beim Selzer Wasser geschieht, abdunsten wird. — Die leichtausführbare Bereitungsmethode, die jedenfalls auch immer ein (ziemlich) gutes Product liefern wird, scheint jene zu sein, die von dem verewigten Buchholz (Theorie und Praxis) angegeben und in die Preuss. Pharmakopöe von 1799 aufgenommen wurde, wonach 1 Unze kohlensaures Ammoniak mit so viel concentrirtem Essig bis zur Neutralität und mit Wasser gemischt wird, daß die Ganze der Flüssigkeit 8 Unzen beträgt. Das spec. Gew. wird dadurch = 1,033, womit das in der Pharmakopöe von 1827 übereinkömmt.

Ferner wurden noch über folgende Arzneimittel Discussionen gepflogen:

1) Ueber den Bleigehalt des käuflichen Orangeblüthwassers, welcher sowohl von Buchholz wie von mehreren Andern beobachtet worden war. Wären sämtliche Apotheker im Stande, sich von Zeit zu Zeit mit frischen Orangeblüthen zu versehen, würde das käuflich bezogene Wasser leicht zu entbehren sein, es ist dies aber freilich nicht jedem möglich: Es wäre deshalb sehr gut und ist nach den Vorlagen unumgänglich nöthig, daß sämtliche Pharmaceuten dies Präparat genau prüfen und es im Falle seiner Verunreinigung dem Verkäufer zurückgeben. Nur wird man die Verfertiger und Versender in Süd-Europa zwingen können, eine andere Wahl der Gefäße, in welchen es verwahrt und versendet wird, zu treffen, und es ist diese Maß-

regel wohl um so nöthiger, als es zwar angeht, das Orangeblüthwasser durch Rectification vom Bleigehalt zu befreien, aber unmöglich, dies unbeschadet seines Geruchs zu bewerkstelligen, indem dieser sich immer mehr oder weniger dabei vermindert. Durch Destillation der gesalzenen Blüthen erhält man nicht immer, wenigstens, wenn diese nicht ganz frisch sind, das beste Wasser, und die an das aus Italien bezogene Orangeblüthwasser gewöhnten Aerzte vermissen gewöhnlich schmerzlich den angenehmen Geruch an demselben. Wird es auf diesem Wege auch ziemlich gut erhalten, so verliert es doch viel früher als das künstliche seinen angenehmen Geruch. Ein durch Mischung mit *Ol. Nodi* bereitetes Wasser, wenn ersteres auch von bester Qualität gewesen wäre, erhält ebenfalls nicht den angenehmen und reinen Geruch des aus frischen Blüthen destillirten Wassers, überdies vertreten solche Gemenge in keinem Falle die besten Präparate, mögen sie durch Hülfe von Weingeist oder Zucker bereitet sein. Schon diese Hülfsmittel nämlich sind gewöhnlich fremde Stoffe in dem Wasser, und außerdem besitzen fast alle Vegetabilien, außer dem Oele, noch andere flüchtige Bestandtheile, die solchen durch Oel gemischten Wässern ganz abgehen.

2) *Über die Verunreinigung des im Handel vorkommenden Citronensafts durch Eisen.* Bucholz erwähnte, daß ihm noch kein Citronensaft vorgekommen sei, der diese Verunreinigung nicht mehr oder weniger gezeigt habe. Auch dem Unterzeichneten ist dasselbe begegnet, und wie Bucholz, so hat auch er es vorgezogen, wenn auch mit größerm Aufwand an Geld und Zeit, den Saft aus Citronen — wie sie im gedrückten Zustande von Händlern zu beziehen sind — selbst zu pressen. Der Vorbehalt einiger Collegen, es sei am zweckmäßigsten, sich der reinen krystallisirten Citronensäure zu bedienen, ist wohl deshalb verwerflich, weil Citronensäure nicht der alleinige Bestandtheil der Citronen ist, sondern der Gehalt an ätherischem Oel, an andern Pflanzenäuren und schleimigen und extractiven Bestandtheilen wird bei seiner medicinischen Anwendung ebenfalls zu berücksichtigen sein.

3) *Über die Bereitung des Heftpflasters.* Dabei möchte es der Bemerkung werth sein, daß Einigen die Consistenz, welche das Pflaster erlangt, wenn es nach der Pharmakopöe bereitet wird, gar nicht genügt hat. Es müsse durchaus förmlich eine Zeit lang gekocht werden, wenn es nicht zu weich ausfallen solle, und die bloße Flüssigerhaltung über dem Feuer, wie die Preuss. Pharm. sie vorschreibe, reiche nicht aus. — Viel mag dabei auf die Beschaffenheit des gekochten Terpentin ankommen, der oft von ganz verschiedener Consistenz in den Handel gebracht wird; theils ist es bloß ein veralteter gewöhnlicher Terpentin, wie er sich in Fässern absetzt, die nach längerer Zeit erst völlig milchert werden. Ein solcher giebt ein viel weiches Pflaster, wenn er nicht zuvor noch längere Zeit mit Wasser gekocht wird. — Nach Bucholz Versicherung wird ein sehr gut klebendes Heftpflaster dadurch erhalten, wenn anstatt *Terebinth. coctae* — Wachs verwendet wird, welches aber wohl nur so lange anwendbar sein möchte, so lange noch das Silberglättepflaster nicht zu spröde durch längere Aufbewahrung geworden ist.

*Terebinth.*  
nur so larval  
glättepflaster  
worden ist. Ja

4) *Ueber Tinct. Rhei aquosa*, über welches Präparat anderwärts schon so viel geschrieben worden ist. Das kenswertheste über diesen Gegenstand möchte sein, da Aussage des Hrn. Collegen Motschmann in Schleusing ihm als das beste Vorbauungsmittel gegen das Verderben leichtveränderlichen Mittels sein Verfahren bewiesen hat, welches darin besteht, die fertige Tinctur im Wasserbade Extractdicke zu verdampfen und von diesem Extract v zu Zeit eine kleine Menge in der entsprechenden Menge Wasser zu lösen. — Der Zusatz von etwas Weingeist zu tigen Tinctur soll ebenfalls ihr Verderben verhindern. dies leicht zu glauben, jedoch wird diese Methode immer werth bleiben, zumal wenn man bedenkt, daß dieses Mittel häufig bei Kindern, oft sogar bei neugeborenen, in Anwendung kömmt.

5) *Ueber Aqua Cerasorum*. Alle Collegen kamen darin ein, daß dieses Wasser (sowohl wie das Lindenblüthwasser) die entbehrlichsten Mittel des ganzen Arzneischatzes zu sein ist, indem es, schon frisch fast alles Geruchs verliert, nach einigen Wochen geruch- und geschmacklos wird, des sobald erfolgenden Schleimigwerdens desselben nicht zu gedenken. — Möchten beide deshalb ganz gestrichen und statt des *Aqua Cerasor.* der Preufs. Pharmacopöe nur *Aqua Cerasor. amygdalata* desselben Dispensatoriums — ein Wasser von kräftigem Bittermandelgeruch und mehrere Jahre unveränderlich in der Haltbarkeit — unter den destillirten Wassern verbleiben!

Hr. Apotheker Simon aus Dermbach zeigte noch von Salepwurzeln, die er sammeln läßt und wovon er jährlich 50 bis 60 Pfund an Materialisten absetzt, vor, sie zeichnete durch besondere Gröfse und Weiße aus, waren schön geschnitten und es werden von ihm mehrere in dortiger Gegend vorkommende Orchisarten gleichgut verwendet \*).

Hr. Apotheker Trommsdorff in Erfurt hatte auf Buchholz auf geschehene Einladung einige Probekästchen der interessantesten Alkaloiden und anderen Pflanzenstoffe, die von ihm zum Verkauf gefertigt werden, gesendet; die meisten von diesen Körpern zeichneten sich durch besondere Reinheit und charakteristische Krystallform aus.

Zuletzt kamen die anwesenden Apotheker noch überein, die Redaction des Archivs, welches jetzt in mehreren Ländern wegen der Mittheilung des Apothekerstandes an die betreffenden Regierungen betrachtet werden kann (indem die Staaten Regierungen dem Apothekerverein Anerkennung geschenkt und das Archiv in den Medicinalcollegien zu halten befohlen haben), zu ersuchen, eine Veröffentlichung des Wunsches sämmtlicher Apotheker in schicklicher Form zu veranstalten, wie gut es

\*) Ich erinnere hierbei an die gleichen Bemühungen des verstorbenen Collegen Beissenhirtz, der schon vor Jahren und länger schöne Salep aus den hierländischen Orchisarten darstellte, sowie auch an die des Hrn. Collegen Dufft in Rudolstadt über diesen Gegenstand.

wenn alle Regierungen dahin wirken wollten, daß das Interesse des Apothekerstandes, wie dies in einigen Ländern begünstigt, durch tüchtige und mit beiden Theilen wohlwollende Pharmaceuten vertreten werde, wohin schon Bley seine Schrift und das Directorium des Vereins schon so sehr zu wirken bestrebt gewesen ist. Es sei jetzt (mehr als je) der Fall, daß man an die Apotheker größere Anforderungen als zu jeder andern Zeit mache, sowohl hinsichtlich der Anforderungen, wie auch in Betreff der Einrichtung und Ordnung der Apotheken und der strengen Einhaltung vieler gesetzlich verordneter Gesetze, während auf der andern Seite die Anforderungen überall zu sehr erniedrigt würden, und die Apotheker durch das, das ganze Apothekerwesen in seinen Grundfesten erschütternde Selbstdispensiren homöopathischer Aerzte, durch den Handel der Kaufleute mit Medicinalwaaren, und durch den, wie in den in polizeilicher Hinsicht bestverwalteten Staaten, noch dauernden Hausirhandel der Balsamträger sich beeinträchtigen und Beeinträchtigungen zu erleiden hätten.

Nach des Unterzeichneten Ansicht möchte noch ein beherachtenswerther Umstand folgender sein:

Durch die Zerstückelung des deutschen Landes in viele, oft an den Grenzen nicht besonders abgerundete Provinzen mit verschiedener Regierungsverfassung ist ein großer Theil der nationalliebenden Apotheker in Thüringen ansässigen Apotheker in sehr betrübende Lage. Vorzüglich die an den Grenzen Wohnenden haben mit den benachbarten Ländern, die im andern Lande an der Grenze wohnen und wo sie Privilegien, oder die Concession nicht mit der sonst in diesen Ländern üblichen Sorgfalt erteilt wurde, zu concurriren. Diese Apotheker leben aber gewöhnlich unter ganz verschiedenen Medicinalverfassungen, sie haben verschiedene Pharmakopöen, und in Folge dessen und der übrigen Verhältnisse verschiedene Taxen. In einem Staate hält es die Landesregierung für nöthig, den Apotheker zu strenger Einhaltung der Taxe anzuhalten, resp. nicht unter der Taxe verkaufen zu lassen, in dem andern, wie z. B. im Großherzogthum Weimar, findet die Behörde keinen Grund, dem Apotheker zu verwehren, unter der Taxe zu verkaufen, wenn er dieselbe nur nicht überschreitet. Auch nun (wir wollen hier einige in der Kürze vorgekommene Fälle im Weimarischen und Meiningischen festhalten) hat das Land die Preuss. Pharmacopöe und Taxe eingeführt haben, so fühlt sich der Weimarische Apotheker aufgelegt (weil er den Nutzen für sich bei dieser Handlungsweise im Voraus zu erwarten sein kann), alle Recepte, da, wo er mit jenem concurrirt, um 15 Proc. und mehr billiger, als der Meiningische zu verkaufen, und es ist natürlich, daß in kurzer Zeit nach Einführung dieser Dinge der letztere für einen Preller angesehen werden und der Weimarische den Zulauf erhalten wird. Es ist deshalb unmöglich, den in solcher Weise beeinträchtigten Apotheker zu genauer Einhaltung dieser gesetzlichen Bestimmungen anhalten zu wollen; damit er mit jenem concurriren kann, und man ihm dasselbe einräumen müssen! Dabei fehlt es nicht, daß andere Meining. Apotheker, die in der Nähe des Weimarischen wohnen, wieder durch diesen beeinträchtigt werden,



und es wirkt somit diese Gesetzesverschiedenheit auf das G zurück — aber es ist natürlich, daß dann manches Präparat solche Fälle von minderer Güte mit untergeschoben werden wird, wenn diese Apotheker bestehen und nicht mit Sch verkaufen wollen. Dies nur als einzigen Fall, dergleichen den sich in unserm Thüringen aber viele, denn es berühren in einer kurzen Landesstrecke die Grenzen von Preussen, sen, Baiern, Sachsen, Weimar, Coburg, Meiningen, Schwarz etc., in denen fast sämmtlich verschiedene Apothekergesetze Taxen gefunden werden. Natürlich müssen hier beständig bungen statt finden, und selbst die Apotheker solcher Sta die auf strenge Einhaltung der gesetzlichen Verfügungen gewiesen sind, erlauben sich dergleichen Kunstgriffe biswe da, wo es ins Ausland geht, weil dann gewöhnlich weniger ihrem Vergehen gemacht wird. — Unter solchen Verhältni wird man in diesem zerstückelten Lande nie ganz vollkom Apotheken erwarten dürfen, und so gern unter andern Ver nissen sich der Apotheker den bestehenden Gesetzen unterw und sämmtliche Präparate genau nach Vorschrift fertigte wenig wird er dies vermögen!

Es würde nun freilich vermessen sein, den Gedanken zusprechen, daß alle diese verschiedenen Länder unter gle Medicinalgesetze gebracht und in dessen Folge denselben gleichlautende Pharmacopöe und Arzneitaxe gegeben wer könnten. Indessen ist der Hauptsache nach nur die Pharma pöe die Basis zur Feststellung der Taxe, alle übrigen Ver nisse bleiben sich gleich oder sind doch von keinem erheblic Einfluß — es beweist dies die durch die Erfahrung bestät Möglichkeit der Anwendung der Preuss. Taxe im ganzen Kö reiche, so verschieden die Lebensverhältnisse in den versch denen Provinzen — an der Ostsee und am Rhein — im Ue gen sein mögen. Durch die schon vor mehreren Jahren von e deutschen Regierung beim Bundestage in Berathung gebrac und damals besonders vom verewigten Geiger beabsichti nach seinem leider zu früh erfolgten Tode von Mohr fort setzte und nun bald ihrem gedeihlichen Ende nahe *Pharmacop universalis* wird aber die Möglichkeit gegeben sein, die in oben beschriebenen Weise bedrückten Thüringischen Apothe und das ganze Apothekenwesen in diesem Lande überhaupt l ser zu stellen — wenn nämlich auf diese Pharmacopöe eine *T universalis* gegründet würde und die verschiedenen Regierungen vereinigen könnten, sie als Landespharmacopöe und Taxe den A thekern als Richtschnur zu geben!

Durch eine solche Maafsregel — wenn sie nämlich über g Deutschland ausgedehnt werden könnte — würde aber ni bloß den Apothekern Thüringens in obiger Beziehung, sonde wohl dem ganzen Apothekerstande in sofern schon Erleich rung verschafft werden, als sie dann, wie die Gewohnheit in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Pharmacopöen e direnden Aerzte es verlangt und fast überall gefunden wi nicht mehr genöthigt sein würden, ein und dasselbe, in Hauptsache gleiche, Mittel nach 3 bis 4 verschiedenen Phar kopöen vorrathig zu halten, sie würde also auch einen Ausw für einen andern Uebelstand darbieten — des Nutzens, der



Ein ähnlichen Stand als unmittelbare Folge sich ergibt, wenn in ganz Deutschland die Arzneimittel nach gleicher Weise und von gleichförmiger Wirksamkeit bereitet würden, ist hier an keiner weiteren Auseinandersetzung zu gedenken!

Beim Schluß der Versammlung wurde auch für die dritte Kreisversammlung wiederum Meiningen gewählt.

Ein frohes Mahl verschönerte dieses Vereinsfest, bei welchem auch eines nothleidenden Collegen gedacht und diese warmen Empfindungen durch Gaben der Liebe bethätigt wurden. Unter den verschiedenen Toasts fand vorzüglich der den freudigsten Anklang, der dem Stifter unsers großen Vereins dargebracht wurde. Nach Tisch fanden sich die Herren zu mannichfachen Besprechungen in dem Garten des Hrn. Collegen Treier ein und von hier aus trat ein Theil den Rückweg zur Heimath an, oder verweilte noch länger in den reichen Herzogl. Gärten, welche mit großer Bereitwilligkeit zur Beschauung aufgestellt worden waren. Nachdem auch die nächsten höchst freundlichen und romantischen Umgebungen der Residenzstadt besucht worden waren, versammelten sich zur Berathung noch interessanter Gegenstände die noch anwesenden Mitglieder im Schießhause, wo man sich später höchst ungern trennte und die Ueberzeugung eintrat, daß der Genuß solcher Stunden, in Kreise lieber Collegen verlebt, von bleibendem Nutzen sei.

Meiningen, den 12. Sept. 1839.

Fr. Jahn,  
als Secretair der obigen Versammlung.

## 2) Medicinalwesen und Medicinalpolizei.

Ämtliche Verfügung, den Betrag der extrapostmässigen Vergütung an die zu Apotheken-Visitationen zugezogenen Apotheker betreffend.

Bei dem Erlasse der Circularverfügung vom 10. Febr. 1836, welcher die Absicht zu Grunde liegt, den zu Apotheken-Visitationen zugezogenen Apothekern in den Fällen, in welchen dieselben nicht gemeinschaftlich mit dem Kreisphysikus reisen können, die Befugniss zuzugestehen, sich der Extrapost, gleich diesem, bedienen zu dürfen, ist es nicht ausgesprochen worden, daß die Physiker, statt der ihnen durch die Bestimmung sub 12 der Medicinal-Personen-Taxe bewilligten freien Fuhr und 10 Sgr. Wagenmiete täglich, in Folge der Verordnung vom 28. Juni 1825, betreffend die Vergütung der Diäten und Reisekosten, §. 11. a. und b., gegenwärtig täglich 20 Sgr. Wagenmiete und 10 Sgr. Stations- und Trinkgelder für jede Meile erhalten.

Das Ministerium declarirt daher die Circularverfügung vom 10. Febr. 1836 hierdurch dahin, daß die Apotheker, wenn dieselben bei Apotheken-Visitationen nicht gemeinschaftlich mit dem Kreisphysikus reisen können, sich der Extrapost unter ganz

gleichen Bedingungen, wie jene Beamten, bedienen, und danach vom 1. Januar *ful. ann.* an:

- a) die Extrapostgebühren für 2 Pferde,
- b) 10 Sgr. Stations- und Trinkgelder pro Meile,
- c) 20 Sgr. Wagenmiethen täglich,
- d) die baaren kleineren Auslagen für Brücken-, Chaussee-Fahrgeld u. s. w.

auf die Bescheinigung der Königl. Regierung über die Nothwendigkeit und Ausführung des Auftrags liquidiren dürfen, und jene Sätze auch in dem Falle gewährt werden sollen, wenn wirkliche Gebrauch der Extrapost oder der Miethsfahrt von Liquidanten nicht nachgewiesen werden kann.

Hinsichtlich der Liquidation für die bis jetzt in Rede stehenden Angelegenheiten unternommenen und resp. bis zum letzten December d. J. noch auszuführenden Reisen muß es bei den Bestimmungen der Circularverfügung vom 10. Febr. 1836 stehen bleiben.

Berlin, den 12. Oct. 1839.

Ministerium der Geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.

Circulare  
an sämmtl. Königl. Regierungen.

## Die Taxation der Recepte betreffend.

Auf den Bericht vom 6. Aug. d. J., die über die Taxation einiger in der Apotheke zu ..... vorgefundener Recepte obwaltenden Meinungsverschiedenheit betreffend, wird der Königl. Regierung hierdurch eröffnet, daß zufolge der Anmerkung pag. 1 der Arzneitaxe für 1838, der Apotheker berechtigt ist, für die Auflösung eines Extracts, desgl. für die warme Auflösung eines Salzes, die für diese Arbeiten in der Taxe ausgeworfenen Preise, und zwar für eine jede derselben besonders, in Anrechnung zu bringen. Bei einer kalten Auflösung von Salzen ist dagegen dem Apotheker, wenn bereits ein in der Arzneitaxe ausgeworfener Arbeitspreis, z. B. für Solution eines Extrats, in Anrechnung gebracht ist, nicht berechtigt, den für die Mischung zweier oder mehrerer flüssiger Arzneimitteln festgesetzten Preis von 6 pf. noch besonders anzurechnen.

Demgemäß ist also das mit No. III. bezeichnete, unter dem von der Königl. Regierung abschriftlich vorgelegten Recepte ganz richtig, dagegen sind die Recepte Nro. I. und II. um die für die Auflösung des Salzes angesetzten 8 pf. zu hoch taxirt.

Hiernach hat die Königl. Regierung die fraglichen Recepte festzusetzen und auf gleiche Weise für die Zukunft in ähnlichen Fällen zu verfahren.

Berlin, den 5. Oct. 1839.

Ministerium der Geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.

(gez.) Ladenberg.

An die Königl. Regierung zu Minden.

## C o p.

## I.

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| R <sub>y</sub> Plumb. acetici gr. j $\beta$  | — 3             |
| Morph. acetic. gr. j $\beta$                 | 4 — 8 p. solut. |
| Succ. liquir. dep. $\mathfrak{z}$ ij         | 1 — 8 p. solut. |
| Aq. cerasor. nigr. $\mathfrak{z}$ ij $\beta$ | — 10            |
| Syr. alth.                                   | — 8             |
| — mannati aa $\mathfrak{z}$ ij $\beta$       | 1 — 3           |
| MD. ad vitr.                                 | 1 — 3 p. vitr.  |

10 Sgr. 7 pf.

## II.

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| R <sub>y</sub> Ammon. muriat. dep. $\mathfrak{z}$ ij | — 9             |
| Tart. stibiat. gr. j                                 | — 3             |
| Aq. sambuci $\mathfrak{z}$ vj                        | 2 — 8 (p. sol.) |
| Succ. liq. dep. $\mathfrak{z}$ ij                    | 1 — 8 (p. sol.) |
| MD. ad vitr.                                         | 2 (p. vitr.)    |

7 Sgr. 4 pf.

## III.

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| R <sub>y</sub> Magnes. sulphuric. $\mathfrak{z}$ j | 1 — 4           |
| Aq. destill. $\mathfrak{z}$ jv                     | — 8             |
|                                                    | — 8 (p. solut.) |
| Extr. Rhei cps. $\mathfrak{z}$ j                   | 4 — 2           |
|                                                    | — 8 (p. sol.)   |
| Elaeosacch. foeniculi $\mathfrak{z}$ j             | — 6             |
| MD. ad vitr.                                       | 2 (p. vitr.)    |

10 Sgr.

## Pensions- und Unterstützungsanstalt für Wittwen und Waisen von Medicinalpersonen in Weimar.

Im Großherzogthum Weimar ist eine Pensions- und Unterstützungsanstalt für Wittwen und Waisen von Medicinalpersonen gegründet worden. Aufser mehren bedeutenden Schenkungen ist sie noch neuerlich von dem Großherzoge und der Frau Großherzogin durch eine Stiftung von 1300 Rthlr. bedacht worden.

## Ueber tief eingerissene die ausübende Pharmacie beeinträchtigende Mißbräuche.

Von allen Seiten mehren sich die Klagen über den Debit von Arzneimitteln durch unbefugte Personen. Die daraus für das Publikum entstehenden Nachtheile liegen auf der Hand; es ist nöthig, sie zu specificiren, ihre Quelle ist niedrige Gewinnsucht. Staat, Arzt und Publikum haben ihre Ansprüche an den Apotheker und an die Apotheken fort und fort gesteigert, und das ist recht: aber dann solle man auch, daß er im Stande sei, solchen Ansprüchen genügen zu können, und da ist doch das mindeste, was der Apotheker verlangen kann: *ausschließlicher Besitz im Debit der Arzneimittel*. Dieses ist die einzige Quelle, auf welche er angewiesen ist, sowohl in Betreff der Beschaffung seiner Apo-

den An-  
mindestens  
r Besitz in  
auf welche  
seiner Apoq.

theke als seiner Subsistenz. Es ist das mindeste, was der Apotheker von dem Staate erwarten kann, dem er seine garufsthätigkeit weihen soll, daß solche Einrichtungen getroffen werden, daß diese Quelle ihm ungekümmert erhalten bleibt. So ist es aber nicht, wenigstens, wenn auch Gesetze vorhanden sind, so fehlt deren heilsame Ueberwachung. Die Uebertreter der heilsamsten Gesetze des Staats für das Gesundheitswohl der Unterthanen gehen hier vor sich, und damit die kränkelnden und verletzendsten Eingriffe in ein Fach, das vollständig in dem ihm zugewiesenen Kreise nicht nur für sich, sondern auch zum Heil des Publikums erwarten muß.

Der Handel mit Arzneiwaaren wird unbefugter Weise betrieben von Kaufleuten und Krämern, und von Droguisten, nur der Handel *en gros* zustehen sollte. Man wird auf den bureaux ohne Zweifel hinreichende Nachweisungen finden, daß große Mengen von Arzneiwaaren in die Läden der Krämer und Kaufleute gehen. In Frankreich ist dieses Unwesen eben zu einer bedeutenden Höhe gestiegen. Zahlreiche Belegblätter liefern die französischen Journale. Hr. Planche erzählt nämlich wieder folgenden Fall im *Journal de Pharmacie* (XXV). Bei einem Droguisten im *Quartier des Lombards* in Paris wurde eine Mixtur angefertigt, bestehend aus 4 Unzen *Decoct. Cort.*, 1½ Unzen *Syrup. Cort. Granat.* und 1 Drachm. *Ferr. subnic.* Der Patient bezog nach einiger Zeit eine Wohnung in einem andern Stadttheile und ließ die Arznei jetzt in der Apotheke seiner Nachbarschaft verfertigen. Da diese weder die schwarze Farbe, noch den dintenartigen Geschmack besaß, wie die vorige, so beklagte sich der Patient darüber seinem Arzte. Dieser, ohne den Grund dieses Unterschiedes zu untersuchen, sprach sich sogleich dahin aus, daß der Apotheker die Arznei unecht angefertigt habe, und daß der Patient sie daher wieder bei dem ersten, dem Droguisten, verfassen lassen solle. Dem Apotheker aber wurden lebhaftere Vorwürfe gemacht. Dieser mit Recht betroffen über ein solches Verfahren, verlangte eine Untersuchung. Man ließ von dem Droguisten *Ferrum subcarbonicum* holen, und die Analyse ergab, daß dieses nichts war als schlecht ausgewaschener Colcathar, in der Unze noch 13 Gran schwefelsaures Eisen enthielt. So werden denn die Mittel beschaffen, die diese Leute debilitiren, schaden und verfälscht auf die schändlichste Weise, womit Unheil aller Art angerichtet und das Publikum betrogen wird. Aber das Verfahren des Arztes in dem vorliegenden Falle verdient den lebhaftesten Tadel. Durch sein unbegründetes und nachsichtig ausgesprochenes Urtheil bedrohte er den Ruf der Apotheke. Mit Recht muß der Arzt fordern, daß die Apotheken untadelhafte Arzneien liefern, auf der andern Seite aber auch dahin streben, daß die Apotheke im Stande werde, das zu leisten, wozu sie bestimmt ist, was aber der Arzt nicht sein kann, wenn ihr die Mittel dazu entzogen werden. Weit entfernt, einer Arzneiverschwendung das Wort zu reden, kann der Arzt hier unzweifelhaft Viel wirken. Leider aber klagen sich viele Apotheker, daß es Aerzte giebt, die den Patienten, statt kräftiger Arzneien, nur zu oft Hausmittel ordnen, und selbst dieses oder jenes Arzneimittel empfe-

von dem Krämer holen zu lassen, der solches gesetzwidrig debet. Abgesehen davon, daß dieses Verfahren ein Heerd für die Quacksalberei wird, möge man auch erwägen, wie ungerecht, wie kränkend solches Verfahren für den Apotheker ist, der kein Hehl scheut, um die Arzneimittel in der vorgeschriebenen Güte zu liefern, und dem Arzte in jeder Beziehung zu genügen; oder glaubt man, daß man dem Apotheker gegenüber keine Pflichten habe. Kann solches Verfahren von Heilkünstlern angewendet werden, die eine gründliche Kenntniß von der Natur der Heilmittel und ihrer heilsamen Anwendung besitzen, ist ein solches Verfahren würdig der rationellen Medicin? Nein!

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, eine Bemerkung einzuführen, die auf vielfachen Erfahrungen beruht; nämlich wie häufig jetzt junge Aerzte eine mangelhafte Kenntniß der Arzneimittel besitzen. Ausgezeichnete Universitätslehrer haben schon auf diesen Uebelstand aufmerksam gemacht. Ein strengeres Examen der Candidaten der Medicin in der *Materia medica* und dieses, wie es in vielen Staaten, wo man heilsame Reformen des Medicinalwesens vorgenommen hat, geschieht, durch Beiziehung von Apothekern auch in die ärztliche Examinationscommission, wird gewiß beitragen, diesem Uebel abzuheffen, und die Studirenden der Medicin veranlassen, auf den Universitäten ernstlich mit dem Studium der Naturwissenschaften und der *Materia medica* sich zu beschäftigen. Dann wird die Wichtigkeit gediegener Arzneimittel mehr und mehr eingesehen werden, und dieser Vorzug der älteren Aerzte auch den jüngeren Aerzten wieder zu Theil werden, und manche auffallende und bei einer wahrhaften wissenschaftlichen Bildung unmögliche Erscheinungen werden in der Medicin nicht mehr vorkommen können. Wenn dann das System einer geläuterten Medicin auch einen einschränken und beschränkteren Arzneischatz bedingt, so wird man doch den Werth der Arzneimittel richtig würdigen, und Mißbräuche, wie die hier gerügten, werden ihr Ende erreicht haben.

Der Verkauf der Arzneimittel in den Apotheken wird aber noch durch andere Umstände, wovon wir weiter einige anführen wollen, verringert, nämlich durch das ganz ungeeignete und unvorsichtige Dispensiren der Thierärzte. Es ist durchaus unrichtig, wenn man glaubt, die Arznei werde auf diese Weise wohlfeiler beschafft. Der Apotheker liefert die Arznei ordnungsmäßig, wie es der Thierarzt nicht kann und nicht versteht, und eben so wohlfeil. Glaubt man das nicht, so kann man ja zum Vortheil des Publikums für die Arzneien der Veterinärpraxis eine besondere Taxe stellen. Dem in jeder Beziehung tadelnswerthen Selbstdispensiren der Thierärzte gesellen sich Quacksalber, Charlatans und Homöopathen zu, die auf der Bebauung des Unverstandes der Menschen ihre reichen Ernten halten. In Bezug auf die Homöopathie bleibt allerdings die Hoffnung, daß die rationelle Medicin durch den Sieg der Vernunft diese Farce der Zeit bald gänzlich wird verschucht haben. Für die anderen Uebelstände wollen wir die Hoffnung nicht aufgeben, daß die Weisheit der erleuchteten Behörden sie auch beseitigen werde, so wie das Unwesen, welches mit dem Ausposaunen von Geheimmitteln betrieben wird, wo die Schlaueit auf die Leichtgläu-

anderen  
daß die  
gen werde,  
on Geheim-  
Leichtgläu-



bigkeit des Publikums die raffinirtesten Speculationen treiben, die Medicin, wie die Pharmacie auf die jämmerlichste Weise gestellt werden. Man lese die Ankündigungen der Neu-  
liner Dintenfabrik und Consorten!

Alle diese das Einkommen der Apotheker bedrohenden schmälern den Eingriffe schaden dazu nicht allein diesen, sondern sind der Grund zahlloser Nachtheile für das Publikum zu verhüten doch wohl im Interesse des Staats liegt. Den Uebelständen gesellt sich für den Apotheker noch die Erfahrung, daß die Arzneitaxe nicht das leistet, was sie muß. Mag sie bei einzelnen günstig situirten Geschäften reichen; im Allgemeinen thut sie es nicht. Will man sich geneigt zeigen, die Preise der Arzneimitteln zu erhöhen, so gebe man um so mehr in der *Taxa laborum* die geeigneten Mittel für die gesicherte Subsistenz und ordnungsmäßige Erhaltung der Apotheken, sowie eine angemessene andere Ordnung des Rabattiren von 25 Proc. und mehr bei Rechnungen für öffentliche Kassen. Höchstens mag man 5 — 10 Proc. setzen, und nur allein aus dem Grunde, weil der Apotheker für mancher Rechnungen sonst nichts haben würde, indem arme entweder der Wohlthat der Arzneimitteln entbehren würden, oder der Apotheker ihnen die Arznei schenken müßte. Einen andern Grund, daß der Apotheker eine so hohe Armensteuer zahlen soll, wie der Rabatt von 25 Proc. mit sich führt, will ich nicht ein.

Der Apotheker ist weit entfernt, unbillige Ansprüche zu machen, und bescheidet sich gern, daß manche Uebelstände unter welchen er leidet, kaum zu heben sind; mit um so mehr Vertrauen hofft er aber, daß ihm das werde, was der Ausübung seines Fachs, bei der Uebernahme seiner Verpflichtungen erwartete. Nicht entgehen kann es, daß eine Reihe vieler Verhältnisse durchaus an der Zeit ist. Zur Bearbeitung einer solchen fehlt es an neuen Hülfsmitteln nicht. Man wie Geiseler, Bley, Probst, Hänle, Buchner, Asch, Trautwein, Martius u. a. haben darüber wichtige Beiträge geliefert, und neuerdings wieder Herberger und Hoffmann in ihrer Schrift: »Entwurf einer zeitgemäßen Apothekeneinrichtung. Erlangen. Verlag von F. Enke. 1839.« Mögen die Bemerkungen dieser und anderer würdiger kompetenter Männer bei der demnächstigen Reorganisation der bestehenden Apotheken die verdiente Aufmerksamkeit finden. Br.

## Notiz über gesetzwidriges Dispensiren von Arzneimitteln;

vom

Apotheker *Liebermann* in Grünenplan.

Nicht weit von meinem Wohnorte befinden sich mehrere Individuen, welche sich mit medicinischer Puscherei beschäftigen, vielen Zulauf haben und Medicamente verordnen und dispensiren, ohne daß von Seiten der Behörden bisher wirksame Maßnahmen ergriffen worden wären, solchem Unfuge zu steuern.

Ein anderer medicinischer Pfuscher in meiner Nähe, übri-  
 gens im Hannoverschen, ist ein gewisser A. in W., dessen Vater  
 schon und schon einer der berühmtesten Quacksalber war.  
 Er selbst hat zwar Medicin studirt, ist aber im Examen durch-  
 gefallen, und treibt nun die medicinische Pfuscheri in einem  
 solchen Grade, daß es in der That allen Glauben übersteigt.  
 Sagt man in dieser Gegend Jemand, der einen Kranken durch  
 den Tod verloren hat, welchen Arzt er gebraucht habe, so er-  
 hält man in der Regel die Antwort: den Doctor A. in W.;  
 allein auch durch so handgreiflich schlimme Erfolge läßt sich  
 das bethörte Publikum nicht abhalten, den Quacksalbern zuzu-  
 laufen. Ich brauche gewiß nicht besonders nachzuweisen, daß  
 durch solchen Unfug nicht allein die Existenz der Aerzte und  
 Apotheker, besonders auf dem Lande, im äußersten Grade ge-  
 fährdet wird, sondern daß auch das Leben und die Gesundheit  
 des unaufgeklärten Theils unserer Mitmenschen dem gewissen-  
 losen Treiben unwissender Practikanten in die Hände gegeben  
 wird.

Ein zweiter mit dem vorigen verwandter Punct, den ich  
 der Aufmerksamkeit empfehlen möchte, betrifft das Dispensi-  
 re von Arzneimitteln, was den Thierärzten auf dem Lande un-  
 ter gewissen Beschränkungen nachgelassen worden ist. Auch  
 diese Einrichtung hat ihre großen Nachtheile, theils ist davon  
 leicht der Mißbrauch in sofern zu trennen, als die Thier-  
 ärzte sich dann auch leicht beugehen lassen, medicinische Pfu-  
 scherei zu treiben, theils wird die gewöhnliche Vorschrift, der  
 Thierärzte ihre Arzneimittel von der nächsten Apotheke neh-  
 men sollen, in der Regel nicht befolgt, indem sie vielmehr aus  
 den Drogueriehandlungen sich mit wohlfeilen und schlechten  
 Waaren versehen. Endlich aber fällt auch dabei jede Controle  
 gegen den Thierarzt weg, welche nur dann möglich ist, wenn  
 die von ihm verordneten Mittel auf der Apotheke bereitet wer-  
 den müssen, und dadurch zu einer genauen Prüfung seines Ver-  
 haltens bei eingetretene miflichen Erfolge der Weg offen  
 gehalten wird.

Es ist dieser Gegenstand schon bei unserer frühern Zusam-  
 menkunft in Braunschweig, auf Anregung des Hrn. Collegen  
 Schultz aus Calvörde, besprochen worden, und damals — für  
 das Gebiet des Herzogthums Braunschweig — wenn ich nicht  
 irre, ein Gesuch an das Staatsministerium von den anwesend  
 gewesenen entworfen und eingereicht worden, welches aber,  
 so viel ich weiß, bis jetzt noch nicht berücksichtigt worden ist.

Zunächst steht aber auch damit in naher Verbindung der  
 Handel mit medicinischen Gegenständen von den Stadt- und  
 Landapothekern. Auch hier tritt die nämliche Gefahr für das  
 Publikum und der nämliche Nachtheil für den Apotheker  
 hervor. Es ist wohl nicht Einer unter uns, der nicht  
 begreift, was ich hier vorgetragen habe — aus eigener Er-  
 fahrung bestätigen könnte. Habe ich auch dabei das Inter-  
 esse der bestellenden Apotheken — besonders auf dem Lande  
 — wesentlich mit berücksichtigt, so ist dieses auch an und  
 für sich sehr wichtig, vor allem aber am wichtigsten für das  
 Publikum. Je entschiedener in neuerer Zeit die Rich-  
 tung der medicinischen Praxis auf Vereinfachung der Medica-

mente geht, desto schwieriger wird die Lage der Apotheker, die bei den bedeutenden und immer gesteigerten Ansprüchen, welche man an sie macht, nur durch die sorgfältigste Bearbeitung aller ihnen naturgemäß allein zukommenden Erwerbsthätigkeit für die Folge erhalten werden können.

Möchte daher auf allen Seiten mit vereinten Kräften nach gleichem Plane gehandelt werden, damit diese großen Uebelstände endlich aufhörten.

## Beitrag zur Aufdeckung der Geheimmittel;

von

Dr. Bley in Bernburg.

Dem Castellan des hiesigen Herzogl. Schlosses war einem Reisenden zur Vertilgung der Motten eine Flüssigkeit und ein Kraut nebst einer bezüglichlichen Gebrauchsanweisung getheilt worden. Der Empfänger, welcher mit Recht die Anwendung der unbekannten Mischung bedenklich fand, überbrachte mir einen Theil derselben mit der Bitte um chemische Prüfung.

Die Flüssigkeit war hell und klar, ohne Geruch, besaß spec. Gew. von 1,050, zeigte gegen Reagenspapiere alkalische Reaction, gab mit salpetersaurem Silber einen starken Niederschlag von blafs-citronengelber Farbe. Hydrothionwasser kaum einen merklichen Schein gelblicher Färbung, als je einige Tropfen Salzsäure zugefügt wurden, entstand starker Niederschlag. Schwefelsaures Kupfer gab sehr starken luminösen Niederschlag von zeisiggrüner Farbe. Kalkwasser nur bei grossem Ueberschuss weifliche Trübung und wolkenförmigen Niederschlag bewirkend. Barytsalze, weifsen Niederschlag. Platinsolution gab gelben Niederschlag. Weinsteinsäure, keinen Niederschlag. 1000 Gran der Flüssigkeit hinterliessen nach dem Abdunsten 70 Gran trocknen aber hygroskopischen Rückstand, welches nicht krystallisirt darzustellen war, auf glühende Kohlen geworfen, einen Knoblauchgeruch verbreitete. Hiermit ist ohne Zweifel jene Flüssigkeit eine Lösung des arsenichten Kalis, das oben erwähnte Kraut war *Herb. Ledi palustris*.

Während es den Apothekern mit Recht bei strenger Staatspolizei untersagt ist, Arsenikalien und andere directe Gifte ohne ärztliche Vorschrift und obrigkeitliche Erlaubnis abzugeben, scheuen sich Kaufleute und Arcanisten nicht, solche Stoffe in die Hände des Publikums zu bringen, ein Unwesen, was leider mehr und mehr um sich greift, und gegen welches Seitens der Medicinalpolizei kräftiger vorgeschritten werden sollte. Belege hierfür liefern alle Zeitungen, so die unter den Augen der Preussischen Obermedicinalbehörde erscheinenden Berliner Zeitungen, in welchen z. B. jetzt häufig eine Pomade des Dr. Dupuytren angeboten wird, welche nach der Mittheilung der *Annalen der Pharmacie*, Aprilheft 1839, Extr. *Cantharidum* und *Hydrargyrum* enthält. Wenn nun, wie es leider den Anschein hat, alles Hinweisen der Medicinalbehörden auf diesen Uebelstand von Seiten der Apotheker und Aerzte nichts fruchtet, so giebt

als anderes Mittel, als solche Arcana der chemischen Prüfung zu unterwerfen und deren Ergebnisse öffentlich bekannt zu machen, wohl auch Warnungen durch Polizeibehörden und Ärzte zu veranlassen. Alle mit gehöriger Sachkenntniß ausgerüstete Pharmaceuten sollten demnach die in ihrem Kreise ausgebotenen Geheimmittel prüfen und die Resultate veröffentlichen. Sie würden dadurch im Geiste edler Wohlfahrtspflege, welche ihnen doch mit obliegt, handeln, einmal dadurch, daß sie auf die Schädlichkeit solcher Geheimmittel hinweisen, und sodann ihre Mitbürger möglichst vor Prellereien bewahren, welche fast jederzeit mit solchen Geheimmittelspeculationen verbunden sind.

### Beitrag zum Medicinalunwesen in England.

Am 7. October 1839 waren in London die Mitglieder des *britischen ärztlichen Vereins* unter Vorsitz des Dr. Webster versammelt. Die Vorschläge, welche sie an die Regierung machten, bezwecken eine *Reform* des so sehr im Argen liegenden englischen Medicinalwesens. Insbesondere wurde auf strenge Scheidung der ärztlichen Praxis und des Apothekergewerbes gedrungen. Als Beispiel, wie gegenwärtig der ärztliche Beruf und der Apothekergeschäft neben dem häufig damit verbundenen Specereikram in einander spielen, wurde angeführt, daß ein bestimmter Arzt zu Manchester, laut seinem Schilde »zugleich dispensirender Apotheker, Verkäufer von Rofs- und Vieharzneien und Cigarren, ärztlicher Rathgeber, Zähneauszieher, Chemiker und Droguist« sei, und »mit wohlfeilen ächten Drogenen, Patentheilmitteln, Parfümerien, starkem Weinessig, Londoner Pöckelfleisch, Fischsauce u. s. w., Sodawasser, Limonade, Birnenfett, Congrevéschen Zündhölzern, Wachs- und gezogenen Lichtern« handele. (*Allgemeine Zeitung* Nr. 296. 1839.)

### Die Morisonschen Pillen.

Ohnerachtet der vielen traurigen Erfahrungen, welche Quackalberei und Unverstand täglich anrichten, werden die Morisonschen Pillen, die gewiß in die Kategorie gefährlicher Mittel gehören, besonders in den Händen der Quacksalber, da sie Gummigutt, Aloe, Scammonium u. s. w. enthalten, doch noch debitiert. In Massen werden diese Pillen in England fabricirt und nach Deutschland, Frankreich u. s. w. spedirt. Hin und wieder scheinen auch schon Krämer in Besitz der Vorschriften zu dieser Panacee zu sein, und bei den jetzigen Verhältnissen werden sie die Bestandtheile sehr leicht dazu sich verschaffen können. In Paris hat man die Morisonschen Pillen neuerdings auch untersucht (*Journ. de Chim. med.* 2. Ser. No. 20.) und darin gefunden: In den Pillen No. 1.: eine kleine Menge Gummigutti, eine in Aether lösliche, weiße, außerordentlich scharfe Substanz, wahrscheinlich Euphorbium, eine große Menge Aloe, ein indifferentes Pulver und Weinstein; in den Pillen No. 2.: eine große Menge Gummigutti ( $\frac{1}{10}$  der Masse), Aloe, Weinstein, Scammonium und ein indifferentes Pulver. Das Gummigutti läßt sich indifferent. eine große Menge Aloe, Weinstein, Scammonium und ein indifferentes Pulver. Das Gummigutti läßt sich indifferent.

oft in kleinen Stückchen daraus abscheiden, eine Substanz, drastisch und abweichend wirkt, Coliken, Entzündungen andere heftige Symptome hervorbringen kann. Möge endlich dem Unwesen, das mit Arzneihandel und mit Geheimteln getrieben wird, gesteuert werden, und die Obrigkeiten endlich einschreiten, dieser vielköpfigen Hyder, der so manchen Leben zum Opfer fällt, das Garaus zu machen! Br.

### 3) Personalnotizen.

Hr. Geh. Medicinalrath Dr. v. Könen in Berlin, Geh. Bergrath und Professor v. Dechen zu Berlin und Medicinalrath Dr. Fischer in Erfurt haben den rothen Adlerorden 3r Klasse mit der Schleife erhalten.

Hr. Professor Dr. Gustav Bischof in Bonn, Hr. Medicinalrath und Stadtphysikus Dr. Kruttge in Breslau, Hr. Roer, Director der Provinzial-Irrenanstalt in Marsberg, Medicinalrath Steffen in Stettin, Hr. Medicinalrath Tob in Trier haben den rothen Adlerorden 4r Klasse erhalten.

Hr. Professor Dr. Ehrenberg in Berlin, Hr. Professor Müller in Berlin, Hr. Professor Dr. Weber in Göttingen, Prof. de Blainville in Paris sind von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Copenhagen zu Mitgliedern erwählt worden.

Hr. Prof. Dr. Glocker in Breslau hat den Orden der Württembergischen Krone erhalten.

Am 22. Jan. d. J. starb in Göttingen der berühmte Ob-Medicinalrath Professor Blumenbach in seinem 88. Jahre.

Hr. Hofmedicus Dr. Brück in Osnabrück, Brunnenarzt Driburg, hat den rothen Adlerorden 4r Klasse erhalten.

Hr. Geh. Medicinalrath Dr. Ritgen in Gießen ist von Großherzog von Hessen in den Adelstand erhoben worden.

Hr. Kreisphysikus Dr. Schüler zu Lüben ist zum Hofrath ernannt worden.

Hr. Custos Dr. Endlicher ist zum Professor der Botanik an der Universität in Wien ernannt worden.

Der practische Arzt, Hr. Dr. Rudolphi in Berlin, ist zum Medicinalrathe und Mitgliede des Medicinalcollegiums für die Provinz Brandenburg ernannt worden.

Hr. Hofrath Professor Dr. Wackenroder und Hofrath Brandes sind von dem Apothekerverein in Hamburg zu correspondirenden Mitgliedern erwählt worden.



## Zweite Abtheilung.

---

### Chemie.

---

#### Analysen des Blutes;

von

Dr. J. Franz Simon.

---

(Fortsetzung von Bd. XVIII. 2. R. S. 54.)

---

Die Analyse des Blutes habe ich in so fern etwas abgeändert, als ich zum Auffangen des Blutes nicht mehr ein Becherglas und zur Abscheidung des Faserstoffs einen Quirl anwende, sondern, nach Vorschlägen Anderer, ein zu verschliessendes Gefäß nehme, und durch Schütteln mit Metallstücken die Gerinnung des Faserstoffs bewirke. Ein weisses Glas mit zollweiter, mit einem eingeriebenen Stöpsel zu verschliessender Oeffnung, in welchem Glase sich einige etwa  $\frac{1}{2}$  Zoll im Durchmesser grosse, an den Kanten eingeschnittene platte Zinnstücke befinden, wird mit dem frischfliessenden Blute gefüllt, der Stöpsel so angesetzt, als es bei dem Bestimmen des spec. Gew. von Flüssigkeiten geschieht, abgewischt und darauf das Glas anhaltend aber nicht zu heftig, etwa 8 — 10 Minuten geschüttelt. . Darauf wiegt man das Glas, und wenn man dessen Tara incl. der Zinnstücke kennt, so ist das absolute Gew. des Blutes und endlich auch sein spec. Gew. bekannt, wenn man das absolute Gew. mit dem absoluten Gew. der Menge destillirten Wassers vergleicht, welche dieselbe Flasche unter denselben Umständen füllt.

In meinem früheren Aufsatze (a. a. O.) habe ich 7 Analysen über gesundes und krankes Blut mitgetheilt,

und ich fahre mit diesen Untersuchungen fort, will ich noch bemerken, daß diese Analysen keine Ansprüche machen sollen auf gänzliche Vollständigkeit. Wie ich früher bei meinen Untersuchungen über Frauenmilch einen gewissen practischen Zweck durch dieselben erreichen wollte, so ist es auch hier der Fall. Bei den Milchanalysen muß es besonders von Wichtigkeit sein, die relativen Verhältnisse von Kasein, Zucker und Butter, welche die Milch enthält, unter verschiedenen Umständen kennen zu lernen. Die Menge der feuerbeständigen Salze darf nicht außer Beobachtung bleiben, weil sie zur Construction der Knochen des Säuglings das Material geben. Die relativen Mengen der einzelnen Salze standen, wie ich zeigte, in Relation zu den relativen Mengen von Kasein und Zucker. Ganz ähnliche Gesichtspunkte fasse ich bei den Analysen des Blutes ins Auge. Für die Erklärung des Stoffwandels und des Ernährungsprocesses sind die relativen Mengen von Kasein und Albumin, so wie von Faserstoff und Fett im Blute von Wichtigkeit. Diese Stoffe wurden mithin bei der Analyse vorzüglich berücksichtigt. Wenn ich von diesen Salzen sprechen werde, hoffe ich zeigen zu können, daß deren einzelne Bestandtheile, ebenso wie bei der Milch in Verhältniß zu den relativen Mengen der eiweißartigen Bestandtheile, (hierunter Albumin, Faserstoff und Kasein begriffen) stehen. Die einzelnen Salze in jeder Analyse genau analytisch zu kennen, ebenso die Fettarten zu behandeln, hiesse mehr abwärts gelegene Interessen auf Kosten der näher gelegenen und wichtigeren vorziehen, abgesehen davon, daß in diesem Falle viel größere Mengen Blut in Arbeit genommen werden müßten, und die Untersuchungen eine große Menge Zeit wegnehmen würden.

8) Analyse des Blutes eines 3½-jährigen Mädchens das am Bronchitis leidet.

Das Blut wurde durch Blutegel, welche dem Kinde auf der Brust angesetzt worden waren, entleert. Die Blutegel wurden durch einige Tropfen absoluten Alkohols gereizt, das Blut abzugeben, wodurch der Zweck schnell und vollständig erreicht wurde. Das Blut war ziemlich dunkel und gerann nicht. 1000 Theile hinterließen 242,4 fester Bestandtheile.

1 Grm. trocknes Blut ergab:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Fett .....              | 0,014 |
| Albumin .....           | 0,450 |
| Kasein .....            | 0,440 |
| Farbstoff .....         | 0,036 |
| Extr. Materie u. Salze. | 0,060 |

9) Blut einer Schwangern im 8. Monate der Schwangerschaft.

Das Blut wurde durch Venaesection am Arme erhalten. Es hat eine ziemlich hellrothe Farbe; der Faserstoff scheidet in kleinen derben und festen Bündeln aus; das faserstofffreie Blut läßt in kurzer Zeit die Blutkörperchen sinken und scheidet ein hellrothes Serum ab, das anscheinend  $\frac{1}{3}$  des Volums vom Blute ausmacht. Die Blutkörperchen selbst zeigen eine ausgezeichnet lebhaft rothe Farbe. Es gaben 1000 Theile 2,102 trocknen Faserstoff und 1000 Theile faserstofffreies Blut hinterließen 190,4 trocknen Rückstand.

1 Grm. trocknes faserstofffreies Blut ergab:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Fett .....              | 0,016 |
| Albumin .....           | 0,380 |
| Kasein .....            | 0,470 |
| Farbstoff .....         | 0,040 |
| Extr. Materie u. Salze. | 0,042 |

## 10) Menstrualblut.

Die geringe Menge Blut, welche ich erhalten konnte, war dunkelroth, schwerflüssig, gerann nicht, liefs bei Vermischen mit Wasser Flocken zurück, die nur Schleim zu halten waren. Unter dem Mikroskope zeigte das mit einer Salzlösung vermischte Blut nichts Leichweichendes in Form der Blutkörperchen, wenn nicht das dafür gehalten, dass mehrere der kleinen Blutscheiben auf beiden Seiten aufgekrümmt vorkamen, wie man wohl auch bei anderm Blute aber nicht so häufig beobachtet. Fettkügelchen konnte ich nicht wahrnehmen, aber sparsam umherschwimmende membranöse Theile wahrscheinlich die Reste der Epitheliumzellen.

1 Grm. trocknes Blut ergab:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Fett .....              | 0,012 |
| Albumin .....           | 0,356 |
| Kasein .....            | 0,510 |
| Farbstoff .....         | 0,050 |
| Extr. Materie u. Salze. | 0,040 |

11) Blut eines Pferdes, das an *Malleus humidus* (Rotkrankheit) leidet.

Das Blut durch Venaesection aus der Halsvene erhalten, hat die gewöhnliche, eher etwas dunklere als hellere Farbe des Venenblutes. Es gerinnt beim Quirlen viel später als Menschenblut. Der Faserstoff in viel gröfserer Quantität als im Menschen- und Ochsenblut enthalten, ist ziemlich derb und doch dabei voluminös, schliefst wenig Blutkörperchen ein und wird, mit Wasser behandelt, in kurzer Zeit farblos. Das farbstofffreie Blut lässt sehr rasch die Blutkörperchen, welche kleiner als beim Menschenblut zu sein scheinen, sinken, und es bildet sich eine bedeutende Schicht schwach rothes Serum, welches noch einzelne Blutkörperchen suspendirt.

Blut enthielt, aber keine Fett- oder Lymphkugeln.  
 Das spec. Gew. des Serums wurde mit 1,031 bestimmt.  
 1000 Theile Blut gaben 4,747 Faserstoff. 1000 Theile  
 faserstofffreies Blut hinterliessen 194,6 feste Bestandtheile.

1 Grm. trocknes faserstofffreies Blut ergab:

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fett .....                                                                  | 0,026 |
| Albumin.....                                                                | 0,326 |
| Kasein .....                                                                | 0,493 |
| Farbstoff.....                                                              | 0,027 |
| Extr. Materien, Salze u. durch den Ge-<br>schmack zu erkennenden Zucker ... | 0,064 |

12) Blut eines gleichfalls am *Malleus humidus* lei-  
 denden Pferdes.

Hr. Prof. Hertwig an der hiesigen (Berliner)  
 Thierarzneischule hatte die Güte, dieses Pferd behufs  
 eines Experiments zu meiner Disposition zu stellen.  
 Das Blut, welches ebenfalls aus der Halsvene erhalten  
 wurde, war dem frühern ähnlich. Die Ausscheidung  
 von Faserstoff geschah jedoch in noch voluminösern  
 Massen. Ebenso trat die Sonderung der Blutkörperchen  
 vom Serum in kürzester Zeit ein. 1000 Theile gaben  
 5,100 trocknen Faserstoffes und 1000 Theile faserstoff-  
 freien Blutes hinterliessen 176,0 festen Rückstand.

1 Grm. trocknes faserstofffreies Blut ergab:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Fett .....              | 0,012 |
| Albumin.....            | 0,390 |
| Kasein .....            | 0,460 |
| Farbstoff.....          | 0,031 |
| Extr. Materie u. Salze. | 0,070 |

13 u. 14) Um den Einfluss zu untersuchen, den Man-  
 gel an Nahrung auf die Zusammensetzung des Blutes  
 ausübt, wurde diesem Pferde nun gänzlich die Nahrung  
 entzogen. Es erhielt vom 8. April 11 Uhr keine feste  
 Nahrung, jedoch hinreichend viel Wasser zum Trinken.



Am 13. wurden dem Pferde aus Mißverständniß 41 Heu gereicht und eine gleiche Menge am 14ten. Hier aber wurde ihm wieder bis zum 18ten sämmtliche Nahrung entzogen. Die äußere Einwirkung dieser Hungerentziehung war unverkennbar. Die fleischigen Theile waren zusammengefallen, die Glieder zitternd, die Kräfte bis auf einen hohen Grad herabgesunken. Das Blut, welches durch eine sehr erschwerte Venaesection erhalten wurde, war heller wie das früher haltene; es coagulirte beim Quirlen schneller und schied eine überraschend große Menge Faserstoff aus. Das faserstofffreie Blut liefs in kürzester Zeit seine Blutkörperchen sinken und bildete eine an Volum fast  $\frac{3}{4}$  der ganzen Blutmasse einnehmende Schicht Serum. Der Faserstoff, obgleich ziemlich derb, wenn auch weniger als der des unter 12) erwähnten Blutes, wurde sehr leicht im Wasser weifs. 1000 Theile Blut gaben 9,011 Faserstoff und 1000 Theile faserstofffreies Blut hinterließ 182,0 festen Rückstandes. Da die Analyse a) eine kleine Unrichtigkeit enthalten muß, indem sie 1,008 mg giebt als Blut zur Analyse angewendet wurde, so habe ich noch einmal 1 Grm. desselben trocknen Blutes untersucht:

1 Grm. trocknes faserstofffreies Blut ergab:

| a.                          | b.                           |
|-----------------------------|------------------------------|
| Fett.....0,020              | Fett.....0,020               |
| Albumin.....0,532           | Albumin.....0,570            |
| Kasein .....0,336           | Kasein .....0,300            |
| Farbstoff.....0,028         | Farbstoff .....0,024         |
| Extr. Materieu. Salze 0,091 | Extr. Materieu. Salze..0,080 |

#### 15) Blut vom *Cyprinus Carpio*.

Das Blut, welches ebenfalls gleich nach dem Auftreten aus dem Körper gerührt werden muß, wenn

nicht gerinnen soll, zeigte einige wenige Flocken von Faserstoff, die aber durchaus vom Faserstoff der bis jetzt von mir untersuchten Blutarten der Säugethiere verschieden waren, da die Masse desselben nicht fadenziehend und elastisch, wenig derb, mehr schleimig oder gallertartig erschien. Die Quantität Blut, welche man erhält, ist verhältnißmäßig nur gering, es ist hellroth, etwas schmutzig von Farbe, dünnflüssig, zeigt unter dem Mikroskop Blutkörperchen, welche nahe die Größe der Froschblutkörperchen erreichen und elliptisch sind. Außerdem beobachtet man noch hier und da Oeltröpfchen. Es ist nicht mit Sicherheit zu behaupten, daß das Blut ganz rein ist, obgleich ich den Karpfen vor dem Stechen abtrocknen liefs, so kann doch Wasser aus den Kiemen mit eingeflossen sein. 1000 Theile Blut enthalten 129,0 Theile feste Stoffe. Der Faserstoff war nicht durch das Gewicht zu bestimmen.

1 Grm. getrocknetes Blut ergab:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Fett .....              | 0,023 |
| Albumin .....           | 0,650 |
| Kasein .....            | 0,166 |
| Farbstoff .....         | 0,025 |
| Extr. Materie u. Salze. | 0,048 |

#### 16) Blut vom *Cyprinus Tinca*.

Die Eigenschaften des Schleienblutes sind ganz die des Karpfenblutes, nur muß bemerkt werden, daß schon durch bloße Augen auf der Oberfläche dieses Blutes Fettkügelchen bemerkt werden konnten, noch mehr ergab die mikroskopische Untersuchung, welche die Gestalt der Blutkörperchen wie die bei vorigem Blute zeigte, eine ansehnliche Menge Oeltröpfchen. 1000 Blut ergaben nur 100 feste Bestandtheile; auch hier will ich vorsichtiger Weise die Möglichkeit hinzugekommenen

Wassers nicht absprechen. Der Faserstoff kann dem Gewichte nach bestimmt werden.

1 Grm. getrocknetes Blut ergab:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Fett .....              | 0,046 |
| Albumin .....           | 0,688 |
| Kasein .....            | 0,128 |
| Farbstoff.....          | 0,018 |
| Extr. Materie u. Salze. | 0,027 |

### 17) Blut von *Bufo variabilis*.

Die *Bufo variabilis* wird an einigen Orten um und an einem Orte in Berlin in ziemlicher Menge ge Die Menge Blut, welche jedes Thier enthält, ist nur daher bedarf es einer grossen Anzahl von Kröten, u hinreichende Menge Blut zur Untersuchung zu er Durchschnittlich erhielt ich beim Abschneiden des mit einer Scheere, wobei die Extremitäten festge wurden, etwa 5 — 12 Tropfen Blut, das aber nicht ganz rein, sondern mit Lymphe und wohl auch, wen zum geringsten Theil, mit dem weissen Schleim die Kröte im geängstigten Zustande aus den W des Körpers von sich giebt, vermengt wird. 1 Schleim ist keineswegs giftig, aber er hat einen angenehmen fast narkotischen Geruch und muß re fettharzigen Theilen sein, da er milchig von susp ten Kügelchen und im Wasser zum grössten The löslich ist. Untersucht habe ich ihn nicht, da m Untersuchung des Blutes näher lag. Unter dem M kope zeigten sich Blutkörperchen von derselben und wahrscheinlich auch von derselben Grösse w Froschblut, nebenbei auch hier und da ungefärbte perchen, die wahrscheinlich der eingemengten Ly angehörten. Die Kerne der Blutkörperchen sind ansehnlicher Grösse, lassen sich bei 300maliger

Frösche vollkommen gut erkennen, und beim Verreiben des Froschblutes mit Wasser scheiden, indem sie aufgelöst am Boden des Glases sich sammeln. Der Faserstoff scheidet sich in ganz unbedeutenden Flocken von dem dasselbe gilt, was von dem Faserstoff des Lurcheblutes erwähnt wurde. In Wasser gelegt, um die eingeschlossenen Blutkörperchen zu entfernen, schied er sich nicht als elastische, derbe, fadenziehende Masse, sondern als schleimige Flocken ab, deren Gewicht nicht bestimmt werden konnte. Von 65 Kröten erhielt ich gegen 500 Grm. Blut.

1000 Theile hinterliessen 151,8 feste Bestandtheile.

1 Grm. getrocknetes faserstofffreies Blut ergiebt:

Fett .....0,004

Albumin .....0,740

Kasein .....0,144

Farbstoff.....0,052

Extr. Materie u. Salze.0,016

Wie früher stelle ich auch diese Analysen übersichtlich für 1000 berechnet zusammen, wobei ich von der im Verhergehenden angegebenen Menge Wasser noch die des Faserstoffs abziehe.

|                        | 8.       | 9.       | 10.      | 11.      | 12.      | 13.      | 14.      | 15.      | 16.      | 17.      |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Wasser .....           | 757,600  | 806,898  | 785,000  | 800,563  | 818,900  | 808,809  | 808,809  | 872,000  | 900,000  | 848,200  |
| Faserstoff .....       | —        | 2,102    | —        | 4,747    | 5,100    | 9,011    | 9,011    | —        | —        | —        |
| Fett desselben .....   | —        | —        | —        | 0,090    | 0,102    | 0,180    | 0,180    | —        | —        | —        |
| Fett des Blutes .....  | 3,393    | 3,040    | 2,580    | 5,059    | 2,112    | 3,640    | 3,640    | 2,967    | 4,630    | 0,607    |
| Albumin .....          | 109,080  | 72,200   | 62,140   | 62,272   | 62,140   | 95,824   | 103,740  | 83,850   | 68,800   | 112,330  |
| Kasein .....           | 106,650  | 89,300   | 80,960   | 95,937   | 80,960   | 61,052   | 54,600   | 21,410   | 13,800   | 21,860   |
| Farbstoff .....        | 8,726    | 7,600    | 6,500    | 4,254    | 6,500    | 5,096    | 4,368    | 3,225    | 1,850    | 7,893    |
| Extr. Materie u. Salze | 14,500   | 7,980    | 12,320   | 12,454   | 12,320   | 16,744   | 14,650   | 6,192    | 2,770    | 2,429    |
| Verlust .....          | —        | 10,120   | 11,866   | 10,674   | 11,966   | —        | 0,718    | 10,356   | 8,150    | 6,691    |
| Summa .....            | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1001,356 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 |



# Ueber das Verfahren, die Zusammensetzung der Harnsteine zu erkennen;

VON

*A. Chevallier.*

Die Methoden zur Entfernung der Harnsteine aus der Blase sind bekanntlich die Operation der Zerbröckelung, oder Cystotomie, und die Auflösung oder Zerfällung durch den Gebrauch natürlicher oder künstlicher doppelt-kohlensaures Alkali enthaltender Mineralwässer. Gewiss ist auf diese letzte Methode ein grosser Werth zu legen, und wir möchten jedem Kranken, der sich operiren lassen will, zurufen, erst den Gebrauch dieser Wasser zu versuchen. Dieses Mittel ist noch nicht so versucht, als dasselbe solches verdient. In Bezug auf die richtige Erkennung der Natur der Harnsteine ist die nachfolgende Darlegung ihrer Eigenschaften bearbeitet.

## *Harnsteine aus Harnsäure.*

Diese Harnsteine haben eine braune, gelbliche, gelblichbraune oder röthlichbraune, zuweilen aber auch eine gold-, orange- und schwefelgelbe, schmutzig-weiße, bläulich-graue, ziegel-, violett- und rosenrothe Farbe; ich habe sie auch krystallisirt gesehen, wovon einer kleine blane Krystalle enthielt.

Ihre Oberfläche ist glatt, oder warzig, und dann den sogenannten Maulbeersteinen ähnlich. Auf dem Bruch zeigen sie mehr oder weniger dicke concentrische Schichten, bisweilen auch kleine zellenartige Zwischenräume.

Die Harnsäure dieser Steine ist im Allgemeinen nie rein, sondern mit harnsaurem Ammoniak, einer thierischen und auch zuweilen einer fetten Materie vermischt,

aber in zu geringer Menge, um sie genau untersuchen zu können, ohne Zweifel ist sie der von Du Me im Harn gefundenen analog. Wird der Harnsäure Harnstein gepulvert und mit Wasser gekocht, so löst sich ein kleiner Theil auf, den man durch Verdunstung erhalten kann \*). Durch Behandeln mit kaustischem Kali entsteht eine Vermehrung des Volums, eine Teig, und durch neuen Zusatz verdünnter Kalilauge eine Auflösung, fast immer unter Entwicklung von Ammoniak, meist mit Hinterlassung einer flockigen Materie und eines Absatzes von phosphorsaurem oder kohlensaurem Kalk. Die alkalische Auflösung läßt, nach Sättigung mit einer Säure, die Harnsäure unter gallertartiger Form fallen, sie nimmt aber bald ein körniges Ansehen an und zeigt unter der Lupe zuweilen eine regelmäßige krystallinische Form.

In Salpetersäure lösen sich diese Harnsteine auf, eine gelbe Auflösung in einem Porcellanschälchen einer gelinden Hitze ausgesetzt, nimmt eine schöne purpurrothe Farbe an, die durch Zusatz von Wasser weinroth wird. Schon mit einem kleinen Stückchen Harnsäure läßt sich dieser Versuch anstellen, man muß aber keine zu große Menge Salpetersäure dabei anwenden.

Durch Erhitzen vor dem Löthrohr, oder in einem Tiegel, entwickeln diese Harnsteine einen Geruch nach brennendem Harn. Bestehen sie aus reiner Harnsäure, so erhält man keinen oder fast keinen Rückstand; enthalten sie Phosphate, so geben sie einen wenig alkalischen, ohne Aufbrausen in Salpetersäure löslichen Rückstand, die salpetersaure Auflösung giebt durch Ammonium

---

\*) Nach Henry löst sich 1 Harnsäure in 1720 Wasser von 15° und in 1150 kochendem Wasser; die Auflösung röthet Lackmuspapier.

mit einem weissen flockigen Niederschlag von phosphors. Kalk; enthalten sie Oxalate, so ist der Rückstand alkalisch, in Wasser schwerlöslich und löst sich in Salpetersäure mit Aufbrausen auf, bei völliger Zersetzung des Carbonats natürlich ohne Aufbrausen.

Durch Erhitzen in einem Retörtchen entwickeln diese Harnsteine ein weisses Sublimat, *Brenzharnsäure*, oder wie sie jetzt genannt wird, *Cyanursäure*.

### *Harnsteine aus harnsaurem Ammoniak.*

Diese Steine kommen selten vor, sind klein, weisslich oder graulich, glatt oder höckrig, aus concentrischen Schichten bestehend, von erdigem Bruch. Nach Fourcroy enthalten sie zuweilen Schichten von erdigen Phosphaten.

In Kali lösen sich die Steine aus reinem harnsaurem Ammoniak völlig auf unter reichlicher Entwicklung von Ammoniak. Beim Erhitzen hinterlassen sie keinen Rückstand, dieses ist nur der Fall, wenn sie erdige Phosphate enthalten. Mit Salpetersäure erwärmt geben sie dieselbe rothe Farbe wie Harnsäure.

Das Ammoniak kann man von der Harnsäure durch verdünnte Salzsäure trennen, wobei die Harnsäure ungelöst bleibt; enthielt der Stein zugleich etwas phosphorsauren Kalk, so geht dieser mit in die Auflösung über, durch Verdunsten derselben und Calciniren des Rückstandes verflüchtigt man das salzsaure Ammoniak und bleibt der phosphorsaure Kalk zurück.

### *Harnsteine aus phosphorsaurem Kalk.*

Harnsteine, die nur aus phosphorsaurem Kalk bestehen, sind selten, Wallaston hat sie zuerst erkannt. Ihre Oberfläche ist polirt, hellbraun; sie bestehen aus

leicht von einander trennbaren concentrischen  
ten; der Querbruch jeder Lamelle erscheint  
wie von parallelen Fasern, gewissermaßen eine K  
lisation anzeigend. Fourcroy hat Steine dies  
beobachtet, die zerreiblich waren und aus wer  
sammenhängenden Granulationen bestanden, wa  
schnelle Bildung durch Niederschlag andeuten m  
zuweilen fand er darin auch Poren, wie ein sc  
migtes Gefüge.

Nach beiden Gelehrten sind diese Harnsteine  
mit einer thierischen gelatinösen Materie verbun

Beim Erhitzen verkohlen sie erst unter Verb  
eines Geruchs nach brennendem Harn, brennen dan  
und schmelzen bei einer hohen Temperatur. Dur  
sen Character unterscheiden sie sich vom basisch  
phors. Kalk. Der Rückstand von der Calcinati  
sich in verdünnter Salzsäure ohne Aufbrausen a  
die Auflösung giebt durch Ammoniak einen Nieder  
von phosphors. Kalk. Die Harnsteine aus phos  
Kalk sind in Wasser unlöslich; an'kochendes V  
treten sie eine thierische gelatinöse Materie ab, u  
aufsteigende Dampf nimmt einen leicht erken  
faden Geruch an. In verdünnter Salpetersäure un  
säure lösen sie sich leicht auf, mit Hinterlassung der  
schen Materie, die man dann leicht abscheiden ka  
die bisweilen Spuren von fetter Materie und von  
säure enthält.

*Harnsteine aus phosphorsaurem Kalk und phospho  
Ammoniak - Magnesia.*

Diese Harnsteine sind kreidenartig und erdi  
weilen zeigen sie kleine mit glänzenden Krystall  
phosphorsaurer Ammoniak - Bittererde ausgekleidet

gen, selten aber zeigen sie sich im Innern blättrig. In dem Löthrohr fließen sie mit großer Leichtigkeit, daher der Name *schmelzbare Harnsteine*. Beim Erhitzen werden sie schwarz und entwickeln vor dem Schmelzen Ammoniak. An verdünnte Essigsäure treten sie fast den Gehalt des Magnesiasalzes ab, während der größte Theil des Kalksalzes ungelöst bleibt. In Salzsäure lösen sie sich mit Leichtigkeit auf; aus der so weit als möglich neutralisirten Auflösung schlägt oxalsaures Ammoniak den Kalk, und ein Ueberschuß von Ammoniak die phosphorsaure Ammoniak-Magnesia nieder. Die Schmelzbarkeit dieser Harnsteine richtet sich nach dem Verhältniß des phosphorsauren Kalks zu der phosphorsauren Ammoniak-Bittererde; mit dem Vorwalten des phosphors. Kalks vermindert sich ihre Schmelzbarkeit, und sie können selbst unschmelzbar werden; beim Vorwalten des Magnesiasalzes werden sie schwerer schmelzbar, aber nicht unschmelzbar. Mitunter enthalten sie noch harnsauren Kalk. Man kann die Harnsäure dann abheben, wenn man den gepülverten Stein mit einem Alkali behandelt und aus der Auflösung durch Ueberfälligen mit Salzsäure die Harnsäure niederschlägt.

#### *Harnsteine aus phosphorsaurer Ammoniak-Magnesia.*

Sie bestehen aus blättrigen halbdurchscheinenden, festen und cohärenten Schichten, lassen sich schneiden und brechen dabei nicht wie der phosphorsaure Kalk, sondern geben ein sanft anzufühlendes, süßlich fade schmeckendes und in Wasser wenig lösliches Pulver. In seltenen Fällen findet man dieses Salz auch in vierseitigen Rhomboëden krystallisirt in den Höhlungen anderer kalkhaltigen Producte.

In Säuren lösen sich diese Harnsteine leicht auf;



Alkalien bringen in dieser Auflösung einen Niederschlag hervor, der alle Eigenschaften der phosphorsauren Ammoniak-Magnesia besitzt.

Kaustisches Kali entwickelt daraus Ammoniak. Erhitzen werden sie schwarz, in Folge der Vertheilung von einem Gehalte thierischer Materie, zuletzt werden sie grau und schmelzen zu einem Email, welche salpetersaures Kobaltoxyd eine schöne rothe Farbe annimmt.

*Harnsteine aus oxalsaurem Kalk.*

Diese Harnsteine haben meist eine unebene Oberfläche, die Frucht des Maulbeerbaums ähnliche Oberfläche, auch ihr Name *Maulbeersteine*. Sie besitzen eine gelbenbraune, dunkelrothe, graue, braune, grünlich-schwarze Farbe, welche nach Marcet vom Blut herrührt, was bei der Bildung der Steine sich ausbreitet, in Folge der Reizung durch die auf der Oberfläche sich findenden Höckerchen. Berzelius leitet die Färbung von der thierischen Materie ab, die sich gleichzeitig mit den schwerlöslichen Kalksalzen aus dem Harn abscheidet. Zuweilen sind diese Steine klein, weißlich-gelb, aus fest aneinanderhängenden spitzen Kugeln gebildet, auch glatt und wenig gefärbt.

In der Hitze blähen sie sich auf, verkohlen und verbreiten einen thierisch brenzlichen Geruch. Hinterlassen nach starkem Erhitzen Aetzkalk, nach längerem kohlensauren Kalk.

Gepulvert lösen sie sich in Salzsäure auf, und beim Verdunsten sondert sich aus der Flüssigkeit der saure Kalk in nadelförmigen Krystallen ab. Durch Handeln mit kaustischem Kali kann man einen Theil der thierischen Materie ausziehen, ohne den oxalsauren Kalk zu zersetzen; durch kohlensaures Kali aber wird

es entsteht kohlensaurer Kalk und oxalsaures, welches mit der thierischen Materie aufgelöst bleibt. Enthalten diese Harnsteine zugleich Harnsäure oder harnsaures Salz, so behandelt man sie mit kaustischer Kalilösung, und fällt dann aus dieser die Harnsäure durch eine Säure.

### *Kieselerdehaltige Harnsteine.*

Die Kieselerde kommt selten in Harnsteinen vor. Fourcroy und Vauquelin fanden nur zwei solcher Harnsteine unter sechshundert von ihnen untersuchten Harnsteinen. Der eine dieser Steine enthielt nur sehr wenig Kieselerde, der andere einen einem Maulbeersteine ähnlichen Harnstein, der aus 34 Proc. thierischer Materie und 66 Proc. Kieselerde bestand.

Nach Fourcroy enthalten diese Steine, außer Kieselerde, phosphorsauren Kalk und eine thierische Materie, analog der in den Maulbeersteinen; sie sind hart, schwer zu schneiden und zu pülvern, und ihr Staub ist zwischen den Fingern hart und ritzt Metallflächen.

Beim kochenden Wasser treten sie fast nichts ab; sie nehmen eine kleine Menge phosphorsauren Kalk auf; Auflösungen von Alkalien und kohlensaure Salze haben keine Wirkung darauf; sie entziehen nur etwas der thierischen Materie. Ihr unterscheidender Character ist, daß sie durch Calcination  $\frac{1}{3}$  ihres Gewichts verlieren, und der Rückstand nicht wie kohlensaurer Kalk sich verhält, sondern durch Glühen mit kaustischem Kali, Behandeln des Products mit Salzsäure u. s. w. wird Kieselerde erhalten.

### *Harnsteine aus kohlensaurem Kalk.*

Diese finden sich selten bei den Menschen, häufig

bei den kräuterfressenden Thieren. Erstere sind grau, gelb, roth und braun, die Farbe rührt von mit diesen Steinen stets verbundenen organischen Materie her. In der Hitze werden sie schwarz, unter Verbreitung eines Geruchs nach Dippelschem Oel. Bei heftigem Glühen bleibt ein Rückstand von Aetzkalk. Salzsäure lösen sie sich unter Aufbrausen auf. Sie enthalten sie auch phosphorsauren Kalk und von harnsaurem Kalk.

### *Harnsteine aus Blasenoxyd.*

Harnsteine aus Blasen- oder Cystikoxyd sind selten. Diese Substanz wurde 1810 von Waller entdeckt. Sie ist unlöslich in Wasser, Essigsäure, Citronensäure, Citronsäure und basisch kohlens. Ammoniak, löslich in Salz-, Salpeter-, Schwefel-, Phosphor-, Oxalsäure und kaust. Kali. Die Verbindungen des Blasenoxys krystallisiren in sternförmig zusammengeordneten Nadeln, die sich in Wasser lösen, aus welcher Lösung basisch kohlens. Ammoniak das Blasenoxyd scheidet. Die Verbindungen mit Alkalien bilden nadelartige Krystalle.

Die Harnsteine aus Blasenoxyd brennen vor dem Löthrohr mit bläulich grüner Flamme, ohne zu zerfallen, unter Verbreitung eines starken eigenthümlichen Geruchs, der an Cyan erinnert; eine graulich schwarze Farbe bleibt zurück \*).

---

\*) Das Blasenoxyd ist ein um so interessanterer Körper, dasselbe neben Kohlenstoff, Stickstoff, Wasserstoff und Schwefel enthält, mithin aus fünf Elementen besteht. Siehe Thaulow in Bd. XV. 2. R. S. 17 Zeitschrift.

*Harnsteine aus Xanthoxyd.*

Das Xanthoxyd wurde von Marcet entdeckt. Die daraus bestehenden Harnsteine sind sehr selten, klein, sphärisch, gelblichbraun und blättrig. Durch kaustisches Kali wird die Farbe intensiver gelb. In der Hitze zerpringen sie zu kleinen Stückchen, werden schwarz und hinterlassen endlich eine weiße Asche, unter Verbreitung eines eigenthümlichen animalischen Geruchs, der dem, welcher die aus Harnsäure und Blasenoxyd bestehenden Harnsteine beim Verbrennen entwickeln, nicht ähnlich ist.

In kochendem Wasser lösen sie sich zum Theil auf, die Auflösung röthet Lackmuspapier und bedeckt sich nach Erkalten mit einer weißen flockigten Haut, die bei ihrem allmäligen Absatz eine weiße Incrustation bildet.

In kaustischem und kohlensaurem Kali und in Ammoniak lösen sie sich auf; aus der Auflösung wird durch vorsichtiges Neutralisiren mit Essigsäure das Xanthoxyd gefällt. Sie lösen sich in Mineralsäuren auf, aber langsamer als in Alkalien. Die Auflösung des Xanthoxyds in Salpetersäure wird beim Abrauchen nicht roth, wie die der Harnsäure, sondern citrongelb; durch Zusatz einer Säure verschwindet diese Farbe, durch ein Alkali wird sie roth, beim Verdunsten carmoisin, und setzt man dann Wasser zu, so wird sie wieder gelb.

Zur Hervorbringung dieser Farbenveränderungen muß man, nach Marcet und Laugier, Salpetersäure auf den Harnstein selbst wirken lassen.

Das Xanthoxyd ist in Alkohol und Aether löslich, und fast unlöslich in Oxalsäure (das Blasenoxyd löst sich in dieser Säure auf). In doppelt-kohlens. Kali und kohlens. Ammoniak scheint es unlöslich zu sein, in Säuren

ist es weniger löslich als das Blasenoxyd. (Vergl. *Annal de Chim. med.* 2. Ser. V, 104.)

---

## Ueber Bereitung, Prüfung, Ursachen Verderbens, und zweckmäfsigste Aufbe- haltung der destillirten Wässer;

von

*Fr. Brendecke.*

---

(Der Verfasser erhielt die silberne Medaille der H. A. Buchholz'schen Stiftung.)

---

**I**st die Ursache des Verderbens destillirter V. richtig erkannt, so wird man den gröfseren oder geringeren Werth ihrer bekannten Bereitungsarten urtheilen können und zu neuen Versuchen die zweckmäfsig zu bereiten geleitet werden; auch sich alsdann die Mittel zur zweckmäfsigen Aufbewahrung und Prüfung leichter finden.

Ich halte es daher für angemessen, die Erfahrungen und Versuche, welche die Ursachen des Verderbens destillirten Wässer zeigen, voranzuschicken \*).

Destillirt man aus einer gewöhnlichen Blase ätherisches Oel enthaltende Vegetabilien mit Wasser, so finden sich in dem Destillate, auch bei sorgfältiger Destillation gröfsere oder geringere Mengen sehr feine theilbar weifse leichter schleimige Flocken suspendirt.

---

\*) Alle in dieser Abhandlung genannten Präparate sind nach der neuen preussischen Pharmakopöe bereitet zu versenden, wenn nicht Näheres deshalb bestimmt ist. Ferner ist die Rede von solchen ätherischen Oelen, welche in natürlichen Wässern enthalten sind.



wodurch dasselbe nicht ganz krystallklar erscheint. (Es ist gewiss, daß das Destillat bei größerem Oelgehalte, als das Wasser aufzulösen vermag, ausserdem getrübt ist.)

Wurde die Destillation so rasch geleitet, daß das Wasser warm überging, war der Abkühlungsapparat unvollkommen oder der Helm von der Beschaffenheit, daß die Dämpfe nur schwierig übergehen konnten, so vermehrten sich in dem letztgenannten Falle erwähnte schleimige Flocken, in dem ersten Falle gehen sie in größere Flocken zusammen und indem sie noch nicht aufgelöstes ätherisches Oel umschliessen, lagern sie sich in der Ruhe am Boden der Standgefäße ab.

Erhält man bei der Destillation bedeutend mehr ätherisches Oel als das Wasser aufzulösen vermag, und sammelt man dieses, indem man das Destillat in eine an beiden Seiten offene unten bis auf eine Linie Durchmesser sich verengende Glasröhre destillirt, diese aber in einer mit Wasser gefüllten, unten verstopften, weiteren Glasröhre so befestigt, daß sie einige Zolle oben herausragt und daß das in die weitere Glasröhre fließende Wasser aus dieser in einer Flasche aufgefangen werden kann, so bekommt man ein ganz klares Wasser, vorzüglich wenn schon vor der Destillation eine Schicht ätherisches Oel in die engere Glasröhre gethan ist. Das von dem überdestillirenden Wasser unaufgelöste Oel nämlich, sammelt sich in dem oberen Theile der engeren Glasröhre, und die schleimigen Flocken, welche das Ueberdestillirende enthält, sinken durch die Oelschicht, werden so mit dem ätherischen Oele benetzt und adhären hierdurch unten an der Oelschicht.

Löst man ein ätherisches Oel durch Schütteln in *Aqua destillata* und destillirt die Auflösung, so erhält

man, wie bei der Destillation der ätherisches Oel haltenden Vegetabilien mit Wasser, ein Destillat mehr oder weniger sehr fein zertheilten suspendi schleimigen Flocken.

Wenn man ätherisches Oel aus einem Dampfstillirapparate destillirt, indem man die Wasserdämpfe auf das Oel streichen läßt, so geht dasselbe gleichfangs über und man erhält fast gar keine Schleimflocken im Destillate.

Nachdem bei einer sorgfältigen Destillation, sowohl der ätherisches Oel enthaltenden Vegetabilien mit Wasser oder auch auf andere vorher erwähnte Art der Riechende übergegangen war, wurde die Destillation verstärkt, daß das Ueberdestillirende warm überging und so jedesmal einige Maass Wasser gesammelt. Dieses war stets ganz klar. Gelinde verdampft, hinterließ es keinen Rückstand. Wurde die Destillation bei gelindem Feuer fortgesetzt, nachdem, wie oben, alles Riechende übergegangen war, so hinterließ das Destillat nach gelindem Verdunsten ebenfalls keinen Rückstand. Daraus geht hervor, daß die schleimigen Flocken nicht Stoffe der zur Destillation verwendeten Vegetabilien sind, die erst zuletzt oder bei vermehrter Hitze übergehen. Sie sind das Product der Zersetzung des ätherischen Oels durch das Wasser. Folgender Versuch bestätigt dieses noch:

Man schüttelte ein ätherisches Oel anhaltend mit viel *Aqua destillata*, daß sich dasselbe entweder nicht völlig oder auch ganz darin auflöste, und ließ die Mischung in einem verschlossenen Glase bei einer Temperatur von 10 bis 20° R. ruhig stehen, ausser daß dieses täglich einige Male wieder tüchtig geschüttelt wurde. In Verlauf einiger Wochen konnte man die Umänderung

das ätherischen Oels in Schleim deutlich verfolgen. Vornämlich bei *Oleum Foeniculi* und *Oleum fl. Aurant.* zeigen sich die vom Wasser nicht aufgelösten Tröpfchen in die Länge, umhüllten sich mit Schleim und wurden nach einigen Monaten ganz darin umgeändert. Ist aber so viel unaufgelöstes ätherisches Oel da, daß dasselbe in der Ruhe wieder in eine Masse zusammenfließt, so bildet sich kein Schleim.

Die Schleimbildung ist die nächste Ursache des Verderbens der destillirten Wässer. Ein destillirtes Wasser wird immer schwächer, je mehr sich das Wesen seiner Wirksamkeit, »das ätherische Oel,« in diesen Schleim verwandelt \*). Eine Ausnahme macht das *Aqua Cinnamomi*. An diesem bemerkt man keine Schleimbildung. Es ist aber auch deshalb ein sehr haltbares Wasser. Aus der Zimmtsäurebildung, die man im *Aqua Cinnamomi* bemerkt hat, geht hervor, daß wenigstens die primäre Zersetzung dieses Wassers von der Zersetzung der übrigen abweicht.

Der sogenannte Blasengeruch eines destillirten Wassers rührt daher, daß sich ein Theil ätherisches Oel bei der Destillation in den Wasserdämpfen in diesen Schleim verwandelt, dieser sich an die heißen Wände des Destillirapparats niederschlägt und so erhitzt, dem Destillate den bei allen Wässern gleichen Nebengeruch mittheilt. Denn destillirt man ein schleimig gewordenes gemischtes Wasser bei starkem Feuer aus einer Glasretorte, so hat das Destillat ebenfalls Blasengeruch. Ich

\*) Sollte nicht der geringere ätherische Oelgehalt mancher Pflanzen, wenn sie auf nassem Boden wuchsen, z. B. *Mentha piperita* und *crispa*, seinen Grund darin haben, daß ätherisches Oel schon in der lebenden Pflanze in diesen Schleim umgeändert wird?



habe indess zuweilen ein destillirtes Wasser fast diesen Nebengeruch erhalten. So z. B. ein *Aquarum* durch vorsichtiges Destilliren bei zweckmäßigem gerichtetem Helm und Kühlapparat, wodurch, wie erörtert, die Schleimbildung möglichst gehemmt. Es war aber auch alsdann immer das Destillat klar fast ohne schleimige Flocken.

Ueber die Eigenschaften des sich bildenden Schleims läßt sich nicht eher etwas Ausführliches sagen, als es gelingt, sich denselben in größerer Menge darzustellen. Denn so voluminös man ihn auch bei der Destillation der ätherischen Oele erhält, so ist doch seine Quantität äußerst gering. Der bei der Destillation von *Sem. Foeniculi*, *Hb. Salviae*, *Rad. Valerianae*, *Calami*, *Bacc. Juniperi* erhaltene Schleim läßt sich mit ätherischem Oele mischen und diese Mischung mit Wasser zu einer ziemlich constanten Emulsion durch Schütteln vereinigen. Er ist in Alkohol, Aether und etwas verdünnten Säuren unauflöslich. Aetznatronflüssigkeit löst auch beim Erwärmen nur schwer das Schleim auf; neutralisirt man die filtrirte Auflösung mit Essigsäure, so scheidet sich das Aufgelöste in feinen weißen Flocken aus. Diese sammeln sich auf der Flüssigkeit zu einer schleimigen Schicht. Die alkalische Auflösung giebt mit Galläpfeltinctur versetzt, einen gelbbraunen Niederschlag.

Dampft man ein destillirtes Wasser, was schleimige Flocken enthält, eine Zeitlang gelinde ab, so werden die weißen Flocken braungrau gefärbt und sammeln sich auf dem Boden der Schale. Nach längerem Stehen an der Luft verwandelt sich der Schleim in Humusextract (Humussäure).

Die Verwandlung des Schleims in Humusextract

also ferner die Ursache des Verderbens destillirter Wässer. Folgende Versuche sollen dies näher erweisen:

Bringt man nämlich ein flockiges destillirtes Wasser in eine flache nur vor Staub leicht bedeckte Schaaale und läßt sie mehrere Monate lang stehen, so bräunen sich die anfangs weissen Flocken, später wird das Wasser ein wenig gelblich gefärbt.

Verdampft man einige Maafs eines frisch destillirten und filtrirten Wässers (nicht *Aqua destillata*) sehr gelinde, so bleibt kein Rückstand, wenn bei der Destillation grosse Vorsicht angewendet war, so dafs durchaus nichts aus der Blase überggesprützt ist. Nur an den Wänden der Schaaale setzen sich wenige schleimige Flecken ab, die zersetztes ätherisches Oel sind, denn eine frisch bereitete Auflösung von ätherischem Oele in *Aqua destillata* verhält sich ebenso. Auch die Wässer, welche frisch aus dem Dampfapparate destillirt sind, liefern gleiches Resultat. Aber schon nach einigen Wochen erhält man aus allen auf jede angeführte Art dargestellten Wässern einen Rückstand nach gelindem Verdampfen, wenn die Luft nicht abgeschlossen war. Bei sehr alten Wässern, wo die Luft leicht Zutritt gehabt hat, ist der Rückstand nicht unbedeutend. Derselbe war bei allen Wässern von gleicher Beschaffenheit:

*Aq. Sambuci*, *Aq. Fl. Aurant.*, *Aq. Chamomillae*, *Aq. Fumarii*, *Aq. Menthae pip. und crisp.*, *Aq. Melissae*, *Aq. Anisi*, *Aq. Salviae*, *Aq. Petroselini*, *Aq. Valerianae* wurden besonders darauf geprüft. Dieser Rückstand hatte folgende Eigenschaften:

Er war von brauner Farbe, von bitterem Geschmack, überzog sich beim Verdunsten zur Trockne mit einer zerklüfteten Haut. Ganz zur Trockne abgedunstet und wieder mit Wasser behandelt, hinterliess er einen



pulvrigen schwarzbraunen Rückstand, der in **W** Alkohol und verdünnten Säuren unauflöslich war in **W**asser Auflösliche gab mit Bleiessig einen Niederschlag, und die überstehende **Flüs** wurde farblos. Zinnoxidauflösung gab dieselb action.

Alles dieses sind Eigenschaften des von **Berz** Humusextract (Humussäure) genannten Stoffes.

Bei mehre Jahre alten *Aq. Juniperi*, *Aq. Petro* und *Aq. Valerianae* war die Menge des gebildeten musextractes so groß, daß diese hellgelb gefärbt v

## II. *Bereitung der destillirten oder statt derselb angewendeten Wässer.*

Bekanntlich bereitet man die einfachen offici **W**ässer häufig auf zweierlei Art:

1) Durch Destillation der Vegetabilien mit **W** oder Wasserdämpfen:

2) Durch Auflösung des entsprechenden ätheri Oels in *Aqua destillata* entweder direct oder i man das ätherische Oel vorher in etwas Alkohol au

Die 1836 in London herausgegebene *Phar* *poea collegii regalis medicorum Londinensis* erlaubt Drachmen ätherisches Oel mit eben so viel kohlen Magnesia zu verreiben, dann vier Octarien *Aqua e* *lata* zuzumischen, abzufiltriren und das Abfiltrirte des destillirten **W**assers zu verbrauchen. Die deut Pharmakopöen schreiben stets Destillation vor; das quantitative Verhältniß in den Vorschriften ist fast gleich. In vielen Apotheken Deutschlands be man jetzt die destillirten **W**ässer stets im Dampf rate. In manchen Apotheken werden wenigstens e

Wässer aus ätherischen Oelen und *Aqua destillata* geschieht.

Da ein frisch bereitetes destillirtes Wasser denselben Veränderungen durch Zeit und Umstände unterworfen ist wie ein aus ätherischem Oele und *Aqua destillata* frisch gemischtes, und nach allen angezeigten Versuchen keinen andern Stoff als das ätherische Oel aufgelöst enthält; ferner, da die unten angeführte spezifische Prüfung destillirter Wässer dieselben Resultate mit gemischten Wässern liefert, so glaube ich, daß kein Unterschied zwischen beiden Arten statt findet, wenn beide gehörig bereitet worden sind.

Wie sehr man sich indess hüten muß, alten Bereitungsarten der Arzneipräparate neue unterzuschieben, ohne sie der vielseitigsten Prüfung zu unterwerfen, darüber ist in den neuesten Zeiten verschiedentlich aufmerksam gemacht. So soll die *Tr. Antimonii acris* Antimonoxyd, das frühere *Ammon. carbon. pyrooleosum* Cyaa enthalten. Das *Ol. tartari per deliquium* ist nicht bloß einfach kohlens. Kaliauflösung, sondern enthält auch zweifach kohlens. Kali. Viele Fettarten, welche früher für wesentlich identisch gehalten wurden, unterscheiden sich sehr u. s. w. Aber es haben auch manche Arzneimittel dennoch andere Bereitungsarten erhalten, obgleich man wußte, daß sie nach der neuen Vorschrift sich in ihren Bestandtheilen nicht gleich verhielten, v. B. die *Pasta Althaeae*, *Ungt. Althaeae* etc. Hält man die fehlenden Stoffe nach solchen neueren Vorschriften bereiteter Arzneipräparate für unwirksam, wird sogar das schnellere Verderben durch diese fehlenden unwirksamen Stoffe bedingt, so ist gewiß selten Anstand genommen, die neue Bereitungsart der alten vorzuziehen. In Bezug, die Wässer entweder durch Destillation oder

durch Auflösen des ätherischen Oels in *Aqua destil* zu bereiten, ist es nun aber höchst wahrscheinlich, ein Unterschied in qualitativer wie in quantitat Hinsicht nicht existirt. Wohl aber ist ein durch stillation dargestelltes Wasser, wenn man nicht Dampfdestillation anwenden kann, gewöhnlich leicht dem Verderben ausgesetzt, indem die Haltbarkeit selben nicht allein von vorsichtiger Leitung Destillation, sondern auch von einer zweckmäßigen Construction des Helmes und des Kühlapparats hängt. Die Nachtheile, welche ein destillirtes Wasser durch die Essigbildung erhält, wenn die durch Auflösen des ätherischen Oels in etwas Alkohol und Zumischung dieser Auflösung zu *Aqua destil* dargestellt ist, sind mehrfach gerügt worden. Bei sehr lange und gut aufbewahrten Wässern findet die Essigbildung indess selten, aber dennoch möchte der geringe Alkoholgehalt von Manchen für nachtheilig gehalten werden. Fürchtete man bloß den Essigsäuregehalt der Wässer, so könnte man statt des Alkohols etwas Aether nehmen. Ausserdem aber, daß der letzte Vorschlag bei Manchen keinen Eingang finden möchte, obgleich der Aether durch einige Erwärmung des dargestellten Wassers in einem flachen Geschirre ohne wesentlichen Nachtheil für dasselbe verfliehet, so ist doch alles vorherige Auflösen des ätherischen Oels überflüssig. Auch die Londoner Bereitungsart der Wässer liefert kein besseres Präparat, als wenn das ätherische Oel unmittelbar dem *Aqua destillata* zugesetzt und 10 Minuten stark schüttelt und abfiltrirt. Soll aber die Wässer durch Destillation der Vegetabilien mit Wasser bereitet werden, so ist unstreitig die Destillation mittelst Dampf die vorzüglichste. Denn auf

bei dem Anbrennen und Uebersprützen verhütet sind die Dampfapparate für pharmaceutische Laboratorien mit vorzüglichen Kühlapparaten und mit der Bereitung destillirter Wässer zweckmäfsig einrichteten Helmen versehen.

Mehrere Wässer lassen sich auch bis jetzt nur durch Destillation bereiten, indem man deren ätherische Oel theils kaum darstellen, theils nur schwierig unversehrt haben kann. Solche Wässer sind das *Aqua Menthae*, *Aq. Asae foetidae*, *Aq. Fl. Aurantii*, *Aq. Melissae*, *Aq. Opii*, *Aq. Rubi Idaei*. Und gerade fast bei diesen Wässern mufs man am meisten die Schleimbildung bei der Destillation zu vermeiden suchen. Denn das wenige ätherische Oel, was die dazu angewendeten vegetabilischen Stoffe enthalten, würde bei fehlerhafter Bereitung grösstentheils in Schleim umgeändert werden. Auch durch Cohobation über neue Quantitäten vegetabilischer Stoffe wird man seinen Zweck, ein kräftiges Wasser zu erhalten, nur unvollkommen erreichen, wenn nicht wieder die Schleimbildung verhindert wird. Ehe ich die Ursache derselben kannte, glaubte ich, das Schleimige der destillirten Wässer sei ein Bestandtheil der bei der Destillation angewendeten Vegetabilien, welcher nur und nur bei rascher Destillation gleich mit dem Wasser überginge. Es wurden deshalb sowohl kalt als warm bereitete, sich gehörig durchs Absetzen geklärte Destillate des *Hb. Melissae*, der *Fl. Sambucii* etc. der Destillation unterworfen, aber immer nur dann ein klares Wasser erhalten, wenn angeführte Bedingungen, welche der Schleimbildung möglichst hinderlich sind, erfüllt waren.

Bei der Bereitung der destillirten Wässer mufs daher die Temperatur, bei welcher das Destillat auf-

gefangen wird, oder dürfen sie durch Auflösen bereit werden, die Temperatur des *Aqua destillata* berücksichtigt werden.

Aus gesättigten filtrirten Auflösungen der ätherischen Oele in Wasser scheidet sich nur langsam ein ätherisches Oel, wenn sie unter der Temperatur aufbewahrt werden, wobei sie aufgefangen oder gemischt sind, erkältet werden. Ein gesättigtes, ganz klar filtrirtes *Aqua Foeniculi*, was bei  $0^{\circ}$  R. alles Oel ausscheidet, kann doch zu mehreren Graden unter  $0^{\circ}$  R. abgekühlt werden, ehe sich in den ersten Stunden ätherisches Oel scheidet. *Aq. Chamomillae*, *Aq. Sambuci*, *Aq. Melissae*, *Aq. Fl. Aurantii* und *Aq. Rosarum* zeigten dasselbe Verhalten.

Alle Versuche über die Löslichkeit der ätherischen Oele in Wasser lehren aber dennoch, daß dasselbe bei  $+5$  bis  $10^{\circ}$  R. mehr von ätherischen Oelen auflöst, als bei dieser Temperatur.

Die destillirten Wässer müssen daher wenigstens bei dieser Temperatur aufgefangen werden, oder wenn sie durch Auflösung bereit werden, muß das *destillata* wenigstens diese Temperatur haben.

### III. Aufbewahrung der destillirten oder statt derselben angewendeten Wässer.

Um die Wässer lange Zeit zu conserviren, ist es wesentlich, daß sie viel unaufgelöstes suspendirtes ätherisches Oel enthalten. Dies schützt am besten vor dem Verderben, wie auch aus dem schon früher erwähnten Versuche hervorgeht. Es lassen sich so die Wässer in passenden Gefäßen Jahre lang aufbewahren, ohne sich viel zu verändern. Zum täglichen Gebrauche in

\*) Waren die Gläser unberührt geblieben und verkorkt, ereignete es sich nämlich öfter, daß die Wässer an einem Orte, der  $-8^{\circ}$  R. hatte, einen ganzen Tag lang stehen konnten, ohne zu gefrieren.



Apotheke hat man nur nöthig, nach Maaßgabe des Ver-  
brauchs eine Quantität durch ordinaires Druckpapier  
zu filtriren und das im Filter mit etwas Wasser zu-  
rückbleibende ätherische Oel ins Vorrathsgefäß zurück-  
gepöfen. Sammelt sich mit der Zeit das ätherische  
Oel im Vorrathsgefäße bedeutend, so kann man zum  
selbigen Gebrauche einen Theil davon abnehmen.

Es ist zweckmäßig, die Wässer auf zweierlei Art  
in den Vorrathsgefäßen aufzubewahren. Die Wässer  
nämlich, welche man leicht mit einer Quantität unauf-  
gelösten ätherischen Oels destillirt erhalten oder solches  
mit denselben zusetzen kann, thue man in Gefäße,  
welche gut verkorkt werden müssen. Wo dies nicht  
der Fall ist, verkorkt man die Gefäße nicht, sondern  
bedeckt bloß Papiertecturen über die Mündungen dersel-  
ben, wenn nicht besondere Flüchtigkeit des ätherischen  
Oels dieses verbietet. Bei *Aq. Melissae*, *Aq. Rosarum*,  
*Aq. Juniperi* und *Aq. Sambuci* ist das bloße Ueberbinden  
mit Tecturen rathsam: denn es ist doch besser, daß  
das im Wasser enthaltene oder sich bildende Schleim-  
stoff Humsextract verwandelt werde, als daß derselbe,  
wie es sonst geschehen würde, faul wird und so das  
Wasser ganz untauglich macht.

Ueberhaupt aber müssen solche Wässer nur auf  
kurze Zeit vorrätzig gehalten werden.

Schließlich folgt aus Manchem, was über die Wäs-  
ser in dieser Abhandlung gesagt ist: daß man dieselben  
möglichst an einem nicht über 10° R. und nicht unter  
10° R. warmen Orte aufbewahren müsse.

#### IV. Prüfung der destillirten oder statt derselben angewendeten Wässer.

Alle officinellen Wässer müssen stark den Geruch  
der Substanz haben, über welche sie abgezogen oder

woraus sie bereitet sind. Sie dürfen keinen Nel Geruch haben. Sie müssen den Geschmack einer *Aqua destillata* gemachten Auflösung des ätherisc Oels, was sie enthalten, besitzen. Die in der Officin Dispensiren vorrätthigen Wässer müssen klar s mit Ausnahme des *Aq. Valerianae* nicht im geringe sauer reagiren. Durch Reagenzien dürfen keine unorg nischen Stoffe darin angezeigt werden. Eine gro Menge gelinde verdampft, darf höchstens Spuren v Humusextract und Schleimtheilen hinterlassen.

Salpetersaure Quecksilberoxydauflösung, auch B essig geben mit mehreren tadellosen frisch bereiteten k lensäurefreien Wässern Reactionen.

Wird salpetersaure Quecksilberoxydauflösung d *Aq. Flor. Aurantii* zugesetzt, so läßt sich eine schwac Reduction des Reagenzes wahrnehmen. *Aq. Juniperi* u. *Salviae* verhielten sich eben so. Bei *Aq. Menthae cr.* die Reduction stark und vermehrt sich noch beim I wärmen. *Aq. Chamomillae*, *Aq. Cinnamomi*, *Aq. Meliss* *Aq. Menthae pip.*, *Aq. Petroselini*, *Aq. Opii*, *Aq. Rosarum*, *Aq. Sambuci* und *Aq. Rubi Idaei*, gaben keine Reacti damit, auch beim Erhitzen nicht.

Mit Bleiessig wurde *Aq. Salviae*, *Aq. Flor. A rantii*, *Aq. Menthae cr.*, *Aq. Opii*, *Aq. Petroselini*, *A Rosarum* und *Aq. Rubi Idaei* stark milchicht und setzen gefüllten und verstopften Gläsern einen geringen weisse in Essig löslichen Niederschlag ab. *Aq. Foeniculi*, *A Chamomillae*, *Aq. Juniperi* und *Aq. Menthae pip.* wurde bloß milchicht davon. *Aq. Cinnamomi* und *Aq. Valeriana* zeigten keine Reaction, auch beim Erhitzen nicht.

*Aquae vinosae.*

Der Alkoholgehalt schützt diese sehr vor dem Ver-  
faulen. Hat die Luft Zutritt, so bildet sich allmählig  
Essigsäure und enthielt das frische Wasser viel ätheri-  
sches Oel aufgelöst, so scheidet sich bei fortschreitender  
Zersetzung ätherisches Oel ab. Besonders beobachtete  
ich dies bei einem *Aq. Menthae pip. vinosa*. Es hatte  
fast die Stärke des destillirten Essigs erhalten, war  
klar, schmeckte noch stark nach Pfeffermünzöl,  
und am Boden der Flasche lag ätherisches Oel in sehr  
fein vertheiltem Zustande. Schleimige Theile waren  
nicht gebildet worden.

Den bekannten Bereitungs- und Aufbewahrungsarten  
weini- gen Wässer habe ich nichts weiter hinzuzufügen.

Durch die Prüfung 1) auf den Alkoholgehalt, aus  
spec. Gewichte zu ermitteln, 2) auf hinreichenden  
ätherischen Oelgehalt, durch Geruch und Geschmack  
zu beurtheilen, 3) auf die Abwesenheit von Essigsäure  
und von anorganischen Substanzen, 4) auf das vorschrift-  
mäßige Klar- oder Trübesein, letzteres von ein wenig  
in suspendirtem ätherischen Oele herrührend, möchte  
sich ein gutes weiniges Wasser hinreichend sich be-  
urtheilen lassen.

Schließlich bemerke ich nur noch, daß kohlen-  
säurefreies *Aq. Cinnamomi vin.* durch Zusatz von Blei-  
essig sich nicht verändert, ein solches *Aq. aromatica*  
gegen stark milchicht wird und nach einiger Zeit  
weißlich, in Essigsäure löslichen Niederschlag ab-  
setzt. Salpetersaure Quecksilberoxydauflösung reagirte  
ebenfalls auf ein kohlensäurefreies *Aq. Cinnamomi vin.*  
Es ändert sich auch nicht beim Erwärmen, wohingegen *Aq.*  
*aromatica* schon in der Kälte stark davon reducirt  
wird, was beim Erwärmen sich noch vermehrte.

# Ueber *Fermentoleum Ericae vulgaris*

von

Dr. Bley.

**D**ie von mir früher unternommene, im *Buch* *schon Repertorio für die Pharmacie* mitgetheilte chemische Untersuchung des Heidekrautes, *Hb. Ericae vulg.* hatte mir einige nicht uninteressante Resultate gegeben. Ich wünschte jetzt mich auch über das Vorhandensein, oder die Bildung eines ätherischen Oeles der Pflanze zu unterrichten und unterwarf daher circa 1 Pfd. des frisch gesammelten halbblühenden Krautes einer zuvoriger Gährung einer Destillation mit Wasser, hobirte das Destillat, versetzte es mit Kochsalz, welches es einen himbeerartigen Geruch zeigte, destillirte nochmals, um vielleicht schon ein ätherisches Oel abzuscheiden, von dem jedoch nur Spuren erhalten werden konnten. Das neue Destillat ward wieder mit Kochsalz versetzt und mit Schwefeläther geschüttelt, so daß dieser noch Geruch annahm, der Aether abgeschieden und für sich im Aschenbade destillirt. In der Retorte blieb das Aetheröl zurück, etwa 3 Drachmen an Gewicht, von folgender Beschaffenheit. Farbe: grünlichgelb. Spec. Gew.: leichter als Wasser. Geruch: grünlich eigenthümlich, nicht leicht mit einem andern zu verwechseln, doch entfernt an *Ol. Absynth. aeth.* erinnernd. Geschmack: flüchtig aromatisch, etwas süßlich und brennend, doch bei weitem geringer als beim *Fermentol. Vinifer.* Ueber der Weingeistflamme erwärmt, Gefäßfassend, mit heller hoher, ein wenig bläulich gefärbter Flamme brennend, keinen Rückstand lassend. Consistenz: dünnflüssig. Lackmus röthend. Mit Jod keine Detonation gebend, dasselbe aber schnell lösend. Mit Aetzalkali

milchichte Mischung darstellend, aus der sich nach einigen Tagen das Aetheröl unverändert abschied. Mit Ammoniak eben so sich verhaltend. Mit concentrirter Schwefelsäure gemischt, eine dunklere Farbe annehmend, ohne Veränderung des Geruchs. Mit rauchender Salpetersäure übergossen, in Wallung gerathend, unter Zerstörung des eigenthümlichen Geruches des Oeles, unter späterer Abscheidung weißer harziger Flöckchen, besonders beim Hinzukommen von Wasser. Mit Chlorwasser geschüttelt und hingestellt, wird der Geruch nach 3 Tagen nicht zerstört oder verändert. Mit Mandelöl eine etwas milchige Mischung gebend, ebenso mit Terpentinöl, welches den eigenthümlichen Geruch des Fermentols verdeckte. Harz und Wachs wurden bei der Digestion vom Aetheröl gelöst. Ob die anhängende Säure eine eigenthümliche oder nur Essigsäure sei, darüber müssen fernere Versuche entscheiden. Ob aber der hier *Fermentol* genannte Stoff Product oder Educt sei, für welche letztere Ansicht Hr. H. Reinsch sich erklärt, ist noch nicht gehörig erwiesen, ist am Ende auch ohne wesentlichen Einfluß. Gelegentliche Prüfungen mögen diese Frage aufklären.



## Beobachtungen zur Geschichte der Weinsäure;

von

*E. Soubeiran und H. Capitaine.*

Die merkwürdigen Beobachtungen von Dumas und Liebig, daß der Brechweinstein die Eigenschaft besitzt, durch Erhitzen 2 Aequivalente Wasser mehr



zu verlieren, als die andern weinsteinsauren schienen Versuchen, in der Absicht angest, dieser Character auch Tartraten zukomme, d dem weinsteinsauren Antimonoxyd-Kali analoge Zusammensetzung haben, einige Wichtigkeit zu auch liefs sich daraus vielleicht Aufklärung über d Constitution der Weinsteinsäure erwarten, ein gegenstand der Versuche beider genannten gesch Chemiker.

### *Weinsteinsaures Eisenoxyd-Kali.*

Unsere ersten Versuche waren auf das bi noch wenig gekannte weinsteinsaure Eisenoxyd-K richtet. So viel wir wissen, ist es nur von Ph analysirt, welcher darin 2 At. Weinsteinsäure, 1 A und  $\frac{1}{2}$  At. Eisenoxyd fand; der Sauerstoff des l zu dem des Kali ist 1,5:1. Unsere Versuche er dafs Phillips mit einem Salze operirte, welche Eisen nicht völlig gesättigt war.

Zur Darstellung des Doppelsalzes läfst man bitartrat und Eisenoxydhydrat, mit der nöthigen l Wasser gemengt, bei 50 bis 60° C. 24 bis 36 St lang digeriren, und darauf diese vom Ueberschu Eisenoxydhydrats abfiltrirte Auflösung in mäßiger V in der Trockenstube auf flachen Schalen verdu Das Salz erhält man dann in Form brauner fast schw glänzender Schuppen, die beim durchfallenden l rubinroth erscheinen. Die Analyse dieses bei 10 getrockneten Salzes ergab dessen Zusammensetzun

|                                                                         |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1 At. Eisenoxyd .....                                                   | 978,41        | 30,2       |
| 1 „ Kali .....                                                          | 559,92        | 18,2       |
| 1 „ Weinsteinsäure (C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> O <sub>10</sub> ) ... | 1661,41       | 51,4       |
|                                                                         | <hr/> 3229,75 | <hr/> 100. |

Dieses Salz hat also dieselbe Zusammensetzung wie der Brechweinstein ohne Krystallwasser; das Antimon-oxyd ist durch Eisenoxyd ersetzt.

Unsere Versuche zur Bestimmung der Menge des Wassers, welche das weinsteinsaure Eisenoxyd-Kali bei einer Temperatur über  $100^{\circ}$  C. verlieren könnte, haben zwar das erwünschte Resultat nicht gegeben, haben uns jedoch eine bemerkenswerthe Eigenschaft dieses Salzes gezeigt. Bei einer Temperatur nämlich, die  $130^{\circ}$  C. nicht übersteigt, wird das Eisenoxyd unter gleichzeitiger Entwicklung von Wasser und Kohlensäure reducirt. Durch diese leichte Zersetzung des Salzes ist es, wie man sieht, durchaus ungeeignet zur Aufhellung unserer Flüssigkeit, aber es erklärt einen Umstand, den wohl die Chemiker, die mit der Darstellung dieses Salzes sich beschäftigten, beobachtet haben, dafs, wenn die Auflösung des Salzes über freiem Feuer abgeraucht wird, der trockne Rückstand in Wasser oft schwerlöslich ist. Dieses rührt davon her, dafs die Temperatur zu dem Ende stieg, dafs eine partielle Desoxydation des Eisens stattfand.

Noch auffallender beobachteten wir diese leichte Reduction, als wir versuchten, ein Doppelsalz darzustellen, in welchem der Sauerstoff des Kali zu dem des Eisens wie 1:1 und 1:2 sich verhielte. Es wurde desoxydirt saures weinsteinsaures Kali mit der entsprechenden Menge Eisenoxyd und Wasser gekocht. Anfangs erhob sich die Flüssigkeit durch Aufnehmen von Eisenoxyd stark, bald aber wurde sie fast farblos, während sich ein kaum gefärbter Bodensatz bildete, der aus weinsteinsaurem Eisenoxydul bestand. Dieselbe Erscheinung tritt ein, wenn man ein Gemenge von saurem weinsteinsaurem Kali und weinsteinsaurem Eisenoxyd-Kali, und

selbst wenn man eine Auflösung des letzten Salzes kocht. Man begreift jetzt leicht, warum wir empfehlen, das Doppelsalz bei einer Temperatur von 50 bis 60 ° C. darzustellen, und daß man bei Ueberschuß von Eisenoxyd Auflösungen erhalten die nicht völlig mit Eisenoxyd gesättigt sind. Das war wahrscheinlich auch bei Phillips Versuch der Fall, und auch bei unsern ersten Arbeiten, wo bei jeder Operation ein Salz von verschiedener Zusammensetzung erhielten. \*)

*Weinsteinsaures - borsaures Kali.*

Das weinsteinsaure - borsaure Kali (*Cremor solubilis*) hat bei völliger Sättigung mit Borsäure \*\* dem Brechweinstein und dem weinsteinsauren Oxyd-Kali, beide bei 100 ° C. getrocknet, correspondende Zusammensetzung. Der Sauerstoff der Borsäure verhält sich zu dem des Kali wie 3 : 1. Da nach den Versuchen mit diesem Salze nicht leicht eine Reduction der Borsäure vor sich gehen kann, so versuchten wir zu bestimmen, ob der Boraxweinstein in der Weise nicht auf gleiche Weise sich verhalte wie der Brechweinstein. Es ergab sich hieraus, daß man das Salz bei 285 ° C. erhitzen konnte, ohne daß Zersetzung eintrat und daß es darnach noch eben so löslich in Wasser war als zuvor. Es gaben nun:

Boraxweinstein bei 100 ° C.

getrocknet und dann bis 280 °

erhitzt:

5,642 Grm.

3,535 „

2,872 „

Verlust an

Wasser:

0,464 Grm. = 0,8227 Proc.

0,285 „ = 0,8060 „

0,230 „ = 0,8008 „

\*) Vergl. die Versuche von Dulk und von Wackenroder in diesem Bande S. 65. D. Red.

\*\*) Es ist hier das Präparat der *Pharm. gallica* gemeint. In den früheren Versuchen von Dulk, auch Storch, S. 72. D.

Wenn man annimmt, daß der *Cremor tartari solubilis* wie der Brechweinstein, unter den angeführten Umständen 2 At. Wasser verliert, so ergiebt die Theorie 8,37 Proc. Der *Cremor tartari solubilis* verhält sich also in der in Rede stehenden Beziehung wie Brechweinstein \*).

Wir hätten gern noch andere weinsteinsaure Verbindungen untersucht, um zu sehen, ob sie sich dem Brechweinstein analog verhielten, und namentlich das Antimonoxysalz des einfachen weinsteinsäuren. Antimonoxysalz gelang es uns nicht, dieses Salz rein darzustellen; in den Handbüchern befindlichen Vorschriften führten wir zu keinem Resultate. Die besten Erfolge erhielten wir durch Sättigen einer Auflösung von Weinsteinsäure mit Antimonoxysalz, Einengen und Fällen durch Alkohol. Aber auch in diesem Falle erhält man sicher nur Gemenge verschiedener Sättigungsstufen; von jeder Operation erhält die Analyse verschiedene Quantitäten von Antimonoxysalz. Wir haben allerdings gefunden, daß das bei

Bei meinen früheren Versuchen über *Cremor tartari solubilis* erhielt ich ein mit Borsäure völlig gesättigtes Salz; dieses Mal fanden wir große Schwierigkeiten, das reine Salz darzustellen. Wenn man das Auswaschen mit Alkohol nicht lange genug fortsetzt, so bleibt Borsäure gemengt mit dem Salze; wird das Auswaschen zu lange fortgesetzt, so wird *Cremor tartari solubilis* zersetzt, indem ihm dann auch ein Theil der zu seiner Zusammensetzung gehörigen Borsäure entzogen wird. Am besten ist es, eine concentrirte Auflösung des *Cremor tartari solubilis* durch Alkohol zu fällen und die gefällte weiche Masse unter Zerreiben mit Alkohol zu erwärmen. Da der *Cremor tartari solubilis* unkrystallisirbar ist und sein Ansehen durch einen Ueberschuß oder Mangel an Borsäure keine Veränderung erleidet, so hat man zur Erkennung seiner Reinheit eigentlich kein anderes Mittel als die Analyse durch chroms. Blei, oder die Bestimmung des Wassers, welches er in höherer Temperatur verliert.

100° C. getrocknetes Product bei 250° eine neue Quantität Wasser verliert; da wir aber nur mit geringen Producten zu thun hatten, so haben wir es für unangebracht gehalten, die Grösse dieses Verlustes zu bestimmen.

Der Verlust von 2 At. Wasser, welche der Brechweinstein durch Erhitzen bei 250° C. verliert, führt nothwendig zu dem Schluss führen, dass er nicht die Säure  $C_8 H_8 O_{10}$  enthalten kann. Liebig hat zwei Hypothesen aufgestellt, nach der ersten, als unwahrscheinlich betrachtet, nimmt er an, dass das Wasser gebildet in der Weinsteinsäure enthalten sei und bei 250° abgesondert werde; nach der zweiten Theil des Antimonoxydes durch einen Theil Wasserstoff der Säure reducirt und dadurch das bei dem Versuch ausgegebene Wasser gebildet werden. Liebig nimmt diese Hypothese vorzugsweise an und so dass man die wahrscheinliche Gegenwart einer Bor-Verbindung im Zustande des Metalls in einer Verbindung mit Sauerstoffsäure nicht mehr als bloße Hypothese betrachten könne.

Diese partielle Reduction des Antimonoxydes von zwei Drittel als Metall in eine Verbindung überzugehen, während ein Drittel im Zustande des Oxydes blieb, scheint keine grosse Wahrscheinlichkeit für sich zu haben. Wenn man den Brechweinstein oder *Cremor tartari solubilis* vorsichtig erhitzt, so dass allein die organische Materie zersetzt wird, so findet man in Wahrheit in dem Rückstande von Brechweinstein Antimon, metallisches vielleicht, welches sich in verdünnten Säuren nicht auflöst: aber in dem kohlenstoffigen Rückstande von *Cremor tartari solubilis* kann man keine Spur von Bor entdecken, weil dieser Körper der Reduction mehr widersteht als Antimonoxyd.

Liebig betrachtet als einen Hauptbeweis gegen



Die der Präexistenz der 2 Atome Wasser im Brechstein, als solches, die Bildung der Oxalsäure und Essigsäurehydrats bei der Zersetzung eines weinsteinsäuren Salzes durch einen Ueberschuß von kaustischem Kali. »Wenn man annimmt, sagt Liebig, daß die Weinsteinsäure 2 At. gebildetes Wasser enthält, so kann man auch annehmen, daß die als wasserleer betrachtete Essigsäure entweder 1 At. Wasser enthält, und sich bildet durch Aufnahme eines At. Wasser, welches in einen Zustand übergeht, in welchem es durch nichts mehr ausgeschieden werden kann.« Man sieht die Schwierigkeit, nach Liebig, liegt in der Annahme, daß die Elemente des Wassers, die im Zustande des Wassers in der Weinsteinsäure vorhanden sind, bei dem Uebergange in Essigsäure in einem andern chemischen Zustande in dieser sich finden könnten. Dieses kann aber bei einer solchen Molekular-Störung, durch welche die Weinsteinsäure in zwei verschiedene Säuren umgewandelt wird, nicht auffallen.

Man kann auf eine eben so leichte als einfache Weise die Zusammensetzung der Weinsteinsäure und der weinsteinsäuren Salze ausdrücken, wenn man für das Aequivalent der Säure die Formel  $C_8 H_4 O_8$  adoptirt und annimmt, daß die Säure stets mit 4 At. Base, Wasser oder Metalloxyd, verbunden sei, von denen 2 Atome stärker angezogen würden als die andern. Bezeichnen wir die Weinsteinsäure,  $C_8 H_4 O_8$ , mit T, so haben wir folgende Zusammensetzungen:

- $T + 2H_2 O + H_2 O, H_2 O$  = krystallis. Weinsteinsäure,
- $T + 2H_2 O + H_2 O, K O$  = saures weinsteins. Kali,
- $T + 2H_2 O + K O, K O$  = neutrals. weinsteins. Kali,
- $T + 2H_2 O + K O, N O$  = Seignettsalz,
- $T + 2H_2 O + Pb O, Pb O$  = weinsteins. Bleioxyd.

Die bekannten basischen Salze sind :

$T + 2 H_2 O + K O, Sb_2 O_3 =$  Brechweinstein, bei  $100^{\circ}C.$  getrocknet

$T + 2 H_2 O + K O, Fe_2 O_3 =$  weinsteins. Eisenoxyd - Kali,

$T + 2 H_2 O + K O, B O_3 =$  *Cremor tart. solub.*

Werden diese bei  $100^{\circ} C.$  getrockneten basischen Salze weiter erhitzt, so verlieren sie ihren Wassergehalt, den sie noch als Basis enthalten, aber wegen Ueberschusses der Base bleibt die Constitution der Tartrate erhalten. Es erklärt sich hieraus, wie die basischen Tartrate die einzigen sind, die 2 At. Wasser durch die Wärme verlieren können; die andern enthalten keine Base, die jene ersetzen könnte. Diese Theorie soll ebenso wenig, als jede andere, als der wahre Ausdruck der Erscheinungen angesehen werden; sie hat indess wenigstens den Vortheil, den Resultaten der Versuche über Weinsteinsäure und die weinsteinsauren Salze zu einer einfachen Form zu entsprechen \*).

Im Laufe unserer Versuche wollten wir auch die directe Wirkung von *Cremor tartari* auf Antimonoxyd basische Salz darstellen, welches einige Chemiker den Mutterlaugen vom Brechweinstein annehmen. Wir ließen 1 At. *Cremor tartari* (24,64 Grm.) und 2 At. Antimonoxyd (38,26 Grm.) mit 400 Grm. Wasser kochen, nur die Hälfte des Antimonoxyds wurde aufgelöst, und die Flüssigkeit gab bis zu Ende nur gewöhnlichen Brechweinstein. Eben so wenig gelang es, ein nicht basisches weinsteinsaures Antimonoxyd - Kali zu erhalten; die Flüssigkeiten gaben immer geschiedene Krystalle von Weinstein und Brechweinstein. (*Journ. de Pharm.* XXV, 73)

\*) Vergl. die Versuche und Ansichten Liebig's über die Gegenstand in Bd. XVI, 2. R. S. 90 u. 99 dieser Zeitschrift.

## Darstellung von Stickgas;

von

*Ph. Lübeckind.*

Es ist mir gelungen, eine recht schöne Methode zu finden, um Stickstoffgas in ziemlicher Menge und ohne viele Mühe zu gewinnen. Dies bewerkstelligt man, wenn man den gewöhnlichen käuflichen Chilisal-  
 peter in einem hessischen Schmelztiegel so lange glühet, bis eine herausgenommene Portion, aufgelöst, eine stark salpetrische Reaction zeigt. Das geschmolzene Salz enthält dann salpetrichsaures Natron und löst man dieses in Wasser auf und gießt Salmiaklösung zu und bringt zum Kochen, so entweicht unter Aufbrausen reines Stickstoffgas. Es bildet sich hierbei offenbar durch eine gegenseitige Zersetzung salpetrichsaures Ammoniak und Chlornatrium und das erstere zersetzt sich dann in gasförmigen Stickstoff und in Wasser, da die Salpetrichsäure 3 At. Sauerstoff und das Ammoniak 6 At. Wasserstoff enthält, welche sich in der Wärme mit einander vereinigen, um Wasser zu bilden, wodurch sowohl der Stickstoff der Säure wie der des Ammoniaks in freiem Zustande auftritt.

## Beobachtungen einer merkwürdigen Eigenschaft der Schwefelsäure;

VON

*Chr. Hansmann.*

Ein gut mit einem Glasstöpfel verschlossenes zur Hälfte mit Schwefelsäure von 1,77 spec. Gew. bei +

9 R. gefülltes Glas stand längere Zeit an einem Orte, wo es einer Kälte von mehreren Graden unter 0 R. ausgesetzt war. Außen am Glase waren Wasserdünste angefroren als dicker Reif, jedoch die Säure darin war durchaus flüssig. Da nun zufällig —  $5\frac{1}{2}$  R. das Glas geschüttelt wurde, so entstand bald ein Knistern darin, auf der Oberfläche der Säure setzten sich zu Boden sinkende Krystalle, worunter einzelne bis zwei Zoll lange theils abgestumpfte theils zugespitzte Prismen befanden, die von den sich später bildenden kleinern prismatischen Krystallen überdeckt wurden, bis die ganze Flüssigkeit krystallisirt war. Obgleich das Glas mit der Säure in derselben Temperatur blieb, so wurde doch während der Krystallisation viel Wärme frei, daß nicht allein das als Reif am Glase gefrorene Wasser aufthaute, sondern auch die frei gewordene Wärme durch die Hand wahrnehmbar wurde. Es war daher interessant, die hierbei frei gewordene Wärme mittelst des Thermometers zu schätzen, und das zu diesem Zwecke in die krystallisirende Säure gestellte Thermometer stieg bis zu  $+ 8^{\circ}$  R.

Obgleich bekannt genug ist, daß Wärme frei wird, wenn Körper aus dem flüssigen in den festen Aggregatzustand übergehen, so muß doch dieser Unterschied von  $- 5\frac{1}{2}$  bis  $+ 8$  R. als sehr bedeutend erscheinen. Die Schwefelsäure blieb später bei  $+ 5^{\circ}$  R. flüssig und wurde erst allmählig wieder flüssig in einer Temperatur zwischen 6 und 7 über 0 R. Diese beobachtete Eigenschaft der Schwefelsäure weicht von der in *Berzelius Lehrb. d. Chemie Bd. 2. pag. 17 u. 18* angeführten Eigenschaften so wie von der von *Bastmann im Jahrb. f. pract. Ph. von 1838. p. 203* mitgetheilten sehr ab, und schien deshalb mittheilenswerth.

Die Schwefelsäure durch diese Krystallisation im hermetisch verschlossenen Gefäße specifisch leichter geworden war, wie von Bassermann am angeführten Orte angegeben wird, konnte nicht beobachtet werden, da das spec. Gew. der Säure nicht vor dem Krystallisiren von mir erforscht war und die Wiederholung des Versuchs durch die eingetretene gelindere Temperatur verhindert wurde.

*Anmerkung.* Die von Hrn. Hansmann hier mitgetheilte Beobachtung vermehrt die Anzahl der Fälle, wo aufgelöste krystallisirende Körper in der Ruhe und vornämlich bei Abschluß der in Bewegung befindlichen Atmosphäre tief unter ihrem Erstarrungspunct erkältet werden können. Der Herr Verf. hatte es offenbar mit dem dritten Schwefelsäurehydrat,  $\text{S O}_3 + 2 \text{H}_2 \text{O}$ , dessen specifisches Gewicht 1,750 und dessen Gefrierpunct die Temperatur von  $+4^\circ \text{C}$ . ist, zu thun. Das Steigen der Temperatur um  $13^\circ, 5 \text{ R}$ . ist daher erklärlich. Ein ausgezeichnetes Beispiel von Temperaturerhöhung während der Krystallisation des essigsauren Natrons, so daß die Erhitzung dem Gefühle fast unerträglich wurde, habe ich B. XV. 2. R. H. 2. dieses Archivs angeführt.

H. Wr.

## Leichte Darstellung einer reinen Borsäure;

von

H. Wackenroder.

Die Borsäure wird gegenwärtig nur noch so selten als Medicament benutzt, daß eine Vorschrift zur Bereitung derselben nicht mehr in alle neueren Pharmacopöen aufgenommen worden ist. Gleichwohl findet sich diese Säure noch sehr häufig in den Apotheken vor, weil sie zu Kunstfeuern und verschiedenen technischen Zwecken verwendet wird. Ihre Anwendung bei Löthversuchen ist außerdem bekannt genug. Es kann



daher wohl der Fall eintreten, wo es wünsche  
erscheint, die Borsäure zu möglichst billigem Pro  
zugleich von möglichster Reinheit darstellen zu  
da selbst eine geringe Beimengung von Schwefelsäure  
die Benutzung der Borsäure, namentlich zu chemischen  
Versuchen beeinträchtigen kann. Aus diesem Grunde  
haben wir in dem Laboratorio unseres pharmaceutischen  
Instituts einige vergleichende Untersuchungen, an  
Hr. Ed. Fischer und Hr. B. Goos Antheil habend, an  
gestellt, um die bisher gewöhnlich befolgte Methode  
möglich zu vervollkommen.

Die von der Preussischen Pharmacopöe gegebene  
Vorschrift ist die bekannte, welche zuweilen man  
findet, doch wie mich dünkt nicht ganz genügender  
Specificationen von den Handbüchern der Pharmacie  
falls angegeben wird. Zwei Punkte scheinen mir  
versucht ausgemittelt werden zu müssen, ob man  
keine zu grosse Menge der Borsäure von der über  
schüssigen Schwefelsäure zurückgehalten werde, und ob  
die Borsäure von einer Beimischung von Schwefelsäure  
oder vielleicht auch schwefelsaurem Natron ohne  
Anwendung von Glühhitze oder Weingeist rein dar  
stellen lasse.

Es wurden also, gemäß der Vorschrift der  
Pharmacop. Bor., 40 Grm. Borax in 100 Grm. warmen  
Wasser aufgelöst, der Auflösung aber 10 Grm. rectif.  
conc. Schwefelsäure hinzugemischt. Die nach 24  
Stunden ausgeschiedene Borsäure wurde durch ein Filter  
abgesondert, mit kaltem Wasser mehrere Male  
gespült, wieder in wenig heissem Wasser aufgelöst  
zum Krystallisiren gebracht. Nachdem sie abermals  
mit kaltem Wasser auf dem Filtrum etwas abgewaschen  
und bei gelinder Wärme, etwa von 30° C., getrocknet

wurden, betrug ihr Gewicht 14,34 Grm., also beinahe 50 Proc. des aufgewendeten Borax. Aus den Waschwässern und den Mutterlaugen wurde auf gleiche Weise noch eine zweite Portion Borsäure, an Gewicht 5 Grm. gewonnen; indessen war diese noch stark mit Schwefelsäure verunreinigt. Die zuerst erhaltene Borsäure konnte dagegen für so rein gehalten werden, wie es die Pharmakopöe verlangt; denn etwa 10 Gran derselben in hinreichendem Wasser aufgelöst, gaben mit einer verdünnten Lösung von Chlorbaryum nur eine ziemlich starke Trübung, die erst beim Stehen der Flüssigkeit in einen keinesweges bedeutenden Niederschlag überging. Hierbei entstand nun die Frage, ob dieser Rückhalt von Schwefelsäure an die Borsäure, wie man annehmen pflegt, gebunden, oder als schwefelsaures Natron der Borsäure beigemischt sei. Dieses konnte sehr leicht mittelst des *neutralen* salpetersauren Quecksilberoxyds, wie ich bereits in meiner Anleitung (pag. 358) angeführt habe, ausgemittelt werden. Die verdünnte Auflösung dieses Reagens giebt nämlich mit sehr wenig Schwefelsäure eine sehr geringe gelbe, oder auch wohl gar keine Trübung, während eine Spur von schwefelsaurem Natron einen verhältnißmässig starken, schön citrongelben Niederschlag hervorbringt. Die Borsäure giebt damit nur einen geringen weissen Niederschlag, auch hebt sie die Reaction der freien Schwefelsäure fast ganz, aber die des schwefelsauren Natrons gar nicht auf. Da nun eine neue Auflösung von 10 Gran der reinen Borsäure mit salpetersaurem Quecksilberoxyd nur eine geringe weisse Trübung und erst nach Verlauf von 24 Stunden einen geringen, weißlichgelblichen, flockigen Niederschlag gab, und da derselbe Erfolg Statt hatte, wenn der Auflösung zuvor ein wenig Schwefel-

säure beigefügt worden, während der geringste Zusatz von schwefelsaurem Natron zu der Borsäure vor oder nach der Vermischung mit salpetersaurem Quecksilberoxyd die momentane Erzeugung eines starken, pulverigen, intensiv citronengelben Niederschlags bewirkt, so folgt daraus unwiderruflich, daß die Borsäure keine Spur von schwefelsaurem Natron, sondern nur eine starke Spur Schwefelsäure enthielt. Es ist daher klar, daß ein Auflösen der Borsäure in Spiritus keine Reinigung derselben bewirken kann, es sei denn durch eine Zerstörung der Schwefelsäure durch den Weingeist, erhöhter Temperatur. Man würde dasselbe aber auch wohl leichter erreichen, wenn man der in ihrem Kristall- und Hydratwasser schmelzenden Borsäure ein Minimum von einem beständigeren organischen Stoffe, z. B. Zucker, hinzufügte. Durch bloßes Glühen der obigen Borsäure in einem Platintiegel wurde ihr auch wirklich nicht die letzte Spur von Schwefelsäure entzogen, da die Auflösung der geschmolzenen Säure durch Chlorbaryum noch eine merkliche Trübung erlitt. Möglich, aber nicht wahrscheinlich ist es, daß das Glühen der Borsäure nicht lange genug fortgesetzt wurde. Auf jeden Fall gehört dazu ein Platintiegel, und für die Bereitung größerer Mengen von Borsäure ein bedeutend größerer. Man kann daher der Vorschrift der Pharmakopöe gewiß nicht das Epitheton einer practisch ausführbaren beilegen. Uebrigens aber bestätigen meine Versuche die Angabe der Pharmakopöe, daß auch die geglühte Borsäure noch Schwefelsäure enthalte.

Die angeführten Ungelegenheiten glaubte ich durch Anwendung der Salzsäure beseitigen zu können, und fand diese Vermuthung auch vollkommen bestätigt. Bei einer noch warmen Auflösung von 40 Grm. Borax in

160 Grm. Wasser wurden 25 Grm. Salzsäure von der gewöhnlichen Stärke hinzugemischt. Nach 24 Stunden wurde die auskrystallisirte Säure durch ein Filtrum getrennt und einige Male mit kleinen Mengen kalten Wassers abgewaschen. Sie wurde durch Auflösen in wenigem heißem Wasser, Umkrystallisiren und Abwaschen mit kaltem Wasser gereinigt, hierauf getrocknet, und wog alsdann 17 Grm. Die Mutterlaugen und Abwaschwasser lieferten noch 3 Grm. getrocknete Borsäure von derselben Beschaffenheit, was denn zusammen 50 Procent des verbrauchten Borax ausmacht. Es leidet jedoch keinen Zweifel, daß von den verloren gegangenen 14 bis 15 Procent Borsäure der grössere Theil noch leicht würde abzuscheiden gewesen sein, wenn grössere Mengen von Borax zu zerlegen für paßlich gehalten wäre. Beide Portionen der Borsäure zeigten sich übrigens so rein von Salzsäure oder Chlornatrium, daß eine Auflösung von 10 Gran derselben in Wasser mit salpetersaurem Silberoxyd nur ganz schwach opalisirte und erst nach langem Stehen einige höchst geringe Flocken von Chlorsilber absetzte. Rührte diese unbedeutende Spur des Chlors von anhängender Salzsäure her, so mußte die Borsäure doch durch Schmelzen und Glühen in einem Platintiegel vollkommen vom Chlor befreit werden. Ein Versuch wies die völlige Richtigkeit dieser Voraussetzung nach. Indessen konnte der Borsäure anstatt der Salzsäure auch eine Spur Chlornatrium beigemengt sein, welches beim Schmelzen der krystallisirten Borsäure zersetzt und in borsaures Natron verwandelt wurde. Als aber eine Portion der Borsäure mit ganz wenig Kochsalzlösung befeuchtet und nun im Platintiegel geschmolzen wurde, so ergab sich, daß die Borsäure nun keinesweges mehr durch das Glühen von ihrem

Chlorgehalte befreit worden war. War demnach Chlorwasserstoffsäure das Verunreinigende der Borsäure, so konnte wahrscheinlich das Glühen der letztern, wovornämlich das Lästige der bis jetzt üblichen Methode liegt, vermieden und durch das bloße Verwitternlassen der Borsäure bei allmählig bis zu einigen Graden über 100° C. steigenden Wärme ersetzt werden. Daß aber hierzu eine Porcellanschale ohne alle Befürchtung einer Verunreinigung der Borsäure benutzen können ist klar. Die in dieser Hinsicht angestellten Versuche gaben ein völlig befriedigendes Resultat. Die so verteilte Borsäure erwies sich nämlich als chemisch reiner oder wenn die Einwirkung der mäßigen Wärme nicht lange genug gedauert hatte, so waren doch nur kaum wahrnehmbare Spuren von Salzsäure zu entdecken. Ich bin daher überzeugt, daß die Anwendung der Salzsäure zur Darstellung der Borsäure in jeder Hinsicht vorzuziehen ist der bisherigen Benutzung der Schwefelsäure zu gleichem Zwecke. Das Verwitternlassen der durch Salzsäure abgeschiedenen Borsäure scheint mir um so angemessener, als ich glaube bemerkt zu haben, daß die Glasflasche, worin eine noch etwas Salzsäure enthaltende Borsäure ein Jahr lang aufbewahrt worden war, in Folge der Verflüchtigung der Salzsäure unklar geworden war.

---

## Chemische Notizen;

von

*Rudolph Brandes.*

---

**D**ie nachstehenden Notizen gehören zu Erfahrungen, die in meinem Laboratorjo bei verschiedenen, meine



helfen und Eleven übertragenen Arbeiten gemacht worden, und deren Mittheilung, wie sich Gelegenheit bietet, fortgeführt werden wird.

## I.

*Entstehung von Ameisensäure aus Korksäure.*

1 Th. Korksäure wurde mit 4 Th. Mangansuperoxyd und 1 Th. Schwefelsäure, die zuvor mit eben so viel Wasser verdünnt war, einer Destillation unterworfen. Die Destillation wurde bis zur Trockne des Rückstandes fortgesetzt, und das Destillat abgenommen. Bei verstärkter Hitze entwickelte sich aus dem Rückstande eine helle ölartige Flüssigkeit, die im Halse der Retorte wieder erstarrte, deren Menge aber zu gering war, um sie einer weiteren Untersuchung unterwerfen zu können.

Die zuerst abdestillirte Flüssigkeit roch scharf und stechend sauer, der Ameisensäure ähnlich; sie wurde zur Entfernung der mit übergegangenen Schwefelsäure mit kohlensaurem Baryt neutralisirt, nach Filtration im Wasserbade verdunstet und ein blättrig-krystallinisches, ziemlich leichtlösliches Salz erhalten. Die Auflösung wurde durch salpetersaures Silberoxyd und salpetersaures Quecksilberoxydul auf Ameisensäure geprüft; die Basen der oben angeführten Metallsalze wurden schon in der Kälte bald reducirt. Hieraus und aus den übrigen Eigenschaften des Destillats ergiebt sich die Anwesenheit der Ameisensäure zur Genüge. Unter den vielen Substanzen, die unter denselben hier angeführten Umständen in Ameisensäure verwandelt werden, ist also auch die Korksäure.

## II.

*Verbindung von Jod und Antimon unter heftiger Explosion.*

Es war eine mehre Unzen betragende Mischung von Jod und Antimon durch Zusammenreiben beider Körper angefertigt, und sollte dieselbe zur Darstellung von

reinem Jodantimon noch destillirt werden. Die Mischung wurde nach dem Zusammenreiben sogleich in eine Retorte gegeben, die auf ein Stativ gestellt wurde; keine Wärme war angebracht, als plötzlich mit einem donnerähnlichen Knall die Retorte zerschmettert wurde. Die Verbindung war also im Moment vor sich gegangen, ein Theil des gebildeten Jodantimons war zu einem dichten Kuchen geschmolzen auf die Unterlage des Stativs geflossen, ein anderer fein zertheilt an die Decke des Zimmers gespritzt. Glücklicherweise war Niemand dabei beschädigt.

Es ist nach vorstehender Erfahrung zu rathen, bei der Darstellung des Jodantimons nur kleine Mengen Jod und Antimon zusammenzumischen, diese erst eine Zeit stehen zu lassen, wo die Verbindung schon selbst vor sich geht, und dann erst die Destillation vorzunehmen.

### III.

#### *Darstellung von Gerbstoff, nach Beral.*

Für die Anwendung eines guten und reinen Gerbstoffs in der Pharmacie, wie in den Künsten, ist es sehr erwünscht, ein geeignetes und leicht ausführbares Verfahren zur Darstellung dieses Körpers zu kennen. Im *LXI. Bde. S. 309 dieser Zeitschrift* wurde daher eine Methode zur Darstellung des Gerbstoffs von Beral mitgetheilt, da sie ein gutes Resultat zu ergeben scheint, und zur näheren Prüfung derselben dieses Verfahren wiederholt. 1 Pfd. Galläpfelpulver wurde in einem Macerationsapparate mit einem Gemisch von 24 Unzen Aether, 6 Unzen Alkohol von 95  $\frac{0}{100}$  R. und 2 Unzen Wasser behandelt. Nachdem etwas über die Hälfte der Flüssigkeit abgetröpfelt war, wurde Wasser nachgegeben, und damit so lange fortgefahren, bis die ätherische

flüchtigkeit ausgetrieben war. Die so erhaltene Auflösung betrug 30 Unzen. Von dieser wurde der Aether wieder abdestillirt, und man erhielt 20 Unzen wieder, zurückblieben gegen 7 Unzen einer dunkelbräunlichen schwarzen schmierigen Masse, die im Wasserbade so weit verdampft wurde, daß sie sich in Stangen ausrollen ließ, die nun eine hellbräunliche Farbe besaßen, und im Trockenofen zur vollständigen Trockne gebracht und dann zu Pulver zerrieben wurden. Dieses Pulver hatte eine schöne gelblich weiße Farbe, und wog  $5\frac{1}{2}$  Unze. Der Ausbeute ist zwar nun nicht so groß, als Beral angibt, was in verschiedenen Ursachen liegen kann; jedoch ist das Verfahren leicht ausführbar und zweckmäßig, und der Medicin wie der Pharmacie dadurch ein Dienst geleistet, wenn erstere der Anwendung reiner und guter Arzneistoffe die gebührende Aufmerksamkeit widmet, wie es sich gebührt.

## IV.

*Schwefelsaures Eisenoxydul.*

Professor Wackenroder hat angegeben, wie man aus den Auflösungen, die bei Entwicklung von Schwefelwasserstoff aus Schwefeleisen durch Schwefelsäure gebildet werden, ein sehr schönes schwefelsaures Eisenoxydul darstellen kann, welches in durchsichtigen gelblichweißen Krystallen erscheint. Auch wir haben dieses Salz hiernach in vorzüglicher Schönheit erhalten. Im LXIX. Bde. S. 64 dieser Zeitschrift ist eine andere Bereitungsmethode eines reinen schwefelsauren Eisenoxyduls von Berthelot mitgetheilt, die einer Wiederholung unterworfen wurde. 500 grünes schwefelsaures Eisen wurden in 550 destillirtem Wasser in der Siedhitze aufgelöst, dann 8 Eisenfeile zugegeben und nach einigem Umschütteln und kurzer Ruhe die Auflö-

sung in eine Flasche filtrirt, in welcher eine M von 375 Alkohol von 75 % und 8 Schwefelsäure vorhanden war. Das schwefelsaure Eisenoxydul, dem den Alkohol das Wasser, sein Lösungswasser, entzogen wurde (Krystallwasser verliert es dadurch nicht), setzte sich, so wie seine Auflösung in die spirituöse Flüssigkeit tröpfelte, in kleinen fast weissen Krystallen ab, nur einen kaum merklichen Stich ins Blaue zeigend. Man schüttelte öfters um, um zu verhindern, dass grössere Krystalle anhäuften, sammelte dann das entstandene Krystallmehl auf einem Filter, welches mit Alkohol ausgewaschen und zwischen Fließpapier getrocknet wurde.

## V.

*Eisenoxydul - Oxyd.*

Die von Preufs kürzlich in den *Annalen der Pharmacie* bekannt gemachte Vorschrift zur Darstellung von Eisenoxydul - Oxyd auf nassem Wege fand sich bestätigt. 4 Th. *Ferr. metallic. pulv.* und 5 Th. *oxydat. fuscum* liess man mit der 2—3fachen Menge Wasser in einem Kolben mehrere Tage in Digestion wärme stehen. Das Gemenge nahm nach und nach eine schwarze Farbe an; das entstandene Oxydul - Oxyd wurde von dem noch dabei befindlichen metallischen Eisen durch Abschlemmen gereinigt, und so ein schönes Präparat erhalten. Dafs dasselbe bedeutende Vorzüge besitzt, wird dem nach der Pharmakopöe dargestellten Präparat nicht giebt sich von selbst.

(Fortsetzung folgt.)

---

## Dritte Abtheilung.

**Naturgeschichte.****Ueber den allgemeinen Character der Vegetation auf der Insel Cuba.**

Aus einem in der botanischen Section der Naturforscherversammlung im September 1839 zu Pyrmont gehaltenen Vortrage;

von

*Dr. Louis Pfeiffer* in Cassel.

Wenn ich mir erlaube, über den allgemeinen Character der cubanischen Vegetation nach eigener Anschauung einige Bemerkungen vorzutragen, so scheint es mir passend, mich für jetzt in sehr allgemeinen Gränzen zu halten, da die Details viel zu reich sind, um mehr als einen geringen Theil derselben hier mittheilen zu können, und von zu gleichmäßigem Interesse, als daß man sie auf Unkosten der übrigen hervorheben könnte.

Ueber die Lage und klimatischen Verhältnisse der Insel brauche ich nichts zu sagen: in dieser Beziehung ist dieselbe wohl schon genugsam bekannt. Nur merke ich, daß die ganze Flora genau der Lage zwischen den Tropen, doch sehr nahe an deren nördlicher Gränze entspricht. Die gesammte Vegetation ist tropische, doch fehlt eine große Menge der Formen, welche in der Nähe des Aequators die vorherrschenden sind, wie überhaupt viele nur dem tropischen Festlande angehörige Familien, ganz. Dagegen schließt sich die Flora durch manche Verbindungsglieder der süd-europäischen nahe an, und zeigt hinsichtlich der

st  
r der  
ch der



Gattungen einige Verwandtschaft mit derselben, auch in Beziehung auf die Arten wohl eine ziemlich strenge Trennung anzunehmen sein möchte. — Dies ist die Folge des während der Hälfte des Jahres gemäßigten Klimas, indem von November bis Ende April die durchschnittliche Temperatur die unserer südlichen Sommer kaum übertrifft. Dazu kommt noch, in dieser Zeit während der Nächte die Temperatur bedeutend sinkt, bei herrschendem Seewinde häufig auf  $5^{\circ}$  R., ja in seltenen Fällen (was ich jedoch selbst erlebte) fast bis zum Gefrierpunkte. Freilich dann nach der Regenzeit die Hitze desto größer und gleichmäßiger, wird jedoch während des ganzen Jahres durch die ziemlich regelmässig Vormittags eintretende Seebrise, und durch den reichlichen nächtlichen Tau in Schranken gehalten.

Alle diese Umstände vereinigen sich, um der Fauna von Cuba einen Character zu geben, der selbst von der zunächstgelegenen Inseln Haiti und Jamaika beträchtlich abweicht. Beide liegen südlicher und sind wärmer, beide von mehr zusammengedrängter Form und von höheren Bergketten durchzogen. Auch Cuba hat einen ziemlich zusammenhängenden Gebirgszug, dessen höchste Kuppen sich in der Gegend des Cap Maisie der Ostküste befinden, da wo nach Humboldt's wichtiger Annahme die drei Inseln, Cuba, Haiti und Jamaika, ehemals durch einen nun eingesunkenen höchsten Punct vereinigt gewesen sein mögen. Von jenem Puncte zieht sich eine allmählig niedriger werdende Gebirgskette nach Westen; bald nördlich, bald südlich zum See sich annähernd, und die ganze lange und schmale Insel in zwei ungleiche, aber ziemlich deutlich begränzte Hälften theilend. Nur im Westen, wo bei Cap Anto

Land sehr flach und steril erscheint, verfließen diese Hälften in einander. Die ganze südliche Hälfte beträchtlich wärmer, als die nördliche, und bietet hinsichtlich der Vegetation im Allgemeinen nicht unbeträchtliche Abweichungen dar. Doch bezieht sich das, was ich aus Autopsie sagen kann, nur auf die nördliche Hälfte der Insel, indem beschränkte Zeit mir nicht gestattete, die genauere Vergleichung mit der südlichen auszuführen.

Man hat hin und wieder geglaubt, die Insel Cuba habe seit der Occupation durch die Spanier die gewöhnlichen durch Anbau hervorgebrachten Veränderungen erlitten. Indessen ist dies nur sehr theilweise der Fall. Allerdings ist der Urwald, der wohl ehemals den größten Theil der Insel bedeckte, hin und wieder gelichtet oder ausgerottet, und vermindert sich noch fortwährend durch den fortschreitenden Anbau des Bodens; doch hat sich der ursprüngliche Character im Innern noch vollständig erhalten, da die Städte und Pflanzungen fast durchgängig an der Küste angelegt sind, und zwischen denselben zu Lande nur höchst beschränkte Communication statt findet.

Im Allgemeinen kann man vier sehr verschiedene Classen der natürlichen wilden Vegetation deutlich unterscheiden. Die erste ist die Felsküstenvegetation, die zweite die der Rhizophoren, die dritte die der Savannen, die vierte der Urwald. In der ersten, welche unmittelbar da beginnt, wo die höchste Fluthgränze bei Ebbe ist, herrschen dichte Gebüsche von *Coccoloba* und furchtbare Massen von *Opuntia Tuna* und *Opuntia* so entschieden vor, daß sie der Gegend den bestimmtesten Character aufdrücken. Unter und zwischen ihnen stehen *Amaryllideen* in großer Fülle und kleine

niedrige Succulenten (*Portulaca* etc.), etwas weiter der Fluthgränze dann auch ansehnlichere Formen, namentlich Plumierien und prächtige Agaven.

Wo aber die Meeresküsten sandig oder schlammig nicht so felsig sind, da tritt in undurchdringlicher Masse die groteske Form der Rhizophoren oder das Mangrogebüsch auf, in die Mündungen der Flüsse meilenweit eindringend und dort mit den im Habitus sehr ähnlichen *Psidium*arten zusammengränzend. Wo diese Vegetation auftritt, da verdrängt sie alles Uebrige und behauptet den ausschliesslichen Besitz beträchtlicher Strecken. Sie macht viele Gegenden unzugänglich, indem sie diese wie ein Wall und Graben umgiebt, wo man weder einen Zugang zu Fufs, noch einen Landungsplatz von der Wasserseite finden kann. Ja längs der nördlichen Küste von Cuba (namentlich vor der Bai von Cardenas) liegen mehrere unbewohnte Inseln (Cayos), die ganz und gar mit Mangrogebüsch bedeckt und unzugänglich sind.

Einen eben so entschiedenen Character hat die Vegetation der Savannen. Dies sind grofse mit hochwüchsigen schilffähnlichen Grasarten bewachsene Strecken, die meilenlang und meilenbreit über Ebenen und Hügel sich ausdehnen, zwar mit mannichfaltigen, zum Theil prächtigen Blüthenstauden untermischt, auch hin und wieder mit riesigen Agaven besetzt, aber mit Ausnahme der Palmen von Bäumen gänzlich entblöfst. Hier sind die höheren und trockneren Stellen, namentlich die Hügelketten und Wälder von *Corypha*- und anderen Schirmpalmenarten bedeckt, aber nur in den tieferen Gegenden, wo kleine Bäche die Savanne durchschneiden, treten in voller natürlicher Pracht die königlichen Oreodoxenwälder auf. Diese Vegetation findet nur ihre Gränzen entweder durch

der Cultur, oder sie dringt bis zum Urwalde vor, doch stets scharf abgeschnitten.

Wo dieser, der eigentliche Urwald, anfängt, durch Mannichfaltigkeit der hohen Bäume und durch die unendliche Menge der Epiphyten und Schlingpflanzen characterisirt, da findet sich keine Palme mehr. Dagegen treten nun die mächtigen Ficusarten, ungeheure Leguminosen (Ceder genannt, wegen Mangels an Blüthen augenblicklich nicht bestimmbar), *Bombax*, Jatrophen und eine unendliche Menge mehr oder minder verwandter Gattungen auf, theils in kolossalen Formen, theils mit leichten schlanken Stämmen zum Himmel strebend, und in der Höhe ein dichtes Dach der verschiedenen Kronen bildend, wo man nicht zu unterscheiden vermag, was dem einen, was dem andern angehört? Auf den Aesten und an den Stämmen leben unzählbare Formen von parasitischen Pflanzen, Bromeliaceen, Tillandsien, Orchideen, Schwämme, zum Theil, wie z. B. einige *Oncidien* und *Epidendren* den ganzen Winter hindurch mit Blüthen geschnückt, doch meist erst im Frühjahr ihre zum Theil prächtigen Blumen entfaltend. Auf umgestürzten uralten Stämmen oder auf den Stümpfen abgehaener oder abgebrochener Bäume wuchern vorzugsweise die prächthigen *Pothos* und andere *Aroideen*. Eine Menge von anderen Orchideen bedeckt den Boden, im Erdreiche selbst wurzelnd, während wieder andere zwischen Himmel und Erde an einer strickartigen Wurzel schwebend freudig vegetiren. Doch es ist nicht leicht, diese Erscheinungen in der Nähe zu bewundern; man muß sich mit Gewalt Wege bahnen durch Lianen, *Epidendren*, kriechende und hängende Cacteen und andere Schlinggewächse, die sich zwischen den nahestehenden Stämmen ausbreiten, von einem zum andern hinüber-

schendern

hinüber-

kriechen, und oft so dichte Gewebe bilden, daß Umstürzen uralter, längst abgestorbener und g verwitterter Stämme zu verhüten im Stande sind.

Andere Vegetationsformen bietet nun natürlich die Nähe von Süßwassersümpfen oder auch die barschaft der Cultur dar; doch sind diese nicht racteristisch, daß sie als besondere Formen aufzu wären.

Zum Schlusse dieser kurzen Uebersicht möch nur noch hinzufügen, daß ich von Coniferen kein beobachtet habe, daß überhaupt die Gattunge Bäume von denen in unseren Floren vorkomm durchgängig verschieden sind, und daß mit Aus einiger in unsern Gärten cultivirten einjährigen (Convolvuli etc.) keine einzige Art gemeinsch zu sein scheint, wohl darum, weil alle unsere Pf so organisirt sind, daß sie einer winterlichen Ruh Säftestillstandes bedürfen. Die Erscheinung des dischen Abfallens des Laubes findet zwar auch bei gen wenigen Bäumen der tropischen Flora statt, bei den Plumierien, und einige Ficusarten wechsel gar zweimal jährlich ihr Laub, aber dies ist kau Folge einer periodischen Ruhe zu betrachten, d frische Grün schon wieder hervorbricht, wenn die alten Blätter abgestorben sind.

## Ueber die *Madia sativa*, eine oelliefernde Pflanze aus Chili;

von

*H. R. Göppert*, Professor in Breslau.

Von mehreren Seiten ist in unsern Tagen die *M. sativa*, wegen ihrer ölreichen Samen, zum Anbau



empfohlen worden. Als ich die Samen derselben versuchte, fand ich sie so ölfreich, daß schon durch jedes Pressen mit dem Finger das Oel in Menge heraustritt, wie man nur bei wenigen oelliefernden Samen sieht, so daß allerdings aus dem Anbau derselben, wenn anders, wie nicht zu zweifeln, die Kulturversuche gelingen, ein wesentlicher Vorthail erwachsen dürfte. In dieser Beziehung möchte es dem ökonomischen Publikum vielleicht nicht unangenehm sein, einige nähere Nachrichten über die Pflanze selbst und die damit in Deutschland bereits angestellten Culturversuche zu erhalten.

Schon Ludw. Feuillée, der 1709 — 11 Chili und Peru auf Kosten des Königs von Frankreich bereiste, erwähnt derselben in seiner werthvollen Reisebeschreibung unter dem Namen *Madia* und bildete dieselbe zuletzt ab. Nach ihm preßten oder kochten schon damals die Eingebornen im ganzen Königreich Chili aus den Samen derselben Oel, welches sie nicht nur zur Bereitung von Speisen und zum Brennen, sondern auch als Heilmittel zu schmerzstillenden Einreibungen benutzten. Er versichert, es süßlich und lieblicher von Geschmack als die meisten Sorten des Olivenöls gefunden zu haben. Der Abbé Molina (dessen *Versuch einer Naturgeschichte von Chili, aus dem Italienischen übersetzt von Dr. J. D. Brandis, Leipzig 1786, S. 113*) beschrieb sie zuerst systematisch unter dem Namen *Melosa* und empfiehlt sie schon zum Anbau in Europa an Orte, die des Olivenbaums entbehren. Die, welche man anbaut, nennt er *Madia sativa*, die wilde (*Madiviva* oder *Melosa* bei den Eingebornen) *Madia mellosa*, die sich jedoch nur durch geringe Größe und lanzetliche, den Stängel mit der Basis stärker umfassende Blätter unterscheidet.

Arch. & Pharm. II. Reihe. XXI. Bds. 3. Hft.

det und nach Donn eben so wenig, wie die *Madia cosa* (Cav. icon. 3. p. 50 t. 298. Jacq. hort. Schönbr. 3. p. 29. t. 302.) specifisch von *Madia sativa* abweicht. Alle drei werden schon seit längerer Zeit in deutschen botanischen Gärten cultivirt, und blühen z. B. in der Mitte oder Anfang Mai ausgesäet, schon im Juli. Die Samenreife erfolgt im August.

Die in Rede stehende Pflanze gehört in die 19. Classe Linné's, in die Familie der zusammengesetzt blühenden Gewächse (*Compositae* oder *Synanthereae*). Die Pflanze derselben ist einjährig, spindelig, etwas ästig, faserig, weiß. Der Stengel ist krautartig, 2 — 3 Fuß hoch, stielrund, schwach, längsstreifig, aufrecht, auch an der Basis etwas niederliegend und dann steigend, ungetheilt, nur oberhalb 10 — 12 einfache, blumige, mehr oder minder verlängerte, aus den Blattachseln entspringende Aestchen tragend. Die Blätter sind zahlreich, die unteren gegenüberständig, die oberen abwechselnd, hellgrün, 4 — 8 Zoll lang, 6 — 8 Linien breit, mit 5 parallelen Längsnerven, von denen der mittlere bis in die Spitze auslaufen, die 2 schmälsten randständigen selten über die Mitte des Blattes hinausreichen; am Rande ganz aber wimprig-haarig und auch auf den Flächen, wie auf allen andern Theilen der Pflanze mit längeren weicheren und drüsigen kürzeren Haaren versehen. Die Haare erscheinen bei hinreichender starker Vergrößerung gegliedert aus 4 — 5 Zellen zusammengesetzt, ebenso die Stiele der kopfförmigen Drüsen, die namentlich in dem oberen Theile eine braune aus ätherischem Oel und Harz bestehende Masse enthalten, welche den übeln Geruch und die Klebrigkeit der Pflanze verursacht. Die gelben Blüthen befinden sich an der Spitze der Aeste des Stengels zu 15 —

Linien langen und einen halben Zoll dicken halbkugelförmigen aufrechten Köpfchen vereinigt, aus welchen eben so viele einzelne Samen sich entwickeln\*). Die äußere Hülle dieser Blüthen, allgemeiner Kelch genannt, besteht aus 8—10 einreihigen, auf dem nach außen gekehrten Theilen gekielte und überall drüsig warigen Blättchen. Die Randblümchen, deren gewöhnlich so viel als Kelchblättchen zu sein pflegen, sind röhrenförmig, seltener unregelmäßig röhrig, und enthalten nur einen, mit zweitheiliger Narbe versehenen Stempel, die der Scheibe oder die der Mitte, immer einreihig, an der Spitze regelmäßig fünfzählig und beinahe innerhalb 5 Staubgefäße, deren Beutel oder Antheren in ein cylindrisches Bündel verwachsen erscheinen, durch welches der Stempel hervorragt. Da sich auf diese Weise beiderlei Geschlechtstheile in einem Blüthenköpfchen vereinigt befinden, nennt man sie zwittrige oder hermaphroditische, die Familie aber, zu welcher diese und sehr viele andere ähnliche Gewächse gehören, zusammengefasstblüthige, *Compositae*, weil viele einzelne Blüthen von einer allgemeinen Hülle oder einem Kelche umschlossen werden, oder auch *Synanthereae* wegen der angegebenen Verwachsung der Staubbeutel. Der Stiel, auf welchem diese Blüthen stehen oder der Pflanzboden, ist in der Mitte eben und trägt nur ge-

In der Beschreibung, welche der Drost und Domainen-Inspector W. Müller zu Aerzen im Hannöverschen von dieser Pflanze liefert, (*Schlesische Chronik* Nr. 14. 1839.) wird diese allgemeine Blüthenhülle oder Kelch fälschlich eine Samenkapsel genannt, was auf unrichtigen Vorstellungen von dem Blütenbau dieser Familie beruht, auf wir aber hier nicht weiter eingehen, da der Verfasser selbst erklärt, keine botanische Kenntnisse zu besitzen.

gen den Rand hin 1 — 2 Reihen aufrechtstehender  
 ner Spreublättchen. Die Samen sind glatt, we-  
 grau, (die von *Madia viscosa* schwärzlichgrau),  
 Linien lang, an der Basis verschmälert, zwar etw  
 zusammengedrückt, aber auf beiden Seiten mit einem  
 hervorragenden Mittelnerven, daher unregelmässig  
 seitig. Innerhalb der ziemlich harten Hülle vo  
 angegebenen Beschaffenheit findet sich nun das  
 liche, an fettem Oele so reiche Samenkorn, dessen  
 der Geschmack etwas an den des Hanfes erinnert.  
 die Samen anderer Arten der Gattung *Madia*, wi  
 von *Madia elegans* Donn (*Madaria elegans* De C  
 von *Madia quinqueradiata*, F. et M. und *Madia s*  
 F. et M. aus Kalifornien, wo übrigens nach Donn  
 die *Madia sativa*, vielleicht durch Anbau verwi  
 vorkömmt, enthalten eine gleiche Menge fetten O  
 wie sich wohl erwarten liefs, da in der Regel verw  
*Pflanzen auch verwandte Eigenschaften besitzen*, ein  
 fahrungssatz, der in der Bearbeitung der öconomis  
 Botanik, so viel mir wenigstens bekannt ist, bis  
 noch niemals auf eine, seiner Wichtigkeit für pract  
 Zwecke entsprechende Weise gewürdigt ward.  
 er sich übrigens auch rücksichtlich des Vorkom  
 von fetten Oelen noch bei anderen, in diese Abtheil  
 der Compositen (*Senecionideae* DC.) gehörende Pfla  
 als richtig beweist, zeigt z. B. die Sonnenrose (*He  
 thus annuus*), deren Samen man schon oft zur Oe  
 winnung benutzte, und die *Verbesina sativa* R  
 (*Guizotia olifera* De Cand.), welche nicht nur in A  
 sinien, sondern auch in Ostindien vorzüglich in Mys  
 zu ähnlichem Gebrauche in grosser Menge culti  
 wird. Vielleicht findet man auch noch in der F  
 den Anbau der *Madia elegans* vortheilhafter als den

*Madia sativa*, weil jene gröfsere und mehr Samen enthaltende Blüthen trägt und überhaupt stärker wird als diese, worüber nur fernere Erfahrungen, zu denen vielleicht der bevorstehende Sommer Gelegenheit giebt, auf genügende Weise entscheiden können.

Mit der *Madia sativa* hat man in Deutschland zuerst in Württemberg seit einigen Jahren Versuche in gröfssem Maafsabe angestellt, welche dem Oberhofgärtner Bosch in Stuttgart und dem Freiherrn v. Tessin zu Hochdorf so vortheilhafte Resultate, im Vergleiche zu andern Oelgewächsen, lieferten, dafs der Letztere im kommenden Frühjahr eine Fläche von 20 Morgen anzulegen beabsichtigt. Aus einem vielleicht hier wenig bekannten Aufsätze des Oberforstmeisters v. Gemmingen im *Grofsherzogl. Badischen Landwirthschaftlichen Wochenblatt* den 30. November 1838 und einer von dem Oberhofgärtner Bosch verfassten Mittheilung erlauben wir uns nun schliesslich noch dasjenige zusammenzustellen, was den Anbau, Ertrag und Benutzung des in Rede stehenden Samens betrifft und daher unsern vaterländischen Oeconomen von besonderm Interesse sein möchte.

#### I. Vortheile, welche zur Anpflanzung auffordern.

- a) Auf jedem Boden und ohne dafs derselbe gedüngt wird, geräth die Anpflanzung und hat namentlich frische Düngung keinen Einflufs;
- b) die Pflanzen sind weder der Beschädigung durch Ungeziefer noch durch Naturereignisse, namentlich Mehlthau etc. unterworfen;
- c) nur bei ungünstigen Witterungsverhältnissen ist es nöthig, die Pflanzen zu pflegen; *Frühlingsfröste* werden ihnen nicht nachtheilig;



- d) das gewonnene Oel, wenn das beim Anbau beobachtete Verfahren beobachtet wird, ist so vorzügliche Qualität und enthält bei völliger Geruchs- und Geschmackslosigkeit so viele Fettigkeit, dass dem besten Olivenöl zur Seite gestellt werden kann
- e) die Stengel und Blätter enthalten so viele hartharige Stoffe, dass sie zur Feuerung verwendet werden können und so rasch brennen wie Kienholz.

## II. *Verfahren beim Anbau und der Erndte.*

Die Aussaat, wozu 4. — 6 Pfd. Samen je nach Beschaffenheit des Bodens auf den Morgen erforderlich sind, kann sowohl zu Ende October als auch und wegen öfteren Wechsels der Witterung am sichersten im Frühjahr bis Mitte Mai vorgenommen werden, entweder breitwürfig oder in Furchen. Im Fall der Frühlingsaussaat lässt man das hierzu bestimmte Feld im Herbst noch gut zurichten, so dass im Frühling, sobald der Boden gehörig abgetrocknet und mit der Egge verebnet ist, die Aussaat sogleich bewerkstelligt werden kann, worauf man den Samen mit der Walze in den Boden eindrückt.

Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen und Ueberhandnehmen von Unkraut werden die Pflanzen ein- oder zweimal mit der Hand gefelgt, wobei zu bemerken, dass es hinreichend ist, wenn die Pflanzen 3—4 Zoll voneinander stehen, indem zu dichter Stand der Samenzugung nur schadet. Verpflanzung wie der Raps verträgt die Pflanze nicht.

Die Zeit der Erndte muss, da der Samen sehr gering ausfällt, genau beobachtet werden; der richtige Zeitpunkt wird angezeigt, wenn der früher schwärzlich gefärbte Samen sich grau färbt; dieselbe wird durch Ab-

den der Pflanze am Boden mit der Sichel be-  
schneidet. Man legt dann die Pflanzen händevoll-  
wie den Raps zum Behuf des bequemen Aufladens  
zusammen, läßt sie auf dem Felde vollkommen abtrock-  
nen und fährt dann auf mit Tüchern belegten Wagen einfahren.  
Am Tage des Einbringens sogleich ausdreschen,  
da durch Liegenbleiben über Nacht das in den Sten-  
den enthaltene ätherische Oel eine Gährung erzeugt,  
welche das reine Ausdreschen des Samens verhindert\*).

Vor der Oelgewinnung muß der Samen mit war-  
mem Wasser abgewaschen und wieder getrocknet wer-  
den, um die anklebende, stark riechende Substanz zu  
entfernen.

### III. Angabe des Ertrags.

Der Ertrag eines württembergischen Morgens von  
10 Ruthen beläuft sich, je nach der Beschaffenheit  
des Bodens und dem Stande der Pflanzen, auf 4 — 6½  
Scheffel Samen; der Scheffel Samen wiegt 194 — 208  
Pfd., woraus bei den bisherigen Versuchen in mehreren  
Möhlcn von verschiedenen Einrichtungen 68 — 70 Pfd.  
Oel kalt und warm geschlagen, gewonnen wurden\*\*).

Die Letzttere ist mir nicht recht klar. Wahrscheinlich  
soll das Ausdreschen wohl deswegen recht bald geschehen,  
damit sich die klebrige Materie nicht allzusehr auch dem  
Samen mittheile, was bei dem Uebereinander- und Zu-  
sammenliegen allerdingst leicht geschehen möchte.

Göppert.

Das Oel, von welchem ich eine kleine Quantität durch die  
Güte des Hrn. Buchhändler Hirt hierselbst zur Ansicht  
empfang, ist von gelber Farbe, wie gelbes feines Baumöl,  
angenehm, süßlichem, dem Hanföl entfernt ähnlichem  
Geschmack, welcher ihm vielleicht durch Bleichmittel  
oder durch andere chemische Behandlung noch entzogen  
werden kann, wo es sich dann eben so gut wie irgend  
ein anderes Oel zu Speisen benutzen lassen wird.

Göppert.

Bei angestellter chemischer Untersuchung ergab sich, daß 100 Theile Madiaöl aus 45 Theilen (oder flüssigem Oelfett), 40 Theilen Stearin (oder Olivenmargarin, festem Fett) und 15 Theilen Glycerin (honigartiger, süßlich schmeckender glutinöser Substanz) bestehen, und daß es als nicht trocknendes Oel bei Kälte von  $19^{\circ}$  R. noch nicht gerinnt, auch eine reichliche und wohlschäumende Seife giebt \*).

Daß es z. B. in Tuchfabriken mit besonderem Vortheile angewendet werden kann, beweisen die bei uns damit angestellten Versuche, nach welchen es für die Wollspinnerei vorzüglicher als das bisher hierzu benutzte Olivenöl ist, so daß letzteres für jenen Zweck vollkommen entbehrt werden kann. Es gewährt besonders den Vortheil, daß das damit gesponnene Gewebe nicht ranzig wird, und die Tücher in der Walke so leicht wieder rein werden.

Vergleicht man den Ertrag dieser nur einjährigen Oelpflanze mit dem Ertrag des Rapses und des Mohns, so stellen sich folgende Verhältnisse dar:

Der Raps, welcher, abgesehen von der seinem Anbau vorauszugehenden Brache, seine vollkommene Ausbildung erst im zweiten Jahre erreicht, liefert per Morgen 4 höchstens 5 Scheffel Samen und geräth nur sehr selten zu Samen.

---

\*) Das Letztere kann ich aus der Erfahrung bezeugen. Ich vermischte 1½ Quentchen des Oels mit ½ Quentchen kaustische Natronflüssigkeit von  $1,33^{\circ}$  spec. Gew. vermischte, erhielt ich nach 3 Tagen bei gewöhnlicher Stubentemperatur eine fast feste mild schmeckende aber recht gelb gefärbte Seife. Vielleicht verursacht dieser gelbe Farbestoff auch den fremdartigen Beigeschmack des Oels. Die Entfernung desselben wäre daher doppelt wünschenswerth, was für Chemiker schwerlich großen Schwierigkeiten unterliegt.

get; der Scheffel Raps giebt 96 Pfd. Oel, demnach der Morgen, den höchsten Ertrag mit 5 Scheffel angenommen, in jenem Zeitraum von 2 Jahren 480 Pfd. à 15 Kr. also auf ein Jahr 60 Fl.

Ein Morgen Mohn liefert  $2\frac{1}{4}$  bis 3 Scheffel Samen und man gewinnt aus einem Scheffel 88 Pfd. Oel, wornach, für den Morgen 3 Scheffel angenommen, ein Ertrag von 264 Pfd. à 15 Kr. 66 Fl. erzielt wird.

Ein Morgen von Madia angebaut, deren Reife in der Regel schon gegen Ende Juli erfolgt, liefert 4— $6\frac{1}{2}$  Scheffel Samen, was, den Scheffel zu 68 Pfd. Oel gerechnet, von  $6\frac{1}{2}$  Scheffel einen Ertrag von 442 Pfd. Oel à 15 Kr. mit 110 Fl. 30 Kr. abwirft.

Der Samen der Pflanze kann von dem Handelsgärtner Herz in Stuttgart bezogen werden.



## Ueber einige schädliche und verdächtige Pflanzen Istriens, nebst einigen chemischen Beobachtungen über das Oel der *Pistacia Lentiscus* und einige andere Oele;

von

Dr. *Biasoletto* in Triest.

Als ich im Frühling 1829 die Inseln des Quarnero-Busens \*) und einige Gegenden Dalmatiens, von Velabit in der Bobbischen Alpenkette, den Biokovo bei Morarsen in botanischer Hinsicht durchreiste, traf ich in

\*) Dieser Busen des adriatischen Meeres liegt auf der Ostseite der Halbinsel Istrien, wo die vielen Inseln an der dalmatischen Küste beginnen.



diesen Gegenden Hunger und Elend in so hohem Grade, daß die ärmsten Bewohner allerlei Kräuter sammeln und diese, mit Oel und Wasser gekocht, als Nahrungsmittel überbrachte mich, als ich unter diesen manche sehr giftige und verdächtige Pflanze fand, wie *Arum italicum* mit seinen Knollen, *Oenanthe pimpinelloides*, *Papaver* und *Ranunculus Ficaria*, *Athamanta verticillata*, *Chenopodium album* u. a. Durch das Kochen müssen diese Pflanzen ihre schädlichen Eigenschaften verlieren, denn sie werden, so viel ich erfuhr, ohne Nachtheil genossen. Das Wasser, worin diese Pflanzen gekocht waren, wird aber stets fortgegossen.

Von den Wurzeln des *Arum* macht man auf der Insel Unie, bei Orsero, eine Art kleiner Brode. Die Wurzeln werden erst in Wasser gekocht, dann zwischen den Fingern gequetscht und die aus dem Teig erhaltenen Brode werden geröstet. Auch habe ich kürzlich im Jahre 1838, erfahren, daß die Bewohner von Montenegro die Wurzeln des *Arum* wie Kartoffeln speisen.

Die Knollen des *Arum italicum* erreichen die Größe einer Faust, sie bestehen äußerlich aus einer blaugrünen Haut, innen aus einer weissen Substanz und haben frisch einen sehr scharfen Geschmack. Beim Zerquetschen reizt die durch ihre Ausdünstung Augen und Nase heftig, und die Haut und ziehen Blasen. Wenn die Wurzeln der Zeit trocken werden, verlieren sie ihre reizende Kraft, werden dann fast geschmacklos, weis wie Stäube mehlige und färben ab wie Kreide. Das scharfe Princip scheint in einer Art Milchsaft seinen Sitz zu haben, welchen die Wurzel durch Einschnitte ausschwitzt. Die ihrer schädlichen Theile beraubten Knollen können meiner Meinung nach, recht wohl zur Nahrung dienen.



weil sie wesentlich aus Stärkmehl bestehen \*). Häufig  
mannt man in Istrien auch die Blätter dieser Pflanze  
als Viehfutter; sie werden zuvor mit Wasser abgekocht,  
mit Kleien vermischt, und den Mastschweinen ge-  
geben, die sie in solcher Zubereitung gern fressen.  
Die frischen Blätter haben übrigens dieselben scharfen  
Eigenschaften wie die Wurzeln, sie lassen auf der Zunge  
eine scharfe stechende Empfindung zurück, zwischen  
den Händen zerrieben, entwickeln sie einen scharfen  
Geruch wie Senf.

Die Gattung *Oenanthe*, aus der Familie der Um-  
belliferen, gehört bekanntlich zu den Giftgewächsen.  
*Oenanthe pimpinelloides* hat einen scharfen Geschmack,  
der zugleich an den von *Daucus silvestris* erinnert,  
dass ist der Geruch, wenn man die Pflanze, beson-  
ders die Wurzeln, zwischen den Fingern zerreibt. Die  
Arten der Gattung *Oenanthe* werden von keinem Thiere  
gegessen.

Auch *Papaver Rhoeas* kann man zu den verdächti-  
gen Pflanzen rechnen, weil die ganze Familie der Pa-  
peraceen in den Kreis der narkotischen Gewächse  
gehört, auch zeigt diese Pflanze beim Kauen auf der  
Zunge Schärfe, und besonders der geringe Milchsaft,  
welchen sie absondert.

Um zu beurtheilen, dass *Ranunculus Ficaria* eine  
verdächtige Pflanze sei, braucht man nur zu erwägen,  
dass dieselbe zur Gattung der Ranunkeln gehört, welche  
alle mehr oder weniger scharf, meist giftig sind, die  
Haut reizen, Blasen ziehen, und innerlich Entzündung  
bewirken. Der Geschmack der Blätter der *Ranunculus*

---

\*) Bekanntlich werden einige Arten von Arum als Nahrungs-  
mittel benutzt.

*Ficaria* ist noch schärfer als der der knolligen V  
zeln. Diese Pflanze ändert aber ihren Geschmack;  
welche im Wasser wächst mit den zarten weissen B  
stielen, welche das Blatt ausserhalb des Wassers  
auf dessen Oberfläche tragen, pflegt der Schärfe  
beraubt zu sein, auch fehlt dem Blatte der gewöhnl  
schwärzliche Flecken auf der Oberseite. Wenn d  
in einigen Gegenden Deutschlands die jungen Blä  
der Pflanze, mit Zucker, Essig und Gewürz zubere  
ähnlich den Blüthenknospen der Kapuzinerkresse,  
Brühen benutzt werden sollen, so nimmt man w  
scheinlich die im Wasser gewachsenen Blätter, oder  
Clima müßte auf die grössere oder geringere Schi  
einen Einfluss ausüben. Denn die von mir versuch  
Blätter der in unserer Gegend gewachsenen Pflan  
würden stets eine Entzündung im Munde und im Schlu  
hervorbringen.

In Mößler's Gemeinnützigem Handbuche der  
wätskunde in der Ausgabe von 1815, Altona bei H  
merich, 2. Abth. S. 751 ist angegeben, daß die Blät  
von *Papaver Rhoeas* genossen werden können. Ich fin  
daß diese Blätter beim Kauen eine Schärfe entwickel  
und besonders der Milchsaft, der nur beim Zerreiß  
des Blatts langsam hervortritt. Man weiß, daß die  
Saft mit dem fortschreitenden Wachsthum der Pflan  
sich vermehrt und gelb wird, und der Geruch der g  
zen Pflanze ist dann narkotisch widrig.

Die ärmeren Einwohner in Istrien pflegen au  
folgende Pflanzen gekocht oder eingemacht zu esse  
*Bunias Erucago*, *Raphanus Landra*, *Scolymus maculato*  
*Rumex acutus*, *Capsella Bursa pastoris*, *Amaranthus B*  
*tum*, *A. hybridus*, *A. viridis*, die Wurzeln von *Daucus*  
*vestris*, *Crithmum maritimum*, *Sonchus oleraceus*  $\beta$  asp

*nicatensis* und *silvestris*. Als Salat brauchen sie auch *Leontodon Taraxacum*, *Diploaxis muralis* und *Sanguisorba*, mehre Arten *Fedia*, *Cichorium Inty-*  
*spontanum in arvis, pratis ectr.*, *Allium roseum*, *A.*  
*spont. in arvis, incultis ectr.*, *Mentha viridis* u. a.  
ferner die Triebe von *Asparagus amarus*, *A. acutifolius*,  
*communis*, *Asphodelus luteus*, *A. ramosus*, *Rus-*  
*aculeatus*, *Humulus Lupulus*, *Urtica dioica* u. a.

Auch die noch grünen Hülsen der *Vicia peregrina*  
werden roh, zuweilen in Wasser gekocht, mit ein  
wenig Salz darauf, vom Volke genossen, ebenso die  
von *Vicia grandiflora*, *Vicia hirta narbonensis*, die im  
flachen Istrien zwischen dem Getreide wächst, ferner  
die Hülsen von *Pisum arvense*, welche Pflanze sich in  
Gärten findet. Die reifen Früchte von *Juniperus ma-*  
*rocarpa*, wie die von *J. oxycedrus* werden ebenfalls,  
und zwar letztere oft mit Wasser gekocht, von den  
Einwohnern gegessen.

Auf der Insel Unie hatte ich selbst Gelegenheit zu  
sehen, wie man aus den reifen Früchten der *Pistacia*  
*terrestris* ein Oel gewinnt, welches man nicht nur zum  
Kochen, sondern auch an Speisen benutzt. Diese Insel,  
Lateinischen *Unitae* oder *Insula Uniensis*, liegt west-  
lich von Ossero. Das darauf befindliche Dorf, etwa 54  
Häuser zählend, liegt auf dem südlichen Theile der In-  
sel, mit einem gut angebauten Revier. Die Häuser ha-  
ben ein ziemlich neues Ansehen, und der Alterthums-  
forscher würde hier vergebens nach Alterthümern su-  
chen. Der Ortsgeistliche sagte mir, die Insel werde erst  
etwa 120 Jahren bewohnt, ihre Bevölkerung beläuft sich  
auf 310 Seelen. Der größte Theil der Insel ist un-  
bebaut, steinig, voll Buschwerk, ihr Haupterzeugniß Wein.  
Durch die Noth getrieben, lernten hier die dürftigen

Bewohner den öligen Stoff der Früchte der *Lentiscus* kennen und dieses Oel daraus zu scheiden zu benutzen.

Im April des Jahrs 1837 gab der Gemeindevorstand die Nachricht von der Bereitung jenes Oels der Kreisbehörde von. Nachricht, und sandte zugleich vier kleine Flaschen davon ein. Demzufolge erließ das Gubernium von. ein Decret, worin es zu Beobachtungen über dasselbe aufforderte, wie es sich am leichtesten würde be- lassen, und wie man das Gewächs selbst am besten zu vielfältigen könnte.

Von den vier Flaschen war eine zerbrochen, die übrigen waren mit den Buchstaben *B C D* bezeichnet und enthielten eine hinlängliche Menge Oels, um die Prüfung, wie folgt, anstellen zu können.

Die Flasche, mit dem Buchstaben *B* bezeichnet, hielt zwei Schichten, die untere, ohngefähr  $\frac{2}{3}$  der ganzen Masse, war weiß, ins Grüne spielend, butterweich unter der Lupe körnig, die obere erschien flüssig, schwach durchscheinend und grün.

Das Oel in der Flasche *C* hatte eine citrongelbe Farbe, war dicht, von dickerem gleichem Korn, ohne eine stehende Flüssigkeit. Das Oel in der Flasche *D* war dem in der ersten Flasche gleich, nur war der flüssige Theil etwas trübe.

Das Oel in der Flasche *B* besaß den eigentlichen terpentinartigen Geruch der Pflanze, schwach etwas pikant und schwach ranzig. Auf Papier hinterließ dieses Oel einen Fettfleck, trocknet an der Luft aus und röthet das Lackmuspapier nicht. Im Sommer ist es flüssig, bei  $+ 6^{\circ}$  R. fängt es an dick zu werden und gesteht nach und nach zu einer gleichförmigen Masse.

grünlich-weißen Masse; zum vollständigen Gefrieren erfordert es aber eine Temperatur von  $-14^{\circ}$  R.

Der flüssige darüber stehende Theil war von dicker Consistenz als das Olivenöl, brannte sehr gut mit heller Flamme, wie das feinste Olivenöl, und mit dem eben nicht widrigen Geruch. Dieses Oel ist leichter als Wasser. Mit Wasser geschüttelt, giebt es eine milchweisse Emulsion, aus welcher nach einiger Zeit das Wasser völlig klar sich wieder abscheidet. Mit Alkohol bildet es eine trübe Mischung, aus welcher nach einiger Zeit das Oel sich wieder absondert, und zwar durchsichtiger und dünnflüssiger. Der Alkohol behält nach dem Terpentinegeschmack des Oels. Dieses beweiset augenscheinlich, daß das Oel mit einer harzigen in Alkohol löslichen Substanz verbunden ist. In Aether löst sich das Oel vollkommen. Mit kohlenisaurem Kali reinigt es sich zu einer milchweissen Substanz, die sich in Wasser auflöst. Mit Kalkwasser bildet es eine dicke Seifenmasse, die in Wasser wenig löslich ist. Mit kaustischem Natron bildet es eine Seife, die eine weiche Consistenz behält. Mit Bleiglätte läßt sich das Oel zu einem Pflaster kochen, wobei es einen Geruch nach Terpentin und Mastixharz entwickelt, das Pflaster bleibt aber nicht weifs, sondern wird bräunlich.

Das Oel aus der Flasche D, obgleich butterartiger, verhielt sich ganz wie das erste, eben so das der Flasche C. Das aus den Flaschen B und D war nur weniger rein, und durch Pressen bereitet, während das in C durch Kochen der gequetschten Früchte dargestellt war.

Das Oel ist in dem fleischigten Theile der Frucht enthalten, etwas auch in dem Kern.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß das Oel der *Pistacia Lentiscus* zum Brennen und sonstigem öco-

as Oel  
em öco-



nomischen Gebrauch sehr gut sich verwenden läßt, des terpentinartigen Geruchs und Geschmacks wegen aber zum Essen sich nicht eignet, wenigstens nicht genehm ist.

Was die Gewinnung dieses Oels betrifft, so sollte man sich meiner Ansicht nach an die Methode halten, die bei der Gewinnung des Olivenöls befolgt wird, wo man die Früchte zerquetscht, den Brei mit heißem Wasser vermischt, in Säcke füllt, und mit einer Schraubenpresse auspresst, oder bei geringeren Massen mittelst einer Walze von hartem Holz auf einer geneigten Fläche so lange ausdrückt, und wiederholtem Aufgießen mit heißem Wasser, bis sich kein Oel mehr zeigt. Von den sämtlichen in den Vorlagegefäßen gesammelten Flüssigkeiten würde dann das Oel abgenommen, und dieses mit Wasser aufgeköcht, um es von den Schleimtheilen zu befreien, und zugleich auch möglichst von dem Terpentinigen zu befreien.

Auch bei der Cultur und Vermehrung der Mutterpflanze müßte man einen ähnlichen Weg, wie beim Olivenbaum einschlagen, nämlich durch Trennung der Seitenäste von der Mutterpflanze. Auch könnte man mittelst der Samen diese Pflanze fortpflanzen. Man legte dieselben in einen leichten weichen Boden, später würden dann die gehörig entwickelten Pflänzchen in einen angemessenen Boden verpflanzt. Bei einer ausgedehnten Culture dieser *Pistacia* könnte man später dahin gelangen, daß man auch das Harz aus dem Stamme derselben benutzt, welches bekanntlich das Mastix ist, und in der Levante und der Insel Scio gewonnen wird.

Uebrigens ist das Oel der *Pistacia Lentiscus* keine neue Entdeckung; es war schon zu den Zeiten Tournefort's, im 15ten Jahrhundert, bekannt, auch gedent

desselben mehrere alte Autoren, so Lemery in seinem *Traité universel des drogues simples*. Paris 1714. S. 472, wo er sagt, daß man in Italien aus den Früchten der *Pistacia Lentiscus* ein Oel gewinne, welches in der Medicin als ein das Fleisch adstringirendes und stärkendes Mittel gebraucht werde.

Schließlich will ich hier noch bemerken, daß man auch noch verschiedenen anderen Pflanzen Istriens ein Oel gewinnen könnte, namentlich aus:

*Celtis australis*, die Samen davon geben ein dem der Mandeln sehr gleichkommendes Oel.

*Cornus sanguinea*, die Früchte geben 34 Proc. eines gelblichen hellgrünen fast geschmacklosen zum Brennen sehr gut sich eignenden Oels. In einem Dorfe des nördlichen Istriens gewinnt man dasselbe seit mehreren Jahren, mittelst Zerquetschen und Kochen der Früchte.

*Corylus Avellana* und *C. tubulosa* geben ein dem Mandelöl ähnliches Oel.

*Cucumis Melo* und *C. sativus*, beide in der Küstengegend Istriens angebaut; ihre Samen werden zur Oelgewinnung benutzt.

*Cucurbita Citrullus* und *C. Pepo*; die Samen der Früchte liefern 18 Proc. eines guten gelblich-weißen eruch- und geschmacklosen Oels. Beide werden sehr angebaut.

*Cynara Scolymus* und *C. Cardunculus*; die Samen beider cultivirten Pflanzen liefern geprefst ein fettes Oel, ohne Zweifel auch die übrigen Carden-Arten, die in der Provinz wild wachsen.

*Evonymus europaeus* und *E. verrucosus*; die von den Häuten gereinigten Samen geben durch Auspressen ein röthlich-braunes Oel, was sich gut zum öconomischen Gebrauch eignet.

*Helianthus annuus.* Die Cultur dieser Pflanz dert wenig Sorgfalt, sie wird in mehren Gegenden gebaut. Der Same enthält ein gutes Oel, welches Brennen wie zu Speisen dienen kann.

*Prunus Armeniaca, P. Cerasus, P. Avium, Pistica* und *Amygdalus persica.* Die von den Schalen freiten Kerne dieser Gewächse geben durch Auspressen 30 — 50 Proc. eines guten, dem Mandelöl ähnlichen Oels.

*Amygdalus communis* und *Juglans regia,* welche in Istrien gut fort, und könnten behufs der Oelgewinnung mehr cultivirt werden.

*Raphanus Raphanistrum;* der Same dieser gepflanzte Pflanze liefert 30 Proc. eines guten Oels.

*Raphanus sativus;* der Same liefert bekanntlich 30 Proc. treffliches Brennöl, ähnlich ist es mit *R. Brassica* und vielen anderen Cruciferen, die in Istrien wild wachsen und leicht angebaut werden können.

Endlich geben die Kerne der Weintrauben, wenn sie als unnütz weggeworfen werden, ein zum Brennen sehr gutes Oel \*). Man hat beobachtet, daß die der weißen Beeren weniger als die der rothen geben, im Allgemeinen 12 Proc. Das kalt ausgepresste Oel kann auch zu Speisen gebraucht werden, das warm ausgepresst aber einen herben Geschmack.

---

\*) Vergl. damit auch die früheren in Würtemberg gemachten bekannten Erfahrungen von Berg u. Schäbler. I

## Vierte Abtheilung.

### Allgemeiner Anzeiger.

#### I. Anzeiger der Vereinszeitung.

##### Notizen aus der Generalcorrespondenz des Directoriums.

Se. Excellenz der Hr. Minister des Innern, von Nostitz und Jänkendorf in Dresden: Wohlwollende Anerkennung des Vereins. — Hohe Herzogl. Anhaltische Medicinal-Commission in Dessau: Ueber ihre Theilnahme an den Fortschritten des Vereins.

Hr. Dr. Herberger: Ueber süddeutsche Vereinsangelegenheiten. — Hr. Vicedirector Sehlmeier: Ueber Ausbreitung des Vereins in der Rheingegend; über den Verkauf der auscirculirten Bücher. — Die Herren Vicedirectoren Dreykorn und Scholz: Ueber den Beitrag für die Portovergünstigung. — Hr. Postmeister Pothmann in Lemgo: Ueber die Portovergünstigung auf Thurn- und Taxisschen Posten. — Hr. Kreisdirector Dr. Voget: Ueber Angelegenheit der Gehülfen-Unterstützungsgesuche. — Hr. Ap. Tuchen in Naumburg: Ueber Bemühungen zur Ausbreitung des Vereins in dortiger Gegend. — Die Herren Vicedirectoren Dr. Bley und Sehlmeier: Ueber die Erhöhung der jährlichen Beiträge und über Angelegenheiten ihres Vicedirectoriums. — Die Herren Kreisdirectoren Voget, Dr. Marder, Dr. Jahn, Dr. Schmedding, Weber, Upmann: Ueber Angelegenheiten ihrer Kreise. — Hr. Vicedirector Grischow: Ueber Vereinsangelegenheiten. — Hr. Ap. Neubauer in Hilden: Ueber den Anschluß der dortigen Apotheker an den Verein. — Hr. Director Du Menil: Ueber auscirculirte Bücher. — Hr. Apotheker Knauer: Annahme des Kreisdirectoriums für den Kreis Weimar. — Hr. Apotheker Hollandt: Dasselbe für den Kreis Güstrow. — Hr. Dr. Meurer: Ueber die Angelegenheiten des Vereins in Sachsen.

Unterstützungsgesuche von den Apothekergehülfen Hrn. Martin in Brakel und Hrn. Koch in Höxter.

Dankschreiben für die Ehrenmitgliedschaft des Vereins gingen ein: von Hrn. Geheimenrath Dr. Jüngken in Berlin.

Beiträge zum Archiv gingen ein: von Hrn. Kreisdirector Voget in Heinsberg, von Hrn. Lohmann in Goslar, von Hrn. Kreisdirector Jonas in Eilenburg.

#### Handelsnotizen.

Amsterdam, den 17. Febr. Unser Vorrath von Reis ist unbedeutend, Java 10½ — 12 fl. Tafelreis 13 fl. Neue Zantesche Coriander 36 fl. Südseether 27 fl. Nach Nelken viel Frage zu 62 Cs.



**Batavia, vom Oct. 1839.** Die Ernte auf Java ist sehr stieg gewesen. Die *Kaffee*-Ernte betrug  $\frac{2}{7}$  mehr als man erwartet hatte. Auch die Ausbeute an *Indig* und *Zinn* ist sehr ergiebig gewesen.

**Hamburg, den 24. Jan.** *Rüböl* ist im Preise gestiegen. *ostind. Pfeffer* wurden zu mäßigem Preise gekauft. *Cassia* was fester, sonst mit Gewürzen ruhig. In *Kaffee* der U beschränkt. *Zucker* wurde zu mäßigen Preisen gekauft. *Mandeln* haben sich auf ihrem gesunkenen Werth fester gestell-

— den 10. Febr. *Pfeffer* und *Mandeln* behaupten sich in den Preisen; auch *Cassia lignea*.

— den 14. Febr. *Baumöl* behauptet sich im Preise, Qualität 30 Mrk.

**Leipzig, Anfangs Febr.** *Spiritus* wird immer höher gehalten. In Berlin am 31. Jan. 16 $\frac{3}{4}$  — 17 $\frac{1}{4}$  Thlr. für 200 Quart Tr. à 54 Proc. Tr.

— Febr. *Rüböl* ist im Preise etwas gesunken, 9 $\frac{1}{2}$  Thlr. *Mohnöl* ist etwas gestiegen. *Leinöl* steht zu 11 $\frac{3}{4}$  Thlr.

**London, den 24. Jan.** *Kaffee* und *Zucker* sind etwas gestiegen. 600 Sack *Pfeffer* gingen heute in Auction zu 4 $\frac{7}{8}$  d. pr. 164 Sack *Piment* zu 3 — 3 $\frac{1}{2}$  d. pr. Pfd. weg. Ferner 6261 Kisten *Thee*, meistens Congo und Twankay, der Rest Hyson 1 d. unter den früheren Marktpreisen.

— den 4. Febr. Der Verkehr in *Zucker* lebhaft; westindischer 6 d. höher als früher, eben so *Mauritius*, besonders gestiegen.

— In der Auction vom 7. Febr. kamen 634 S. *Pfeffer*, 52 Pack *Nelken*, 52 Pack *Macis* und 92 Pack *Nüsse* vor. *Pfeffer* bis 4 $\frac{3}{8}$  d., *Nelken* 2 sh. 3 d., *Macis* 2 sh. 3 d. bis 5 sh. 1 d., *Nüsse* 3 sh. 4 d. bis 4 sh. 3 d., *Piment* sehr gefragt.

— In der Auction Ende Januars kamen 2300 B. *Canehl* mit unregelmäßigen Preisen, feine grüne Sorte dagegen sehr hoch gehalten. *Cassia lignea* wurde rasch verkauft, selbige Waare ist selten und wird bereits mit 80 sh. bezahlt. Fürten bengal. *Ingwer* wird schon 17 sh. bezahlt. *Pfeffer* wird lebhaft gefragt. *Blauholz* ist im Preise gestiegen.

**Neapel, den 11. Jan.** Die Ernte von *Olivöl* scheint in der Provinz Bari und Calabrien viel weniger ausgegeben zu haben als man erwartete, und der Preis ist daher gestiegen.

**Rotterdam, Ende Januars.** *Pfeffer* 23 Cs. *Cassia lignea* Kisten 43 — 50 Cs. *Nelken* 57 Cs. *Muskatnüsse* 200 — 210 Cs.

— den 10. Febr. Roher wie raffinirter *Zucker* fest in den Preisen. *Nelken* finden zu 58 Cs. Frage. *Pfeffer* 24 Cs. *Cassia* 25 Cs. *Zimmt* 48 — 50 Cs. *Jamaica-Piment* 21 — 22 fl.

**Stettin.** *Pottasche* zu 8 $\frac{5}{6}$  Thlr. bei Parthien.

## Berg- und Hüttensegen.

Die durchschnittliche jährliche Mineralproduction des Landes beträgt 9 — 11 Mark Gold, 50,000 Mark Silber, 80,000 Mark Eisen (mit dem Solling), bei einer Eisensteinförderung durchschnittlich 300,000 Ctr. Ferner 100,000 Ctr. Blei u. Gl. 2 — 3000 Ctr. Kupfer und 50 Ctr. Zink. Die Salzwerke liefern circa 290,000 Ctr. Salz. Die Stein- und Braunkohlen-Förderung



mit jährlich 2,260,000 Balgen (zu 1 Cubikfufs) angeschlagen. An Schwefel werden 1500 Ctr. producirt.

Die Zinkproduction von 1839 in Schlesien wird auf 220,000 Ctr. berechnet, während die von 1838 nur 153,000 Ctr. lieferte.

Die Ausbeute von Eisen im Reg.-Bezirk Trier betrug im Jahre 1838 einen Geldwerth von 1 Mill. 624,514 Thalern. Der Abbau auf Steinkohlen wurde auf den landesherrlichen Gruben Saarbrückschen im Jahr 1838 durch 2093 Arbeiter betrieben. Es wurden 212,127 Fuder oder 1 Mill. 697,000 Tonnen Steinkohlen gefördert. Der Absatz von Coaks auf den beiden Zechen Sulzbach-Dettweiler und Königsgrube im Jahre 1838 betrug 281,263 Centner.

Die Eisenproduction in Großbritannien beträgt jetzt jährlich 1,000,000 Tonnen, 239 Hohöfen sind im Gange und 40,000 Menschen werden dadurch beschäftigt.

Die Eisenproduction in Belgien ist in stetem Zunehmen, sie ist auf 147,690 Tonnen gestiegen. 1837 waren 23 Koaks-Hohöfen und 66 Holzkohlen-Hohöfen in Betrieb, und 20 neue Koaks-Hohöfen sind seitdem wieder errichtet.

In Toskanischen hat man eine reichhaltige Fundgrube von Quecksilber entdeckt. Ein ausgezeichnete Geolog, Ritter Piccolomini, welcher im Auftrage der Regierung sowohl die Bergwerke von Salvana als die neu aufgefundenen von Savigliana und Serrarezza untersuchte, bemerkt darüber, daß nach mehreren Schichten von rüthlichem Sand ein Lager von Erdharz folge und dann Schichten von Thon, Glimmer und Talkerde, worin das Quecksilber liege. An Reichthum sollen die Gruben von Serrarezza denen von Almaden nicht nachstehen. Dieser Fund ist von bedeutender Wichtigkeit.

Auf den preuß. Salinen Halle, Dürenberg, Köfsen und Arnheim wurden im Jahre 1838 gewonnen: 13,289 Last weißes, 16 Last gelbes, 36 Last schwarzes Salz und 40,267 Schffl. Düngesalz. Die pfünnerschaftliche Saline in Halle und die gewerkschaftlichen Salinen in Teuditz und Kötschau lieferten: 2849 Last weißes, 29 Last gelbes, 23 Last schwarzes Salz und 14,169 Schffl. Düngesalz. Auf dem Alaunwerk Schwemmsal wurden 8 Ctr. Glaubersalz gewonnen.

Die Gruben im Bergbezirk Mansfeld lieferten 1838: 16,485 Mark Silber (263,760 Thlr. werth) und 15,547 Ctr. Kupfer.

## Miscellen.

**Zucker.** Der in Rußland producirt Zucker findet in Persien einen bedeutenden Absatz. 1838 wurden davon über das Caspische Meer nach Persien eingeführt 1985, und 1837 2570 Pud. Der Absatz würde noch größer sein, wenn die Russen sich begnügten, den Zucker nach dem persischen Geschmack zu formen, der in allen Erzeugnissen eine geregelte Form verlangt. Bei verschiedenen Gelegenheiten beschenkt man sich in Persien mit Zucker und Zuckersachen, man überschickt solche seinen Freunden und Chefs, die Sitte bestimmt dabei genau die Zahl der Hüte oder Stücke, auf das Gewicht kommt es nicht an. Am meisten ziehen sie den Zucker in Form kleiner Fliesen in bunt-

nen  
e Zahl  
an. Am  
in bunt-

farbigen Umschlägen von 1 — 1½ Pfd. Gewicht vor. Formen würde man eine noch weit grössere Quantität

Die *Runkelrübenzucker-Fabrication* in Oestreich nicht zu. Es bestehen 66 Fabriken im Staate, davon in Böhmen 28. Oestreich gebraucht jährlich gegen 650,000 Ctr. wovon jetzt ungefähr  $\frac{1}{3}$  im Staate producirt wird.

*Bordeaux-Weine.* Das Departement der Gironde ist vorzüglichsten Weinreben Frankreichs, sowohl in Hinsicht Menge als der Mannigfaltigkeit ihrer Producte, was nicht nur von der Quantität und dem Werthe, sondern auch von der Bedeutung des Handels, der damit getrieben wird, zu sagen.

Der Umfang dieser Weinberge beträgt 137,000 Hectaren, wovon 46,931 der Umgegend von Bordeaux, als Haupt-Departements, 5486 der Umgegend von Bazas, 16,830 der von Blaye, 30,996 der von Libourne, 18,030 der von Les Landes, 18,709 der von Réole angehören.

Das Totalproduct dieser 137,000 Hectaren ist 2,805,476 Hectolitres, oder 18,072½ Hectolitres für einen Hectar, was auf 2,585,476 Hectolitres zu reduciren ist, da ein Theil der Weine erst nach 6 Monaten abgezogen und zur Consumtion gebracht wird. Der Localbedarf besteht in 640,965 Hectolitres für eine Bevölkerung von 522,041 Seelen nebst den zahlreichen aus Bordeaux kommenden Fremden. Zur Disposition des Handels bleiben daher 1,865,461 Hectolitres, und dieser Handel ist von beträchtlicher Wichtigkeit zu achten, da die Negocianten aus Frankreich und aus den naheliegenden Departementen beträchtlich von Bordeaux beziehen, um ihn mit dem ihrigen zu mischen. Dazu kommt nun noch, daß die Marseiller heut zu Tage einen Theil der Weine zu machen verstehen, den sie in sehr beträchtlicher Menge nach den Colonien versenden.

Die sogenannten *Vins de côte* gehören zu den vorzüglichsten unter welchen die feinen Weine von Saint-Emilion, Grenet, Barbeblanche u. s. w. zu nennen sind. Von diesen kostet ein Faß von 917 Litres 200 — 300 Franken. Diese Weine reifen sehr lange, erst wenn sie drei Jahre alt sind, füllen sie in Flaschen, in denen sie nach 10 Jahren ihre größte Reife erreichen, und die allerfeinsten Sorten bringt man erst im zehnten bis sechsten Jahre in Bouteillen, und solche kosten 100 Franken und mehr.

Die Trauben, aus welchen die besten Bordeaux-Weine entstehen werden, heißen: Noir de Prossac, le Pachet und le Pichet. Die an beiden Ufern der Garonne und der Dordogne in dem fetten Boden cultivirten Reben liefern die *Vins de Palus*, die *Vins de Grave* gehören; man darf sie erst nach 7 oder 8 Jahren auf Flaschen ziehen, und 20 Jahre nachher haben sie von ihrer Qualität verloren. Zu den Weinen vom ersten Ranges gehören die von Medoc, insbesondere Chateau-Margaux, Chateau-Lafitte. (*Nouvelles Annales des Voyages Etyr, et de Humboldt etc. Mai 1838, p. 242 et suivant.*)

*Opium.* Nach Berichten aus Bangkok (Siam) haben die sinesischen Behörden auch in Pungah, Trang und den umliegenden Häfen die Einfuhr des Opiums untersagt. Nachrichten aus Sumatra melden, daß der Radscha von Abschin, der Tod des Ibrahim, ein Bruder des verstorbenen Herrschers, einer

in, welchem die drei Sadsikis und andere Vornehme des Reichs beiwohnten, in welchem eine Verfügung über alle Befugnisse auf der Ost- und Westküste von Sumatra beschlossene wurde, dass sie alles aufbieten sollten, die Einfuhr des Opiums zu verhindern. Nach den neuesten Nachrichten aus Canton sind mehr als 1000 Opiumraucher und -Händler aufgeboten, und zur Kettenarbeit an den Stadtmauern von Canton vertheilt.

**Ueber den Anbau des Thees in Assam.** Ganz Ober-Assam erweist fast wie ein einziger Theegarten; die Theepflanze ist hier manchmal so groß und üppig als in China. Der Anbau wird einen bedeutenden Gewinn abwerfen, zumal bei den jetzigen Störungen des chinesischen Handels.

### Mineralienverkauf.

Bei Endesunterzeichnetem sind geognostische Sammlungen der schönsten Gebirgsarten des Thüringer Waldgebirgs, frisch geschlagen in verschiedenem Format zu 100 — 200 Stück, im Preise von 5 — 50 fl. rhein. zu haben. Desgleichen sind vorzüglich eine oryctognostische Sachen aus Tyrol (Fassathal), Böhmen, Mittelgebirge und Thüringer Wald, sowie auch schöne Exemplare von dem äusserst merkwürdigen und berühmten, bei Hildburghausen im bunten Sandstein vorkommenden grossen Fußstapfen des Chirosauros, zu billigem Preise zu haben. Um frankirte Briefe bittet

Hildburghausen,  
im März 1840.

C. F. Bartenstein,  
Assessor der Großherzogl. S.-Weim.  
Societät für d. gesammte Mineralogie  
und Mitglied des Nordd. Ap.-Vereins.

### Dienstgesuche.

Ein junger Pharmaceut, der vor zwei Jahren das Staatsexamen in Berlin gemacht, und den ich als früheren Gehülfen in meiner Apotheke als solide, fleissig und geschickt bestens empfehlen kann, wünscht eine Stelle als Provisor oder Administrator zu übernehmen. Nähere Nachrichten bin ich auf frankirte Briefe zu geben gern bereit.

Dr. Bley in Bernburg.

Ein junger Mann, welcher der Pharmacie sich zu widmen wünscht, kann eine zu empfehlende Stelle durch mich erhalten.

Der Apotheker Koch in Runderath,  
Reg.-Bezirk Achen.

## II. Anzeiger der Verlagshandlung.

(Inserate werden mit 1½ Ggr. pro Zeile mit Petitschrift, oder für den Raum derselben, berechnet.)

Hannover, im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung  
eben erschienen:

### **Praktische Anleitung** zum grammatisch = richtigen Übersetzen aus **Deutschen in's Lateinische** für den Schul- und Privatgebrauch

von  
**Dr. G. S. Klippel,**  
Corrector am Dom-Gymnasium zu Verden.

In drei Cursus. gr. 8.  
**Erster Cursus. Formenlehre. — 12 M. Zweiter Cursus.**  
**Syntax. — 20 M.**

Diese, aus drei Cursus bestehende Anleitung ist eben sowohl die untern und mittlern Klassen gelehrter Schulen als auch für Privat-Unterricht bestimmt. Der Herr Verf. hat sich bemüht, derselben nach einer einfachen, durch mehrjährige Erfahrung währten Methode den Verstand und das Gedächtniß der Jung gleichmäßig zu üben, eine gründliche Kenntniß der lateinischen Grammatik zu befördern und den Schülern eine technische Fertigkeit und Sicherheit in der Anwendung der grammatischen Regeln im Übersetzen zu verschaffen. Um die Aufmerksamkeit und das Nachdenken der Lernenden zu schärfen und vorzüglich ihren häuslichen petitionen zu Hülfe zu kommen, sind mit Hinweisung auf die gewöhnlich am häufigsten gebrauchten Sprachlehren jedem einzelnen Schnitte Fragen vorausgeschickt; sodann folgen kürzere und längere Beispiele als Beispiele zum Übersetzen. Den Beschluß jedes Cursus bilden angemessene Erzählungen, die dem Lehrer Gelegenheit geben, in zweckmäßiger Abwechselung auch die weiter vorgerückten Schüler seiner Klasse zum Übersetzen zu üben. Da der Hr. Verf. zugleich ein stufenweises Fortschreiten vom Leichten zum Schwereren sorgfältig beobachtet hat, darf dieses neue Übungsbuch allen Schulmännern und Privatlehrern als vorzüglich brauchbar empfohlen werden. Der 3te Cursus, welcher den Periodenbau enthält, folgt baldigst nach.

Im Verlage der Rauch'schen Buchhandlung in Berlin ist erschienen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

### **H a n d b u c h** der **p h a r m a c e u t i s c h e n B o t a n i k.** Ein Leitfaden zu Vorlesungen und zum Selbststudium von

**Dr. Albert Dietrich.**  
28 Bogen in gr. 8. Preis 2 Rthlr.

**Textverbesserung.**  
S. 252 Z. 13 v. u. l. Sept. statt Dec.





**Archiv und Zeitung**  
des  
**APOTHEKER-VEREIN**  
in  
**Norddeutschland.**

---

**Herausgegeben**  
von  
**Rudolph Brandes und Heinrich Wackenrodt**

---

**Zweiter Band**  
im  
*Vereinsjahr der Jussieu's.*

---

**Hannover.**  
Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung.  
**1840.**

# ARCHIV

der

# PHARMACIE,

eine Zeitschrift

des

Apotheker - Vereins in Norddeutschland.

Zweite Reihe. XXII. Band.

Der ganzen Folge LXXII. Band.

Herausgegeben

unter Mitwirkung der HH. *Albers, L. Aschoff, Baldenius, Bartling, Bassoletto, Bley, Bolle, Cerutti, Erdmann, Gebauer, Geiseler, Guppert, Hansmann, Hedrich, Jahn, Jonas, Liebermann, Löwig, Michel, Mohr, Müller, Oberdörffer, Richter, Röttscher, Siller, Simon, Stratingh, Tognio, Voget*

von

*Rudolph Brandes und Heinrich Wackenroder.*



Hannover.

Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung.

1840.



# Inhaltsanzeige.

## Erstes Heft.

### Erste Abtheilung.

#### Vereinszeitung.

1. Vereinsangelegenheiten. Andeutungen über den Werth, welcher der Versammlung des norddeutschen Apothekervereins zu Pyrmont, sowie den Versammlungen des Vereins überhaupt beizulegen ist; von Dr. Geiseler. (Vortrag, gehalten in der Generalversammlung des Vereins zu Pyrmont, am 21. Sept. 1839) S. 1. — 2. Wohlwollen für den Verein 8. — 3. Eintritt neuer Mitglieder 9. — 4. Vicedirectorium im Königreich Sachsen 10. — 5. Verschiedene Nachrichten 10. — 6. Generalkasse 11. — 7. Vereinskassapital 11. — 8. Gelehrte Gesellschaften. Akademie der Wissenschaften in Berlin S. 11.

### Zweite Abtheilung.

#### Chemie.

Seite

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Chemische Ansichten über die Zusammensetzung mehrerer organischer Stoffe; von Dr. C. Löwig, Professor in Bonn. (Forts. von Bd. XVII. 2. R. S. 176).....                                                                                                                                  | 13 |
| 2. Geraniin, den eigenthümlichen Bitterstoff mehrerer Storchschnübelarten ( <i>Geraniceae</i> ); vom Apotheker Müller in Albstadt, Vicedirector des Vereins. (Vorgetragen in der Versammlung des Apothekervereins in Norddeutschland) am 21. Sept. 1839 zu Pyrmont gehaltenen Jussieu'schen | 29 |
| 3. Ueber den Stickstoff in festen Pflanzentheilen nachzuweisen; von Chr. Hansmann .....                                                                                                                                                                                                     | 33 |
| 4. Ueber animalischer Substanzen in Flüssigkeiten; von Dr. J. Franz Simon. (Forts. von Bd. XXI. 2. R. S. 278).....                                                                                                                                                                          | 35 |
| 5. Ueber Bemerkungen über den officinellen Kermes und Goldschweidel; von Franz Jahn, Apotheker und Kreisdirector des Vereins in Meiningen .....                                                                                                                                             | 40 |
| 6. Ueber die Darstellung von <i>Kermes minerale</i> und <i>Sulphur. aurum</i> , nach der Deplacirungsmethode; vom Professor Dr. S. Stratingh in Gröningen .....                                                                                                                             | 68 |
| 7. Ueber die Darstellung einer besondern Krystallisation des Figuier'schen Gallinzes; von Dr. Bley .....                                                                                                                                                                                    | 70 |
| 8. Ueber die leichteste und zweckmässigste Benotzung des sauren schwefelsauren Kali, Retortenrückstand von der Salpeterbereitung, auf neutrales schwefels. Kali; von L. K. Jonas in Eilenburg .....                                                                                         | 70 |
| 9. Ueber <i>Amphas kalicus</i> in Betreff zu technischer Anwendung; von W. Richter .....                                                                                                                                                                                                    | 72 |

### Dritte Abtheilung.

#### Extractionen.

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Ueber die zweckmässigste Darstellung der Extracte; von Dr. Fr. Mohr .....                 | 74 |
| 2. Ueber Extractbereitung; vom Apotheker Bolle in Angermünde, Vicedirector des Vereins ..... | 85 |

Bemerkung über Bereitung narkotischer Extracte, vom Apotheker Liebermann in Grünenplan .....  
 Ueber die Darstellung der narkotischen Extracte; von Rudolph Brandes.....

### Vierte Abtheilung.

#### Arzneiformen und Compositionen.

Ueber einige Syrupe mit Jodverbindungen; vom Professor Dr. Tognio in Pesth.....  
 Formeln für Doppeltjodquecksilber-Jodkalium.....  
 Furnari's Jodsolution.....  
 Cooper's Jodkaliumlösung.....  
 Salbe zur Erweiterung der Pupille .....  
 Emulsio Cerae.....  
 Ueber verschiedene Bindungsmittel des Copaivabalsams in Pillenmassen; von Dr. Geiseler.....  
 Bemerkung einer merkwürdigen Temperaturerhöhung, die bei der Mischung von trockenem Schwefelkali mit Baldrianpulver entsteht; vom Apotheker Röttcher in Wiedenbrück.....  
 Ueber die Mischung des Kamphers mit verschiedenen Körpern, die den Geruch desselben maskiren; von Plancher.....  
 Vereinigung fetter Oele mit Samenemulsionen, ohne Zusatz von Gummi; von E. Siller in St. Petersburg .....  
 Pulverförmige Conserven; von Foy.....  
 Syrupus Chinae.....  
 Syrupus cortic. rad. Granati.....

### Fünfte Abtheilung.

#### Allgemeiner Anzeiger.

*I. Anzeiger der Vereinszeitung.* Notizen aus der Generalcorrespondenz des Directoriums S. 114. — Handelsnotizen 114. — Bemerkungen über die Etiketten an Standgefäßen; vom Apotheker Denius in Dessau 116. — Miscellen 117. — Anzeige 118. — Kauf- und Verkaufsanzeigen 118. — Dienstgesuche 120.

*II. Anzeiger der Verlagshandlung* S. 120.



### Zweites Heft.

#### Erste Abtheilung.

##### Vereinszeitung.

1) *Vereinsangelegenheiten.* Directorialconferenz zu Herborn am 2. April 1840 S. 121. — Hohes Wohlwollen für den Verein — Erweiterung des Vereins und Eintritt neuer Mitglieder 123. — Aufforderung in Bezug auf die nöthige neue Auflage der Statuten des Vereins 125. — Vereinskapi tal 125.

2) *Medicinalwesen und Medicinalpolizei.* Hufeland'sche Gesellschaft zur Unterstützung nothleidender Aerzte und Wundärzte S. 125. — Notiz über das Medicinalwesen in Rußland 126. — Die medico-chirurgischen Akademien in Rußland 127. — Die Medicinalpersonen in London 127. — Medicinalwesen bei den Chinesen auf Java 127.

3) *Gelehrte Gesellschaften und Lehranstalten.* Akademie



Gesellschaften in Berlin S. 128. — Gesellschaft naturforschender  
in Berlin 128. — Verein für Erdkunde in Berlin 129. —  
Gesellschaft der Wiener Aerzte 129. — Die Gartenbaugesellschaft  
in 130. — Physikalischer Verein in Frankfurt 130. — Aka-  
demie der Wissenschaften in St. Petersburg 130. — Asiatische Ge-  
sellschaft in London 130. — Medicinisch-botanische Gesellschaft  
in London 131. — Britisches Museum 131.

Personalnotizen S. 131.

## **Zweite Abtheilung.**

### **Physik.**

Seite

Die Fixirung mikroskopischer Lichtbilder mittelst des  
Hydro-Oxygengasmikroskops; von J. Gebauer, Director  
der Bau- und Kunstschule, und H. R. Göppert, Professor  
in Breslau ..... 133

## **Dritte Abtheilung.**

### **Chemie.**

Untersuchungen über den Indigo; von Otto Linné Erdmann 138  
Beiträge zur chemischen Kenntniss der ätherischen Oele; von  
Rudolph Brandes ..... 160  
Die Camphene; von Soubeiran und Capitaine..... 171  
Die Aetherbildung, nach H. Rose..... 188  
Die Erscheinungen der Gährung, Fäulniss und Verwesung,  
und ihre Ursachen, nach Liebig..... 197

## **Vierte Abtheilung.**

### **Mineralwässer und Bäder.**

Das Vorkommen des Jods und Broms im Wasser eines  
Bunnens zu Atens im Oldenburgischen; von Chr. Hans-  
mann..... 211  
Abhandlung über das Mineralwasser von Franzensbrunn bei  
Eger..... 214  
Abhandlung über die Mineralwässer der Moldau..... 215  
Die Quellen in der Berberei ..... 217

## **Fünfte Abtheilung.**

### **Naturgeschichte.**

Chemische Untersuchung zweier angeblichen Meteorsteine vom  
Hinterkley bei Quedlinburg; von Dr. Bley in Bernburg 218  
Chemische Notiz; vom Professor Dr. Bartling in Göttingen 226  
Fischzucht, insbesondere die Zuchtteiche in Moritzburg bei  
Dresden betreffend; vom Apotheker F. W. Hedrich da-  
selbst..... 226

## **Sechste Abtheilung.**

### **Toxikologie.**

Erzeugung einer Vergiftung durch Schwefelsäure; von L.  
Aschoff, Apotheker in Bielefeld und Assessor des Vereins 234

## **Siebente Abtheilung.**

### **Allgemeiner Anzeiger.**

Anger der Vereinszeitung. Notizen aus der Generalcorres-  
pondenz des Directoriums S. 240. — Die Gehülfsen-Unterstützungs-  
zahl 240. — Handelsnotizen 241. — Vorschrift zu Goldfirnis,  
ertheilt von Müller in Medebach 243. — Buchbinderlack 244. —  
Die Stempelfarben für die chemische Bleiche 244. — Dinte für

Stahlfedern 244. — Herausbringen festsitzender eingeriebener Stöpsel 244. — Miscellen 245. — Verkaufsanzeige 246. — I gesuche 246. — Apothekenverkäufe 247.

II. Anzeiger der Verlagshandlung S. 247.

### Drittes Heft.

## Erste Abtheilung.

### Vereinszeitung.

1) *Vereinsangelegenheiten.* Directorialconferenz zu Sal am 27. April 1840 S. 249. — Eintritt neuer Mitglieder 250. — ralkasse 250. — Fortsetzung des Verzeichnisses der eingeg nen Beiträge für Hrn. Ap. Linke in Neustadt, Vereinskreis walde 251. — Anzeigen über Kreisversammlungen 251.

2) *Personalnotizen* S. 252.

## Zweite Abtheilung.

### Chemie.

Untersuchungen über den Indigo; von Otto Linné Erdmann (Schluß der Seite 159 abgebrochenen Abhandlung).....

Ueber freie Bernsteinsäure, welche im Retinit, in den Braun kohlen und dem *Qleum empyreumaticum e ligno fossili* ge funden wird; vom Apotheker Cerutti in Camburg.....

Ueber die wahrscheinliche vorweltliche Bildung des Bernsteins; von Dr. Voget in Heinsberg.....

Bemerkung über den Bernstein zu vorstehendem Aufsätze; von Rudolph Brandes.....

Ueber Darstellung des Jodeisens; vom Apotheker Oberdörf fer in Hamburg.....

Ueber Verbrennung des Eisens; vom Professor Stratingh Gröningen.....

Ueber Darstellung einiger destillirten Wässer; von Dr. Bley

## Dritte Abtheilung.

### Mineralwässer.

Die Mineralquellen der Wallachei; von Dr. Carl Friedrich Eduard Siller, Apotheker, kais. russ. Rathe und Ritter des St. Annenordens dritter Klasse, etc.....

Chemische Analyse der Mineralquelle zu Steinbeck im Kreise Tecklenburg (Regierungsbezirk Münster); von J. F. Albers, Apotheker zu Lengerich.....

## Vierte Abtheilung.

### Allgemeiner Anzeiger.

I. *Anzeiger der Vereinszeitung.* Notizen aus der Genera respondenz des Directoriums S. 352. — Versammlung im directorium Bernburg 352. — Anzeige, über die diesjährige K versammlung in Münster 353. — Handelsnotizen 353. — Misc Notiz über die im Handel vorkommenden Spermaceti-Lichter Dr. Biasoletto in Triest 355. — Anwendung des Ultramarins Michal in Schweinfurt 356. — Verkaufsanzeige 357.

II. *Anzeiger der Verlagshandlung* S. 358.

Vereinsjahr der Jussieu's.

1840.

April.

**ARCHIV**  
**DER PHARMACIE,**  
eine Zeitschrift  
des  
Apotheker-Vereins in Norddeutschland.

Zweite Reihe. Zweiundzwanzigsten Bandes erstes Heft.

Erste Abtheilung.

**Vereinszeitung,**

redigirt vom Directorio des Vereins.

*1) Vereinsangelegenheiten.*

Vorträge über den Werth, welcher der Versammlung des norddeutschen Apothekervereins zu Pyrmont, so wie den Versammlungen des Vereins überhaupt beizulegen ist;

von

*Dr. Geiseler.*

gehalten in der Generalversammlung des Vereins zu Pyrmont, am 21. Sept. 1839.)

Die Naturwissenschaften gedeihen in unserer Zeit mit so großen Trieben, daß sie das Bewußtsein, welches sie zum Fortschritt der Erkenntniß macht, in eine unabsehbare Ferne zu führen scheinen, wo nicht sowohl eine Befriedigung gegeben, als vielmehr das demüthigende Gefühl erzeugt wird, daß es unangeheuren Stoff, auch bei dem regsten Interesse und

Pharm. II. Reihe. XXII. Bds. I. Hft.

dem größten Fleiß, wenig gewachsen zu sein. Beobachten folgen auf Beobachtungen, Entdeckungen auf Entdeckungen, Hypothesen auf Hypothesen. Indem aber die Wissenschaft diese gesteigerte Thätigkeit einer endlosen Zersplitterung gegeben zu sein scheint, macht sich in ihr von selbst ein Bedürfnis fühlbar, über der Mannichfaltigkeit des Einzelnen nicht die Einheit des Ganzen zu verlieren. Es fehlt wenig an Systemen, als ehemals, und sogar äußerlich jene Nothwendigkeit, eine Uebersicht des Ganzen zu gewinnen, sich Bahn; die Naturforscher feiern in Deutschland olympische Spiele ihrer Wissenschaft in den großartigen, bald dort gehaltenen Versammlungen, wo alle Gelehrten der Naturkunde repräsentirt werden und die verschiedensten Ansichten in die Möglichkeit versetzt sind, durch mündliche Verhandlungen sich auf eine Weise leicht zu verständigen und zu vereinigen, wie wir noch nirgend anders ein Beispiel gesehen haben. Jene Nothwendigkeit, in der empirischen Fülle der Natur die Einheit zu bewahren, muß unstreitig als die philosophische Grundlage der Naturwissenschaften angesehen werden.

Wie nun aber auch das Verhältniß der Philosophie zur Empirie betrachtet werden mag, so viel ist gewiß, daß die Empirie eben sowohl, als in der Speculation logisch begründet werden muß. Das Logische aber erscheint von besonderer Bedeutung in den Eintheilungen, deren auch die Empirie entbehren kann. Wie nun ein Stoff am richtigsten einzutheilen werden könne, darüber giebt die gewöhnliche Logik einige Regeln, welche jedoch von dem Mangel nicht frei sind. Das Erkennen in der Geschiedenheit von seinem Gegenstande zu behandeln. Da aber die Eintheilung nicht von uns, den Theilnehmenden, sondern von dem Object der Erkenntniß selbst abhängt, und die wahrhafte Eintheilung nicht die ist, welche wir nach besonderen Eintheilungsgründen machen, sondern die, welche der Gegenstand an sich selbst hat, so thun wir ihm, wenn wir diese Uebereinstimmung nicht erreicht ist, mit unserem Willen Gewalt an. Die Eintheilung ist am Ende nichts anderes als der Begriff der Sache, denn sie stellt uns dar, wie das Allgemeine in der Sache selbst in das Besondere und Einzelne unterteilt ist. Diese Einheit des Allgemeinen, Besondern und Einzelnen ist der Begriff.

Der Gang der Erkenntniß in ihrer geschichtlichen Entwicklung ist nun allerdings der, daß zunächst das Besondere ergriffen und zur Grundlage einer Eintheilung gemacht wird. Man sucht die hervorstechendsten wesentlichen Merkmale und Hauptkennzeichen auf und subsumirt darunter das Einzelne. Allein bei dieser Ausführung ergiebt sich als gewöhnliches Resultat die relative Widerlegung der beim Eintheilen gemachten Voraussetzung, daß das Merkmal, von dem man ausgeht, das wesentliche, das charakteristische sei. Es finden sich dann Substanzen, welche bei aller sonstigen Aehnlichkeit die Substanz verweigern und man erkennt dann zwar, daß die bisherige Eintheilung zu eng ist, als die am meisten durchgeführte, auf einen gewissen Grad bewährte, man will sie aber nicht gleich aufgeben, woran man allerdings Recht thut, und hat nun eine Zeit lang mit Zwitterformen und Zwitterbegriffen zu thun.

In die Eintheilung nun, wie eben angedeutet, im Grunde dem Begriff der Sache dasselbe ist, so erhellet auch hier, wie das Systematische überhaupt mit ihr zusammenhängt, wie beim Systematisiren ist die Eintheilung und das Princip zwischen das Wesentliche. Gewöhnlich unterscheidet man hier das künstliche System vom natürlichen. Es braucht kaum erwähnt zu werden, daß bei wirklichen Versuchen, in jenen oft die Natur, als in dieser Kunst vorhanden sein kann. Allein die Begründungsweise selbst ist dies etwas Zufälliges. Es geht sich in dieser Hinsicht nur, ob die Uebereinstimmung des dargestellten Begriffs mit dem Object, von dem er der Begriff ist, aus dem Princip hervorgeht oder nicht, und ob ein Mittel über diese Consequenz möglich ist, oder nicht? Klar ist aber, daß ein künstliches System, wenn es dies wirklich ist, immer nur ein provisorisches sein kann, und daß es größter Werth in dem liegen muß, was in ihm dem natürlichen System angehört. Das natürliche System ist nämlich ein anderes, als das der Natur selbst. Die Natur ist ein System. Wir haben sie nur zu erkennen, um auch systematisch zu verfahren, und je inniger wir uns ihr hingeben, je mehr wir ganz von uns absehen, um so mehr wird sie unseren Blicken die Harmonie ihres wundervollen Lebens enthüllen. Der Eintheilungsgrund des künstlichen Systems ist uns deshalb unzureichend, weil er nicht gleichmäßig das Ganze ergreift, sondern nur, wenn auch wesentliche Prädikatbestimmung für das Ganze in ihrer Einseitigkeit geltend machen will.

Je schneller und umfangreicher sich nun das Studium der Natur in der neuen Zeit entwickelt hat, um so größer hat auch die Verwirrung werden müssen, die in den Eintheilungen herrschte, weil die genauere Kenntniß Vieles weit ausderrückte, was früher mit einander verbunden war, und verlebte Vieles in enge Gemeinschaft brachte, was früher als ein ganz Heterogenes dand.

Beseitigt deshalb die Herstellung der Einheit, wie in den Naturwissenschaften im Allgemeinen, so in jedem einzelnen Theile derselben als nothwendig und wünschenswerth, so müssen die Manner, welche sie zu erreichen trachten und trachten, uns im höchsten Grade ehrenwerth erscheinen, so können wir uns gedrungen fühlen, ihnen die Tribute der Achtung und Dankbarkeit freudig darzubringen. Und dies geschieht auch am heutigen Tage von Seiten des norddeutschen Apothekervereins. Es wird das heutige Stiftungsfest zu Ehren von Männern gefeiert, die in einem wichtigen Zweige der pharmaceutischen Wissenschaften, in der Botanik die Einheit bekämpfend, die Gründer des natürlichen Pflanzenstems, also die Gründer der Einheit und Harmonie auf dem natürlichen Naturgebiete wurden, und die bisherige Kenntniß der Gewächse zur Erkenntniß erhoben.

Wichtig und bedeutungsvoll hat in der That gerade in dieser Lehre das verehrte Directorium unsers Vereins Männer zu Hauptstünden der allgemeinen und besondern Verehrung der Vereinsmitglieder gemacht, die dieselbe Einheit erstrebten, auf welche auch wir, versammelt in Pyrmont und zum ersten Male versammelt seit jener wichtigen und einflußreichen, die Einheit



bezweckende Umgestaltung des Vereins, so unzweideutig gewiesen werden, denn wenn uns in Anton und Be v. Jussieu auf der einen Seite Symbole der wirklichen Einheit in einem wichtigen Theile unserer Berufschaften entgegentreten, so manifestiren wir auf der andern Seite nicht weniger unser Streben nach Einheit dadurch, dass wir uns in einer Stadt versammelt haben, die in ihren freien Räumen die Naturforscher Deutschlands zu ihren olympischen Spielen vereint und auch uns zur Theilnahme an denselben bereit sieht.

Bezeichnen wir daher unsere Versammlungen im Allgemeinen als die lebendig und äusserlich werdenden Ausdrücke innerlich geschauten, wenn auch nebelumhüllten Bildes, so wird uns die heutige insbesondere deutlicher schon als alle bisherige die Umrisse eines Ideals erkennen lassen, dessen Erfassung und Verwirklichung wir erstreben. Zwar könnte die auch bei uns thätige Einbildungskraft die Schranken des Wirklichen überschreiten und nur nach den Gesetzen des Möglichen etwas Idealisches zu bilden scheinen, allein dies kann eben auch nur Schein sein, denn der Stoff zu diesen Bildungen ist aus der Wirklichkeit entnommen und vereint nur die in der Wirklichkeit zerstreut und zerstückelt findenden Züge zu einem Gesamtbilde des Vollkommenen, Grossen und Schönen. Dies Ideal aber, dem Schoosse unsers jugendlichen Vereins bei dessen Gründung noch schlummerte, und bei der anfänglichen geringen Thätigkeit desselben nur nach den Gesetzen der Möglichkeit zu verwirklichen scheinen konnte, muss jetzt schon mehr seines Nebels entkleidet und nach Ideen der Vernunft aufgestellt erscheinen, je mehr die immer weitere Verbreitung, die immer grössere Ausdehnung dieses Instituts einen bestimmten Strebe- und Zielpunkt voraussetzen lässt, jetzt, wo der Verein schon eine Geschichte hat und seiner Leistungen sich rühmen darf, heute endlich die gesteigerte Theilnahme an demselben sich in einer so reichhaltigen, glänzenden Versammlung ausspricht.

In früheren Zeiten, in denen das Menschengeschlecht mehr naturwüchsig, mehr allmählig entwickelte, traten an die Stelle der immer absterbenden, stagnirenden Verhältnisse ein, in denen die durchgemessene Laufbahn der geistigen Ausbildung des Alters ins Bewusstsein zurückgerufen werden musste und lange Ruhepunkte dazu dienten, den Boden wieder tragfähig zu machen, und fähig, die Saat für eine weitere Fortentwicklung aufzunehmen. In der neuern Zeit dagegen, wo die steigende Cultur alle Interessen beschleunigt, findet dieser allgemeine, ungenommene Gang nicht mehr in so stetiger, consequenter Fortentwicklung innerhalb so grosser Zeitdimensionen statt, sondern läuft rasch und in engeren Kreisen ab, und zwar so, dass die verschiedenen Stadien desselben nicht unmittelbar hintereinander, sondern theilweise über einander geschoben erscheinen, oder, um ein anderes Bild zu gebrauchen, Blüthe und Frucht stehen oft gleichzeitig neben einander auf dem breit entfalteten Baume des schichtlichen Lebens, dessen Keim als innerer Kern seine Wurzeln in den Boden des allgemeinen Lebens verzweigt, aus dem er dessen Urstoffe als Nahrung in sich aufnimmt. Das Wesentliche der Jetztzeit nämlich besteht in immer rascherer Fortentwicklung.

beschränkung ursprünglich einfacher und einseitiger Interessen immer complicirter allseitiger Individualisation, und daher der schaffende Geist eines Künstlers, in welchem die Phantasie noch Ideen bildet, zwischen die Wirklichkeit und die sichtbare Welt der Ideen gestellt zu sein scheint, wie er lebt und individualisirt zugleich, so sehen wir auch jetzt, daß die Wirklichkeit angeregt, die gegebenen Formen zur Vollkommenheit der Idee sich erheben, indem dieser Act des Idearens und Individualisirens vorgenommen wird. Es wird also nicht jetzt noch der Zustand der Wirklichkeit mit der Gestaltung der Formen nach einem durchmessenen Zeitabschnitte ins Irdische gerufen, jedoch ohne langes Verweilen durch die Betrachtung dieser Formen die Idee in ihrer Klarheit immer deutlicher ins Licht gestellt. Und so bleibt denn auch innerhalb, dieser enger sich concentrirenden Kreise der Typus eines Organisationsgesetzes bemerkbar, ohne dessen Befolgung der Streben-Zelpunct in jeglicher Art von geistiger Entwicklung nicht erkennbar, ohne dessen Walten das Keimen und Wachsen der neuen und Reifen neu gestreuter Saaten selbst in dem so unfruchtbaren Boden der Jetztzeit unmöglich ist.

In wie weit auch der Apothekerverein in Norddeutschland dem Organisationsgesetze gefolgt sei, das wird aus seinen, häufig wiederkehrenden, öffentlichen Versammlungen klar, sie geben einem Theils einen Beweis für seine, im Laufe der Zeit entwickelte Thätigkeit, indem sie in ihnen einen mit Blüthen und Früchten zugleich prangenden Baum zeigen, andern Theils zeigen sie die Stadien und Ruhepunkte, während derer immer wieder die Keime gelegt sind zur Umgestaltung mancher Formen, da das anzustrebende Ideal mehr erkannt war, und der Idee, in dem Inhalte auch die Form adaequat gemacht werden mußte, während derer dann aber auch der zurückgelegte Weg mit einem Überblick und Muth geschöpft werden konnte zu einem neuen Schritte fortschreiten. Zwar bot sich hier auch dem forschenden Auge manches Trübe dar, oft mußten die Blicke gelenkt werden auf Verhältnisse, die dem Gedeihen der Wissenschaften in unserm Kreise nicht günstig waren, da behagliche, wohlhabende, durch innere und äußere Stürme und Besorgnisse nicht gekümmerte Zustände schmerzlich vermifst, die in dieser Beziehung ausgesprochenen Klagen und Wünsche aber schief beurtheilt und zugeschrieben wurden gemeiner und niedriger Geistesart, während sie ihren reinen Silberquell hatten in dem Streben nach der Erreichung des Ideals, das unser Verein umschließt, in dem Streben nach Erlangung einer größern Vollkommenheit in unserer Kunst und Wissenschaft; dennoch kräftigten jedesmal die Versammlungen und deren mitgetheilte Resultate alle Vereinsmitglieder und erzeugten in allen eine Begeisterung, wie sie nur durch etwas wahrhaft Edles hervorgerufen werden und wie sie nur zur Erstrebung eines Ideals des Vollkommenen, Großen und Schönen leiten kann.

Es zeigt sich also auch in der Entwicklung unsers Vereins ein Gesetz wirksam, dessen erfolgreiches Walten besonders in unsern Versammlungen hervortritt, ein Gesetz, das aus dem inneren Wesen jeder günstigen Entwicklung hervorgeht und zu derselben Einheit führen muß, der es entsprossen ist. Die

Erkenntniss einer Einheit, als vollständiger Uebereinstimmung von Form und Inhalt, wie sie im natürlichen System gegentritt, und wie sie nothwendig ist zur Bildung eines ständigen Ganzen, hat unstreitig die Stifter und Gründers Vereins geleitet und sie in den angeordneten jährlichen Versammlungen nicht nur Ruhepunkte, sondern auch Anregungsmittel der Einheit in jeglicher Beziehung erkennen lassen. Ja das Streben nach ihr hat unzweifelhaft auch die so genannten Klagen und Wünsche hervorgerufen, die aus dem nicht schweigen können. Denn erst der äusserlich zu geistig gestellte Mensch wird empfänglich für die Wissenschaft, die dem gemeinen Bedürfniss enthobene vermögen es, den ungeschmälertesten Antheil zuzuwenden. Aus dem fröhlichen Gefühle der Sorglosigkeit, Ruhe und Fülle geht das Bestreben hervor, dies Behagen durch geistige That gleichsam in die höhere Welt zum Vollgenuss zu bringen, den rechten Sinn der Wissenschaft zu erregen, zu nähren und auf das Wichtigste zu erweitern. Darum dürfen wir denn das Streben der Pharmacie äusseren Hindernisse hinwegzuräumen, wenn es auch eine strenge Beurtheilung nicht entgeht, dennoch als eines Bestrebens, eine durch humane Gesetze immer freier werdende Entwicklung der Pharmacie herbeizuführen, uns rühmen. Auch diese Bestrebungen aber können zu einem sicheren Resultate niemals führen, wenn sie nicht alle einem Ziele zugewendet werden, wenn sie nicht aus einer Einheit und Ganzheit des Willens hervorgehen, wie ihn unser Verein darbietet, wie er ihn in den Versammlungen seiner Glieder durch mündliches Besprechen und Erwägen auf eine Weise kund giebt, die nichts von geistiger Leidenschaftlichkeit an sich trägt.

Wie sich aber auch Alles in wechselnden Kreisen und wie sich auch Alles gestalten mag, einer Kraft dürfen wir noch vertrauen, einer Kraft, die in deutschen Herzen unerschöpflich und unzerstörbar verborgen ist, einer Kraft, die geistigeren Interessen des Menschengeschlechts immer in ihm rege und aufrecht erhält, und somit Kunst und Wissenschaft auf eine, alle anderen Länder überbietende, Weise, trotz grösserem Mangel an äusserer Unterstützung, hebt und trägt. Das ist die Idee und zwar die Idee in ihrer allgemeinsten Bedeutung, in einem tieferen Gehalte, als sie die anderen sehr nach Ausen gerichteten Nationen zu fassen vermögen. Sie bietet den höchsten Standpunkt dar, auf welchem der menschliche Geist die Gesetze der Natur und die Verbindung derselben zu einer grossen harmonischen Einheit erkennen lernt, und auch das Ideal bilden lassen, das unser Verein anstrebt und nach allmäliger Erhebung der Pharmacie auch in ihrem Complexus von Wissenschaften wird erkennen lassen, in welchem jedes Einzelne nothwendiges Glied eines Ganzen ist, in welchem also die einzelnen Erkenntnisse zu einer Einheit im Ganzen verbunden sind.

Eine Hinaufläuterung der besonderen Erscheinung zu rein menschlichen, eine Verklärung der gemeinen Wirklichkeit in eine höhere, das scheint sonach, wie überhaupt der unheutigen Bildungsansprüchen gemässe, so auch für die zu Erhebung und Vervollkommnung der Pharmacie in jedem Be-

vereinten Pharmaceuten der ihnen vorschwebende Begriff des lebenden Ideals. Auch für uns kann nichts über die Wirklichkeit, die objective Wahrheit der Natur Hinausgehendes das Ideal sondern nur das Erfülltsein der Erscheinung des Gegenstandes, die Durchdrangensein seiner Oberfläche oder Außenseite von seiner vollen inneren Wesenheit. Wie könnten wir uns aber zu diesem Streben kräftigen, wie könnten wir uns zu dem gegenseitig anfeuern, wie könnten wir dauernd und fest stehen, schließend, die den Stürmen der Zeiten trotzend, fest haltend, ein Symbol der Einigkeit und Einheit uns allein in dem lockenden und schönen Ziele zuzuführen vermag, selbst die Idee überhaupt immer mehr und mehr in ihrer Klarheit erkannt werden, wenn unsre Versammlungen nicht Plattformen einander zuführten, wenn sie nicht die Ruhe des Blickes zu einem freudigen Rück- und Vorwärtsblicken. Und so kann auch für uns nur das hohe, in der menschlichen Meinung ruhende und in der gemeinen Wirklichkeit nur durch die Betrachtung heraufgeführt werden ans Tageslicht, in ihnen sich das anschauende Subject und das angelegte Object, die höchste Allgemeinheit und die größte Individualität zu der vollkommenen Erscheinung wahrer Idealität. Und so sehen wir in der Gegenwart nun aber auch Wissenschaft und Industrie einstimmig die Hände, die materielle Basis zu besserer Existenz vorzubereiten, verwenden sie alle Aufmerksamkeit und alles Sinnen zur Erreichung des Zwecks, so tief möglich die Natur zu durchforschen und ihre Kräfte und Kräfte für das Wohlbefinden der Gesellschaft zu benutzen, und setzen sich auf diesem Felde der Wirksamkeit die Pharmaceuten besonders thätig, so werden auch sie auf das geheime Gesetz der Natur nach ewigen unabänderlichen Gesetzen aufbauen, denn niemals vorher, so werden auch sie gewahr, in dem Entstehungsprozess der Objectenwelt dem subjectiven Denken das reinste Vorbild und die bestimmteste Vorlage gegeben ist. Mit dieser Erkenntnis verbindet sich dann die Einsicht, wie tief das menschliche Dasein in diesem Boden steht und selbst seine höhere Existenz gefährdet, wenn es die Gesetze für sein leibliches und damit geistiges Wohlbefinden in den Gesetzen der Natur überschreitet, ja, wie seine sublimere Einsicht sich in dem Grade fortentwickle, in dem sie die Gesetze des Werdens in der Natur sich offenbarende Gesetze der Vernunft tiefer erkennen lernt. Wie alte Weise das Leben auf den Staat der Bienen als Vorbild für die wahre Ordnung bürgerlicher Gesellschaft hindeuten, so wird die zunehmende Erkenntnis der tiefen Gesetzmäßigkeit in der großen Oekonomie der Natur immer auf das, was einzig Recht ist, weisen, und, wie wir immer naturgemäßere Formen im Leben auftreten sehen, so hat sich auch die Wissenschaft des Lebens dieses Prinzips der Durchdringung von Subject und Object für ihr Aufleben und Gedeihen zu erfreuen, eines Einflusses, dessen günstige Wirkung auch die deutsche Pharmacie in der Bildung von Vereinen unter ihren Bekennern, und besonders in deren von Zeit zu Zeit sich wiederholenden Versammlungen in den Tag legt. Und wie es ein Zeichen der Zeiten und der Künste und Wissenschaften ist, daß die schaffenden



Geister, welche sich der gährenden Gedanken gestaltend tigen, dadurch die Menge unwillkürlich zum Bewusstsein und somit zu einer höheren und freieren Bildung ziehen, so dürfen wir gewiss mit Recht das Entstehen der pharmaceutischen Vereine, deren ersten einer der norddeutschen als eine günstige Vorbedeutung für das immer höhere Aufblühen der Pharmacie in Deutschland betrachten, ja die beabsichtigte Organisation eines süddeutschen Apothekervereins mit schon vorbereitenden, im Laufe der Zeit gewiss eine Verschmelzung desselben mit dem unsrigen, zeigt, wie der klang die große, von unserem verehrten Oberdirector ben gerufene Idee gefunden hat, sie zeigt, wie durch seine würdigen Mitstifter ein Gedanke lebendig und Wirklichkeit geworden ist, der in den Herzen der deutschen Pharmazie nur schlummernd vorhanden war und erst durch eine schaffende Hand geweckt werden mußte, um die schönen Früchte zu tragen, um seine reichen Segnungen allen Gliedern unserer pharmaceutischen Vereine zu spenden, und auch uns, wie ich so besonders in dieser Versammlung ein herrliches und glückliches Fest zu bereiten.

## Hohes Wohlwollen für den Verein.

(Fortsetzung von S. 131 Bd. XXI. 2. R. des Archivs  
XI.)

Wohlgeborner,  
Hochgeehrtester Herr Hofrath und Medicinalrath

In Folge des von Ew. Wohlgeboren unterm 24. v. das von mir bekleidete Ministerium des Innern gerichteten Beschlusses, daß der Begründung des Apothekervereins in Norddeutsches Land im Königreiche Sachsen ebenfalls Genehmigung zu ertheilen, dahin, daß die hiesigen Medicinal-Collegien das von diesem eine herausgegebene Archiv der Pharmacie mithalten, und die beigefügte Vorstellung an das Ministerium der Finanzen befördert werden möge, ermangele ich nicht, Folgendes zu ergebenst zu erwiedern.

Die Verbreitung des fraglichen Vereins kann auch in anderen Ländern gestattet werden, folglich Dr. Meurer, Vorstand der hiesigen Marienapotheke, das ihm für das Königreich Sachsen übertragene Vicedirectorium annehmen. Das Mithalten des Archivs der Pharmacie findet bereits bei der, der obersten Medicinalbehörde und der chirurgisch-medicinischen Akademie gemeinschaftlich zugehörigen Bibliothek statt. Das Gesuchte wird durch Bewilligung einer Portovergünstigung bei Versendung des Archivs und der Bücher des Lesezirkels gegen ein Avers an das Finanzministerium abgegeben und thunlichst ermöglicht worden.

Mit größter Hochachtung verharre ich übrigens

Ew. Wohlgeboren

Dresden,  
am 15. Febr. 1840.

ergebener  
v. Nostitz und Jäncker



## XII.

Im Namen Sr. Herzogl. Durchlaucht des Herzogs Bernhard  
von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen, souverainen Fürsten  
Sachsen-Meiningen.

Auf Ihre Vorstellung vom 8. Juni v. J. eröffnen wir Ihnen  
hiermit in Gemäßheit eines höchsten Rescripts vom 8. d. M.,  
d. Sr. Herzogl. Durchlaucht der regierende Herzog die Be-  
gehren des norddeutschen Apothekervereins und seines Direc-  
tors zur Vervollkommnung der Pharmacie mit Wohlgefallen  
abgenommen und den Verein für das Herzogthum anzuer-  
kennen gütigst geruhet haben, auch dafs zur Anschaffung des  
Bedarfs für unsere Geschäftsbibliothek Verfügung ergangen ist.  
Meiningen, den 14. Januar 1840.

Herzogl. Sächs. Landesregierung.

A. Hollmann.

an den Hrn. Hof- und Medicinal-  
rath Dr. Brandes in Salz-  
burg im Fürstenthum Lippe.

### Eintritt neuer Mitglieder.

Durch die erfolgreichen Bemühungen des Hrn. Vicedirectors  
Dr. Maurer in Dresden sind wieder folgende verehrte Collegen  
im Königreich Sachsen dem Verein zugetreten:

Hr. Hofapotheker Semmler in Dresden,

„ Apotheker Bärwinkel in Leipzig,

„ „ Neubert das.,

„ „ Rohde das.,

„ „ Täschner das.,

„ „ Gebauer in Döbeln,

„ „ Sörnitz in Frohburg,

„ „ Oertel in Geringswalde,

„ „ Hennig in Grimma,

„ „ Gelbrecht in Kohren,

„ „ Schlegel in Mittweida,

„ „ Helbig in Pegau,

„ „ Leistner in Zwickau,

„ „ Dammann in Radeberg,

„ „ Heinze in Nossen,

„ „ Klingner in Camenz,

„ „ Müller in Röswein,

„ „ Jessing in Bautzen,

„ „ Bruhm in Chemnitz,

„ „ Bredemann in Borna,

„ „ Semmt in Neugersdorf,

„ „ Leubner in Wolkenstein,

„ „ Bandau in Strehle,

„ „ Arnold in Leisnitz,

„ „ Heinze in Oedran,

„ Administrator Täschner in Waldheim.

Hr. Apotheker Schmithals in Waldbroel ist, nach An-  
meldung durch Hrn. Kreisdirector Dr. Marder, als wirkliches

Mitglied des Vereins in den Kreis Gummersbach aufgenommen worden.

Desgl. Hr. Apotheker Krappe, nach Anmeldung durch Hr. Kreisdirector Jonas, in den Kreis Eilenburg.

Desgl. Hr. Apotheker Grove in Beverungen, nach Anmeldung durch Hr. Kreisdirector Müller in Driburg, in den Kreis Paderborn.

Desgl. Hr. Apotheker Scheel in Lübz, nach Anmeldung durch Hr. Vicedirector Grischow und Kreisdirector Landt, in den Kreis Güstrow.

Desgl. Hr. Apotheker Dr. Koelges und Hr. Apotheker Hart in Achen und Hr. Apotheker Esser in Aldenhoven, nach Anmeldung durch Hr. Vicedirector Sehlmeier und Kreisdirector Voget, in den Kreis Achen.

Desgl. Hr. Apotheker Trinkler in Römheld, nach Anmeldung durch Hr. Kreisdirector Jahn, in den Kreis Meiningen.

Desgl. Hr. Apotheker Westhoff in Gräfrath und Hr. Apotheker Peters in Ronsdorff, nach Anmeldung durch Hr. Kreisdirector Weber, in den Kreis Schwelm.

Desgl. Hr. Apotheker Grave in Rhede, nach Anmeldung durch Hr. Kreisdirector Dr. Schmedding, in den Kreis Münster.

Desgl. Hr. Apotheker Hentschel in Salzwedel, nach Anmeldung durch Hr. Kreisdirector Treu, in den Kreis Stendal.

Hr. Apotheker Rougemont in Calbe, bereits früher Mitglied des Vereins, ist in den Kreis Stendal wieder eingetreten.

Hr. Hofapotheker Hübner in Altenburg ist als wirkliches Mitglied des Vereins aufgenommen worden, und wird in Verbindung mit mehreren andern Collegien einen besondern Kreis im Herzogthum Altenburg begründen.

### Vicedirectorium im Königreich Sachsen.

Nachdem durch die erfolgreichen Bemühungen des Hr. Meurer in Dresden bereits eine große Zahl unserer verehrten Herren Collegien in Sachsen dem Vereine zugetreten, so ist die Organisation so weit vorgeschritten, daß drei Kreise gebildet worden sind: Kreis Dresden (Altstadt), unter Leitung des Hr. Kreisdirectors Ficinus, Kreis Dresden (Neustadt), unter Leitung des Hr. Kreisdirectors Dorn jun., Kreis Lausitz, unter Leitung des Hr. Kreisdirectors Päßler in Bautzen. Mit der Gründung noch einiger neuen Kreise ist Hr. Vicedirector Meurer beschäftigt, und auch Hr. College Bärwinkel in Leipzig wirkt für denselben Zweck in dasiger Gegend.

### Verschiedene Nachrichten.

Hr. Oberfeldapotheker Wendland in Hannover ist durch den Tod unserm Vereine entrissen. Er hatte früher für die Anstalt thätig mitgewirkt und mehrere Jahre die Verwaltung des Kreises Hannover geführt.

Hr. Apotheker Hüber in Deutz ist durch den Verkauf seiner Apotheke aus dem Kreise unsers Vereins ausgetreten.

Hr. Apotheker Neddermann in Schwarza hat seine Apotheke verkauft und ist aus dem Kreise Meiningen ausgetreten, aber Mitglied bleiben und nach Begründung eines neuen Vereins in einem andern Vereinskreise, wieder eintreten.

Hr. Apotheker Rocholl, jetzt in Legde, ist mit Veränderung seines Wohnortes in den Kreis Münster übergetreten.

Die Herren Collegen Groß in Dresden und Dhomke in Meissen sind durch den Tod aus unserm Vereine ausgeschieden. Wir hätten wir gewünscht, sie noch lange in gemeinsamer Wirken unter uns zu sehen.

Hr. Administrator E. Springmühl, der der Dhomkeschen Apotheke in Meissen vorsteht, bereits früher Mitglied des Vereins im Kreise Saalfeld, ist in den Kreis Dresden (Neustadt) eingetreten.

### Generalkasse.

Rechnungen von 1839 gingen ein: von Hrn. Vicedirector K. in Angermünde, von Hrn. Vicedirector Sehlmeier in Meissen, von Hrn. Vicedirector Klönne in Mühlheim, von Hrn. Vicedirector Dr. Bucholz in Gotha.

Die Beiträge aus dem Kreise Stade für 1840 sind von Hrn. Vicedirector Kerstens eingesandt.

Verfallene Zahlungen an die Generalkasse für 1840 wurden von Hrn. Vicedirector Dr. Bley in Bernburg, von Hrn. Vicedirector Dr. Bucholz in Gotha, von Hrn. Vicedirector Sehlmeier in Köln, von Hrn. Kreisdirector Dr. Schmedding in Münster, von Hrn. Kreisdirector Müller in Paderborn.

In die Beiträge der Mitglieder zur Generalkasse des Jahres 1840 statutenmäßig jetzt entrichtet sein müssen, so werden die Herren Vicedirectoren und Kreisdirectoren um deren Sendung zur Generalkasse ersucht. Die noch restirenden Abrechnungen aus einigen Kreisen von 1839 werden in den nächsten Wochen erwartet.

Die Direction der Generalkasse.

Dr. E. F. Aschoff.

### Vereinskapital.

Beiträge zum Vereinskapital gingen ein: von Hrn. Apotheker Ernst, Hrn. Apotheker Pfeffer und Hrn. Apotheker Tippe in St. Petersburg.

Die Verwaltung des Vereinskapitals.

Brandes. Aschoff. Overbeck.

## 2) Gelehrte Gesellschaften.

Akademie der Wissenschaften in Berlin.

Sitzung am 1. Aug. 1839. Professor Dr. Lichtenstein: Ueber die Naturgeschichte Brasiliens, als Erläuterung der Werke

von Marcgrafe und Piso. — *Am 15.* Professor H. Rose: die Harze. — *Am 14. Oct.* Derselbe: Ueber eine neue der Aetherbildung und das Knistersalz von Wieliczka. — Professor Dr. Ehrenberg: Ueber noch lebende zu Thierarten der Kreideformation und neue Beobachtungen über die Algen und Bryozoen der Feuersteine der Kreide. — *Am 24.* Professor Dr. Dove: Ueber magnetelectrische Induction, die, wenn sie am Galvanometer im Gleichgewicht steht, den menschlichen Körper heftig erschüttern, hingegen, wenn sie die physiologische Wirkung gegenseitig neutralisiren, die Nadel in starke Bewegung versetzen. — *Am 28.* Prof. Dove: Ueber die Kenntnisse der Alten von der verschiedenen Temperatur des Wassers. — *Am 11. Nov.* Professor Poggenдорff: Ueber galvanische Flüssigkeiten durch zwei einander nicht berührende Metalle. — *Am 14.* Geh. Rath Karsten: Ueber die chemische Verbindung der Körper. — Professor Ritter: Ueber die geographische Verbreitung des Zuckerrohrs in der alten Welt vor dessen Verpflanzung in die neue Welt. Die älteren Griechen und Römer schweigen über das Zuckerrohr, deren Andeutungen finden sich erst bei Varro und Aelian; es ist schon daraus gewiss, daß die Heimath des Zuckerrohrs nicht in Nordasien zu suchen, sondern daß dasselbe erst in späteren Zeiten aus Ostindien nach Westasien übertragen worden ist. Das Wort für den Zucker stammt aus dem Indischen (*Sarkara, Prakrit: Sakara*), und erhielt im Arabischen die Gestalt, in welcher es nach Europa wanderte. In der Heimath des Zuckerrohrs, heisst dasselbe indess *Ikshana*. Eine veredelte Zuckerfabrikation findet man schon im 7. und 8. Jahrhundert, die wahre Raffinirung kam jedoch erst später vor, etwa um 1270. Unter den Marktpreisen von Venedig vom Jahr 1303 erscheint bereits der Zuckerkauf. Interessant sind die seit kurzem aufgefundenen Trümmer der einst berühmten Stadt Ahrtaz in Khusistan (Susiana), welche zu der Abassidischen Khalifen blühte, und wo noch unzählige Mühlsteine beweisen, welche bedeutende Zuckerfabrikation einst getrieben wurde. — Alex. v. Humboldt: Ueber die Vulkane der Hochebene von Quito. Es wurden in diesem Vortrage drei grofse Naturphänomene beschrieben, darunter der Einsturz des Vulkans Capac Urcu oder Altar de los Collanes, 30 Jahr vor der Entdeckung von Amerika, eines Berges, welcher wahrscheinlich den Chimborasso an Gröfse übertraf. — *Am 5. Dec.* Prof. G. Rose: Ueber das ursprüngliche Vorkommen des Goldes und Platins im Ural, mit Vorlegung kleiner Körner von gediegenem Golde, welches mit Osmium-Iridium verwachsen, aus den Eisenwerken von Plinsk, und eines gröfsern, einen halben Zoll dicken, mit Titaneisen verwachsenen Goldkorns aus Beresow bei Nischnei-Tagilk, und über zwei neue Mineralien, den *Uranokinit* und das *Uranotantal*. — Professor H. Rose: Ueber ein schwefelfreies schwefelsaures Ammoniak. — *Am 19. v. Olfers:* fossile Reste von Cetaceen; das wichtigste der vorgezeigten waren in Sandstein verwandelte Reste von dem Schädel eines Delphins, welcher von allen bekannten abweicht, und bei Hildesheim in Westphalen gefunden worden ist.

## Zweite Abtheilung.

### Chemie.

#### Theoretische Ansichten über die Zusammensetzung mehrer organischer Stoffe;

von

Dr. C. Löwig,

Professor in Zürich.

(Fortsetzung von Bd. XVII. 2. R. S. 176.)

#### Ueber die Zusammensetzung des Amygdalins und der Amydalinsäure.

Die große Zahl von Atomen in der Zusammensetzung dieser Körper läßt vermuthen, daß sie zusammengesetzte Verbindungen sein können. Die Einwirkung oxydirender Substanzen, wie Braunstein, Quecksilberoxyd, auf diese Körper zeigt als höchst wahrscheinlich, daß das Bittermandelöl darin gebildet vorhanden ist, nach der Einwirkung des Emulsins auf das Amygdalin kann auch die Blausäure als schon vorhanden in Betracht angenommen werden; das Auftreten von Ammoniak und Ameisensäure sind dann Zersetzungsprodukte der wässrigen Blausäure. Die Bildung von saurem Kali durch Einwirkung von übermangansaurem Kali auf Amygdalin kann auch das Resultat einer Oxydation von dem entstandenen Cyankalium sein. Ueber Blausäure und Bittermandelöl muß das Amygdalin noch eine dritte Verbindung enthalten, aus welcher die Bildung des Zuckers, der Ameisensäure, der Blausäure und des Wassers resultiren, während die Scheidung von Blausäure und Bittermandelöl erfolgt.



Nach den weitem die Zersetzung begleitenden Umständen, wird die Blausäure in Ammoniak, und Ameisensäure und das Bittermandelöl in Benzoesäure verändert. 1 At. Amygdalin ist  $N_2 C_{40} H_{54} O_{22}$ , und kann nach obigen Voraussetzungen, bestehen aus: 1 At. Blausäure ( $N_2 C_2 H_2$ ), 2 At. Bittermandelöl ( $C_{28} H_{34} O_4$ ) und 1 At. einer organischen Verbindung ( $C_{10} H_{28} O_{18}$ ). Treten zu dieser letzten noch 6 At. Sauerstoff vor, so können diese Stoffen, die leicht Sauerstoff abtreten, so können diese aus Ameisensäure, Kohlensäure und Wasser gebildet werden. Z. B. können sich bilden 5 At. Ameisensäure ( $C_{10} H_{10} O_{15}$ ) und 9 At. Wasser ( $H_{18} O_9$ ). Eben so kann diese Verbindung durch Hefe in Zucker, Ameisensäure und Wasser zerfallen, und liefern  $\frac{1}{2}$  At. Traubenzucker ( $C_6 H_{14} O_7$ ), 2 At. Ameisensäure ( $C_4 H_4 O_6$ ) und 5 At. Wasser ( $H_{10} O_5$ ) =  $C_{10} H_{28} O_{18}$ .

Was die Bildung der Amygdalinsäure anbelangt, so ist bekannt, daß durch Einwirkung von Alkali auf 1 At. Blausäure und 3 At. Wasser ameisensaure Alkali unter Freiwerden von Ammoniak entsteht, kann also beim Erhitzen des Amygdalins mit wässrigen Alkalien dieselbe Zersetzung eintreten, und während Ammoniak frei wird, die Ameisensäure die Stelle der Blausäure im Amygdalin einnehmen, und so Amygdalinsäure sich bilden. Amygdalin und Amygdalinsäure wären demnach dadurch nur unterschieden, daß das erste Blausäure, und letztere Ameisensäure enthält, wobei im letztern Falle 1 At. Wasser abgeschieden worden wäre. Nämlich 1 At. Amygdalin = 1 At. Blausäure ( $N_2 C_2 H_2$ ) + 2 At. Bittermandelöl ( $C_{28} H_{34} O_4$ ) + 1 At. der organischen Materie ( $C_{10} H_{28} O_{18}$ ) =  $N_2 C_{40} H_{54} O_{22}$ , und 1 At. Amygdalinsäure = 1 At. Ameisensäure ( $C_2 H_2 O_3$ ) + 2 At. Bittermandelöl

$10 \text{ H}_2\text{O}) + 1 \text{ At organischer Materie (C}_{10}\text{H}_{28}\text{O}_{18})$   
 $1 \text{ At. Wasser (H}_2\text{O)} = \text{C}_{40}\text{H}_{52}\text{O}_{24}.$

*Benzoylwasserstoff (Bittermandelöl) und Benzoessäure.*

Nach den Resultaten der Einwirkung von Chlor, Sauerstoff, Brom u. s. w., auf das Bittermandelöl, haben Liebig und Wöhler bekanntlich die Ansicht aufgestellt, daß das Bittermandelöl die Wasserstoffverbindung eines ternären Radikals sei, des Benzoyls, welches in seiner chemischen Wirkungsweise dem Cyan sich analog verhalte, wie folgende Verbindungsreihe zeigt:

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Benzoyl (unbekannt)..... | $\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{O}_2$                |
| Bittermandelöl.....      | $\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{O}_2 + \text{H}_2$   |
| Benzoessäure.....        | $\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{O}_2 + \text{O}$     |
| Chlorbenzoyl.....        | $\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{O}_2 + \text{Chl}_2$ |

Dieser der Zersetzung des Bittermandelöls consequenten Theorie läßt sich aber Folgendes einwenden. Ist das Bittermandelöl eine Wasserstoffverbindung, analog dem des Cyanwasserstoffs, so setzte dieses voraus, daß Benzoyl sei eine saure Substanz, welche durch Wasserstoff neutralisirt werde, dann aber müßten Substanzen, die stärker electropositiv wirken, wie der Wasserstoff, diesen aus dem Benzoylwasserstoff abscheiden, und mit dem Radikal Benzoyl sich verbinden, analog dem Verhalten der bekannten Wasserstoffverbindungen, in welchen ein einfaches oder zusammengesetztes Radikal angenommen wird. Kalium oxydirt sich zwar im Bittermandelöl, aber es veranlaßt keine Entwicklung von Wasserstoffgas, was jedenfalls eintreten müßte, wenn das Benzoyl ein electronegatives Radical wäre. Auch verwandelt sich das Bittermandelöl, mit der weingeistigen Lösung von Kali in Berührung gebracht, in benzoesaures Kali, gleichfalls ohne Entwicke-

lung von Wasserstoffgas. Man kann hier einwenden, daß das Kalium dem Benzoyl Sauerstoff entziehe, zugleich eine neue Säure gebildet werde, zu der Existenz der Wasserstoff, welcher, mit dem Benzoyl vereinigt, nothwendig wäre: aber diese Einwirkung würde gerade die Benzoyltheorie am meisten erschüttern, zumal es jedenfalls sehr sonderbar wäre, daß Benzoyl mit dem Kalium keine Verbindung bilden können, während es mit den kräftigsten electropositiven Körpern solche einzugehen vermag.

Das Benzoessäurehydrat zerfällt, wie Mitscherlich beobachtete, durch Destillation mit Kaliüberschuss, in Benzin und Kohlensäure. Mitscherlich betrachtet hierin das Hydrat der Benzoessäure für die eigentliche Säure, die aus 1 At. Benzin und 2 At. Kohlensäure besteht, und nennt sie daher Benzinkohlensäure ( $C_{12}H_{12} + C_2O_4$ ). Verbindet sich die Benzinkohlensäure mit Basen, so vereinigen sich in dem Fall, daß Wasser geschieden wird, 1 At. Sauerstoff und 2 At. Kohlensäure mit 2 At. Wasserstoff des Benzins, wodurch eine neue Säure entsteht ( $C_{12}H_{10} + C_2O_3$ ), die Benzidkohlensäure. So wie die Benzinkohlensäure dem Hydrat der Benzoessäure entspricht, so die Benzidkohlensäure der wasserfreien Benzoessäure. Das Bittermandelöl ist nach dieser Ansicht eine Verbindung von Kohlenoxyd mit Benzin ( $C_{12}H_{12} + C_2O_2$ ), und die Zersetzung dieses Oels durch Chlor, Brom u. s. w. erfolgt, indem 2 At. Chlor 2 At. Wasser dem Benzin entziehen, während 2 At. Chlor entweder mit dem zersetzten Benzin oder mit dem Kohlenoxyde sich verbinden. Im letzteren Falle vertreten die 2 At. Chlor 1 At. Sauerstoff in der Benzidkohlensäure (wasserfreie Benzoessäure). Das Chlorbenzoyl ist demnach entweder  $C_{12}H_{10}Cl_2 + C_2O_3$



$C_{12}H_{10} + C_2O_2 + Cl_2$ . Die Bildung der Benzinsäure (Benzoessäurehydrat) aus dem Bittermandelöl besteht nach dieser Theorie darin, daß 2 At. Sauer- das Kohlenoxyd im Bittermandelöl in Kohlensäure andeln. Hiernach hat man folgende Reihe von bindungen.

Bittermandelöl..... $C_{12}H_{12} + C_2O_2$

Benzoessäurehydrat..... $C_{12}H_{12} + C_2O_2 + O_2$

Wasserfreie Benzoessäure.... $C_{12}H_{10} + C_2O_2 + O$

Chlorbenzoyl..... $C_{12}H_{10} + C_2O_2 + Cl_2$

Die Zersetzungen des Bittermandelöls lassen sich nach dieser Theorie ebenso consequent erklären, nach der Benzoyltheorie, und sie hat gegen letztere den Vorzug, daß das Benzin, welches in den Verbindungen auftritt, dargestellt werden kann, während Benzoyl als eine hypothetische Substanz erscheint. wird noch unterstützt durch die Eigenschaft der eisensäure und der Schwefelsäure, mit dem Bittermandelöl eigenthümliche organische Säuren zu bilden. Verbindung der Ameisensäure mit dem Bittermandelöl, die Mandelsäure, beweist, daß organische Säuren einer Verbindung einer indifferenten organischen substanz mit einer Säure bestehen können. Für diese Theorie spricht ferner noch die Fähigkeit des Benzins mit der Schwefelsäure eine Verbindung zu bilden, welche der Benzidkleesäure in ihrer Zusammensetzung analog ist. Endlich erhält man durch Addition der spec. wichte von 2 Maafs Benzingas = 2,738 und 1 Maafs kohlen säuregas = 1,524 das spec. Gew. von 1 Maafs benzoessäurehydratgas = 4,262.

Gegen diese Ansicht läßt sich aber dasselbe einwenden, was schon bei der Essigsäure erwähnt worden ist \*).

\*) Bd. XVII. 2. R. S. 61. dieser Zeitschrift.

Durch Destillation von einfach benzoesaurem Silber wird nach Peligot eine Substanz gebildet, welche die Mitscherlich als eine Verbindung von  $C_6H_6 + CO$  ansieht, bei deren Bildung aus der Benzinkohlensäure 1 At. Sauerstoff und 2 At. Wasserstoff als Wasser ausgeschieden worden sind. Es fällt in die Augen, dass das Benzon und die Kohlensäure sich zur wasserfreien Benzoessäure verhalten, wie das Aceton, Valeron, Butyron, Delphinon u. s. w., und die Kohlensäure zur Essigsäure, Baldriansäure, Buttersäure, Delphinsäure u. s. w. Die Consequenz, welche aus der Mitscherlich'schen Theorie gezogen werden muss, ist, dass die organischen Säuren, welche 3 At. Sauerstoff enthalten, als kohlensaure Kohlenwasserstoffe angesehen werden müssen, in ihrem sogenannten wasserfreien Zustande in kohlensaure Verbindungen übergegangen sind, demnach wäre:

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Essigsäure.....    | $C_2 H_4 + C_2 O_2$       |
| Buttersäure.....   | $C_4 H_8 + C_2 O_2$       |
| Valeriansäure..... | $C_5 H_{10} + C_2 O_2$    |
| Benzoessäure.....  | $C_{12} H_{10} + C_2 O_2$ |

Ferner:

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Aceton.....  | $C_3 H_6 + CO$       |
| Butyron..... | $C_4 H_8 + CO$       |
| Valeron..... | $C_5 H_{10} + CO$    |
| Benzon.....  | $C_{12} H_{10} + CO$ |

Für jetzt liegen aber zu wenig Thatsachen vor, um dieser Ansicht eine so allgemeine Bedeutung geben zu können.

Lässt man nach Peligot auf benzoesaures Silberoxyd Brom wirken, so entstehen Bromsilber, Bromwasserstoffsäure und Brombenzoessäure, welche letztere mit den Basen Salze bildet, woraus die Säure unzersetzt sich abscheiden lässt. Sieht man die wasserhaltige Brombenzoessäure an, so sieht man, dass sie sich in Wasser auflöst, und dass die Lösung mit Silberoxyd eine milchige Flüssigkeit bildet, welche bei der Destillation eine Substanz liefert, welche die Mitscherlich als eine Verbindung von  $C_6H_6 + CO$  ansieht, bei deren Bildung aus der Benzinkohlensäure 1 At. Sauerstoff und 2 At. Wasserstoff als Wasser ausgeschieden worden sind. Es fällt in die Augen, dass das Benzon und die Kohlensäure sich zur wasserfreien Benzoessäure verhalten, wie das Aceton, Valeron, Butyron, Delphinon u. s. w., und die Kohlensäure zur Essigsäure, Baldriansäure, Buttersäure, Delphinsäure u. s. w. Die Consequenz, welche aus der Mitscherlich'schen Theorie gezogen werden muss, ist, dass die organischen Säuren, welche 3 At. Sauerstoff enthalten, als kohlensaure Kohlenwasserstoffe angesehen werden müssen, in ihrem sogenannten wasserfreien Zustande in kohlensaure Verbindungen übergegangen sind, demnach wäre:



saure für eine Wasserstoffsäure an ( $C_{14}H_{10}O_4 +$   
 so hat man im benzoesauren Silberoxyd  $C_{14}H_{10}$   
 + Arg., und könnte die Brombenzoesäure durch  
 $H_{10}O_4 + Br_2$  ausgedrückt werden, so enthielte das  
 Brombenzoyl dasselbe Radikal — 2 At. Sauerstoff wie  
 Brombenzoesäure:

Brombenzoyl .....  $C_{14}H_{10}O_2 + Br_2$

Brombenzoesäure.....  $C_{14}H_{10}O_4 + Br_2$

Nach dieser Ansicht lassen sich die brombenzoesau-  
 ren Salze als Verbindungen von 1 At. Brommetall +  
 1 At. eines sauerstoffhaltigen Salzes betrachten, worin  
 der Sauerstoff der Base zu dem der Säure wie 2:9, aus-  
 tritt, und durch eine stärkere Säure die Brombenzoesäure  
 wieder ausscheidet, ähnlich als Brom, wenn ein  
 Gemenge von Bromkalium und unterbromigsaurem Kali  
 durch eine Säure zersetzt wird.

Wird jedoch die Benzoesäure für eine Sauerstoff-  
 säure gehalten, so ist das benzoesaure Silberoxyd  $C_{14}$   
 $H_{10}O_4 + Ag_2O$ , und die Bildung der Benzoesäure kann  
 erfolgen dadurch, daß das Brom Bromsilber und unter-  
 bromige Säure ( $Br_2O$ ) bildet, welche mit der Benzoe-  
 säure, der durch 1 At. Brom 1 At. Wasserstoff entzo-  
 gen wurde, sich verbindet; oder indem das Brom Brom-  
 silber bildet, während der Sauerstoff des Silberoxyds im  
 Augenblick seines Freiwerdens mit 2 At. Brom sich mit  
 der Benzoesäure zu einer neuen Säure vereinigt, und  
 1 At. Bromwasserstoffsäure ausgeschieden wird. Nach  
 der ersten Ansicht sind die benzoesauren Salze Doppel-  
 salze aus unterbromigsauren und benzoesauren Verbin-  
 dungen, was aber um so mehr unwahrscheinlich ist,  
 da alle bekannten Doppelsalze mit 2 Sauerstoffsäuren  
 in ihre einzelne Verbindungen zerlegbar sind. Nach  
 der zweiten Ansicht ist die Brombenzoesäure eine Ver-

bindung von  $C_{14}H_9O_4Br$ , und in ihren Verbindungen als solche anzusehen. Da Brom und Sauerstoff negative Körper, so ist die Möglichkeit vorhanden, daß beide Stoffe in Verbindungen theilweise sich vereinigen können, ohne Aenderung des sauren Characters zu bewirken. Die Säure  $C_{14}H_9 + O_4Br$  wäre demnach eine Säure  $C_{28}H_{18} + O_9$ , und diese Ansicht ist leicht die wahrscheinlichste.

Ebenso wie die Brombenzoesäure läßt sich das Chlor-, Brom- und Jodbenzoyl als eine Benzoesäure betrachten, in welcher 1 At. Sauerstoff durch den genannten Körper vertreten ist. Die Benzoesäure selbst ist ein Oxyd von  $C_{14}H_{10}$ , und ihre sauren Eigenschaften werden durch die Summe sämtlicher Sauerstoffatome bestimmt. Die Ursache, warum das Chlorbenzoyl durch Wasser in Benzoesäure und Chlorwasserstoffsäure zerfällt, während die Brombenzoesäure eine ähnliche Zersetzung nicht erleidet, erklärt sich einfach durch die Annahme, daß eine Verbindung  $C_{28}H_{18} + O_9$  nicht existirt, während die  $C_{28}H_{18} + O_3$  die Benzoesäure darstellt. Die Entstehung der Benzoesäure aus dem Bittermandelöl wird nach dieser Ansicht nicht durch das Vorhandensein eines aromatischen Radikals — Benzoyl — bedingt, sondern durch die ganze Zusammensetzung des Oels. Die Verbindung der Art, daß durch Absorption von 2 At. O die ganze Bittermandelöl die Zusammensetzung des Benzoyls der Benzoesäure ohne Abscheidung einer andern Substanz herauskömmt. Ebenso erklärt sich die Bildung des Chlorbenzoyls aus dem Bittermandelöl; das Chlor entzieht diesem  $(C_{14}H_{12} + O_2)$  2 At. H, während das Chlor in die zersetzte Verbindung eintreten, wo  $C_{14}H_{10} + O_2 + Cl_2$  gebildet wird.

Diese Ansicht zeigt uns zugleich, daß Benzoessäure aus Substanzen gebildet werden kann, welche mit Bittermandelöl in keiner Beziehung stehen, wie auch in der That durch Zersetzung von Anisöl und Mandelöl mittelst Salpetersäure hervorgebracht werden können. Das Benzin und Benzon sind Zerstörungsproducte der Benzoessäure. Diese Ansicht ist im Folgenden zu Grunde gelegt.


### 25) Benzin.

Das Benzin giebt manche sehr interessante Verbindungen. Die Verbindung, welche nach Mitscherlich durch Einwirkung von rauchender Salpetersäure auf Benzin entsteht, ist Nitrobenzid = 1 At. Benzid ( $C_{12}H_{10}$ ) + 1 At. salpetriger Salpetersäure ( $N_2O_4$ ) =  $N_2H_{10}O_4$ . Vermischt man die weingeistige Auflösung Nitrobenzids mit einer reinen geistigen Auflösung von Kali und destillirt, so geht zuletzt eine rothe Substanz über, die zu Krystallen erstarrt, Stickstoffbenzid, entstanden durch Entziehung von Sauerstoff aus dem Nitrobenzid, durch die Bestandtheile des Weingeistes. Stickstoffbenzid ist 1 At. Benzid ( $C_{12}H_{10}$ ) + 2 At. Stickstoff ( $N_2$ ) =  $C_{12}H_{10}N_2$ .

Wird das Benzid mit Schwefelsäure behandelt, so entstehen zwei verschiedene Verbindungen. Löst man Benzin in wasserfreier Schwefelsäure auf und verdünnt die Masse mit Wasser, so scheidet sich nach einiger Zeit Sulfobenzid ab = 1 At. Benzid ( $C_{12}H_{10}$ ) + 1 At. Schwefelsäure ( $SO_2$ ) =  $C_{12}H_{10}O_2S$ . Löst man rauchender Schwefelsäure Benzin auf, so lange diese noch davon aufnimmt, verdünnt, sättigt mit kohlensaurem Baryt, filtrirt und zersetzt den benzidschwefelsauren Baryt mit schwefelsaurem Kupferoxyd, filtrirt,

läßt krystallisiren, löst das benzidschwefelsaure und zersetzt die Auflösung durch Schwefelwasser erhält man eine Auflösung von Benzidschwefelsäure beim Verdunsten zu einer krystallinischen Masse. Diese Säure läßt sich betrachten als bestehend aus 1 At. Benzid ( $C_{12}H_{10}$ ) + 1 At. Unterschwefelsäure ( $O_5S_2$ ) oder aus 1 At. Sulfobenzid ( $C_{12}H_{10}OS$ ) + 1 At. Schwefelsäure ( $SO_3$ ) =  $C_{12}H_{10}O_5S_2$ .

In den Körpern, welche durch die Einwirkung der Schwefelsäure auf das Benzin entstehen, ist ein Kohlenwasserstoff enthalten,  $C_{12}H_{10}$ , welcher sich vom Benzin unterscheidet, dadurch, daß er 2 At. Wasserstoff weniger enthält. Dieser Kohlenwasserstoff, welcher jedoch für sich noch nicht dargestellt werden konnte, wird *Benzid* genannt, das Benzin könnte sonst als *Benzidwasserstoff* betrachtet werden. Da es nicht wahrscheinlich ist, daß im Nitrobenzid  $\frac{1}{2}$  At. salpetriger Säure enthalten ist, weil diese Säure keine Verbindungen bilden kann, so wäre möglich, daß im Nitrobenzid Benzidoxyd vorkäme, welches in Verbindung mit Salpetersäure das Nitrobenzid darstellte. In dem Benzidoxyd würde 1 At. Sauerstoff 2 At. Wasserstoff im Benzin vertreten, und im Stickstoffbenzid würde Stickstoff die Stelle des Wasserstoffs im Benzin einnehmen. Daraus könnte nach Berzelius folgendes hervorgehen:



Diese Uebersicht soll aber für nichts anders

werden, als für eine Vorstellungsart, die nur in so fern Werth hat, als sie mit andern Erscheinungen in Zusammenhang gebracht werden kann.

Durch Einwirkung von Chlorgas auf Benzin, unter Einfluß der Sonne, entsteht nach Mitscherlich das Chlorbenzin  $C_2 H_2 Cl_2$ . Wird dieses destillirt, so geht es zum Theil unzersetzt über, zum Theil wird es in eine neue Substanz verändert, Chlorbenzid, unter Ausscheidung von Chlorwasserstoffsäure. Das Chlorbenzid hat die Formel  $C_2 H Cl$ .

Mit Brom bildet das Benzin analoge Verbindungen, Brombenzin und Brombenzid.

Aus dem Vorstehenden sieht man, daß das Benzin, und namentlich das Benzid, nicht mit den Substanzen übereinkommen, welche im Sulfobenzid u. s. w. enthalten sind, weshalb es passender gewesen wäre, den Chlor- und Bromverbindungen andere Namen zu geben, daß jedoch das Chlorbenzin auch als eine Verbindung von Chlorbenzid mit Chlorwasserstoff betrachtet werden kann, versteht sich von selbst.  $C_2 H Cl + Cl H = C_2 H_2 Cl_2$ .

## 26) Benzon.

Das Benzon wird von Mitscherlich, wie bereits oben erwähnt, als eine Verbindung von Benzid und Kohlenoxyd betrachtet.

## 27) Benzoeschwefelsäure.

Diese Säure entsteht nach Mitscherlich durch Einwirken von wasserfreier Schwefelsäure auf krystallisierte Benzoessäure, wodurch sich bilden Schwefelsäurehydrat ( $SO_2 + C_{12}$ ) und Benzoeschwefelsäure ( $C_{14} H_{10} O_3 + SO_2$ ).



28) *Benzamid, Bibenzamid und Hydrobenzamid.*

Das *Benzamid* entsteht bekanntlich, nach Li und Wöhler, wenn Chlor-, Brom- oder Cyanbenzoyl und wasserfreies Ammoniak auf einander wirken. Es lässt sich als eine Verbindung von 1 At. Benzoyl ( $C_{14}H_{10}O_2$ ) mit 1 At. Amid ( $N_2H_4$ ) betrachten  $= N_2C_{14}H_{10}O_2$ . Bei der Zersetzung wird 1 At. Wasser zerlegt, Benzoesäure und Ammoniak gebildet. Nach der Zintheorie erscheint das Benzamid als eine Verbindung von Benzid ( $C_{12}H_{10}$ ) mit 1 At. Oxamid ( $N_2C_2H_4O_2$ )  $= N_2C_{14}H_{14}O_2$ ; oder als 1 At. Benzid ( $C_{12}H_{10}$ ) + 1 At. Oxamid  $= (1 \text{ At. Cyan } N_2C_2 + 2 \text{ At. Wasser } H_2O) + C_{12}H_{10} = N_2C_{14}H_{14}O_2$ .

Das *Bibenzamid*, von Laurent untersucht, scheint durch längere Einwirkung von blausäurehaltigem Benzol, Mandelöl und Wasser zu entstehen. Es lässt sich ansehen als 1 At. doppelt benzoesaures Ammoniak, aus welchem 2 At. Wasser ausgeschieden worden sind. 1 At. doppeltbenzoesaures Ammoniak ( $N_2C_{28}H_{26}O_6$ )  $- 2 \text{ Wasser } (H_4O_2) = 2 \text{ At. Bibenzamid } N_2C_{28}H_{22}O_4$ .

Laurent betrachtet das Bibenzamid als eine Verbindung von 2 At. Imid ( $NH$ ) + 1 At. Benzoyl, 1 At. Imid ( $NH$ ) + 1 At. Benzoyl ( $C_{14}H_{10}O_2$ )  $= 1 \text{ At. Bibenzamid } N_2C_{28}H_{22}O_4$ . Nach dieser Theorie würde auch das *Bisuccinamid* aus 2 At. Imid ( $N_2H_2$ ) und einer organischen dem Benzoyl entsprechenden Verbindung entstehen. 2 At. Imid ( $N_2H_2$ ) + 1 At. der organ. Verbindung ( $C_8H_8O_4$ )  $= 1 \text{ At. Bisuccinamid } N_2C_8H_{10}O_4$ .

Bezeichnet man Benzamid mit  $C_{14}H_{10}O_2 + NH_4$ , so ist Bibenzamid  $= C_{14}H_{10}O_2 + NH_4$ . Bezeichnet man Benzamid mit  $C_{12}H_{10} + N_2C_2 + H_4O_2$ , so ist 2 At. Bibenzamid  $= C_{12}H_{10} + N_2C_2 + H_2O + C_{12}H_{10}O_2$ .

Die Bildung des Hydrobenzamids, die bekanntlich längere Berührung von Bittermandelöl und Ammoniak erfordert, würde nach der Benzoyltheorie darauf beruhen, daß  $1\frac{1}{2}$  At. Benzoyl mit 1 At. Ammoniak 3 At. Wasser Benzoylstickstoff bilden, welcher mit dem anwesenden Wasserstoff des Benzoylwasserstoffs das Hydrobenzamid hervorbringt.  $1\frac{1}{2}$  At. Bittermandelöl ( $C_{21}H_{15} + H_2$ ) + 1 At. Ammoniak ( $N_2H_6$ ) = 1 At. Hydrobenzamid ( $N_2C_{21}H_{15} + H_3$ ) + 3 At. Wasser ( $H_6O_3$ ).

Nach der Benzintheorie könnte das Hydrobenzamid eine Verbindung sein von  $N_2C_3 + C_{18}H_{18}$  ( $1\frac{1}{2}$  At. Benzol). Nämlich  $1\frac{1}{2}$  At. Bittermandelöl ( $C_{18}H_{18} + C_3O_3$ ) + 1 At. Ammoniak ( $N_2H_6$ ) = 1 At. Hydrobenzamid ( $H_{18} + C_3N_2$ ) + 3 At. Wasser ( $H_6O_3$ ).

Beide Ansichten haben jedoch wenig Wahrscheinlichkeit. Daß in der ersten Zusammenstellung eine Unrichtigkeit liege, ergibt sich auf den ersten Blick; die erste würde sehr gut passen, wenn eine Verbindung  $C_3$  bekannt wäre. Wäre diese Verbindung ein solches Amid, so würde sie ganz aus der Benzoyl- und Benzidreihe verschwinden. Laurent glaubt, daß die Entstehung des Hydrobenzamids sehr zu Gunsten der zweiten Ansicht spreche, nach welcher das Bittermandelöl eine Wasserstoffsäure betrachtet wird. Ich habe schon darüber ausgesprochen, was von dieser Ansicht zu halten ist, und die Zusammensetzung des Hydrobenzamids scheint fast direct zu beweisen, daß das Bittermandelöl keine Wasserstoffverbindung ist, sondern ein Oxyd von  $C_{18}H_{18}$  betrachtet werden muß. Hydrobenzamid kommt dann in seiner Zusammensetzung mit dem Stickstoffbenzid überein, und seine Bildung und Zersetzung in Bittermandelöl und Ammoniak steht im Zusammenhange mit vielen gut bekannten

Erscheinungen.  $1\frac{1}{2}$  At. Bittermandelöl ( $C_{21}H_{18}$  + 1 At. Ammoniak ( $H_6N_2$ ) bilden: 1 At. Hydrobenzamid ( $C_{21}H_{18} + N_2$ ) + 3 At. Wasser ( $H_6O_3$ ), ferner Stickstoffbenzid ( $C_{12}H_{10} + N_2$ ) + 1 At. Hydrobenzamid ( $C_{21}H_{18} + N_2$ ). Der Name Hydrobenzamid sehr übel gewählt.

### 29) Benzoin und Benzoyl.

Der Antheil des Kali an der Umwandlung des Bittermandelöls im Benzoin ist nicht bekannt, da dieses Kali keine Verbindung bildet. Wird das Bittermandelöl als  $C_{14}H_{10}O_2 + H_2$  angesehen, so könnte das Benzoin als  $C_{14}H_{10}O + H_2O$  sein. Gegen diese Ansicht spricht aber die Bildung des Brombenzoins. Bemerkenswert ist, daß sowohl Benzoin als Bittermandelöl, mit Wasserhydrat erhitzt, benzoesaures Kali bilden. Bittermandelöl und Benzoin stehen daher in einem ähnlichen Zusammenhang, wie Weinsäure und Traubensäure. Aus der Vergleichung der Eigenschaften des Benzoin und Benzoins ergibt sich eine sehr große Ähnlichkeit, aber jedenfalls halte ich das Benzoyl nicht für identisch mit dem Benzoyl des Bittermandelöls.

### 30) Mandelsäure.

Durch Zusammenbringen von Bittermandelöl mit wasserfreier Schwefelsäure entsteht nach Mitscherlich die *Bittermandelölschwefelsäure*, deren Zersetzung nicht bekannt ist.

Die von Winckler entdeckte Mandelsäure ist von Liebig als eine Zusammensetzung aus Ameisensäure und Bittermandelöl nachgewiesen. Mitscherlich betrachtet sie als *Benzin-Ameisensäure*, woraus 1 At. Wasser ausgeschieden = 1 At. Benzin ( $C_{12}H_{12}$ ) + 2 At. A

mandel (H<sub>4</sub> O<sub>6</sub>) — 1 At. Wasser (H<sub>2</sub> O) = 1 At. Mandel-  
säure (C<sub>10</sub> H<sub>14</sub> O<sub>5</sub>). Die Hippursäure (Urinsäure, Pferde-  
säure) erscheint als blausaure Mandelsäure = 1 At.  
Bittermandelöl (C<sub>14</sub> H<sub>12</sub> O<sub>2</sub>) + 1 At. Ameisensäure (C<sub>1</sub>  
O) + 1 At. Cyanwasserstoffsäure (N<sub>2</sub> C<sub>2</sub> H<sub>2</sub>) = 1 At.  
Hippursäure (N<sub>2</sub> C<sub>18</sub> H<sub>16</sub> O<sub>5</sub>).

Das benzoesaure Bittermandelöl, welches nach Winck-  
ler und Robiquet durch Einwirkung von feuchtem  
Chlor und Schwefelsäure auf Bittermandelöl entsteht,  
setzt die Zusammensetzung von 2 At. Bittermandelöl  
(C<sub>28</sub> H<sub>24</sub> O<sub>4</sub>) + 1 At. Benzoessäurehydrat (C<sub>14</sub> H<sub>12</sub> O<sub>4</sub>) =  
1 At. benzoes. Bittermandelöl (C<sub>42</sub> H<sub>36</sub> O<sub>8</sub>).

### Zimmtöl und Zimmtsäure.

Die Untersuchungen des Zimmtöls von Dumas u. Pe-  
gibet, von Mulder haben nicht gleiche Resultate gege-  
ben. Nach Mulder ist das Oel C<sub>20</sub> H<sub>22</sub> O<sub>2</sub> = 1 At. Bitter-  
mandelöl (C<sub>14</sub> H<sub>12</sub> O<sub>2</sub>) + 1 At. Kohlenwasserstoff (C<sub>6</sub> H<sub>10</sub>).  
Durch Aufnahme von Sauerstoff wird es in Zimmtsäure  
verwandelt nebst einem Harze, und es bilden sich auch  
andere Krystalle, die nicht sauer reagiren und in  
Wasser unlöslich sind. Verdünnte Kalilauge wirkt nicht  
auf das Zimmtöl, durch concentrirte aber wird es zer-  
setzt, es entwickelt sich Wasserstoff und Bittermandelöl,  
vernetztes Zimmtöl destillirt über, benzoesaures Kali  
bleibt zurück und der Rückstand ist durch Kohle ge-  
schwärzt. Durch die Einwirkung des Kalis wird der  
im Zimmtöl vorkommende Kohlenwasserstoff vom Bit-  
termandelöl getrennt, welches zum Theil durch die Ein-  
wirkung des Kalis benzoesaures Kali bildet, unter Ent-  
wicklung von Wasserstoffgas. Mulder scheint anzu-  
nehmen, daß Bittermandelöl und wässriges Kali ohne  
Entwicklung von Wasserstoffgas in benzoesaures Kali

sich verwandeln können, und dabei eine ölige Flüssigkeit auf der Oberfläche sich abscheide. Die Bildung Benzoessäure durch Einwirkung von Kali gehört haupt zu den schwachen Seiten der Benzoyltheorie. Zimmtöl verbindet sich bekanntlich sowohl mit Kali als mit Ammoniak.

Die Analysen der Zimmtsäure von Dumas, Peligot und von Mulder stimmen überein. Sie geben für das Zimmtöl aber die Formel  $C_{18}H_{16}O$  und in dem Oel ein ternäres Radikal, *Cinnamyl*,  $H_{14}O_2$ , verbunden mit 2 At. Wasserstoff,  $H_2$ , und Zimmtsäure entsteht nach dieser Theorie auf gleiche Weise aus dem Zimmtöl, wie die Benzoessäure aus Bittermandelöl. Sind aber die Resultate von Mulder richtig, so folgt von selbst, daß von einem Radikal  $H_{14}O_2$  nicht die Rede sein kann, und daß die Zimmtsäure nicht in dem Verhältnisse zum Zimmtöl steht wie die Benzoessäure zum Bittermandelöl.

Die Krystalle, welche sich ausser der Zimmtsäure noch im Zimmtöle absetzen, müssen noch näher untersucht werden; auch ist nicht bekannt, ob sich diese Krystalle zum Zimmtöl verhalten, wie das Benzoin zum Bittermandelöl.

Ob andere flüchtige Oele in demselben Verhältnisse zum Bittermandelöl stehen, wie das Zimmtöl, muß unseren Untersuchungen überlassen bleiben. Die Erfahrung, daß Anis- und Fenchelöl durch Salpetersäure Benzoessäure liefern, spricht jedoch zu Gunsten dieser Meinung.





Ueber Geraniin, den eigenthümlichen Bitterstoff mehrer Storchschnabelarten (*Geraniaceae*);

vom

Apotheker *Müller* in Medebach,  
Vicedirector des Vereins.

Vorgetragen in der am 21. Sept. 1839 zu Pyrmont gehaltenen Jussieuschen Versammlung des Apothekervereins von Norddeutschland.)

Der häufige Gebrauch von Wurzeln der Pflanzen aus der Familie der Geraniaceen von Landleuten bei Dysenterien, Blutflüssen, in hiesiger Gegend, veranlasste mich, mehre derselben, namentlich:

- Geranium pratense*,
- » *palustre*,
- » *malvaefolium*,
- » *robertianum*,
- » *sylvaticum*,
- » *sanguineum*

einer chemischen Analyse zu unterwerfen. Ich fand, daß die Geraniaceen, diese ausgezeichnete Familie, neben einem eigenthümlichen Bitterstoffe überhaupt sehr reich an Gerbstoff sind, und ist in dieser Beziehung *Geranium pratense* (Wiesenstorchschnabel) der Repräsentant der Geraniaceen.

Die Wurzel desselben ist ausdauernd, treibt aufrechte, ziemlich runde Stengel, welche drei bis vier Fuß hoch und sehr ästig sind; Blätter fast rund, aderig runzelig, die Einschnitte derselben dreilappig und spitzig; die Wurzelblätter und die nahe an denselben stehenden untersten Stengelblätter sind lang gestielt. An der Basis der Stiele stehen an beiden Seiten zwei gefärbte

Nebenblätter; Blütenstiele in den Winkeln und Spitze stehend; Kelchblätter gestreift, spitzig, Beg. Kronblätter himmelblau, stumpf und ganz; Kapsel behaart; Samen punctirt.

Die Wurzel besitzt einen äußerst zusammenziehenden, und nebenbei sehr bitteren Geschmack, einen sehr eigenthümlichen Geruch. Der frische Saft derselben ist etwas röthlich gefärbt. Der kalte wässrige Ausguß schön braunroth, der warme ebenfalls, jedoch intensiver. Beide reagiren stark sauer, werden durch Leimlösung mit einer fleischrothen, später braun werdenden Farbe, durch Eisensolution blau und schön grün gefällt. Der Geschmack derselben ist stark zusammenziehend, der Geruch entfernt aromatisch. Aus derselben zieht man eine schön goldgelbe Tinctur, aus dem Holz eine dunkelbraunrothe.

Bei der chemischen Analyse wurde der gewöhnliche Gang befolgt, weshalb ich denselben nicht anzuführen für nöthig erachte, sie zerfiel in folgende Abschnitte:

- 1) Destillation des Wurzelpulvers mit destillirtem Wasser; 2) Behandlung mit Aether; 3) mit Alkohol; 4) mit kaltem destillirtem Wasser; 5) mit kochendem destillirtem Wasser; 6) mit Hydrochlorsäure; 7) mit Aetzkali; 8) Einäschern des Rückstandes.

Die auf diesem Wege erhaltenen Bestandtheile sind folgende:

Balsamisch harzige Materie, verbunden mit Oxal- oder Gallussäure,  
 Gerbstoff,  
 eigenthümlich bittere Materie (Geraniin),  
 färbender Extractivstoff,  
 Schleimzucker,

Stärkmehl,  
gummöser Extractivstoff, durch Aetzkali ausge-  
zogen,  
Oxalsäure,  
Phosphorsäure,  
Salzsäure,  
Kali,  
Kalk,  
Gallertsäure,  
Kieselerde,  
Faser.

Bei der Destillation des Wurzelpulvers mit Wasser  
da nichts Bemerkenswerthes entdeckt. Das Destillat  
einen faden Geruch, welcher sich nach drei Wo-  
n unter Absetzen von häufigen Schleimflocken in ei-  
nmaligen umgewandelt hatte, ohne dass man bei vor-  
kommenen Versuchen etwas ätherisches Oel ermitteln  
nte.

### *Darstellung des Bitterstoffs.*

Wegen des bedeutenden Gehalts der Wurzel an  
bstoff ist es schwierig, den ohnehin nur in geringer  
nge in der Wurzel vorhandenen Bitterstoff recht rein  
zustellen. Unter mehreren Methoden, welche ich zur  
stellung desselben anwandte, fand ich die nachfol-  
de am zweckmässigsten.

1 Pfund (à 16 Unzen) fein gepulverte Wurzeln wer-  
so lange mit gewöhnlichem Alkohol behandelt, bis  
selbe völlig ungefärbt abfließt. Die gesammelten  
cturen haben eine schön dunkelbraunrothe Farbe,  
en äußerst zusammenziehenden, hintennach bitteren  
schmack und wird darin durch die bekannten Rea-  
tionen, als Eisensolutionen, Leimlösung u. s. w. ein be-  
stehender Gerbstoffgehalt angezeigt. Diese Tincturen

unterwirft man der Destillation, und sobald man Hälfte des angewandten Weingeistes wieder erhalten, unterbricht man die Destillation, bringt die in Blase jetzt intensiver gefärbte, jedoch völlig klare Flüssigkeit in eine Porcellanschale und setzt so lange Kalkhydrat zu, bis in der abfiltrirten Flüssigkeit durch erforderlichen Reagentien kein Gerbstoff mehr angetroffen wird. Hierauf entfernt man durch Filtration den Kalkniederschlag und erhält dann eine hellgelbe sehr bitter schmeckende Flüssigkeit, welche man gelinde verdunstet, wobei sich nach und nach etwas Harz an den Wänden der Abrauchschale ablagert, welches man zu trennen sucht. Nach völliger Verdunstung erhält man eine honiggelbe, durchscheinende Masse von sehr bitterem Geschmack, welche indess sehr hygroskopisch ist und nicht trocken erhalten werden kann. Dieser Bitterstoff löst sich in Wasser, so wie in Weingeist auf, nicht aber in Aether und absolutem Alkohol, schmilzt im Feuer gleich einer wachsartigen Materie, wird durch Salpetersäure tief gelblichbraun und nach und nach zersetzt. Concentrirte farblose Schwefelsäure wird von demselben zuerst schwach röthlich gefärbt, nach fernerer stärkerer Einwirkung dunkel purpurroth. Alkalien und Metallsalze zeigen keine besondere Reactionen damit.

*Vergleichende Uebersicht des Gehalts an Gerbstoff in Geraniin in 100 Theilen der Wurzeln nachstehend benannter*

*Geraniaceen.*

|                        | Gerbstoff | Geraniin |
|------------------------|-----------|----------|
| Geranium pratense..... | 44,8      | 5,5      |
| „ palustre.....        | 36,5      | 4,6      |
| „ robertianum....      | 35,3      | 4,5      |
| „ sanguineum....       | 29,5      | 3,0      |
| „ sylvaticum....       | 26,4      | 2,5      |
| „ malvaefolium..       | 19,6      | 1,4      |





# einfache Art, den Stickstoff in festen Pflanzentheilen nachzuweisen;

von

*Chr. Hansmann.*

Da der Stickstoff im Pflanzenreiche, auſſer in den Alkaloiden, im Pflanzeneiweiſs, Kleber etc. häufig vorkommt (wie auch ſchon aus den Abhandlungen Bousſignault's über den Stickſtoffgehalt der Futterarten und Gay-Lussac's über den Stickſtoff in vielen andern hervorgeht), der Stickſtoff aber, auſſer in den Pflanzen wie Alkaloiden die durch trockne Deſtillation Ammoniak geben, nur durch Glühen des zu unterſuchenden Pflanzentheils mit Kupferoxyd im Verbrennungsrohr und Unterſuchung der erhaltenen Gasarten nachgewieſen wird, ſo ſchien mir für die qualitative Prüfung der Pflanzentheile auf Stickſtoff eine einfache Prüfungsmethode nahe zu liegen.

Werden Rinden, Wurzeln oder dergleichen Pflanzentheile der trocknen Deſtillation unterworfen, ſo erhält man die von Reichenbach und andern Chemikern beſchriebenen Producte der trocknen Deſtillation im eſſentlichen Oele mit Eſſigsäure und Waſſer. Es kann ſich etwa aus ſtickſtoffhaltigen Beſandtheilen der Pflanze ſich bildende Ammoniak bei dieſer Operation nicht frei auftreten, ſondern wird im Entſtehungsmomente in der Eſſigsäure geſättigt und es bildet ſich eſſigſaures Ammoniak mit Eſſigsäure. Aus dieſer ſauren Flüſſigkeit muß alſo das Ammoniak leicht durch hinreichenden Zuſatz von Alkalien frei zu machen und durch geeignete Reagentien zu erkennen ſein.

Nach dieſer Anſicht nun iſt das Verfahren zu meiner



Prüfungsart folgendes: In einer etwa  $\frac{1}{4}$  Zoll we 2 $\frac{1}{2}$  Zoll langen, an einem Ende zugeschmolzenen Röhre werden fünf bis zehn Gran der zu untersuchen Substanz der Flamme einer Weingeistlampe zusetzt, bis keine gasförmige Producte mehr daraus vorgehen, jedoch dabei die Röhre so nach Vorne gehalten, daß die gebildeten flüssigen Producte zu der glühenden Substanz zurück fließen können die Röhren zersprengen, sondern sich bei der geringen Neigung der Röhre im vorderen Theile derselben sammeln und auf eine kleine darunter gehaltene Glasplatte auffangen lassen. In die wenigen Tropfen der erhaltenen brenzlichen Säure auf der Glastafel bringt man am besten ein kleines Stück Aetzkali, (doch kann auch kohlensaures Kali oder trocknes kohlensaures Natron dazu dienen) und hält gleich einen schon vorher mit Essigsäure benetzten Glasstab darüber, worauf man an den nie sinkenden Nebeln das Ammoniak erkennen wird. Ist der Ammoniakgehalt im zu untersuchenden Pflanzentheile gering, so legt man am besten ein kleines Stück Aetzkali nahe an die brenzliche Essigsäure auf der Glasplatte und läßt diese erst durch Neigung der Platte an das Aetzkali fließen, wenn schon der mit Säure benetzte Glasstab darüber gehalten ist. — Läßt man die brenzliche Essigsäure in eine kurze etwa einen Zoll lange an einem Ende zugeschmolzene Glasröhre fallen, giebt etwas Aetzkali dazu und bringt einen feuchten Streifen Curcuma-papier in die Röhre, so wird auch dieses gebräunt, wenn der Stickstoffgehalt einigermaßen bedeutend ist oder was mehr der zu untersuchenden Substanz der trocknen Destillation unterworfen wird.

Es gelang mir nach dieser Methode in mehreren Pflanzentheilen, wie *Cort. Angusturae*, *Cascarillae*, *Hip-*

lai, *Quercus*, *Lign. Guajaci*, *Rad. Arnicae*, *Calami*,  
*mae*, *Irid. florent.* *Oonidis* und *Ramalina fraxinea*,  
Analysen keine stickstoffhaltigen Bestandtheile er-  
n haben, den Stickstoff nachzuweisen.



## Analysen animalischer Substanzen in Flüssigkeiten ;

von

Dr. J. Franz Simon.

(Fortsetzung von Bd. XXI. 2. R. S. 278.)

### 1) Untersuchungen des Harns auf Harnstoff.

Der Zusammenhang zwischen Blut und Harn ist so naher und gewiß einem Jeden einleuchtender, als über das Vorhandensein eines solchen gar nicht mehr sprechen ist. Später, wenn ich vom Blute im Allgemeinen, von der Circulation und dem Stoffwandel sprechen werde, wird es mir nicht schwer fallen darzulegen, daß die Untersuchungen über den Zusammenhang für die medicin und Chemie von hoher Wichtigkeit sind; daß mehrere Fragen über den Stoffwandel dadurch genau klären lassen; daß die respective Zusammensetzung einer dieser Flüssigkeit, wie die des Harns, gewisse Schlüsse auf die der andern, also des Blutes, zu ziehen erlaubt; daß Abweichungen in der Zusammensetzung des Harns auf entsprechende Abweichungen in der Zusammensetzung des Blutes schließen lassen. Bis dahin dürfte es nicht nutzlos erscheinen, einige Untersuchungen über die Quantität Harnstoff, diesen wichtigsten Bestandtheil im Harn, anzuführen, die deshalb angestellt wurden, um ein-

mal die Menge desselben im normalen Harn zu e  
 andererseits die Abweichung bei pathologischen Z  
 des Körpers zu erforschen. Wichtig bei Erörteru  
 Fragen ist es, den Harn unter solchen Umstä  
 untersuchen, daß aus einer Reihe von Unterst  
 sich gültige Schlüsse ziehen lassen. Ich such  
 dadurch zu bezwecken, daß ich stets den Urin,  
 des Morgens nüchtern gelassen wird, wobei am  
 gehenden Abend regelmäfsig gelebt werden mu  
 eine nicht aufsergewöhnlich grofse Menge Fl  
 getrunken werden durfte, zur Analyse anwende  
 will aber bemerken, daß, wenn diese Art zu v  
 auch ziemlich sichere Bestimmungen zulassen dü  
 doch die gewünschte Genauigkeit fehlt, denn  
 besonders wenn man mit dem Harne Anderer  
 nicht Herr der zufälligen Störungen, die mögliche  
 eintreten können. Die sichersten Resultate aber w  
 erhalten, wenn man den Harn, der in 24 Stunden  
 wird, sammelt, sein Gewicht bestimmt und aus  
 die Quantität Harnstoff berechnet. Denn es is  
 daß in diesem Falle die Quantität Flüssigkeit, die ge  
 wird, keinen Einfluß hat; die Menge Urin wir  
 dadurch vermehrt, aber auch der relative Gehalt an  
 stoff vermindert. Ich hoffe noch eine Reihe von  
 suchungen, unter diesen Umständen angestellt, lie  
 können, und spreche den Wunsch aus, daß au  
 andern Seiten die Menge von Harnstoff, welche in 2  
 den aus dem Körper entfernt wird, auf die Art, v  
 sie gleich angeben will, bestimmt werden möchte,  
 in dieser wichtigen Frage durch zahlreiche Untersuch  
 ein möglichst genaues Resultat erhalten werde.

Auf diese Weise wie ich den Harnstoff ausse  
 nämlich durch Salpetersäure, erhält man kein anal

einiges Resultat, aber ein sehr annäherndes. Der salpetersaure Harnstoff, wie ich ihn erhalte, ist noch mit etwas färbender Materie verunreinigt, aber er enthält wenig Beimengungen von andern fremden Salzen, da ein Grm. im Platintiegel erhitzt, eine kaum wägbare Menge Rückstand giebt.

10 Grm. Harn werden im Wasserbade zur starken Syrupconsistenz abgedampft, mit etwa 15 Grm. absoluten Alkohol übergossen, filtrirt und das Filtrum mit Alkohol ausgesüßt. Die Filtrate werden im Wasserbade wieder zur starken Syrupconsistenz verdampft, und der Rückstande einige Tropfen destillirtes Wasser zugefügt, worin er sich lösen muß. Alsdann wird die Masse in möglichst kaltes Wasser oder in eine Eismischung gestellt, und mit Salpetersäure versetzt. Ich nehme so viel Salpetersäure, daß, nachdem sich der salpetersaure Harnstoff gebildet, einige Tropfen Flüssigkeit darüber liegen. Man bringt den salpetersauren Harnstoff auf ein Filter von Josephspapier, das für alle Untersuchungen von bestimmter Gröfse ist, damit sein Gewicht, indem ein gleich großes Filter auf die andere Schale gelegt wird, aufgehoben. (Der Gewichtsunterschied, den zwei gleiche Filter von feinem Josephspapier zeigen, ist für die Untersuchung zu übersehen.) Ich lasse, was durchfließt, abtröpfeln, und entferne die übrige Feuchtigkeit durch behutsames Drücken in dickem Löschpapier. Wird das gar nicht mehr feucht, so wird der salpetersaure Harnstoff nebst Filter bei einer Wärme von 30–40° R. getrocknet, und dann gewogen. Hier folgen die Resultate dieser Untersuchung.

100 Grm. Harn enthielten an salpetersauren Harnstoff:

1) Von einem 3½jährigen Kinde (siehe Blutanalyse 8)\*) im Hyperoxismus: 2,625 Grm.

\* Dieses Archiv, 2. R. Bd. XXI, 271.

- 2) Von demselben Kinde aufser dem Paroxismus: 2,175.
- 3) Von demselben Kinde, 24 St. vor dem Tode: 4,200.
- 4) Von der gesunden Schwester, 4½ Jahr alt: 1,900.
- 5) Von einem 20jähr. Mädchen, das an Brightscher Krankheit leidet: Eiweiß 0,450, salpeters. Harnstoff 1,200.
- 6) Von demselben Mädchen, 8 Tage später: Eiweiß 0, salpeters. Harnstoff 0,800.
- 7) Harn eines 25jährigen gesunden Mannes von guter Ernährung: 2,100.
- 8) Harn von einem gesunden 28jährigen Manne mit guter Ernährung: 2,900.
- 9) Harn von einem gesunden 26jährigen Mann mit guter Ernährung: 2,700.
- 10) Harn von einem gesunden 30jährigen Mann, der gut ernährt: 3,000.
- 11) Harn von einem gesunden 28jährigen Mann, der nicht gut ernährt: 3,100.
- 12) Harn eines 32jährigen gesunden Mannes, der sich gut ernährt: 2,700.
- 13) Harn von demselben: 2,800.
- 14) Harn von demselben, am Morgen gelassen, nachdem 24 Stunden gefastet worden: 1,300.
- 15) Die Gesamtmasse in 24 Stunden gelassenen Harns, während des Fastens, wobei jedoch viel Wasser getrunken wurde, gesammelt, betrug 15 med. Pfd., in 100 Theilen waren: Eiweiß 0, salpeters. Harnstoff.
- 16) Harn von demselben, nach 48stündigem Hungern, wobei in den letzten 8 Stunden nicht getrunken worden: 3,010.
- 17) Harn von einer Frau, die an *Diabetes insipidus* leidet: 1,300.
- 18) Harn von derselben zur andern Zeit untersucht: 1,300.
- 19) Harn einer 83jährigen gesunden Frau: 1,900.
- 20) Harn von einer 56jährigen gesunden Frau: 1,800.
- 21) Harn von einem etwa 50jährigen Mann, der an Phthisis tub. im 3ten Stad. leidet, um 10 Uhr gelassen: 4,05.
- 22) Harn von demselben, früh nüchtern gelassen: 4,75.



13) Harn eines von einem acuten Nierenleiden befallenen  
Pferdes: Eiweiß 0,500, salpeters. Harnstoff 1,500.

21) Harn von einem an *Malleus humidus* leidenden Pferde  
(s. Blutanalyse 11)\*): 9,50.

25) Harn von einem ähnlich kranken Pferde, nachdem es  
4 Tage gehungert: 4,6.

Bemerkungen. Die mikroskopische Beobachtung ergab bei 3)

Der Urin zeigt Kügelchen, membranöse Theile und Epithelienzelle. 23) Der Harn hat eine Blutfarbe, und enthält Blutkörperchen. 25) Der Harn ist mit einer grossen Menge Epithelienzellen beladen.

## 2) Untersuchung des Meconium von Kindern.

Das Meconium ist grün, zähe und klebrig; es quillt in Wasser zu einer voluminösen Masse auf, in welcher unter dem Mikroskop sich eine grosse Menge Epithelienzellen und runde Körperchen, von denen einige an blatter platten Form für entfärbte Blutkörperchen zu halten waren, zeigen. Ausserdem erkennt man viele kleine mikroskopische Krystalle (rhombische Tafeln), welche Cholesterin sind. Der Geruch des Meconiums ist unangenehm, nicht unangenehm, der Geschmack fade, ganz schwach süßlich. Aether zieht aus dem Meconium ein weisses Fett, wahrscheinlich reines Cholesterin. Alkohol eine kleine Menge extractiver Materie und an Geschmack zu erkennenden Gallenharzes; wässriger Alkohol Käsestoff, dem Picromel beigemischt ist. Aus dem Rückstande zieht durch Schwefelsäure angesäuert Alkohol noch grünen Gallenfarbstoff.

100 Theile trocknes Meconium bestehen aus:

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Cholesterin.....                           | 16,00  |
| Extractive Materie und Gallenharz...       | 10,400 |
| Käsestoff .....                            | 34,00  |
| Picromel .....                             | 6,00   |
| Gallengrün.....                            | 4,00   |
| Zellen, Schleim, vielleicht auch Eiweiß .. | 26,00  |

### 3) *Untersuchung der Faeces eines durch Muttermilch genährten Kindes von 6 Tagen.*

Die Faeces sind breiartig, gelb, riechen stark saurer Milch. Mit Wasser angerührt, zeigen sie dem Mikroskop eine Menge Fettkügelchen, aber deutlich zu erkennende Epitheliumzellen, dagegen Hauptmasse nach eine Substanz, die dem geronnenen Eiweiss oder Käsestoff gleicht. Beim Abdampfen verbleibt die ganze Masse in der grossen Menge Fett, welche sie enthält. Aether zieht dieses Fett aus, das fester ist, aber kein Cholesterin enthält, denn es schmilzt sich vollkommen. Aus den mit Aether ausgepressten Faeces zog Alkohol oder verdünnter Alkohol keine extractive Materie, sondern, besonders der mit etwas Salzsäure angesäuerte, Gallenfarbstoff.

In 100 bestanden die trocknen Faeces aus:

|                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Fett.....                                                                              | 52,0 |
| Gallenfarbstoff, der an Aether eine nicht geringe Menge grüngefärbtes Fett abgiebt ... | 16,0 |
| Coagulirten Käsestoff und Schleim .....                                                | 18,0 |

Der grosse Verlust ist einer hartnäckig zu haltenden Menge Feuchtigkeit zuzuschreiben.



## Practische Bemerkungen über den neuen Kermes und Goldschwefel

von

**Franz Jahn,**

Apotheker und Kreisdirector des Vereins in Meiningen

I.

Viele meiner Collegen haben mir mitgetheilt, dass man im Verfolg der Vorschrift der Preuss. Pharm.

durch Schmelzen einer Mischung von Spießglanzmetall, Schwefel und trockenem kohlensauren Natron und wiederholten Auskochen dieser Hepar — wobei es mir schon vorgekommen ist, daß Einige die Bezeichnung: *Stibium* male für käufliches Schwefel-Spiessglanz genommen haben) eine allzugeringe Ausbeute an Kermes erhalte, welche durch den etwas hochgestellten Preis in der Taxe — 1 Drachme zu 6 Silbergr. — keinesweges vergütet werde. Es ist auch bei mir schon vorgekommen, daß die Menge des Products im Verfolg ein und derselben Vorschrift verschieden war und ich habe anfänglich diese Verschiedenheit einem verschieden stark eingehaltenen Grade der Schmelzung der Mischung, wobei in einigen Fällen (doch ohne daß von mir die Veranlassung erschraucht worden ist, welche dieser Erscheinung zu Grunde liegt) eine Ausscheidung von sehr viel Spießglanzmetall-Regeln in der Hepar, trotz dem daß das verwendete Spießglanz aufs feinste gepülvert und innig mit den übrigen Substanzen gemengt worden war, beobachtet wurde, zugeschrieben, ich habe mich aber überzeugt, daß letzteres keinesweges die Ursache der geringen Ausbeute gewesen sein kann, sondern daß diese bloß dem wechselnden Trockenheitsverhältniß des zur Mischung verwendenden kohlensauren Natrons anheimzustellen ist.

Bekanntlich bewirkt man letzteres, indem die etwas zerkleinerten Krystalle an einem trocknen Orte so lange ausgebreitet werden, bis sie zu einem völlig trocknen Pulver zerfallen sind. Wenn aber das Natron in ziemlich klein zerstückeltem Zustande in der angezeigten Weise behandelt wird, so sieht es oft ganz weiß aus und erscheint verwittert in Pulver verwandelt — dessenungeachtet ist es noch nicht gehörig ausgetrocknet sondern es ver-

geachtets.

n es ver-13

liert noch beim Erhitzen, indem es schon in gelinder Wärme noch in seinem Krystallwasser zu unvollkommener Schmelzung kommt, eine beträchtliche Menge von Wasser. 7 Unzen in solcher Weise anscheinend gehörig getrocknetes kohlensaures Natron verloren aber beim ferneren Austrocknen in einem eisernen Tiegel, wobei fast zum Glühen erhitzt wurde, noch so viel an Gewicht, daßs nur noch 4 Unzen zurückblieben.

Während man nun in zwei vorhergehenden Arbeiten aus einer in dem Verhältniß, wie es die Pharmakopoe vorschreibt, und in derselben Quantität zusammengesetzten Mischung mit dem erwähnten für trocken gehaltenen kohlensauren Natron jedesmal nur etwas mehr als 3 Drachmen Kermes (also aus 8 Unzen metallischen Spießsglanzes) erhalten hatte, lieferte eine mit in der angegebenen Weise völlig entwässerten Natron bereitete Hepar, in welcher beim Zerstossen nichtsdestoweniger eine beträchtliche Menge von ausgeschiedenem Metalle beobachtet wurde, sogleich beim ersten Auskochen schon eine Quantität von 10 Drachmen sehr schön braunroth gefärbten Kermes, so daßs in 3 Mal wiederholten Auskochungen mit ersterem zusammen 23 Drachmen erhalten wurden. Es hätte aus dieser Hepar indessen immer noch mehr Kermes erhalten werden können, wenn das Auskochen noch ferner fortgesetzt worden wäre, allein theils hatte man in diesen Arbeiten schon ein für mehrere Jahre ausreichendes Quantum von diesem in hiesiger Gegend nicht allzugebäuchlichen Arzneimittel erhalten, theils zweifelte man, weil nämlich der in letzteren Abkochungen erhaltene Kermes ein ziemlich aufgequollenes Ansehn und eine mehr gelbbraune Farbe besaß, so daßs er auch ungleich schwieriger als der erste ausgewaschen werden konnte, ob dieser zuletzt erhaltene

sichtlich oxydhaltiger Kermes sei. Als aber derselbe, nachdem er etwas abgetrocknet war (welches allerdings noch längere Zeit als bei dem zuerst erhaltenen erforderte) noch halbfeucht mit heißem Wasser wieder angerührt und nun, aufs Filter gebracht, wiederholt mit Wasser ausgesüßt worden war, bot er nicht mehr das aufgequollene Ansehn dar und es entwickelte sich daraus nicht, wie man vermuthet hatte, Schwefelwasserstoffgeruch beim Uebergießen des getrockneten Kermes mit wässriger Weinsteinsäure, sondern er erwies sich im Gegentheil durch die starke gelbrothe Fällung, welche das damit gekochte und wieder abfiltrirte weinsaure Wasser durch Schwefelwasserstoffwasser erlitt, als *ebenso stark oxydhaltig*, als der bei erster Abkochung erhaltene mehr dunkelbraun gefärbte und ebenso behandelte Kermes.

Nach dieser Erfahrung glaube ich also, daß die in der genannten Pharmakopöe gegebene Vorschrift zur Bereitung des Kermes nichts zu wünschen übrig läßt, wenn nur *vollkommen trocknes* kohlen-saures Natron dabei in Anwendung gebracht wird.

## 2.

In einigen pharmaceutischen Zeitschriften ist ferner schon die Rede davon gewesen, daß man (im Verfolg der Vorschrift derselben Pharmakopöe — aus Schlippe-chen Salz) mitunter sehr feurig roth, mitunter aber auch fast braun wie Kermes gefärbten Goldschwefel erhalte und ich habe mich bestrebt, da ein gleicher Fall wie der letztbeschriebene bei mir, angeblich im getreuen Verfolg dieser Vorschrift vorgekommen ist und dazu noch ein stark oxydhaltiges Product gewonnen wurde, die Veranlassung zu diesem abweichenden Resultate zu ergründen.

gewor-  
henden



Veranlaßt durch die sich später als ungegründete Vermuthung, als ob durch längeres oder kürzeres Schmelzen des vorgeschriebenen Gemenges kohlensaurem Natron, Schwefel, Schwefelspießglanz und Kohle verschiedener Einfluß auf die zu erhaltenden Krystalle des Schlippe'schen Salzes und den daraus fallenden Goldschwefel sich geltend mache, habe ich solche Mischungen in verschiedener Weise in Fluß gebracht und darin erhalten.

Wenn man nun auch fand, daß hierdurch Schmelzen mag längere oder kürzere Zeit hindurch getrieben werden, jederzeit Schlippe'sches Salz geworfen wird, so fällt doch die ganze Quantität desselben, je nach den verschiedenen Hitzgraden, wegen der nebenbei entstehenden Producte, ganz verschieden aus, ja in einzelnen näher zu beschreibenden Fällen erhält man neben Schlippe'schem Salz ganz andere Krystalle. Bei gehöriger Aufmerksamkeit kann man aber aus jeder Hepar einen gänzlich reinen Einfach-Schwefelantimon \*) freien Goldschwefel erhalten. Der Oxydgehalt des Goldschwefels ist ebenfalls nur eine Folge von unachtsamer Behandlung, wie sich aus Folgendem ergeben wird.

Nach dem erwähnten Dispensatorium soll die vorgeschriebene Mischung bei mäßigem Feuer in Fluß gebracht werden und man erhält, wenn man den Zeitpunkt richtig einhält, in welchem die Masse ruhig zu fließen anfängt und nicht bedeutend mehr aufwallt; aus solchen Hepar, in welcher die letzten Antheile Kohle noch nicht völlig verbrannt sind, die größte Menge von Schlippe'schem Salz. Treibt man aber, ohne man jenen Begriff des Flüssigmachens verstehen könnte

---

\*) welches die Ursache der braunen Farbe des Goldschwefels



zu können. Die Menge der somit erhaltenen Krystalle ist aber noch unbedeutender, als in der letztbeschriebenen Schmelzung, unter ihnen habe ich merkwürdiger Weise, aber erklärbar durch die Oxydation eines Theils Schwefelnatriums, einige Glaubersalzkry stallen welche sich als solche schon durch ihr leichtes Vertheilen zu erkennen geben, bemerkt.

Wenn sich nun hieraus ergibt, daß die Menge des Schlippe'schen Salzes durch zu weit getriebene Schmelzen der Hepar abnimmt und sich eine immer beträchtlichere Menge von Einfach-Schwefelantimon bildet, so muß dies Folge davon sein, daß sich, worauf schon Duflos aufmerksam gemacht und eine größere Menge von Schwefel zu nehmen oder die Lauge später hinzusetzen vorgeschlagen hat, ein Theil des in die Mischung gehörigen Schwefels verflüchtigt; aber wie aus der Untersuchung der nicht unbeträchtlichen Menge von Antimonoxyd, wenn man die Hepar sehr lange in Fluß erhalten hervorgeht (von welchem man zwar keine Spur in der beim Erkalten der Lauge entstehenden Absätzen antreffen kann, wenn es vielleicht auch zum Theil in anderer Verbindung in dem in Wasser unlöslichen Theil der Hepar zurückbleibt), dieses Antimonoxyd wird, wenn Wasser hinzukömmt, nicht wohl ohne Einwirkung auf das in der Mischung befindliche Schwefelnatrium bleiben, sondern es wird sich daraus jedenfalls Einfach-Schwefelantimon und Natron in größern oder kleinern Mengen bilden. Es läßt sich somit der sehr starke Absatz in einer solchen Lauge, herbeigeführt durch die Auflösung von Einfach-Schwefelantimon in diesem Natron und dem noch übrigen Schlippe'schen Salze, und die geringe Ausbeute an letzterem erklären.

Andere Krystalle neben Schlippe'schem Salze, v

welchen ich oben sprach, erhält man ferner noch, wenn man die Mischung, wie sie die Preuss. Pharmakopöe vorschreibt, nur unvollkommen erhitzt und nicht ordentlich zum Flusse kommen läßt, und zwar so, daß die Masse nur bis zum starken Zusammenbacken gelangt. Man mag sie in einem bedeckten oder unbedeckten Tiegel in der angegebenen Weise behandeln, so erhält man, wenn diese Hepar aus dem Feuer genommen wird, eine, durch die in großer Menge und unzersetzt noch vorhandene Kohle, schwarzgefärbte Masse. Wird dieselbe in feingepulverten Zustande mit Wasser digerirt, oder wird sie damit ausgekocht, so erhält man eine nur wenig gefärbte durchs Filter laufende Flüssigkeit (welche aber ebenfalls beim Erkalten schon Kermes absetzt); diese Flüssigkeit reagirt alkalisch, mit Schwefelsäure versetzt, entbindet sich aus ihr, wie sich aus dem starken Aufschäumen im Verhältniß zu der geringen Menge des niederfallenden Goldschwefels ergibt, neben Schwefelwasserstoff eine noch größere Menge von Kohlenwasserstoffgas — es ist also noch kohlen-saures Natron vorhanden, aber es hat sich schon Schlippe'sches Salz (die Verbindung von Schwefelantimon mit Schwefelnatrium) gebildet. Verdunstet man nach dem Absetzen des Kermes die Flüssigkeit zum Krystallpunct, so erhält man, nach der Dauer des Schmelzens, eine krümlige un- deutlich krystallinische Masse und ein in feinen Nadeln zerfließendes Salz, oder wenn man etwas länger schmilzt, schon mehr deutlich auskrystallisirtes Schlippe'sches Salz und Krystalle von der Form des Glaubersalzes, welche kleineren, so wie die in feinen Nadeln angeschossenen Krystalle, auch dem größten Theile nach aus schwefel-saurem Natron bestehen (weil ihre Auflösung durch

salpetersauren Baryt stark getrübt wird \*) und der Luft bald verwittern), aber Schlippe'sches Salz ihre Auflösung durch Säure zerlegt, Goldschwefel läßt) und unterschwefligsaures Natron beigemischt halten. An der vorhin beschriebenen krümlichen stallform des nebenbei krystallisirenden Schlippe Salzes ist das vorhandene kohlen saure, jedenfalls eingemengtes unterschwefligsaures Natron Schuld, sich aber letzteres wirklich bilde, geht daraus hervor, daß die Auflösung dieser glaubersalzähnlichen Krystalle mit kohlen saurem Bleioxyd digerirt (unter Braunfärbung dieses letzteren — indem sich durch das vorhandene Schlippe'sche Salz Schwefelblei und Schwefelantimon bilden), wenn jetzt die Flüssigkeit abfiltrirt wird, Vermischen und Erwärmen mit Salzsäure Geruch schwefliger Säure entwickelt und Schwefel fallen — der anderweitigen Reactionen hier nicht bedürftig noch zu gedenken. Es kann deshalb über die Anwesenheit der unterschwefligen Säure in diesem Salze Zweifel sein, und es bestehen demnach diese in 4facher Weise zusammengesetzten Krystalle aus schwefelsaurem und unterschwefligsaurem Natron, Schwefelnatrium und Schwefelantimon.

Es ist nun aber bekanntlich angenommen worden, daß der beim Zusammenschmelzen von kohlen saurem Natron, Schwefelantimon, Schwefel und Kohle durch die Verbindung des Schwefels mit dem Natrium freigesetzte Sauerstoff sofort sich auf die Kohle wirft und Kohlensäure entweicht, ohne daß sich Antimonoxyd

---

\*) und der Niederschlag in Salpetersäure nicht völlig löslich ist.



andere oxydirte Substanz in der Mischung bildet. Durch den im Ueberschuß anwesenden Schwefel bildete Dreifach-Schwefelnatrium verbindet sich alsdann, indem es an das vorhandene Einfach-Schwefelantimon seine 2 Atome Schwefel abtritt, mit diesem Dreifach-Schwefelantimon zu den Bestandtheilen des Schlippe'schen Salzes. Diese Theorie genügt völlig zur Erklärung der Entstehung dieses Doppelsalzes, allein gerathet sich, wie sich aus der Bildung von Schwefelsäure und unterschwefligsaurem Salze ergibt, (das zur Arbeit verwendete kohlensaure Natron war ganz frei von Glaubersalz!) der freiwerdende Sauerstoff des Natrium gewordenen Natrons zu Anfang des Processes auf den vorhandenen Schwefel, ebenso wird aber auch schon hier (worauf vielleicht die Ausscheidung von Einfach-Schwefelantimon aus der Lauge von einer nur kurze Zeit erhitzten, kaum etwas Schwefel verloren habenden Hepar hinweist) wohl etwas Antimonoxyd gebildet werden, welches darauf durch die Einwirkung des Schwefelnatriums, wenn Wasser hinzukömmt, zu Schwefelantimon verwandelt wird und jedenfalls größtentheils in der Gestalt von Crocus (d. h. nicht völlig ersetztes, sondern noch mit Schwefelantimon verbundenes Oxyd) bei dem in kochendem Wasser unlöslichen Theil der Hepar zurückbleibt. Ein kleinerer Theil mag aber doch als Antimonoxydalkali der Zersetzung noch widerstehend in Auflösung gehen und dann bei fernerer Berührung mit Schwefelnatrium, beim Verdampfen und Erkalten einer solchen Lauge, gefällt werden, wodurch die Kermesabsätze aus einer solchen Flüssigkeit sich erklären lassen, wenn sie nicht dahin zu deuten sind, daß das in der Flüssigkeit befindliche Schlippe'sche Salz oder das unzersetzt vorhandene kohlens. Natron

unzersetztes Einfach-Schwefelantimon beim Kochen löst und beim Erkalten wieder fallen läßt, was frey in dieser gemischten Verbindung nur schwer wird stimmt werden können.

Die Reduction dieses gebildeten schwefels. und terschwefligs. Salzes und des gebildeten Antimonos erfolgt erst alsdann, wenn die Masse ruhig im Feuer zu fließen beginnt, also gerade in dem Augenblicke, welchem die größte Menge von Schlippe'schem Salz, oben erwähnt wurde, erhalten wird, — man findet da keine Spur von fremder Krystallisation mehr in solchen aus solcher Hepar gewonnenen Salze, aber wegen schon eingetretenen Schwefelmangels scheidet sich immer eine beträchtliche Menge von Einfach-Schwefelantimon aus der erkaltenden Flüssigkeit aus.

---

Wenn man bedenkt, daß die Zersetzung eines terschwefligs. Salzes, wenn freier Schwefelwasserstoff mit in Freiheit gesetzter unterschwefliger Säure in Verbindung kommt — wie es bei dem erwähnten vierfach zusammengesetzten Krystallen, wenn ihre Auflösung durch Schwefelsäure zerlegt wird, der Fall sein muß — eine Ausscheidung zur Folge hat, so wird die Möglichkeit gegeben sein, daß man aus solchen, aus einem unvollkommen geflossenen Hepar erhaltenen Krystallen Goldschwefel bekommen kann, welcher mehr Schwefel enthält, als eigentlich in seine Mischung gehört und wirklich habe ich aus einer aufs Neue in der angegebenen Weise behandelten Mischung, als die daraus erhaltenen gemischten Krystalle in Wasser gelöst und mit Schwefelsäure zerlegt wurden, einen etwas mehr lichtroth gefärbten Goldschwefel erhalten. Ich bin aber in dem mir zur genauen Ermittlung des Schwefelgehalts die

Schwefels angestellten Versuchen nicht im Stande zu sein, eine grössere Menge von Schwefel darin zu lösen, sondern er verhielt sich ganz wie der aus Schlippe'schen Krystallen gefällte, und das verschiedene Ansehen muß wohl nur auf dem verschiedenen Grade der Verdünnung der Lauge oder der feineren Theilung des Niederschlags beruht haben. — Ich habe aber doch hiemit die Möglichkeit dargethan zu zeigen, daß auch aus krystallisirtem Salz (wenn nämlich ein solches einer Flüssigkeit neben einem Schlippe'schen Salz eine grössere Quantität dieses fremden Salzes mit angesetzt) ein im Schwefelgehalt verschiedener Goldschwefel erhalten werden kann.

Alle diese Krystallansätze, wie sie in einem oder dem andern der oben beschriebenen Grade der Schmelzung erhalten werden, es mag nun viel oder wenig Eisen-Schwefelantimon (Kermes) sich dabei mit abgefallen oder darauf abgelagert haben, liefern, wenn sie in kaltem destillirtem Wasser gelöst werden, wobei ein schwarzer Absatz unlöslich zurückbleibt, mit Säure zerlegt, einen schön feurigrothen Goldschwefel. Uebergießt man diese Krystalle, ohne sie von dem zugleich mit abgelagerten Kermes zu trennen, mit heißem Wasser, so macht man die Auflösung derselben heiß, so löst sich in derselben der größte Theil des noch feuchten Kermes wieder, und wenn nun diese heiße Auflösung mit Säure zerlegt wird, so fällt mit dem daraus zu erhaltenden reinen Goldschwefel zugleich das aufgelöste Eisen-Schwefelantimon nieder, welches dann dem Niederschlag, je nach der Quantität, in welcher es gegenwärtig ist, eine sehr stark dunkelbraune Farbe ertheilen kann und in solcher Weise kann deshalb auch, wenn man zumal mit einer sehr lange geflossenen Hepar zu

thun hat, trotz dem, daß die Lauge zur Krystallbeförderung und nur der Krystallabsatz auf Gold benutzt wurde \*) — wenn nämlich heiß gelöst fällt wird — ein ganz verschiedenes Product re-

In keiner Weise, wenn es nach diesem auch war, woher die braune Farbe des eingedickten Goldschwefels rühre, ist es mir jedoch gewesen, oxydhaltigen Goldschwefel oder oxydarmen Kermesabsatz aus solchen Flüssigkeiten zu erhalten sind von mir über diesen Gegenstand sorgfältige Versuche angestellt worden, der Goldschwefel und aus allen diesen Arbeiten wurde auf Oxydgehalt untersucht, aber aus frisch bereitetem Goldschwefel habe ich nie durch Kochen mit verdünnter Weinsteinsäure niemals Oxyd erhalten können. Man erinnerte sich nicht an die Bereitung jenes Goldschwefels mit Oxydgas, die Sommerzeit gefallen war, daß man denselben auf dem Boden des Hauses unter dem Dache getrocknet hatte, daß dagegen das Trocknen der spätern Goldschwefelproben auf einem erwärmten Stubenofen vorgenommen worden war, und daß namentlich, weil eine kleineren Menge gearbeitet hatte, das Trocknen wegen des letztern Umstandes in ungleich kürzerer Zeit vorgegangen war. Durch die längere Einwirkung

---

\*) Von dieser Nothwendigkeit, um einen gleichförmig zusammengesetzten Goldschwefel zu erhalten, können sich noch nicht alle Apotheker überzeugen. In sehr vielen Apotheken findet sich dies Präparat in solcher Weise, daß die Hepar ausgekocht und die daraus erhaltene Masse geradezu mit Säure präcipitirt wird. Darum sieht sie braun, (aus obiger Ursache) bald orangegelb (von dem geringen Schwefelgehalte aus dem mitgefällten überschüssigen der Lauge befindlichen Schwefelnatrium) und nur in seltenen Fällen feurigroth aus.

chtigkeit und der Luft konnte das Präparat oxydirt worden sein. — Es wurde deshalb Goldschwefel und oxydfreier Kermes längere Zeit der Luft in kaltem Zustande ausgesetzt, schon nach Verlauf von Tagen, oft selbst nach 24 Stunden, \*) fand man solche Niederschläge oxydhaltig, woraus sich ergab, daß hiernächst das abweichende Verhalten jenes Goldschwefels bedingt worden war. Auch aus einer Auflösung von Schlippe'schem Salz, welche nach einer davon gewonnenen Probe einen Goldschwefel lieferte, welcher eine Spur von Oxyd an Weinsteinsäure abtrat, erhielt man nach vierteljährigem Stehen in offenem leichtbedeckten Glase von selbst kermesähnlich ausgefallten Goldschwefel, welcher eine sehr beträchtliche Menge des Oxyd an Weinsteinsäure abtrat.

Aber besonders merkwürdig und auch der Betrachtung in medicinischer Hinsicht ist es werth, daß feuriger Goldschwefel aus schönstkrystallisirtem Schlippe'schem Salz, welcher nach dem Trocknen durchaus keinen Oxydgehalt zeigte, nachdem er etwa 2 Monate lang in einem nicht ganz damit gefüllten aber doch luftdicht verschlossenen Glase gestanden hatte, schon so viel Sauerstoff in sich aufgenommen hatte, daß verdünnte Weinsteinsäure nach dem Kochen damit, sich durch Zusatz von Ammoniumsulphhydrat röthlichgelb färbte. An dieser Neigung des Goldschwefels, sich zu oxydiren, mag hauptsächlich die Eigenschaft desselben, als starkhygroskopische Substanz eine beträchtliche Menge von Wasser in sich zurückzubehalten, wenn er auch längere Zeit hindurch der Wärme und der trocknen Luft ausgesetzt wurde, Ursache sein.

\*) Bei kleinen Quantitäten.



Zur Verbesserung solchen braungefärbten Schwefels ist, so viel ich mich erinnere, vor einiger Zeit von Stickel vorgeschlagen worden, man solle denselben in Aetzlauge unter Zusatz von Schwefel auflösen und diese Auflösung durch Säure fällen, wodurch viel schöner gefärbtes Präcipitat erhalten werde. Auf diesem Wege ist es mir aber, ich mochte viel oder wenig Schwefel zusetzen, nicht möglich gewesen, ein aus Schlippe'schem Salz dargestelltes nur einigermaßen ähnliches Product zu erhalten. Der in solcher Weise erhaltene Goldschwefel enthält, wie natürlich, eine größere bald kleinere Menge von Schwefelmilch gemischt und ich habe den Schwefelgehalt in solchem Goldschwefel schon zu 60 und 70 Proc. angetroffen. Die Ursache dieses bedeutenden Schwefelgehalts beruht bekanntlich auf dem in solchen Flüssigkeiten überschießig vorhandenen Schwefelkalium, weshalb auch auf nassem Wege, durch Eintragen eines Gemenges von Schwefelantimon und Schwefel in Aetzkalklauge (welches Verfahren noch die ältere Preussische Pharmacopoe von 1827 vorschreibt) und sofortiges Präcipitiren heraus bereitete Goldschwefel in keinem Falle ein Schwefelantimon mit bestimmtem Schwefelgehalt darstellt, sondern sich ganz wie der nach oben verbesserte Goldschwefel verhält. Bekanntlich kann man eine solche Lauge nur sehr schwer zum Krystallisiren bringen, die dem Schlippe'schen Schwefelantimon-Schwefelnatrium entsprechende Kaliumverbindung zu erhalten, aus der Zersetzung durch Säure sogar, wie aus ächtem Schlippe'schen Salze reines Dreifach-Schwefelantimon res-

---

\*) d. h. diesen freien und gebundenen Schwefel zusammen gerechnet.

würde. — Die Krystalle zerflossen schon wieder, wie sie nur einige Zeit mit der Flüssigkeit selbst mit der atmosphärischen Luft in Verbindung stehen. Das einzige Mittel, aus einer solchen Lauge den guten Goldschwefel zu erhalten, würde darin bestehen, sie nach Döbereiner's Vorschlag mit der entsprechenden Menge von Glaubersalzlösung zu vermischen und die beim Verdampfen erhaltenen Krystalle, wobei zuerst jedenfalls schwefels. Kali auskrystallisiren wird, in der bekannten Weise zu zerlegen. Einfacher ist natürlich der Weg, Natronlauge zu nehmen, aus welcher wird ohne Weiteres, wenn solcher rufsfarbener Goldschwefel unter Zusatz von Schwefel darin gelöst wird, Schlippe'sches Salz beim Verdampfen herauskrystallisiren.

Wenn man versucht, solchen braungefärbten Goldschwefel dadurch zu verbessern, daß man ihn ohne Zusatz von Schwefel in Aetzkalklauge löst, so bleibt, indem sich der größte Theil des Goldschwefels löst, eine nicht beträchtliche Menge eines gelblich oder graulichweiß gefärbten Rückstandes, welcher dem größten Theile nach, (nach meinen Versuchen damit) aus basischem Antimonoxydkali mit Schwefelantimon vermischt, besteht und deshalb eine Art von Crocus darstellt. Fällt man nach Absonderung dieses unlöslichen Körpers die Lauge durch Schwefelsäure, so erhält man ein sehr schön rothes, im hohen Grade dem Goldschwefel aus Schlippe'schem Salz ähnliches Schwefelantimon. Aber auch wenn dies Präcipitat sehr gut mit Wasser ausgewaschen worden war, tritt es an Weinsteinsäure, mit welcher es gekocht wird, eine beträchtliche Menge von Antimonoxyd ab, ohne daß sich seine Farbe verändert und eine Untersuchung auf das Verhältniß des Schwe-

fels zu dem Antimon in solchem bis zum Erschöpfen mit weins. Wasser gekochten Goldschwefel lieferte Resultat, daß derselbe nicht, wie man vermuthet haben würde, ebenfalls mehr Schwefel, als ihm gehöre, enthalte, sondern daß er im Gegentheil trotz seiner etwas blaurothen Farbe eine geringere Quantität Schwefel, als aus Schlippe'schem Salz enthält. Dieser Schwefelgehalt betrug nach mehrfältigen Versuchen im Durchschnitt nur 33 Proc. Auch er ist also ein von dem aus Schlippe'schem Salz erhaltenen Goldschwefel ganz verschiedenes Product und auf solchem Wege kann also ebenfals solch braungefärbter Goldschwefel nicht verbessert werden.

---

Während meiner Beschäftigung mit den in verschiedenen Weisen erhaltenen Goldschwefelproben theilte Hr. Professor Mitscherlich ein neues Verfahren zur Erlangung von arsenikfreiem Goldschwefel beschrieben (*Berliner Jahrb. XXXVI, 1. pag. 209 — 212.*) Nach diesem wird zunächst aus kohlens. Natron mit Aetzkalk in der bekannten Weise Aetznatronlauge bereitet. Obgleich sie aber erst lange mit dem Kalk zu kochen oder wenigstens dem entstandenen kohlens. Kalk abzufiltriren, wird gleich der Mischung ein Gemenge von gewöhnlichem Schwefelantimon mit gewaschenen Schwefelblumen zugesetzt und  $\frac{1}{2}$  Stunde unter fleißigem Umrühren zu kochen erhalten. Der hierbei zurückbleibende kohlens. Kalk hält neben Antimonoxydkalk nach Mitscherlich den größten Theil des im Schwefelantimon enthaltenen Arsens als arsenigtes Kalk beigemischt, ein anderer Theil des Arsens bleibt als leichtlösliches Schwefelarsenik beim HerauskrySTALLISIREN des Schlippe'schen Salzes in der Mutterlauge.

Ich habe damals sogleich dieses sehr bequeme Verfahren befolgt, man erhält aus einer gleichen Menge Schwefelantimons (im Verhältniß der Vorschrift der Preuss. Pharmakopöe) eine ungleich grössere Menge Schlippe'schen Salzes, mit welchem man bei weitem nicht so viel Ungemach wegen des hier beim Auskrystallisiren des Salzes fast ganz fehlenden Einfach-Schwefelantimons hat. Die Krystalle besitzen aber eine viel mehr gelbe Farbe und der daraus gefällte Goldschwefel war sehr schön feurigroth, doch erschien auch er etwas trübe, als der der Vorschrift der Preuss. Pharmakopöe gemäß bereitete Goldschwefel. Wegen dieser gelben Farbe der Krystalle, welche mit denen des Kaliumeisensulfids im Aeußern große Aehnlichkeit haben, habe ich eine Verschiedenheit in der innern Zusammensetzung derselben gegen bloßes oder ungefärbtes Schlippe'sches Salz vermuthet und namentlich geglaubt, daß mehr Schwefel darin enthalten sei. Dieses hat sich indessen durch den von mir zur Bestimmung des Schwefelgehaltes aus demselben gefällten Goldschwefels unternommenen Versuchen nicht bestätigt, sondern der Schwefelgehalt betrug nicht mehr als der im Goldschwefel aus anderm Schlippe'schen Salz. Ein kleiner Kalkgehalt wurde zwar in diesen Krystallen getroffen, aber ich kann nicht glauben, daß dieser die Ursache ihrer gelben Farbe sei. Der kleine Antheil des bei der Zerlegung dieser Krystalle mittelst Schwefelsäure mit dem Goldschwefel niederfallenden Gypses, in Folge dieser Beimischung, wird durch sorgfältiges Auswaschen des Präcipitats vollkommen wieder entfernt und ich erlaube mir nochmals hervorzuheben, daß dies Verfahren sehr practisch ist und deshalb jedem Pharmaceuten nicht genug empfohlen werden kann. Die Drachme Goldschwefel, nach der

Preuss. Pharmakopöe bereitet, ist mit 4 Sgr. 6 l der Taxe angesetzt, ich bin aber überzeugt, daß von der geringen Ausbeute bei jener Verfahrungsweise Apotheker kaum eine Vergütung seiner Arbeit bei dem Preise finden wird. — Ob man in Verfolg der Vorschrift der Pharmakopöe, wenn nach Duflos größere Menge von Schwefel angewendet wird, reichere Ausbeute an Schlippe'schem Salz erhält, ich nicht beurtheilen, indem gerade über diesen Gegenstand keine Versuche von mir unternommen worden.

*Zur Beurtheilung der Güte und chemischen Reinheit des officinellen Goldschwefels und des Kermes* wird in manchen Lehrbüchern und Arzneimittel-Prüfungstafeln (unter letztern nenne ich *Röloff's Anleitung zur Prüfung der Arzneikörper*, herausgegeben von Lindes) vorgeschlagen, man solle diese Präparate erhitzen, völlige Verflüchtigung sei ein Beweis ihrer Reinheit. — Es sind von mir über diesen Gegenstand viele Versuche sowohl in verschlossenen Glasröhren als in offenen Schalen und auf Glastafeln unternommen worden, aber auch der ganz reine aus Schlippe'schem Salz bereitete Goldschwefel verflüchtigt sich nicht vollkommen. Unter Ausschluss der Luft erhitzt, bleibt der Goldschwefel, wie bekannt, unter Verflüchtigung eine Sublimation eines Antheils Schwefel, schwarzes Eisen- und Schwefelantimon zurück. Dieses verhält sich selbst bei starker und langer Glühhitze unverändert. Erst wenn es sehr heftig geglüht wird, giebt es noch etwas Schwefel aus und es schien mir wenigstens so, als ob sich flüchtige sich etwas Antimonmetall, welches sich sogleich über der glühenden Stelle der Glasröhre niederschlägt, anlegt. Macht man die Probe in einer offenen



röhre, so verflüchtigt sich nach Ausgabe des über-  
schüssigen Schwefels nach und nach etwas Antimonoxyd,  
welches sich als weißer Anflug besser oben anlegt, es  
bedürft aber schon sehr starke Glühhitze dazu, eine ge-  
ringe Menge von Schwefelantimon gänzlich zu oxydi-  
ren — es bleibt sogar noch lange neben einer gelblich-  
weißen pulverigen Substanz schwarzes Schwefelantimon  
als Antimonmetall zurück. Am leichtesten geschieht  
die Umwandlung in oxydirtes Antimon auf der Spitze  
der Glastafel, aber auch bei einer Hitze, wo das Glas  
schmelzen anfängt, (sich wenigstens erweicht) ist  
man nicht im Stande, das gebildete Oxyd, weil sich  
ebenfalls zugleich antimonige oder Antimonsäure bil-  
det, völlig zu verflüchtigen. Anfangs schmilzt die weiße  
Substanz, später wird sie fest und es bleibt nach dem  
Abkühlen ein gelblichweißer Punct zurück.

Das Verhalten vor dem Löthrohre habe ich nicht  
geprüft, es wird hierdurch jedenfalls der Zweck eher  
erleichtert werden, indem sich auf der Kohle und in der  
Oxidationsflamme die gebildete Antimonsäure wieder  
(verflüchtiges) Oxyd zurückführen läßt. Da aber die  
Kohle fremde Stoffe neben Schwefelantimon mit ein-  
bringt, welche doch eben dadurch nachgewiesen werden  
können, so wird man auf diese Art eine genaue Prüfung  
nicht unternehmen können. Von einigen Schriftstellern ist  
sogar in dieser Verflüchtigung ein Platinlöffel vorgeschla-  
gen worden. Niemand wage es, sich eines solchen zu bedie-  
nen! Das nach Verflüchtigung des Schwefels zurückblei-  
bende Antimon, wohl auch das Schwefelmetall selbst,  
verbindet sich fest mit dem Platin und wenn es auch  
durch anhaltendes und heftiges Glühen zwischen Koh-  
len davon wieder getrennt wird, so bleibt doch die

Stelle des Tiegels, wo das Schwefelmetall lag, p und aufgetrieben.

Zur Prüfung des Goldschwefels auf Oxydgehalt ein kurzes Kochen des mit Wasser feinabgerieb Präparats mit einer Auflösung von Weinsteinsäure schicklichsten. Einige Tropfen *Aqua hydrosulph* oder Ammonium-Sulphhydrat zeigen augenblick diese Beimischung in der abfiltrirten Flüssigkeit. Wie ich aber oben erwähnte, so wird ein kleiner halt an Oxyd \*), da auch der gut verschlossen gehalt Goldschwefel in kurzer Zeit sehr oxydhaltig wird, n leicht zu vermeiden sein, wenn man diesen Zust nicht durch, von Zeit zu Zeit vorzunehmendes Koch mit weins. Wasser zu beseitigen sucht. Es giebt uns d Beobachtung zugleich jedoch einen Fingerzeig, den G schwefel nicht in zu großen Quantitäten vorrätig halten, den frischgefällten nach hinlänglichem Aus sehen schnell zu trocknen (wie dies schon Geiger pfohlen hat), aber dabei durch anhaltendes Trock denselben so wasserfrei als möglich herzustellen, ind dieser Wassergehalt jedenfalls zunächst Veranlass zu dieser Oxydation giebt.

---

\*) Dasselbe fand auch Otto (*Annalen der Pharmac.* XI p. 88.) stets im Goldschwefel neben etwas Schwefelsä und erklärt die Entstehung ebenfalls durch Oxydation Goldschwefels während des Trocknens. Der mit Weinsä vom Oxyd durchs Kochen befreiete Goldschwefel soll n ihm sich später nicht ferner oxydiren — worüber von keine Versuche gemacht worden sind. — In einem geblich aus Schlippe'schem Salz bereiteten und der Fa nach ächten Goldschwefel, der aber längere Zeit hind in einer gewöhnlichen Holzbüchse gestanden hatte, h sich soviel Oxyd gebildet, daß ein sehr bedeutender R stand an Einfach-Schwefelantimon (entstanden aus O — siehe das Folgende) bei der Behandlung mit Antim sulphhydrat blieb.

Das Verfahren, den Goldschwefel durch Aetzlauge prüfen, in welcher er sich lösen muß, wobei, im Oxyd darin enthalten ist, ein weißer Rückstand bleibt, giebt für sich allein kein sicheres Resultat; man weiß nämlich nicht, ob dies Oxyd zuvor schon darin enthalten ist, oder erst durch Einwirkung des Alkalis, wenn nämlich etwas Einfach-Schwefelantimon dabei ist, wie ich bei Behandlung des obenerwähnten braunen Goldschwefels mit Kalilauge fand, gebildet wurde. Ferner löst sich Goldschwefel aus Schlippe'schem Salz in frischbereiteter Aetzlauge vollkommen hell und klar, während derselbe Goldschwefel in etwas länger gestandener Lauge einen weißen Bodensatz liefert (aber auch in erster Auflösung hatte sich bis zum andern Tage ein krystallinischer weißer Absatz gebildet) und auch der Goldschwefel mit mehr Schwefelgehalt ist in Aetzlauge löslich.

Geiger schreibt zur Prüfung des Goldschwefels Aetzammoniak vor; reiner Goldschwefel soll sich, nachdem er durch Abreiben mit Wasser fein zertheilt ist, in 50 Theilen Salmiakgeist in gelinder Wärme unter Ausschluss der Luft völlig lösen. Unter den genannten Prüfungsmitteln hat sich auch mir dasselbe, wo es sich darum handelt, Beimischungen von Einfach-Schwefelantimon, Antimonoxyd und Schwefel zu erkennen, als das Beste bewiesen. Ersteres bleibt als eine braunrothe, letztere beiden als eine gelbweiße Substanz zurück; wird diese, mit Ammonium-Sulphhydrat abgerieben, braun und löst sich in einer etwas größern Menge desselben auf, indem sie gelbes Ammonium-Sulphhydrat anfärbt, so ist sie Antimonoxyd und kein Schwefel, welcher sich ebenfalls bekanntlich in Schwefelammonium löst, jedoch ohne vorher braun zu werden, und gerade

wel-  
monium  
ad geradob

das Auflösungsmittel noch mehr hochgelb färbt. Auch der aus schönstkrystallisirtem Schlippe'schen gefällte Goldschwefel, welcher an Weinsteinsäure der Prüfung auf Oxyd nichts abtrat, hinterließ in von mir unternommenen Versuchen einen kleinen Rest gelblichweißer Flöckchen, welche ich Anfangs für eine Spur Kieselerde gehalten, später aber, so es ihre geringe Menge zuließ, für Antimonoxyd erkannte, jedenfalls entstanden durch Oxydation eines Theils Antimon aus dem Schwefelantimon, indem es auf der andern Seite Schwefelammonium bildete. Ich verlange deshalb auch hier keine völlig klare Auflösung.

Der Salmiakgeist wird immer eins der schätzbarsten Prüfungsmittel bleiben, da, wo es sich darum handelt, Verunreinigungen des Goldschwefels durch zugleich mitgefällten Schwefel (wenn z. B. die Aetzlauge, oder sie zum Krystallpunkte zu verdampfen und das entstandene Salz zur Präcipitation zu verwenden, ohne Weiteres gefällt worden wäre) zu erkennen. Dieser nicht chemisch gebundene Schwefel bleibt sämmtlich zurück und wird auch bei anhaltendem Kochen der Flüssigkeit nicht aufgenommen. Nur hat die Anwendung des Salmiakgeists das Unangenehme, daß man längere Zeit digeriren und selbst kochen muß, um eine möglichst klare Auflösung zu bewirken. Sein Gebrauch ist also bei schnellen Versuchen, um z. B. bei Apothekenvisitationen über die Aechtheit eines Goldschwefels zu entscheiden, mit Umständlichkeit verknüpft.

Ein schnelleres Prüfungsmittel, als der Salmiakgeist giebt in solcher Beziehung das *Ammonium-Sulphhydrid* (*Schwefelammonium*) ab, am besten, wenn es frisch bereitet oder doch nicht allzu gelb gefärbt ist. Dieses Prüfungsmittel ist von mir seit einigen Jahren schon

nur allein in Anwendung genommen worden, um in kurzer Zeit sogleich die Aechtheit des officinellen, in der Preuss. Pharmakopöe (aus Schlippe'schem Salz) bereiteten Goldschwefels zu erproben. — Wenn schon die feurigrothe Farbe dieses Goldschwefels dem, welcher solchen einmal bereitet und gesehen hat, sogleich ein ziemlich bestimmter Aufschluss über seine Aechtheit und Unterscheidung von andern Goldschwefelproben geben wird, indem eine mehr braune Farbe auf Beimischung von Einfach-Schwefelantimon (oxydfreien Kermes) eine dunkler rothe oder orangegelbe auf Beimischung von verflüssigtem Schwefel in den meisten Fällen hinweist (was auch sogar auf die bei der Bereitung befolgte Methode geschlossen werden kann), so täuscht man sich doch darin mitunter, und ich habe oben von einem durch sehr lange früher braunroth aussehendem Goldschwefel gesprochen, welcher dem ächten täuschend ähnlich sah, dessenungeachtet ein unreines, weniger Schwefel enthaltendes Präparat war, welchem statt des Schwefels eine beträchtliche Menge Antimonoxydalkali beigemischt war. Die Art dieser Beimischungen ergibt sich sogleich ziemlich genau bei Behandlung des Goldschwefels mit der *schicklichen* Menge dieser Flüssigkeit. Dieser Goldschwefel aus Schlippe'schem Salz löst sich nämlich *schnell* und in *kurzer Zeit* in einer sehr geringen Menge dieser Flüssigkeit, — 1 Gran zuvor mit 2 bis 3 Tropfen Wasser abgeriebener Goldschwefel in 20 Tropfen Schwefelammonium (erhalten durch Sättigung des mit einem gleichen Gewichte Wassers verdünnten Salmiakreueils mit Schwefelwasserstoff — aber auch ein concentrirteres Schwefelammonium \*) ist brauchbar.) In

\*) nur in anderm Verhältniß der Zumischung. (Antimon) (Kermes) A



10 Minuten ist die Flüssigkeit völlig klar und nicht gelb gefärbt, als sie vorher war. Directe Versuche, welche ich sonst noch darüber anstellte, sind folgende.

Einfach-Schwefelantimon (aus Brechweinsteinlösung oder *Liquor stibii muriatici* durch Schwefelwasserstoff gefällt) sieht dem Goldschwefel ziemlich ähnlich, feurigroth, aber erfordert, wenn es sich auch schon in der Kälte darin löst, eine ungleich größere Menge Schwefelammonium; seine rothe Farbe verwandelt sich, wenn es damit übergossen wird, mehr in dunkelbraun und das gelbe Schwefelammonium entfärbt sich so, daß es hell wie Wasser wird, oder wenn das Lösungsmittel stärker gelb gefärbt ist, so wird diese Farbe doch geringer, als vor dem Versuche. Wenn dem obigen Verhältniß 1 Gran mit 20 Tropfen behandelt wird, so bleibt bis zum andern Tage, ja selbst 8 Tagen, noch ein ziemlich beträchtlicher Theil ungelöst — und es erfordert deshalb auch ein Goldschwefel der Einfach-Schwefelantimon beigemischt enthält, eine ungleich größere Menge des Auflösungsmittels.

Oxydhaltiger Kermes der Preuss. Pharmacopöe löst sich damit ebenfalls anfänglich mehr dunkelbraun, die Farbe des Ungelöstbleibenden wird dann mehr rothbraun, aber es gehört noch eine beträchtliche Menge von Schwefelammonium dazu, um eine kleine Quantität dieses Kermes nach und nach zu lösen. 1 Gran mit 20 Tropfen behandelt, hinterläßt noch nach 8 Tagen eine ziemlich beträchtliche Menge eines kastanienbraunen Absatzes und die gelbe Flüssigkeit entfärbt sich noch mehr vorhin. Auch reines Antimonoxyd (*Stib. oxydat. seum*), mit Schwefelammonium abgerieben, färbt sich braunroth (sich in Einfach-Schwefelammonium vermittelnd) und löst sich endlich in einer beträchtli-

von dieser Flüssigkeit, indem diese ebenso wie  
entfärbt wird, auf. — Goldschwefel, der irgend  
beträchtliche Menge von Antimonoxyd enthält, er-  
deshalb ebenfalls eine gröfsere Quantität des Prü-  
mittels, als die oben angegebene. — Jener Gold-  
schwefel, von welchem ich oben sprach, dafs er aus braun-  
rothem, durch Auflösung in Aetzlauge und Fällung  
in Flüssigkeit mittelst Schwefelsäure, erhalten wor-  
den, wodurch ein stark oxydhaltiges Product resul-  
tete, verhielt sich, als 1 Gran mit 20 Tropfen Am-  
monium-Sulphhydrat übergossen wurde, in folgender  
Weise: Er veränderte die Farbe binnen Kurzem, ohne  
gänzlich zu lösen. Der unlösliche Theil war anfäng-  
lich dunkelbraun, wurde dann braungelb, binnen  
kurzer Stunde graugelb. Die überstehende Flüssigkeit sah  
schwarzer gelbgefärbt aus wie vorher, der Niederschlag  
nach andern Tage war nicht mehr so bedeutend, aber  
die Flüssigkeit mehr hellgelb geworden, woraus her-  
vorgeht, dafs dieser Goldschwefel aufser dem beigemisch-  
ten Antimonoxyd auch eine kleine Menge nicht chemisch  
gebundenen Schwefels enthielt, welcher bei der, auf das  
relative Verhältnifs des Schwefels zum Antimon ge-  
richteten Analyse übersehen worden war.

Goldschwefel aus Schlippe'schem Salz, welchem bei  
der Auflösung absichtlich eine Schwefelleberauflösung  
beigemengt wurde, durch Schwefelsäure präcipitirt, wo-  
bei also ein mehr Schwefel enthaltendes Product ge-  
bildet wurde — veränderte seine schönrothe Farbe  
sogleich, wie bei ächtem Goldschwefel, als er in  
dem angegebenen Verhältnifs mit Ammonium-Sulph-  
hydrat übergossen wurde; die Flüssigkeit blieb aber sehr  
dunkel und selbst nach langem Umschütteln hellte sie sich  
nicht auf. Nach einigem Stehen war ein gelber Absatz

von Schwefel sichtbar, die überstehende Flüssigkeit *sich mehr goldgelb gefärbt*. Bis zum andern Tage *sich der Schwefelabsatz noch verringert*, aber es *noch nach mehreren Tagen ein weißgrauer Absatz*, *rend sich bis dahin die Flüssigkeit stark goldgelb, braungelb färbte*.

Es geht also hieraus hervor, daß diese Flüssigkeit *in schicklichem Verhältniß angewandt*, welches ich *mals hervorheben muß*, sich sehr wohl als schnelles Lösungsmittel zur Erkennung des ächten Goldschwefels Schlippe'schem Salz, von welchem sich 1 Gran bis 10 Minuten in 20 Tropfen lösen muß, eignet. Bei einem unlöslichen Absatz, während sich die Flüssigkeit färbt, oder doch nicht *mehr* gefärbt wird, als sie *war*, so enthält der Goldschwefel eine Beimischung Antimonoxyd oder Einfach-Schwefelantimon. Löst der Anfangs bleibende Bodensatz nach und nach *indem das Schwefelammonium sich goldgelb färbt*, *färbt sich dies gleich im Anfang stärker gelb*, so *man sicher darauf rechnen*, ein mehr Schwefel enthaltendes Präparat vor sich zu haben, und mit Hülfe Salmiakgeists oder des Kochens mit Weinsteinsäure *dann derjenige, welchem es um nähere Kenntniß der Beimischung zu thun ist*, eine genauere Prüfung unternehmen können, welches aber, wenn man erst mehrere Prüfungen dieser Art mit dem erwähnten Mittel unternommen hat, in den wenigsten Fällen nöthig *sondern man wird aus der Farbe des Absatzes und der Färbung des Goldschwefels selbst und der später überstehenden Flüssigkeit sogleich mit ziemlicher Sicherheit die Art der Verunreinigung bestimmen können*, wie *vorhin schon erwähnte* \*).

---

\*) Der Genauigkeit wegen darf ich zu bemerken nicht unterlassen.

Die sonstigen Verunreinigungen des Goldschwefels, die salzige Bestandtheile, in Folge nachlässigen Auswaschens in denselben gelangt, werden in bekannter Weise erkannt, die Prüfung auf beigemischtes Schwefelarsenik wird sich aber wohl schwerlich nach dem Marsh empfohlenen Verfahren entdecken lassen, es sich wohl nicht leicht eine ganz von Antimon freie Substanz durch Oxydation des Goldschwefels mit Salpetersäure oder auf andere Art erhalten läßt und das Antimon dann ebenfalls mit dem Wasserstoff eine gasförmige Verbindung eingeht, welche fast gleiche Eigenschaften mit dem Arsenikwasserstoff theilt. Die Methode, den Goldschwefel nach Simon mit frischem Kalkhydrat in einer Glasröhre zu bedecken und zu erhitzen (aber genau nach dessen Vorschrift, *Annalen der Chemie* Bd. 21.), oder denselben mit Königswasser vollkommen zu oxydiren, um das Antimon und das Arsenik in Antimonsäure und Arseniksäure zu verwandeln, von welchen dann die erste durch salpetersaures Silberoxyd weiß, die andere braunroth gefärbt wird, werden in dieser Beziehung die besten Prüfungswege bleiben.

Es kann, daß auch der reinste Goldschwefel in der obigen Prüfungsweise, wenn er sich auch Anfangs sogleich scheinbar völlig hell und klar in Ammoniumsulphhydrat löst, nach mehreren Stunden eine Spur, aber auch nur eine Spur, eines grauschwarzen Absatzes zeigt — daß er also deshalb nicht für unrein zu nehmen ist. Worin dieser Absatz besteht, ob in Staub, einer Spur von Kieselerde oder vielleicht von Schwefeleisen, habe ich wegen seiner geringen Menge, wie ich ihn in obigen Versuchen erhielt, nicht genau bestimmen können. Jeder, der die Prüfung des Goldschwefels in Vergleich mit unreineren Präparaten nur einige Mal versucht hat, wird aber diesen geringen Absatz leicht von anderen Beimischungen schon durch das äußere Ansehen unterscheiden können.

# Ueber die Darstellung von *Kermes m* *rale* und *Sulphur. auratum*, nach der Deplacirungsmethode;

vom

Professor Dr. *S. Stratingh* in Gröningen

**H**r. Apotheker *Musculus* in Sulz am N  
rhein hat bekanntlich vor einigen Jahren die Deplacirungsmethode auch auf die Darstellung anorganischer Producte angewandt, und namentlich auf die des Goldschwefels und des Kermes.

Zur Darstellung des *Goldschwefels* giebt er folgende Vorschrift. 6 Th. gebrannter Kalk werden mit Wasser gelöscht und dann vermischt mit 4 Th. kohlens. oder trockenem kohlens. Natron, 2 Th. aufs feinst pülverten Schwefelantimon, 1 Th. Schwefelblumen und 8 Theile gewaschenen Sand. Die Mischung kommt in einen Deplacirungsapparat, und nach Ueberdeckung mit einer Lage Sand wird die Auslaugung mit kohl. Wasser vorgenommen und so lange fortgesetzt, bis die ablaufende durch Salzsäure nicht mehr getrübt wird. Aus dem sämmtlichen Filtrat schlägt man hierauf, nach zweckmäßiger Verdünnung mit Wasser, den Goldschwefel nieder, und wäscht und trocknet das Präparat auf die bekannte Weise, welches fast eben so viel an Gewicht beträgt, als das angewandte Schwefelantimon.

Das Verfahren zur Darstellung des *Kermes* ist ähnlich, nur läßt man aus der Gemenge die Schwefelblumen weg, und behandelt das Filtrat mit einer Lösung von doppeltkohlensaurem Natron oder mit einem Strom von Kohlensäure.

Diese Bereitungsweise ist einfacher und man ers



derselben das Brennmaterial, auch sind nach Mus-  
 las die Präparate, besonders der Goldschwefel, sehr  
 gut.

Boullay bemerkt im *Journ. de Pharm. Mai 1836*.  
 II, dafs er diese Methode geprüft und darnach einen  
 sehr schönen Goldschwefel erhalten habe, der Kermes  
 schwer und von nicht vorzüglicher Farbe ausge-  
 fallen sei, indessen dafs man auch diesen von einer vor-  
 züglichen Beschaffenheit erhalte, wenn man, statt koh-  
 lensaurem Kali, trocknes kohlensaures Natron anwende,  
 die Fällung mit von Luft durch Kochen befrei-  
 tem destillirten Wasser die Flüssigkeit verdünne, und  
 die Fällung, statt mit kohlensaurem Gase, mit doppelt-  
 kohlensaurem Natron vornehme.

Auch Brandes hat sich in seinem Archiv (2. R.  
 24. VI. 290) sehr günstig über diese Methoden ausge-  
 prochen, nachdem er sie einer Wiederholung und Prü-  
 fung unterworfen hat.

Ich habe nun ebenfalls, durch das Schöne und Ein-  
 fache dieser Bereitungsweise dazu veranlafst, dieselbe  
 geprüft, und beim *Sulphuraurat* an Menge und Schönheit  
 des Präparats ein sehr zufrieden stellendes Resultat er-  
 halten, beim *Kermes minerale* aber war der Erfolg nicht  
 so günstig, wenn man die von Boullay angegebenen  
 Cauteleu nicht berücksichtigte, wobei ich indess bemer-  
 ken mufs, dafs ich eine reichlichere Ausbeute erhielt  
 durch Fällen mit kohlensaurem Gase, als mit doppeltkoh-  
 lensaurem Natron.



## Beobachtung einer besondern Krystallisation des Figuier'schen Goldsalzes

von  
Dr. Bley.

---

Man erhält dieses natronhaltige Goldchlorid in der Regel in vierseitigen Säulen und abgestumpften Enden. Durch eine sehr langsam, bloß beim Ausfällung der Lösung in mäßig warmer Luft erhaltene Verfestigung, bekam ich ansehnlich große Krystalle in vierseitigen Säulen, von der Farbe des doppeltchromsauren Kalis, welche durchaus luftbeständig sich zeigten.

---

## Ueber die leichteste und zweckmässigste Benutzung des sauren schwefelsauren Kalis als Retortenrückstand von der Salpetersäurebereitung, auf neutrales schwefels. Kali

von  
L. E. Jonas in Eilenburg.

---

Abgesehen davon, daß dieses als Nebenprodukt gewonnene Salz, insofern man die Salpetersäurebereitung als Hauptgegenstand betrachtet, vielen wichtigen Anwendungen in der Technik unterliegt, worüber die Lehrbücher der Chemie Auskunft geben, so bleibt dem pharmaceutischen Arbeiter, wenn er diesen Rückstand in sein Geschäft in jener Art benutzen will, trotz des leichten Absatzes, der größte Gewinn; da ein Preis von 10 bis 14 Thlr. pro Cent. jeden hinweist, seine Salpetersäure selbst darzustellen.

Die Ausführung in der Darstellung der Salpetersäure

re ist mit so wenigen Umständen verknüpft, daß, man nur auf die Einhaltung der von der Wissenschaft vorgeschriebenen Erfordernisse richtigen Fleiß wendet, jeder Versuch auch im Kleinen beweisen d, wie selbst in diesem so billigen Artikel man den reiken die Spitze bieten kann.

Wenn der saure Rückstand von der Salpetersäure-  
reinigung aus salpetersaurem Kali mit Pottaschenlauge  
neutralisirt wird, so ist, um krystallisirtes schwefelsau-  
Kali daraus zu gewinnen, die schwere Löslichkeit  
des Salzes und die zweckmäßigen, geräumigen Gefäße,  
der Stein des Anstosses, bedeutende Quantitäten dessel-  
auf einmal ohne besondere Einrichtungen darzustel-  
; dies zu umgehen, dahin richtet sich mein Verfah-  
n. Man laugt entweder den Destillationsrückstand aus,  
der wo die Glasretorten nicht zu theuer kommen, zer-  
richt man dieselben und im letztern Fall pulverisirt  
an den Rückstand, übergießt solchen in einem kupfernen  
essel ohngefähr mit der fünffachen Menge Wasser und  
neutralisirt mit Kali unter Kochen dies ziemlich feine  
pulver, dessen völlige Neutralisation man dem sich bil-  
enden Salze ansehen kann, wenn nämlich selbiges glän-  
end durchscheinend auf dem Boden des Gefäßes ver-  
bleibt. Ist so das neutrale schwefelsaure Kali gewon-  
nen, berücksichtigt man dessen Verunreinigung mit an-  
deren heterogenen Beimischungen theils aus der Pott-  
asche, aus deren Silikate entstanden, oder zufälligen Um-  
ständen erwachsen, beseitigt solche durch Auswaschung  
mit kaltem Wasser, und trocknet das Salz, wo ein schnee-  
weißes chemisch reines Präparat gewonnen wird. Man  
ist im Stande, auf diese Weise in einem Tage mehrere  
Centner darzustellen.



# Beobachtung

**M**an er-  
 Regel in vie-  
 dern. Durch  
 der Lösung  
 stung, bekar-  
 seitigen Säul-  
 Kalis, welch

Ueber di-  
 Benutzu-  
 Retorten  
 bereit

## Z

vor: Man  
 ben Gewi-  
 gel, bis be-  
 mehr wegge-  
 dampfen ist

## Die P

307 schreibe

dem auch oft eine große Menge  
verarbeitet werden muß, um das Anbren-  
nen zu vermeiden. Gleichfalls ist bekannt,  
daß durch kochendes Wasser die auszuzie-  
henden Stoffe auflöst, daß man, statt  
in hölzernen Gefäßen vor-  
zugehen, Methode vielfache Vor-  
theile nur noch für we-  
nigen Nutzen.

mit kaltem Wasser.

Dieser Extracte läßt

sich in.

darf mit keiner

zu werden, weil

wohl das Harz

so ist es doch

gegen Extracts

nig Wasser

durch mehr

isses Ex-

gebrauch

msalze,

salze \*).

man die-

zugeschrie-

Zweifel einige

abhängige Heilwir-

ausehen, warum man

erberger und Märcklin,  
Zeitschrift. D. Red.

r und Mätsch.  
D. R. A. G.



# Ueber *Bisulphas kalicus* in Betreff technischer Anwendung;

von

*W. Richter.*

**Z**ur Bereitung dieses Salzes schreibt Ber vor: Man übergieße das neutrale Salz mit seinen Gewichte Schwefelsäure, und erhitze im Pl gel, bis bei anfangendem Glühen keine Schwef mehr weggeht. Es schießt nach dem Auflösen un dampfen in Prismen an.

Die *Pharmacopoea borussica, Editio quinta 1825* 307 schreibt vor:

℞ *Kali sulphuric. dep. pulv. ʒxjj*  
solve in

*Acid. sulph. rectific. venal. ʒvj*

*Aq. destill. ʒxvjjj*

*antea caute mixtis. Solutionem filbratam lege ad  
crystallos redige, quas bene sicca.*

*Sint coloris expertes, peracidæ, in æere parum  
centes, in aquae partibus duabus solubiles.*

Von beiden Vorschriften erlaube ich mir Folg zu sagen. Die erste Vorschrift, welche sich auf kleine Quantitäten beschränkt, ist, da im Platin gearbeitet wird, für den Apotheker und Techniker practisch.

Die zweite Vorschrift, welche mir nicht die rige Ausbeute lieferte, habe ich abgeändert wie fo

Man nehme 4 Theile fein gepülvertes vollkom trocknes einfach schwefelsaures Kali, schütte es in porcellanenes Gefäß und gieße rasch 3 Theile r rauchendes Vitriolöl darauf. Jetzt suche man d

und Niederdrücken mit Hülfe einer porcellanen  
die das Ganze zu einer Masse zu bringen. So wie  
Natriolöl eingetragen ist, geht die Verbindung zum  
schwefelsauren Kali vor sich, mit Begleitung einer  
Wärmeentwicklung. Es ist hierbei zu bemer-  
ken, daß die eingetretene Temperaturerhöhung so lange  
möglich unterhalten wird, damit die Masse nicht  
durch zu heftiges Agitiren zu schnell abgekühlt  
wird, wodurch leicht könnte ein Verlust an dem ge-  
suchten sauren schwefelsauren Kali herbeigeführt wer-  
den. Wenn die Salzmasse erkaltet ist, übergießt man  
mit der doppelten Gewichtsmenge Wasser, löst das  
über Feuer auf und dampft ab bis zum Krystalli-  
sationspunkte.

Es schießt ein Salz an in übereinandergelegten Plätt-  
chen zu mitunter ziemlich großen Krystallen anwach-  
send. Da dieses Salz sich leicht von der Mutterlauge  
freien läßt, in Folge der erwähnten großen Krystalle,  
hat es wohl in technischer Hinsicht Vorzüge vor dem  
fein prismatisch krystallisirten Salz, welches letztere  
so rasch von der Mutterlauge frei wird.

Für vollkommen rein ist aber bloß das in haarfei-  
nen Krystallen angeschossene Salz zu halten, und um  
es zu bekommen, braucht es weiter nichts, als einer  
schmaligen Auflösung in der doppelten Menge kalten  
Wassers, Befreiung vom ungelösten, ein Achtel des ange-  
wandten schwefelsauren Kalis betragenden schwefelsau-  
ren Kali durch Filtration und Umkrystallisirung.



## Dritte Abtheilung.

**Extractionen.****Ueber die zweckmässige Darstellung  
Extrakte;**

von

**Dr. *Fr. Mohr.***

(Auszug aus der Festschrift des Rheinischen Medicinalcollegii  
zur Jubelfeier des Hrn. Geheimeraths Dr. Wegeler in Coblenz)

**D**ie Extrakte werden bereitet, um das **Wirksamkeit** der Arzneikörper, von den indifferenten Substanzen scheidet, darzustellen. Bei der Bearbeitung der *Pharmacopoea universalis* fand ich beim Durchgehen der Vorschriften der verschiedenen Pharmakopöen hinlängliche Gelegenheit, von den grossen Abweichungen derselben in der Bereitung der Extrakte mich zu überzeugen. Nachfolgendem habe ich meine Beobachtungen über diese Klasse von Arzneimitteln zusammengestellt.

**A. Wässrige Extrakte.**

Die Bereitung der Extrakte mit Wasser geschieht auf dreierlei Arten, durch Maceration mit kaltem Wasser, durch Infusion mit warmem Wasser und durch Auskochen.

Die Maceration mit kaltem Wasser bedingt eine grosse Menge des Auflösungsmittels und dabei werden die auflöslichen Theile weder schnell noch vollständig aufgelöst, und das Verdampfen der Auszüge erfordert einen grössern Aufwand an Zeit und Brennmaterial. Die Erfahrung hat gezeigt, daß durch Auskochen der zu extrahirenden Substanzen mit Wasser dieses nicht bes

werde, und außerdem auch oft eine große Menge Wasser dabei angewendet werden muß, um das Anbrennen der Substanz zu verhüten. Gleichfalls ist bekannt, daß die Infusion mit kochendem Wasser die auszuziehenden Substanzen am leichtesten auflöst, daß man, statt metallenen, diese Operation in hölzernen Gefäßen vornehmen kann, und daher diese Methode vielfache Vorzüge besitzt. Die Auskochung dürfte nur noch für wenige Substanzen beibehalten werden.

c) Extracte durch Maceration mit kaltem Wasser.

Die an sich schon kleine Zahl dieser Extracte läßt sich vielleicht noch weiter vermindern.

*Extractum Aloes.* Die Ausziehung darf mit keiner geringen Menge Wasser vorgenommen werden, weil das Extract sonst harzhaltig wird, denn obwohl das Harz in reinem Wasser nicht aufgelöst wird, so ist es doch in einer concentrirten Lösung des wässrigen Extracts löslich. Daher giebt die Aloe mit wenig Wasser eine gleichförmige Auflösung, aus welcher durch mehr Wasser das Harz gefällt wird.

*Extractum Opii aquos.* Die Bereitung dieses Extracts mit kaltem Wasser ist durch langjährigen Gebrauch gerechtfertigt. Es enthält wesentlich die Morphiumsalze, mit Entfernung des größten Theils der Narcotinsalze \*).

*Extractum Chinae frigide paratum.* Wenn man diesen Extract auch übertriebene Wirkungen zugeschrieben haben mag, so enthält es doch ohne Zweifel einige von der alkaloidischen Heilkraft unabhängige Heilwirkungen. Es ist aber nicht wohl einzusehen, warum man

\*) Vergl. die Erfahrungen von Herberger und Märcklin, Bd. XX. 2. R. S. 75 dieser Zeitschrift.

D. Red.

so sehr die trübe Beschaffenheit der wässrigen Auflö-  
 dieses Extracts scheuet. Die meisten Pharmakologen  
 schreiben zur Extraction der Rinde zu viel Wasser  
 nicht erwägend, daß durch das Wasser selbst beim  
 dampfen die Klarkeit wieder aufgehoben werde.  
 Vorschrift der *Pharm. borussica* für dieses Extract  
 angemessen \*).

*Extractum Valerianae frigide paratum.* Warum  
 Valeriana mit kaltem Wasser ausgezogen werden  
 ist schwer einzusehen. Wollte man vermeiden,  
 beim Auskochen die wirksamsten Bestandtheile, das ä-  
 therische Oel und die Valeriansäure, sich nicht verflü-  
 chtigen, so werden diese durch das nachherige Ver-  
 dampfen der Auszüge doch verjagt; aber das kalte Wa-  
 asser löst von dem Oel auch nicht einmal etwas auf.  
 Baldrianwurzeln, welche mit kaltem Wasser behufs  
 Extractbereitung erschöpft waren, erhielt ich bei  
 nachheriger Destillation eine reichliche Menge ätheris-  
 ches Oel. Daß die grösste Wirksamkeit der Valeriana  
 ihrem Gehalt an ätherischem Oel liege, beweisen  
*Tinct. Valerianae spirituosa* und *aetherea*, deren letz-  
 tere ausgezeichnete Wirkung nur von dem Gehalt an ä-  
 therischem Oel und Valeriansäure bedingt sein kann,  
 da sie nur diese fast aufgelöst enthält. Die Auszie-  
 hung mit kaltem Wasser ist daher die ungeeignetste Methode  
 für die Darstellung des Valerianaextracts. Soll ein wä-  
 ssriges Extract der Valeriana beibehalten werden, so  
 ist Infusion mit siedendem Wasser und noch mehr ein-  
 langes Aufkochen zu empfehlen, weil im letztern Falle  
 mehr Oel und mehr Valeriansäure aufgelöst werden.

---

\*) Vergl. die Erfahrungen von Dr. Geiseler in Bd.  
 2. R. S. 218 des Archivs, und von Herberger und Ma-  
 rin, ebend. Bd. XX. 75.



besten aber dürfte die Ausziehung mit Weingeist der Wärme sein, da das Auflösliche davon leicht aufgenommen wird und die Abdampfung schnell und bei hoher Wärme vor sich gehen kann.

b) Extracte mit lauwarmem Wasser.

Wasser von 40 — 45° R. ist häufig dem kalten Wasser vorzuziehen, indem dadurch das Auflösliche leichter ausgezogen und ein zu grosser Schleimgehalt, den kochendes Wasser aufnehmen könnte, vermieden wird. Es gehören hierher: *Extractum Bardanae, Liquiritiae, Rhei, Gentianae, Saponariae* und *Sennae*.

*Extractum Rad. Liquiritiae.* Das Auskochen der Wurzel muss vor Allem unterlassen werden, weil dadurch ein scharf unangenehm und kratzend schmeckendes Harz mit in das Extract übergeht, das von lauwarmem Wasser nicht aufgelöst wird \*).

*Extractum Rhei.* Die durch kalte Maceration oder siedendheisse Infusion bereiteten Auszüge werden durch Kochen trübe und geben Extracte, die in kaltem Wasser eine harzige Substanz ungelöst zurücklassen, die in kaltem Wasser unlöslich, in kochendem wenig, in Weingeist leichtlöslich ist; durch Auskochen der Wurzel wird zwar eine möglichst grosse Menge Extract erhalten, aber voll unauflöslicher Materie. Die Infusion mit lauwarmem Wasser aber giebt das hellste und reinste Extract \*\*).

\*) Vergl. die Erfahrungen über Maceration der Wurzel, die von F. Aschoff, Trommsdorff, Brandes, Forcke u. a. erhalten wurden. D. Red.

\*\*) Vergl. die Erfahrungen von Geiseler, Bd. V. 2. R. S. 68 dieser Zeitsch. und von Brandes, Buchner u. Trommsdorff, Bd. VIII. 2. R. S. 13 dieser Zeitschrift. D. Red.

wiederholte Operation nur sehr verdünnte, des Aufwands kaum werthe Brühen liefert.

Ein Beispiel wird dies näher erläutern. 6 Pfd. *Marrubii* erforderten zur Befeuchtung 53 Pfd. kochendes Wasser. Am andern Morgen war die Masse im Innern noch so heiss, dass man sie nicht mit der Hand behandeln konnte. Ohngefähr die Hälfte der Flüssigkeit floss freiwillig ab, die andere Hälfte durch die Presse. Nach Verdampfen der Flüssigkeiten wurde 1 Unze Extract erhalten. Die wiederholte Digestion eines Presskuchens mit 27 Pfd. kochendem Wasser gab einen Auszug, der nur 3 Unzen 3 Drachmen Extract lieferte, das aber als nicht mehr tauglich verworfen wurde. Diese Operation erforderte 4 Tage; die dazu nöthige Wassermenge wäre weder zur Auskochung noch zur Macerationsmethode ausreichend gewesen; zum Auskochen würde man, um das Anbrennen zu verhüten, wenigstens die dreifache Menge Wasser gebraucht haben, und bei der Deplacirung kann man eine grosse Verdünnung nicht vermeiden.

Diese Methode der Extractbereitung dürfte vor den übrigen Vorzüge haben, und eignet sich besonders für *Extractum Absinthii, Florum Calendulae, Cardui benedicti, Caryophyllatae, Catechu, Centaurii minoris, Chamomillae, Cichorii, Croci, Cynarae, Dulcamarae, Fumariae, Gallicae, Larum, Graminis, Marrubii, Millefolii, Sabinae, Taraxaci, Trifolii fibrinae* \*).

d) Extracte durch Auskochen mit Wasser.

Bei einigen Rinden und Hölzern von härterer Consistenz ist ein längeres Auskochen der Infusion vorzuziehen.

\*) Vergl. die Erfahrungen von Brandes, Bd. XIII. 2. R. dieser Zeitschrift. D. Red.

Es aber nicht mehr Wasser anwenden, als zur  
ung des Anbrennens nöthig ist. Die 3fache Menge  
und die 3 — 4malige Auskochung sind meistens  
end. Diese Methode gilt für: *Extractum An-*  
*cascarillae, Chinae, Fuliginis splendentis, Hip-*  
*ni, Ligni campechiensis, Quercus, Rad. Ratanhiae,*  
*rhoe, Cort. Salicis, Rad. Sarsaparillae.*

e) Wässrige Extracte aus dem Saft.

Nach der älteren Methode wird der ausgepresste  
mit seinem ganzen Inhalte zur Trockne gebracht;  
nach dem Abdampfen erhält man gute Extracte,  
aber wegen der leichten Fäulniß ihres Gehalts an  
sich bald Schimmel und Ammoniak entwickeln und  
versetzt werden. Die neue Preuss. Pharmako-  
poeie einen andern Weg eingeschlagen. Der ausge-  
presste durch Kochen coagulirte Saft wird zur Extract-  
bereitung verdampft, das Coagulum und der Krautrück-  
stand mit Weingeist ausgezogen und das Extract dieses  
mit dem ersten vermischt. Das Resultat einer  
Prüfung dieser Methode ergiebt, daß man dar-  
aus erhält, was Wasser und Weingeist nur aus-  
ziehen aufzunehmen können, und man nur noch die  
Faser hinzuzufügen braucht, um die ganze Pflanze  
auszuziehen. Nach vielen Versuchen finde ich folgende  
Methode geeignet, den aus dem Angeführten sich erge-  
benden Uebelständen zu begegnen.

Das frische Kraut wird in einem steinernen Mör-  
ser zerkleinert, der Saft ausgepresst, der Rückstand mit  
Wasser angestossen, ausgepresst und der Press-  
rückstand hierauf weggeworfen. Die grünlichen trüben  
Extrakte werden in Wasser erhitzt und nach der  
Filtration durch ein wollenes Colatorium gegeben,

und unter stetem Umrühren in Quantitäten von wenigen Pfunden bis zur Syrupsconsistenz eingedampft, vermeidet hierdurch, daß dieselbe Menge der V nicht zu lange ausgesetzt wird. Die zur Syrup gebrachte Extractmasse wird nun mit ihrem g Volum Alkohol geschüttelt, der Niederschlag durch Filiren entfernt, der Weingeist im Wasserbade abgilt und der Rückstand in einer silbernen oder porzellanen Schale im Wasserbade zur gehörigen Consistenz gebracht. Die so bereiteten Extracte zeichnen sich durch einen starken Geruch aus und lassen sich lange Zeit unverderbt aufbewahren. Und wenn man selbst sehr wirksame Kräuter anwenden muß, so wird durch die Ausscheidung der größeren Menge Schleim doch das Extract eine gleichmäßigere Zusammensetzung erhalten.

Diese Methode gilt für: *Extractum Aconiti, Belladonnae, Chelidonii majoris, Cicutae, Conii, Digitalis purpureae, Hyoscyami, Juglandis, Lactucae, Nicotianae glaucae, satillae, Stramonii, Vitis Pampinorum.*

#### B. Mit Weingeist zu bereitende Extracte.

Diese Methode ist meistens passend, man muß nicht mehr Weingeist nehmen, als zur völligen Befreiung nöthig ist; die doppelte Menge reicht fast immer. Eine 3 — 4malige Wiederholung der Digestion ist meistens reichend, und Auspressen stets angemessen. So sind zu bereiten: *Extractum Agarici, Caincae, Chinae, Colchidis, Cort. rad. Granatorum, Croci, Ligni Guaiaculi, Lupuli, Scillae, Valerianae.*

---

\*) Vergl. die Erfahrungen von Brandes, Archiv 1822, Bd. I. S. 184, von Buchner, Bucholz und Jahn in der Zeitschrift, 2. R. Bd. XVII. S. 97. D. Re

Mit Beihülfe von rectificirtem Weingeist zu bereitende  
Extracte.

Viele Extracte werden zweckmäfsig durch Ausziehen von Weingeist und durch Wasser bereitet, namentlich von solchen Pflanzen, die einen wirksamen harzigen Theil enthalten, der durch einen gummiartigen Wasser löslichen Stoff zur Extractform gebracht wird, durch welchen das Harz zwar nicht in Wasser löslich wird, aber doch zur Suspension kommt und trübe Flüssigkeiten entstehen. Es ist sonach Zweck der geistig wässrigen Extracte, das medicamentöse Wirksame durch Weingeist aufzulösen und durch wässrigen Theile in wässrigen Flüssigkeiten fein zu erhalten. Die Preufs. Pharmacopöe schreibt vor, erst die Pflanze mit Weingeist, dann den Rückstand derselben mit heifsem Wasser zu extrahiren und das Infusum mit Weingeist zu fällen. Da nun verwechelt werden hierbei das ausgezogen wird, was nachher wieder präcipitirt werden soll, so ist es besser, zuerst mit rectificirtem Weingeist und zum zweiten und dritten Male mit einem Gemisch von gleichen Theilen Weingeist und Wasser auszuziehen, wodurch die Aufnahme eines zu grofsen Theils schleimiger Stoffe verhindert wird. Die Preufs. Pharmacopöe schreibt weiter: Extraction von einem Gewichtstheil Vegetabil 5 Gewichtstheile Spiritus vor, 10 Gewichtstheile Wasser und über zur Präcipitation noch eine unbestimmte Menge Wasser. Es kommen also gegen 20 Gewichtstheile Spiritus in Anwendung, während 6 — 8 Gewichtstheile, in mehreren Portionen angewandt, völlig ausreichen. Auch kann man der oben bemerkten Schraubenpresse mit Wasser sich bedienen. Auf angeführte Art werden dargestellt: *Extractum Angelicae, Rad. Arnicae, Cort. Au-*



*rant., Calami, Columbo, Enulae, Gratiolae, Hellgri, Levistici, Pimpinellae, Roris marini, Senecadaariae.*

**D. *Extracte mit höchst rectificirtem Weingeist zu***

Bei diesem Verfahren ist nur noch die Theilbarkeit der Flüssigkeit in kleine Portionen, und ein fleißiges Rühren beim Abdampfen, das immer im Wasserbade geschehen muß, zu beachten. Durch ein fleißiges Rühren wird das Abdampfen äußerst beschleunigt. Nach der Vorschrift werden dargestellt: *Extract. rad. Asaeulae vulg., Cantharidum, Cubebae, Filicis maris, Vomicarum, Seminis Cinae.*

*Mit Aether zu bereitende Extracte.*

Hierbei möchte nur bemerkt werden, daß die Darstellung möglichst zur Winterszeit auszuführen ist, so weniger an Auflösungsmittel zu verlieren. Die gepulverte Substanz presse man gut aus, damit es möglichst erschöpft werde, auch kann man sogleich in den Filtrirapparat coliren, um vieles Umgießen zu vermeiden. Die Verdampfung muß im Wasserbade geschehen. Die Extracte werden auf diese Weise bereitet: *Extract. Cubebae, Filicis Maris und Sem. Cinae.* Ich schlage vor, diese Extracte mit heißem höchst rectificirten Alkohol zu bereiten; sie haben genau dieselbe Beschaffenheit.



# Ueber Extractbereitung;

vom

Apotheker *Bolle* in Angermünde,  
Vicedirector des Vereins.

*Die Verdrängungsmethode, angewandt auf die Bereitung der Extracte.*

Vor einiger Zeit schon hörte ich von meinem ~~und~~ und Collegem Wittrin in Prenzlau, wie er eine Abänderung der Verdrängungsmethode zur Bereitung größerer Extractmengen, mit Bequemlichkeit und Vortheil, benutze. Dieselbe erfordert nichts weiter, als ein geeignetes Faß, das, wie auch Brandes angegeben, ich denn sogleich anfertigen ließ, mich des-  
dem seitdem mit völliger Befriedigung bediene und ~~hier~~ nicht anstehen will, das Verfahren zur allgemeinen Kenntniss zu bringen:

Die zu extrahirenden Vegetabilien werden, etwas mehr als zur gewöhnlichen Extractbereitung, durch ein Reissieb geschlagen, verkleinert, am Abend vor der Zeit mit kaltem Wasser so angefeuchtet, daß sie, in den Händen leicht gedrückt, backen und in das so-  
wie zu beschreibende Extractionsfaß gebracht. Dieses Faß ist von eichenem Holz und vor dem Gebrauch ~~ausgelaut~~ ausgelaut worden. An dem oberen weiteren Ende ist es offen, das untere engere Ende mit einem Bodenschloß, über den, außer dem gewöhnlichen Rande, drei verlängerte Stäbe, als Füße dienend, hinausragen \*). Unter dem Boden, etwa in 1 Zoll Höhe, liegt ein ~~reiter~~ herausnehmbarer, durchlöcherter, und zwischen

\*) Die Lichtenmaasse meines Fasses sind: Höhe  $2\frac{1}{2}$ ', obere Weite 11'', untere Bodenweite 8''. Es lassen sich 8 — 10 Pfd. Krautes darin behandeln.

beiden Böden, den Abfluß der Flüssigkeit zu betrieht ist ein zinnerner Hahn, eingeschraubt. Beim Gebrauch wird der durchlöchernte Boden so mit einem naßgewaschenen wollenen Tuche belegt, daß keine Flüssigkeit abfließen kann ohne das Tuch zu passieren \*). Die angesetzten Vegetabilien werden noch an demselben in das Faß gegeben und ein wenig eingedrückt, auch nur festgerüttelt. Oben auf das Vegetabilien man einen zweiten, möglichst dem Fasse angepaßten durchlöchernten Boden und beschwert ihn mit Steinen, um das Schwimmen zu verhindern. So vorgerichtet bleibt das Ganze die Nacht hindurch ruhig stehen. Am andern Morgen, bei dem geöffneten Hahn, schon einige reichhaltige Flüssigkeit angesammelt; sie wird abgelassen und dann viel kochendes Wasser langsam aufgegossen, das das Kraut nur von ihm eben bedeckt wird, wobei der Hahn geschlossen bleibt. Nach  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{2}$  Stunde, während welcher eine neue Menge Wasser ins Kochen bringt, wird der Hahn geöffnet und die braune und fast dickflüssig erscheinende Flüssigkeit langsam abgelassen. Nachdem diese vollständig abgelaufen, wird der Hahn geschlossen, abermals in demselben Maße kochendes Wasser aufgegossen, wobei man, wie oben beim ersten Aufguss gegeben, verfährt. Ein dritter Aufguss wird nur

---

\*) *Angefeuchteter*, wollener oder leinener Tücher bedient sich mit Vortheil sehr oft statt des zerstörbaren Papierfiltrums und es gilt, in Beziehung auf das Anfeuchten bei ihnen dasselbe, was Berzelius über das vorerwähnte Anfeuchten des Papierfiltrums sagt. Es sei diese Anweisung besonders für junge Leute hingestellt, die dahin zu bringen sind, jedes Filtrum vor dem Aufguss des zu Filtrirenden mit entsprechender klarer Flüssigkeit zu befeuchten.

weingelb beim Ablaufen erscheinen und hat nur sehr wenig Geschmack, jedoch unterlasse ich ihn nicht. Die Eindampfung kann gleich nach dem ersten Aufkochen geschehen und würde man eine nicht unbedeutende Menge Extract in Einem Tage darstellen können, wenn man nicht, wie ich, es vorziehen sollte, nur auf einige Quart abzudampfen, über Nacht absetzen lassen und durch ein wollenes, angefeuchtetes Colatorium zu coliren.

Man erspart bei dieser Methode Feuerungsmaterial und Zeit, indem man nur bis  $\frac{2}{3}$  der von unserer Pharmacopoe vorgeschriebenen Menge Wassers aufzuwenden braucht und also bei Weitem nicht so viel Flüssigkeit verdunsten hat; man ist dem zeitraubenden und ausserordentlich widerwärtigen Auspressen des Vegetabils, das bei der gewöhnlichen Bereitungsart der Extracte nöthig halte, überhoben und erhält eben so viel, wo es nicht mehr, Ausbeute an klarem, leichtlöslichen, schönen Extracte. Es wurden z. B. erhalten aus: 6 Pfd. *Hb. Chamomill.* 1 Pfd. 5 Unz., aus 4 Pfd. *Flor. Chamomill.* 1 Pfd. 5 Unz., aus 6 Pfd. *Herb. Trifol.* 2 Pfd. 6 Unz. (Civilgewichte) Extract von gehöriger Consistenz.

Bei dieser Gelegenheit finde die Bemerkung Platz, dass die Verdrängungsmethode schon längst gekannt aber nicht gehörig erkannt wurde und dass sie ein ähnliches Verfahren ist, wie die Runkelzuckerfabrikation gehabt hat. Beide sind eigentlich ein Kind Deutschlands, das in Frankreich aber erzogen wurde. — Schon in den zehn Jahren dieses Jahrhunderts wurde das *Extr. Chinae* parat. in Berlin so bereitet, dass man die gepulverte Rinde in einen Spitzbeutel brachte und allmählig darauf gegossenes Wasser abtröpfeln liess. — War es wohl etwas anderes als Displacement? Leider aber

ist die Sache mit ihrem auffallend günstigen Ende nicht bei uns verfolgt worden.

b) *Anwendung von Blechcylinder bei der Bereitung spirituöser Extracte.*

In kleinen Geschäften, wo es nicht recht lohnend auf seltener in Anwendung kommende Apparate bedenken Kosten zu wenden, muß man wissen, wie der hochgeachtete Pfaff, mit Franklin, sagt, mit einer Feile zu bearbeiten und mit einem Bohr zu feilen. So bediene ich mich bei der Bereitung spirituöser Extracte, sowohl zur Rectification als zur Destillation, statt der kostbaren Eisen- oder Zinn- cylinder von Zinn, deren von dem besten Weißblech. Indessen war es immer sehr unangenehm, daß die Blechcylinder, namentlich am Boden, also da, wo sie mit der kupfernen Blase in Contact kommen und ein Volta'sches Element bilden, sehr schnell vom Rost angefressen und durchlöchert wurden. Den Uebelstand zu umgehen lasse ich jetzt den Blechcylinder *sehr dicht* anschließend mit Zinkblech umgeben, wodurch er nicht allein vor Rost geschützt wird, sondern auch an Festigkeit und Handhabung gewinnt. Das Zinkblech muß überall dicht schließen, weil, wie mich die Erfahrung gelehrt hat, die geringste, zwischen den Blechen befindliche Leertschicht das Kochen der im Cylinder befindlichen Flüssigkeit und somit die resp. beabsichtigte Destillation verhindert.

---



# Bemerkung über Bereitung narkotischer Extracte;

vom

Apotheker *Liebermann* in Grünenplan.

Ein jeder meiner Collegen weiß aus Erfahrung, daß bei dem Auspressen des bloßen Krautes von Aconit und Hyoscyamus wenig Saft erhalten wird, weshalb ein Zusatz von Wasser vorgeschrieben ist.

Um nun diese Uebel möglichst zu beseitigen, liefs ich versuchsweise bei dem Zerstampfen des Krautes auf etwa 4 Pfd. 3 Unzen schwachen Alkohol zusetzen, um damit auf die schleimigten und resinösen Theile zu wirken, und dann auspressen.

Dieses Verfahren entsprach ganz meinen Erwartungen; ich erhielt eine große Menge schönen Saft und der ausgepresste Rückstand war saftlos, und gar nicht mehr klebrig anzufühlen.

Der erhaltene Saft wurde auf flachen Porcellantellern bei einer Wärme von 40 bis 50° R. abgedampft u. s. w. behandelt, wobei jedoch der wenige Alkohol nicht berücksichtigt werden darf.

Daß während der Verdampfung des Saftes von Hyoscyamus eine große Menge Eiweißstoff, und bei Aconit viel aconitsaurer Kalk abgeschieden wird und beseitigt werden muß, ist bekannt.

Ich möchte glauben, daß die auf diese Weise bereiteten narkotischen Extracte denen nach der Preuss. Pharmacopöe an Wirksamkeit gleich kämen, wo nicht übertreffen, was wohl in der Hinsicht zu wünschen wäre, weil dabei viel Alkohol und Zeit erspart würde.

Kürzlich habe ich auf dieselbe Weise, aus den noch

unreifen Mohnsamenkapseln ein Extract bereitet; dieses Extract hat einen überaus starken betäubenden Geruch, und ist wahrscheinlich von grosser Wirksamkeit, was auszumitteln — wir aber den Aerzten überlassen müssen.



## Ueber die Darstellung der narkotischen Extracte;

von

*Rudolph Brandes.*

**D**ie Darstellung guter narkotischer Extracte ist eine Hauptaufgabe der pharmaceutischen Praxis. Bemerkungen, welche Fr. Bucholz in Erfurt darzulegen mitgetheilt hat \*), verdienen die sorgfältigste Beachtung. Diese betreffen vorzüglich die Einengung der Auszüge zur Extractconsistenz, und ob dabei das Wasserbad oder das Dampfbad vorzuziehen sei. Bucholz entscheidet sich für das *Wasserbad*, und wer die Resultate beider Methoden vergleichend geprüft hat, wird unbedingt beistimmen, besonders wenn die Einwirkung des Dampfes gegen Ende der Arbeit noch mit einer Spannung verbunden selbst statt findet, wo die oberen freien Wände des Abdampfungsgefässes so heiss werden, dass die sich nach oben hinaufziehende Flüssigkeit eintrocknet und der Wärme ferner ausgesetzt, der eingetrocknete Theil zu einem halbkarbonisirten und also zersetzten Körper einschrumpft. Selbst die Temperatur des siedenden Wassers ist zu hoch, wenn sie bis zu den letzten Stadien der Concentration erhalten wird. Jahn in Meiningen und Bucholz in Gotha haben kürzlich eben so sehr zu

\*) S. diese Zeitschr. 2. R. XI, 234.

zuziehende Beobachtungen über die Darstellung der narkotischen Extracte mitgetheilt, die zum Theil auch auf diesen Punct hinausgehen \*).

Wie dem auch sei, alle Erfahrungen stimmen darin überein, daß die Enengung der Auszüge in möglichst geringer Wärme statt finde; und vor geraumer Zeit habe ich gezeigt, daß die wirksamen Bestandtheile der narkotischen Pflanzen in den Verbindungen, in welchen sie in den Gewächsen enthalten sind, in Weingeist sich leicht lösen, während eine Menge anderer Stoffe derselben, die nur in Wasser löslich sind, nicht vom Weingeist aufgenommen werden, die durch Weingeist bereiteter Auszüge daher die wirksamen Bestandtheile in concentrirter Form enthalten, folglich wirksamer sind, und auch gleichförmiger, weil wenigstens die Zufälligkeiten, die den Gehalt der nur in Wasser löslichen Bestandtheile betreffen, ausgemerzt sind \*\*).

Bei der Bereitung der narkotischen Extracte sind daher zwei Hauptpuncte ins Auge zu fassen: 1) die Flüssigkeit, mit welcher der Auszug bereitet wird, und 2) die Temperatur, welche man zur Concentration anwendet.

Entsprechen die neuen Vorschriften, welche zum Theil auf diese Sätze gegründet sind, diesen Anforderungen völlig? Ich glaube nicht.

Die Preuss. Pharmacopöe (sowie die, welche derselben gefolgt sind), giebt die Bereitung aus frischem und getrocknetem Kraut zu. Sind die Kräuter vorsichtig getrocknet und sorgfältig gegen Luft und Licht aufbewahrt, die Pulver in zuvor erwärmten und fest ver-

\* S. diese Zeitschr. 2. R. XVII, 97.

\*\* Vergl. meine ersten Mittheilungen über diesen Gegenstand in 1. Bde. 1. R. S. 189 dieses Archivs, 1822.

schlossenen, nicht zu grossen Gläsern, so ist mit denselben das trefflichste Extract darzustellen.

Bei der Darstellung der narkotischen Extracte soll trocknem Kraut nach der Vorschrift 1 Pfd. Kraut mit 5 Pfunden rectificirtem Weingeist 36 — 48 Stunden digeriren, und dann die Flüssigkeit durch Auspressen u. s. w. gesondert werden. Der Krautrückstand darauf mit 10 Pfunden heissem Wasser übergossen, damit 24 — 48 Stunden stehen, worauf die Flüssigkeit ebenfalls durch Auspressen gesondert wird. Diese Flüssigkeit soll bis auf  $\frac{1}{3}$  Rückstand abgedampft und dann mit rectificirtem Weingeist so lange vermischt werden, bis keine Trübung mehr entsteht. Angenommen, man habe den wässrigen Auszug bis zu 3 Pfd. abgedampft, so wird man wenigstens auch 3 Pfd. Weingeist zusetzen müssen. Nach der Fällung wird filtrirt, das Filtrat darauf mit dem ersten weingeistigen Auszuge vermischt, der Spiritus abdestillirt und der Rückstand im Dampfbade zur vorschriftsmässigen Consistenz eingeengt.

Unterwerfen wir diese Methode, unter Zugrundelegung neuerer Erfahrungen, einer sorgsamten Kritik, finden wir, dafs dieselbe eine grosse Menge Flüssigkeit erfordert, auf 1 Pfd. 5 + 3 Pfd. Spiritus und 10 Pfd. Wasser, also 18 Pfd. Flüssigkeit, womit das Kraut 3 Tage in Digerirtemperatur bleibt, endlich erfordert die Flüssigkeit noch eine geraume Zeit zur Verdampfung, um bis zur Extractconsistenz, also bis auf 2 — 3 Unzen, welches ohngefähr die Ausbeute an Extract aus einem Pfd. der narkotischen Kräuter ist, eingeengt zu werden, auch während dieser Zeit ist sie der Einwirkung einer hohen Temperatur ausgesetzt. Wenn die wirksamen Bestandtheile durch Weingeist den in Rede stehenden

anzen entzogen werden, so ist nicht wohl abzusehen, warum die zweite Ausziehung mit Wasser gemacht werden soll, dessen Verdampfung wieder eine höhere und länger dauernde Wärme erfordert.

Bei der Darstellung der narkotischen Extracte aus solchen Kräutern, wird der Saft derselben ausgepresst, abgekocht, abgeschäumt und im Dampfbade zur Honigdicke verdampft. Das Satzmehl mit dem ausgepressten Rückstande wird jetzt mit seinem doppelten Gewichte Alkohol 24 Stunden lang digerirt, ausgepresst, die Flüssigkeit bis zur Hälfte abdestillirt, bis zur Honigdicke verdampft, mit dem eben so weit eingedickten Saftes vermischt, und dann das Ganze bis zur Pillenconsistenz verdampft.

Unterwerfen wir auch diese Methode einer nähern Betrachtung, so sehen wir, daß gegen die erste hier keine Ausziehung mit Wasser angewandt wird, was gewiß angemessen ist, aber billig fragen wir: Warum schreibt die Pharmakopöe bei der einen Methode Alkohol, bei der andern rectificirten Weingeist vor? Warum werden nach der einen Methode die nur in Wasser löslichen und indifferenten Stoffe durch Weingeist abgezogen, nach der andern aber nicht? Beide Methoden würden in einer angemessenen Uebereinstimmung sein, wenn auch der Rückstand des Krautes nach Auspressen des Saftes mit rectificirtem Weingeist behandelt, und mit diesem Auszuge der durch Einengen concentrirte Saft versetzt würde, worauf man colirte und das Ganze zur vorschriftsmäßigen Consistenz brächte.

Nach dieser Auseinandersetzung scheint es mir erwiesen, daß die Darstellung der narkotischen Extracte noch mehrer Verbesserungen bedarf, die aber wesentlich von den beiden oben aufgestellten Principien ausgehen. Extract: wesentlich en ausgehen



müssen. Auf diese gestützt, lege ich folgendes Verfahren vor, was ich schon mehrmals früher versucht worüber ich aber seit einigen Jahren gelegentliche Versuche in meinem Laboratorio anstellen um die für eine allgemeine Angabe nöthigen Detailmehren Operationen abzuleiten.

### *M e t h o d e .*

1 Pfd. (16 Unzen) des gröblich gepülverten Kraut wird in einen Deplacirungscylinder eingedrückt, nicht zu fest, und dann mit Spiritus von 65 bis 70° übersetzt. Das Pulver befindet sich in dem Cylinder bekanntlich zwischen zwei kleinen Blechsieben, auf das unterste befestigt man zugleich eine Scheibe Filtrirpapier. Der Spiritus wird anfangs eingesogen, ohne daß er abtröpfelt, man gießt fortwährend nach. Endlich abtröpfelt unten die Flüssigkeit ab, und zwar sehr concentrirt und intensiv dunkelgrün gefärbt, man gießt lange Spiritus in den Cylinder nach, bis 90 Unzen gegeben sind, und hört dann auf. Man kann der ausschöpfung gewiß sein, denn die zuletzt abtröpfelnde Flüssigkeit hinterläßt beim Verdunsten nur noch wenig Extract, die Unze kaum 3 Gran. Wenn das Abtröpfeln aus dem Cylinder aufhört, gießt man Wasser hinein um durch dasselbe den noch in dem Kraute steckenden Spiritus, 10 — 12 Unzen, auszutreiben; man läßt abtröpfeln, bis man 90 Unzen Flüssigkeit wieder erhalten hat oder bis die nach dem Aufgießen des Wassers anfangs wenig gefärbt abtröpfelnde Flüssigkeit wieder eine dunklere braune Farbe annimmt, ein Zeichen, daß der zurückgebliebene Spiritus wenigstens größtentheils entfernt ist, und nun der wässrige Auszug kommt, nicht in das Extract darf.

Die sämmtlichen geistigen Auszüge gießt man in eine Porcellanschale und stellt diese in die Destillirblase des Beindorfschen Apparats, und destillirt allen Spiritus ab. Die Schale wird dann herausgenommen und enthält die Extractflüssigkeit, worin das Chlorophyll in feinen und Körnern abgeschieden ist. Ich halte nicht für, dieses bei dem Extract zu lassen, soll es geschehen, so muß es nun durch anhaltendes Rühren innig mit wieder vermengt werden. Consequent aber den dargestellten Principien wird die Flüssigkeit jetzt filtrirt. Sie hat einen äußerst intensiven fast unerträglichen narkotischen Geruch, den sie bei dem weiteren Abdampfen zu einem großen Theil einbüßt. Die grünharzige Masse, welche auf dem Filter verbleibt, beträgt 4 — 5 Unzen. Die Extractflüssigkeit wird endlich in einer kleinen Porcellanschale im Wasserbade bei 50 — 60° R. zur vorschriftsmäßigen Consistenz gebracht.

Bei der näheren Betrachtung dieser Methode stellen sich nun folgende Vorzüge derselben heraus. Der ganze Verlauf der Darstellung des Auszuges des narkotischen Vegetabils findet, ohne alle von außen angebrachte Wärme, bei der gewöhnlichen Temperatur statt. Das Durchsiegeln der Flüssigkeit erfordert gegen 3 — 4 Tage. Nach der Vorschrift der Pharmakopöe ist das Kraut nur eben so lange Zeit einer Digerirtemperatur ausgesetzt.

Nach unserer Methode wird 1 Pfd. Kraut durch 90 Unzen Spiritus völlig erschöpft, und also durch eine Flüssigkeit, die keine 2 Pfd. Wasser enthält, während nach der Pharmakopöe auf dieselbe Krautmenge 8 Pfd. Spiritus (128 Unzen) und 10 Pfd. Wasser genommen werden müssen.

Nach der Pharmakopöe ist nicht nur eine über

viermal so große Menge Flüssigkeit zu verdampfen nach unserer Methode, sondern diese Flüssigkeit bedarf dazu noch über die Hälfte aus Wasser, und bedarf daher der Auszug, nach der Pharmakopöe bereitet, viermal längere Zeit und eine größere Wärme, um der vorschriftmäßigen Consistenz gebracht zu werden, als der nach unserer Methode dargestellte Auszug erfordert, nach welcher dazu noch der größte Theil verdunstet wird, mittelst der angegebenen Abdestillirung des Spiritus, ohne daß die Luft Zutritt hat; also nicht verändernd darauf wirken kann, und nur ein kleiner Theil Flüssigkeit noch im Wasserbade in der offenen Porzellanschale zum Verdunsten übrig bleibt.

Nach der Art, wie wir die Abdestillirung des Spiritus bewirken, ist endlich auch der Uebelstand ganz beseitigt, daß an einzelnen Stellen der Gefäßwände getrocknete Extractbrühe durch größere Hitze mehr oder weniger verkohlt werde.

Daß sich die nach unserer Methode erhaltenen vom Spiritus durch Abdestilliren befreiten Extracte endlich durch künstliche Austrocknungsmittel in luftverdünntem Raum, durch Chlorcalcium u. s. w. noch durch weniger Wärme concentriren lassen, versteht sich von selbst. Dies war aber für jetzt nicht der Zweck unserer Aufgabe, sondern diese bestand in einer möglichst einfachen und leicht und allgemein ausführbaren Methode. Ich glaube, diese einigermaßen erreicht zu haben, wenigstens werde ich bestärkt in dieser Ansicht durch die Vergleichung der Producte, die durch die neue zum Vortheil unserer Methode ausfallen; die Menge des Products endlich, welche dieselbe liefert, ist etwas geringer, als die des nach der Pharmakopöe bereiteten Extractes, aber nur zum Vortheil, indem

in unserer Methode dargestellte Extract reiner ist von kalen und unwirksamen Bestandtheilen als das letztere.

Es lieferte uns 1 Pfd. (à 16 Unzen) gepülvertes Henkraut 3 Unzen 5 Drachmen, 1 Pfd. gepülverter Belladonna 2 Unzen, 1 Pfd. gepülvertes Schierlingskraut 3 Unzen 2 Drachmen Extract.

Das Extract. *Hyoscyami* hatte eine gelblichbraune Farbe, einen sehr betäubenden, dabei etwas süßlichen Geruch, und löste sich in Wasser vollkommen klar auf, die Auflösung war durchsichtig röthlichgelb, sie wurde durch Galläpfeltinctur stark getrübt, und nach einiger Zeit schieden sich viele gelbliche Flocken darin ab. In Alkohol löste sich das Extract.

Das Extractum *Belladonnae* war dunkelbraun ins Schwarzbraune, besaß den eigenthümlichen widrigen narkotischen Geruch der Pflanze im hohen Grade, dabei etwas tabacksartig; in Wasser löste es sich völlig auf, die Auflösung war dunkelbraun und wurde durch Galläpfeltinctur reichlich getrübt, die sich ausscheidenden Flocken besaßen eine schmutzig bräunlichgelbe Farbe. In Alkohol löste sich das Extract.

Das Extract. *Conii* hatte eine gelblichbraune Farbe, den Extract. *Hyoscyam.* ganz gleich, einen intensiven narkotischen Geruch wie die Pflanze. Es löste sich in Wasser völlig und mit hellröthlichgelber Farbe auf, die Auflösung verhielt sich gegen Galläpfeltinctur wie das Eisenkrautextract.

Als eine detaillirtere Erläuterung über den Werth dieser verschiedenen Methoden will ich folgende Versuche über das Extractum *herbae Pulsatillae* anführen.

a)  $\frac{1}{2}$  Pfd. *Herbae Pulsatillae sicc.* wurde mit  $2\frac{1}{2}$  Pfd. Spirit. rectificat. einige Tage digerirt, darauf ausgepresst und der Krautrückstand mit 5 Pfd. kochendem Wasser

$2\frac{1}{2}$  Pfd...

ausgepresst  
in Wasser

übergossen, 24 Stunden stehen gelassen, und darauf ausgepresst. Den wässrigen Auszug engte man bis auf ein Drittel ein und fällte denselben mit Weingeist, wozu ohngefähr das dreifache Volumen erforderlich war. Die von dem reichlichen Bodensatze abfiltrirte Flüssigkeit war nur noch schwach gelblichbraun gefärbt, und wurde nach Vermischen mit dem ersten geistigen Auszuge der Destillation unterworfen und nach weiterem Verdampfen 1 Unze 3 Drachmen eines grünlichbraunen Extractes erhalten, dieses entsprach, nach dem Resultate eines desfalls angestellten Versuchs, 415 Gran trockenem gepulvertem Extracte.

b)  $\frac{1}{2}$  Pfd. gröblich gepulvertes Kraut wurde in einen Cylinder mit Weingeist von 60 Proc. der Deplatirung unterworfen; zur völligen Erschöpfung dieses Krautes waren 3 Pfd. des gedachten Weingeistes erforderlich, der letzte Rückhalt des spirituösen Auszuges wurde durch etwas Wasser ausgetrieben. Es wurde erhalten 6 Drachmen eines schönen braunen Extractes und  $2\frac{1}{2}$  Drachmen Chlorophyll, welches nach dem Abdessilliren des Weingeistes sich ausgeschieden hatte. Im Ganzen also 1 Unze  $\frac{1}{2}$  Drachme Extract. Dieses zur Trockne gebracht, gab 370 Gran eines pulverförmigen Extractes, und mit Abzug des Chlorophylls 250 Gran desselben. Nur dieses letztere kann als das reine Extract angesehen werden.

c)  $\frac{1}{2}$  Pfd. des trocknen Krautes wurde mit 5 Pfd. kochendem Wasser übergossen, nach 24 Stunden ausgepresst, und der Krautrückstand nochmals mit  $2\frac{1}{2}$  Pfd. kochendem Wasser auf gleiche Weise behandelt. Die colorirten Auszüge lieferten nach Verdampfen 1 Unze 7 Drachmen Extract. Dieses Extract behandelte man mit 6 Unzen *Spirit. rectificat.*, und erhielt durch



Verdampfen der Auflösung 6 Drachmen Extract, die-  
 selbe Menge als durch Deplacirung; aber gewiß nicht  
 gut, es waren bei dieser Behandlung mehrtägige Di-  
 stillationen und das Verdampfen von 7 Pfd. Wasser nöthig,  
 bei der Deplacirung nur 3 Pfd. Spiritus. Es wurde hier  
 beinahe kein Alkohol, sondern nur Weingeist genom-  
 men, um das Resultat mit dem nach der Vorschrift der  
 Pharmakopöe möglichst vergleichbar zu machen.

Nach einer sorgfältigen Kritik der bekannten ver-  
 schiedenen Methoden zur Darstellung der narkotischen  
 Extracte und der Producte, welche sie liefern, scheint  
 mir der Vorzug der hier auseinandergesetzten, durch  
 Deplacirung mit Alkohol etc., erwiesen; ich empfehle  
 deshalb der besondern Aufmerksamkeit. Schliesslich  
 bemerke ich noch, daß die nach dieser Methode bereite-  
 ten Extracte nach anderthalbjähriger sorgsamer Aufbe-  
 wahrung, in Extractconsistenz, noch ihre ursprünglich  
 schöne Beschaffenheit und den virösen Geruch der Pflanze  
 in hohem Grade besitzen, und keine Spur von Schim-  
 melbildung dabei wahrgenommen worden ist.

#### Vierte Abtheilung.

### Arzneiformen und Compositionen.

#### Ueber einige Syrupe mit Jodverbindungen;

Professor Dr. Tognio in Pesth.

#### I. Syrupus Ferri jodati.

Wackenroder's Abhandlung über dieses Präpa-  
 rat (diese Zeitschrift 2. R. Bd. XIX. S. 176.) interes-  
 sirt mich so sehr, daß ich diesen Syrup sofort in der

Officin des Hrn. Wilhelm Würtzler, eines un-  
 ausgezeichnetsten Pharmaceuten, bereiten liefs.  
 frisch bereitete fast farblose und geruchlose star-  
 kenartig schmeckende Saft färbte sich allmählig,  
 der Oberfläche beginnend, lichtgelb, ohne an Durch-  
 tigkeit zu verlieren, wurde aber nach und nach  
 tigt dunkelbraun. Der Umstand, dafs die Färbung  
 oben nach unten erfolgt, deutete darauf, dafs die  
 von eingedrungener Luft herrührte; dafs das Licht  
 nen Antheil daran habe, ging daraus hervor, dafs  
 Färbung auch in dem Saft eintrat, der an einem  
 Lichte gänzlich entzogenen Orte aufbewahrt wurde.

Ein Theil des Saftes wurde in einem kleinen  
 chen aufbewahrt und die Oberfläche des Saftes mit  
 etwa 3 Linien hohen Schicht von frischem Man-  
 bedeckt. Es erfolgte zwar auch hier die oben  
 gebene lichtgelbe Färbung, doch verdunkelte sie  
 weiter nicht; erst nach mehren Wochen zeigte sich  
 schwacher Stich ins Grünliche.

Die Oeldecke schien sonach einigen Nutzen zu  
 ben; beim Dispensiren ist sie übrigens auch nicht  
 derlich, man entkorkt das Gläschen, schliesst mit  
 Daumen, wendet es um, dafs das Oel aufsteigt, wo-  
 man so viel des Saftes auslaufen lässt, als man nö-  
 hat, und es verkorkt wieder hinstellt; die Oel-  
 sammelt sich sofort wieder obenan. Dafs das  
 übrigens nichts von dem Präparate aufnimmt, liefs  
 erwarten. Besondere Versuche, die wir noch dar-  
 anstellten, haben dieses bestimmt ergeben.

Die therapeutische Anwendung dieses Präp-  
 ist, wie Wackenroder ganz richtig angiebt, eben  
 sicher als bequem. Ein zwölfjähriges, im hohen G-  
 torpides und scrophulöses Mädchen gebraucht seit 3

den diesen Syrup, anfangs in sehr kleinen Gaben, nach der im Archiv gegebenen Formel; allmählig stieg er bis zu einer Drachme des Eisenjodürsyrops auf eine Unze *Syrupus simplicis*. Patientin nimmt von diesem Saft Morgens und Abends einen Theelöffel voll mit etwas Wasser und hat bis jetzt 645 Gr. des Eisenjodürsyrops verbraucht. Der Erfolg ist zwar nicht auffallend, wie das auch in dem vorliegenden Falle nicht erwartet werden konnte, doch recht günstig; Erscheinungen von Ueberreizung sind nicht eingetreten; ich werde daher mit der Gabe noch steigen und den Gebrauch noch einige Wochen fortsetzen lassen.


#### II. Alkoholische Lösung und Syrup mit Doppeltjodquecksilber-Jodkalium.

Die Anwendung einer kräftigen Jodquecksilberverbindung bei einem Kranken, wo nur von einem kühnen Heilversuche dieser Art noch etwas zu hoffen blieb, veranlaßte die Verbindung des Doppeltjodquecksilbers mit Jodkalium zu versuchen, die auch bekanntlich Channing und Puche vorgeschlagen. Hr. Apotheker Würtzler stellte die Verbindung nach der Vorschrift von Dumas dar. 6 Drachmen Jodkalium wurden in  $\frac{1}{2}$  Unze destillirtem Wasser aufgelöst, und zu dieser concentrirten Lösung so viel Quecksilberjodid zugesetzt, als davon sich noch auflösen wollte. Die filtrirte Flüssigkeit wurde in gelinder Wärme verdunstet, worauf das Präparat zum Theil in schönen gelblichen glänzenden nadelförmigen Krystallen erschien, die in feuchter Luft zerflossen, in Trockner aber unverändert bleiben.

In Weingeist von 0,850 löst sich diese Verbindung vollständig auf. Die Auflösung läßt sich, ohne Veränderung zu erleiden, mit Wasser vermischen, und wird

auch durch Luft und Licht nicht zersetzt. Die Herstellung des Eisenjodürsyrups bestimmte uns nun auch für dieses an der Luft so leicht zerfließliche Präparat die Syrupusform zu versuchen, und diese Form haben wir sehr angemessen gefunden.

In 1 Unze *Syrup. simplicis*, mit kaltem destillirtem Wasser bereitet, werden 4 Gran des krystallinischen Präparates aufgelöst. Der Saft ist klar farblos und leidet durch Luft und Licht keine Veränderung. Er besitzt einen herb metallischen Geschmack. Mein verehrter College, Hr. Professor v. Stähly, hat diesen Saft mit Erfolg in der hiesigen klinischen Schule angewandt. Ebenso Dr. Schlesinger und ich selbst. Man kann mit  $\frac{1}{8}$  bis  $\frac{1}{6}$  Gran Doppeltjodquecksilber-Jodkalium beginnen und nach Stähly allmählig bis zu  $\frac{3}{4}$  Gran steigern.



## Formeln für Doppeltjodquecksilber-Jodkalium.

• **D**ieses Salz (Jodkalium-Quecksilberjodid) erhält man durch Auflösen gleicher Theile rothes Jodquecksilber und Jodkalium in viel Wasser. Die Auflösung ist schwach gelb gefärbt; durch Verdunsten hinterläßt sie eine gelbe Masse, die in trockner Luft zwar beständig ist, in feuchter aber zerfließt. Da die flüssige Form nicht für jede Art der pharmaceutischen Anwendung geeignet, so hat man versucht, das Salz in Pillenform zu administrieren, aber das baldige Zerfließen derselben an der Luft ist auch dieser Form hinderlich; dieser Uebelstand wird aber völlig vermieden, wenn man die Pillen mit Gelatin überzieht. Folgende Formeln eignen sich für Anwendung dieses Medicaments:

### *A u f l ö s u n g .*

Bijodureti Hydrarg. ....8 Gran  
Jodureti Kalii.....8 „  
Aq. dest.....8 Unzen.

M.

Dosis: 2 Drachm. bis 2 Unz. innerhalb 24 Stunden.

### *P i l l e n .*

Bijodureti Mercurii.....8 Gran  
Jodureti Kalii.....8 „  
Sacchar. lact.....64 „  
Mucilag. g. mimos.....q. s.

F. Pilul. No. 32.

Die Pillen werden mit Gelatin überzogen. Dosis :  
— 3 Stück täglich. (*Journ. de Chim. med.* 2. Ser. V, 70.)

---

## Furnari's Jodsolution.

Bei der allgemeinen Behandlung scrofulöser und  
in Augenübeln leidender Kinder empfiehlt Dr. Furnari  
folgende Auflösung :

Jodkalium.....1 Drachme  
Jod .....3 Gran  
Wasser .....10 Unzen.

M.

---

## Cooper's Jodkaliumlösung.

Jodkalium.....3 Gran  
Sarsaparilldecoct. 2 Unzen.

M.

---

## Salbe zur Erweiterung der Pupille.

4 Gran Kampher werden in etwas Mandelöl aufge-  
löst, mit 2 Drachmen Baldrianextract zusammengerieben  
und dann mit 2 Drachm. *Ungt. mercuriale* vermischt.



## Emulsio Cerae.

**D**ie nach Steinbrenner gegen verschiedene Arten von Diarrhöen empfohlene Wachsemulsion wird folgende Weise bereitet.

9 Drachm. *Mucilag. G. arabic.* und 2 Drachm. *Wachses* werden in einem Medicinglase bis zum Schmelzen des Wachses erhitzt, stark geschüttelt, das Vehikel zugesetzt, darauf  $\frac{1}{2}$  Unze *Syrup. opial.*, und bis zum Erkalten der Emulsion geschüttelt. Während des Gebrauchs dieser Emulsion läßt man Reiswasser trinken und Klystiere mit Stärkmehl und Cataplasmen auf den Unterleib anwenden.

## Ueber verschiedene Bindungsmittel des Copaivabalsams in Pillenmassen;

von

Dr. Geiseler.

**E**s ist jedem practischen Pharmaceuten bekannt, daß es unmöglich ist, nach den Vorschriften der Aerzte aus Copaivabalsam und Pulvern, gewöhnlich Kubebenpulver, ohne weiteren Zusatz, Pillenmassen herzustellen. Entweder wird die Masse bröcklich und unzusammenhängend, oder der Copaivabalsam drückt sich aus der Masse, während des Formirens derselben zu Pillen, heraus. Zur Bindung des Copaivabalsams kann man sich folgender Mittel bedienen.

1) *Mimosenschleim*. Man bildet mit diesem und dem Balsam eine Emulsion und setzt dann das Pulver zu. Da eine Unze Mimosenschleim ungefähr eine halbe Unze

Balsam bindet, so bedarf man einer grossen Menge des feinsten Pulvers zur Herstellung einer Masse und ist deshalb in den Pillen nur wenig Balsam enthalten. Verdunstet man den Wassergehalt der Emulsion, so erhält man selbst ohne Zusatz von einem Pulver eine wohl zu verarbeitende Pillenmasse, es fragt sich aber, ob die zur Verdampfung anzuwendende langdauernde Erhitzung nicht die Wirksamkeit des Balsams schwächt. Durch Mimosengummipulver läßt sich ohne Zusatz von Wasser der Balsam nicht binden.

2) *Magnesia*. Durch kohlensaure und gebrannte *Magnesia* läßt sich, nach Mialhes Entdeckung, der Balsam verdicken. Der so verdickte Balsam ist sowohl ohne als mit Zusatz von Pulver sehr gut in Pillenform zu bringen, doch ist zu bemerken, daß die Verdickung nur allmählig vor sich geht und bis zum Uebergehen in eine fast steinharte Masse fortschreitet.

3) *Weisses Wachs*. Man darf den Balsam nur mit sehr wenig Wachs zusammenschmelzen, um ihn so zu binden, daß er mit jedem Pulver eine sehr gut zu verarbeitende Pillenmasse darstellt, aus der der Balsam nicht ausschmilzt; mit mehr Wachs bildet er ohne anzuweitigen Zusatz eine sehr gute Pillenmasse. Diese von Simon vor einigen Jahren in der Berliner medicinischen Centralzeitung mitgetheilte Vorschrift verdient allgemeiner bekannt und angewendet zu werden; ich habe dieselbe in keiner pharmaceutischen Zeitschrift erwähnt gefunden.

4) *Wallrath*. 1 Theil Balsam mit 2 Theilen Wallrath zusammengesmolzen, stellte eine ceratähnliche Mischung dar, die für sich nicht in Pillenform gebracht werden konnte, mit Pulvern schien sie anfänglich auch nicht eine bindende Masse geben zu wollen, kurze Zeit

hindurch aber mit denselben in einem Mörser da geknetet, bildete sie eine Pillenmasse, aus der der Balsam nicht ausschwitzte und die sich sehr gut form liefs. Cubebenpulver gab eine eben so schöne Masse als Altheapulver.

5) *Gekochter Terpentın.* 1 Theil gekochter Terpentın wurde zerrieben und unter beständigem Agiren in der Wärme des Wasserdampfades mit 1 Theil Copaivabalsam zu einer gleichförmigen Masse zusammengeschmolzen. Diese gab nach dem Erkalten mit 1 Theil Cubebenpulver eine sehr geschmeidige Pillenmasse. Auch durch weniger als gleiche Theile gekochten Terpentın wird der Balsam gebunden, die Herstellung einer Pillenmasse erfordert aber dann einen gröfsern Zusatz an Cubebenpulver. Nimmt man mehr gekochten Terpentın als Balsam, so erhält man eine spröde Masse, die sich nur erwärmt in Pillenform bringen läfst.

Es wäre wünschenswerth, dafs die Aerzte von verschiedenen Bindungsmitteln für den Copaivabalsam Notiz nähmen, um das eine oder das andere derselben nach Verschiedenheit der Umstände verschreiben können, da kein Apotheker im Stande ist, aus Copaivabalsam und Pulvern, namentlich Cubebenpulver, ohne weiteren Zusatz, Pillen herzustellen.



erhöhung einer merkwürdigen Tempera-  
 turerhöhung, die bei der Mischung von  
 trockenem Schwefelkali mit Baldrianpul-  
 ver entsteht;

vom

Apotheker *Röttscher* in Wiedenbrück.

Bekanntlich werden in der Thierarzneikunde öfter  
 aus Schwefelkali mit andern Substanzen dispen-  
 sirt. Es wurden neulich bei mir Pulver aus 1 Unze  
 Baldrianpulver und  $\frac{1}{2}$  Unze Schwefelkali verordnet, die,  
 als sie einige Zeit in der Apotheke gelegen, einen  
 unangenehmen Gestank, gleichsam wie faules Leder, ver-  
 breiteten, und beim Anfühlen eine bedeutende Tem-  
 peraturerhöhung zeigten. Ich mischte hierauf 2 Unzen  
 Baldrianpulver und 1 Unze Schwefelleber und stellte  
 ein Thermometer, welches  $15^{\circ}$  R. zeigte, in die Mischung,  
 so es ohngefähr  $\frac{1}{4}$  Stunde darin stehen, worauf es von  
 $15^{\circ}$  bis auf  $33^{\circ}$  stieg, also eine Temperaturerhöhung von  
 $18^{\circ}$  zeigte. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die was-  
 serziehende Kraft des Schwefelkalis und der Baldrian-  
 pulver, wobei zugleich das Wasser zersetzt wird, diese  
 Erscheinung hervorgebracht hatte.

Ueber die Mischung des Kamphers mit  
 verschiedenen Körpern, die den Geruch  
 desselben maskiren;

von

*Planche.*

Das Verfahren Garrot's, Pillen mit einem Ueber-  
 ge zu umgeben, ist bekannt; ich bin dadurch auf



frühere Versuche zurückgeführt, die in einer Absicht angestellt wurden, nämlich das Maskiren des Kamphergeruchs durch einen andern angenehmen Geruch den Körper.

Wenn man gleiche Gewichte Kampher und Asa foetida mischt, so wird die Masse, wie bekannt, so weich, der Kamphergeruch verschwindet, so daß nach 24 Stunden kaum merklich ist, und der Geruch der Asa foetida bleibt allein vorherrschend. Viele andere Substanzen verhalten sich der Asa foetida ähnlich, doch mit geringen Abweichungen, wie folgende übersichtliche Darstellung zeigen wird.

### I. Gruppe.

- a) Gemenge mit Kampher, die Pillenconsistenz annehmen und solche behalten: *Sang. Dracon.*, *Guajac.*, *Asa foetida*, *Galbanum*;
- b) Gemenge, die anfangs Pillenconsistenz haben, an der Luft erweichen: *Benzoës*, *Bals. tolu.*, *Ammoniacum*, *Mastix*;
- c) Gemenge, die halbflüssige Consistenz annehmen: *Sagapenum*, *Anime*;
- d) Gemenge, die eine körnige Form behalten: *Olibanum*, *Opoponax*, *Gutti*, *Euphorbium*, *Bdellium*, *Myrra*, *Succinum*;
- e) Gemenge, die den pulvrigen Zustand stets behalten: *Tacamahaca*, *Resina Jalapae*, *Sandaraca*, *Resina Chinae*.

### II. Gruppe.

- a) Gemenge, in welchen der Kamphergeruch verschwindet, während die zugesetzte Substanz ihren eigenthümlichen Geruch behält: *Asa foetida*, *Galbanum*, *Sagapenum*, *Anime*, *Bals. tolu.*;



Gemenge, die noch einen schwachen Kamphergeruch behalten: *Sang. Dracon.*, *Oliban.*, *Mastix*, *Benzoës*, *Opoponax*, *Tacamahaca*, *Resina Guajaci*, *Ammoniacum*;

Gemenge, die einen starken Kamphergeruch behalten: *Gutti*, *Euphorbium*, *Bdellium*, *Succinum*, *Myrrha*, *Resina Jalapae*, *Scammonium*, *Sandaraca*, *Resina Pini*, *Colophonium*, *Resina Chinae*.

Die vorstehenden Resultate dürften in der Praxis von Nutzen sein; ich will einen Fall der Art führen: Ein junger Arzt verschrieb ein Räucherpulver, bestehend aus Weirauch, Tolubalsam, Benzoe, Bernstein und Kampher. Die Formel wurde genau ausgefertigt, jede Substanz gepulvert, dann alles gemengt, statt eines homogenen Pulvers aber eine magmaartige Masse erhalten, wie vorausszusehen war. Der junge Doctor befragte die Zubereitung, und ohnerachtet ich versicherte, die dieselbe nothwendig ein solches Resultat liefern, wenn das Gemenge pulvrig bleiben sollte, eine inerte Substanz demselben zugesetzt werden müßte, blieb er bei seiner Behauptung. Da er immer bitterer wurde, so ergab ich ihm die verschriebenen Substanzen gepulvert, jede für sich, und ersuchte ihn nun, dieselben selbst zu mischen. Es geschah, und aus dem Erfolg erkannte er bald seinen Irrthum.

Noch anderer nützlicher Anwendung sind diese Vertheilungen fähig. Das verschiedene Verhalten des Kamphers gegen Mastix und Sandarak giebt zum Beispiel ein Mittel an, zu erkennen, ob der Mastix mit Sandarak verfälscht ist, was im Handel wohl vorkommt. Hätte man nicht noch andere Mittel, um *Resina Jalapae* und *Scammonium* zu unterscheiden, so würde es auch mittelst des

Kamphers geschehen können. (Auszug aus dem *de Pharmacie XXIV*, 224.)

## Vereinigung fatter Oele mit Samene- sionen, ohne Zusatz von Gummi;

VON

*E. Siller* in St. Petersburg.

**E**s trifft sich öfters in der Receptur, daß fette mit Samenemulsionen ohne Zusatz von Gummi verordnet werden. Gewöhnlich sieht in diesen Fällen Receptarius es als vom Arzt stillschweigend genehm an, die nöthige Menge arabisches Gummi zuzusetzen, um das Oel mit der Samenmilch zu vereinigen, jenes mit dieser nur schüttelnd zu mischen, würde widerliche ungleichförmige Arznei liefern. Es kann oft die Abwesenheit des Gummis gerade im Zweck des Arztes liegen, was namentlich bei Verordnung des cinusöls in der erwähnten Form der Fall sein dürfte.

Diese Vereinigung des Oels mit der Samenemulsion gelingt ohne Gummizusatz sehr gut, wenn man auf 1 Drachme des verordneten Oels eine Drachme Samen z. B. Mohnsamen oder Mandeln, nimmt, diesen mit wenig Wasser zu einem mäßig steifen, sehr zarten Teig zerstößt, darauf abwechselnd und während fleißigen Zerreibens, in kleinen Quantitäten, Oel und Wasser lange zusetzt, bis die dazu bestimmten Mengen verbraucht sind, und dann, scharf auspressend, colirt. so bereitete Emulsion ist vollkommen gleichförmig, steht der, mit arabischem Gummi auf das Sorgfältigste

eten, in keiner Hinsicht nach. (Nord. Centralbl. Pharm. 1839. 7.)

---

## Pulverförmige Conserven;

von

*F o y.*

---

Die pulverförmigen Conserven sind einfache Me-  
tele, denen eine frische Pflanze oder ihre Theile  
als Vehikel dient. Ein Beispiel  
und die Darstellung zugleich erläutern.

### *Conserv. pulverulent. Digital. purp.*

Zur Zeit des Anfangs der Blüthe gesammelte Blät-  
ter der Digitalis, die von ihren Blattstielen und grossen  
Adern befreit worden sind, werden in feine Stücke  
geschnitten, im Schatten zwischen Löschpapier 12  
Stunden lang der Luft ausgesetzt und dann in einem  
Mörser mit 3 Th. Zucker zusammengerieben, so dass  
keine Spur des Vegetabilis unterscheiden kann. Das  
Gemisch wird hiernach in Gläsern von schwarzem Glase  
abgefüllt.

Auf dieselbe Weise werden solche Conserven von  
Belladonna, Aconitum, Stramonium, Hyoscyamus,  
Scopolia, Rhus toxicodendron, Sabina, Lauro-Ce-  
rocladon bereitet.

Nach dieser Art von Arzneiform werden die kräf-  
tigsten Mittel in einem stets gleichen Zustande sich fin-  
den. Extracte, Pulver und Tincturen dadurch ersetzt

Die Unbequemlichkeit der pulverförmigen Conser-  
ven besteht darin, dass man diese Zubereitungs-

weise nur auf eine kleine Zahl von Substanzen anwenden kann, aber diese sind auch die kräftigsten und in kleinen Dosen wirksamen Mittel. Man kann einwenden, daß man in diesen Formen zwar den wirksamen Bestandtheil hat, aber mit einer Menge inactiver Stoffe verbunden; dieser Uebelstand trifft aber nur bei mehreren andern älteren Zubereitungen ein, sondern läßt sich durch Vermehrung der Dosis auch beseitigen.

Dagegen sind augenscheinliche Vortheile unserer neuen Arzneiform, daß diese Substanz keiner vortheiligen Austrocknung unterworfen zu werden braucht, durch sie in Farbe, Geruch, Geschmack und Bestandtheilen mehr oder minder verändert wird; daß Alkohol, Aether, Wein und ähnliche Vehikula, deren medicinische Eigenschaften denen der Substanz, mit welcher sie in Berührung gebracht werden, oft ganz entgegen gesetzt sind, durchaus vermieden werden können; die Veränderungen, die schon während eines Jahres in Extracten, Pulpen u. s. w. erleiden, durch diese Conserven, die ich nach zweijähriger Aufbewahrung ganz unverändert finde, völlig beseitigt werden, und diese stets nicht nur in ihren chemischen und physikalischen, sondern auch in ihren medicinischen Charakteren identisch sind. (*Journ. de Pharm.* XXIV, 476. Aus



## Syrupus Chinae.

**D**er neue franz. Codex schreibt vor 96 Grm. (3 Unzen) graue China eine halbe Stunde mit 1000 Grm. (2 Pfund) Wasser in einem bedeckten Gefäße kochen zu la

zu coliren, das trübe Decoct bis zur Hälfte seines Volums einzuengen, hierauf 500 Grm. (1 Pfd.) Zuckerzusetzen, das Ganze zur Syrupsconsistenz zu bringen und nach Erkalten zu filtriren. Apotheker Ducosté-Diré zu Elbeuf schlägt dagegen vor, das Chinadecoct weit zu verdunsten, daß nur die zur Umwandlung des Zuckers in Syrup nöthige Menge zurückbleibt, dann das erhaltene Decoct zu filtriren, und mit dem Zucker durch Erhitzen zu Syrup zu machen. (*Journ. de Chim. med. 2. Ser. IV, 241.*)

---

## *Syrupus cortic. rad. Granati.*

---

Zu diesem Syrup giebt Apotheker Mouchon zu Lyon folgende Vorschrift: 8 Unzen gröblich gepulverte Granatwurzelrinde werden mit 3 Pfd. Wasser durch Macerirung ausgezogen. Man erhält ohngefähr 2 Pfd. Auszug, der mit 1 Pfd. *Syrup. Sacchari* bis zu 1 Pfd. eingekocht wird. 2 Unzen dieses Syrups enthalten soviel das Wirksame von einer Unze der Wurzel. Statt des Auszuges der Wurzel kann man auch 2 Unzen des rectificirten Extracts der Wurzel auf 1 Pfd. *Syrup. Sacchari* nehmen. (*Journ. de Chim. med. 2. Ser. V, 173.*)

---



## Fünfte Abtheilung.

**Allgemeiner Anzeiger.****I. Anzeiger der Vereinszeitung.****Notizen aus der Generalcorrespondenz des Directoriums.**

Hr. Vicedirector Dr. Meurer: Ueber Angelegenheiten Vereins im Königreich Sachsen. — Hr. Vicedir. Sehlme Ueber Ausbreitung des Vereins in der Rheingegend. — Hr. rector Dr. Aschoff: Die Bücher für den Lesezirkel betreffend. — Hr. Dr. Herberger: Ueber Angelegenheiten des südschen Apothekervereins. — Die Herren Vicedirectoren Dr. L. zog und Bolle: Die Gehülfen-Unterstützungskasse und kauf der auscirculirten Bücher betreffend. — Die Herren Vicedirectoren Schmithals, Müller, Rammstädt, Postl Ueber Angelegenheiten ihrer Kreise und Verkauf der auscirculirten Bücher. — Hr. Dr. Geiseler: Ueber die nächste Generalversammlung. — Hr. Vicedirector Dr. Bley: Ueber selben Gegenstand und den Lesezirkel. — Hr. Hofapoth. Hübler: Annahme des Kreisdirectoriums für den Kreis A. burg. — Hr. Vicedirector Dreykorn: Ueber den Kreis A. burg und Saalfeld. — Hr. Rath und Ritter Dr. Siller in tersburg: Beiträge zum Vereinskapi tal. — Hr. Vicedir. Klö. Herstellung der Lesezirkel in den Kreisen Mühlheim Xanten. — Hr. Prof. Göppert und Hr. Dr. Duflos: U Begründung des Vereins in Schlesien. — Hr. Vicedirector W. Bucholz: Ueber Angelegenheiten seines Kreises. — Director Overbeck und Dr. Aschoff: Ueber die nächste Directorialconferenz.

Unterstützungsgesuch von Hrn. Prediger Todt in Möd für den invaliden Gehülfen Pollnow in Lenzen.

Dankschreiben für die Ehrenmitgliedschaft des Vereins: von Hrn. Geh. Medicinalrath Dr. Kothe in Berlin.

Beiträge zum Archiv gingen ein: von Hrn. Prof. Göpp in Breslau, von Hrn. Apotheker Lichtenstein in Helms.

**Handelsnotizen.**

*Amsterdam.* Kaffee, ord. Cheribon am 10. März 30 Cs., wenig Umsatz, Lumpen 34 — 38 fl., Muskatnüsse 210 Cs., 62 Cs., Pfeffer 25 Cs., Piment, Jamaica 22 fl., Südseethran 27.

*Berlin.* Die Preise von Spiritus sind merklich herun gegangen.

*Hamburg,* Anfangs März. Unsere Vorräthe von Pugl. villa- und Messina-Baumöl mögen zusammen nur noch 500 betragen. Pugl. 32½ — 33 Mk. Palmöl läßt sich noch zu 30

Gen. *Caroliner Reis* wurden 1200 Tonnen direct eingeführt. Gesamt-vorrath von den Nebensorten ist auf 8000 Säcke eingeschlagen, 10 — 11 Mk.

— den 10. März. *Cocosöl* ist beinahe geräumt, 31 Mk. Leinöl 23 Mk. Neuer *Caroliner Reis* 200 Tonnen zu 14 $\frac{3}{4}$  — 15 $\frac{1}{2}$  Mk. In Januar und Februar wurden eingeführt: *Cacao* 243 Säcke, Pfeffer 14,527 Säcke, 53 Ballen und 85 Fässer, *Canel* 1 Colli Ballen, *Cassia* 609 Kisten, *Flor. Cassiae* 13 Kisten, *Cassia lignea* 1 Kisten, *Feigen* 525 Körbe, 592 Trommeln, 50 Kisten, 12 Pack, Anis 18 Säcke, *Indigo* 495 Kisten, 80 Seronen, 1 Fafs, 1 Korb, Pfeffer 230 Säcke, 54 Bund, *Kümmel* 73 Säcke, 21 Ballen, 4 Fässer, *Labritzen* 100 Kisten, *Macis* 2 Fässer, *Muskatnüsse* 1 Fafs, Pfeffer 1 Fafs, *Pfeffer* 1518 Säcke, *Nelkenpfeffer* 516 Säcke, *Potamo* 76 Fässer, *Sagó* 86 Kisten, 45 Fässer, *Salpeter* 10 Säcke, *Tea*, *Thee* 780 Kisten, 13 Pack, *Talg* 21 Fässer, *Weinstein* 1 Fasser, *Zinn* 3091 Platten.

— Da die letzten Vorräthe guter *Para-Cacao* zu 4 $\frac{1}{2}$  fl. verkauft und bereits mehrere Bestellungen auf die neuen Zufuhren abgegeben, so kann der Preis guter Qualität etwas höher gehen. Pfeffer: von der neuen Zufuhr aus Rio wurden bereits 1000 Säcke 4 fl. verkauft.

— Mit *Palmöl* wurde es Ende März fester, für 150,000 Pfd. loco wurden 23 $\frac{1}{4}$  Mk. bewilligt, schwimmende Parthien zu 23 Mk. vergeblich gesucht.

*Leipzig*, Anfangs März. Die eingetretene starke Kälte hat die Steigen der Oelgewächse bewirkt. *Rüböl* 11 Thlr., *Leinöl* 11 Thlr., *Mohnöl* 20 Thlr.

— *Rüböl* ist in Folge der Witterung schon zu 11 $\frac{3}{4}$  Thlr. gefallen, *Leinöl* auf 11 $\frac{1}{4}$ , *Mohnöl* 20 $\frac{3}{4}$  Thlr.

— den 12. März. Unsere Gegend hat noch ziemlich Vorrath von *Rüböl*, über den Staud der Oelfrüchte läßt sich noch nichts Bestimmtes sagen. *Baumöl* wenig Vorrath, *Leinöl* 11 $\frac{1}{4}$  Thlr., *Mohnöl* 21 $\frac{1}{4}$  Thlr., *Südseethran* 9 $\frac{1}{4}$  Thlr.

*London*, Ende Februars. In der beendeten Theeauction von 2,000 Colli oder 7,000,000 Pfd. wurden 2,000,000 Pfd. wirklich verkauft. Die Preise von *Zucker* haben sich behauptet; trockne Thee ostind. wurden selbst 6 d. theurer bezahlt.

— den 6. März. 608 S. *Calcutta-Salpeter* gingen in heutiger Auction zu einem Werth von 25 sh. — 25 sh. 6 d. *Cassia* waren sehr gesucht zu 80 — 82 sh. für geringe und Mittelquantitäten. *Spanisches Zinn* 75 — 76 sh. *Bancazinn* 80 sh. *Spanisches Blei* 17 Pfd. 12 — 15 sh.

— den 10. März schlossen die Theepreise: ord. *Tonkay* 1 sh. 7 d., ord. *Congo* 2 sh. 9 $\frac{1}{2}$  d., comp. *Congo* 2 sh. 11 $\frac{1}{2}$  d.

— In der am 16. März begonnenen Auction von *Thee* zeigte sich verminderte Kauflust; von 9700 Colli wurden nur 1200 verkauft, fast ausschließlich grüne Sorten. *Tonkay* 5 — 6 d., *Imperial* 6 d., *Gunpowder* 4 d., *Haysan* 4 — 5 d. niedriger als in der Februar-Auction. Auch die schwarzen Sorten wurden zu geringern Preis losgeschlagen. *Congo* 5 — 6 d. wohlfeiler. In der Auction am 17. März kamen 23,000 Colli vor, nur 3100 wurden wirklich verkauft.

*Napel*. Der König soll das Decret wegen Auflösung des *Schiffmonopols* in *Sicilien* unterzeichnet und den Staatsrath

bereits beauftragt haben, die von der Regierung der Compagnie zuzugestehende Entschädigungssumme zu bestimmen.

— Die Oelpreise im März sollen sehr veränderlich sein. 24 Stunden oft um 50 Grana bis 1 Ducati. *Gallipoliöl* 25 90 Gr. pro Salme.

*Smyrna.* Ende Februars ist unser Vorrath von rothen Wein, 100,000 Cantari, nach London und dem Norden verladen.

*Stettin,* Anfangs März. *Rüböl* augenblicklich 10½ Thlr. 1 9½ Thlr. *Gallipoli-Baumöl* unverst. 7 Thlr., *Palmöl* 14 Thlr.

## Bemerkungen über die Etiketten an Standgefäßen vom Apotheker *Baldenius* in Dessau.

Nicht jeder Apotheker ist mit Glücksgütern gesegnet, allen Anforderungen, die von den Medicinalbehörden, rücksichtlich der Einrichtung und der äußern Eleganz ihrer Apotheken Vorrathskammern und Kellern gemacht werden, zu genügen. Als kostspielige Sache führe ich nur an die verschiedenen Standgefäße alle mit Schildern und Signaturen zu versehen und zu erhalten. Am häufigsten findet man in den Apotheken Schilder von Oelfarbe und mit solcher Farbe beschrieben, welche, wenn sie mit einem guten Lack überzogen worden sind, geraume Zeit halten; allein dies gilt doch nur bei minder sauren und trocknen Sachen; für Mineralsäuren und alkalische Flüssigkeiten dauern solche Schilder nicht lange und mir ist keine Art von Lack bekannt, der diesen widerstanden hätte.

Am meisten sind die Oelschilder der Zerstörung in Kellern, wo sie den Mineralsäuren nahe stehn, ausgesetzt; die Ausdünstung der Säuren und die Kellerfeuchtigkeit haben auf einen großen Einfluß. Da die ordinären Mineralsäuren gewöhnlich in großen Steinkruken oder Ballons vorrätig gehalten werden, so konnte ich die Schilder daran nie lange erhalten, und selten hielten sie länger als ein Jahr aus. Schilder von Eisenblech mit Oel bemalt hielten eben nicht länger, wenn sie an den Flaschen aufgehängt wurden, dabei noch das Lästliche, daß der Messing- oder Eisendrath, womit das Schild befestigt ist, sehr bald zerfressen oder oxydirt ward. Platindrath ist wohl practischer anzuwenden, aber die Ausgabe für manche viel zu groß. Deshalb habe ich nun seit einigen Jahren kleine Bretterchen von leichtem Holze lackirt und mit Oelfarbe bemalt an die Mineralsäuren im Keller befestigt, und zwar mit Schnüren von *Resina elastica*, welche dem Endzweck ganz entsprechen; diese Bretterschilder sind seit 2 Jahren an den Standgefäßen der scharfen Säuren befestigt gewesen und sowohl die Bretter als die Cautschukschnüre sind noch in ganz gutem Zustande. Als Lacküberzug über die Schrift der Schilder habe ich fetten Copalfirniss am dauerhaftesten gefunden.

Ein ähnlicher Uebelstand findet bei den Tecturen der Standgefäße in den Kellern statt; hier hat man nun neuerdings Cautschukleinwand als am zweckmäßigsten und am haltbarsten gefunden.

pfahlen, diese soll mit einem Firnifs aus Cautschuk  
 en werden, dadurch wasserdicht, gemacht würde sie  
 l der Feuchtigkeit im Keller am besten widerstehen.  
 un die Zubereitung eines solchen Cautschukfirnifs bis  
 h nicht gelungen und wenn ich von irgend einem  
 legen in diesem Blatte darüber Auskunft erhalten  
 ürde ich solches mit Dank annehmen.

### Miscellen.

von *Polygonum tinctorium*. Der landwirthschaftliche  
 i Heidelberg hat auf seinem Musterfelde im vorigen  
 reuche mit dem Anbau von *Polygonum tinctorium* ge-  
 Die Pflanze zeigte ein gutes Gedeihen und lieferte einen  
 indischen gleichen Indigo. Bei einer frühen Aussaat  
 auf jährlich drei Ernten rechnen. Der Centner Blät-  
 1 — 2½ Pfd. Indigo liefern.

von Zuckerrohr auf Ceylon. Der Aufseher des botani-  
 tens in Paradinia hat viele Anfragen wegen des Zucker-  
 i Mauritius und Bitten um Proben davon erhalten. Die  
 machten Versuche in mehren Theilen der Insel sind  
 lungen. Der Arbeitslohn auf Ceylon ist weit niedriger  
 mauritius, und man kann von der Küste von Malabar zu  
 it so viele Arbeiter erhalten, als man nur haben will.

Theeplantzungen in Ostindien. Bei den jetzigen Ver-  
 in Englands mit China werden die Theedistricte in As-  
 steigender Bedeutung. Die fünf Theegärten, welche  
 Agent der Compagnie in Assam betreibt, lieferten 1838  
 i vorigen Jahre 53 Ctr. Thee. Im laufenden Jahre sol-  
 ie Gärten angelegt werden, und rechnet man auf 130  
 g. Die Kosten der Agentschaft belaufen sich auf 15,000  
 jährlich, so daß das Pfd. 2½ sh. käme. Nach einer de-  
 Berechnung der Kosten sollen 36,000 Pfd. jährlich  
 ipien kosten (incl. der Fracht nach London), wonach  
 Verkaufspreise zu 2 sh. per Pfd. ein Gewinn von 47,000  
 brig bleibe. Sollte das Resultat auch nicht so günstig  
 ann jedenfalls der Assam-Thee mit dem chinesischen  
 en. Die Theedistricte sind unermesslich und erstrecken  
 allen Seiten über die Waldgegenden der wilden Stämme  
 China und ins birmanische Gebiet; es würde nur nö-  
 die Sicherheit der Einwanderer gegen die Einfälle  
 rischen Stämme in Süden und Osten durch einige mi-  
 i Posten zu schützen.

Theeconsum in England wird auf 36 — 38 Mill. Pfd. jähr-  
 schlagen.

der *Madia sativa*. Die Versuche des Amtsraths Kopp e  
 omaine Wollup in Schlesien über den Anbau der *Ma-*  
 haben folgende befriedigende Resultate gegeben: a) auf  
 en mittler Güte, b) auf Bruchboden geringer Art, c) auf  
 estenland 2r Klasse, d) auf Höhe - Geestenland 1r Klasse.  
 13. Morgen gab:



| auf | Aussaat                      | Körnerertrag        | Oelertrag |
|-----|------------------------------|---------------------|-----------|
| a)  | 1 Pfd. 22 $\frac{1}{4}$ Loth | 575 Pfd.            | 156 Pfd.  |
| b)  | 4 „ 16 „                     | 247 $\frac{1}{4}$ „ | 86 „      |
| c)  |                              | 636 „               | 174 „     |
| d)  | 3 „ — „                      | 540 „               | 150 „     |

### Anzeige.

Von meinem Versuche einer Würdigung der Chemie Pharmacie auf ihren jetzigen Standpuncten oder Beleuchtung der Frage:

»Was haben diese Wissenschaften seit Ende des 18. Jahrhunderts geleistet? Zugleich als Beitrag zur Geschichte d. Wissenschaften.« Oder: »Fortschritte und neue Entdeckungen im Gebiete der Chemie und Pharmacie, so wie ihrer Hilfswissenschaften.«

sind bei Hrn. C. A. K ü m m e l in Halle 2 Bände erschienen, welche die Entdeckungen und Fortschritte in jenen Wissenschaften seit Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Jahre 1840 umfassen. Gegen meinen Wunsch und ohne meine Schuld ist der Druck ungemein langsam vorgeschritten. Ich halte mich indess den resp. Käufern des Werks zur Fortsetzung und möglichst zur Vollendung verpflichtet und habe nicht allein den 3. Band im Manuscripte zum Druck vollendet liegen, sondern auch die Bearbeitung des 4. und 5. Bandes bereits vorgenommen. Dieselbe ist ziemlich weit gediehen und ich bin gerne bereit, die Fortsetzung schneller, wie bisher zu fördern, was sich durch Hinzutritt neuer Abnehmer meine Unternehmung einer weitem Unterstützung zu erfreuen haben sollte. Ich ersuche daher diejenigen, welche sich für dieses Werk interessieren, ein, die Bestellung darauf bei Hrn. Buchhändler K ü m m e l in Halle, der Grünig'schen Buchhandlung in Bernburg oder mir durch ihre resp. Buchhandlungen oder unmittelbar frankirten Briefen zu machen.

Dr. L. F. Bley in Bernburg

### Kauf- und Verkaufsanzeigen.

Ein mit den besten Zeugnissen versehener, practisch theoretisch gebildeter Apotheker, der jetzt im Königreich Sachsen als Kaufmann mit seiner starken Familie sich nur kümmerlich durchschleppt, wünscht sehnlichst einen andern Wirkungskreis, d. h. als Apotheker. Er hat über circa 3000 Thlr. verfügen und bittet, daß Collegien, die nicht bloß aus Gewinnsucht verkaufen, beim Verkauf ihrer Apotheken, ihn berufen möchten. Auch er bietet sich derselbe, Vegetabilien, welche Gebirge wachsen, z. B. Arnica etc., auf Bestellungen zu sammeln, so wie auch mechanische oder andere Präparate, z. B. *Candelae fumal.* zu fertigen. — Nähere Auskunft ertheilt Dr. Friedrich Meurer, Vorsteher der Marien-Apotheke in Dresden.



Nachstehende Waaren, die zu den beigefügten Preisen von Hrn. Apotheker C. Huguenel in Frankfurt a. d. Oder beziehen sind, kann ich als sehr preiswürdig empfehlen:

*Acid. nitric.* 3 $\frac{3}{4}$  Sgr., *Acid. tartaric.* 19 Sgr., *Aloe lucida* 10 Sgr., *am. murial. aeg.* 8 $\frac{1}{2}$  Sgr., *Antimon. crud.* 13 Thlr., *Bals. in-* 56 Sgr., *Borax* 9 $\frac{1}{2}$  Sgr., *Camphora* 67 $\frac{1}{2}$  Sgr., *Castor. sibi-* 15 Thlr., *Chinin. sulphur.* 54 Thlr., *Coccionella* 2 $\frac{3}{4}$  Thlr., *Co-* 25 Sgr., *Cort. Aurant.* 13 $\frac{1}{2}$  Thlr., *Cort. Cascarill.* 23 Thlr., *Crystalli Tart.* 29 Thlr., *Cubebae* 10 Sgr., *Flor. Acaciae* 5 $\frac{1}{2}$  Sgr., *Flor. Lavendul.* 9 $\frac{1}{2}$  Thlr., *Malv. arbor.* 8 Sgr., *Flor. Malv. vulg.* 9 $\frac{1}{2}$  Sgr., *Flor. Pae-* 5 Sgr., *Flor. Rhoeados* 13 Sgr., *Flor. Tiliae* 5 Sgr., *Gutti* 37 Sgr., *Hb. arabic. alb.* 14 Sgr., *Hb. Centaur. min.* 7 Thlr., *Hb. Far-* 6 Thlr., *Hb. Melissa* 7 Sgr., *Hb. Menth. crisp.* 15 $\frac{1}{2}$  Thlr., *Hb. pip.* 18 Thlr., *Hydrargyr.* 43 Sgr., *Jod.* 4 Thlr., *Sulphuric.* 10 Thlr., *Macis* 40 Sgr., *Magnes. carb.* 11 Sgr., *Nuc. Vomicae* 2 $\frac{1}{2}$  Sgr., *Ol. Lavend.* 41 Sgr., *Ol. Philosop.* 6 $\frac{1}{4}$  Sgr., *Ol. Ricini* 11 $\frac{1}{2}$  Sgr., *Rad. Alth.* 12 $\frac{3}{4}$  Thlr., *Rad. Angel.* 13 $\frac{1}{2}$  Thlr., *Rad. Sarcocodan.* 22 Sgr., *Rad. Rhei. ind. opt.* 3 $\frac{3}{4}$  Thlr., *Rad. Sars-* 24 $\frac{1}{2}$  Sgr., *Sem. Cinae levant.* 8 Sgr., *Sem. Lycopo-* 25 Sgr., *Sem. Sinapeos* 10 Thlr., *Sulphur. dep.* 7 $\frac{3}{4}$  Thlr., *Sem. Ullat.* 14 Sgr., *Vanill.* 24 Thlr.

Sauzigberg i. d. Neumark, den 21. März 1840.

Dr. Geiseler.

Seit 14 Jahren liefere ich schön und sauber gearbeitete Ahorn-Büchsen in jeder beliebigen Form, so auch Zahnpulverdosen und kleine Büchsen von Ahornholz für Mineralien- und Dro-Genussmahlungen mit Zufriedenheit der Herren Abnehmer.

Denjenigen Herren Collegen, welche sich mit diesen Gegenständen versehen wollen, ersuche ich ergebenst um Ertheilung von Aufträgen.

Winterberg im Kreise Brilon,  
im März 1840.

Der Apotheker  
Franz Röseler.

Bemerkung. Die Gefäße, die Hr. Röseler liefert, sind in geschmackvoller wie in solider Arbeit so ausgezeichnet, wie man es nur wünschen kann, und haben ihren Ruf vollkommen bewährt.

Brandes.

Butteröther zur Darstellung des künstlichen Rums ist in billigen Preisen zu haben bei

Dr. Bley in Bernburg.

Unterzeichneter ist beauftragt, ein vollständiges Exemplar von Düsseldorf's Pflanzenabbildungen zu 50 Thlr. (kostet über 100 Thlr.) und ein vollständiges Exemplar von Goebel's Waarenkunde mit illuminirten Kupfern zu 10 Thlr. zu verkaufen. Beide sind sehr gut erhalten, und wird nach Entrichtung des Betrags die Absendung sogleich besorgt werden.

Braunschweig.

Dr. C. Herzog.

Von Poggendorff's Annalen für Physik und Chemie die Jahrgänge 1831, 1832, 1833 und 1834, gut erhalten, zum Preise abzulassen bei

Dr. Bley in Bernburg.

### Dienstgesuche.

Ein durch gute Zeugnisse empfohlener junger Mann sogleich oder Johanni ein Provisorat oder eine Gehülfe übernehmen. Gefällige Anfragen wird Hr. Apotheker Wehren in Duderstadt besorgen.

Ich muß hierbei bemerken, daß der anfragende junge seit mehreren Jahren der Administration einer Apotheke als visor vorgestanden hat und darüber die besten Zeugnisse weissen kann.

Br.

## II. Anzeiger der Verlagshandlung.

(Inserate werden mit 1½ Ggr. pro Zeile mit Petitschrift, oder für den Raum derselben, berechnet.)

Bei Fr. Mauke in Jena ist so eben erschienen und in jeder handlung zu haben:

### **P i n a k o t h e k**

der

**d e u t s c h e n G i f t g e w ä c h s e**  
für Botaniker, Pharmaceuten, Droguisten, so  
zum Schulgebrauch.

In naturgetreuen colorirten Abbildungen  
h e r a u s g e g e b e n

von

**Dr. Joh. Günther und Fr. Bertuch.**

1ste Lieferung.

gr. 4. geh. Preis à Liefer. 12 Ggr. (Das Ganze wird 8 bis 10  
rungen geben.)

Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung ist so eben erschienen

### **N e u e A r z n e i - T a x e**

für

**d a s K ö n i g r e i c h H a n n o v e r**  
vom 1. April 1840.

gr. 8. geheftet 4 Ggr.



5. Vereinsjahr der Jussieu's. 1840.

**M a i.**

**ARCHIV**  
**DER PHARMACIE,**  
eine Zeitschrift  
des  
Apotheker-Vereins in Norddeutschland.

Reihe. Zweiundzwanzigsten Bandes zweites Heft.

Erste Abtheilung.

**Vereinszeitung,**

redigirt vom Directorio des Vereins.

*1) Vereinsangelegenheiten.*

Generalconferenz zu Herford am 2. April 1840.

Es wurden vorgelegt ein Schreiben Königl. Sächsischen Medicinarius des Innern über die beifällige Anerkennung, und ein gleiches Schreiben Herzogl. Anhaltischer Commission in Dessau.

Von dem Hrn. Vicedirector Dr. Meurer in Dresden Theilung der dem Vereine bis jetzt zugetretenen Apotheken im Königreich Sachsen, in 6 Kreise, wurde beschlossen.

Die Verhandlungen über die Bildung eines neuen Kreisapothekenthums Altenburg wurden vorgelegt und dieser Kreis Directorium Weimar zugetheilt.

Die Statuten des Vereins wurden behufs der neuen Aufstellung revidirt, und die berathenen Veränderungen vor-

getragen. Dem Director der Kasse wurde die Revision der Rechnung und der Controle der Generalkasse vom 1. Quart. beauftragt.

6) Von der Verwaltungscommission des Vereinskapitals die Revision der Rechnungsführung und Controlle dieses als vorgenommen, und zugleich die Ausleihung einiger Capitale bewirkt.

7) Der Oberdirector übergab der Gehülfen-Unterstützungskasse mehre Beiträge von den Herren Apothekern in Magdeburg und mehren Herren Gehülfen in Hamburg.

8) Namens der Buchholz-Gehlen-Trommsdorffschen Stiftung wurden für dieses Jahr wiederum weitere Pensionen an invalide verarmte Gehülfen bewilligt, namentlich an die Herren: Carl Mehl in Rossenfelde, Karbe in Königsberg in der Neustadt, Schiffer in Essen a. d. Ruhr, Croweke in Slawe, K. Höxter, Pollnow in Lenzen. Den Herren W. Drees in Berlin und Martin in Brakel wurden, nach Prüfung der falls erforderlichen obrigkeitlichen und sonstigen Atteste, Unterstützungen aus der Stiftung bewilligt.

Der Oberdirector: R. Brandes.

Die Directoren: Dr. E. F. Aschoff. Overbeck. W. ...

Die Assessoren: L. Aschoff. Faber.

## Hohes Wohlwollen für den Verein.

(Fortsetzung von S. 9.)

### XIII.

Hochwohlgeborner,

Insonders zu verehrender Hr. Hof- und Medicin

Auf Ew. Hochwohlgeboren an die hiesige Herzogl. Landesregierung gerichtetes verehrliches Schreiben vom 30. Jan. 1851, welches an die hiesige Herzogl. Cammer abgegeben und dieser Behörde nebst den beige-schlossenen Anfügen an uns mitgeteilt wurde, beehren wir uns in ganz ergebenster Antwort zu erwiedern, daß es uns stets zum Vergnügen gereicht hat, die eben so rühmliche als zweckmäßige Tendenz des verehrlichen würdigen norddeutschen Apothekervereins nach Kräften zu fördern, damit die bei der Begründung desselben beabsichtigte schönen Zwecke erreicht, dessen rastlose Thätigkeit in gemeinnütziges Wirken möglichst unterstützt werden. In diesen Beziehungen haben wir Gelegenheit genommen, die Apotheker im hiesigen Herzogthume, welche dem Verein nicht beigetreten sein sollten, zu veranlassen, sich um Beitritt zu bemühen und an den Hrn. Kreisdirector Dr. ... zu Bernburg zu sich wenden.

Indem wir uns schliesslich erlauben, für die Bibliothek des geehrten Vereins und Ew. Hochwohlgeboren zwei Exemplare von unserer vor einigen Jahren neu erschienenen Taxe ganz ergebenst beizufügen, bitten wir übrigens die Versicherung der vorzüglichsten Hochachtung genehmigen zu

zu welcher wir uns beehren ganz gehorsamst zu unter-  
 zeichnen, den 17. Febr. 1840.

Herzogl. Anhalt. Medicinal-Commission.  
 Olberg. Zier. D. Schütz. Dr. Mann.

Hrn. Hof- und Medicinal-  
 Rath Dr. Brandes zu  
 Salzuflen.

## Fortsetzung des Vereins und Eintritt neuer Mitglieder.

Da die Theilnahme und die erfreuliche Mitwirkung so  
 Collegen ist der Verein im Königreich Sachsen nicht  
 gegründet, sondern auch sehr bald zu einer geregelten  
 Form ausgebildet worden. Wir halten es für nothwen-  
 dig in nachstehender Uebersicht zur allgemeinen Kennt-  
 nissen, indem wir dabei die angenehme Pflicht erfül-  
 len Hr. Vicedirector Dr. Meurer, so wie den Herren  
 Rectoren und Hr. Collegen Bärwinkel, für ihre er-  
 zeigten Bemühungen für die Förderung der guten Sache den  
 besten Dank zu bringen.

### Altstadt Dresden.

Die Herren Apotheker:  
 C. in Dresden, Kreis d.,  
 S. in Dresden,  
 T. in Dresden,  
 R. in Pirna,  
 M. in Pottschappel,  
 H. in Haynichen,  
 G. in Dippoldiswalde,  
 F. in Freyberg,  
 K. in Freyberg,  
 L. in Tharand,  
 N. in Brand,  
 P. in Dohna,  
 Q. in Wilsdruff,  
 R. in Nossen,  
 S. in Hohenstein.

### Kreis Neustadt Dresden.

Die Herren Apotheker:  
 1) Dorn jun. in Dresd., Kreis d.,  
 2) Dr. Holl in Dresden,  
 3) Hederich in Moritzburg,  
 4) Springmühl in Meissen,  
 5) Schütz in Grossenhayn,  
 6) Vogel in Koetzschenbroda,  
 7) Adler in Riesa,  
 8) Dorn sen. in Dresden,  
 9) Hoffmann in Dresden,  
 10) Menzner in Pulsnitz,  
 11) Dammann in Radeberg,  
 12) Grosse in Dresden,  
 13) Dr. Struve in Dresden,  
 14) Hofap. Semmler in Dresd.,  
 15) Dr. med. Meurer in Dresd.,  
 Vicedirector.

### Kreis Leipzig.

Die Herren Apotheker:  
 A. in Leipzig, Kreis d.,  
 B. in Leipzig,  
 C. in Leipzig,  
 D. in Leipzig,  
 E. in Grimma,  
 F. in Nerchau,  
 G. in Pegau,  
 H. in Zwenckau,  
 I. in Dahlen,

### Leipzig-Erzgebirg. Kreis.

Die Herren Apotheker:  
 1) Kirsch in Penig, Kreis d.,  
 2) Strasser in Lengefeld,  
 3) Fischer in Colditz,  
 4) Töpfer in Zschopau,  
 5) Martius in Frankenberg,  
 6) Bruhm in Chemnitz,  
 7) Leubner in Wolkenstein,  
 8) Müller in Rotswein,  
 9) Heinze in Oederan,



- 10) Rouanet in Wermsdorf,
- 11) Arnold in Leisnig,
- 12) Bredemann in Borna,
- 13) Soernitz in Froburg,
- 14) Gelbrecht in Kohren,
- 15) Bandau in Strehla.

- 10) Gebauer in Döbe
- 11) Oertel in Gering
- 12) Schlegel in Mitw
- 13) Täschner in Wal
- 14) Fischer in Harth

### Lausitzer Kreis.

Die Herren Apotheker:

- 1) Päßler in Bautzen, Kreisd.,
- 2) Klinger in Camenz,
- 3) Neubert in Zittau,
- 4) Wolff in Neukirch,
- 5) Seele in Neusalze,
- 6) Leuthold in Bischoffswerda,
- 7) Klaucke in Bautzen,
- 8) Jaessing in Bautzen,
- 9) Just in Herrenhut,
- 10) Hennig in Weissenberg,
- 11) Schönfelder in Bernstadt,
- 12) Erselius in Gr. Schöna,
- 13) Semmt in Neugersdorf,
- 14) Otto in Reichenau.

### Voigtländischer Kreis.

Die Herren Apotheker:

- 1) Goebel in Plauen,
- 2) Bauer in Oelsnitz,
- 3) Hüne in Reichenb.
- 4) Carl in Mylau,
- 5) Pinther in Adorf,
- 6) Borott in Lengfeld
- 7) Schwabe in Auerb.
- 8) Schmidt in Mühlb.
- 9) Braecklein in Tr.
- 10) Etzrodt in Pausa.

Ein neuer Kreis des Vereins hat sich durch die erfreulichen Bemühungen des Hrn. Hofapothekers Hübler in Altenburg bildet. Hr. Vicedirector Dreykorn hat dazu seine Mithilfe geboten und ist der neue Kreis als Kreis Altenburg in das directorium Weimar aufgenommen und Hr. Hofapotheker Hübler zum Kreisdirector erwählt worden. Die Mitglieder des Kreises sind:

- Hr. Hofapotheker Hübler in Altenburg, Kreisdirector
- » Stadtapotheker Baumann in Altenburg,
  - » Apotheker Dr. Wiedmeyer in Ronneburg,
  - » » Böttcher in Meuselwitz,
  - » » Hennig in Lucka,
  - » » Illgen in Gößnitz,
  - » » Kirmse in Schmöllo,
  - » » Grau in Orlamünde,
  - » » Wolff in Ulstädt.

Zu dem Kreise Altenburg sind noch folgende Collegen aus dem Altenburgischen, die bisher im Kreise Jena waren, getreten: Hr. Hofapotheker Waibezahl in Eisenberg, Hr. Apotheker König und Hr. Apotheker Schröter in Caha und Hr. Apotheker Löwel in Roda.

Hr. Apotheker Vahle in Paderborn ist, nach Ansuchen durch Hrn. Kreisdirector Müller, als wirkliches Mitglied des Vereins in den Kreis Paderborn aufgenommen worden.

Desgl. Hr. Hofapotheker Benecken, nach Anmeldung durch Hrn. Kreisdirector, Commissionsrath Rammstedt, in den Kreis Sondershausen.

Desgl. Hr. Apotheker Schnapp in Calcar, nach Anmeldung durch Hrn. Kreisdirector Schmithals, in den Kreis Xanten.

ogl. Hr. Apotheker Woitke in Mullrose, nach Anmel-  
durch Hrn. Kreisdirector Dr. Geiseler, in den Kreis Königs-  
L. d. Neumark.

ogl. Hr. Apotheker Henning in Sternberg, nach Anmel-  
durch Hrn. Vicedirector Bolle und Hrn. Kreisdirector  
, in den Kreis Arnswalde.

ogl. Hr. Apotheker Beneckendorff in Werder, nach  
durch Hrn. Kreisdirector Menzel, in den Kreis

### Der Oberdirector des Vereins. Brandes.

### Aufforderung in Bezug auf die nöthige neue Auflage der Statuen des Vereins.

Die Besorgung einer neuen Auflage der Statuten  
des großen Zuwachses des Vereins, dringend nö-  
thig geworden ist, so werden, nach Beschlufs der Directorial-  
versammlung vom 10. Febr. d. J., alle Mitglieder, welche zur Ver-  
antwortung derselben Vorschläge und Anträge zu machen  
sollen, ersucht, solche auf dem in der Vereinszeitung (2. R.  
XII, 250) angegebenen Wege uns *baldigst* mitzutheilen.

Brandes.

### Vereinskapi tal.

Beiträge zum Vereinskapi tal gingen ein von Hrn. Kreisphy-  
Dr. Wittzack in Templin.

Die Verwaltung des Vereinskapi tals.  
Brandes. Aschoff. Overbeck.

### Medicinalwesen und Medicinalpolizei.

### Land'sche Gesellschaft zur Unterstützung noth- leidender Aerzte und Wundärzte.

Nach dem so eben erschienenen »Neunten Jahresbericht der  
Land'schen Stiftung zur Unterstützung nothleidender (preuss.)  
Aerzte und Wundärzte« betrug die *Einnahme* im vorigen Jahre  
(nach den Zahlen) 3380 Thlr. an Beiträgen der den Verein bil-  
denden Aerzte und Wundärzte (worunter 111 Thlr. aus  
den Vermögensverhältnissen des zu P. Wartenberg verstorbenen Kreis-  
Dr. Hofrichter und 10 Thlr. jährlichen Beitrag des hie-  
sigen Buchhändlers Hrn. Hirschwald) und 1083 Thlr. an Zin-  
sen des Capitalvermögens, in Summa 4463 Thlr. *Ausgegeben*  
wurde im vorigen Jahre 2195 Thlr. zur Unterstützung von 53  
nothleidenden Aerzten und Wundärzten, so wie 362 Thlr. zur  
Deckung der Verwaltungskosten. Das Capitalvermögen ward  
um 100 Thlr. vermehrt und belief sich am Schluss des vori-  
gen Jahres auf 25,152 Thlr.

zur  
gen ward  
des vori-

|                       |           |           |              |       |
|-----------------------|-----------|-----------|--------------|-------|
| Aus Preussen          | kamen ein | 323 Thlr. | Dahin gingen | 150 T |
| » Brandenburg         | »         | 841       | »            | 480   |
| » Pommern             | »         | 255       | »            | 200   |
| » Schlesien           | »         | 611       | »            | 395   |
| » Posen               | »         | 154       | »            | 75    |
| » Sachsen             | »         | 423       | »            | 400   |
| » Westphalen          | »         | 245       | »            | 145   |
| » Rheinprovinz        | »         | 518       | »            | 350   |
| Betrag der Münze etc. |           | 10        |              |       |

Summa... 3380 Thlr.      Summa... 2195

Hierbei ist zu bemerken, dass aus dem Regierungsbezirk A ein dreijähriger und aus Trier ein zweijähriger Beitrag eingegangen war.

Bei der Kasse des »Vereins zur Unterstützung nothleidender Wittwen verstorbener Aerzte und Wundärzte« in Preussen lief sich die *Einnahme* des vorigen Jahrs auf 1557 Thlr., wovon 232 Thlr. Zinsen vom Capitalvermögen. *Ausgegeben* wurden 220 Thlr. zur Unterstützung von 6 Wittwen, und 11 Thlr. zur Bestreitung von Nebenkosten. Das Capitalvermögen vergrößerte sich um 1000 Thlr. und betrug Ende vorigen Jahrs 6413 Thlr. *Semper honos nomenque tuum laudesque manebunt.*

## Notiz über das Medicinalwesen in Russland

Das Ministerium des Innern wirkt fortdauernd thätig auf das öffentliche Gesundheitswohl. Vom Genuss des rohen Getreides *Hausen* hatten sich in einigen Gouvernements nachtheilige Folgen gezeigt, worauf sogleich die schon früher dargegebene Instruction durch Rückschreiben an die Civilgouvernements wiederholt wurde. Zur Abwendung nachtheiliger Folgen, welche der Genuss des aus *unreifem Korn* gebackenen Brodes, wie des Gemisches mit anderen nachtheiligen Gewächsen, erzeugt, wurde eine besondere, von einer eigenen Commission geprüfte, Instruction erlassen.

Im Jahr 1838 wurden im Reich 25 Privatapotheken begründet.

Was die Oekonomieverwaltung der medicamentlichen Vorräthe der chirurgischen Apparate, des Apothekergeräths für die Bedürfnisse der Armee, der Flotte, der Civilbehörden betrifft, so hat das Ministerium seine unablässige Fürsorge darauf gerichtet, die örtlicher Aufsicht über die Operationen der Kronapotheken ihrer Vorrathsmagazine möglichst zu verstärken. Zunächst zu dieser stetigen Inspection die beregten Medicinalexpeditionen in den Gouvernementsstädten verpflichtet, das Ministerium hat aber seit einiger Zeit die Bemerkung, dass diese bei ihren vielen anderen Berufspflichten dieser Beaufsichtigung nicht richtig nachkommen können. Es ist daher das Apothekenwesen den Gouvernements einer besondern Controleverwaltung anvertraut. Als vorläufigen Versuch hat man sie erst in den Städten Stawropol, Pätigorsk, Tiflis, Kiew, Orenburg, Wilna und Odessa über die dort befindlichen Apotheken eingeführt. Jeder

stehen Inspectoren und ihre Gehülfen vor; in Betreff auf Inspection der Kronapotheken sind sie ganz in die Rechte Medicinalexpeditionen getreten, welche jetzt dieser Verbindung entbunden sind. Der Provisionenankauf ausländischer Arzneimittel wird ausschließlich in Petersburg, nach Grundlage des höchst bestätigten Reglements, von einer besondern Commission, formirt aus Gliedern des medicinischen Conseils, bewirkt. Im Jahr 1838 belief sich die Zahl ihrer verschiedenen Gattungen auf 150, die Zahl der aus dem Vaterlande bezogenen Heilmittel auf 250. Hauptdepotörter für die letztern finden sich in St. Sankt Woronesch und Lubna.

Am 1. Januar 1839 erschienene Medicinalverzeichnis zeigt die Zahl der Aerzte auf 6380 an, die nur auf einen gewissen Theil der Heilkunde beschränkten, Oculisten, Dentisten, Geburtshelfer, auf 483. Die Zahl der Aerzte hat sich gegen das Verzeichniß des Jahrs 1837 um 380 vermehrt, die der Oculisten und Veterinärärzte um 15.

### medico-chirurgischen Akademien in Rußland.

Die drei im russischen Reiche bestehenden medico-chirurgischen Akademien zählten Anfangs 1839 1278 Studenten der Medicin. Im Laufe von 1838 waren aus ihnen 258 entlassen worden, von welchen 124 in Militär- und 17 in Civildiensten angestellt wurden. Im Laufe des Jahrs 1839 sind 269 in den verschiedenen medicinischen und pharmaceutischen Chargen beschäftigt.

### Zahl der Medicinalpersonen in London.

Im Jahr 1836 gab es in London 300 Aerzte, 580 Apotheker und 1180 Wundärzte.

### Medicinalwesen bei den Chinesen auf Java.

Auf Java leben über 80,000 Chinesen, in demselben streng geschlossenen Kastengeisse wie in ihrem Vaterlande. Die Apotheken derselben sind dem Aeufsern nach wie die europäischen eingerichtet, die chinesischen Etiketten vor den Standgefäßen und das große Bild des höchsten chinesischen Gottes mit Wachstafeln und mit Opferschalen auf einem davor stehenden Altare angebracht. Man ist indess sofort, daß man in einer chinesischen Officin sich befindet. Die Wissenschaft läßt dem chinesischen Arzt keinen Spielraum; es spricht sich auch hier die Starrheit aller ihrer Einrichtungen aus. Der medicinische Codex, der vor Jahrtausenden von dem Kaiser Sche-mong festgesetzt sein soll, bildet die strenge Richtschnur. Hat der Arzt danach gehandelt, so mag der Kranke genesen oder nicht, er ist ein guter Arzt, wenn er von jenen Vorschriften abweicht und der Kranke stirbt, macht er sich des Todes schuldig.

Die chinesische Medicin scheint mit der arabischen eine gewisse Aehnlichkeit zu besitzen. Es werden fünf Elemente an-

genommen, aus denen der Mensch bestehen soll, und die Harmonie Krankheit erzeugt, wie die Gesundheit das Gleichgewichts derselben ist. Die Zeichenlehre des Lebens und die Pulslehre ist bei ihnen sehr ausgedehnt, auch die Diät legen sie eine große Wichtigkeit.

### 3) Gelehrte Gesellschaften und Anstalten.

#### Akademie der Wissenschaften in Berlin

*Sitzung am 9. Jan. 1840.* Weiss: Ueber die Theorie der Sechsendsechskantner und Dreieunddreikantner, besonders die von Levy neu bestimmten Kalkspathflächen. — Mittheilung: Ueber den Zusammenhang der Krystallform mit der chemischen Zusammensetzung. — *Sitzung am 20. Febr.* Ueber die Harze.

#### Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin

*Sitzung am 19. Nov. 1839.* Hr. Prof. H. Rose: Ueber die Verknüpfung der Salze und das Knistersalz von Wieliczka. — Prof. G. Rose: Ueber eine Stufe von gediegenem Platin und eine von gediegenem Golde, von Hrn. Anat. Demidoff dem Königl. Mineralienkabinet geschenkt; das Platinstück wiegt 4 Pfd. 11½ Loth (Preuss.), das Gold 13½ Loth, beide aus den Seifenwerken von Nischnei-Tagilsk, der Besizer Hr. von Demidoff im Ural.

*Sitzung am 18. Febr. 1840.* Prof. Poggendorff: Ueber die Verzögerung der von Dr. Rieffs beobachteten Thatsache, über die Verzögerung elektrischer Entladungen durch Leiter neben dem Draht der Leidener Batterie. Giebt man einer solchen eine abgemessene Ladung und schließt sie durch einen Bogen, in welchem ein durch die Kugel eines Luftthermometer gehender Platindraht und eine auf Holz befestigte flache Spirale von 12 Fuß langem Kupferdraht eingeschaltet sind, so sieht man, daß die Erwärmung des Platindraths, welche bei der Entladung der Batterie eintritt, unverändert dieselbe ist, es mag die Spirale frei stehen, oder parallel neben ihr in geringem Abstande eine Kupferscheibe von 0,33 Linien Dicke oder eine Spirale von Kupferdraht geschlossen oder nicht, angeschlossen sein. Obwohl hierbei in dem Nebenleiter ein starker elektrischer Strom erregt wird, wie dies der glänzende Funke beweist, der zwischen den bis auf 0,2 Linien genähereten Enden der offenen Nebenspirale überspringt, so findet doch keine merkliche Wirkung auf den Hauptstrom statt. Hier war der Nebenleiter ein sehr guter, anders verhält es sich, wenn er ein schlechter Leiter ist als der Hauptleiter. Dann wird die Erwärmung im letztern vermindert. Gesetzt, die Erwärmung des Platindraths im Thermometer sei für eine bestimmte Ladung der Batterie, wenn die Hauptspirale allein



die ihr gegenüberstehende Nebenspirale durch Kupfer gelassen ward, gleich 100, so sinkt sie bei Schließung der Spirale durch einen 11 Zoll langen sehr dünnen Platinblech auf 74 bis 63, bei Schließung derselben durch einen 3 Fuß langen Neusilberdraht selbst auf 39, und ein Staniolblatt, der Spirale gegenübergestellt, vermindert die Erwärmung auf ein Blatt unächten Silberpapiers auf 44. Dr. Riefs schließt daraus: Wenn eine bestimmte Electricitätsmenge in der Batterie aufgehäuft und durch einen Draht entladen, in einem Nebendraht einen electrischen Strom erregt, so wird hierdurch die Electricitätsmenge weder vermindert noch vermehrt, es wird die Entladung verzögert, wenn der Nebendraht schlechterer Leiter ist, als der Hauptdraht, und zwar in dem Maße, als die Leitungsfähigkeit jenes Nebendrahts unvollkommen ist. — Link legte Abbildungen antherenartiger Körperchen dem Lichneen vor. Sie liegen mit den Samenschläuchen in der und derselben Frucht zusammen, unterscheiden sich aber dadurch, daß sie keinen Samen, sondern eine gleichmäßige körnige Masse enthalten. Er legte auch Abbildungen von solchen antherenartigen Körpern in den Farrnkräutern vor, zwischen den Früchten stehen, die zwar schon von mehreren beobachtet, aber noch nicht gehörig abgebildet sind. Ehrenberg theilte mit, daß der Oberförster Wache auf der durch das Grundwasser einer lange überschwemmt gewesenen Ackerfläche am Tscherschiner Damme eine aus Infusorien bestehende Masse Watte bemerkt, die zerfallend in eine netze spinnewebenartige Haut übergeht. Ferner, daß der im Hafen zu Wismar ausgebaggert wird, von  $\frac{1}{16}$  seines Volums aus Kieselpanzern von Infusorien aus der Masse der Baccillarien besteht.

### Verein für Erdkunde in Berlin.

Sitzung am 17. März. Hr. Mahlmann machte Mittheilung aus einem Schreiben des Bergwerkdirectors Degenhardt aus Marmato, Provinz Popayan, an v. Humboldt, die Bestätigung der Beobachtung, daß manche Erdbeben auf den Gehalt der Quellen in dortigen Gegenden einen nachtheiligen Einfluß haben; die Entdeckung großer Fußstritte von Vögeln, die bei Giva in der Provinz Socorro, im rothen Sandstein in einer Höhe von 500' gefunden.

### Gesellschaft der Wiener Aerzte.

In der Sitzung am 5. März zeigte Hr. Prof. v. Ettinghausen das Daguerre'sche Verfahren zur Erzeugung der Lichtbilder, und durch einen Versuch ferner, daß schon ein Zeitraum von fünf Minuten hinreicht, ein vollkommenes Lichtbild mittelst künstlichen Lichts zu erzeugen. \*) — Hr. Prof. Dr. Berger zeigte eine von ihm entworfene und von Plössl ausgeführte Vorrichtung zur öffentlichen Demonstration opaker Gegenstände, durch Auffassung des Lichtbildes auf einer weißen Wand; von

\*) Vergl. die Versuche von Gebauer u. Göppert, Bd. LXXI. S. 78 dieses Archivs und die folgende Abhandlung S. 133. Br.

Ettinghausen hofft auch diese Lichtbilder durch das Daguer-  
typ fixiren zu können. Das Lampenmikroskop tritt dadurch  
gewissermaassen veredelt wieder auf und wird in seiner neuen  
Umgestaltung statt magischer Unterhaltungen, mit dem Drum-  
mond'schen Lichte erleuchtet, nicht nur transparente und opake  
Gegenstände aus dem Gebiete der Naturwissenschaften darzu-  
stellen, sondern auch den Blick in das Innere der organischen  
Bilder schärfen.

### Die Gartenbaugesellschaft in Wien.

In der Sitzung am 8. Febr. wurde dem Gärtner Marc, b.  
Grafen v. Karoly, die große silberne Gesellschaftsmedaille  
theilt für eine der schönsten Entdeckungen in der Gartenkultur.  
Marc hat den Versuch gemacht, die *Petunia phoenicea* mit ihrer  
Abarten und *Petunia nyclaginiflora* auf *Nicotiana glauca* zu ver-  
edeln. Der Versuch ist über alle Erwartung gelungen; durch  
die glückliche Idee, eine der größten Zierden unserer Blumen-  
beete zum Baum zu erheben, hat Marc auf einem Stamme der  
*Nicotiana glauca* von 6 Fuß Höhe eine Krone erhalten, welche  
einen Durchmesser von 5 Fuß erreichte und mit tausenden  
Blumen bedeckt war.

### Physikalischer Verein in Frankfurt.

In einer der letzten Sitzungen theilte Kessler Gontz  
eine Entdeckung mit, die für die Kenntniss des Magnetismus  
von Interesse sein kann. Er hat entdeckt, daß durch strömende  
Electricität magnetisch gemachtes Eisen beim Trennen der Kette  
tönt, und zwar mehr oder weniger, je nach der Stärke der  
Erregung des Magnetismus angewandten galvanischen Batterien.

### Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.

Die Akademie hat kürzlich unter anderm auch eine botanische  
Sammlung angekauft, die Dr. Schimper in Abyssinien  
veranstaltete, und auf den Vorschlag von Trinius hat die Akade-  
mie auch drei Actien zu nehmen beschlossen, um an den  
Sammlungen sich zu betheiligen, die Kotschy in Sennaar und  
in Nigritien, und Wellwitsch auf den Inseln des grünen Ver-  
gebirgs und auf den Azoren veranstalten werden.

### Asiatische Gesellschaft in London.

Sitzung am 16. Nov. 1839. General Briggs: Ueber den  
Baumwollenhandel Indiens. Der General sucht zu beweisen, daß  
die Bewohner von Hindustan Europa eben so gut mit Baum-  
wolle zu versorgen vermöchten, wie die Nordamerikaner. Für  
jeder Theil der Bodenfläche Indiens eigne sich zum Anbau irgend  
einer Baumwollenart. Das Plateau von Dekkan, Ueberreste von  
Trappgebirgen, sei ganz besonders zum Anbau von *Gossypium*.

*bacum*, der eingebornen Baumwolle Indiens, geeignet, wo die Baumwolle von Amerika gar nicht passe; hieraus ergibt sich das Mislingen aller bisherigen Versuche, die amerikanische Baumwolle dort einheimisch zu machen. Der Boden für Cultur der amerikanischen Baumwolle in Indien sind die Gegenden, wo aber die einheimische Pflanze nicht gedeiht. Die amerikanische Baumwolle ist zwar von längerem Stapel, die indische aber bei weitem feiner. — In einer der letzten Sitzungen gab Solly Notizen über das *ostindische Opium*. Das nach England gesandte soll nicht so gut sein, als das für den chinesischen Markt bereitete, welches möglichst rein ist von erdigen und reinen Stoffen, und weniger Kautschuk und Leim enthält. Es giebt daher auch mehr an wässrigem Extract, dessen sich die Chinesen unter dem Namen *rauchbares Extract* sich zum Rauchen bedienen.

### Medicinisch - botanische Gesellschaft in London.

*Sitzung am 8. Jan.* Dr. Sigmond: Ueber den Opiumverbrauch in China. Die Ursache, warum die Chinesen das Opium rauchen und nicht essen, wie andere Orientalen, soll darin liegen, daß durch Rauchen die Berausung schneller erfolgt. Seit 1820 hat der Opiumverbrauch in China außerordentlich zugenommen. Von 1820 — 22 schätzte man die Anzahl der Opiumraucher auf 365,569, die jährlich 4287 Kisten verbrauchten. Von 1822 — 35 vermehrte sich die Zahl der Raucher auf 2,039,998, und der verbrauchten Kisten auf 12,339. Jetzt soll die Zahl der Opiumraucher in China auf 12 Millionen gestiegen sein. Man rechnet im Durchschnitt auf jeden täglich  $17\frac{1}{2}$  Gran. Die Regierung in Bengalen giebt vom Opiummonopol jährlich 901,293 £ Sterl.

### Britisches Museum.

Die Einnahmen des britischen Museums im Jahr 1839 betrugen mit Einschluss der Parlamentsbewilligungen von 21,000 Pfd. 3,775 Pfd., die Ausgaben 31,385 Pfd. Ausser obiger Bewilligung bewilligte das Parlament noch 1600 Pfd. für den Ankauf von Anastasy's ägyptischen Antiquitäten und 4212 Pfd. für Dr. Maitell's geolog. Sammlung. Die Zahl der Besucher des Museums betrug 1836: 383,147, 1839 aber weniger: 280,850.

### 4) Personalnotizen.

Am 16. Jan. wurde das funfzigjährige Doctorjubiläum des Hrn. Hofraths Dr. Heinecke in Bernburg festlich begangen. Von den vielen dem verehrten Jubilar zu diesem Feste gewordenen Ehrenerweisen wollen wir nur anführen, daß von Sr. Majestät dem Könige von Preussen demselben als frühern preuss. Medicinalbeamten in Halberstadt, der rothe Adlerorden 3r Klasse verliehen wurde; von Sr. Durchlaucht dem Herzoge von Bern-

burg ein schönes Geschenk, bestehend in zwei kostbaren Porcellanvasen; die Universität Halle hatte dem Jubilar ein erneuertes Doctordiplom übersandt, und von Hrn. Dr. Bley wurde derselben im Namen des Apothekervereins in Norddeutschland ein Ehrendiplom des Vereins und ein feierliches Glückwünschens schreiben überreicht. Möge der hochverdiente Jubilar noch lange segensreich fortwirken.

Der berühmte Mineralog an der Universität in Wien, Hr. Friedrich v. Mohs, starb zu Agordo, einem Marktflecken weit Belluno, und wurde am 1. Oct. 1839 daselbst begraben. Ein stattlicher Trauerzug folgte der Leiche, und in Ermangelung eines protestantischen Geistlichen begleitete der würdige Archidiaconus die Leiche. Vorher hielt Prof. Lavini eine Rede, welcher er die Verdienste des Verstorbenen hervorhob und aufrichtigste die erhabene Wahrheit allen Anwesenden ans Herz legte, daß in Wissenschaften und nützlichem Wirken ausgezeichnete, um die ganze Menschheit verdiente Männer, Staatsbürger jedes Landes sind, was für Länder, Gebräuche, Religionen und Sprache sie auch von ihrer Geburtsstätte scheiden.

Dr. Perier, der sich mit der Armee in Afrika befindet, hat der Akademie der Wissenschaften in Paris einen Plan zur Gründung eines botanischen Gartens in Algier vorgelegt; er beabsichtigt die China und manche andere exotische Medicinalpflanzen, wie Guajac, Jalape, Ipecacuanha, Manna, Opium, Kampher u. s. w. daselbst zu bauen.

Hr. Rufsegger ist von seinen dreijährigen Reisen in Afrika zurückgekehrt, und wird nun in seiner Heimath, Oestreich, die Früchte seiner Entdeckungen zum Druck vorbereiten. Von allen europäischen Reisenden ist er am weitesten in Afrika vordringen. Er ertrug eine Hitze von 50°, wo viele seiner Begleiter dahinstarben. Die Escorte, welche Mehemet Ali ihm bei seinem Vordringen ins Innere Afrikas mitgegeben, betrug ein tausend Mann, und mehr als ein Schirm müßte mit den Eingebornen statt finden, um weiter vordringen zu können. Gegenwärtig befindet sich Hr. Rufsegger mit Hrn. Oberberg rath Nöggerath von Bonn auf einer gemeinschaftlichen Reise in Paris.

Hr. Galle, Gehülfe auf der Sternwarte in Berlin, hat von des Königs von Preussen Majestät die große goldene Preisen daille erhalten, als Belohnung seiner so schnell auf einander folgenden Entdeckungen dreier Cometen.

Der Kaiserl. Königl. Rath, Feldstabsarzt und Professor Dr. Jäger in Wien hat von Sr. Majestät dem Könige von Preussen den rothen Adlerorden 3r Klasse erhalten.

Die Herren Dr. Lessing und Dr. Böhm in Berlin sind von der Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher zu Mitgliedern erwählt worden.

Hr. Hofrath und Baderarzt Dr. Prieger zu Kreuznach hat den belgischen Leopoldsorden erhalten.

Die schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur hat den Hofrath Dr. Brandes zum correspondirenden Mitgliede erwählt.

## Zweite Abtheilung.

**Physik.**

über die Fixirung mikroskopischer Licht-  
bilder mittelst des Hydro-Oxygengas-  
mikroskops;

von

**J. Gebauer,**

Director der Bau- und Kunstschule

und

**H. R. Göppert,**

Professor zu Breslau.

Bereits am 29. November des vorigen Jahrs legten wir in der allgemeinen Sitzung der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur *gelungene Proben mikroskopischer Lichtbilder* vor, welche mittelst des *Hydro-Oxygengasmikroskops* nach dem *Daguerre'schen Verfahren* auf Metallplatten dargestellt worden waren. Wir theilten uns vorläufig mit der Anzeige, welche aus den hiesigen Zeitungen in die preuß. Staatszeitung vom 1. Dec. und andere politische Blätter, so wie auch in die Zeitschr. der Herren v. Froriep (*Neue Notizen im Dec.* 1842. p. 231 und in *dieses Archiv*) überging. Obschon wir Willens waren, später ausführlicher darüber zu berichten, so sehen wir uns doch durch die jüngst (aus dem Oesterreich. Beobachter entlehnte) in der preuß. Staatszeitung vom 4. März enthaltenen Notiz, daß Hr. Littinghausen in Wien ebenfalls dergleichen dargestellt habe, veranlaßt, an unsere ältere Beobachtung zu erinnern, und zugleich einen kurzen Bericht über das ganze Verfahren und die Anwendung des Hydro-Oxygen-



gasmikroskops zu dergleichen Zwecken überhaupt anzuknüpfen.

Die schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur vermehrte auf unsern Vorschlag ihren physikalischen Apparat durch ein mittelst des Drummond'schen Licht erleuchtetes Mikroskop, gewöhnlich Hydro-Oxygenmikroskop genannt, welches in der That vortreffliche Dienste leistet, wenn es sich darum handelt, nicht etwa specielle Untersuchungen anzustellen, sondern bereits erlangte mikroskopische Resultate einem größeren Auditorium mitzutheilen. Von den thierischen Organisationen lassen sich nach den Erfahrungen unsers Freundes des Hrn. Prof. Purkinje die Structur der Oberhaut und der übrigen Horngebilde, die Darmzotten, die Capillargefäße nach ihren mannichfaltigen Verzweigungen, die Knochen, Zähne, das Muskel-, Nerven- Drüsengewebe nach zweckmäßiger Präparation darstellen, so wie auch die äußern Bedeckungen aller Thierklassen, Haare, Schuppen, Panzer, Flügeldecken, Flügel, der verschieden geformten Augen, Fühlhörner, Extremitäten, Eingeweide und bei sorgfältiger Zubereitung auch das Nervensystem, kleine, durchsichtige Thiere, Larven von Wassernymphen, kleine Wasserkrebse, Infusorien der größeren Art, einen eben so trefflichen als belehrenden Anblick gewähren. Jedoch viel nützlicher und brauchbarer ist das Instrument für die Anatomie der Pflanzen, wo es so oft darauf ankommt, die mikroskopische Structur eines größeren Abschnittes zu übersehen, als man jemals unter einem gewöhnlichen Mikroskop zu überblicken vermag, wie z. B. Querschnitte von Pflanzenstämmchen, um das Verhältniß und die Lage der Gefäße und Zellen zu einander deutlich zu machen. Hinreichend klar erschien unter anderm das Zellgewebe in seinen ver-

chiedenen regelmässigen und unregelmässigen Formen, wie z. B. die in den Luftgängen der Nymphaeaceen, die festen Secrete in den Zellen, die Stärkmehlkerne und die Krystalle oder Raphiden, ferner die Spinalggefäßbündel, die Spiralgefäße selbst aber nur im abrollten Zustande, die Umrisse des Pollen nebst seiner Haut, und dem heraustretenden Inhalt, der gebildete Ring der Fruchtkapsel der Farrnkräuter u. s. w., so daß man in der That, wie einer der Verfasser (Göppert) bereits gethan, einen fast vollständigen Coursus der Anatomie und Physiologie der Pflanzen einem größeren Publicum mit Hülfe dieses Instruments zu erläutern vermag, dem nur bei einigen genauern, die Veränderungen der Gefäße z. B. betreffenden Parthien durch das zusammengesetzte Mikroskop nachzuhelfen ist. Unser Verfahren hierbei war, daß wir das zu verwendende Wasser- und Sauerstoffgas aus getrennten Gasbehältern unter 0,7 Metre Wasserdruck in ein Rohr mit Platinalze gegen einen drehbaren Kalkcylinder entzündet lassen, und das durch das Erglühen des Kalks erzeugte Licht durch zwei 5½ zöllige Linsen von 12 Zoll Brennweite und eine kleinere von 6 Zoll Brennweite in einen kleineren Brennraum concentrirten, in welchen wir das Object stellten. Hinter das Object wurden die Vergrößerungslinsen passend eingefügt und die erzeugten Bilder auf einer gegenübergestellten weißen Tafel abgefangen. Rückt man die Tafel, auf welche das Bild fällt, dem Instrument hinreichend nahe, so erhält dasselbe so bestimmte Umrisse, wie es zur Darstellung einer Zeichnung nothwendig wird. Nimmt man statt des Schirmes ein mattgeschliffenes Glas, so erscheint das Bild mit solcher Helligkeit, daß eine Durchzeichnung mit größter Genauigkeit statt finden kann. Die Deutlichkeit

Bild  
ang mit  
atlichkeit

und Schärfe der Bilder wird noch um Vieles erhöht, wenn man die von Hrn. Seligie mit so vielem Erfolg angewandte Combination mehrerer achromatischer Linsen auch hier versucht, wozu wir treffliche von Hrn. Schi in Berlin gefertigte Linsensätze die Combinationen 1, 2 und 3, 4, 5 verwendeten. Jedoch darf man seine Erwartungen nicht zu hoch spannen und nicht vergessen, daß hier immer nur die Schatten der Gegenstände sichtbar werden, und daß daher das Instrument, möchte es auch noch so sehr verbessert werden, niemals das gewöhnliche dioptrische Mikroskop an Schärfe und Bestimmtheit der Umrisse auch im Entferntesten zu ersetzen, geschweige zu feineren mikroskopischen Untersuchungen zu dienen vermag. Die obengenannten Gegenstände mikroskopischer Anatomie lassen sich allerdings darstellen, aber sehr zarte durchsichtige, wie Längsschnitte engwandiger Zellen und Gefäße, so wie Vertiefungen (Puncte), Streifen, Spiralwindungen auf den Wänden derselben, überhaupt äußerst durchsichtige Objecte, wie sie bei dem Studium der Entwicklungsgeschichte der Thiere und Pflanzen vorkommen, kann man, weil sie einen zu geringen Schatten werfen, niemals auf eine Weise verdeutlichen, daß man irgend eine genaue Vorstellung davon zu erlangen vermöchte. So sieht man, um dies nur durch einige Beispiele zu beweisen, wie schon erwähnt, die Parenchymzellen, aber nicht ihre Intercellulargänge; man bemerkt die in den Luftgängen der Nymphaeaarten sitzenden Haare, aber nicht die punctirte Beschaffenheit ihrer Zellen; man erkennt das Satzmehl in den Zellen der Kartoffeln als schwärzliche Körnchen, ohne aber auch nur einen Begriff von ihrer eigentlichen Structur der concentrischen Beschaffenheit ihrer Häute zu erlangen; bei dem Querschnitt eines dikotyledonen Stammes

erscheinen die Rindenzellen nicht, wenn sie zu Harz, grüne Körner oder andere feste Secrete enthalten, und eben so wenig die Bast- und Markstrahlen, weil sie zu eng sind, um das Licht hindurchzulassen, aber wohl die Zellen des Markes, die punctirten Gefäße und gröfseren Holzzellen u. dergl. mehr. Auch steigern sich noch die Schwierigkeiten bei krautigen Pflanzen, die man nur unter Wasser deutlich sieht, weil es äufserst schwer hält, zarte Schnitte immer ohne Luftblasen zwischen Glasplatten einzukleben. Sind die letzteren vorhanden, so veranlassen sie nicht nur Undeutlichkeit des Bildes, sondern auch Verdrückung und Veränderlichkeit des Focus. Demohnachtet kamen wir eben durch diese Versuche auf den Gedanken, die glänzende Entdeckung von Hrn. Dabene auf diese Weise auch zur Fixirung mikroskopischer Bilder zu verwenden. Wir verfahren dabei nach der von demselben publicirten Beschreibung der Behandlung der dazu verwendenden plattirten Kupferplatten, und brachten nur die zubereitete jodirte Platte anstatt in die *Camera obscura* in den Focus der Vergrößerungslinse des Hydro-Oxygengasmikroskops, und setzten sie 15 bis 20 Minuten lang der Einwirkung des Knallgaslichtes aus, eine Zeit, die unserer Erfahrung gemäß vollkommen ausreichte. Alles, was man mittelst des Hydro-Oxygengasmikroskops zu zeigen wünscht, läßt sich natürlich auf diese Weise auch auf die Kupferplatte fixiren und zwar in der Art, daß das erhaltene Bild eine mattweisse Abbildung der durchgehenden Theile des Objects darstellt, der Körper des Objects selbst aber unbezeichnet bleibt, indem an seiner Stelle die Platte nur mit Metallglanz erscheint.

Jedoch können wir nicht umhin zu bemerken, daß

*diese Versuche* ohnerachtet des erwünschten Erfolges *der* rücksichtlich ihrer *Umständlichkeit und Kostspieligkeit* der dazu erforderlichen *Apparate gegenwärtig wenigstens* mehr wissenschaftlich interessant, als eben von großem *practischen Nutzen zur Anfertigung mikroskopischer Zeichnungen*, wie vielleicht Viele und auch wir anfangs *hätten*, zu sein scheinen. So angenehm es auch uns *dem Daguerre'schen Verfahren auf diese Weise zu* eine weitere Anwendbarkeit gegeben zu haben, so *wir* doch weit davon entfernt, das von uns *Erlangen* überschätzen zu wollen, und schrieben diese Bemerkungen, um auch andere davor zu bewahren. Das *mirari* ist auch hier an seinem Platz.

Breslau, den 6. März 1840.

### Dritte Abtheilung.

## Chemie.

### Untersuchungen über den Indigo;

von

Otto Linné Erdmann.

(Nach einer besondern Mittheilung des Hrn. Verfassers.)

### Erste Abhandlung.

*Zusammensetzung des Indigblau. Producte, welche der* die *Einwirkung von Chlor und Brom auf dasselbe* *stehen. Verhalten dieser Producte gegen die fixen Alkalis*

**D**ie bewundernswürdige Arbeit der Herren Liebig und Wöhler über die Natur der Harnsäure ist zuerst dargethan, welcher überaus mannichfaltigen *Umsetzungen* die Elemente quaternär zusammengesetzt



nischer Körper fähig sind. Es liefs sich erwarten, die wunderbare Beweglichkeit der Atome, welche genannten Forscher an der Harnsäure nachgewiesen, nicht das einzige Beispiel dieser Art bleiben und man bald zur Entdeckung ähnlicher merkwürdiger Verhältnisse bei andern stickstoffhaltigen Körpern gelangen werde. Ich richtete meine Aufmerksamkeit in dieser Voraussetzung auf den Indigo, dessen Natur, ohngeachtet der zahlreichen und vortrefflichen darüber angestellten Untersuchungen, doch noch so wenig bekannt, dafs wir über das Verhalten desselben unter dem Einflusse zersetzender Reagentien kaum mehr als einige vollständige und unzusammenhängende Erfahrungen besitzen. Eine Reihe von Versuchen, welche ich über das Verhalten des Indigfarbstoffes gegen Chlor, Brom, Salpetersäure und einige Superoxyde angestellt habe, hat mir einen überraschenden Reichthum an merkwürdigen und unerwarteten Thatsachen dargeboten, die in mehrfacher Beziehung für die Theorie der Chemie von Wichtigkeit zu werden versprechen. Indessen sind die beobachteten Erscheinungen zum Theil so räthselhaft und verwickelt und es treten der Untersuchung derselben so viele Schwierigkeiten entgegen, unter denen Mangel an Material, bei den Versuchen mit den in kleineren Mengen sich erzeugenden Substanzen, keine der geringsten, dafs ich eine baldige Vollendung der ganzen, nach mehreren Richtungen sich verzweigenden Arbeit nicht hoffen kann. Ich werde deshalb die erhaltenen Resultate nur nach und nach in einer Reihe von Abhandlungen veröffentlichen können. Der hier folgende erste Theil meiner Untersuchungen umfaßt, nächst den Versuchen über die Elementarzusammensetzung des Indigs, die Zersetzungen, welche derselbe durch Chlor und Brom

erleidet, die aus dieser Zersetzung hervorgehende Verbindungen und die Metamorphosen, welche Zersetzungsproducte unter dem Einflusse der Alkalien erleiden.

Das Verhalten der stickstoffhaltigen organischen Körper gegen Chlor ist bisher noch gar nicht der Gegenstand einer besondern Untersuchung gewesen. Ich halte das Indig bei der Zersetzung durch Chlor und Brom, unter Mitwirkung des Wassers, giebt den Anlaß, daß hier eins der reichsten Felder für interessante Untersuchungen vernachlässigt worden ist. Es läßt sich mit Sicherheit erwarten, daß fortgesetzte Untersuchungen in dieser Richtung angestellt, die wichtigsten Aufschlüsse geben werden.

Ein besonderes Interesse erhalten die hier mitgetheilten Resultate dadurch, daß sie einen Beitrag zur Lösung der wichtigen Tagesfrage in der organischen Chemie, über die allgemeine Gültigkeit der sogenannten Substitutionstheorie des Hrn. Dumas, liefern. Ich werde mich zwar zunächst auf die Mittheilung der Thatfachen beschränken und meine Ansichten über die Entstehungsweise und die Constitution der erhaltenen Producte erst nach Beendigung der ganzen Arbeit ablegen, so viel lehren jedoch die mitgetheilten Resultate mit Gewissheit, daß die Producte, welche Indig bei der Zersetzung durch Chlor und Brom liefert, nicht durch eine einfache Austauschung von Wasserstoff gegen Chlor und Brom entstehen können.

Bei meinen Analysen habe ich mich, wo mir das Gegentheil ausdrücklich angegeben ist, des von Hrn. Hofmann beschriebenen Apparates \*) bedient und mich

---

\*) S. Journ. für pract. Chem. Bd. XVII, 399.

seiner Zweckmäßigkeit vollständig überzeugt. Sicher-  
des Resultats, Eleganz und Bequemlichkeit in der  
habung sind unbestreitbare Vorzüge desselben, wel-  
die gröfsere Kostspieligkeit leicht übersehen lassen.  
Man hat diesem Apparate den Vorwurf gemacht,  
er zu complicirt sei. In der That erfordert seine  
Nutzung gröfsern Raum und die Anwendung setzt  
Umsichtsamkeit und einige Geschicklichkeit voraus. Man  
kann deshalb sehr Unrecht thun, Anfängern in der ana-  
lytischen Chemie ihre Uebungsarbeiten mit diesem Ap-  
parate anstellen zu lassen. Wer sich aber mit dem ge-  
wöhnlichen Verfahren gehörig vertraut gemacht hat,  
kann ihn gewifs mit Vortheil benutzen. Ich gestehe,  
dafs ich anfangs gegen die Anwendung desselben einge-  
nommen war und dafs erst die Nothwendigkeit, die klei-  
nen Wasserstoffgehalte meiner Indigpräparate mit der  
möglichsten Schärfe zu bestimmen, mich veranlafste, zu  
dem Apparate meine Zuflucht zu nehmen, von wel-  
chem ich das Vorurtheil hegte, dafs seine Anwendung  
in hohem Grade zeitraubend sei. Dafs sie es nicht ist,  
sah man den Apparat einmal gehörig vorgerichtet  
und davon überzeugt man sich leicht beim Gebrauche.  
Man ist mit demselben recht wohl im Stande, 2, ja so-  
gar 3 Verbrennungen hinter einander in Zeit von 6 bis  
8 Stunden auszuführen. Sobal der Apparat täglich im  
Gebrauche ist, kann man natürlich ein weit gröfseres  
Gasometer damit verbinden, als Hr. Hefs vorschreibt.  
Zur Verbrennung der chlor-, brom- und kalihalti-  
gen Substanzen bediente ich mich des chromsauren Blei-  
salzes. Das bei der Verbrennung mit diesem Salze sich  
bildende Chlorblei ist weit weniger flüchtig als das  
Chlorkupfer, indessen wird doch leicht etwas Chlorblei  
mit Bromblei durch den Gasstrom in die Chlorcalcium-

röhre übergeführt, und es kann also auch bei Anwendung von chromsaurem Bleioxyd nicht immer vermeiden werden, daß die Wasserstoffgehalte etwas zu hoch ausfallen. Dies geschieht vorzüglich bei flüchtigen Körpern, die erst vollkommen verbrennen, indem sie dampfförmig über das glühende chromsaure Bleioxyd hinstreichen. Aber auch bei nicht flüchtigen chlor- oder bromhaltigen Körpern tritt dieser Uebelstand ein, wenn man sie in einem in die Röhre geschobenen Schiffchen setzt, so daß erst die dampfförmigen Producte der trocknen Destillation derselben durch das chromsaure Bleioxyd verbrannt werden. Um den hieraus entstehenden Fehler möglichst zu vermeiden, habe ich mich bei meinen neueren Analysen der Schiffchen nicht mehr bedient, sondern die Substanz in der Röhre mittelst eines stark nach Art eines Korkziehers gewundenen Drahtes mit dem Verbrennungsmittel gemengt, wobei es auf große Genauigkeit der Mengung natürlich nicht ankommt, der nach beendigter Verbrennung durch die Röhre geleitete Sauerstoffstrom jedes zurückgebliebene Kohlentheilchen vollständig verbrennt. Ich ziehe überhaupt dieses Verfahren, die Substanz in der Röhre mit dem Verbrennungsmittel zu mengen, auch bei chlorfreien Substanzen, der Anwendung der Schiffchen vor. Um nämlich die Zersetzung der im Schiffchen liegenden Substanz mit der erforderlichen Genauigkeit beobachten zu können, darf die unter die Glasröhre gelegte Blechrinne nur ziemlich flach sein. In diesem Falle ist man aber bisweilen einem Zerspringen der Röhre ausgesetzt, indem die Flamme der Lampe die nicht geschützten Seiten der Röhre treffen kann. Hat man dagegen die Substanz mit dem Verbrennungsmittel gemengt, so bedarf es der Beobachtung des Vorgangs in der Röhre nicht. Man

Man dann die Röhre in einer Rinne von schwachem  
mit so hohen Seitenwänden legen, daß das Glas  
ends von der Flamme unmittelbar berührt wird, und  
In diesem Falle hat man nie, selbst nicht bei Anwendung  
schon gebrauchten Röhren, ein Zerspringen dersel-  
zu fürchten. Man regulirt den Gang der Verbren-  
nung, wie bei der Verbrennung ohne Sauerstoff, nach  
Entwicklung. Es bedarf bei diesem Verfahren  
nicht, der schwer schmelzbaren böhmischen  
Röhren, die immer nur schwierig in den brauchbaren  
Dimensionen zu haben sind. Den hinteren Theil der  
Verbrennungsröhre, die einige Zolle länger sein muß  
als bei dem gewöhnlichen Verfahren, verbinde ich nicht  
mit einem Kork, sondern durch ein Kautschukrohr  
mit der Kaliröhre, wodurch der Apparat beweglicher  
wird. Außerdem verbinde ich den Absorptionsapparat  
mit stickstoffhaltigen Körpern noch mit einem kleinen  
engen Rohre mit Kalihydrat. Dieses vermehrt in-  
nen sein Gewicht selten um mehr als 3 Milligramme,  
wenn 80 — 100 Cb. C. Sauerstoff nach beendigter  
Verbrennung durch das Rohr geleitet werden. Den  
Apparat, welcher das Chlorcalciumrohr mit der Verbren-  
nungsröhre verbindet, bekleide ich mit einem Stücke  
Zinnblech. Man kann denselben auf diese Weise durch  
kleine Handgriffe, die sich allerdings schwerer  
beschreiben als ausführen lassen, so vollkommen  
gegen das Eindringen oder Austreten von Feuchtigkeit  
schützen, daß es ganz überflüssig ist, den Kork zu trock-  
nen, wodurch er immer an Weichheit und Elasticität  
verliert. Ich habe mich zum Ueberflusse durch einen  
neuen Versuch davon überzeugt, daß mein Verfahren  
vollkommene Genauigkeit gewährt. Eine in einem Glas-  
Glockchen abgewogene Menge Wasser wurde in die mit

das Glas-  
die mit



glühendem Kupferoxyd gefüllte und erkaltete Röhre gebracht, ein Chlorcalciumrohr mittelst des verbleiten Kokes vorgelegt und dann wie bei einer Analyse verfahren. Nach Beendigung des Versuches fand sich das Gewicht der Chlorcalciumröhre *genau* um das Gewicht des angewandten Wassers vermehrt.

Es ist bei Anwendung der Hefs'schen Methode sowohl möglich, den gewöhnlichen Wasserstofffehler, sofern er von Feuchtigkeit in der Mischung und im Apparat abhängt, vollkommen zu vermeiden. Dagegen kann es geschehen, daß Wasserstoff- und Kohlenstoffgehalt zu klein ausfallen, wenn der Sauerstoffstrom nicht lebhaft genug ist, um ein Zurücktreten von Wasserstoff und Kohlensäure in die Kaliröhre, durch welche der Sauerstoff zugeführt wird, zu verhindern. Ein einfaches Mittel gegen diesen Fehler, den man übrigens bei einiger Aufmerksamkeit leicht vermeidet, besteht darin, daß man das Kalirohr an seinem gegen die Verbrennungsröhre gerichteten Ende in eine Spitze auszieht, eben weit genug, um den stärksten Gasstrom zu gestatten, welchen man gegen das Ende der Verbrennung nöthig hat. Die kleinen Wasserstofffehler, welche man in den nachstehenden Analysen findet, rühren gewiß größtentheils, abgesehen von den unvermeidlichen Wägungsfehlern, unvollständiger Reinheit der Präparate u. s. w. davon her, daß kleine Mengen von Chlorblei mit dem Wasser übergingen. Oft waren dieselben durch weißliche Beschläge am vorderen Theile der Chlorcalciumröhren erkennbar, die von Schwefelwasserstoffgas schwarz gefärbt wurden.

Bei Verbrennung stickstoffhaltiger Substanzen in Hefs'schen Apparate geschieht es leichter als bei der Verbrennung mit bloßem Kupferoxyd, daß Stickstoff

sich bildet. Man erkennt dies an der Bildung gelber Dämpfe im Kaliapparate. Der Fehler findet aber nie statt, wenn man die Substanz mit dem Verbrennungsmittel gemengt hat, indem dann die Verbrennung noch regelmässiger geleitet werden kann als bei Anwendung der Schiffchen. Ich bin nur selten in dem Falle gewesen, Analysen aus dem Grunde verwerfen zu müssen, weil gelbe Dämpfe bei der Verbrennung erschienen waren.

Die Stickstoffbestimmung geschah nach dem Verfahren von Dumas, mittelst des von Marchand und Berzelius beschriebenen Apparates \*). Zur Bestimmung des Chlors und Broms wurde die Substanz mit reinem gewaschenen Kalk gemengt, das Gemenge in eine gewöhnliche Verbrennungsröhre gefüllt, auf deren Boden sich etwa 1 Zoll hoch Kalk befand, vor dieselbe noch eine Schicht Kalk in Stücken gebracht und dann die Röhre allmählig fortschreitend, wie bei einer organischen Analyse, zwischen Kohlen oder über der Hefs'schen Lampe gehalten, die gebrannte Masse in Salpetersäure gelöst, in der Kohle abfiltrirt und mit salpetersaurem Silber gefällt.

### *Indigblau.*

Um mir die zu meinen Versuchen erforderlichen oder bedeutenden Mengen von Indigblau zu verschaffen, bediente ich mich anfangs der Methode von Berzelius, wählte dieselbe aber wegen zu grosser Umständlichkeit und Kostspieligkeit verlassen. Ich bereitete das Indigblau später blofs durch Reduction ohne vorherige Behandlung des Indigs mit Schwefelsäure, Kali u. s. w. Man erhält nämlich, wie schon W. Crum angegeben hat,

\*) S. Journ. für pract. Chem. Bd. XIV, 206.

ein ziemlich reines Indigblau durch Fällung der klaren Flüssigkeit einer kalten Indigküpe mittelst Salzsäure und Auswaschen des gefällten Farbstoffes. Ich stellte zu diesem Behufe eine sehr concentr. kalte Küpe (Indigant der Färber) mit 5 Pfd. des feinsten Indigs, 15 Pfd. Kalk, 10 Pfd. Eisenvitriol und etwa 300 Pfd. Wasser nach gewöhnlicher Weise an. Die geklärte Auflösung von reducirtem Indigblau wird mittelst eines Hebbers in ein Gefäß, welches verdünnte Salzsäure enthält, unter ständigem Umrühren der sauren Flüssigkeit übergezogen und der gebildete Niederschlag an der Luft ausgetrocknet. Der Rückstand in der Küpe wird wiederholt mit heißem Wasser, nöthigenfalls unter Zusatz von Kalk, aufgerührt und giebt nach dem Klären noch beträchtliche Mengen von Indigblau.

Das auf diese Art gewonnene Indigblau enthält noch den größten Theil des Indigroth und etwas schwefelsauren Kalk, dessen Menge jedoch 0,75 Proc. in der Regel nicht übersteigt. Das Indigroth läßt sich von dem gefällten Indig nur sehr schwierig durch oft wiederholtes Auskochen mit Alkohol entziehen. Man kann aber den größten Theil desselben dadurch entfernen, daß man den gefällten Indig aufs Neue reducirt und durch Salzsäure ausfällt. Die vom wiederholt gefällten Indig ablaufende saure Flüssigkeit, welche im ersten Augenblicke blaßgelb oder fast farblos ist, färbt sich an der Luft bald bräunlich-violett, trübt sich und setzt beim Stehen ein violettes Pulver ab, das fast reines Indigroth zu sein scheint und sich in siedendem Alkohol oder Rückstand mit tief roth-violetter Farbe auflöst. Indigblau, welches viermal hintereinander reducirt und wieder ausgefällt worden war, färbte den Alkohol beim Sieden damit nur noch rein blaßblau. Das Auskochen

Alkohol von 0,83 spec. Gew. wurde 5 — 6mal wiederholt. Bisweilen geschah es, daß die letzten Antheile Alkohol sich fast gar nicht mehr färbten. In der Regel färbt er sich aber auch nach 4 — 6maligem Auswaschen noch blau durch Aufnahme von Indigblau.

Dumas hat für das Indigblau die Formel  $C_{16}H_{10}O_2$  aufgestellt. Einige früher von mir durch Verasung mit Kupferoxyd angestellte Analysen von reinem Indigblau lieferten mir Resultate, welche sich dieser Formel ziemlich gut anpaßten, aber doch einen höheren Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalt gaben, als die Formel fordert.

Meine neueren Versuche mit dem Hefs'schen Apparat dagegen haben mir sehr abweichende Resultate gegeben. Es wurde dazu das viermal reducirte und durch Alkohol völlig erschöpfte Indigblau angewandt.

0,228 Grm. gaben 0,622 C und 0,082 H,

0,242 Grm. gaben 0,660 C und 0,086 H,

0,253 Grm. gaben 23 Cb. C. Stickstoff bei 13° und 0,747

M. B. = 0,02675 Stickstoff,

0,359 Grm. gaben 32 Cb. C. bei 6° C. und 0,740 M. B.

= 0,03828 Stickstoff.

Diese Zahlen geben für 100 Th.:

|                | 1.     | 2.      |
|----------------|--------|---------|
| Kohlenstoff... | 75,430 | 75,406  |
| Wasserstoff... | 3,992  | 3,940   |
| Stickstoff.... | 10,573 | 10,650. |

Ein Theil des zu den vorstehenden Versuchen angewandten Indigblau wurde vorsichtig im luftleeren Raume zerrieben, die Krystalle zerrieben, mit Alkohol ausgekocht, der sich dabei anfangs wieder violett, nach mehrmaligem Auskochen aber nur rein hellblau färbte, und nochmals analysirt.

0,255 gaben 0,700 C und 0,088 H.

Dies giebt in 100 Th.:

Kohlenstoff.....75,904

Wasserstoff.....3,828.

Der gefundene Kohlenstoffgehalt ist, wie man bedeutend höher, als man ihn bisher angenommen eine Folge der vollkommenen Verbrennung im stoffstrome. Bei keinem der angeführten Versuche sich eine Spur von gelben Dämpfen im Kaliapparat. Um jedoch dem Einwurfe, daß die Bildung von stoffoxyd den Kohlenstoffgehalt habe höher erschaffen lassen, vollständig zu begegnen, habe ich das Indigo auch ohne Anwendung von Sauerstoffgas im Liebig'schen Apparate verbrannt. Ich bediente mich dabei einer 1 Fuß langen Röhre, mischte das Indigoblau äusserst feinst mit einer sehr grossen Menge Kupferoxyd, legte vor die Mischung und das Kupferoxyd noch eine 8 Zoll lange Schicht von feinertheiltem metallischem Kupfer.

0,563 gaben hierbei 1,544 Kohlensäure = 75,804 Kohlenstoff.

Dieser Versuch beweist, daß die Bildung von stoffoxyd keinen nachtheiligen Einfluß auf die Richtigkeit meiner Versuche gehabt haben kann, um so weniger, als der Indig überhaupt nicht zu den Körpern gehört, welche bei der Verbrennung leicht Stickstoff liefern. Er zeigt aber zugleich, daß es bei recht feinsten Mischungen wohl möglich ist, den Indig mit Kupferoxyd allein vollständig zu verbrennen. Daß indessen schwierig ist, haben mir meine früheren Versuche gelehrt, bei welchen ich 72,9 — 73,9 Proc. Kohlen erhielt. Diese Schwerverbrennlichkeit des Indigs ist auch den Umständen, daß die Bestimmung des Stick-



ults, wenn dabei die Röhre mit gehöriger Sorgfalt leer gemacht wird, immer etwas zu niedrig ausfällt, es ist einleuchtend, daß die unverbrannt in der Verbrennungsröhre zurückbleibende Kohle etwas Stickstoff zurückhalten muß.

Die erhaltenen Zahlen führen auf folgende Formel:

|                    | Berechnet     | Gef. im Mittel |
|--------------------|---------------|----------------|
| $C_{32} = 2445,92$ | 75,84         | 75,70          |
| $H_{10} = 124,79$  | 3,87          | 3,92           |
| $N_4 = 354,08$     | 10,90         | 10,61          |
| $O_3 = 300,00$     | 9,39          | 9,77           |
| <b>3224,79</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00.</b> |

Marchand hat auf meine Bitte eine Analyse des Indigblau angestellt, deren Resultat ganz dem meinigen entspricht. Er wendete sublimirtes und wiederholt mit Alkohol ausgekochtes Indigblau an. 0,412 Grm. gaben 1,128 Kohlensäure und 0,150 Wasser = 75,70 C und 4,04 H.

0,609 Grm. gaben ferner bei 8° und 752 M. B. 55 Cb. Stickstoff = 10,88 Proc.

Das Wasser war bei diesem Versuche besonders aufgefangen worden und zeigte keine saure Reaction.

Die von mir angenommene Formel giebt ganz nahe das Doppelte des von Dumas aus der Verbindung des Indigblau mit Schwefelsäure abgeleiteten Atomgewichts, und der Unterschied zwischen der von mir gefundenen Zusammensetzung von den durch Hrn. Dumas bestimmten Zahlen beschränkt sich auf den Sauerstoffgehalt, welcher eine Aenderung erleidet, die den Ansichten von Dumas über die Indigblauschwefelsäure keinesweges günstig ist.

Das Indigblau, dessen ich mich zu meinen Versuchen über die Einwirkung des Chlors und Broms be-

diente, wurde gewöhnlich mit seinem ganzen G an Indigroth angewandt, nachdem ich mich überzeugt hatte, daß das Indigroth keinen wesentlich nachtheiligen Einfluß auf die Reaction ausübt. Das Indigroth verändert sich bei der Behandlung mit Chlor in eine harzähnliche, in Wasser unlösliche, in Alkohol lösliche Masse, deren Trennung von den Hauptproducten der Reaction des Chlors auf das Indigblau keinen Schwierigkeiten unterliegt. Uebrigens ist auch die Menge des dem Indigblau anhängenden Indigroth überaus gering.

*Verhalten des Indigblau gegen Chlor.*

Im trocknen Zustande wirken Chlor und Indigblau weder bei niedriger Temperatur noch bei  $100^{\circ}$  auf einander ein. Ich brachte getrocknetes und feinzertheiltes Indigblau in den Liebig'schen Trockenapparat und leitete einen Chlorstrom, der zuerst durch Schwefelcalcium und dann noch durch ein Rohr mit Chlorcalcium geleitet war, anhaltend bei  $-2^{\circ}$  darüber. Es erfolgte keine Veränderung, das Indigblau behielt seine Farbe und es entband sich nicht eine Spur von Chlorwasserstoff. Der Erfolg blieb derselbe, als der Apparat mit seinem Inhalt dem Wasser umgeben wurde. Die Erscheinungen waren also wie beim Lackmus, das nach Davy's Versuchen von trockenem Chlor ebenfalls nicht verändert wird.

Wird dagegen das Indigblau mit Wasser zum Brei angerührt und dann ein Strom von Chlor hineingeleitet, so verschwindet die blaue Farbe des Indigs allmählig, die Masse färbt sich erst graugrün und zuletzt gelb. Die dabei entstehende Chlorwasserstoffsäure bleibt fast gänzlich in der Flüssigkeit aufgelöst. Es entwickelt sich während der Reaction weder Kohlensäure noch ein anderes gasförmiges Product.

scheinungen bei der Zersetzung des Indigs durch Chlor etwas verschieden je nach der Temperatur, bei welcher sie erfolgt. Im Allgemeinen ist es am besten, die Temperatur möglichst niedrig zu halten. Die Zersetzung erfolgt dann vollständiger und schneller. Der gechlorte Indigo scheidet sich, wenn man die Flüssigkeit, nachdem kein Chlor mehr absorbirt, ruhig stehen läßt, als ein gelber oder fast orangefarbener zarter Brei ab. Die überstehende Flüssigkeit ist gelbroth gefärbt. Hat man die Temperatur nicht niedrig gehalten, so fällt der Brei mehr körnig aus und hat eine tiefere Farbe; hält man aber die Flüssigkeit warm, so backt die Masse zu dicken Klumpen zusammen, welche auch nach der längsten Einwirkung des Chlors noch viel unzersetzten Indigo enthalten.

Die mit Chlor behandelte Masse ist ein Gemenge verschiedener Producte. Unterwirft man sie der Destillation, so geht mit der wässrigen Flüssigkeit ein festes flüchtiges Product über, das sich in weißen Schüppchen oder nadelförmigen Krystallen im Halse der Retorte und in der Vorlage anlegt.

Dieses flüchtige Product will ich vorläufig *Chlorindigo* nennen. Man wird später sehen, daß es sich mit Kali in zwei verschiedene Verbindungen zerlegt.

Die zugleich übergehende wässrige Flüssigkeit besitzt einen Geruch, welcher an Ameisensäure erinnert. Willt man dieselbe nochmals für sich, sättigt die zu übergehende Portion mit Silberoxyd und kocht die gebildeten Chlorsilber abfiltrirte Flüssigkeit, so wird metallisches Silber reducirt. Dieses veranlaßte mich anfangs zu der Annahme, daß die Flüssigkeit etwas Ameisensäure enthalte. Indessen besitzt auch die wässrige

Auflösung des durch wiederholte Sublimation gereinigten Chlorindoptens die Eigenschaft, das Silber in Siedehitze zu reduciren, und ich habe mich später durch einen ganz entscheidenden Versuch von der Abwesenheit der Ameisensäure überzeugt. Sättigt man nämlich die vom Chlorsilber abfiltrirte silberhaltige Flüssigkeit mit Kali, dampft sie nach dem Abfiltriren ab und destillirt den Rückstand mit Phosphorsäure, so geht Chlorindopten über; die mit demselben überdestillirende Flüssigkeit besitzt nicht den Geruch der Ameisensäure und giebt mit Bleizuckerlösung keine Reaction. Der Ameisensäure ähnliche Geruch des ersten Destillats hört demnach der Mischung von Salzsäure und Chlorindopten an.

Kocht man, nachdem der größte Theil des Chlorindoptens übergegangen ist, den Rückstand in der Retorte wiederholt mit vielem Wasser aus, so wird er, mit Zurücklassung einer bald größeren bald kleineren Menge einer braunen harzähnlichen Substanz aufgelöst. Die siedend filtrirte Auflösung setzt beim Erkalten ein feines gelbes krystallinisches Pulver ab. Die Flüssigkeit, welcher sich dasselbe abgesetzt hat, liefert beim Abdampfen noch einen Antheil, der aber unreiner und harthaltig ist. Man reinigt ihn durch nochmaliges Auswaschen mit Wasser, wobei der größte Theil des Harzes zurückbleibt. Das erhaltene Product löst sich in kochendem Alkohol, mit Zurücklassung von etwas Gyps, dem Indigblau, auf und krystallisirt beim langsamen Erkalten der Lösung in morgenrothen verworrenen Blättchen und Nadeln. Die Zusammensetzung dieser Krystalle ist indessen eben so wenig constant als die aus der wässrigen Lösung abgesetzten Pulvers. Nach vielen vergeblichen Versuchen, in die erhaltenen wid

henden Resultate der Analysen Uebereinstimmung zu zeigen, ergab sich endlich, daß das rothe Product aus einander in allen ihren Eigenschaften überaus ähnlichen Verbindungen gemengt ist, die man durch wiederholtes Umkrystallisiren scheiden kann, indem die eine leichter in Alkohol ist als die andere. Ich nenne die schwerer lösliche und zuerst anschliessende Verbindung *Chlorisatin*, die leichter lösliche, weil sie, bei übrigens gleicher Zusammensetzung, doppelt so viel Chlor enthält als die erste, *Bichlorisatin*. Die letztere Verbindung entsteht immer, selbst wenn die Zersetzung des Indigoblau durch Chlor nicht vollständig geschehen ist, in einer und vielleicht doppelt so grossen Menge als Chlorisatin.

Wird die saure Flüssigkeit, aus welcher das Gemisch von Chlorisatin und Bichlorisatin sich abgesetzt hat, abgedampft, so entwickelt sie eine reichliche Menge Salzsäure und zuletzt erhält man Krystalle von Salzsäure. Ich gehe jetzt zur Beschreibung der genannten Reaction der Reaction und ihrer Veränderungen durch Alkalien über.

#### *Chlorindopten.*

Man erhält diesen Körper, wie ich angeführt habe, wenn die durch Behandlung des Indigoblau mit Chlor erhaltene Masse destillirt wird. Es ist schwer, sich grössere Quantitäten dieses Körpers zu verschaffen. Obwohl die Menge, in welcher er sich erzeugt, nicht unbedeutend ist, so geht doch die Destillation derartigen Masse, wobei ein heftiges Aufstossen kaum zu vermeiden ist, nur sehr schwierig von statten. Erhöht man die Temperatur der Flüssigkeit unter dem Siedepunkte, so geht fast nichts als Wasser über, und

kaum  
ten. Er-  
unter dem  
Siedepunkte



selbst wenn man den Siedepunct durch Auflösen Chlorcalcium in der Flüssigkeit erhöht, muß die chlorte Masse wiederholt mit der übergegangenen Flüssigkeit destillirt werden, um einen einigermaassen trächtlichen Theil des flüchtigen Products zu erhalten. Kocht man dagegen die Masse an der Luft aus, so flüchtigt sich das Chlorindopten ziemlich leicht, man an dem erstickenden und reizenden Geruche siedenden Flüssigkeit erkennt. Man würde die Destillation aus diesem Grunde vielleicht am besten in einer Gasstrome vornehmen.

Die übergegangene feste Substanz wird durch normale Destillation mit Wasser oder durch sehr vorsichtige Sublimation gereinigt, wobei sie in Gestalt weißer, feiner, leichtzerreiblicher Nadeln und Blättchen von einem eigenthümlichen unangenehmen Geruche erhalten wird. Sie gleicht in ihren äußeren Eigenschaften einem Stearopten. In der Wärme schmilzt sie in einem farblosen Oele und beginnt zu verdampfen. Unter starker Einwirkung der Wärme wird sie gebräunt und theilweise zersetzt. Für sich ist sie nicht sehr leicht flüchtig, leichter verflüchtigt sie sich im Dampfe siedendem Wasser. In kaltem Wasser ist sie sehr wenig, reichlicher in heißem löslich und scheidet sich daraus beim Erkalten in krystallinischen Flocken aus. Alkohol löst sie sich schon in der Kälte, weit leichter aber in der Wärme auf und wird aus dieser Lösung durch Wasser ausgefällt. Sowohl die wässrige als weingeistige Lösung des sorgfältig ausgewaschenen Chlorindoptens reagiren sauer. Die Lösung wird durch Petersaures Silberoxyd nicht verändert. Das Chlorindopten enthält keinen Stickstoff; es besteht aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Chlor.

Um die Substanz trocken zu erhalten, wurde sie Tage in Vacuo über Schwefelsäure aufbewahrt, sie indessen fortwährend durch Verdampfung an Gewicht verlor. Die Verbrennung läßt sich nicht in Gelingen bewirken, da sich der Körper bei einer gewissen Temperatur plötzlich zersetzt. Sie wurde deshalb mit chromsauren Bleioxyd in der Röhre gemischt, so die Verbrennung leicht vor sich geht.

0,373 Grm. gaben 0,084 Wasser, 0,766 Kohlensäure,  
0,379 Grm. gaben 0,060 Wasser, 0,515 Kohlensäure,  
0,316 Grm. gaben 0,043 Wasser, 0,423 Kohlensäure,  
0,395 Grm. gaben, mit Kalk geglüht, 1,086 Chlorsilber,  
0,389 Grm. gaben, mit Kalk geglüht, 0,858 Chlorsilber.

Dies giebt in 100 Theilen:

|                 | 1.     | 2.     | 3.     |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Kohlenstoff...  | 36,962 | 37,536 | 37,012 |
| Wasserstoff...  | 1,626  | 1,721  | 1,515  |
| Chlor .....     | 54,123 | 54,411 |        |
| Sauerstoff..... | 6,289  | 6,331  |        |

Ich habe in einer vorläufig publicirten Notiz aus diesen Zahlen die Formel  $C_8 H_4 Cl_4 O$  oder  $C_{32} H_{16} O_4$  abgeleitet, welche der gefundenen Zusammensetzung ziemlich nahe entspricht, wie folgende Vergleichung zeigt.

| At.             | Ber.   | Gef. Mittel |
|-----------------|--------|-------------|
| $C_8 = 611,48$  | 37,70  | 37,170      |
| $H_4 = 24,95$   | 1,53   | 1,619       |
| $Cl_4 = 885,30$ | 54,58  | 54,267      |
| $O = 100,00$    | 6,19   | 6,944       |
| 1621,73         | 100,00 | 100,000.    |

Indessen zeigt das Verhalten der Substanz gegen Wasser, daß sie aus zwei Substanzen besteht, von denen eine ein indifferenter Körper, die andere aber eine Säure ist. Ich halte es für wahrscheinlich, daß beide

nur mit einander gemengt sind. Uebergießt man nämlich den Körper, welchen ich Chlorindopten genannt habe, mit Kalilauge, so verändert sich augenblicklich der unangenehme Geruch desselben in einen ziemlich angenehmen, welcher einige Aehnlichkeit mit Fei oder noch mehr mit Kerbel (*Scandix Cerefolium* L.) besitzt. Die Veränderung erfolgt eben so leicht bei Anwendung von kohlensaurem Kali, wobei sich zugleich Kohlensäure entwickelt. Dieser Umstand scheint reichend zu beweisen, daß die beiden Körper, in welche das Chlorindopten zerlegt wird, nicht erst durch den zersetzenden Einfluß des Kalis gebildet werden.

Erwärmt man das Gemisch von Chlorindopten mit reinem oder kohlensaurem Kali in einer Retorte, so zerfällt sich das Chlorindopten vollständig auf und es geht ein festes Product von dem Geruche der Flüssigkeit über, das im Uebrigen alle äußeren Eigenschaften des Chlorindoptens zeigt. Es unterscheidet sich aber von demselben dadurch, daß es weder mit Wasser befeuchtet noch in Alkohol gelöst, saure Reaction zeigt. Die Menge desselben ist nur äußerst gering. Ich nenne diesen Körper *Chlorindatmit*. (Nach dem Rathe des Hrn. Compt. G. Hermann von ἀτμός Duft, Ausgehauchtes, abgetrieben.) Von erwärmter Salpetersäure wird er unter Entwicklung rother Dämpfe zersetzt. Es bildet sich bei dieser Zersetzung keine Kleesäure. Setzt man zu dieser gelben Flüssigkeit Ammoniak oder Kali, so färbt sie sich roth. Salpetersäure bringt diese Farbe nach einiger Zeit zum Verschwinden, ohne etwas niederzuschlagen.

Aus Mangel an Material habe ich nur wenige Versuche mit diesem Körper anstellen können.

0,308 Grm. gaben 0,411 Kohlensäure und 0,062 Wasser.

0,209 Grm. gaben 0,454 Chlorsilber.

giebt in 100 Theilen :

Kohlenstoff ... 36,89

Wasserstoff.....2,23

Chlor.....53,58,

und der theoretischen Zusammensetzung :

|                   | Ber.  |
|-------------------|-------|
| $C_{12} = 917,22$ | 36,76 |
| $H_2 = 49,92$     | 2,00  |
| $Cl_6 = 1327,95$  | 53,22 |
| $O_2 = 200,00$    | 8,02  |
| <u>2495,09.</u>   |       |

nach dem Abdestilliren des Chlorindatmits in  
 te zurückbleibende Kaliverbindung erstarrt beim  
 oder nach dem Eindampfen, zu einem Brei  
 in durchsichtigen und farblosen Krystallnadeln.  
 diesen abfiltrirte kalihaltige Mutterlauge ent-  
 nichts davon aufgelöst und giebt mit Säuren  
 Niederschlag. In reinem Wasser dagegen ist die  
 Verbindung leicht löslich, etwas weniger in Alko-  
 hol. Löst dieselbe nach dem Auspressen an der  
 Pressen, so daß das überschüssige Kali sich mit  
 Säure sättigen kann, und löst sie dann in mög-  
 lichst siedendem Alkohol auf. Beim Erkalten kry-  
 stallisirt die Verbindung in haarförmigen Krystallen.  
 Aus der Auflösung eines dem Chlorin-  
 dopten ähnlichen Körper in weissen Flocken nieder, des-  
 halb weit widriger als der des Chlorindoptens  
 sich aber übrigens diesem ganz ähnlich verhält  
 und sauer reagirt. Ich nenne ihn *Chlorindopten-*  
 Das chlorindoptensaure Kali giebt mit salpeter-  
 Silberoxyd einen sehr voluminösen citrongelben,  
 in kaltem Wasser nur sehr wenig löslichen, in kal-  
 tem Wasser aber völlig unlöslichen Niederschlag, mit  
 Bleioxyd eine weisse, mit schwefelsaurem

Kupferoxyd eine dunkel purpurviolette Färbung habe das Silbersalz zur Bestimmung des Atoms der Chlorindoptensäure benutzt.

0,308 Grm. chlorindoptensaures Silberoxyd, getrocknet, wurden mit kohlsaurem Kali gegossen, nach dem Auswaschen mit Wasser verbleibend stand der geglühten Masse hinterließ beim Glühen in der Luft 0,112 Silber = 38,70 Proc. Silberoxyd giebt für die Chlorindoptensäure das Atomgewicht 2299,3.

0,336 Grm. gaben, mit chromsaurem Blei verbrannt, 0,029 Wasser (es sublimierte etwas Chlorwasser, daß diese Zahl zu hoch ausgefallen ist), und 0,165 Kohlensäure.

0,186 Grm. gaben 0,165 Kohlensäure,

0,637 Grm. gaben 0,050 Wasser und 0,585 Kohlensäure.

(Bei diesem Versuche war die größte Sorgfalt angewandt worden, um jeden Wasserstoffüberschuß zu vermeiden, dennoch sublimierten Spuren von Chlorwasser.)

0,440 Grm. gaben 0,630 Chlorsilber.

Diese Zahlen entsprechen folgender Zusammenfassung:

|                           | Ber.    | 1.     | Gef.    | 2.    |
|---------------------------|---------|--------|---------|-------|
| C <sub>12</sub> = 917,22  | 24,64   | 24,93  | 24,53   | 24,53 |
| H <sub>4</sub> = 24,96    | 0,67    | 0,95   |         |       |
| Cl <sub>6</sub> = 1327,95 | 35,69   | 35,32  |         |       |
| Ag = 1451,61              | 39,00   | 38,80  |         |       |
|                           | 3721,74 | 100,00 | 100,00. |       |

Freie Chlorindoptensäure, durch Salzsäure und Salpetersäure aus dem Kalisalze abgeschieden und im Vacuum getrocknet, zeigte folgende Zusammenfassung:

0,200 Grm. gaben 0,275 Kohlensäure und 0,032 Wasser.

0,358 Grm. gaben 0,485 Kohlensäure und 0,055 Wasser.

0,332 Grm. gaben 0,734 Chlorsilber.



se Zahlen geben in 100 Theilen :

|                 | 1.    | 2.    |
|-----------------|-------|-------|
| Kohlenstoff...  | 38,02 | 37,46 |
| Wasserstoff.... | 1,77  | 1,70  |
| Chlor.....      | 54,53 |       |
| Sauerstoff..... | 5,68  |       |

hend der theoretischen Zusammensetzung :

|          |           | Ber.    |
|----------|-----------|---------|
| $C_{12}$ | = 917,22  | 38,48   |
| $H_6$    | = 37,44   | 1,57    |
| $Cl_6$   | = 1327,95 | 55,73   |
| $O$      | = 100,00  | 4,22    |
|          | <hr/>     |         |
|          | 2382,61   | 100,00. |

sen Resultaten zufolge verliert die Chlorindopten-  
wenn sie sich mit Basen verbindet, 1 At. Wasser,  
bei der Abscheidung von der Basis wieder auf-



ist eine Wasserstoffsäure, deren Radical sich  
n Radical der Basis verbindet, während ihr Was-  
sich mit dem Sauerstoffe derselben zu Wasser



Chlorindatmit würde das Hydrat der Wasser-  
re sein :  $C_{12} H_4 Cl_6 O + H_2 + H_2 O$ .

angel an Material hat mich verhindert, die Un-  
ng dieser Substanzen weiter auszudehnen, oder  
rsuche über die Zusammensetzung derselben so  
vielfältigen, als ich wohl gewünscht hätte.

(Fortsetzung folgt.)



# Beiträge zur chemischen Kenntniss ätherischen Oele;

von

*Rudolph Brandes.*

## Ueber das ätherische Oel der Laurineen *Lorbeeröl.*

**D**as ätherische Oel der Lorbeeren ist, so  
weiss, noch keiner genauen Untersuchung und  
unterworfen worden, demohnerachtet ist eine  
ohne Zweifel von besonderm Interesse, wenn man  
Wichtigkeit der Producte erwägt, welche die  
wozu der Lorbeer gehört, insbesondere dem Arznei-  
liefert. Unter den Producten dieser Familie hat  
ätherischen Oele derselben vorzugsweise ein In-  
sowohl was ihre Benutzung betrifft, als auch  
neueren Zeiten gewonnenen Kenntnisse ihrer chemi-  
Verhältnisse. Es genügt, in dieser Beziehung  
den Kampher und an das Zimmtöl zu erinnern  
hielt es dieserhalb für einen Gegenstand von In-  
zu untersuchen, ob das Lorbeeröl in seiner Zus-  
setzung und seinem Verhalten mehr dem Zimmtöl  
dem Kampher sich anschliessen würde, oder ob  
beiden gänzlich abweiche. Die Familie der Lau-  
hat gewiss etwas sehr Ausgezeichnetes in ihren  
schen Oelen, nämlich die bedeutende Verschie-  
derselben, wie die Vergleichung von Zimmtöl, Sa-  
und Kampher sogleich ergiebt, die in ihren ä-  
Merkmalen nicht nur sehr von einander abweiche-  
dern noch mehr in ihren chemischen Verhältniss-  
Besitz einer Quantität ächten Lorbeeröls, welch-  
theils selbst hatte bereiten lassen, theils von Hrn. F.

rnigerode destillirt war, habe ich solches benutzt, r Kenntniss dieses Oels und zur Entscheidung obigen einen kleinen Beitrag zu liefern.

### *Rohes Lorbeeröl.*

it dem Namen *rohes Lorbeeröl* werde ich das Oel a, wie es aus der Destillation der Lorbeeren mit r hervorgeht. Dieses hat eine schwach gelbliche ist durchsichtig, in Aether und Alkohol leicht- und sein spec. Gew. bei 15° C. = 0,914. Lackmus- wird davon schwach geröthet.

### *Destillation des rohen Lorbeeröls für sich.*

ird das Lorbeeröl einer Destillation für sich un- rten, so geht ein Theil desselben in wasserklarem de über, während der in der Retorte zurück- nde Theil nach und nach eine schmutzig-bräun- Farbe annimmt. Die Destillation bedarf jetzt in weitem Fortführung einer stärkeren Hitze, ein s, dass in dem Oele mehre von verschiedenem Siede- enthalten sind. Das in der ersten Periode überdestil- el wurde daher für sich gesammelt, und das darauf le ebenfalls. Zuletzt gingen auch bei stärkerer kaum noch Tropfen über, und der Rückstand in torte stellte eine schwarzbraune balsamartige zäh- e Masse dar.

urch die Destillation des Oels für sich war das- onach geschieden in ein *leichtflüchtigeres* und ein *flüchtigeres Oel*, und in eine *zähflüssige balsam-* Substanz.

as *leichtflüchtigere Oel* ist, wie bemerkt, farblos, etwas reiner, dem Cajaputöl ähnlicher als das Del, ist leicht löslich in Aether und Alkohol, und

reagirt schwach sauer. Sein spec. Gew. ist me-  
geringer als das des rohen Oels, es ist nämlich 0,

Um die Zusammensetzung dieses Oels auszum-  
wurde dasselbe erst über Chlorcalcium von seinem  
sergehalte befreit und dann der Elementaranalyse  
Verbrennen mittelst Kupferoxyd unterworfen. Da  
wurde in kleinen Glaskügelchen in die Verbren-  
röhre gebracht, und diese vor der Luftpumpe ent-  
Bei dem Versuch ergaben:

0,270 Grm. Oel = 0,798 Grm. Kohlens. u. 0,286 Grm. W

Dieses giebt für die Zusammensetzung des Oel

Kohlenstoff .... 81,724

Wasserstoff .... 11,605

Sauerstoff ..... 6,691

100.

Das *schwerflüchtigere* Oel hat eine etwas gelb-  
Farbe, reagirt schwach sauer, ist im Geruch dem  
gen ähnlich, nur etwas weniger rein, es ist leicht  
lich in Alkohol und Aether, und sein spec. Gew.  
falls geringer, als das des rohen Oels, obwohl  
größer als das des leichtflüchtigen Oels, nämlich  
Die Analyse dieses Oels, wie die vorige angestellte  
gab folgendes Resultat:

0,369 Grm. Oel = 1,090 Grm. Kohlens. u. 0,309 Grm. W

Hieraus berechnet sich die Zusammensetzung  
Oels zu:

Kohlenstoff .... 81,630

Wasserstoff .... 11,711

Sauerstoff ..... 6,609

100.

Die *braune balsamartige Materie*, welche bei  
Destillation des rohen Oels als Rückstand erhalten w  
löste sich in Alkohol von 80 Proc. nur theilweise  
eine ölige Materie blieb ungelöst; die Auflösung

ch Verdunsten eine weiche krystallinisch körnigte Substanz. Aetzkalkilauge bewirkte ebenfalls nur eine theilweise Auflösung der balsamartigen Substanz, eine ölige Materie blieb ungelöst. Aus der Auflösung mit wässrigem Kali schied Chlorwasserstoffsäure einen milchweissen Niederschlag ab. Dieser löste sich in Aether, nicht in Alkohol auf, auch in Ammoniak und in letzterer Auflösung bewirkte Chlorbaryum einen weissen Niederschlag, der schon bei mäßigem Erwärmen sich bräunte. Ich vermuthete in dieser Substanz anfangs Zimmtsäure oder Kamphersäure, es ist mir aber nicht wahrscheinlich, dafs sie für eine dieser Säuren gehalten werden kann; leider war die Menge, die davon erhalten wurde, zu gering, um nur eine einigermaafsen begründete Vermuthung darüber aussprechen zu können. Da eine Zerlegung der balsamartigen Substanz in ihre näheren Bestandtheile nicht möglich war, indefs jener eben erwähnte Körper nur einen sehr unbedeutenden Theil derselben ausmachte, so stellte ich doch eine Analyse der balsamartigen Materie an, um zu sehen, in welcher Beziehung ihre Zusammensetzung zu dem davon abdestillirten Oele stehen möchte. Die Analyse ergab Folgendes:

0,461 Grm. Substanz = 1,315 Kohlens. u. 0,462 Grm. Wasser.

Demnach ist die Zusammensetzung der balsamartigen Materie:

Kohlenstoff.....78,850

Wasserstoff.....11,135

Sauerstoff.....10,013

100.

Das rohe Oel liefert also durch die Destillation für zwei Oele von verschiedener Flüchtigkeit und verschiedenem spec. Gew., aber von gleicher Zusammensetzung, sie sind also als *isomerisch* anzusehen, und eine



balsamartige Materie, die von der Zusammensetzung der Oele wesentlich sich unterscheidet durch einen höheren Gehalt an Sauerstoff. In dieser balsamartigen Materie findet sich zugleich eine Säure, deren Natur aber nicht bestimmt werden konnte, weil diese Säure in zu geringer Menge erhalten wurde, deren Flüchtigkeit aber nicht so groß ist, wie die der Oele, die dem rohen Lorbeeröle abdestillirt werden.

*Destillation des rohen Lorbeeröls mit Wasser.*

Ein Theil rohes Lorbeeröl wurde mit einer nöthigen Menge Wasser in eine Retorte gegeben und Destillation unterworfen, welche sehr langsam vor sich gehen ging. Als die Hälfte des Oels überdestillirt zu sein mochte, war die Destillation schwieriger und erforderte eine stärkere Hitze; sie wurde jetzt unterbrochen.

Das in der Retorte verbliebene Oel hatte eine etwas dunklere weingelbe Farbe und röthete Lackmus merklich.

Das überdestillirte Oel wurde vom Wasser getrennt und war nun vollkommen farblos und wasserklar; der Geruch war weit mehr kampherartig und nach Cajuput als bei dem rohen und bei dem für sich rectificirten Oele; es zeigte keine saure Reaction, was die oben ausgesprochene Ansicht über die schwerere Flüchtigkeit in dem rohen Oele enthaltenen Säure bestätigt. Das Oel wurde durch Chlorcalcium völlig entwässert und dann der Analyse unterworfen. Diese ergab :

- I. 0,312 Grm. Oel = 0,920 Grm. Kohlens. u. 0,315 Grm. Wasserstoff.  
 II. 0,315 „ „ = 0,932 „ „ „ 0,330 „ „

Hieraus folgt für die Zusammensetzung des Oels

|                      | I.     | II.    |
|----------------------|--------|--------|
| Kohlenstoff . . .    | 81,534 | 81,811 |
| Wasserstoff . . .    | 11,251 | 11,637 |
| Sauerstoff . . . . . | 7,115  | 6,552  |
|                      | 100    | 100.   |

Das rectificirte Lorbeeröl ist in Aether und in absolutem Alkohol, wie in Alkohol von 78 Proc., leicht löslich; es vermischt sich mit fetten und ätherischen Oelen, Talg giebt damit beim Erhitzen eine klare Auflösung. Wachs wird beim Erhitzen ebenfalls davon aufgelöst, nach Erkalten entsteht eine dickliche weisse Flüssigkeit.

Mit Aetzammoniak bildet das Lorbeeröl eine trübe Flüssigkeit.

*Behandlung des rohen Lorbeeröls mit kaustischen Alkalien.*

Wird Lorbeeröl mit concentr. kaust. Kalilauge geschüttelt, so färbt sich die Lauge bräunlich; das Oel sondert sich nach einiger Zeit auf der Lauge ab. Wird letztere vom Oele getrennt und durch Chlorwasserstoffsäure zersetzt, so entsteht ein weisser Niederschlag, der in Ammoniak sich auflöslich zeigt. In dieser Auflösung in Ammoniak bringt Chlorbaryum einen weissen Niederschlag hervor. Als die Barytverbindung unter einer Glasglocke erwärmt wurde, schied sich daraus noch etwas Lorbeeröl ab, welches an den Wänden der Glocke in Tröpfchen sich verdichtete, die Barytverbindung hatte sich etwas gebräunt, durch Chlorwasserstoffsäure zersetzt, schied sich aber die mit dem Baryt verbundene Säure als ein weisser Niederschlag wieder aus. Ohneachtet mehre Unzen Oel auf diese Weise behandelt wurden, so wurden doch kaum einige Gran der Säure daraus abgeschieden, so daß sie nicht zum Gegenstande einer näheren Untersuchung gemacht werden konnte. Ohne Zweifel ist sie aber dieselbe, die oben bei der Behandlung der balsamartigen Substanz erhalten wurde.

Ein Theil rohes Lorbeeröl wurde mit gepulvertem kaustischem Baryt geschüttelt. Es entstand eine dicke

weisse linimentartige Flüssigkeit, aus welcher durch wiederholtes Auswaschen mit Wasser der Barytüberschuss entfernt wurde, worauf man das Ganze auf ein Filter gab, auf welchem endlich eine schmierige Masse zurück blieb. Da diese ohne Zweifel noch eine Menge unverbundenes Oel enthielt, so wurde sie mit Wasser einer Destillation unterworfen und dadurch das Oel abgeschieden. Der Rückstand wurde durch Chlorwasserstoffsäure zersetzt und eine geringe Menge eines weissen Niederschlages erhalten, der sich, wie die mittelst Kali abgeschiedene, oben erwähnte Säure verhielt, aber auch zu geringer Menge vorhanden war, um eine nähere Untersuchung versuchen zu können.

*Destillation des rohen Lorbeeröls über Kali.*

Wird das rohe Lorbeeröl mit kaustischer Kalilauge einer Destillation unterworfen, so findet beim starken Erhitzen ein lebhaftes Aufbrausen statt und die Destillation muß mit grosser Aufmerksamkeit geleitet werden. Das auf diese Weise destillirte und vom Wasser getrennte Oel hat jetzt einen äusserst feinen campherartigen, dem rectificirten Cajaputöl so ähnlichen Geruch, dass man es wohl damit verwechseln könnte, er ist aber weniger flüchtig und weniger durchdringend. Das über Kali destillirte Oel reagirt nicht sauer. Es wurde durch Chlorcalcium von allem Wassergehalt befreit und dann der Analyse unterworfen. Es wurden erhalten von:

I. 0,359 Grm. Oel = 1,082 Grm. Kohlens. u. 0,372 Grm. Wasserstoff.  
 II. 0,153 „ „ = 0,460 „ „ 0,160 „ „

Hieraus ergiebt sich für die Zusammensetzung des Oels

|                  | I.     | II.    |
|------------------|--------|--------|
| Kohlenstoff..... | 83,075 | 83,133 |
| Wasserstoff..... | 11,204 | 11,621 |
| Sauerstoff.....  | 5,721  | 5,246  |
|                  | 100.   | 100.   |

Das über Kali rectificirte Oel enthält also mehr Kohlenstoff und weniger Sauerstoff als nicht nur das reine Oel, sondern auch das mit bloßem Wasser rectificirte. Ich muß hier bemerken, daß es mir wahrscheinlich ist, daß das Lorbeeröl mit der Zeit, wie andere ätherische Oele, Sauerstoff anzieht und dadurch sich verändert. Es spricht dafür auch der Umstand, daß ein reines Lorbeeröl, welches ich erst kurz zuvor selbst rectificirt hatte und das ich nur über Wasser rectificirt, bei der damit unternommenen Analyse eine Zusammensetzung ergab, die der des über Kali rectificirten wesentlich gleich kam, mithin von dem früher angegebenen, bereits älteren, über Wasser rectificirten, eben so durch einen größeren Gehalt von Kohlenstoff und einem geringeren von Sauerstoff sich unterschied. Dieses Oel gab bei der Analyse nämlich folgendes Resultat:

100 Grm. Oel = 1,000 Grm. Kohlenst. u. 0,343 Grm. Wasser.

Hieraus folgt für die Zusammensetzung des Oels:

Kohlenstoff.....83,791

Wasserstoff.....11,478

Sauerstoff..... 4,731

100.

Dieses ist also wesentlich dieselbe Zusammensetzung wie die des Oels, welches über Kali rectificirt worden ist. Die meisten der vorstehenden Versuche waren im Jahre 1838 bereits beendet, als zu jener Zeit in den *Annalen der Pharmacie Bd. XXVII, 43 u. s. w.* die Fortsetzung einer interessanten Abhandlung von Th. Martius über das natürliche Kampheröl erschien; ich selbst, wie mein damaliger Gehülfe, Hr. Leber, ersahen mit großem Interesse, daß unser Lorbeeröl gerade dieselbe Zusammensetzung habe, als wie Martius und Ricker von dem natürlichen Kampheröle angeben.



Martius und Ricker fanden nämlich, nach den Analysen über das natürliche Kampheröl folgende Resultate:

|       | I.     | II.    | III.   | Mittel |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| C.... | 83,771 | 82,697 | 83,018 | 83,129 |
| H.... | 11,368 | 11,320 | 11,352 | 11,346 |
| O.... | 4,861  | 5,983  | 5,630  | 5,525  |
|       | 100.   | 100.   | 100.   | 100.   |

Meine Versuche über das Lorbeeröl ergeben:

|       | I.     | II.    | III.   | Mittel |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| C.... | 83,075 | 83,133 | 83,791 | 83,334 |
| H.... | 11,204 | 11,621 | 11,478 | 11,434 |
| O.... | 5,721  | 5,246  | 4,731  | 5,232  |
|       | 100.   | 100.   | 100.   | 100.   |

Diese Zusammensetzung entspricht folgender Atomformel:

|                      |          |        |
|----------------------|----------|--------|
| 20 At. Kohlenstoff = | 1528,740 | 83,611 |
| 32 „ Wasserstoff =   | 199,648  | 10,919 |
| 1 „ Sauerstoff =     | 100,000  | 5,469  |
|                      | 1828,388 | 100.   |

Man sieht, daß dieses genau die Formel ist, welche Martius und Ricker vom natürlichen Kampheröl angeben. Ich habe später die Analysen wiederholt und dieselben Resultate erhalten.

Wir haben also das interessante Ergebniss, daß das reine ätherische Oel der Lorbeeren dem natürlichen Kampheröl gleich zusammengesetzt ist. Von dem Zimmtöl weicht dagegen das Lorbeeröl gänzlich ab, denn dieses ist nach den Versuchen von Dumas und Peligot  $C_{16}H_{16}O_2$  und nach Mulder's davon abweichender Analyse  $C_{20}H_{22}O_2$  \*). Mulder fand in zwei Analysen die Zusammensetzung des Zimmtöls:

\*) Vergl. diese Zeitschr. 2. R. Bd. XII, 194, wobei zu merken, daß die früher von Blanchet angestellte Analyse (*Annalen der Pharmacie* VII, 163) mit den Analysen von Mulder wesentlich übereinstimmt.



|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| Kohlenstoff...  | 81,773 | 81,090 |
| Wasserstoff.... | 6,907  | 7,036  |
| Sauerstoff..... | 11,320 | 10,974 |
|                 | 100    | 100.   |

Von dem Cajaputöl weicht das reine rectificirte Lorbeeröl in seiner Zusammensetzung eben so sehr ab, obwohl es demselben im Geruch so sehr ähnlich ist, als das Zimmtöl. Das Cajaputöl ist nach Blanchet \*) zusammengesetzt aus:

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 10 At. Kohlenstoff... | 78,12 |
| 18 » Wasserstoff ..   | 11,49 |
| 1 » Sauerstoff....    | 10,38 |
|                       | 100.  |

Dieses ist merkwürdiger Weise genau die Zusammensetzung, welche die balsamartige Materie besitzt, die bei der Rectification des rohen Lorbeeröls erhalten wird, und das Cajaputöl nähert sich daher in seiner Zusammensetzung dem rohen Lorbeeröl.

Die Fortsetzung der Versuche über das Lorbeeröl, die das interessante Resultat der gleichen Zusammensetzung desselben mit dem Kampheröl gegeben hatten, traf nun die Erforschung seines Verhaltens gegen einige andere Körper. Diese Versuche wurden indess durch verhäufte anderweitige Geschäfte unterbrochen und sind vor einiger Zeit wieder aufgenommen worden.

### *Laurel Oil.*

Unter dem Namen *Laurel oil* ist von England aus das Lorbeeröl in Handel gebracht worden, welches vorzüglich als ein kräftiges Mittel gegen rheumatische Schmerzen empfohlen wurde. Dieses Oel ist schon seit wenig Jahren bekannt. Wenigstens giebt Virey im

\*) Annalen der Pharm. VII, 161.

*Journ. de Pharm.* X, 547, siehe auch dieses Archiv I. XIII, 291, eine Beschreibung von einem natürlichen Lorbeeröl (*native Oil of Laurel*), welches aus dem spanischen Guyana kommen soll. Die Einwohner gewinnen dieses Oel aus einem Baume, welchen sie *Azeyte de Sasafras* nennen und der zur Familie der Laurineen gehört. Dieser Baum soll sehr groß und schön sein, in den Wäldern von Parima und an den Ufern des Orinoco sehr häufig wachsen. Wegen Mangel einer genau botanischen Untersuchung ist es zweifelhaft, ob der Baum zur Gattung *Ocotea*, *Persea*, oder *Litsaea* gehört. Das Oel ist dicklich und bräunlich. Zur Gewinnung desselben werden die eigenthümlichen Gefäße der Rinde aufgeritzt, worauf das Oel ausfließt und von den Einwohnern in Calabassen gesammelt wird. Auch rectificirt ist es schwerer als Alkohol, bleibt dann dunkelrothlich, schmeckt stechend erwärmend, riecht aromatisch dem flüchtigen Oele der Coniferen gleich, verdunstet an der Luft völlig, ist sehr entzündlich und verbrennt ohne Rückstand. Es löst Kautschuk, Wachsharz und Kampher auf, und ist in Alkohol und Aether löslich. Man soll es als *Diureticum* gebrauchen.

Hr. Medicinalrath Dr. Krüger in Pyrmont hat durch einen Freund etwas dieses Oels erhalten, seine Güte verdanke ich eine kleine Probe davon. Das Oel ist nicht das oben erwähnte rohe Oel, sondern, wenn es wirklich davon her stammt, müßte es das rectificirte sein. Es ist nämlich völlig farblos und wasserklar, riecht dem Cajaputöl ähnlich, wie das über Kali destillirte Lorbeeröl. Leider war die Menge dieses Oels, die mir zu Gebote stand, so gering, daß ich keine weiteren Versuche als eine Analyse davon anstellen konnte. Die Analyse gab folgende Resultate:

13 Grm. Oel = 0,957 Grm. Kohlens. u. 0,307 Grm. Wasser.  
Hiernach berechnet sich für die Analyse dieses Oels :

|                  |            |
|------------------|------------|
| Kohlenstoff..... | 77,146     |
| Wasserstoff..... | 9,974      |
| Sauerstoff.....  | 12,850     |
|                  | <hr/> 100. |

Dieses Oel hat nun zwar eine andere Zusammensetzung als das rectificirte Oel der Lorbeeren, nähert aber in seiner Zusammensetzung der dicklichen anartigen Masse, welche bei der Rectification des Lorbeeröls zurückbleibt. Es ist möglich, daß das analysirte *Laurel oil* beim Rectificiren eine Substanz noch würde zurückgelassen haben. Weiters habe ich mich davon überzeugt, daß das *Laurel* den Sauerstoff der Luft leicht anzieht und eine dickere Consistenz annimmt, so daß dieser grössere Gehalt an Sauerstoff vielleicht dieser Eigenschaft des zuzuschreiben ist, und auch die balsamartige Masse dem rohen Lorbeeröl einer gleichen Oxydation ihre Entstehung verdankt. Es ist aber möglich, daß dieses nicht zu der Reihe des Lorbeeröls gehört, sondern Sassafrasöl sich mehr anschliesst, was spätere Versuche ergeben werden.

(Fortsetzung folgt.)

## Ueber die Camphene;

von

*Soubeiran und Capitaine.*

Das Wort *Camphèn* \*) gebrauchen wir als den generischen Ausdruck für diejenige Gruppe der ätherischen

*Camphèn* ist nur der generische Name für alle Verbindungen

Oele, welche aus Kohlenstoff und Wasserstoff in hältnifs der Atome  $= 5 : 8$  bestehen, und die Eigenschaft besitzen, mit Chlorwasserstoffsäure sogenannten natürlichen Kampher zu bilden. Nach bekannten Vergehören zu dieser Gruppe Terpentinöl, Citronöl, wahrscheinlich auch die Oele anderer Hesperiden, ätherische Oel des Copaivabalsams, und wahrscheinlich auch das der Wacholderbeeren und des Pfeffer. Dumas ebenso zusammengesetzt fand; endlich sind Ettlins zwei ähnliche Oele angeführt worden, von denen das eine einen Bestandtheil des Nelkenöls, das andere des Baldrianöls ausmacht. Unsere Kenntnisse über die molekuläre Constitution dieser Oele sind aber von geringem Umfange. Dumas hat gezeigt, daß die Sättigungscapacität des Terpentinöls und Citronöls verschieden ist, daß sie für erstes die Formel  $C_{10}H_{16}$  für das zweite die Formel  $C_{10}H_{14}$  ergiebt. Blomberg hat bewiesen, daß das ätherische Oel des Copaivabalsams einen Kampher giebt, welcher dieselbe Zusammensetzung hat als der des Citronöls. Unsere Vorstellungen über die ätherischen Oele aus der Ordnung der Monophene werden durch die Arbeiten unserer Vorgänger schon so interessanten Geschichte dieser Klasse neue nicht unwichtige Thatsachen hinzufügen.

### *Terpentinöl.*

Die Verbindung des Terpentinöls mit Chlorwasserstoffsäure, bekannt unter dem Namen : künstlicher

---

von  $C_{10}H_{16}$ . Die Endung *en* gebrauchen wir für diejenigen aus Kohlenwasserstoff bestehenden ätherischen Oele, welche mit Chlorwasserstoffsäure eine feste Verbindung bilden; die Endung *ilén* für diejenigen, welche einen natürlichen Kampher liefern.

ist ihrer Zusammensetzung nach von Dumas festgestellt worden, während derselbe aber dafür, daß das Terpentinöl gänzlich in künstlichen Kampher umgeändert werden kann, sind die Beobachtungen der Chemiker, welche mit dieser Untersuchung sich beschäftigten, namentlich von Blanchet und Sell, entgegen, und führen dahin, daß das Terpentinöl zugleich eine feste und eine flüssige Verbindung liefern kann. Dumas betrachtet das Oel, welches als Bestandtheil (Camphen) in der festen Verbindung enthalten ist, als das Oel selbst, während Blanchet und Sell die feste Verbindung andere Eigenschaften und namentlich einen höheren Siedepunct zuschreiben.

Wir haben vielfach Terpentinöl mit Chlorwasser behandelt, aber bei keiner Operation ist uns eine vollständige Umwandlung desselben in künstlichen Kampher vorgekommen. Die Existenz eines flüssigen Terpenkumfers ist hiernach für uns nicht zweifelhaft, wenn man auch mit Dumas annimmt, daß das Terpentinöl unter gewissen Umständen sich vollständig in festen Kampher verwandelt, so bleibt doch sicher, daß es nur eine Ausnahme ist, und daß man fast immer zu jeder Zeit eine feste und eine flüssige Verbindung erhält.

Ueber die Zusammensetzung dieses flüssigen Kamphers wissen wir nichts Bestimmtes. Blanchet und Sell haben, auf die Erwägung gestützt, daß das Terpentinöl und das Oel, welches einen Bestandtheil seines festen Kamphers ausmacht, gleich zusammengesetzt sind, für die Base des flüssigen Kamphers dieselbe Zusammensetzung angenommen, indess keine Analyse darüber angestellt \*).

Vergl. Annalen der Pharm. VI, 277.

Br.



Zur Darstellung des künstlichen Kamphers haben wir rectificirtes und entwässertes Terpentinöl auf gewöhnliche Weise mit Chlorwasserstoffgas behandelt. Nach Abscheidung des festen Kamphers wurde der flüssige Theil, welcher einen grossen Ueberschuss an Chlorwasserstoffsäure enthielt, einige Minuten lang im Wasserbade erhitzt, und dann dem Erkalten überlassen, wodurch sich eine neue Quantität fester Kampher absetzte. Der flüssige Kampher wurde dann mit gepulverter Krebssäure gesättigt, wozu eine nur geringe Menge erforderlich war, und dann noch einer Kälte von  $-4^{\circ}\text{C.}$  und  $-10^{\circ}\text{C.}$  ausgesetzt. Durch jedes Erkalten wurde eine neue Quantität fester Kampher abgeschieden. Die kalte Flüssigkeit hatte eine halbsyrupartige Consistenz; bei einer Wärme von  $15$  bis  $18^{\circ}\text{C.}$  wurde sie aber sehr dünnflüssig; sie enthält gewiss noch etwas festen Kampher, der sehr leichtlöslich ist.

Diesen flüssigen Kampher haben wir der Analyse unterworfen, derjenige, welchen wir anwendeten, war vorher in seinem doppelten Volum Alkohol gelöst, durch gereinigte Thierkohle gebleicht, und dann aus dem Extrakte durch Wasser gefällt, worauf er durch Chlorcalcium getrocknet wurde. Zwei Analysen \*) gaben folgende Resultate :

|                 |           |            |
|-----------------|-----------|------------|
| Kohlenstoff...  | 69,50     | 71,24      |
| Wasserstoff.... | 9,69      | 9,36       |
| Chlor .....     | 20,81     | 19,40      |
|                 | <hr/> 100 | <hr/> 100. |

\*) Die Verbrennung geschah mit chromsaurem Bleioxyd. In diesen wie bei den folgenden Versuchen wurde an Liebig'schen Kaliapparat noch eine kleine Röhre mit Chlorcalcium befestigt, deren Gewichtsvermehrung dem Gewicht der Kohlensäure zugesetzt wurde. Diese Röhre wurde genommen, ehe man Luft durch den Apparat leitete.

Wir finden hier also dieselbe Zusammensetzung, wie des festen Kamphers des Terpentinöls, und es läßt sich hieraus schliessen, 1) daß die Base des flüssigen Kamphers aus denselben Elementen und in denselben Verhältnissen besteht, als das Terpentinöl, 2) daß diese Base des flüssigen Kamphers dieselbe Sättigungscapacität besitzt, als das Oel, welches im festen und flüssigen Kampher mit Chlorwasserstoffsäure verbunden ist. Aus dem vergleichenden Eigenschaft der beiden läßt sich schließen, daß, wenn ihre Basen dieselbe Atomenzusammensetzung haben, ihre molekuläre Constitution doch wesentlich verschieden sein muß.

Ist nun die Base des festen Kamphers, wie Dumas annimmt, das Terpentinöl selbst, oder muß man mit Blanchet annehmen, daß es verschiedene Eigenschaften besitzt? Zur Aufhellung dieses Punctes haben wir das feste Kampher, durch wiederholte Destillation über Aetzkalk, in einer Röhre, die mit Stückchen gepulverten Kalk angefüllt und in eine Temp. von  $195 - 200^{\circ}\text{C}$ . erhalten wurde, dargestellt. Diesen von Chlorwasserstoffsäure völlig befreiten Körper nennen wir Tereben, es ist das *Camphen* von Dumas, das *Dadyl* von Blanchet und Sell.

Das reine über Chlorcalcium getrocknete Tereben siedet bei  $155^{\circ}\text{C}$ ., dieser Siedepunct ist constant, nur gegen Ende der Destillation steigt das Quecksilber ein wenig höher; denselben Siedepunct hat das Terpentinöl. Das spec. Gew. beider Körper ist gleich, und, wie auch schon Dumas gefunden, das spec. Gew. ihrer Dämpfe. Nur im Geruch beider Körper bemerkt man einen geringen Unterschied. Dumas konnte um so mehr die Identität beider Körper annehmen, als er fand, daß das Tereben mit Chlorwasserstoffgas wieder künstlichen

, daß das  
künstliche

Kampher bildet. Unsere Versuche ergaben, daß es dem Terpentinöl ganz gleich verhalte, nämlich, daß wie dieses, zugleich festen Kampher, flüssigen Kampher und mehr oder weniger einer braunen Materie bildet.

Dennoch unterscheidet sich das Tereben vom Terpentinöl wesentlich durch seine Molekular-Constitution. Nach Biot lenkt das Terpentinöl die Strahlen des polarisirten Lichts links ab, und behält diese Eigenschaft in dem festen Kampher unverändert, indem die Richtung und Intensität der Rotationskraft desselben in völligem Verhältniß stehen mit dem darin enthaltenen ätherischen Oele. Ferner aber hat Biot gefunden, daß die Kraft bei dem reinen Tereben beträchtlich geschwächt war. Wir haben nun hierüber, unter Biot's Anleitung Versuche angestellt, welche Folgendes ergaben:

Das Terpentinöl behält sein eigenthümliches Rotationsvermögen auch in dem festen Kampher, und ist dieser Verbindung enthalten, ohne irgend eine Veränderung seines molekulären Zustandes. Das Tereben aber für sich, oder das Oel, welches man durch Zersetzen des festen Kamphers mit Wasser enthält, zeigt kein Zeichen mehr von Rotation, es ist ein ganz neuer Körper mit einer ganz andern Molekular-Constitution, es ist nicht das regenerirte Terpentinöl. Der Umstand, daß Biot im Tereben noch eine geringe Rotationskraft des Terpentinöls fand, liegt darin, daß das von ihm untersuchte Product noch etwas unzersetzten festen Kampher enthielt, wovon wir uns durch eine Untersuchung überzeugt haben.

Das Tereben zeigt einen noch bemerkenswerthen Character. Mit Chlorwasserstoffgas liefert es eine feste Verbindung, die dem festen Kampher des Terpentinöls ganz ähnlich ist; untersucht man aber das Rotations-

mögen dieser neuen Verbindung, so findet man es sauer; das Tereben verbindet sich folglich mit dem Wasserstoff, ohne das ursprüngliche Terpentinöl zu reproduciren.

Wir sehen hier also zwei Körper, bemerkenswerth durch ihre außerordentliche Analogie, man könnte sagen durch ihre physikalischen und chemischen Charaktere, und worin das Molekül doch auf eine verschiedene Weise constituirte ist. Zur deutlichen Unterscheidung dieser Körper wollen wir den Namen Camphen für das Oel nehmen, welches in dem gewöhnlichen künstlichen festen Kampher enthalten, und vielleicht nichts anderes ist, als Terpentinöl, und *Tereben* für dasjenige Oel, welches bei der Zersetzung dieses Kamphers durch Aetzkalk entsteht, und sich in der zweiten Kampherart findet. Das Oel besitzt ein Rotationsvermögen.

Das Oel, welches die Basis des flüssigen Terpentinkamphers ausmacht, ist von Blanchet und Sell mit dem Namen *Peucyl* bezeichnet. Wir werden es unse- rer Nomenclatur gemäß *Peucylen* nennen. Jene Chemiker fanden seinen Siedepunct von dem des Terpen- tinöls verschieden. Unsere Versuche haben andere Re- sultate ergeben. Wir wollen zuerst anführen, daß es nicht gelang, den flüssigen Kampher von allem festen Kampher zu befreien; es gelang uns nur, mittelst Kälte ein reineres Product zu bekommen, als Blanchet und Sell, so daß der Rückhalt von festem Kampher die Annahme der wichtigsten Eigenschaften nicht hindern konnte. Wir haben schon gezeigt, daß dieser flüssige Kampher dieselbe Zusammensetzung hat als der feste, und daß er eine verschiedene Base enthält.

Im flüssigen Kampher ist die Rotation wie im festen, links, aber für das Verhältniß des darin enthal-



tenen Oels schwächer. Wir schliessen hieraus, dass die Materie, welche einen Bestandtheil des Kamphers macht, in dem Terpentinöl nicht präexistirt, sondern durch den Einfluss der Salzsäure sich bildet. Da der flüssige Kampher stets einen festen Kampher zurückhält, so könnte man annehmen, dass sein Rotationsvermögen von diesem Rückhalt an festem Kampher herrührt, also der flüssige Kampher nicht die Eigenschaft besitzt, die Strahlen des polarisirten Lichtes abzulenken, in welchem wir haben uns vielfache Versuche zu der Annahme gefügt, dass er keine so beträchtliche Menge festen Kampher enthalten könne, als es nach dieser Voraussetzung der Fall sein müsste. Es ist daher als erwiesen anzusehen, dass die molekulare Constitution des Oels des flüssigen Terpentin- oder Terpentinkamphers von der des Terpentinöls verschieden ist.

Durch Zersetzen des flüssigen Kamphers mit Wasser erhält man daraus ein Oel, *Terebilen*, welches dem Terpentinöl ganz analog ist; Siedpunkt, spec. Gewicht, Dichtigkeit des Dampfes und chemische Zusammensetzung gleich, beide haben kein Rotationsvermögen, aber das *Terebilen* unterscheidet sich wesentlich vom Terpentinöl dadurch, dass es keinen festen Kampher bildet; die Chlorwasserstoffsäure verbindet sich damit, die Materie wird braun, bleibt aber flüssig.

Die neue Verbindung, welche durch Einwirkung der Chlorwasserstoffsäure auf das *Terebilen* entsteht, ist, hat kein Rotationsvermögen. Das *Peucylen* verhält sich also, wie das *Camphen*, seine Natur, wenn es durch die Verbindung mit Chlorwasserstoffsäure herabgelöst wird, beide sind darin ganz analog.

Was nun die Ansicht betrifft, dass das Terpentinöl zwei verschiedene Oele enthalte, eins, welches in die Bildung des festen, das andere, welches in die des



in Kamphers eingeht, oder daß das Terpentinöl eine solche Zusammensetzung sei, welche durch den Einfluß der Säure eine Veränderung erleide, so müssen wir glauben, bei Erwägung des constanten Siedepunktes des Terpentinöls, daß sein Rotationsvermögen in dem Theil, welcher in den festen Kampher eingeht, sich wiederfindet, während es in dem Theil, welcher in den flüssigen Kampher eingeht, merklich getrübt ist, daß dieser letzte Theil in dem Terpentinöl nicht präexistirt, sondern ein Resultat der Veränderung ist, die das Oel zum Theil erlitten hatte.

Folgende Tafel wird die Polarisationsverhältnisse der bezeichnen.

*Terpentinöl und seine Ableitungen.*

| Substanz.                                  | Dichtigkeit.<br>Wasser = 1. | Länge der<br>Beobachtungs-<br>röhre.<br>Millim. | Abweichung<br>d. Polarisations-<br>ebene d. gelben<br>Strahls. | Molekul. Rota-<br>tionsvermögen<br>d. Flüssigk. auf<br>d. gelben Strahl,<br>für eine Dicke<br>von 100 Millim.<br>u. einer idealen<br>Dichtigkeit = 1. |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terpentinöl...                             | 0,860                       | 78 Millim.                                      | — 29 ′                                                         | — 43°,38 ′                                                                                                                                            |
| Kunstl. Kampher, auf-<br>gelöst in Alkohol | 0,834                       | 78                                              | — 4,433 ′                                                      | — 6,814 ′                                                                                                                                             |
| Kunstl. Kampher ....                       | 1,017                       | 78                                              | — 15,802 ′                                                     | — 19,920 ′                                                                                                                                            |
| Terpent. ....                              | 0,860                       | 78                                              | Unmerklich                                                     | Unmerklich                                                                                                                                            |
| Kunstl. kamph.                             | „                           | „                                               | Unmerklich                                                     | Unmerklich                                                                                                                                            |
| Terpent. ....                              | 0,860                       | 78                                              | Unmerklich                                                     | Unmerklich                                                                                                                                            |
| Kunstl. kamph.                             | „                           | „                                               | Unmerklich                                                     | Unmerklich                                                                                                                                            |

Aus den in dieser Tafel mitgetheilten Beobachtungen ergeben sich folgende Schlüsse.

- 1) Das *Tereben* und *Terebilen* haben eine andere Molekularconstitution, als das Terpentinöl, weil dieses ein beträchtliches Rotationsvermögen besitzt, jene aber keine Rotationskraft haben.

2) Der *feste Kampher* betrug in der Auflösung in Alkohol an Gewicht nur  $\frac{1}{5}$  derselben, das eigentliche Vermögen dieses Kamphers ist also 5mal —  $= -34^{\circ},0727 \frac{1}{2}$ , weil der Alkohol keine merkliche Rotationskraft besitzt.

3) Das Oel des festen Kamphers betr. darin 0,7915. Rotationskraft dieses Oels ist also —  $\frac{34,0727}{0,7915} = -43^{\circ}$ , nahe derjenigen des ursprünglichen Oels gleich.

4) Die Farbe des beobachteten *flüssigen Kamphers* anfänglich roth. Die Abweichung des gelben Strahls hier von der des rothen Strahls abgeleitet, multipl. durch  $\frac{3}{2}$ , gemäß den Gesetzen der Dispersion der Polarisationsebene bei den vorhergehenden farblosen Verbindungen. Die Gewichtsmenge des ursprünglichen Kamphers, welches in diese Verbindung eingeht, ist die nämliche wie beim festen Terpentinkampher, nämlich 0,7915. Die eigenthümliche Kraft dieses Theils des Oels in der Verbindung, ist also —  $\frac{19^{\circ},920}{0,7915} = -25^{\circ},1678 \frac{1}{2}$ , also weit geringer, als die des ursprünglichen Oels.

Aus dem Vorstehenden lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

1) Die Chlorwasserstoffsäure giebt durch ihre Wirkung auf Terpentinöl zwei verschiedene Verbindungen; die eine ist der feste Kampher; das darin haltene Oel (Camphen nach Dumas) hat sein ursprüngliches Rotationsvermögen behalten. Die andere Verbindung ist flüssig, und enthält ein Oel, welches dem Einfluß der Säure eine Modification erlitten hat, wornach es seine chemische Zusammensetzung, Sättigungscapacität noch behalten, indess die optische Eigenschaft verloren hat, festen Kampher zu bilden. Dieses modificirte Oel, welches wir *Peucylen* nennen,

Der flüssigen Kampher ein Rotationsvermögen nach welchem schwächer ist als das des Terpentins.

Die Zersetzung des festen Terpentinkamphers mit Kalk, giebt ein eigenthümliches Oel, welches Du- als Terpentins betrachtet; wir haben ihm den Namen gegeben. Dieses ist dem Terpentins ganz ähnlich, nur hat es *kein* Rotationsvermögen. Dieser Körper mit Chlorwasserstoffsäure wieder einen festen Körper, aber dieser hat ebenfalls nicht die Eigenschaft, Strahlen des polarisirten Lichtes abzulenken.

Der flüssige Terpentinkampher oder das Peucylhydrat hat dieselbe chemische Zusammensetzung wie der feste Kampher, und giebt durch Zersetzen mit Kalk ein Oel, welches die grösste Aehnlichkeit hat mit Terebinthol und dem Terpentins. Dieses neue Oel, welches wir *Terebinthol* nennen, unterscheidet sich in der That vom Terebinthol nur in dem einen Punkte: das Terebinthol giebt keinen festen Kampher; von dem Terpentins aber unterscheidet es sich durch seinen Geruch und seine Rotationskraft null ist.

Das *Camphen*, *Terebinthol*, *Peucylol* und *Terebinthol* bilden eine merkwürdige Reihe von vier isomerischen Körpern, die aus denselben Elementen in denselben Verhältnissen bestehen, dieselbe Sättigungscapazität haben, aber jeder doch einen besondern molekulären Zustand besitzt. Dieses ist vielleicht das merkwürdigste Beispiel von Isomerie, was die Wissenschaft bis jetzt kennt. Das Terebinthol und Camphen sind für den Chemiker dieselben Körper; dieselbe Identität bieten das Terebinthol und Terebinthol dar; die Chemie ist nicht im Stande sie zu unterscheiden und doch ist die molekulare Constitution dieser Körper verschieden.

*Citronöl.*

Das Citronöl, welches zu unsern Versuchen danken wir der Gefälligkeit des Hrn. Mero, De-  
teurs zu Grasse. Dieses Oel wurde durch Destil-  
mit Wasser rectificirt; die erste Hälfte des Dest  
über Chlornatrium entwässert, hielt ein spec. Ge-  
von 0,848. In einer Retorte im Oelbade erhitzt,  
dieses Oel an einem eingetauchten Thermometer 16  
als sich Blasen zu bilden anfangen. Diese Tempe-  
 blieb eine ziemliche Zeit stationär, bis sie später  
175 ° C. stieg, wo die Operation beendet wurde.  
Rückstand des Oels in der Retorte war wenig ge-  
und schien keine merkliche Veränderung erlitten  
haben. Das spec. Gewicht des ersten Products d-  
• Rectification war 0,844, die Dichtigkeit des letztern 0.  
Bei der Rectification einer grossen Menge des Oel  
(Kilogr.) erhielten wir zuletzt ein Oel, dessen Dic-  
keit auf 0,877 stieg. Diese Veränderungen können  
weder von einem Gemenge verschieden flüchtiger  
oder von Veränderungen eines einzigen durch  
Wärme bedingt sein.

Biot hat eine Ablenkung von  $+80^{\circ},484$  für  
Citronöl von 0,848, für eine Länge von 100 Mil-  
und einer idealen Dichtigkeit = 1 gefunden.

Unsere Versuche mit rectificirten Oelen haben  
folgende Resultate gegeben.

Citronöl.

| beobachtete<br>Dichtigkeit.                                     | Dichtigkeit. | Länge der<br>Beobachtungs-<br>röhre. | Abweichung<br>des<br>gelben Strahls. | Rotationsver-<br>mögen für den<br>gelben Strahl<br>für eine Dicke<br>von 100 Millim.<br>und eine ideale<br>Dichtigkeit=1. |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reines Citronöl                                                 | 0,854        | 78 Millim.                           | + 52°,9 f                            | + 80°,916 f                                                                                                               |
| von M. Grasse,<br>reines Product..                              | 0,844        | 78                                   | + 52,5 f                             | + 79°,749 f                                                                                                               |
| das, letztes<br>Product.....                                    | 0,853        | 78                                   | + 52 f                               | + 78,156 f                                                                                                                |
| reines Product<br>nach Rectifica-<br>tion v. 3 Kilogr.<br>..... | 0,877        | 78                                   | + 10,5 f                             | + 15,349 f                                                                                                                |

Auffallend ist das geringe Rotationsvermögen des Citronöls. Wir werden später ein Bergamottöl finden, bei welchem nicht nur die Intensität, sondern auch die Richtung der Ablenkung verändert ist.

Die Dichtigkeit des Dampfes des Oels von 0,844 spec. Gew. fanden wir in zwei Versuchen 0,487 und 0,481, nämlich dieselbe, wie die des Terpentinsöls.

Dumas hat beobachtet, daß fast die ganze Menge des Citronöls sich in festen Kampher verwandelte; von Dumas, Blanchet und Sell erhielten eine ziemliche Menge festen Kampher. Unsere Versuche haben dasselbe Resultat der letzten Chemiker gegeben, so daß unter diesem Gesichtspuncte eine völlige Analogie des Citronöls und des Terpentinsöls besteht.

Der Citronölkampher besteht nach den Analysen von Dumas, Blanchet und Sell aus:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 10 At. Kohlenstoff..... | 57,97 |
| 18 » Wasserstoff.....   | 8,51  |
| 2 » Chlor.....          | 33,52 |

100.



Oder:

|                           |          |        |
|---------------------------|----------|--------|
| Citren .....              | 864,186  | 65,5   |
| Chlorwasserstoffsäure.... | 455,130  | 34,5   |
|                           | <hr/>    |        |
|                           | 1319,316 | 100,0. |

Der feste Kampher des Citronöls ist merklich durch seine leichte Zersetzbarkeit. Schon durch Verdunsten seiner alkoholischen Lösung wird er zum Theil zersetzt. Bei der Destillation aus einer Retorte entdet sich viel Salzsäure ab, bei  $142^{\circ}$  ist die Entwicklung des salzsauren Gases so stark, daß man an ein wirkliches Kochen glauben sollte. Diese leichte Zersetzung macht jeden Versuch zur Bestimmung des Dampfes des Citronkamphers unnütz.

Um zu erforschen, ob das Citronöl in dem festen Kampher seine eigenthümliche Ablenkung nach sich behält, versuchten wir das Rotationsvermögen des Citronkamphers zu bestimmen. Da dieser Kampher in Alkohol schwer löslich ist, so machten wir eine Lösung desselben in Citronöl, dessen Rotationsvermögen durch einen besondern Versuch bestimmt war. Es ergab sich, daß das Oel, welches einen Bestandtheil des festen Kamphers ausmacht (*Citren* nach Dumas) keine Spuren der Rotationskraft mehr zeigt, die dem ursprünglichen Oele angehört. Folgendes sind die Details der Beobachtung.

Das Oel, welches zur Auflösung diente, hatte ein Rotationsvermögen von  $+ 77^{\circ},56 \frac{1}{2}$  für den mittleren gelben Strahl. Die Auflösung bestand aus 1 Theil festem Citronkampher = 0,7401 des Oels, und 2 Theile Citronöl. Die Dichtigkeit der Auflösung war 0,867, die Länge der Röhre 78 Millim., die Rotation ergab sich  $+ 36^{\circ}25 \frac{1}{2}$ . Die Rotation, welche unter denselben Umständen das Citronöl, in welchem der Kampher

ist war, bewirken mußte, würde  $36^{\circ},637$  rechts sein. ergibt sich hieraus, daß die ganze beobachtete Ab-  
 ung dem Auflösungsmittel angehört, und daß das  
 welches einen Bestandtheil des festen Kamphers  
 macht, kein Rotationsvermögen besitzt. Diese That-  
 e ist um so bemerkenswerther, als man das Gegen-  
 el für den festen Kampher des Terpentinöls beobachtet.

Zur Abscheidung des Oels aus dem festen Kampher  
 llirten wir denselben zuerst aus einer Retorte, wo-  
 ed sich ein ziemlicher Theil Chlorwasserstoffsäure  
 nderte, und ließen es dann im Dampfzustande über  
 k strömen, der zu  $180^{\circ}$  erhitzt war, wie bei der  
 stellung des Terebens.

Das erhaltene *Citren* besaß einen Citronengeruch,  
 y weniger angenehm als das Citronöl, seine Dichtig-  
 war 0,847, fast dieselbe wie die des rectificirten  
 onöls. Beim Erhitzen in einer Retorte blieb der  
 epunct bei  $156^{\circ}$  C. einige Zeit beständig, später  
 te sich der Rückstand etwas. Die Dichtigkeit des  
 upfs des Citrens fanden wir 4,73. Cahours hat  
 zu 4,891 bestimmt. Die Dichtigkeit des Dampfs des  
 rens ist also dieselbe wie die des Citronöls und des  
 pentinöls.

Dadurch, daß es nicht die Eigenschaft besitzt, die  
 eahlen des polarisirten Lichts abzulenken, unterschei-  
 es sich vom Citronöl; zwischen diesen beiden Kör-  
 is derselbe Unterschied, als zwischen dem Tere-  
 und Terpentinöl.

Wird das Citren aufs neue mit Chlorwasserstoffgas  
 andelt, so verhält es sich anscheinend dem Citronöl  
 log. es wird gefärbt und liefert einen flüssigen und  
 en festen Kampher. Wegen Mangel an Materie ha-  
 wir nicht untersuchen können, ob das Oel, welches

einen Bestandtheil der neuen festen Verbindung macht, wie das Citronöl die Eigenschaft besitzt polarisirten Lichtstrahl rechts abzulenken, oder wie das Citren dieselbe nicht besitzt, welches scheinlich ist, wegen des Mangels dieser Eigenschaft dem ihm correspondirenden Kampher des Tereben

Wir haben flüssigen Citronenkampher einer von  $-10^{\circ}$  C. ausgesetzt, zur Abscheidung des Kamphers; wir haben den Säureüberschuß entfernt die ihn verunreinigende braune Materie, indem ihn durch eine hohe Schicht reiner Thierkohle fielen, die mit etwas Kreide bedeckt war. Man hier nicht zur Auflösung in Alkohol und Füllen Wasser seine Zuflucht nehmen, weil ein Theil der Wasserstoffsäure würde dadurch abgeschieden werden.

Wir haben die Analyse des flüssigen Citronenkamphers wiederholt unternommen, wir erhielten aber Zahlen, die mit irgend einer wahrscheinlichen analytischen Zusammensetzung in Einklang zu bringen gewesen wären; wir fanden 31 Proc. Chlor, statt 33,5 Proc. die ein mit dem festen Citronenkampher isomere flüssiger hätte haben müssen. Man könnte glauben, daß die Sättigung, wegen möglichen Mangels an Chlorwasserstoffgas nicht weit genug vorgeschritten sei; ließen deshalb 48 Stunden lang durch diesen flüssigen Kampher trocknes Chlorwasserstoffgas strömen, theilten dann das Product in zwei Theile. Der eine wie früher behandelt, gab dem ersten conforme Resultate; der andere Theil wurde mit Wasser geschüttelt dann über Chlorcalcium getrocknet und analysirt gab nun 28,5 Proc. Chlor. Wir hielten uns außer Zweifel überzeugt, daß der flüssige Citronkampher, mit dem wir experimentirten, kein Rotationsvermögen

und die Reaction der Chlorwasserstoffsäure auf das ätherische Oel also ihre Vollendung erreicht hatte. Bei so leichten Zersetzbarkeit dieses Kamphers können wir annehmen, daß er bei der Reinigung einen Theil der Säure verloren habe; und obgleich die Analyse einen Mangel an Chlor ergiebt, so stehen wir nicht an, anzunehmen, daß der flüssige Citronenkampher dieselbe Zusammensetzung habe als der feste, wofür alle Analysen spricht.

Durch Zersetzen des flüssigen Kamphers durch Kalk erhalten wir einen Körper erhalten, den wir *Citrilen* nennen (Citronyl von Blanchet und Sell) und dessen Eigenschaften von denen des Citronkamphers merklich abweichen. Das *Citrilen* hat ein spec. Gew. von 0,88, größer wie das des Citronöls und Citrilens. Sein Siedepunkt bleibt einige Zeit beständig bei 168° C., und nach steigt er auf 175°, die Temperatur, bei welcher die Operation sich vollendet, der Rückstand dann schon merklich gefärbt. Die Dichtigkeit des Dampfes des Citrilens ergab sich aus Versuchen zu 5,08, eine Zahl, die weit von der für die Dichtigkeit des Dampfes sich entfernt; es ist aber zu bemerken, daß ein unterscheidender Character des Citrilens darin besteht, daß es durch Wärme leicht zersetzbar ist, weshalb auch das Oel, welches man nach der Operation im Recept findet, braun gefärbt ist. Wir haben deshalb die Hoffnung aufgegeben, zu einem genügenden Materiale zu gelangen.

Dieser Character wird hinreichen, das *Citrilen* vom Citronöl zu unterscheiden. Uebrigens haben beide ihr Brechungsvermögen auf das polarisirte Licht verloren.

Aus dem Vorstehenden ergiebt sich, daß die Gerüche des Citronöls eine große Aehnlichkeit hat mit

der des Terpentins. Beide geben mit Chlorsäure zwei Verbindungen, eine feste und eine flüchtige, welche isomerisch sind, indessen weichen wesentlich von einander darin ab, daß während Terpentins im festen Kampher sein ursprüngliches Auflösungsvermögen ganz und im flüssigen Kampher einem geringeren Grade behält, das Citronöl, umgekehrt, in keiner seiner chlorsäureverbindungen die Eigenschaft besitzt, die Strahlen polarisirten Lichts rechts abzulenken. Wenn man annehmen könnte, daß das Terpentins unverändert in den festen Kampher übergegangen wäre, so würde hier ergeben, daß das Citronöl in keiner seiner Verbindungen seinen ursprünglichen Molekulargehalt hat. (Vergl. *Journal de Pharmacie* XXI)

(Fortsetzung folgt.)

## Theorie der Aetherbildung, nach H.

Eine neue Theorie der Aetherbildung hat H. aufgestellt (*Poggend. Annal.* XXXVIII, 463); er sucht, diesen Proceß an andere der anorganischen Chemie anzureihen. Viele Metallsalze, wie die Arsen-, Antimon- und Quecksilberoxyde, werden bekanntlich durch Wasser zersetzt, wodurch ein Aether-Salz, unter besondern Umständen auch wohl rein ausgeschieden wird. Man erklärte dieses dadurch, daß das Wasser jene neutralen Metallsalze in saure Salze zerlege. Die Existenz dieser sauren Salze



istens nicht bewiesen. Die Auflösung giebt beim Ver-  
 upfen oft nur neutrales Salz, selten erhält man eine  
 Doppelverbindung des neutralen Salzes mit Säurehydrat,  
 bildet die ganze Menge des Oxydes basisches Salz,  
 er die Auflösung enthält durch die abgeschiedene Säure  
 r wenig neutrales Salz aufgelöst. Eine richtigere Er-  
 klärung dieses Vorganges dürfte sich daraus herleiten  
 lassen, daß das Wasser in diesem Falle als Base wirkt  
 und mit der Säure, die in die Auflösung übergeht, sich  
 verbindet, um so mehr, da die auf die in Rede stehende  
 Base zersetzten Salze meist solche sind, de-  
 ren Basen keine starke basische Eigenschaften besitzen.  
 Noch in anderen Fällen tritt das Wasser als Base  
 auf, und scheidet bisweilen andere Basen aus ihren Ver-  
 bindungen. Da es aber eine schwache und zugleich flüch-  
 tige Base ist, so sind diese Fälle nicht häufig. So wird  
 die Auflösung von schwefelsaurem Ammoniumoxyd durch  
 langes Kochen sauer und entwickelt etwas Ammoniak,  
 und das Wasser das Ammoniumoxyd (das im freien Zu-  
 stande nicht bestehen kann, und sich in Ammoniak und  
 Wasser zersetzt) aus seiner Verbindung mit der Schwe-  
 felsäure austreibt und mit dieser sich verbindet, obwohl  
 r wenig schwefelsaures Ammoniumoxyd auf diese  
 Base zersetzt wird, da das Ammoniumoxyd zu den  
 stärkeren Basen gehört, und dieser Erfolg seiner leicht-  
 eren Flüchtigkeit zuzuschreiben ist.

Die Aethyloxydsalze (die zusammengesetzten Aether-  
 salze) werden nun durch Basen, bei Gegenwart von  
 Wasser, mehr oder minder leicht zersetzt; sie verbind-  
 en sich mit der Säure des Aethylsalzes und das Aethyl-  
 oxyd scheidet sich als Hydrat (Alkohol) ab. Eben so  
 wirkt aber auch das Wasser für sich, und mehrere Aethyl-  
 salze werden durch Wasser eben so leicht zersetzt als

so  
 e Aethyl-  
 zersetzt als

durch Basen, wie z. B. Oxaläther durch Wasser in Oxalsäurehydrat und Alkohol zerlegt wird.

Die ganze ähnliche Zerlegung erleidet auch das saure schwefelsaure Aethyloxyd oder vielmehr die Verbindung des schwefelsauren Aethyloxydes mit Schwefelsäurehydrat (Schwefelweinsäure), in deren wässriger Lösung schon bei gewöhnlicher Temp. nach und nach Alkohol und Schwefelsäurehydrat entstehen, schnell beim Kochen. Auch dieser Proceß läßt sich einfach durch die Annahme erklären, daß das Wasser als Base das Aethyloxyd aus seiner Verbindung mit Schwefelsäure austreibt, welches im Augenblick der Ausscheidung Wasser aufnimmt und Alkohol bildet.

Die Lösungen fast aller schwefelweinsauren Salze in Wasser werden, besonders beim Kochen, ähnlich zerlegt. Alkohol und Wasser werden verflüchtigt und bei der Auflösung bleibt ein sogenanntes saures schwefelweins. Salz, d. h. eine Verbindung des in dem schwefelweins. Salze schon präexistirenden neutralen Salzes mit Schwefelsäurehydrat.

Erhitzt man Schwefelweinsäure mit nur wenig Wasser, so erhält man wasserhaltige Schwefelsäure und Aethyloxyd (Aether), es bildet sich kein Alkohol, weil es an Wasser fehlt, um den ausgeschiedenen Aether in Alkohol zu verwandeln. Die Schwefelweinsäure oder vielmehr das Doppelsalz von neutralem schwefelsauren Aethyloxyd mit Schwefelsäurehydrat entsteht bekanntlich durch Vermischen von Alkohol mit Schwefelsäurehydrat. Durch die Bildung von schwefelsaurem Aethyloxyd werden 1 Mol. Wasser frei, eins aus dem Schwefelsäurehydrat, das andere aus dem Alkohol. Beim Erhitzen in dieser Mischung nun scheidet das eine dieser beiden freien Atome Wasser das Aethyloxyd aus seiner Verbindung aus.

Schwefelsäure aus und es entsteht Schwefelsäurehydrat. In diesem Falle der Aether sich nicht als Alkohol scheidet, obgleich noch ein Atom Wasser da ist, kann darin liegen, daßs dieses von der Schwefelsäure, die als ein Hydrat bildet und in krystallisirtem Zustande 2 At. Wasser enthält, und dann einem basischen schwefelsauren Salze entspricht, dieses Atoms Wasser ist noch bemächtigt. Wird die Mischung aber kochend gekocht, so verliert das Schwefelsäurehydrat das aufgenommene Wasser, das dann gemeinschaftlich dem Aether destilliren kann, als Producte nicht eines, sondern zweier chemischen Processe, die neben einander in der kochenden Mischung thätig sind.

Im Anfange der Destillation des Gemisches von Schwefelsäure und Alkohol geht mit dem Aether und dem nicht in Schwefelweinsäure verwandelten Theil Alkohols nur wenig Wasser über, was sich später, besonders in der höheren Temp., wenn die Menge des zweiten Hydrats der Schwefelsäure zugenommen hat, vermehrt. Mit wasserhaltigem Alkohol, den man bei der Aetherbereitung in der Regel anwendet, der nicht der Kälte, sondern erst in höherer Temp. mit Schwefelsäure Schwefelweinsäure bildet, erhält man bei Dest. der Mischung mit Schwefelsäure Aether, aber immer noch Alkohol, da selbst bei wasserfreiem Alkohol beinahe ein Theil nicht in Schwefelweinsäure verwandelt wird. Dieser Theil des Alkohols kann aus dem Gemisch als Alkohol abdestillirt werden; ein anderer Theil aber, der gemeinschaftlich mit dem Aether überdestillirt, kann nur dadurch entstehen, daßs Aether und Wasser bei ihrer gleichzeitigen Entwicklung aus dem Gemisch zu Alkohol verbunden werden. Denn ist Aether einmal aus einer Aethyloxydverbindung frei geworden,

ist Aether  
geworden.

so verbindet er sich nicht mehr mit Wasser, und dieses findet nur statt, wenn der Aether scheidungs-momente mit Wasser in Berührung kommt. Wenn daher durch die Neigung des Schwefelhydrats, noch mehr Wasser aufzunehmen, und eine Menge von Alkohol und Schwefelsäure Aether bildet hat, so nimmt derselbe, nachdem er ausgekocht ist, nicht mehr das Wasser auf, was durch die Einwirkung der verdünnten Schwefelsäure abdestillirt wurde. Die gleichzeitige Verflüchtigung von Aether und Wasser aus einer kochenden Mischung von Alkohol und Schwefelsäurehydrat zeigt daher ganz deutlich, dass diese beiden Componenten ihren Ursprung von zwei verschiedenen Processen haben.

Um zu sehen, bei welcher Periode der Aether sich aus dem Wasser anfängt überzudestilliren, stellte Wittstock darüber Versuche an. Es wurden 2 Pfd. Schwefelsäurehydrat mit 2 Pfd. wasserfreien Alkohol in einer Retorte möglichst schnell zum Kochen gebracht, und das Destillat in gebrochenen Portionen gesammelt. Es wurden im Ganzen ohngefähr 21 Unzen abdestillirt. Die erste Portion, welche aufgefangen war, ehe die Mischung den Kochpunct erreicht hatte, bestand aus Aether mit nur wenig Weingeist, gegen die herrschende Ansicht, dass Aether sich erst beim Kochen des Alkohols bildet. Erst bei der sechsten Portion, als ohngefähr 15 Unzen abdestillirt waren, zeigte sich so viel Wasser, dass es sich abschied, und vermehrte sich nun fortwährend auf der Destillation, bis die letzte Portion fast reines Wasser bestand und Weinöl enthielt, und nach dem Abdampfen nach Essigsäure roch.

Einige haben angenommen, dass die Bildung von Aether aus Schwefelweinsäure zur Aethererzeugung nicht nöthig sei, weil das kochende Gemenge, worin man

neuen Methode der Aetherdarstellung den Alkohol kochen läßt,  $140^{\circ}$  C. Temp. habe, bei welcher die Schwefelweinsäure nicht existiren könne. Aber an der Stelle, wo der Alkohol in das kochende Gemenge fließt, ist die Temp. nicht  $140^{\circ}$ , und es wird hier Schwefelweinsäure gebildet, die aber natürlich bald die Temp. der kochenden Flüssigkeit annimmt und dann zersetzt wird. Die Aetherbereitung nach dieser Methode ist also eine fortwährende Bildung und Zersetzung von Schwefelweinsäure.

Die Ansicht, daß die Aetherbildung aus einem Gemenge von Alkohol und Schwefelsäure durch das Kochen schon bei einer bedeutenden Temp. von ungefähr  $140^{\circ}$  C. beginnt werde, ist durchaus irrig. Ein Gemenge von Schwefelsäurehydrat und wasserfreiem Alkohol, selbst Alkohol von 90 % Tralles giebt Aether bei Temperaturen, die noch unter dem Siedepuncte des Wassers sind, wie dieses aus von Wittstock deshalb angestellten Versuchen sich ergibt. Bei  $75 - 80$  und  $90 - 95^{\circ}$  R. stillte aus einem solchen Gemenge der Aether über, und mit den letztern Portionen erschien Wasser. Auch das Destillat, was bei der Temperatur, die niedriger als der Siedepunct des Gemenges, erhalten wird, mit etwas Wasser und weniger Alkohol vermischt, und also auch reiner, wenn man wasserfreien als wasserhaltigen Alkohol anwendet, da im letztern Falle mehr Alkohol mit überdestillirt, weil beim Vermischen des wasserhaltigen Alkohols mit Schwefelsäure weniger Alkohol in Schwefelweinsäure verwandelt, und mithin mehr im freien Zustande im Gemenge bleibt, als bei Anwendung von absolutem Alkohol.

Die Thatsache, daß der Aether aus einem Gemenge von Alkohol und Schwefelsäure schon beim Siedepuncte



des Wassers erzeugt wird, ist für die Theorie der Aetherbildung wichtig, indess kann sie nicht auf die Darstellung des Aethers sich anwenden lassen, weil in der niedrigen Temp. die Destillation äusserst langsam erfolgt.

Bei der hier angeführten Theorie scheint es auffallend, dass das Wasser als eine schwache Base, das Aethyloxyd aus seinen Verbindungen austreibt, während die Auflösung der Salze der Schwefelweinsäure mit Kalium und Natron mit dem Ueberschuss dieser Basen behandelt werden können, ohne dass Aethyloxyd sich abscheidet; auch die Salze der alkalischen Erden können neben überschüssiger Base bestehen. Es scheint indessen ein Unterschied zwischen dem Verhalten der Doppelverbindung von Schwefelhäurehydrat mit schwefelsaurem Aethyloxyd und den übrigen schwefelweinsäuren Salzen zu finden. Erstere wird weit leichter durch Wasser zerlegt als letztere. Diese Thatsache ist nicht ohne Analogie. Wasser kann viele Salze des Antimonoxys zersetzen und letztes als basisches Salz ausscheiden, aber die Verbindungen des Antimonoxys mit Weinsteinsäure und anderen nicht flüchtigen organischen Säuren werden durch Wasser nicht zersetzt.

Wenn nach der früheren Methode Aether durch Destillation eines Ganges von gleichen Gewichten Schwefelsäure und Alkohol dargestellt wird, so muss mit dem Abdestilliren des Alkohols und Aethers die Menge der Schwefelsäure überwiegender werden, die dann auf den ausgeschiedenen Aether selbst zersetzend wirkt und ihn erst in eine Doppelverbindung von schwefelsaurem Aethyloxyd mit schwefelsaurem Aetherol (Weinöl) und endlich durch die zu grosse Menge des Schwefelsäurehydrats in Elaylgas (ölbildendes Gas) verwandelt. Obschon die Vergleichung der Zusammensetzung dieser Substan-

mit der des Aethers sollte schliessen lassen, dass Bildung auf einer bloßen Wasserentziehung durch Einwirkung der Schwefelsäure beruhe, so kann die- doch nicht sein, weil mit dem Auftreten der gering- sten Spur von Weinöl Schweflichtsäure erscheint, deren Menge zunimmt, wenn ölbildendes Gas sich erzeugt. Diese Körper entstehen unstreitig durch eine ähnliche Wirkung auf den Aether, als diese Säure auf andere organische Körper bei höheren Temp. ausübt. Auch der kohlenartige Körper, welcher die Schwefelsäure schwarz färbt, und der von Erdmann und Lose näher unter- sucht worden ist\*), hängt mit der Bildung der Schwe- felsäure des Weinöls des ölbildenden Gases zusammen; diese Körper sind das Resultat eines andern Processes, nicht mit der Bildung des Aethers wohl nichts gemein, sondern die Zersetzung des Aethers durch die Schwefelsäure ist. Es ist aber auch möglich, dass nicht der Aether als solcher zersetzt wird, sondern Aether, welcher noch von der Schwefelsäure als Isäthionsäure oder Äthionsäure zurückgehalten wurde, und dann aus die- sem mittelst eines Uebermaasses von Schwefelsäure und bei hohen Temp. die Producte entstehen, die neben dem Aether erzeugt werden, wenn die Destillation längere Zeit in erhöhter Temp. fortgesetzt wird, nämlich kohle- artige Substanz, Schweflichtsäure, Weinöl und ölbil- dendes Gas. Bei der neuen Methode der Aetherdestil- lation vermeidet man die Entstehung dieser Producte gänzlich. Man verhindert durch das Nachtröpfeln von Alkohol, dass ein Uebermaass von Schwefelsäure auf den Alkohol, oder vielmehr auf die Isäthionsäure, wirken kann.

\*) Poggend. Annal. XXXXVII, 619.

Der früheren Erklärungsart, dass die Aetherbildung auf Wasserentziehung beruhe, konnte man mit Recht den Vorwurf machen, dass andere Körper als Schwefelsäure, die ebenfalls starke Verwandtschaft zur Schwefelsäure haben, wie Kalihydrat, Chlorcalcium u. s. w. nicht vermögen, den Alkohol in Aether umzuwandeln. Dieser Einwand fällt jetzt weg, da man weiß, dass nicht durch diese Wasserentziehung, sondern durch die Zersetzung der Schwefelweinsäure der Aether gebildet wird.

Wenn man den Aether für eine Base hält, so können alle Theorien über die Aetherbildung die paradoxe Erscheinung nicht genügend erklären, dass eine Base aus einer stark sauren Flüssigkeit nur durch eine stärkere Säure ausgetrieben wird. Nur nach der hier gegebenen Erklärung und durch die Analogie, welche die Abscheidung des Aethers und der Schwefelweinsäure mit der Zersetzung vieler unorganischer Salze mittelst Wassers hat, so wie die oben angeführte Analogie des Aethers mit einer Reihe von Oxyden, welche sich nicht oder schwer mit Säuren verbinden, verliert diese Erscheinung das Anomale.

Die erörterte Theorie gilt zwar nur für die Bildung des Aethers aus einem Gemenge von Alkohol und Schwefelsäure; sie wird aber unstreitig auch für die des Aethers aus Gemengen von Alkohol mit Phosphorsäure und Arseniksäure gelten. Unausgemacht lässt es Rose noch, ob die Bildung des Aethers durch Behandlung von Alkohol mit Fluorborgas, so wie mit Zinkchlorid durch eine bloße Wasserentziehung mittelst dieser Substanzen erklärt werden muss, oder auf die Weise, dass dieselben mit dem Alkohol bei gewöhnlicher Temp. Verbindungen analog der Schwefelweinsäure, bilden, die bei erhöhter

np. durch das Wasser zersetzt werden, welches letzte wahrscheinlichsten sein möchte.

---

## Ueber die Erscheinungen der Gährung, Fäulniss und Verwesung, und ihre Ursachen, nach *Liebig*.

---

In einer interessanten Abhandlung (*Poggend. Annal.* XXVIII, 106) hat Liebig seine Ansichten über diese wichtigen Gegenstände ausgesprochen, die, obwohl sie vielen ausgezeichneten Gelehrten bekanntlich zum Vorstande ihrer Forschungen genommen wurden, doch der Einsicht entbehren, die das Ziel der Forschung bei der Wichtigkeit dieses Gegenstandes wollen. Die Hauptmomente dieser scharfsichtigen Untersuchungen hervorzuheben suchen.

Die vier Elemente der organischen Verbindungen, Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff besitzen, wie Erfahrung und Versuche zeigen, wo diese Körper mit einander in directe Verbindung gebracht werden, ungleiche Grade von Anziehung zu einander. Darin liegt ihr chemischer Character, mehr oder weniger in diese Verbindungen zu bilden, den sie behaupten, in welcher Form sie auch zu dem Zusammengesetzten sich vereinigen.

Die organischen Verbindungen haben ihren Character in der eigenthümlichen Form, in welcher ihre Elemente vereinigt sind. Es ist darin ein zusammengesetztes Radikal enthalten, und ihre Verschiedenheit bei



gleicher oder ungleicher Zusammensetzung ist ausschließlich abhängig von der Form und Zusammensetzung der Radikale.

In der Construction eines organischen Atoms zweierlei Arten von Anziehung angenommen werden.

1) *Die Anziehung des aus Kohlenstoff und Stickstoff und Kohlenstoff und Wasserstoff, Stickstoff und Wasserstoff u. s. w. zusammengesetzten Radikals zu dem Sauerstoff oder den andern einfachen oder zusammengesetzten Radikalen, mit denen es verbunden ist.*

2) *Die besondern, höchst ungleichen Grade der Anziehungen, welche die Elemente, der Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff, zu einander besitzen.*

In dem organischen Atom sind also zwei Kräfte thätig. Die überwiegende Verwandtschaft des Kohlenstoffs, wodurch die Bestandtheile der Verbindung in bestimmter Ordnung erhalten werden, die also der Ursprung der Eigenthümlichkeit der Verbindung ist, und die gleiche Verwandtschaft der Elemente, die diese Eigenthümlichkeit zu vernichten strebt. Den Einfluß der speciellen Verwandtschaften auf das Bestehen des organischen Atoms kann man *chemische Differenz* nennen.

Das organische Atom kann sonach auf zwei Weisen verändert werden: 1) durch eine in ihm liegende Ursache, wenn die chemische Differenz, durch die die Elemente zu einfacheren Verbindungen in Uebergewicht erhält; 2) durch fremde Ursachen, wodurch hervorgebrachte neue Ordnung der Elemente man *organische Metamorphosen* nennt, die von andern Zersetzungsweisen darin sich unterscheiden, daß die Elemente an der Umsetzung Theil nehmen und folglich kein einzelnes Element abgeschieden wird.

Mit der Zahl der Atome der Elemente in einer Verbindung



nischen Atom wachsen die speciellen Anziehungen Elemente, und damit schreitet die Leichtigkeit des Writts einer Metamorphose fort.

Wo die Verwandtschaft des Radikals die speciellen Anziehungen der Elemente unter einander übertrifft, hat die organische Verbindung einen bestimmten chemischen Charakter (sauer, basisch, neutral). In den complexen Verbindungen aber, wo die Verwandtschaft des Radikals die speciellen Anziehungen der Elemente unter einander im Gleichgewicht gehalten wird, erhält die organische Verbindung einen unbestimmten chemischen Charakter (sauer gegen starke Basen, basisch gegen starke Säuren, amphoter.)

Die Störung, welche die Metamorphosen bedingt, ist die Auflösung des Gleichgewichts in der Anziehung des Radikals zu den Elementen oder den Radikalen, mit denen es verbunden ist, in Folge gesteigerter chemischer Einwirkung, wird bewirkt:

- 1) durch Aenderung des Cohäsionszustandes, welche die Elemente mehr oder weniger durch den Einfluß der Wärme erfahren;
- 2) durch Berührung mit einem dritten Körper, der eine neue Verbindung hierbei eingeht;
- 3) durch Hinzutreten der Elemente des Wassers;
- 4) durch gleichzeitiges Zusammentreffen mehrerer dieser Ursachen.

Die hierdurch entstehenden Metamorphosen sind entweder ein Zerfallen eines complexen Atoms in zwei oder mehrere zusammengesetzte Atome von gleicher oder ungleicher Zusammensetzung (*Polymorphose*) oder ein Zusammentreten von zwei oder mehreren einfacheren Atomen zu einem einer höhern Ordnung (*Symmorphose*), z. B. das Zusammentreten von 3 At. Cyan zu 1 At.

Paracyan, die Verwandlung des cyansauren Am in Harnstoff u. s. w.

Diese Ursachen bedingen die Metamorphose organischen Atome, die Umsetzungen ihrer Elemente in allen den Fällen, die von den gewöhnlichen chemischen Zersetzungen abweichen, und wozu wir eine Menge Erfahrungen besitzen. Wenden wir uns jetzt zu den Ursachen derjenigen Metamorphosen, die man gemeinen mit *Verwesung*, *Fäulniss*, *Gährung* und *Vermoderung* bezeichnet.

*Diese Ursache ist die Fähigkeit, welche ein Körper in einer chemischen Verbindung besitzt, in einem andern Körper dieselbe Thätigkeit hervorzurufen, die er selbst erfährt.*

Unter *Verwesung* (*Eremacausie*, von ἡρέμα, Ruhe und καυσίς, Verbrennen) versteht man im Allgemeinen Veränderungen der organischen Materien bei Zutritt von Sauerstoff oder einer dieser nur wenig übersteigenden Bedingungen, die nur im befeuchteten Zustande und bei Zutritt von Sauerstoff statt finden kann. Wird dabei der Zutritt von Sauerstoff durch Wasser abgeschlossen, so findet *Fäulniss* statt. Bei behindertem Zutritt von Sauerstoff und bei Zutritt von Wasser tritt *Fäulniss* und *Verwesung* gleichzeitig ein, *Vermoderung* (*Aposepsie*). *Gährung* nennt man die Veränderung vegetabilischer Substanzen, welche dabei einen unangenehmen Geruch verbreiten.

Nach dem bekannten Verhalten der Elementenorganischer Körper muß man annehmen, daß in einem aus C, H und O zusammengesetzten organischen Körper Theil oder aller Wasserstoff, als der verbrennliche Bestandtheil, zuerst und ausschließlich mit dem

Der Sauerstoff sich verbindet zu Wasser; der Sauerstoff der Substanz bleibt mit den übrigen Elementen entweder zu einem oder mehreren an Sauerstoff ärmeren Verbindungen vereinigt, oder er verbindet sich mit einem Theile des Kohlenstoffs der Materie zu Kohlensäure, die sich von den übrigen Elementen trennt. Der Kohlenstoff der Substanz geht allein und direct nicht eher eine Verbindung mit dem einwirkenden Sauerstoff ein, als bis aller vorhandene Wasserstoff in Wasser verwandelt ist. Wird aber mehr Sauerstoff aufgenommen, als der Sauerstoff des in Wasser verwandelten Wasserstoffs entspricht, so ist ein wasserstoffärmeres Oxyd entstanden, welches die Fähigkeit besitzt, Sauerstoff aufzunehmen und zu einer höheren Oxydationsstufe überzugehen.

Diese Regeln stützen sich auf die beiden ausschliessend studirten Verwesungsprocesse: die Essigsäurebildung aus Alkohol und die Humusbildung aus verwesenden vegetabilien.

Bei der Verwesung des Alkohols werden durch den einwirkenden Sauerstoff zwei Aequivalente Wasserstoff aufgenommen und zu Wasser; ein an Wasserstoff ärmeres Oxyd, *Aldehyd*, bleibt übrig, welches allen Sauerstoff des Alkohols enthält, und nun bei weiterer Einwirkung des Sauerstoffs noch 2 Aequivalente Sauerstoff aufnimmt und dadurch in Essigsäure sich verwandelt.

Bei der Verwesung des Holzes wird für jedes Vol. aufgenommenen Sauerstoffs 1 Vol. Kohlensäure abgetrieben. Wäre die Kohlensäurebildung in diesem Falle eine Folge der directen Oxydation des Kohlenstoffs, so müsste eine Materie zurückbleiben von grösserem Wasserstoff- und geringerem Kohlenstoffgehalt, was nicht der Fall ist, sondern es bleibt eine Substanz zurück, welche die Elemente des Wassers und mehr

Kohlenstoff enthält, als der Körper, aus dem sie gebildet hat. Der aufgenommene Sauerstoff ist also den Wasserstoff getreten, während die Kohlensäure der Holzfaser herrührt. Drückt man die Zusammensetzung des Holzes durch die Formel  $C_{36}H_{48}O_{12}$  so werden 24 At. H durch 12 At. O als Wasser genommen. Von den übrig gebliebenen  $C_{36}H_{12}$  werden 6 At. Kohlensäure abgeschieden, wonach *mus, Ulmin*, eine an Kohlenstoff reichere Verbindung zurückbleibt,  $C_{30}H_{24}O_{12}$ , welche Wasserstoff und Sauerstoff nicht in der Form von Wasser enthält, und leicht weiter verwesen, oder durch Einwirkung von Sauerstoff weiter sich verändern kann. Denkt man aus der ursprünglichen Formel des Holzes allen Wasserstoff weggewonnen und allen Sauerstoff als Kohlensäure dem Holze abgeschieden, so bleiben  $\frac{2}{3}$  von dessen Kohlenstoff in mehr oder weniger fein zertheiltem Zustande übrig, *Moder*, der in Verbindung mit Sauerstoff und Wasserstoff in Form von Wasser den Hauptbestandtheil des Torfs und der Braunkohle ausmacht.

Die Fäulniß entsteht in Folge einer Störung des Gleichgewichts in den Anziehungen der Elemente des complexen organischen Atoms. Das Endresultat der Umsetzung ist eine neue Ordnung der Elemente, welche abhängig von der besondern Verwandtschaft, die sie zu einander haben, indem keine Art von Prädisposition auf sie einwirkt; sie erfolgt nur bei Gegenwart von Wasser, dessen Elemente meistens Antheil an dieser Umsetzung nehmen. In dieser Beziehung sind die Producte der Fäulniß ähnlich den Producten, die sich durch den Einfluß der Wärme auf organische Materien bilden.

Feuchte vegetabilische Materien verwesen an feuchter Luft, der Sauerstoff, den sie daraus aufnehmen, ver-

sich mit ihrem Wasserstoff zu Wasser, der Sauerstoff, den sie selbst enthalten, mit einem Theil ihres Kohlenstoffs zu Kohlensäure, die als Gas sich entbindet. In einer Atmosphäre von Wasserstoffgas hört die Verwesung dieser Materie auf, sie gehen in Fäulniß über; eben so, wie in der Luft, entwickeln sie Kohlensäure, und Sauerstoff aus ihrer Substanz, also nicht von der Atmosphäre hergenommen wird. Unter Wasser faulende Pflanzenfaser (Sümpfe) entwickelt Kohlensäure und Kohlenwasserstoffgas. 1 At. Holz und 3 At. Wasser enthalten die Elemente von 6 At. Kohlensäure und 6 At. Sumpfgas. Braunkohlen und Torf sind in Folge der Verwesung der Holzfaser entstanden; durch *Verwesung* trennte sich entweder ein Theil des Wasserstoffs, durch Fäulniß der Sauerstoff derselben von den Elementen des Holzes. Die letztere Metamorphose in einer etwas erhöhten Temperatur und unter hohem Druck vor sich, so mußte auf der einen Seite ungeheure Massen von Kohlensäure, auf der andern Ablagerungen von Kohlenstoff entstehen, die einen Theil des Wasserstoffs der Substanz enthalten; die Steinkohlen und mehrere Arten von Braunkohlen sind diese Ueberreste der Metamorphose des Holzes. Die gegenseitige Beziehung läßt sich jetzt leicht nachweisen. Die Splintkohle von Newcastle und die Cannelkohle von Lancashire ist  $C_{24} H_{26} O = C_{24} H_{10} + H_2 O$ ; das ist die Zusammensetzung des Ulmins, aus dem sich die Elemente von 6 At. Kohlensäure gewant haben. Die Backkohle von Caresfield bei Newcastle ist aus Cannelkohle entstanden, indem sich von den Elementen derselben die Bestandtheile von 4 At. Kohlenstoff und 8 At. Wasserstoff abgeschieden haben. Wenn man diese Entwicklungen auch nur als Verwesungen betrachten will, so ist es jedenfalls merk-



würdig, daß die sogenannten bösen Wetter in Braunkohlengruben nicht aus entzündlichen Gasarten sondern aus Kohlensäure bestehen, und alle Braunkohlen von dem Vogelsberg durch die Wetterau längs dem Main bis nach der Eifel, ohne Ausnahme, von Kohlensäurequellen begleitet sind, aus denen sich die Sauerlinge in der Gegend an allen Orten bilden, wo Quellen süßem Wasser zu Tage kommen.

In den animalischen Materien geht die Metamorphose der Fäulniß leichter von statten, als in vegetabilischen, weil die chemische Differenz ihrer Bestandtheile und die Zusammensetzbarkeit ihres Atoms größer ist. Die größere chemische Differenz liegt in der Verwandtschaft des Kohlenstoffs oder des Kohlenstoffs und Wasserstoffs zum Sauerstoff einerseits und der engen Verwandtschaft des Stickstoffs zum Wasserstoff andererseits. Alle sehr zusammengesetzte stickstoffhaltige Materien, in welchen die chemische Differenz ihrer Elemente überwiegend ist, erleiden unter Zutritt von Wasser schon bei gewöhnlicher Temp. die Metamorphose in Fäulniß. *Cyan* zerfällt dadurch in Oxalsäure und Ammoniak, *Blausäure* in Ameisensäure und Ammoniak, *Cyansäurehydrat* in Kohlensäure und Ammoniak; *blausaures Ammoniak*, *blausaures Ammoniak*, die hier zugleich entstehen, sind Producte gewöhnlicher chemischer Zersetzung. *Harnstoff*, *Paracyanwasserstoff* und *Paracyansäure* sind Producte einer Symmorphose.

Viele stickstoffhaltige Materien, welche Bestandtheile von Pflanzen und Thieren ausmachen, wie Eiweiß und Pflanzensäfte, erleiden von dem Augenblicke an, wo sie aufhören dem lebenden Organismus anzugehören, durch Luft und Wasser eine fortschreitende Veränderung. Die Fäulniß dieser Materien zerfällt in mehrere Perioden; die anfangs gebildeten Materien ver-

winden gegen Ende der Metamorphose. Kohlensäure, Ammoniak und ein humusartiger Körper sind die letzten Producte derselben.

Stickstofffreie organische Materien gehen, mit wenigen Ausnahmen, nicht von selbst sondern nur bei Gegenwart von in Fäulnifs begriffenen organischen Substanzen, wie faulendes Muskelfleisch, Harn, Osmazom, Eiweiß, Käse, Gliadin, Kleber, Legumin, Blut und vor dem Ferment, in Gährung.

Das Ferment entsteht in Folge einer Veränderung zuckerhaltigen Pflanzensäften, die an der Luft fermentirt, und bei Abschluß derselben bis zu einem gewissen Punkte fortfährt; aller Stickstoff des Eiweißs, Harns und Pflanzenleims findet sich in dem entstandenen Ferment; es ist also in Folge einer Veränderung dieser Materien entstanden. Alle Untersuchungen beweisen, daß das Ferment eine leicht veränderliche Materie ist, die in ununterbrochener Fäulnifs und Verwesung sich auflöst. Den Sauerstoff der Luft verwandelt es in Kohlensäure und entwickelt noch Kohlensäure aus seichthigen Masse; unter Wasser giebt es dabei übelriechende Gasarten aus und wird zuletzt in eine alte ähnliche Masse verwandelt, wo es dann seine Fäulnisfähigkeit, Gährung zu erregen, verloren hat.

Zur Erhaltung der Eigenschaften des Ferments ist eine Bedingung. Schon durch bloßes Auspressen wird seine Eigenschaft, Gährung zu bewirken, verlohren, durch Austrocknen wird sie vernichtet, wie auch alle Substanzen, welche der Fäulnifs entgegenwirken, mithin auch der fortschreitenden des Ferments. Das Ferment mit ausgekochtem dest. Wasser ausgekocht, so daß es stets davon bedeckt bleibt, so bringt man den Rückstand, der unlösliche Körper des Ferments, die

*Gährung in Zuckerwasser nicht mehr hervor.* Digenschaften hat aber nun das Waschwasser, es sie aber in Verlauf von wenigen Stunden die Veränderungen, die es dadurch erfährt. Ein heftiger Guß von Ferment bringt nur dann Gährung in Wasser hervor, wenn er der Luft zuvor ausgesetzt wird, wodurch er Sauerstoff absorbiert und dann Kohlenstoff enthält; ohne zuvor der Luft ausgesetzt gewesen bewirkt er keine Gährung. Das Ferment bewirkt Gährung in Folge einer Zersetzung seiner äußeren Theile selbst.

Die Analyse des Zuckers ergibt, daß er aus 1 At. Ferment, 4 At. Kohlensäure, 2 At. Aether und 1 At. Wasser enthält. Von den Producten seiner Zersetzung enthält der Alkohol  $\frac{2}{3}$ , der Kohlenstoff  $\frac{1}{3}$  des Kohlenstoffs des Zuckers; aber 2 At. Wasserstoff und 1 At. Sauerstoff mehr als der Zucker. Es haben die Producte Elemente von 1 At. Wasser an der Veränderung genommen. Das ganze Verhalten des Zuckers zeigt, daß darin weder Kohlensäure noch Aether präexistirt, sondern daß er ein organisches Atom ist, und sein Zerfallen in Alkohol und Kohlensäure in Folge einer Umsetzung seiner Elemente geschieht, wobei in die neuen Producte Wasser aber keines der Elemente des Ferments eingeht, obwohl dieses völlig auch verändert wird. Die Producte, die aus dem Ferment entstehen, sind also nicht bekannt, nur von seinem Stickstoffgehalt weiß man, daß er als Ammoniak in der gegohrenen Flüssigkeit enthalten ist.

Das Ferment ist also ein in Zersetzung begriffener Körper; seine Fähigkeit, Gährung zu bewirken, erhält es durch Berührung mit dem Sa-

Verwesung. Das unauflösliche Ferment, welches nach Waschen mit luftfreiem Wasser diese Eigenschaft verloren hat, erhält sie wieder, wenn man es faulen läßt, die mit Wasser bereitete Auflösung, wenn sie einige Stunden der Luft ausgesetzt war. Das Ferment ist also nicht ein Erreger der Gährung; der unlösliche Theil hat diese Eigenschaft nicht, der aufgelöste, der durch Zersetzung entsteht, ebenfalls nicht. Beide Materien aber erregen Gährung von dem Augenblick an, wie durch Einwirkung von Wasser und Luft eine Veränderung erleiden, deren letztes Resultat ihre eigene Gährung ist; es ist mithin kein eigenthümlicher Körper oder Materie, welche Zersetzung bewirkt, sondern sind nur Träger einer Thätigkeit, die sich über die Grenzen des in Zersetzung begriffenen Körpers hinaus erstreckt.

Wie in einer Metamorphose begriffener organischer Körper veranlaßt also in anderen organischen Atomen Störung des Gleichgewichts der Anziehungen seiner Elemente. Kohlensäure auf der einen, und Kohlenstoffverbindungen auf der andern Seite, sind die Producte dieser Umsetzungen bei stickstofffreien Materien. Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Phosphorwasserstoff, Wasserstoffgas, Oxyde von Kohlenstoff, Stickstoff und Wasserstoffverbindungen (*Käseoxyd, Käsensäure*) neben Kohlensäure die Producte der Umsetzung stickstoffhaltiger Materien.

Nach dieser Theorie kann man über eine Menge beobachteter Erscheinungen sich jetzt genügende Rechenschaft geben.

Die Metamorphose zweier Körper neben einander geht nicht vor sich, ohne daß die Elemente des einen Antheil an der Entstehung der durch die Zersetzung des

andern gebildet werdenden Producte, oder unter änderten Bedingungen, so daß alle oder ein Theil der Elemente zu den von dieser gegenseitigen Action gebildeten Producten beitragen.

Beispiele für den ersten Fall sind: die Bildung von Blausäure, wenn Amygdalin einige Zeit mit Zucker in Berührung war; die Bildung von saurem Ammoniak, wenn der asparaginhaltige Asparagin durch Hefe in Gährung gesetzt wird, wodurch das Asparagin als solches verschwindet; das Versetzen von Harnstoff in einer bei 35° gährenden Zuckerlösung. Für den andern Fall: kommt Indigo mit Waide in Berührung und einem Alkali in Berührung bei einer bestimmten Temperatur, so wird der Indigo in dem Alkali löslich, der Waide muß die Eigenschaft besitzen, den Sauerstoff aufzunehmen, den der Indigo abgibt; die Desoxydation einer organischen Substanz erfolgt hier durch eine damit in Berührung brachte andere organische Substanz, die selbst in der Lage der Zersetzung sich befindet. Der Saft von Rüben und Zwiebeln, der viel Zucker neben stickstoffhaltigen Materien enthält, geht, sich selbst in Gährung; der Rohrzucker geht in Traubenzucker über, nach vollendeter Zersetzung enthält die Flüssigkeit eine reichliche Menge Milchsäure und Mannit, nicht entfernt das Aequivalent Alkohol, was der Rohrzucker hätte liefern müssen. Milchsäure und Mannit enthalten keinen Stickstoff, sie sind entstanden durch Zersetzung des Zuckers, aber in Folge einer Isomerie, die durchaus verschieden ist von der gewöhnlichen Gährung. Honig, Traubensaft und Pflanzensäfte enthalten alle Bedingungen zur Fermentation, aber die Berührung mit Sauerstoffgas, mit Luft



Die anfangende Verwesung ist hierbei eine Bedingung, unter welcher die Zersetzung nicht beginnt. Mit der Absorption einer kleinen Menge Sauerstoffgas beginnt die Zersetzung, die Flüssigkeit trübt sich, sättigt sich mit Kohlensäure, und von dem Augenblick, wo dieses Gas nicht mehr aufgenommen wird, stellt sich eine Ruheentwicklung ein. Jetzt geht eine neue Periode an, und der Zutritt des Sauerstoffgases kann nun abgebrochen werden, ohne daß die Gährung aufhört. Mit der eingetretenen Ruhe ist der Zucker verschwunden, und die vorher aufgelöst vorhandenen stickstoffhaltigen Materialien finden sich als Hefe oder Ferment in unaufgelöstem Zustande wieder. In Folge der Veränderungen, die Pflanzenleim oder Eiweiß für sich erleiden, besteht diese Materie nicht. Da sie sich bildet, wenn die Gährung begonnen hat, auch bei Abschlufs der Luft, muß der zu ihrer Bildung nothwendige Sauerstoff aus den Elementen des Zuckers oder des Wassers genommen sein. Hieraus müssen jedenfalls an Wasserstoff reichere oder an Sauerstoff ärmere Producte entstehen, die sich in der Flüssigkeit oder den Niederschlägen vorfinden. *Oenanthsäure*, *Kartoffeln-* und *Getreideöl* sind offenbar Producte der Gährung, erzeugt durch die Mitwirkung fremder Materien; denn sie sind vor der Gährung in den Pflanzensäften nicht nachweisbar, und die Gährung des Zuckers durch Ferment ist nach dem Vorstehenden wesentlich verschieden von der Gährung eines Pflanzensaftes oder der Bierwürze; bei dem ersten verschwindet das Ferment mit dem Zucker, bei der andern wird es neben oder in der Metamorphose gebildet, welche der Zucker erleidet.

Fassen wir in einem allgemeinen Ueberblick das Verhalten der organischen Verbindungen auf, so stellen wir uns folgendes Bild vor: Ueberblick d. b. f, so stellende

sich zwei einander durchgreifend entgegengesetzte Erscheinungen dar.

1) *Es entstehen Körper von neuen veränderten Eigenschaften, indem sich die Elemente mehrerer Atome in einfachen Verbindung umsetzen und vereinigen zu einem Atome einer höheren Ordnung.*

2) *Es zerfallen zusammengesetzte Atome einer höheren Ordnung in zwei oder mehrere minder complexe Atome einer niederen Ordnung, in Folge einer Aufhebung des Gleichgewichts in der Anziehung ihrer Elemente.*

Diese Störung aber wird bewirkt: a) durch Wärme, b) durch Berührung mit einem differenten Körper, c) durch den Einfluß eines in einer Matamorphose begriffenen Körpers. Diese letzte Ursache bewirkt die hier betrachteten Erscheinungen der Gährung und der Fäulnis.

In der gährenden Zuckerauflösung befinden sich also die Atome des Zuckers in Berührung mit dem Ferment, mit einem faulenden Körper, dessen Atome in unaufhörlicher Bewegung sind. Wären die Atome des Zuckers mit derselben Kraft zusammengehalten, wie die Elemente im schwefelsauren Kali, so würden sie, so wenig wie dieses, die geringste Aenderung durch das Ferment oder den faulenden Körper erleiden. Dieses ist aber nicht immer der Fall. Die Elemente aller organischen Verbindungen, welche fähig sind, Metamorphosen zu erleiden, behaupten ihren Zustand nur durch die Trägheit durch das Beharrungsvermögen. Die Kraft, mit welcher die Atome einer Verbindung zusammengehalten sind, giebt sich lediglich durch den Widerstand zu erkennen, den dieser Körper einem andern entgegenstellt, der ihn zu verändern strebt. Bei sehr zusammengesetzten organischen Atomen bemerken wir aber keinen Widerstand, ihre Elemente ordnen sich auf die regelloseste

in mannigfaltigste Weise, je nach den Materien die  
an darauf einwirken läßt. Aehnlich also wie die  
Wärme das statische Moment in den Elementen sehr  
leicht Verbindungen aufzuheben fähig ist, geschieht die-  
selbe durch einen Körper, dessen Elemente sich selbst  
dem Zustande des aufgehobenen Gleichgewichts be-  
halten, die Bewegung, in der sich seine Atome befinden,  
theilt sich den Atomen der Elemente des Zuckers mit;  
sie hören auf, in dem Zustande zu beharren, in wel-  
chem sie Zucker bilden, und ordnen sich nach ihren be-  
stimmten Beziehungen. Die Art und Weise, wie sie sich  
verhalten, dürfte bei allen Metamorphosen die nämliche  
seyn, mögen sie durch Wärme, oder Verwandtschaft, oder  
durch die so eben berührte Ursache vor sich gehen.

---

#### Vierte Abtheilung.

---

### Mineralwässer und Bäder.

Ueber das Vorkommen des Jods und Broms  
im Wasser eines Brunnens zu Atnas im  
Oldenburgischen;

von

*Chr. Hansmann.*

Da es wohl immer von Interesse sein muß, das  
Wasser, welches man täglich zum Essen und Trinken  
benutzt, genauer zu kennen, so fühlte ich mich veran-  
laßt, das hier von uns benutzte Wasser aus einem vor  
paar Jahren gegrabenen Brunnen einer qualitativen  
chemischen Prüfung zu unterwerfen, zumal da das Wasser

anfänglich abführend wirkte für die solches Brunnenwasser nicht gewohnten Hausbewohner. Der Brunnen ist im Marschboden gegraben, 36 bis 40 Fuß tief, und eine viertel Stunde vom Ufer der Weser entfernt, welche hier zur Fluthzeit salziges Wasser führt. Offenbar ist er in einen Boden gegraben, der sich einst allmählig aus dem Weserwasser absetzte, und sich bildet wie noch jetzt am Weserufer Marschland entsteht, und also auch zu Fluthzeiten früher von salzigem Meerwasser überströmt wurde.

Das Wasser des Brunnens ist klar, doch in Masse gesehen graulich-grün und nicht ganz geschmacklos, besonders für den, der solches Wasser nicht zu trinken gewohnt ist. Zur Prüfung dieses Brunnenwassers wurden 54 bürgerliche Pfunde desselben abgedampft, wodurch ein gelblicher Niederschlag erhalten wurde, der größtentheils aus kohlensaurem Kalk und kohlensaurer Magnesia mit etwas Eisenoxyd bestand, und sechs Drachmen und zwei und einen halben Scrupel wog. Das verdampfte Wasser hinterließ ferner einen Salzurückstand aus dem durch Krystallisation drei und eine halbe Drachmen schwefelsauren Natrons und fünf Drachmen und acht undfunfzig Gran nicht ganz von schwefelsaurem Natrium reines Chlornatrium abgeschieden wurden.

Außerdem enthielt das Wasser noch phosphorsaurer Magnesia und organische Materie. Die etwa eine Drachme betragende Mutterlauge wurde durch hineingeleiteten Chlor dunkelgelb gefärbt, und Aether damit geschüttelt nahm diese dunkelgelbe Farbe auf. Nachdem der von der Lauge abgeschiedene Aether mit etwas Kalilauge geschüttelt und entfärbt worden, wurde diese zur Trockne abgeraucht, das erhaltene Salz mit etwas Braunstein in eine unten zugeschmolzene 4 Zoll lange Glasröhre ge-

acht, die Röhre etwa einen Zoll von der Mündung vor dem Löthrohr verengt, daß die jetzt hineingegebene Schwefelsäure erst zu dem Salze gelangen konnte, die Luft durch Erwärmen der Röhre aus dieser gegeben worden und durch Erkalten derselben ein luftreicher Raum entstand. Während der Zeit war die Röhre sorgfältig mit frischem Kleister verschlossen. So wie die Schwefelsäure an das Salz trat, entwickelten sich orangefarbene Dämpfe von Brom, welche die Stärke braunroth färbten, zuletzt, nachdem frischer Kleister in die Röhre gebracht und diese erwärmt worden, wurde eine schwache, doch deutliche Reaction von Jod und Stärke erhalten.

Das Hervortreten des Jods bei dieser Operation würde früher gewesen sein, wenn ich nicht unterlassen hätte, Kalisalz vorher zu glühen und so das gebildete jodsaure Kali in Jodkalium umzuwandeln. Wenn gleich das Vorkommen des Jods und Broms im Wasser eines Theils der Marsch nach dem, was oben über die Lage derselben mitgetheilt, leicht erklärlich ist, so hat man diese Stoffe bis dahin doch noch nicht im Brunnenwasser ähnlicher Gegenden aufgefunden, und das Vorkommen des Jods darin muß um so interessanter erscheinen, da Sarpbati in seiner Abhandlung über das Jod in *diesem Archiv der Pharm.* 2. R. Bd. XII. Heft 1. (1837) angiebt, das von anderen Chemikern im Meerwasser nachgewiesene Jod nicht darin gefunden zu werden.

---



## Bemerkung über das Mineralwasser von Franzensbrunn bei Eger.

**D**ie Mineralquellen von Franzensbad bei Eger durchdringen, ehe sie zu Tage kommen, eine bedeutende, mit Schwefelkies innig durchdrungene Torfschicht. Dieser Schwefelkies ist offenbar durch den Einfluß der organischen Torfsubstanz auf das schwefelsaure Salze und kohlenst. Eisenoxydul enthaltende Mineralwasser entstanden. Daß nun das Mineralwasser von Eger zuweilen schwache Spuren von Schwefelwasserstoff zeigt, liegt nach H. Rose in Folgendem. Da nämlich der Gehalt des Mineralwassers an schwefels. Natron sehr überwiegend ist, so wird außer Schwefelkies durch die organische Substanz des Torfs auch Schwefelnatrium, und durch den Kalkgehalt des Wassers auch wohl Schwefelcalcium erzeugt, welche Schwefelverbindungen, wenn sie mit schon an Kohlensäure reichem Mineralwasser in Berührung kommen, eine Spur Schwefelwasserstoff entwickeln, das sich in dem Mineralwasser auflöst. Das Mineralwasser selbst enthält keine organische Materie und nimmt also nichts Auflösliches aus dem Torf auf. Es liegt in der Natur der Sache, daß dieser Gehalt an Schwefelwasserstoff sehr veränderlich und auch kaum in Spuren vorhanden ist. Nur an dem Orte, wo das Mineralwasser mit dem Torfschlamm gemengt, zum Baden angewandt wird, giebt sich der Schwefelwasserstoff im entweichenden Kohlensäuregas durch eine schwache Bräunung des Bleiweißanstrichs der Thüren und Fensterahmen im Badehause zu erkennen. (*Poggend. Annal.* XLIV, 672.)



## Notiz über die Mineralwässer der Moldau.

In der Moldau finden sich ohne Zweifel viele Mineralwässer. Schon Sulzer\*), Hacquet\*\*) u. Wolf\*\*\*) haben darüber einzelne Nachrichten mitgetheilt. Sulzer führt darüber an: »Ich glaube, daß es keine Nation in der Welt giebt, die weniger auf die Gesundheit hielt, als die Wallachen. Es ist bekannt, daß man von der Siebenbürgischen Bergseite von Kronstadt aufwärts nordwärts hinauf bis in die Marmarosch, auf jede halbe Stunde einen Sauerbrunnen antrifft, darunter einige, als harmeroder (*homoróder*), kowasner (*kówasnaer*), kassoner (*kászoner*), von allen aber der in den Gebirgen von der *Györgyö* gegen die Moldau zu Borsseker) vorzüglich gut und bewährt sind. Braucht man mehr Beweise, als diese Siebenbürgischen Sauerbrunnen, um daraus zu schließen, daß auch auf der moldauisch-wallachischen Seite der Karpathen dergleichen zu finden sein werden. Alle Siebenbürgischen Aerzte kennen die wunderbare Heilkraft des Borseker Sauerbrunnens, aber es liegt in einer furchtbaren Wildniß hart an der moldauischen Grenze. Von der Moldau her ist zum Brunnen viel leichter und viel näher zuzukommen, doch ist zu bezweifeln, ob man denselben in Jassy auch nur dem Namen nach kennen werde.«

Hacquet führt an, daß hinter der Stadt *Botoschany* oder *Potuschan* gegen Südwesten kleine Anhöhen mit

\*) Gesch. des transalpinischen Daciens etc. Wien, 1781.

\*\*) Neueste physikal. polit. Reisen in den Jahren 1788 u. 1789 durch die dacischen und sarmatischen oder nördl. Karpathen. Nürnberg, 1798.

\*) Beiträge zu einer stat. hist. Beschreib. des Fürstenthums Moldau. Hermannstadt, 1808.

weitschichtiger Waldung mit fast undurchdringlichen Sümpfen angefüllt, sich finden, in welchen viel Schwefelwässer zu Tage kommen.

Wolf berichtet: »Wenn man von der Siebenbürgischen Oitoser Kontumaz bei dem ersten moldauischen Gebirgsdorfe Herrscha vorbei bis nach dem nächsten Dorfe Grosseseht kommt, so empfindet man schon weitem einen starken Schwefelgeruch und sieht bald schwefelhaltige Wasserquellen, die sich in der Oitos ergießen. Wendet man sich wieder gegen Okna zu, so trifft man einige nicht unbedeutenden Bergtheer, welchen die Moldauer *Pekura*, die Siebenbürger aber *Duhot* nennen, und dessen sie die Schmierer ihrer Wagen und des Pferdegeschirrs anwenden. Auch pflegen sie diesen Bergtheer bei Wunden Viehes anzuwenden, besonders in der Sommerhitze alle Arten der Insecten davon abzuhalten. Verfolgt man aber den geraden Weg nach Grosseseht über Bakau Roman bis an den Serethfluß, so trifft man gleich zur Hand, noch ehe man über diesen Fluß setzt, nahegelegenen Waldungen eine starke schwefelhaltige Wasserquelle an, die aber von den Moldauern wenig geachtet wird, als eine andere mineralische Quelle, die sich im Rianzer Gebiete an der Grenze der Moldauischen Gebirge, gegen Siebenbürgen hin, findet.

Diesen im Allgemeinen traurigen Zustand der moldauischen Mineralwässer schildert auch Dr. Constantin Edler von Wernau in seiner Dissertation *dimentum physiographiae Moldaviae, Budae MDCCCXXXVI* \*). Er bemerkt, daß die Moldau gewiß reich sei an Mineralwässern, indessen kommen sie theils

---

\*) Ich verdanke diese Hrn. Professor Dr. Tognio in  
Br.

den Gebirgen, theils in dichten Waldungen vor. An  
Vorrichtungen zur Aufnahme der Badegäste ist nicht zu  
denken, und wo man Vorrichtungen zu den Bädern  
findet, sind sie höchst dürftig, und doch sieht man von  
dem Gebrauch dieser Wässer bei krätzigen, herpeti-  
schen, rheumatischen, scrophulösen und arthritischen  
Krankheiten sehr häufig die heilsamsten Folgen. Zu Borka  
und Suchanener Districte kommen in den Wäldern Mi-  
neralwässer von ausgezeichnete Wirkung vor, deren  
genaue Bestandtheile man aber noch nicht kennt. Es  
scheinen dieselben Quellen zu sein, welche Sulzer und  
Wolf beschrieben haben. Zu Strunga in der Nähe von  
Borka kommen kalte schwefel- und eisenhaltige Quellen  
vor, und ähnliche Quellen finden sich zu Slanik in den  
Karpathen im District Bakeu, die schon vor mehreren  
Jahren Dr. Zotta, emeritirter Protomedicus der Moldau,  
besucht hat.

## Heisse Quellen in der Berberei.

Ungefähr 2 Lieues von Mjer - Ammar, etwas im  
Westen des Weges von Bona nach Constantine, und  
8 Lieues von Ghelma, nicht fern von Rasselacba,  
an der höchsten Ketten des kleinen Atlas, kommen  
heisse Quellen zu Tage, die schon von früheren Reisen-  
den beobachtet wurden und kürzlich von Dr. Sedillot  
näher beschrieben sind. Das Wasser ist sehr in-  
teressirend, so wie zu Calsbad, Monte Amiata und Ti-  
voli, es setzt einen schneeweissen Kalksinter ab, der  
mehrere hundert kegelförmige Hügel bildet, von 6 — 18  
Fuß Höhe. Die Höhe der Kegel war wohl von der  
Kraft bedingt, mit welcher das Wasser hervorsprudelte;  
Arch. d. Pharm. II. Reihe. XXII. Bds. 2. Hft.

sprang dasselbe z. B. 12 Fuß hoch, so konnte es nur einen Kegel von dieser Höhe erzeugen, und derselbe fertig, so mußte es natürlich aufhören, auszufließen und seitwärts einen Ausweg suchen. Wasser ist fast siedend heiß und riecht nach Schwefelwasserstoff. (*Compt. rend. V, 555.*)

---

### Fünfte Abtheilung.

---

## Nat u r g e s c h i c h t e.

---

### Chemische Untersuchung zweier angeblich Meteorsteine vom Hinterkley bei Quedlinburg;

von

Dr. *Bley* in Bernburg.

**D**iese angeblichen Meteorsteine wurden mir kürzlich von Hrn. Yxem mitgetheilt, welcher darüber Folgendes berichtet hat:

Vor vier Jahren eines Herbsttages gegen 12 Abends sollen im Nordwesten von Quedlinburg mehrere hellrothleuchtende Feuerkugeln mit lautem Prasseln vom Hinterkley zur Erde gefallen sein. An einem kleinen Felsabhange des Hinterkley, nahe am Steinholzwege, fanden sich der grössere der Steine 4 Fuß, der kleinere 2½ Fuß tief in die Erde gedrungen.

Der mir übergebene grössere Stein war in 2 Stücke geschlagen, deren eines die Grösse eines Taubeneies hatte, eiförmig geformt war, 640 Gran wog und die Hälfte des gefundenen Stücks war; er bestand aus einer 3



starken Schale, muskatnussfarbig, und einem röthlich-grauen Kern, ebenfalls eiförmig gestaltet, etwa 15 Linien lang, 15 Linien breit; fein zerrieben gab sowohl Schale als Kern ein übereinstimmend rothbraunes Pulver.

Vor dem Löthrohre gab das Pulver mit Natron geglähet ein undurchsichtiges schwarzgrünliches Glas. Mit Borax gab es eine an den Kanten durchscheinend röthliche, mit mikrokosmischem Salz eine anfangs hellgelbliche, hernach trübe unklare Perle.

Mit Salzsäure und kleinem Zusatz von Salpetersäure digerirt, entfärbte sich das Pulver völlig, gab eine goldgelbe Lösung, im Rückstande blieb wieder erdige Substanz. Als die Lösung mit Ammoniak neutralisirt wurde, entwickelte sich Schwefelwasserstoff. Gegen Reagentien verhielt sie sich also: Ammoniak, im Ueberschuss zugesetzt, gab einen starken rothen Niederschlag, wobei die überstehende Flüssigkeit farblos erschien.

Als die farblose Flüssigkeit zur Trockne verdunstet ward, detonirte dieselbe gelinde. Die trockne Masse wurde mit Wasser gekocht, filtrirt. Die Auflösung gab mit salzsaurem Ammoniak keine Trübung, salzsaures Platin gab kein dreifaches Kalisalz, Weinsäure keinen körnigen Niederschlag. Zum Krystallisationspunkte abgedunstet, erhielt man kleine spiefsige Krystalle von salpetersaurem Ammoniak. Der in Wasser nicht lösliche Niederschlag wurde mit Salzsäure behandelt, welche ihn aufnahm. Als man kohlenstoffsaures Kali hinzusetzte und aufkochen liefs, erschien ein röthlicher Niederschlag. Der oben mittelst Ammoniak erhaltene Niederschlag wurde in Salzsäure gelöst und zu der durch Verdunsten neutralisirten Flüssigkeit Chlorkalklösung gesetzt. Es erfolgte keine besondere Reaction. Ein Theil der ersten salzsauren Lösung wurde durch Aetzkali zerlegt, aufge-

kocht, vom Niederschlage getrennt und salzsaures Ammoniak zugesetzt, es erfolgte ein gelber flockiger Niederschlag.

Derjenige Theil des Steins, welcher der Einwirkung der Säure widerstanden hatte, wurde mit einem doppelten Gewichte Kali behandelt und im Tiegel zum Rothglühen erhitzt. Es trat Schmelzung ein, die Masse zeigte eine schmutzig-graugrüne Farbe. Nach dem Aufweichen der Masse in Wasser und Zusatz von Salpetersäure erhielt man eine klare, nicht gelblich gefärbte Lösung. Etwas der salpetersauren Lösung wurde zur Trockne abgedunstet, mit Wasser übergossen, blieb ein schmutzig-grauer Niederschlag, der nach dem Auswaschen und Glühen im Platintiegel völlig weiß erschien und sich wie Kieselerde verhielt.

Die im vorigen Versuche mit Wasser erhaltene Lösung wurde mit salpetersaurem Quecksilberoxyd versetzt; man erhielt eine milchige Trübung. Demnach waren in diesem Theile des Steines nachgewiesen: Kieselerde, Eisenoxyd, Thonerde, Talkerde, Mangan und Schwefel, aber weder Nickel noch Chrom.

### *Quantitative Analyse.*

50,0 Gran aufs feinste gepulverten Minerals wurden mit Salpetersalzsäure so lange gekocht, als noch etwas löste und dann filtrirt. Der weiße, ausgewaschene Niederschlag betrug nach dem Glühen 27,0 Gran und bestand in Kieselerde.

Die salzsaure Lösung ward vorsichtig mit Aetzammoniakflüssigkeit gesättigt, der Niederschlag gesammelt mit Aetzlauge gekocht, schnell filtrirt. Der Niederschlag in Salzsäure gelöst, mit Ammoniak vorsichtig gesättigt und mit bernsteinsaurem Ammoniak gefällt, ausgewaschen und geglühet gab 12,5 Gran Eisenoxyd. Die

Die obigen Flüssigkeit vereinigte Solution wurde mit kohlensaurem Ammoniak versetzt. Der Niederschlag betrug nach dem Auswaschen und Glühen 60 Gran Thonerde. Aus der Flüssigkeit ward durch Schwefelwasserstoff der Mangangehalt abgeschieden. Man erhielt 1,875 Gran Schwefelmangan, welches durch Digestion in Salzsäure gelöst und durch kohlensaures Kali gefällt ward, nachdem kein Schwefelwasserstoff mehr entwickelt wurde, der Niederschlag ward nach dem Auswaschen geglühet und betrug 1,49 Gran Manganoxydul.

Aus den rückständigen Flüssigkeiten wurde mittelst phosphorsaurem Ammoniak die Talkerde abgeschieden. Man erhielt 6,5 Gran geglühte Phosphorammoniaktalkerde und 2,6 Gran Talkerde. Zur Bestimmung des Schwefels wurden 25,0 Gran des Mineralpulvers mit Salpetersäure versetzt, die Lösung mit salpetersaurem Baryt gefällt, der Niederschlag ausgewaschen und geglühet, gab 2,5 Gran schwefelsauren Baryt = 0,47532 Gran Schwefel.

Hiernach war nun die ermittelte Zusammensetzung des Steins:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kieselerde..... | 27,00 |
| Eisenoxyd.....  | 12,50 |
| Thonerde.....   | 6,00  |
| Talkerde.....   | 2,60  |
| Manganoxydul... | 1,49  |
| Schwefel.....   | 0,47  |
|                 | <hr/> |
|                 | 50,06 |

#### Untersuchung des Stücks B.

Dasselbe wog 1040 Gran, war rundlich geformt, der Theil einer größern Masse bestand aus drei Lagen, die äußere auf der Außenseite gelblichgrau innen schwarzgrau, deren mittlere erst gelb mit einzelnen dunkelgelben ins Rothbraune neigenden Pünctchen, de-

nen  
elnen  
n, de-

ren dritte metallglänzend wie Schwefelkies erschien. Diese Masse war beträchtlich schwer, erforderte große Kraft zum Zerschlagen, gab beim Zerreiben im Mörser ein schwarzgrünes Pulver, welches der Netze nicht folgte.

Vor der Löthrohrflamme gab es mit kohler Natron eine schwarzgrüne unklare Perle, mit Bor an den Seiten durchscheinende röthliche, mit kosmischem Salz eine wie mit Borax röthliche und niger helle Perle. Bei der Digestion mit Salzsäure und Zusatz von etwas Salpetersäure, wurde es nicht entfärbt. Die Auflösung war grünlichgelb, der Rückstand schwarzgrau. Bei der Digestion entwickelte sich Hydrothiongas. Der Rückstand gab nach dem Zersetzen mit Kali, Aufweichen mit Wasser, Zusatz von Salzsäure einen Rückstand, der im Platintiegel geglüht, weiß wurde.

Die Auflösung gab nach dem Abstumpfen mit Ammoniak folgende Reactionen:

Ammoniak im Ueberschuss gab einen starken Niederschlag, während die überstehende Flüssigkeit klar erschien. Beim Abdunsten derselben trat nach dem Trockenwerden und Glühen eine geringe Verwitterung ein. Die Masse gab in Wasser gelöst mit oxalsaurem Ammoniak Trübung; mit selbigen gefällt, filtrirt und mit phosphorsaurem Ammoniak versetzt, weißer Niederschlag; mit Weinsteinsäure körnigen Niederschlag. Ein Theil der Lösung gab nach dem Abdunsten und Ruhigstehen kleine spießsige Krystalle. Der in Wasser unlösliche Rückstand wurde von Salzsäure gelöst, oxalsaures Kali gab beim Aufkochen keinen Niederschlag. Der von Ammoniak bewirkte Niederschlag wurde mit Salzsäure gelöst und zu der durch Verdunsten neu gemachten Flüssigkeit einige Tropfen Chlorkalklösung

st, worauf keine Reaction folgte. Ein Theil der ersten salzsauren Auflösung wurde mittelst Aetzkali zerlegt, gekocht, vom Niederschlag befreit und mit salzsaurem Ammoniak versetzt. Es erfolgte ein flockiger weißlicher Niederschlag. Ein Theil der sauren Lösung wurde mit Aetzammoniak vorsichtig neutralisirt, dann wurde ein wenig überschüssig zugesetzt, der Niederschlag abfiltrirt und jetzt zu der filtrirten Flüssigkeit wasserstoffschwefliges Schwefelammonium gesetzt. Es entstand ein fleischrother Niederschlag. Ein Theil der Auflösung gab nach dem Zusatz von Schwefelammonium einen dunkelgrünen, ins Schwarze neigenden Niederschlag. Um zu entscheiden, ob man es mit Kobaltoxyd, Nickeloxyd oder Eisenoxydul zu thun habe, mischte man zu einem Theil der Auflösung kohlensaures Kali. Es entstand ein weißer, schnell grünlich und auf der Oberfläche braunroth werdender Niederschlag, was also die Gegenwart des Eisenoxyduls anzeigte. Um noch auszumitteln, ob nicht in diesem Niederschlage ein Hinterhalt von Nickel- oder Kobaltoxyd vorhanden sei, ward selbe mit Salzsäure unter Zusatz von Salpetersäure versetzt, filtrirt, erhitzt, mit Ammoniak versetzt, filtrirt und mit Schwefelammoniak versetzt. Man erhielt keinen rothen noch grünen Niederschlag. Endlich ward zu einem Theile der sauren Auflösung Weinsteinersäure gesetzt, dann mit Ammoniak übersättigt, die klare Flüssigkeit mit wasserstoffschwefligem Schwefelammonium versetzt, so Schwefeleisen gefällt, in dem sie noch eine Zeit lang einer gelinden Wärme ausgesetzt wurde, abfiltrirt und die rückständige Lösung zur Trockne verdunstet, geglühet, mit kohlensaurem Kali geschmolzen, in Chlorwasserstoffsäure gelöst, aufgeköcht, mit Ammoniak versetzt. Man erhielt keinen auf Chromoxyd deutenden Niederschlag. Demnach enthielt dieser Stein:

Am-  
moxyd



Eisenoxydul, Manganoxydul, Kieselerde, Kalk, Talk und Schwefel.

*Quantitative Analyse.*

50,0 Gran des fein gepulverten Minerals wurde mit ansehnlicher Menge Salpetersäure digerirt, Beachtung, daß kein Rückstand von Schwefel sich schied. Mittelst Chlorbaryum ward der Schwefel als schwefelsaurer Baryt gefällt; der Niederschlag trug nach dem Auswaschen, Trocknen und Glühen 16,0 Gran, welche 2,06955 Schwefel entsprechen. 50,0 des Steinpulvers wurden mit Salzsäure unter Zusatz etwas Salpetersäure so lange digerirt, als noch aufgenommen wurde. Der mit Säuren nicht völlig zuschließende Rückstand ward nach dem Abwaschen mit Kali gekocht, geschmolzen, geglüht, mit Wasser zerweicht, und mit der salzsauren Auflösung vermischt; der entstehende Absatz noch mit Säure ausgewaschen, mit Wasser, endlich getrocknet und geglüht; es blieb 16,0 Gran Kieselerde.

Die saure Lösung ward vorsichtig mit Ammoniak neutralisirt, nachdem vorher der Flüssigkeit Chlorammonium beigemischt war, so daß zwar ein rother Niederschlag entstand, jedoch nicht alles Eisen ausgefällt war. Man ließ die Flüssigkeit warm bis zur Auflösung des Niederschlags aufsteigen, setzte auf Neue Ammoniak hinzu, bis zum Erscheinen neuen Niederschlags, übergoss diesen mit etwas Aetzammoniak, und löste selbigen Niederschlag in Salzsäure, mit kaustischem Kali; die filtrirte alkalische Lösung mit kohlensaurem Ammoniak keinen Thonerden-Niederschlag. Aus der vom Eisengehalt befreiten Flüssigkeit fällte man mittelst oxalsaurem Ammoniak die Talk. Man erhielt 1,250 Gran oxals. Kalk = 0,9375 Gran kohlensauren Kalk. Der Eisenniederschlag ward noch in Salzsäure gelöst, mit Wasser verdünnt, mit Am-

ak gesättigt, mittelst bernsteinsäuren Ammoniak gefällt, filtrirt, der Niederschlag mit Ammoniak übergossen, mit kaltem destillirten Wasser und unter Luftzutritt ausgesüßt. Man erhielt 28,0 Gran Eisenoxyd = 1,138 Eisenoxydul, als welches es in dem Mineral vorhanden war. Darauf ward mittelst Schwefelammoniak das Mangan gefällt, der Niederschlag mit Chlorwasserstoffsäure digerirt, die Lösung filtrirt, und mittelst kohlen-säurem Kali gefällt, ausgewaschen, geglüht und das Manganoxydoxydul als Manganoxydul berechnet, dessen Menge 4,265 Gran betrug.

Die rückständige Flüssigkeit, aus welcher durch Wasserstoffschwefelammonium das Mangan gefällt war, wurde mit Salzsäure digerirt, filtrirt und mittelst phosphorsaurem Ammoniak die Talkerde gefällt. Man erhielt 1,750 Gran phosphorsaure Ammoniaktalkerde = 0,45 Gran kohlen-saurer Talkerde.

Hiernach war nun die Zusammensetzung dieses Minerals:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Schwefel .....        | 2,06955         |
| Eisenoxydul .....     | 25,13800        |
| Manganoxydul .....    | 4,26550         |
| Kohlensaurer Kalk ... | 0,93750         |
| Kohlensaure Talkerde  | 1,45250         |
| Kieselerde .....      | 16,00000        |
| Verlust .....         | 0,13695         |
|                       | <hr/> 50,00000. |

Die gänzliche Abwesenheit des Nickels, Kobalts und besonders des Chroms, welches man, wenn auch nur in geringen Spuren, bis jetzt in allen Meteorsteinen aufgefunden hat, so wie auch, daß in diesem Minerale alle Metalle im oxydirten Zustande vorhanden waren, machen es mir nicht wahrscheinlich, diese für wirkliche Meteorsteine zu halten. Ein angesehener Mineraloge,

Hr. Oberberggrath Zincken zu Mägdesprung, erhielt dasselbe für Sphärosiderit \*).

---

## Botanische Notiz;

vom

Professor Dr. *Bartling* in Göttingen.

*Pulmonaria saccharata* ist Varietät von *P. o. nalis* L. mit röthlich gefleckten Blättern und kömmt *promiscue* in vielen Gegenden Deutschlands, z. B. Donauthale, vor.

Bei einer botanischen Excursion in Pyrmont wurde die hybride Form von *Polygonum lapathifolium* und *Persicaria* häufig in Gräben auf dem Wege nach Erdfällen angetroffen.

---

## Blutegelzucht, insbesondere die Zuchtteiche in Moritzburg bei Dresden betreffend

vom

Apotheker *F. W. Hedrich* daselbst.

Die Blutegelzuchtteiche zu Moritzburg wurden im Novbr. und Decbr. 1834 in der Pressenteiche zu achtjährigem Betrieb in 8 Abtheilungen ausgegraben. Jeder Teich ist 20 Ellen lang, 10 breit und 3 Ellen tief. Der Boden fast durchgängig lehmig mit wenig Sand und Moosadern, oben auf  $\frac{1}{4}$  Elle guter schwarzer Moorboden. Die Teiche sind mit einer Neigung von 45° ausgegraben, theils weil es für die Egel bequem

---

\*) Wahrscheinlich enthielt derselbe dann kohlensaures Eisenoxydul, welches auch im thonigen Sphärosiderit den Hauptbestandtheil ausmacht.

theils des Frostes wegen, der sonst durch Heben  
Erdreichs die obern trocken liegenden Erdschichten  
bröckelt und die Zwischengänge schmälert. Abwärts  
an Ufer ist eine, anderthalb Elle in und  $\frac{3}{4}$  Elle über  
Erde gehende, alle 8 Teiche umschließende Bohlen-  
wand angebracht, nach Scheele's Vorschrift, um das  
Umwandern der Egel zu verhüten, hauptsächlich aber  
das Eindringen ihrer Feinde, als des Maulwurfs,  
des Landkrebsses und der Wasserspitzmaus zu verhindern.  
Jeder Teich ist von einem 2 Ellen hohen und  
2 Ellen dicken Walle umgeben, bei Wolkenbrüchen  
um sonst das Ausreißen der Teiche zu verhüten. Auf  
dem Walle steht noch ein  $2\frac{1}{2}$  Elle hoher Zaun mit  
eisernen Reuterspitzen versehen, um das Einstei-  
gen der unberufenen Liebhaber zu verhindern oder  
zumindestens zu erschweren. Jeder Teich wurde im Mai  
1836 mit 6000 Mutteregeln besetzt, die ich meist in Po-  
land aufkaufte und damals mit 20 Thlr. per 1000 bezahlte.  
Der Transport in leinenen Beuteln, jeden mit 8 — 10 Pfd.  
Egeln angefüllt, ging gut von statten. Man drückt bei  
dieser Art des Transports die Egel im Beutel gelind  
zusammen, um fast alles Wasser zu entfernen, und bindet den  
Beutel dicht über der Egelmasse zu, so daß der Beutel  
wie ein angefüllter Geldsack dasteht, und die Egel kei-  
nen Raum übrig haben, sich zu bewegen. Die Egel  
halten sich durch ihre Masse selbst feucht, und werden  
erst bei warmer Witterung in 2 Tagen, bei mehr  
Kälte oder Regenwetter in 3 bis 4 Tagen in andere  
Beutel gebracht, oder wenn sie nicht zu sehr geschleimt  
sind, nur frisch angefeuchtet. Am Bestimmungsort  
 angekommen, bringt man die Egel nicht sogleich in die  
Teiche, sondern schleimt sie erst dadurch ab, daß man  
sie über ein Stück aufgespannte Leinwand gleichsam

hinrollt und dann in ein unterstehendes Gefäß, beim Abzählen, fallen läßt. Die Begattungszeit fällt nachdem das Frühjahr früher oder später warme bringt, von Mitte Mai bis Mitte Juni, und die Cocons findet man nach dem 10 bis 15 Juli. Die Vermehrung könnte man als die 10fache annehmen, da selten nur 8, meist 12 bis 14 junge Egel in einem Cocon enthalten sind. Nach dreijährigen, nicht einzelnen, sondern mehrfachen Beobachtungen legt Blutegel auch mehr als ein Cocon, denn 100 abgetrocknete Mutteregel geben mir im Durchschnitt 130 bis 140 Cocons.

Zum Betrieb oder Handel, da die Zucht wenig wie möglich beunruhigt werden dürfen, ist sogenannte Entenfang bestimmt, ein schon seit langer Zeit ausgegrabener Teich von 292 □ Ruthen Flächeninhalt, aber nur 1½ Elle mittlerer Wasserhöhe. demselben ließ ich im Herbst 1834, um vor dem trocknen und auch Ausfrieren gesichert zu sein, 56 Ellen lange, 4 Ellen breite und 1 Elle tiefere Einschnitte machen, und besetzte ihn nun theils mit 3 — 4 jährigen Egel, die zum Verkauf noch zu klein waren, theils mit Brut.

Bei dem seit 6 — 8 Jahren wohl um mehr als vierfach gestiegenen Werthe der Blutegel war es sehr sam, darauf zu merken, daß die gebrauchten Blutegel nicht mehr als unnütz weggeworfen würden. Gleichwohl ließen die früher vorgeschlagenen Mittel, das Blut durch Ausdrücken zu entziehen, oder sie mit Natron zu bestreuen, die Anwendung nur im Kleinen zu, dürfte auch nicht von Vielen, ohne Ekel zu erregen, befolgt werden. Bloß im Nothfall kann man diese Mittel gut heißen. Es wurde daher auf den Vorschlag



Hrn. Hof- und Medicinalraths D. Seiler in Dresden, dem wir überhaupt das Entstehen der hiesigen Blutegelzucht zu verdanken haben, ein besonderer Teich in drei Abtheilungen, in der sogenannten Grotte im Hirschpark, mit Canal eingerichtet. Dieser Teich war dazu bestimmt, aufgekaufte Blutegel, welche alle oder doch ein Theil schon gesogen hatten, mindestens ein Jahr lang in demselben ruhen zu lassen, um die Egel so auf eine Weise zum Wiedergebrauch geschickt zu machen. Einen Nebennutzen gewähren solche Egel aber auch, wenn sie sonst groß und alt genug sind, durch vermehrte Fortpflanzung. Es ist Schade, daß ich wenig Egel von Wundärzten und Hospitälern zu erhalten, obgleich ich die Mühe des Sammelns und der täglichen Versorgung derselben mit frischem Wasser, wenn oder mehrere Schock beisammen sind, reichlich bezahlt.

Wenn nun alle diese Teiche von Sachkennern als zweckmäßig eingerichtet erkannt worden sind, und seit dem Herbst 1836 nach der ersten Bekanntmachung mit vielseitigen Aufträgen beehrt wurde, die Angelegenheit also so zu sagen in gutem Gange ist, so kann ich doch keinesweges noch eines Vortheils erfreuen. Die bestehenden Schattenseiten will ich für solche nicht anführen, die etwa im Begriff sind, eine ähnliche Anlage, sei in kleinem oder großem Umfange, zu unternehmen. Hierbei denke ich an meine Freunde in Dänemark und an die guten örtlichen Gelegenheiten zu einer oder mehrer solcher Anlagen, die in der Gegend von Lugeberg oder Bonnhäfft, so wie zwischen Bramstedt und Kellinghusen in Holstein, desgleichen zwischen Lüneburg und Flensburg im Schleswigschen, zu machen wären, ohne gerade andern Orten dortiger Gegend die

Zulässigkeit solcher Teiche absprechen zu wollen. Dr. Steffens in Christiania, der mir die Noth im Winter dort Blutegel zu erhalten, schilderte, und 3 Jahren Willens war, mit Beihülfe der norwegischen Regierung ein solche Anstalt zu errichten, dahin geht, ist, weifs ich nicht, eben so wenig, ob er die jungen von hier aus, die noch in den Cocons eingeschlossen waren, damals mit zu Hause brachte und lebend erhielt. Eine Wiederholung hierauf in dieser weit verbreiteten Zeitschrift dürfte, da die Sache von grossem practischen Interesse ist, ausser mir auch vielen Andern willkommen sein.

Die Nachtheile, deren sich meine Blutegelanstalt neuerer Zeit mehrfach ausgesetzt sieht, sind folgende. Die wilden Enten fallen sowohl am Tage, noch häufig des Nachts in die Teiche ein. Mit Schiefsgewehr kann man sie hier des Thiergartens wegen nicht verjagen und sie wegzufangen hält schwer. Die Wasserspitzmaus hat sich seit 2 Jahren trotz der Scheele'schen Vorrichtung eingeschlichen, obgleich noch nicht in Menge. Der Schaden ist aber nicht unbedeutend, da sie gewöhnlich zur Zeit der Coconbildung, wo die Egel tagelang unter dem Rasen verweilen (im Gegensatz zu Scheele's Bemerkung, dass sie sich nur im Winter als schädlich erwiesen), das Lager der Egel aufsuchen, indem sie vom Walle aus elle hoch über die Bohlenvermachung ins Wasser springen.

Unter die Feinde der Egel oder richtiger der Blutegelzuchten muss ich auch die Diebe zählen. Sie sind die schlimmsten Feinde für meine Anstalten. Da die Teiche in 3 Abtheilungen, jede  $\frac{1}{4}$  Stunde von der andern entfernt liegen, so reicht ein Wächter unter diesen Umständen nicht aus. So werden denn sowohl bei Tage als bei warmen Nächten die Teiche von ihnen heimgesucht. Die Feinde kommen, wie ich hier leider bemerken musste, nicht zu

n, sondern zu 2 oder 3, und wenn ich auch einige  
selben der Obrigkeit angezeigt habe, so bleibt mir  
mer der Schade. Die Diebe hatten sich, um das be-  
werliche Uebersteigen zu vermeiden, gerade hinter  
a Wachthäuschen zwischen dem Wall und der Ver-  
schung durchgegraben, und treiben so ihr Wesen im  
stern. Uebel ist es, daß die Egeldiebe ihr Gestohle-  
n so leicht verwerthen können, und zur Vorsicht, daß  
mein Eigenthum nicht noch einmal bezahle, habe  
grüne (ungarische) und graue (deutsche und polni-  
sche) in jeden Teich zusammengethan.

Oben habe ich gesagt, daß die Vermehrung der Egel  
sch die Brut als eine 10fache angesehen werden kann.  
klingt zwar einladend, aber von der Brut verschwin-  
im ersten Jahre  $\frac{4}{5}$  bis  $\frac{2}{10}$  wieder, wahrscheinlich  
theils durch die weiße Erdspinne, die sich häufig  
den Ufern solcher Teiche findet. Wäre dieser Um-  
stand nicht, so könnte man erwarten, in der Folge einen  
Gewinn von solchen Teichen zu ziehen, dessen  
aber vor der Hand noch gänzlich entbehre.

Das Absterben der Egel durch das Aufbewahren der-  
selben im Winter raubt jeden durch den Verkauf im  
Sommer mit Mühe erlangten Vortheil. Hierzu kommt,  
daß unsere Herren Collegen im Sommer sich weniger  
um sie wenden, weil immer noch viele Blutegel von  
Käufern gekauft werden. Der stärkere Vertrieb bleibt  
also für die Wintermonate, daher ich große Men-  
gen von Blutegeln aufzubewahren habe. Der Verlust  
den jeder Apotheker durch Absterben der Egel  
erleidet, trifft mich wohl 50fach, ungeachtet der  
Anwendung aller vorgeschlagenen Mittel und der Be-  
achtung der eigenen Beobachtungen.

Im Interesse der Apotheker sowohl, als meiner

Anstalt, suchte ich vor mehreren Jahren für Absenden der Blutegel von hier aus an sächsische Apotheker Portofreiheit nach. Dieser kleine Vortheil ist mir nicht gewährt worden. Wer da glaubt, über die gedeuteten Schwierigkeiten hinwegzukommen, 59 Diebstahl und die Wasserspitzmaus gesichert zu wer nicht nöthig hat, den Winter über Vorrath feil halten, übrigens guten Wiesenboden besitzt und nöthigen geregelten Wasserstand herbeizuführen will, der mag es immer wagen, eine solche Anlage zu etablieren. Als Leitfaden kann ihm hierbei zur ersten Orientirung dienen: *Scheel, der medic. Blutegel. Breslau 1833, bei Korn; Belehrung und Aufbewahrung des Blutegels, vom Hofrath Seiler, Dresden 1834, Walthe'sche Hofbuchhandlung.* Ausserdem sind in diesem Archiv fast in jedem Jahrgange, so wie in *Buchn. Repert.* als auch dem *pharm. Centralbl.* eine Menge Notizen über Naturgeschichte, Behandlung und Aufbewahrungsorte und Krankheiten des Blutegels mitgetheilt. Zusammengezogen findet man diese Notizen im *Hauslexikon f. d. Pharm.* Leipzig 1834, bei Breitkopf u. Härtel. Auch spricht Martius im *Lehrb. der pharm. Zoologie, Stuttg.* 1833, *Balz'sche Buchh.* ausführlicher darüber aus.

Zum Ausgraben von 8 Zuchtteichen, so wie zur Einfriedigung, wurde mir zu seiner Zeit unter hoher Mitwirkung aus den Staatskassen ein Zuschuss von 1600 Thlr. bewilligt. Zum ersten Besetzen der Teiche waren 1832 1600 Thlr. veranschlagt. Ehe es aber im Herbst 1834 bis zum Abtreten der hierzu bestimmten fiskalischen Grundstücke kam, war der Preis der Egel um das Doppelte gestiegen, so daß ich über 3200 Thlr. zum ersten Ankauf an Egel aufwenden mußte. Diese zweijährige Zögerung änderte nichts in der Anlage, wohl

richte sie sehr zu meinem Nachtheile wegen der Erhaltung des auf die Egel zu wendenden Capitals.

Wie sehr man schon seit langer Zeit einsah, daß die immer theurer werdenden Blutegel viel Geld dem Lande gehe, und daß eine Abhülfe wünschenswerth sei, zeigte, außer der von hoher Staatsregierung oben angeführte Art bewiesenen Begünstigung Einrichtung der hiesigen Zuchtteiche, eine öffentliche Bekanntmachung der Königl. sächs. Amtshauptmannschaft zu Chemnitz vom 1. Sept. 1835, wonach aus Mitteln der Apotheker Dehne in Penig sechs, und vier acht Louisd'or demjenigen als Prämie aussetzte, der die Blutegelzucht im Kleinen, d. h. jedem Apotheker oder Andern möglich, so weit bringe, daß nicht nur die von ihnen aus der Brut gezogenen Egel zum medicinischen Gebrauch herangewachsen, sondern auch von der Größe seien, daß sie sich wieder fortpflanzen. Der Preis für die Preisbewerber war der December 1837, und durfte der Bewerber nicht weiter, als bis zu drei Meilen von Chemnitz heimathsangehörig sein.

Im August 1838 erfolgte die anderweitige amtshauptmannschaftliche Bekanntmachung, daß dem Rathmann und Arzt C. Müller in Penig, welcher die Egel auf obenerwähnte Art in Fässern, bis zum medic. Gebrauch herangebracht habe, der Preis von 8 Louisd'or zuerkannt worden. Der zweite Punct, selbstgezojene Blutegel bis zur Fortpflanzung zu bringen, scheint aber nicht erleichtert zu sein, wenigstens sagt die öffentliche Bekanntmachung nichts davon. Es sei mir daher erlaubt, vor der Erreichung noch an dieses erreichte Ziel zu zweifeln. Ich habe 5 — 6jährige selbstgezojene Egel, welche zum medicinischen Gebrauch recht gut angehen, aber bis zur Fortpflanzung gehört eine doppelte Größe und also auch

*sch. d. Pharm. II, Reihe. XXII. Bds. 2. Hft.*



ein höheres Alter derselben. Scheel, der wohl älteste Blutegelzucht besitzt, ist vielleicht der einzige, der es schon so weit gebracht haben kann.

Mit dieser kurzen Schilderung des jetzigen Standes der Blutegelzucht habe ich übrigens Niemanden zu treten wollen, und indem ich nicht wünsche, dadurch noch mehr Feinde hervorzurufen, bin ich dem eignen Antriebe als der mehrseitigen Aufforderung dazu gefolgt \*).

---

### Sechste Abtheilung.

---

## **T o x i k o l o g i e.**

---

### Untersuchung einer Vergiftung durch Schwefelsäure;

von

*L. Aschoff,*

Apotheker in Bielefeld und Assessor des Vereins.

---

Unter den zufälligen Vergiftungen, die heutzutage leider noch so oft durch Nachlässigkeit herbeiführt werden, sind wohl die durch Schwefelsäure häufigsten, wenigstens sind mir seit Kurzem mehrere Fälle vorgekommen, wovon ich eine ich aufführe.

---

\*) Obgleich über die immer dringlicher hervortretende Blutegelzucht schon so viel geschrieben worden ist, so scheinen uns doch die Mittheilungen solcher Ergebnisse, wie vorstehenden, recht practisch-nützlich. Es wäre wünschenswerth, wenn die Besitzer grosser und kleiner Blutegelcolonien über den Ertrag derselben kurze statistische Nachrichten mittheilten. Man würde mit der Zeit dadurch den Stand gesetzt werden, die entgegenstehenden Schwierigkeiten zu besiegen und über den wirklichen Nutzen der Blutegelzucht zu entscheiden.

erhaltens wegen, hier näher erwähnen will, wo nämlich die Schwefelsäure schon tödtlich gewirkt, wenngleich in den untern Theilen der Speiseröhre, dem Magen und in normalen Därmen keine Spur von Schwefelsäure noch von Schweflichtsäure sich vorgefunden.

Das Kind eines wohlhabenden Mannes hatte nämlich mit einiger Zeit an Scropheln gelitten und wurde ihm von dem Arzt ein Saft verschrieben, der aus der nahegelegenen Apotheke geholt wurde. Gleichzeitig sollte die Magd vom Krämer Schwefelsäure mitbringen, wozu zufällig ein eben so großes Glas genommen wie das aus der Apotheke bekam. Zu Hause angelangt, wurde nun bald, wie es so häufig geschieht, die Signatur vom Glase abgerissen, aus welchem dem Kinde bald auf ein Theelöffel voll eingegeben werden sollte. In der Meinung, daß die Schwefelsäure bereits zur Stielwiche verbraucht, nahm die Mutter des Kindes das vor dem Fenster stehende Glas, und versuchte, dem Kinde, welches nicht gern Arznei nahm, und deshalb in der Magd gehalten werden mußte, einen Theelöffel voll Arznei einzugeben. So erhielt nun das Kind einen Theil dieser Flüssigkeit, während einiges vorbeifloß und die Hand der Magd traf, diese erkannte durch das heftige Brennen sogleich den Irrthum.

Der alsbald hinzugerufene Arzt verordnete *Kaliumplenicum* in eine schleimige Emulsion eingehüllt. Nach dem Genuß der Säure hatte sich gelindes Erbrechen eingestellt, daß nach der Emulsion sich noch wiederholte. Doch starb das 2½jährige Kind schon nach wenigen Stunden. — Bei der Obduction fanden sich die ganze Mundhöhle, die Backen, das Zahnfleisch, die Zunge, der Gaumen wie verbrannt. Die Oberhaut ganz weiß, an einigen Stellen zerfressen, an anderen

abgelöst und liefs sich die Haut mit den Fingern abstreifen.

Der Pharynx war in demselben Zustande, die Schleimhaut war zerstört, abgelöst und ebenfalls sehr leicht abzustreifen. Die Muskularhaut war theils entzündet wie gangrenös. Der Kehledeckel an der oberen Lippe ebenfalls wie verbrannt und die Oberhaut zerfetzt. Der Kehlkopf und die Luftröhre waren nicht beschädigt. Die Lungen waren von sehr blasser, hellgrauer Farbe, marmorirt, enthielten wenig Blut und knisterten beim Einschneiden. Das Herz hatte die normale Lage und Gröfse, in beiden Ventrikeln und Vorkammern lag sich flüssiges Blut, jedoch in der rechten mehr als in der linken. Die *Vasa coronaria* und die grossen Arteriengefäfsse waren, wie gewöhnlich, mit Blut gefüllt. Die Vena cava superior war in der Brust nicht. Die Leber, Milz, Pankreas, der Magen und alle Gedärme hatten ein gesundes Ansehen. Am Magenmunde, der *Cardia* und dem Duodenum, dem Zwölffingerdarm so wie an dem übrigen Verdauungskanal war weder Entzündung, Corrosion noch etwas Abnormes wahrzunehmen.

Die Gegend um den Mund herum, die Oberlippe und das Kinn waren corrodirt und mit graulich-weißen, gelblichen, trocknen pergamentähnlichen Schichten oder Brocken bedeckt. Am anderen Theile des Gesichts so wie am Handgelenke fanden sich ähnliche schmutziggelblichweisse Streifen.

Da die Obduction legal war, so mußte man sich vergewissern, ob wirklich das Kind durch den Genuß von Schwefelsäure gestorben. Es wurde daher der Magen mit seinen *Contentis*, der untere Theil der Speiseröhre etc. einer chemischen Untersuchung unterworfen, die ich hier in aller Kürze erwähnen will.

Der mir zur Untersuchung übergebene Magen nebst dem Theil des Schlundes enthielt ungefähr eine Unze einer gelblich trüben Flüssigkeit ohne besonderen Geschmack. Es wurde nun der Magen zerschnitten, mit destillirtem Wasser sorgfältig abgewaschen, und dies mit der im Magen enthaltenen Flüssigkeit vermischt, durch Filtration erhielt man eine klare, gelblich gefärbte Flüssigkeit, die nur nach längerer Zeit Lakmuspapier sehr schwach röthete. Ein Theil dieser Flüssigkeit wurde auf metallische Gifte untersucht, es konnten aber weder durch Schwefelwasserstoffwasser noch durch Schwefelwasserstoffammoniak oder andere dazu geeignete Reagentien unter den erforderlichen Cautelen solche darin aufgefunden werden.

Dem Sectionsbefunde zufolge, mußte eine ätzende Substanz die Zerstörung im Munde bewirkt haben, da keine metallischen Gifte bei der Prüfung sich ergeben hatten, so wurde ein anderer Theil der Flüssigkeit auf mineralische Säuren untersucht. Es konnten jedoch nur geringe Mengen von Chlorwasserstoffsäure gefunden werden, die auch nur zum Theil als die Chlorwasserstoffsäure darin enthalten war.

Chlorbarium brachte nicht die geringste Trübung hervor, sowohl vor Zusatz von Chlorwasser noch nach Zusatz desselben, daher weder Schwefelsäure noch Schweflichtsäure darin enthalten war. Ebenso konnte keine Salpetersäure darin aufgefunden werden, welche sich nicht eine solche *Corrosion* bewirkt haben konnte, wie die thierischen Körper gelb färbt.

Ein kleiner Theil der Flüssigkeit wurde der Destillation unterworfen, im Destillat waren weder Schweflichtsäure noch Schwefelsäure enthalten, sondern nur Spuren von Chlorwasserstoffsäure.

Die noch übrige Flüssigkeit, so wie der Magen, wurden nun mit Salpetersäure behandelt, im Filtrat fanden sich aber weder metallische Gifte noch Mineralien.

Bei weiterer Prüfung ergab es sich, daß nur die gewöhnlichen im Magen vorhandenen Bestandtheile von Natron (Ammonium) Chlorwasserstoffsäure etc. vorhanden waren. Der Rest der Flüssigkeit, welchen das Kind genossen, war bereits, um diese zu vermeiden, mit dem Glase ins Wasser geworfen, ebenso wie von der ausgebrochenen Flüssigkeit nichts mehr vorhanden, es konnte daher auf diese Weise keine bestimmte Auskunft über die Art des Giftes erhalten wer-



den. Da jedoch sowohl an dem Halse wie an den Halsgelenken des Kindes sich einige Streifen befanden, wie verbrannt aussahen, so liefs sich vermuthen, auch die Kleidungsstücke hin und wieder zerfressen Stellen hatten. Bei näherer Besichtigung fanden wir sowohl im Hemde wie in den Oberkleidern einige braune, theilweise durchlöchernte Flecken, welche sauer reagirten, diese wurden ausgeschnitten, mit stillirtem Wasser ausgekocht, wo dann in der filtrirten Flüssigkeit durch Baryt die Schwefelsäure vollkom- nachgewiesen wurde, in dem übrigen Theile der Kleidungsstücke, wo diese Flecken sich nicht befanden, keine Schwefelsäure vorhanden.

Wenngleich die chemische Untersuchung des Magens nebst dessen Inhalt, so wie auch einen Theil der Speiseröhre, worauf die Säure bedeutend eingewirkt zu keinem bestimmten Resultate führte, so wurde doch von den Obducenten als constatirt angenommen, dass der Tod des Kindes in Folge der Einwirkung des triolöls auf die Luftwege und zwar durch Entzündung und Krampf der *Glottis* und des Kehlkopfes erfolgt. Als Beweismittel wurde auf die Erfahrungen von Christison, Wagner und Augustin hingewiesen, die ebenfalls in ähnlichen Fällen den Tod erfolgen sahen, ohne dass die concentrirte Mineralsäure den Magen, sondern auch nur die Speiseröhre erreicht hatte.

Da die Vergiftungen vermittelt Schwefelsäure durch Unvorsichtigkeit so häufig aller Orten erfolgen, so ist es gut, wenn Vorsichtsmafsregeln bei Verabreichung dieses gefährlichen Stoffes aufgefunden werden können.

Nach dem Reglement vom 16. Septbr. 1836, Debit der Arzneiwaaren betreffend, ist es den Krämer erlaubt, Blausäure, *Hydr. oxyd. rub.*, *Zinc. sulphuric.* zu verkaufen, jedoch nicht unter 2 Loth; hingegen auch *Aloes*, *Arsenic. album*, *Aurum pigment*, *Hydr. corrosivum*, *Nuces vomicae*, *Radix Hellebor. alb.*, *Hell. binae* und minder schädliche (oder unschädliche) *Cortex Angusturae*, *Liq. Ammon. aceti*, *Magnes. ust.*, *Sulphuric. aether.* nicht unter 1 Pfunde; ob zwar Krämer, gleich den Apothekern, die gesetzlichen Vorschriften beim Verkauf der Gifte zu beobachten haben, so ist ihnen doch auch noch erlaubt, mehrere in der Pharmakopöe aufgenommene Arzneien, welche in den Vorschriften des oben angeführten Reglements nicht erwähnt sind, ohne alle Beschränkung zu verkaufen, dahin gehören unter andern die Mineralsäuren, *Capita papaveris*, *Opium*.



zum annum, Kleesalz, (welcher Name in einigen Gegenden so häufig von den Landleuten mit Glaubersalz verwechselt wird) durch welche so leicht Unglücksfälle beigegeführt werden können, zumal wenn sie in die Hände ganz unkundiger Leute kommen. Wünschenswerth wäre es daher, wenn man sich überzeugt hält, daß es den jetzigen Verhältnissen der Gewerbe angeeignet ist, daß die Kaufleute und Krämer mit den besten Arzneien und Giften handeln dürfen (deren Eigenschaften und Wirkung sie zwar sehr häufig gar nicht kennen), daß wenigstens strenge Mafsregeln beim Verkauf derselben ihnen anbefohlen, und nicht allein von den Medicinalpolizeibehörden, sondern auch von der Ortspolizei darauf gesehen, daß solche befolgt würden. Somit dürfte beim Verkauf der Schwefelsäure und übrigen Mineralsäuren, die man so häufig zu technischen Zwecken benutzt, das Anbinden einer Etiquette vielleicht nicht als unnütz sein, und gewifs mancher Mißgriff dadurch verhütet werden.

---

*Nachschrift zu vorstehendem Aufsatz.*

Möge der hier mitgetheilte traurige Vorfall für die aus der Medicinalpolizei nicht verloren sein! In den Kramladen finden weder Arzneistoffe noch Gifte. Die Apotheke allein ist der Ort sein, wo das Publikum solche zu suchen hat, und zu billigen Preisen nicht nur sondern auch von der erforderlichen Güte und für Giftstoffe auch mit der dazu nothwendigen Verpackung finden wird. Wie ist es aber in der Wirklichkeit? Nachstehendes ist eine Antwort auf diese Frage. Öffentliche Blätter enthalten die Ankündigung „die Neue Berliner Kautschukfabrik, verbunden mit einer Handlung heilsamer Waaren zur Abhülfe vielfacher Übel ist in Berlin, Mohrenstrasse № 37. unter den Colonaden.“ Vortrefflich, wenn die Medicin, Chirurgie und Pharmacie auch sogar mit Kautschukfabrikanten concurriren muß!

Br.

## Siebente Abtheilung.

### Allgemeiner Anzeiger.

#### I. Anzeiger der Vereinszeitung.

##### Notizen aus der Generalcorrespondenz des Directoriums.

Hr. Vicedirector Dr. Bley: Ueber das Kreisdirectorium den in seinem Vicedirectorium zu bildenden neuen Kreis De — Hr. Vicedirector Müller: Ueber Versendung des Archivs. — Hr. Dr. Geiseler: Ueber Ausbreitung des Vereins. — Hr. Apotheker Müller in Schneeberg: Ueber den Beitritt der Apotheker im sächs. Erzgebirge zum Verein. — Hr. Apotheker Geiseler und Hr. Kreisdirector Erdmann: Ueber Angelegenheiten des Vereins in Berlin. — Hr. Medicinalrath Staber: Ueber denselben Gegenstand und über Angelegenheiten der Gen-Buchholz'schen Stiftung. — Die Herren Kreisdirectoren Geiseke und Voget: Ueber Angelegenheiten ihrer Kreise. — Vicedir. Grischow: Ueber Portofreiheit für die Bücherbesitzer in Mecklenburg. — Hr. Hofapoth. Hübner: Ueber Differenzen betreffend denselben Gegenstand. — Hr. Postmstr. Pothmann Lemgo: Ueber denselben Gegenstand. — Hr. Vicedirector Meurer: Ueber Angelegenheiten seines Vicedirectoriums, über die Bemühungen des Kreisdirectors Praefssler, die Apotheker in der Lausitz zum Beitritt zum Verein zu veranlassen. — Hr. Dr. Marquart in Bonn: Ueber die Wiederherstellung des Kreises Bonn. — Hr. Apotheker und Assessor Faber: Ueber Ausbreitung des Kreises Minden.

Dankschreiben für die Ehrenmitgliedschaft des Vereins eingegangen: von Hrn. Apotheker Pfeffer, Hrn. Apotheker Meurer und Hrn. Apotheker Ernst in St. Petersburg.

Unterstützungsgesuch von Hrn. Prediger Thilo in Döbeln für den invaliden Apotheker Zickner. Von Hrn. Apotheker Albers in Lengerich für den blödsinnigen Gehilfen Drees. Von Hrn. Apoth. Möhring in Wernigerode. Dankschreiben für erhaltene Unterstützung von Hrn. Brekenfelder in Cröplin.

Beiträge zum Archiv gingen ein: von Hrn. Dr. Geiseler in Königsberg; von Hrn. Apotheker Gräger in Mühlhausen; von Hrn. Apotheker Dr. Wagner in Pesth.

#### Die Gehülfen-Unterstützungsanstalt.

Hr. College Müller in Medebach hat die schöne Absicht, durch die Herausgabe eines pharmaceutisch-botanischen Wörterbuchs, zum Besten der Gehülfen-Unterstützungskasse, einen Beitrag zu ihren Fonds zu verschaffen. Indem wir

beimüthige Absicht des Hrn. Collegen Müller dankbar anerkennen, wünschen wir recht sehr, daß dieselbe von einem der wohlthätigen Stiftung segensreichen Erfolge gekrönt sein möge. Nach Einsicht der uns mitgetheilten ersten Bogen des Werkes halten wir dasselbe besonders für jeden angehenden Pharmaceuten recht nützlich. Es enthält die Erklärung aller lateinischen *termini technici*, kurz und gründlich, so wie alle Pflanzen, die in den Arzneischatz von Wichtigkeit sind, oder sonst ein besonderes Interesse haben, und deren natürlichen Familien darin bezeichnet sind. Diejenigen also, die für 8 Thlr. ein nützliches Buch sich erwerben und zum Besten der Unterstützungsanstalt dadurch zugleich mitwirken wollen, empfehlen wir dasselbe bestens.

Die Buchholz-Gehlen-Trommsdorff'sche Stiftung.

### Handelsnotizen.

*Amsterdam, den 23. März.* Maranham Cacao  $23\frac{1}{2}$  Cs., Reis, ar. 12 — 13 fl., schöner  $14\frac{1}{2}$  —  $15\frac{1}{2}$  fl., Java  $9\frac{1}{2}$  — 11 fl., gehälter Tafelreis 13 fl., Pfeffer 25 Cs., Nelken 65 Cs., Zimmt, langer Ceylon 4 —  $5\frac{1}{2}$  fl., kurzer  $3\frac{1}{2}$  —  $4\frac{1}{2}$  fl.

*Antwerpen, den 21. März.* Der Mangel an Pfeffer ist durch die Zufuhr von 1000 B. gehoben. 50 Kisten chin. Zimmt wurden zu 54 Cs. pr.  $\frac{1}{2}$  Kilogr. verkauft. Cacao, wenig Vorrath.

*Berlin, Anfangs April.* Rohes Rübol  $10\frac{5}{8}$  —  $10\frac{7}{8}$  Thlr., raff.  $11\frac{1}{2}$  — 12 Thlr. Leinöl  $10\frac{1}{4}$  —  $10\frac{1}{2}$  Thlr.

*Halle, Anfangs März.* Viele Aufkäufe von Rübol hat die Vorthe verkleinert und den Preis auf  $11\frac{1}{4}$  —  $11\frac{1}{2}$  Thlr. gebracht. Stärke  $7\frac{1}{4}$ , Mohnöl 20, Leinöl 11 Thlr.

*Hamburg.* Die Waareneinfuhr in Hamburg im Monat März giebt unter anderm: Cacao 424 Säcke, 2212 Aroben. Kaffee 549 Säcke, 25 Fässer, 380 Ballen. Canel 1 Packen. Cassia 62 Kisten. Corinten 142 Both, 2 Carrotels, 19 Fässer. eigen 532 Trommel, 61 Kisten, 200 Fässer, 232 Matten, 4 Körbe, Parthien. Blauholz 5074 Stück, 35 Tons. Brasil 758 Stück, Pack. Indigo 327 Kisten, 66 Seronen, 4 Fässer. Ingwer 322 Sack, 126 Bund, 391 Colli, 3 Ballen, 2 Robben. Krapp 20 Fässer. Kümmel 40 Säcke, 10 Ballen. Lakritzen 186 Kisten. Lumen 401 Ballen, 10 Fässer, 1216 Säcke, 63 Matten. Macis 2 Fässer. Muskatnüsse 8 Fässer. Mandeln 18 Fässer, 496 Seronen, 55 Säcke, 63 Körbe, 5 Ballen. Nelken 13 Matten, Pfeffer 13 Säcke, 55 Ballen. Piment 255 Säcke. Pomeranzen 3 Fässer, 6 Kisten, Ballen. Pottasche 13 Fässer. Reis 5187 Säcke, 610 Tonnen, 3 Fässer. Sago 1 Sack. Salpeter 60 Säcke, 301 Fässer. Schellack 295 Kisten. Thee 1194 Kisten, 6 Packen. Wachs 60 Säcke, 5 Packen, 3 Körbe, 14 Fässer, 11 Colli, 70 Ballen, 8 Stück. Weinstein 38 Fässer.

— Ende März. Guajaquil Cacao  $3\frac{3}{4}$  fs. Es sind 80,000 Camachholz importirt, werden auf  $6\frac{3}{4}$  Mk. gehalten. Mandeln Venez., werden auf  $58\frac{1}{2}$  — 59 Mk. gehalten. 800 Säcke Sumatra Pfeffer befanden sich am Markt, werden auf  $4\frac{3}{8}$  fs. gehalten.

— Anfangs April. Die Zufuhr von Kaffee in den letzten

drei Monaten betrug circa 5 Millionen Pfd., noch weniger die Hälfte gegen den gleichen Zeitraum im vorigen Jahre.

— den 14. April. Von *Pugl. Baumöl* sind noch keine Zufuhren eingetroffen, von *Spanischem* ist eine Kleinigkeit. Hafen, *Messina* bedingt 32 Mk.

Nach Nachrichten aus *Jamaica* vom 28. Febr. sollen die Aussichten auf eine günstige Zuckerernte gering sein, in Folge haltender Dürre. Pflanzungen, die voriges Jahr 80 — 100 Ouh ergaben, liefern dieses Jahr nur 10.

*Havanna.* Ausfuhr von *Kaffee* und *Zucker* vom 1. Jan. bis Ende Februar:

|                                | 1839           | 1840           |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Zucker von <i>Havanna</i> .... | 13,967 Kisten  | 31,761 Kisten  |
| "      " <i>Matanzas</i> ....  | 4,943 " "      | 23,442 " "     |
|                                | 18,910 Kisten  | 55,203 " "     |
| Also mehr.....                 |                | 36,293 " "     |
| Kaffee von <i>Havanna</i> .... | 476,731 Aroben | 341,618 Aroben |
| "      " <i>Matanzas</i> ....  | 46,785 " "     | 36,454 " "     |
|                                | 523,516 Aroben | 382,072 " "    |
| Also weniger ..                |                | 141,444 " "    |

Das Deficit an *Kaffee* betrifft allein die Staaten von *Nordamerika*, während nach *Europa* mehr als seit Jahren versandt wird.

*Liverpool.* Mitte März kam das Schiff *Garrick* mit 4700 von *Newyork* und mit einer andern Ladung von eben dabin 2000 Colli *Thee* enthaltend, an, können aber nach den Navigationsgesetzen nicht zum Verbrauch, sondern nur zur Ausfuhr verwendet werden.

*London.* Aus dem amtlichen Bericht über den Handel und die Schifffahrt Großbritanniens in dem mit dem 5. Januar 1840 endenden Jahre theilen wir folgende Notizen mit. Einfuhr 1839: *Cacao* 1 Mill. 602,206 Pfd. *Kaffee* aus den britischen Besitzungen in *Amerika* und *Afrika*, 10 Mill. 769,655 Pfd., von *Cap* der guten Hoffnung, aus *Maritius* und dem brit. Ostindien 4 Mill. 260,188, aus der *Levante* (nicht britisch) 20 Mill. 345,000 Pfd. Gesamteinfuhr 39 Mill. 850,752 Pfd. *Kupfererz* 593,113 Ctr. *Zink* 163,815 Ctr. *Quecksilber* 2 Mill. 273,695 Pfd. *Opium* 195,240 Pfd. *Reis* 931,284 Ctr. *Rum* 5 Mill. 477,670 Gallonen. *Brandy* 2 Mill. 270,748 Gall. *Wacholderbranntwein* 666,372 Gall. *Zucker* 4 Mill. 677,149 Ctr. *Talg* 1 Mill. 330,310 Ctr. *Thee* 12,538 Fässer und Lasten. *Thee* 38 Mill. 68,565 Pfd. *Tabak* (roh) 35 Mill. 609,183 Pfd. *Terpentin* 321,211 Ctr. *Wein* 9 Mill. 907,980 Gall.

— den 28. Febr. *Zucker* lebhaft begehrt. *Corinten* sind stark zum Export gekracht, neue Zante mit 53 sh. — 53 sh. 6d. Der Markt von *Indigo* ist stille, aber fest. Das Deficit im Vorrath gegen voriges Jahr beträgt circa 6300 K., doch lassen sich keine höhere Preise erwarten, da im April alle die schönen im Januar zurückgezogen *Indigos* in Auction kommen. Auf süßen *Mandeln* sind bedeutende Aufträge eingegangen, die Eigener fordern jetzt 60 sh.; Zufuhren sind in diesem Monat nicht eingetroffen; *bittere* sind nicht mehr unter 45 sh. zu haben. Von



Indischem Reis kamen heute 1513 S. in Auction, weißer Beng. 13 sh., geringer weißer Java 9 sh. 6 d., Caroliner neuer h. Olivenöl viel gefragt. Palmöl 34 Pfd. Ostind. Cocosöl h. Pfeffer stark begehrt, in der Auction kamen 1950 S. vor. 3½ d. Ostind. Ingwer gefragt. In *Cassia lignea* wegen hohen Forderungen wenig Umsatz. In *Thee* wenig Umsatz. Die Preise von *Salpeter* sind fest, in der nächsten Auction kommen 7100 S. vor, Preis über 25 sh.

— Ende März. Das bis jetzt declarirte Quantum für die Indigoauction beläuft sich auf 5451 Kisten. Nach den letzten Briefen von Calcutta wird die Ernte auf 120,000 Maunds geschätzt. Der Begehr nach *Thee* hebt sich, geringer Congo zu Tsankay 2 sh. 2½ d., Compagnie Congo 2 sh. 3½ d. Fast alle wohlfeile Thees sind vom Markte geräumt. Ostind. Cocosöl hat nicht viel Käufer, doch sind die Preise fest. Palmöl 36 Pfd.

— den 3. April. Die Zuckerpreise sind fester. Cacao Trinid. vorzügliche Sorte, ist mit 64—65 sh. bezahlt. *Salpeter* 27 sh. Pfeffer 3½—4 d. *Cassia lignea*, gute Mittelwaare zu geringer Mittelwaare 78—80 sh. Ingwer 22 sh.

— den 10. April. Schwefel gesucht 12 Pfd. 10 sh. — 13 Pfd. Ingwer und Piment behaupten sich im Preise. In *Cassia lignea* seit letzter Auction von 600 Kisten zu 80 sh. auf Speculation nicht viel Umsatz, doch blieben die Preise fest.

— den 17. April. Das Schiff Pekon ist mit 5900 Colli *Thee* angekommen. In Auction gegen 594 S. Piment zu 3—3½ d. Feiner Ingwer 3 Pfd. 15 sh. — 3 Pfd. 5 sh. 12 d. *Cassia* im Preise fest.

— Es ist für *Salpeter* ziemlicher Begehr und höhere Preise deshalb notirt, die geringste Qualität zu 25 sh., auch 26 sh. Palmöl werden höhere Preise gefordert. 2000 Robins Malabar-Pfeffer ist der volle Werth 4½—4¾ d. bezahlt. Piment 2. Geringe *Cassia lignea* 82 sh., gute 87 sh., feine 90 sh. Ingwer gefragt. Malabar-Ingwer 17 sh. — 17 sh. 6 d. Bengal 18 sh. 6 d. Feiner rother Trinidad-Cacao aus der Hand 64—65 sh. bezahlt.

— Mainz, Anfangs April. Rüböl findet guten Absatz zu 42 Thlr. Leinöl wird 38½ Thlr. gefordert. In Rheinhessen und Rheinl., zwei der vorzüglichsten Rappsländer, erwartet man eine reiche Ernte.

— Neapel, den 20. Febr. Gegen alle Erwartung sind die Oelpreise noch gesunken, Gallipoli gegen baar 25 Dr. 75 Gr. Calab. 66 Dr. pr. Both von 2½ Salmen.

— Mitte März. Gallipoli Baumöl ist auf 26 Dr. 80 Gr. gekommen. Das zur Ausfuhr bestimmte Quantum beläuft sich auf 600 Salami.

— Stettin, Ende März. Rüböl 11 Thlr., Leinöl 9¾ Thlr., Hanföl 10 Thlr., Palmöl 14½ Thlr., Baumöl geräumt, Südseetheran 9¾ Thlr.

Schrift zu Goldfirniss, mitgetheilt von Müller in Medebach.

Lacc. in Granis. 3ijj, Sandarac 3ß, Mastiches 3j, Colophon. 3j, Orlean gr. xx, Sanguin. Dracon. 3ß, Croci, Rad. Curcuma gr. xv, Alcohol. 3ijj, Dig. per horas xxiv.



### Buchbinderlack.

Eine Vorschrift zu diesem Lack liefert Apotheker W. Gand in St. Ingbert, die dem berühmten Pariser Lack ganz gleich sein soll. 12 Unz. Gummi Lacc. in Tab.,  $\frac{1}{2}$  Drachme Kampfer und  $\frac{1}{2}$  Drachme feiner Zucker werden mit 6 Pfd. Alkohol 86 Proc. aufgelöst, die Auflösung durch Löschpapier filtrirt in einer Retorte bis zur Hälfte abdestillirt, und dann der warmen Flüssigkeit 1 Drachme Ol. aeth. Cassiae zugesetzt. Dieser Lack besitzt die Consistenz des Mandelöls, hat 0,945 Gew. Der Kampher und Zucker sollen die gleichförmige Uebertragung befördern, das Ol. Cassiae den Kamphergeruch verstärken und den frisch gebundenen Büchern dadurch ein mehrere Monate anhaltender angenehmer Geruch ertheilt werden.

### Aechte Stempelfarben für die chemische Bleichung.

Eine Mischung hierzu, die ihrem Zwecke völlig entspricht und gegen Schwefelsäure, Chlor, Salzsäure, Salpetersäure und Kali beständig ist, besteht nach L. Elsner in folgender Zusammensetzung:

1 Zinnober und  $\frac{1}{2}$  Eisenvitriol werden mit Leinöl zu einem dicken Firniss zusammengerieben, welcher auf die bekannte Weise mittelst Stempelballen und Stempel auf die Waare gedrückt wird. Ebenso kann diese Mischung gebraucht werden um Leinenzeug in öffentlichen Anstalten auf eine dauerhafte Weise zu zeichnen. — Weniger echt, aber für manche Fälle ausreichende Stempelfarben liefern der sogenannte grüne Zinnober (Chromoxyd) und Berlinerblau, welche erst mit Leinöl firniss angerieben und dann wie gewöhnlich auf die Waare gedruckt werden. (Erdmann's Journ. XII, 302.)

### Dinte für Stahlfedern.

Nach Hänle erhält man eine gute schwarze, die Stahlfedern nicht angreifende Dinte, wenn man 4 Loth Galläpfel,  $\frac{1}{2}$  Loth arab. Gummi und 10 Loth Wasser 24 Stunden stehen läßt und dann ein Scrupel Eisenoxyd, erhalten durch Calciniren von Eisenvitriol bis zum rothen Oxyde, zusetzt.

### Herausbringen fest sitzender eingeriebener Glasstöpsel.

Hr. Flusain empfiehlt folgendes Verfahren, festsitze eingeriebene Glasstöpsel loszumachen. Man nimmt einen mit einem Lederstreifen versehenen Bogen, legt das Leder um den Hals der Flasche, worin der Stöpsel fest sitzt und läßt den Bogen wirken; mittelst der durch den Bogen hervorgebrachten Wärme und Erschütterung geht der Kork, ohne Nachtheil für das Glas, in einigen Secunden los. (Journ. de Chim. med. 2. Ser. IV. 436.)

## Miscellen.

**Die Fasern des Pisangbaumes** (*Musa paradisiaca*.) Den Banan- oder Adamsfeigenbaum, hat man angefangen, zur Papierherstellung zu benutzen. Das Verfahren ist dem bei der Darstellung des Papiers aus Lumpen ganz ähnlich. Es läßt sich die dichteste wie das dünnste Papier daraus bereiten. Wahrscheinlich läßt sich auch die Faser zu Geweben bearbeiten. Die Tropenländer kann hierauf ein neuer wichtiger Industriezweig gegründet werden; Cayenne könnte in kurzer Zeit tausend Kilogramme von Pflanzenfasern liefern.

**Anbau des Sumachs.** Der Färber Gerok in Heilbronn macht die Vortheile der inländischen Cultur des Sumachbaums (*Rhus typhina*, *Rhus Typhina*) aufmerksam, da der Gebrauch des Sumachs in der Färberei, besonders in der Türkischrothfärberei und Gerberei so sehr zugenommen hat. Der inländische soll den besten italienischen, von welchem der Centner, 104 Pfd., 7 Fl. kostet, völlig gleich kommen. Man setzt die jungen Bäume, Ausläufer, zeitig im Frühjahr ungefähr 4' weit voneinander. Die Blätter kommen zeitig und wachsen schnell, im ersten Jahr können aber nur wenig geerntet werden. Im August und Sept. werden die Blätter sammt den Blattstielen abgenommen, im Schatten getrocknet und ganz oder gemahlen in Säcke verpackt in Handel gebracht. In den ersten 3 Jahren der Ertrag nur gering, aber schon nach acht Jahren liefert der württembergische Morgen 15 Centner trockne Blätter, à 5 Fl. 15 Fl. Ertrag; nach 10 Jahren ungefähr 20 Centner. Die Bäume erfrieren bei uns nicht, und vermehren sich durch Samen wie bekannt, ungemein.

**Der Weinbau und Seidenbau in Kaukasien.** Der letztangebaute Weinanbau an der Kuma im kaukasischen Gebiet ist das Landgut des Rebrow. Mitten in der todten oft salzgründigen Steppe derselbe Wälder, Weingärten und Seidenplantagen angelegt. Er gewinnt gegen 2000 Wedro Tischwein und fabricirt einige tausend Flaschen muscirenden Wein. Der Seidenbau wirft jährlich einen Gewinn von 6000 Rubeln ab.

**Blutegel.** Hr. Huzard hat der französischen Gesellschaft eine Aufmunterung der Industrie den Vorschlag gemacht, Preise für die beste Art, die Blutegel in Frankreich zu vermehren, auszusetzen. Es werden jährlich 23 Millionen dieser nützlichen Thiere in Frankreich consumirt, der Preis derselben ist, wegen der Schwierigkeit sie zu erhalten, zu einer enormen Höhe gestiegen. Die Preisaufgabe soll nun für folgende Fälle gestellt werden: 1) für die Nachweisung und Anlage solcher Gewässer, die zur Aufnahme von Blutegeln geeignet sind, jetzt aber dergleichen noch nicht haben. 2) Für die Erfindung der besten Operation, um die Blutegel, nachdem sie sich voll gesogen, zur Abführung zu bringen, ohne daß dieselben dabei leiden oder die Sauglust einbüßen. 3) Für die Einführung einer neuen Art, die in Frankreich noch nicht gekannt ist.

**Kürbiszucker.** Nach Nachrichten in öffentlichen Blättern sagt man in Ungarn jetzt an, Zucker aus Kürbissen zu produziren. 27 Centner Kürbisse sollen 1 Centner Rohzucker geben, und ein Acker viermal mehr Kürbisse als Rüben produ-

ciren, Kürbisse von 100 Pfd. sollen dort nichts Seltenes sein. Schaafe fressen den Abfall sehr gern und der Kürbis gedeiht in leichtem Boden.

**Indigo.** Nach Berichten schätzt man die Indigoausfuhr 1839 nach England auf 26,500, Frankreich auf 7000, Noramerika auf 800, Preussen auf 400, zusammen 34,700 Kisten 125,000 Maunds.

**Bernstein.** Seit Menschengedenken hat die See in der Gegend von Danzig nicht so viel Bernstein ausgeworfen, wie in den letzten Wochen. Man sucht diese Erscheinung auf Durchbrüche bei Neufähr zu erklären.

**Berg- und Hüttensegen.** Im Jahr 1839 betrug die Gewinnung an Gold in den Bergwerken der russ. Krone 142 Pud 22 Pfd. in den Privat-Bergwerken 170 Pud 22 Pfd. Unter dem letzteren das dem Gardecornet Jakolew gehörende Bergwerk von W. Isset, welches 54 Pud brachte, das einträglichste. An Platinen auf den Kron- und Privatbergwerken 91 Pud 36 Pfd. gewonnen, und kamen davon 90 Pud 26 Pfd. allein auf die Bergwerke der Herren v. Demidoff.

---

### Verkaufsanzeige.

Unsere gewächsreiche Umgegend bietet von den meisten cinellen narkotischen Kräutern, als: *Atropa Belladonna*, *Scleranthus*, *lendul. off.*, *Conium macul.*, *Digital. purp.*, *Hyoscyam. nigr.* u. s. w. so viel wildwachsend dar, daß ich im Stande bin, die Präparate genau nach Vorschrift der neuesten preuss. Pharmacopoe Beindorfschen Dampfapparate sorgfältigst bereiteten Extracten auch in größeren Quantitäten abzugeben, wenn deren Bestellung bis Ende Juni bei mir eingeht. Mit kleinern Quantitäten kann ich, wie schon bisher, jederzeit dienen und zwar zu billigen Preisen, als die der Droguisten.

Weimar, im April 1840.

L. Knauer, Apotheker.

---

### Dienstgesuche.

Ein junger Mann, welcher die Pharmacie erlernen will und die dazu erforderlichen Schulkenntnisse besitzt, kann auf dem ersten Michaelis in meiner Apotheke unter billigen Bedingungen eine Anstellung finden.

Barntrup im Fürstenthum Lippe,  
den 28. April 1840.

Der Apotheker Reinhold

Ich kann diese Stelle einem jungen Manne recht sehr empfehlen.  
Br.

---

Ein anspruchsloser junger Mann, der sich hinreichend mit Glück in den Schulwissenschaften umgesehen hat, dabei anerkannter Rechtschaffenheit ist, wünscht, obgleich etwas in den Jahren in welchen man sich gewöhnlich in die Lehre aus großer Vorliebe für die Pharmacie, noch eine Lehrzeit

alle, und kann sie sofort antreten. Weitere Nachricht bei Ferdinand Rougemont in Hoya, auch bei mir.

Wunstorf bei Hannover,  
im April 1840.

Dr. Du Ménil,  
Oberbergcommissair etc.

### **Apothekenverkaufe.**

Eine Apotheke, die einzige einer lebhaften Stadt von 2000 Einwohnern im Königreich Sachsen, zu deren Uebernahme circa 500 Thlr. baarer Anzahlung, eben so eine Apotheke mit ansehnlichen Realitäten in einer bedeutenden Stadt des Königreichs Preussens, zu deren Acquisition mindestens 11,000 Gulden, so wie eine Apotheke in einer ansehnlichen Stadt Preussens, zu deren Uebernahme circa 15,000 Thlr. erforderlich sind, und ausserdem mehrere andere grössere und kleinere Apotheken, sollen verkauft werden. Nähere Auskunft in diesen Beziehungen ertheilt

der Apotheker E. Grefssler zu Saalfeld  
in Thüringen.

---

## **II. Anzeiger der Verlagshandlung.**

(Insertate werden mit 1½ Ggr. pro Zeile mit Petitschrift, oder für den Raum derselben, berechnet.)

---

### **Vollständiges Real-Lexicon** der

medicinisch-pharmaceutischen Naturgeschichte und  
Rohwaarenkunde.

Enthaltend:

Erklärungen und Nachweisungen über alle Gegenstände der Naturgeschichte, welche bis auf die neuesten Zeiten in medicinisch-pharmaceutischer, toxikologischer und diätetischer Hinsicht bemerkenswerth geworden sind.

historisch-geschichtlicher und pharmakologischer Commentar zur Pharmakopöe für Ärzte, Studirende, Apotheker und Droguisten.

Herausgegeben von

**Dr. Eduard Winkler.**

Erster Band in fünf Heften. A—L.

Gr. 8. Jedes Heft im Subscriptionspreis 20 Gr.

Die Kritik hat sich auf das günstigste über das Werk ausgesprochen, das einem wahrhaften Bedürfnisse entspricht. An dem zweiten Bande, der das Werk beendigt, wird ununterbrochen gedruckt.

Leipzig, im März 1840.

**F. A. Brockhaus.**



**Botanik,**

Für Freunde und Kenner derselben!!

Vollständig in drei Bänden, als classisch von allen Botanikern  
erkannt, sowohl für den Botaniker von Fach als auch für den  
der Botanik unentbehrlich, kann die dritte Auflage von

J. C. Moessler's

**Handbuch der Gewächskunde**

Dritte Auflage

herausgegeben, vermehrt und verbessert

von

**Dr. J. C. L. Reichenbach.**gr. 8. 3 Bände. Altona, Hammerich. 6 $\frac{3}{4}$  fl.

nicht dringend genug empfohlen werden.

Dieses sichere, zuverlässige Handbuch, hat bereits beim  
der Gewächskunde sich als höchst praktisch bewährt, was wohl  
besser beweist, als die allgemeine Verbreitung desselben, wodurch  
möglich wird, einen so billigen Preis zu stellen.

Sämmtliche solide Buchhandlungen Deutschlands, Oesterreichs  
Schweiz etc. haben dieses gebiegene Werk stets vorrätzig.

Von folgendem Werke:

**Principes élémentaires de Pharmaceutique, ou  
position du système de connaissances relatives  
l'art du Pharmacien. Par M. P. A. Cap.**

wird binnen Kurzem eine deutsche Bearbeitung in unserm T  
erscheinen. Dieses Werk ist gewissermaßen eine Introduction  
Pharmacie, wie solche noch nicht existirt. Unsere Ausgabe wird  
eine bloße Uebersetzung des in Frankreich mit so vielem Beifall  
genommenen Werks des Hrn. Cap sein, sondern eine gründliche  
arbeitung desselben unter steter Anwendung auf die Zustände  
Pharmacie in Deutschland. Wir glauben, nach dem Urtheile  
verständiger überzeugt zu sein, daß dem angehenden Pharmaceut  
Buch in die Hände gegeben werden kann, was ihn auf eine so  
Weise in das ganze Gebiet der Pharmacie einführt, als dieses,  
merken nur noch statt alles Weiteren, daß unsere Ausgabe  
Hrn. Hofrath Ritter Dr. A. Brandes bearbeitet wird.

Hannover, im April 1840.

Hahn'sche Hofbuchhandlung

**Textverbesserung.**

Bd. XXI. 2. R. S. 124 Z. 9 von unten l. an den statt an d  
Bd. XXII. 2. R. S. 80 Z. 6 von unten l. fibrini statt fibrin





**J u n i.**

**ARCHIV**  
**DER PHARMACIE,**  
 eine Zeitschrift  
 des  
 Arzner-Vereins in Norddeutschland.

III. Reihe. Zweiundzwanzigsten Bandes drittes Heft.

Erste Abtheilung.

**Vereinszeitung,**

herausgegeben vom Directorio des Vereins.

**1) Vereinsangelegenheiten.**

Generalconferenz zu Salzuflen am 27. April 1840.

Ein Bericht des Hrn. Vicedirectors Weifs in Bromberg an das dortige Vicedirectorium wurde vorgelegt. Die Ansicht des Vicedirectors Weifs, dasselbe in noch mehr Kreise zu theilen, würde alsdann im Interesse des Ganzen sein, wenn jeder Kreis aus wenigstens 15 Mitgliedern bestehe, und der Gegenstand den Herren Mitgliedern in diesem Vicedirectorium bei der nächsten Versammlung, die Hr. College beabsichtigt, zur Berathung empfohlen. Vielleicht werden dahin noch mehr Collegen dortiger Gegend sich anschließen, und die Bildung eines dritten Kreises im Vicedirectorium Bromberg dann um so mehr rathlich sein.

Es wurde der Antrag des Hrn. Dr. Bley in Erwägung genommen, wegen Theilung des Kreises Bernburg, der durch den Zutritt vieler neuer Mitglieder zu sehr ausgedehnt ist, und die nothwendige Begründung eines neuen Kreises, des Kreises Bernburg. Dieser Antrag wurde im Interesse der Mitglieder angenommen und Hr. Dr. Bley ersucht, auf der von ihm beab-

sichtigten nächsten Kreisversammlung die desfallsigen Einrichtungen zu treffen.

3) Dem emerirten Apotheker Hrn. Möhring in Wernrode wurde die nachgesuchte Unterstützung, Namens der Buch Gehlen-Trommendorfschen Stiftung auch für 1840 bewilligt.

4) Die Revision der neuen Auflage der Statuten wurde gesetzt.

E. F. Aschoff. Brandes. Overbeck.

### Eintritt neuer Mitglieder.

Hr. Apotheker Elferding in Dinslaken ist, nach Anmeldung durch Hrn. Vicedirector Klönne, in den Kreis Essen Ruhr als wirkliches Mitglied des Vereins aufgenommen worden.

Desgl. Hr. Apotheker Röttger in Sternberg, nach Anmeldung durch Hrn. Vicedirector Dr. Grischow und Hrn. Kreisdirector Hollandt, in den Kreis Güstrow.

Desgl. Hr. Apotheker Tills in Flammersheim, nach Anmeldung durch Hrn. Vicedirector Sehlmeier, in den Kreis Cöln.

Desgl. Hr. Apotheker Augstin in Pacosc und Hr. Apotheker Bogenschneider in Fardon, nach Anmeldung durch Hrn. Vicedirector Weifs, in den Kreis Bromberg.

Desgl. Hr. Apotheker Bethe in Clausthal und Hr. Apotheker Lühring in Dassel, nach Anmeldung durch Hrn. Kreisdirector Bolstorff, in den Kreis Eimbeck.

Desgl. Hr. Apotheker Schlatter in Petershagen, nach Anmeldung durch Hrn. Kreisdirector Faber, in den Kreis Minden.

Desgl. Hr. Apotheker Märtens in Zorge, nach Anmeldung durch Hrn. Vicedirector Herzog, in den Kreis Braunschweig. Hr. College Märtens ist bereits 1839 eingetreten, die Anmeldung ist zufällig verspätet.

Desgl. Hr. Apotheker Hecker in Chemnitz, nach Anmeldung durch Hrn. Vicedirector Dr. Meurer und Hrn. Kreisdirector Kirsch, in den Leipzig-Erzgebirgischen Kreis.

Desgl. Hr. Apoth. Heynemann jun. in Lemgo, nach Anmeldung durch Hrn. Director Overbeck, in den Kreis Lippe.

Der Oberdirector des Vereins  
Brandes.

### Generalkasse.

Abrechnungen von 1839 gingen ein: von Hrn. Vicedirector Weifs in Bromberg, von Hrn. Kreisdirector Bolstorff in Eimbeck, von Hrn. Kreisdirector Giseke in Eisleben, von Hrn. Kreisdirector Gressler in Saalfeld.

Abrechnungen von 1840 gingen ein: von Hrn. Kreisdirector Kerstens in Stade, von Hrn. Vicedirector Dr. Herzog in Braunschweig, von Hrn. Kreisdirector Faber in Minden, von Hrn. Kreisdirector Wackenroder in Burgdorf.

Vorläufige Zahlungen an die Generalkasse für 1840 von Hrn. Kreisdirector Jahn in Meiningen, von Hrn. Kreisdirector Weifs in Bromberg, von Hrn. Kreisdirector

Holstorff in Eimbeck, von Hrn. Vicedirector Dr. Meurer  
Dresden, von Hrn. Kreisdirector L. Treu in Stendal, von  
Hrn. Kreisdirector Grefsl er in Saalfeld.

Die Direction der Generalkasse.

Dr. E. F. Aschoff.

Hölzermann.

Fortsetzung des Verzeichnisses der eingegangenen  
Beiträge für Hrn. Ap. Linke in Neustadt, Vereins-  
kreis Arnswalde.

|                                               |   |       |
|-----------------------------------------------|---|-------|
| Von Hrn. Apoth. Kreisd. Franc in Witzenhausen | 1 | Thlr. |
| „ „ „ Schaumburg in Rothenburg.               | 1 | „     |
| „ „ „ Braun in Eschwege.....                  | 4 | „     |
| „ „ „ Treu in Stendal.....                    | 1 | „     |
| „ „ „ Thiede in Arneburg.....                 | 1 | „     |
| „ „ „ Bracht in Osterburg.....                | 1 | „     |
| „ „ „ Riemann in Gardelegen.....              | 1 | „     |
| „ „ „ Lohse daselbst.....                     | 1 | „     |
| „ „ „ Büttner in Salzwedel.....               | 1 | „     |
| „ „ „ Woltersdorf in Arendsee ...             | 1 | „     |
| „ „ „ Piccard in Kloetze.....                 | 1 | „     |
| „ „ „ Mandenberg in Seehausen...              | 1 | „     |
| „ „ „ Vicedir. Müller in Medebach.            | 2 | „     |
| „ „ „ Director Wilken in Minden..             | 2 | „     |
| „ „ „ Assessor Faber in Minden....            | 2 | „     |
| „ „ „ Uder in Detmold.....                    | 2 | „     |
| „ „ „ Hecker in Nebra .....                   | 5 | „     |

Summa 28 Thlr.

Summe der Beiträge laut erstem Ver-  
zeichniß dieser Zeitschr. 2. R. Bd. XX.

Vereinszeitung S. 276.....65 „ 8 3/4

Summa 93 Thlr. 8 3/4

Dr. E. F. Aschoff.

Hölzermann.

Wir bitten diejenigen unserer verehrten Herren Collegen,  
welche das große Unglück, das Hrn. Linke durch die Feuers-  
brand betroffen, durch gemeinsame Hülfe demselben erleich-  
tern wollen, recht bald ihre Gaben durch die Kreisdirectoren  
hinzustellen. Gemeinsame Hülfe auch in solchen Unglücks-  
fällen ist ein heiliger Zweck unsers Vereins; lassen Sie auch  
dieses uns erfüllen. Gottes Segen ruhet auf solcher Hülfe!

Salzuflen, den 27. April 1840.

E. F. Aschoff.

R. Brandes.

### Anzeige über Kreisversammlungen.

Von mehren Seiten ist der Wunsch geäußert, daß eine Ver-  
sammlung der Mitglieder unserer und benachbarter Kreise in die-  
sem Jahre in Bielefeld statt finden möge. Wir sind daher überein-  
gekommen, diese auf den 3. Juli zu bestimmen. Diejenigen

Mitglieder unserer und benachbarter Kreise, welche daran Theil nehmen wollen, ersuchen wir, Hrn. Collegen Aschoff in Bielefeld gefälligst bald darüber Anzeige zu machen.

Dr. E. F. Aschoff. Faber. Overbeck.

Auf den Wunsch mehrerer Mitglieder wird im Monat August eine Versammlung des Vereins in dem Vicedirectorium der Provinz gehalten werden, und zugleich dem Gedächtniß der Provinz gewidmet sein. Als Versammlungsort ist Freienburg gewählt worden. Zeit und Stunde sollen den verehrlichen Mitgliedern seiner Zeit durch besondere Circulare bekannt gemacht werden.

Angermünde, den 5. Mai 1840.

Bolle.

Von mehreren Mitgliedern des Kreises Paderborn ist gewünscht worden, daß in diesem Sommer eine Kreisversammlung zu Driburg gehalten werden möchte. Auf dieser kann denn auch der Verkauf der aus der Circulation zurückgekommenen Bücher stattfinden; ich ersuche die Herren Collegen, mich gefälligst zu lassen, welcher Tag am passendsten zu der Versammlung sein wird.

Driburg, den 29. April 1840.

Müller.

## 2) Personalnotizen.

Hr. Professor Dr. Magnus in Berlin ist zum ordentlichen Mitgliede der Akademie der Wissenschaften in Berlin ernannt und die Herren Prinsep in Calcutta, Pickering in Edinburgh, Schaffewik in Prag und Millingen in Florenz sind zu correspondirenden Mitgliedern derselben Akademie erwählt worden.

Die geologische Gesellschaft in London hat in ihrer Sitzung am 24. Febr. Hrn. Professor Dumont in Lüttich für seine geologische Abhandlung über die Provinz Lüttich die goldene Wollaston'sche Medaille ertheilt.

Hr. Dr. Hennemann, Leibarzt Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Mecklenburg-Schwerin ist zum Obermedicinalrath ernannt worden. Die medicinisch-chirurgische Gesellschaft des Cantons Zürich und die Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden haben denselben zum Mitgliede erwählt.

Se. Majestät der Kaiser von Rußland haben dem Prof. Jacobi, Adjuncten der Akademie der Wissenschaften in Petersburg, wegen seiner Erfindung mittelst des Galvanismus auf Zinkplatten applicirt, in der vollkommensten Genauigkeit Abdrücke von allen beliebigen Gegenständen der Kunst und Industrie zu produciren, welche auf Künste und Gewerbe von dem wichtigsten Einfluß ist, eine Gratification von 25,000 Rubeln zustellen lassen.





## Zweite Abtheilung.

### Chemie.

#### Untersuchungen über den Indigo;

von

*Otto Linné Erdmann.*

Schluss der Seite 159 abgebrochenen Abhandlung.

#### *Chlorisatin.*

Die rothgelbe feste Substanz, welche das Hauptproduct der Einwirkung des Chlors auf das Indigblau macht, besteht, wie erwähnt, aus zwei Körpern, welche man, vermöge ihrer verschiedenen Löslichkeit in Alkohol, durch wiederholtes Umkrystallisiren von einander trennen kann. Wird das Gemenge der beiden Stoffe in siedendem Alkohol gelöst, so erhält man beim Abkühlen der Lösung einen Anschuss von rothgelben oder braunen Krystallen, welche hauptsächlich aus *Chlorisatin* bestehen. Durch wiederholtes Umkrystallisiren, wobei das noch beigemengte Bichlorisatin in der Flüssigkeit aufgelöst bleibt, erhält man das *Chlorisatin* rein. Weil die Krystalle auch nach mehrmaligem Umkrystallisiren braun gefärbt durch eine kleine Menge harziger Substanz, welche sich zugleich mit dem *Chlorisatin* bildet. Man muss deshalb suchen die Bildung von grossen Krystallen, durch Umrühren der erkaltenden Auflösung, zu verhindern. Vollkommen frei von Harz kann das *Chlorisatin* aus dem weiter unten beschriebenen chlorisatinsäuren Kali erhalten werden.

Das *Chlorisatin* krystallisirt in orangegelben durchsichtigen vierseitigen Prismen oder glänzenden Blättchen.



Es ist geruchlos und besitzt einen bitteren Geschmack. Der Staub davon reizt zum Niesen. An der Luft erhitzt, schmilzt das Chlorisatin zu einer braunen Flüssigkeit, stößt gelbe Dämpfe von einem ähnlichen Geruche wie verbrennendes Indigblau aus, brennt mit leuchtender Flamme und hinterläßt eine schwer entzündliche Kohle, welche beim Verbrennen in der Weingeistflamme diese grünlich färbt. Das Chlorisatin trägt eine Temperatur von  $160^{\circ}$ , ohne sich zu zersetzen oder Wasser zu verlieren. Stärker erhitzt, sublimirt es zum Theil unverändert in orangegelben durchsichtigen Nadeln, der größte Theil aber wird schwarz, schmilzt und zersetzt sich unter starkem Aufblähen. In kaltem Wasser ist es fast unlöslich, in siedendem löst es sich mit rothgelber Farbe auf. Eine siedend filtrirte Auflösung von Chlorisatin, dem noch etwas Bichlorisatin beigemischt war, hinterließ beim Abdampfen etw.  $\frac{1}{2}$  Proc. feste Substanz. Die erkaltete Lösung ist blaßgelb gefärbt. 100 Grm. einer bei  $0^{\circ}$  gesättigten Lösung enthielten nur 0,09 Grm. Chlorisatin. In Alkohol löst sich das Chlorisatin mit tief orangegelber Farbe auf. 32,228 Grm. einer bei  $14^{\circ}$  C. gesättigten Auflösung in Alkohol von 0,830 spec. Gew. hinterließen beim Abdampfen 0,146 Grm. Hiernach lösen 100 Th. Alkohol von angegebenen spec. Gew. 0,455 Chlorisatin auf. Die Auflösung ertheilt der Haut einen unangenehmen sehr anhängenden Geruch. Die Pflanzenfarben werden weder durch die wässrige noch durch die weingeistige Auflösung verändert. Das Chlorisatin ist also keine Säure. Concentrirte Schwefelsäure löst das Chlorisatin mit dunkelrothbrauner Farbe auf; durch Zusatz von Wasser wird es scheinbar unverändert wieder ausgeschieden. Salpetersäure von gewöhnlicher Stärke

Chlorisatin selbst in der Siedehitze nicht viel reicher als Wasser; von concentrirter, rauchender Salpetersäure wird es zersetzt und liefert dabei neue Producte, die ich später beschreiben werde. Salzsäure übt keine besondere Wirkung auf das Chlorisatin. Die Bestandtheile des Chlorisatins sind Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Chlor. Letzteres wird durch salpetersaures Silberoxyd nicht angezeigt.

1) 0,330 Grm. (aus chlorisat. Kali) gaben 0,661 Kohlensäure und 0,070 Wasser.

2) 0,331 Grm. (aus Alkohol kryst.) gaben 0,661 Kohlensäure.

3) 0,240 Grm. (aus Alkohol kryst.) gaben 0,4775 Kohlensäure und 0,050 Wasser.

4) 0,212 Grm. (aus Kalisalz) gaben 0,425 Kohlensäure.

5) 0,501 Grm. (aus Kalisalz) gaben 0,999 Kohlensäure und 0,103 Wasser.

1) 0,319 Grm. (aus Alkohol kryst.) gaben 20 Cb. C. Stickstoff bei 4° und 762 Mm. B.

2) 0,357 Grm. (aus Kalisalz) gaben 25,5 Cb. C. Stickstoff bei 9° C. und 749 M. B.

3) 0,537 Grm. (aus Kalisalz) gaben 35 Cb. C. Stickstoff bei 2° C. und 740 M. B.

1) 0,561 Grm. gaben 0,452 Chlorsilber.

2) 0,496 Grm. gaben 0,401 Chlorsilber.

Dies giebt in 100 Theilen:

|                 | 1.    | 2.     | 3.    | 4.    | 5.    |
|-----------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Kohlenstoff...  | 55,38 | 55,22  | 55,00 | 55,43 | 55,13 |
| Wasserstoff...  | 2,35  |        | 2,31  |       | 2,28  |
| Stickstoff..... | 7,80  | 8,40   | 7,95  |       |       |
| Chlor.....      | 19,87 | 19,94, |       |       |       |

entsprechend folgendem Atomenverhältniß:

|                    | Berechnet | Gef. Mittel |
|--------------------|-----------|-------------|
| $C_{16} = 1222,96$ | 55,77     | 55,23       |
| $H_8 = 49,92$      | 2,27      | 2,31        |
| $N_2 = 177,04$     | 8,07      | 8,05        |
| $Cl_2 = 442,65$    | 20,18     | 19,90       |
| $O_3 = 300,00$     | 13,71     | 14,51       |
| 2192,57            | 100,00    | 100,00.     |

### *Chlorisatinsäure.*

Vermischt man eine Auflösung von Chlorisat  
ätzendem Kali, so erhält sie im ersten Augenblick  
tiefrothe Farbe, nach kurzer Zeit aber versch  
diese Färbung und die Flüssigkeit nimmt eine bla  
Farbe an. Die Entfärbung erfolgt augenblicklich,  
man die Flüssigkeit erwärmt. Uebergießt man  
Chlorisatin mit Kalilauge, so nimmt es eine fast sch  
Farbe an, löst sich aber allmählig mit hellgelber  
auf. Beim Erhitzen geschieht dies sehr schnell. E  
wickelt sich bei dieser Reaction keine Spur von A  
niak. Ist die Auflösung einigermaassen concentr  
krystallisirt aus derselben beim Erkalten ein hell  
Salz von metallischem Perlmutterglanz; oft erstarr  
ganze Flüssigkeit zu einem Brei von glänzenden  
stallschuppen. Diese Krystalle sind das Kalisalz  
neuen Säure, welche entsteht, indem das Chlor  
( $C_{16} H_8 N_2 Cl_2 O_3$ ) ein Atom Wasser aufnimmt  
nenne dieselbe *Chlorisatinsäure*. Das erhaltene K  
ist in Wasser sehr leichtlöslich. Um es zu rei  
wird es zwischen Papier ausgepresst, und, nachde  
anhängende freie Kali sich durch Liegen an der  
mit Kohlensäure gesättigt hat, in siedendem Al  
aufgelöst, aus welchem es beim Erkalten in glänze  
Schuppen krystallisirt. Durch doppelte Zersetzung  
sen sich aus dem Kalisalze die Salze vieler andern

darstellen. Die Chlorisatinsäure kann nicht isolirt werden. Setzt man zu der Auflösung des chlorisatinsauren Kalis eine stärkere Säure, z. B. Salzsäure, so sieht man Augenblicke des Zusammentreffens der beiden Flüssigkeiten einen gelben Niederschlag entstehen, allein dieser löst sich sofort wieder auf, zugleich färbt sich die Flüssigkeit orange, trübt sich allmählig und setzt nach einiger Zeit Chlorisatin in krystallinischen Schüppchen oder Körnern ab. Erwärmt man die mit Salzsäure versetzte Auflösung des chlorisatinsauren Kalis, so wird sie augenblicklich tief orange und giebt beim Erkalten Krystalle von Chlorisatin. Essigsäure verändert die Auflösung des chlorisatinsauren Kalis in der Kälte nicht, beim Erwärmen scheidet sich sogleich Chlorisatin aus. Dieses Verhalten des chlorisatinsauren Kalis gewährt das sichere Mittel, um das Chlorisatin im reinen Zustande zu erhalten.

Die Chlorisatinsäure hat hiernach eine so geringe Beständigkeit, daß sie im Moment des Freiwerdens, besonders unter Einfluß einer erhöhten Temperatur, sofort in Chlorisatin und Wasser zerfällt.

*Chlorisatinsaures Kali.* Durch wiederholtes Umkrystallisiren in Alkohol wird dasselbe leicht vollkommen rein erhalten. Auch aus einem unreinen Chlorisatin, welches noch Harz und Bichlorisatin enthält, kann man es rein erhalten, indem das entsprechende bichlorisatinsaure Salz schwerer krystallisirt und die Kaliverbindung des Harzes als ganz unkrystallisirbar in der Mutterlauge zurückbleibt. Das chlorisatinsaure Kali bildet durchsichtige glänzende blaßgelbe Schuppen oder flache vierseitige Nadeln. In Wasser ist es leicht mit hellgelber Farbe löslich, schwerer in Alkohol, und zwar um so schwerer, je stärker er ist. In siedendem Alkohol

war um  
Alkohol

löst es sich in größerer Menge als in kaltem. Das Salz besitzt einen intensiv bitteren Geschmack. Beim Erhitzen zersetzt es sich plötzlich mit einiger Heftigkeit und hinterläßt dabei schlackig aufgetriebenes und mit Kohlen gemengtes Chlorkalium. Das aus Alkohol krystallisierte Salz enthält kein Krystallwasser. Es verlor bei 180° nicht an Gewicht.

0,352 Grm., mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt, gaben 0,073 Wasser, 0,5405 Kohlensäure.

0,371 Grm. gaben 0,235 Chlorsilber.

0,477 Grm., mit Salzsäure geglüht, hinterließen 0,11 Chlorkalium (kohlehaltig).

Nach der Formel  $C_{16}H_{10}N_2Cl_2O_4 + K$ , welche sich auf die Bestimmung des Atomgewichts aus dem Silber- und Bleisalz gründet, muß das Kalisalz enthalten

|                    | Berechnet | Gefunden |
|--------------------|-----------|----------|
| $C_{16} = 1222,96$ | 42,24     | 42,45    |
| $H_{10} = 62,40$   | 2,15      | 2,30     |
| $N_2 = 177,04$     | 6,11      |          |
| $Cl_2 = 442,65$    | 15,28     | 15,62    |
| $O_4 = 400,00$     | 13,86     |          |
| $K = 589,91$       | 20,36     | 21,08    |
| <hr/>              | <hr/>     |          |
| 2894,96            | 100,00.   |          |

*Chlorisatinsaures Silberoxyd.* Man erhält dieses Salz durch Vermischung einer Auflösung des Kalisalzes mit salpetersaurem Silberoxyd als einen blafsgelben Niederschlag, der sich in siedendem Wasser auflöst. Beim Erkalten der Auflösung krystallisiert das Salz in büschelförmig vereinigten, gewöhnlich gekrümmten Nadeln oder baumartigen Verästelungen von gelblicher Farbe.

0,487 Grm., mit Salzsäure und Alkohol in der Wärme zersetzt, lieferten 0,2245 Chlorsilber = 0,1816 Silberoxyd = 37,3 Proc.



0,484 gaben, auf gleiche Weise behandelt, 0,224 Chlorsilber oder 37,44 Proc. Silberoxyd.

Bei Untersuchung der vom Chlorsilber abfiltrirten Flüssigkeit fand sich in derselben Chlorsilber aufgelöst, welches beim Abdampfen bis zur Trockne und Uebergießen mit Wasser zurückblieb. Einige directe Versuche bestätigten, daß sich Chlorsilber in einer Mischung von Alkohol und Salzsäure in merklicher Menge auflöst. Wird Chlorsilber mit salzsäurehaltigem Alkohol gekocht, so trübt sich die klar abfiltrirte Flüssigkeit schon beim Abkühlen, indem sie einen Theil des aufgelösten Chlorsilbers fallen läßt.

Um eine genauere Bestimmung des Silbergehaltes zu erhalten, mußte das Salz mit Salzsäure in der Wärme versetzt, das entstehende Gemenge von Chlorsilber und Chlorisatin auf einem Filter gesammelt und nach dem Ablaufen der sauren Flüssigkeit das Chlorisatin durch Alkohol gewegewaschen werden.

0,484 Grm. gaben, auf diese Weise behandelt, 0,230 Chlorsilber = 38,444 Silberoxyd.

0,382 Grm. wurden mit kohlensaurem Kali in einem Porcellantiegel geglüht, die gebrannte Masse mit Wasser ausgelaugt und der aus Kohle und Silber bestehende Rückstand an der Luft geglüht. Er wog 0,137 Grm. = 1,521 Proc. Silberoxyd.

Das Mittel beider Zahlen = 38,48 giebt für das Atomgewicht der Säure die Zahl 2320,8, während das nach der Formel  $C_{16}H_{10}N_2Cl_2O_4$  berechnete Atomgewicht = 2304,9 ist.

0,639 Grm., mit chroms. Bleioxyd verbrannt, gaben 0,760 Kohlensäure, 0,102 Wasser.

Dies giebt folgende Zusammensetzung des Salzes:

|                      | Berechnet      | Gefunden |
|----------------------|----------------|----------|
| $C_{16} = 1222,96$   | 32,55          | 32,88    |
| $H_{10} = 62,39$     | 1,66           | 1,76     |
| $N_2 = 177,04$       | 4,71           |          |
| $Cl_2 = 442,65$      | 11,77          |          |
| $O_4 = 400,00$       | 10,67          |          |
| $\dot{A}g = 1451,61$ | 38,64          | 38,48    |
| <u>3756,65</u>       | <u>100,00.</u> |          |

*Chlorisatinsaurer Baryt.* Wird eine Auflösung chlorisatinsaurem Kali in der Wärme mit Chlorbaryt vermischt, so erhält man den chlorisatinsauren Baryt nach dem Erkalten krystallisirt. Die Krystalle, welche in der Regel erst ziemlich spät nach dem Erkalten absetzen, sind bald zu Büscheln vereinigte zarte Nadeln blafsgelber Farbe, bald tief goldgelbe glänzende Blättchen. Bisweilen erscheinen beide Formen zugleich in der selben Flüssigkeit, und beim Umkrystallisiren geht die eine Form leicht in die andere über. Diese zwei Arten von Krystallen unterscheiden sich durch ihren Wassergehalt. Durch Auflösen von Chlorisatin in Barytwasser, Abfiltriren und Umkrystallisiren erhielt ich chlorisatinsaurer Baryt in Gestalt blumenkohlartig zusammengelagerter Nadeln ohne regelmässige Form.

Das dunkelgelbe Salz verliert schon bei 100° Wasser, die letzten Reste entweichen aber erst bei 150–160°, das dunkelgelbe Pulver nimmt beim Trocknen blafsgelbe Farbe an.

1,130 Grm. verloren 0,117 Wasser = 10,354

1,587 Grm. verloren 0,165 Wasser = 10,35

0,913 Grm. verloren 0,097 Wasser = 10,62

Dies entspricht nahe 3 Atomen Wasser, welche, das Atomgewicht des Salzes nach der Formel  $C_{16}H_{10}N_2Cl_2O_4 + \dot{B}a$  3261,9 beträgt, 9,4 Proc. geben müßten.

0,815 Grm. des getrockneten Salzes, mit Schwefel-  
 re zersetzt, gaben 0,358 schwefels. Baryt = 28,82 Proc.  
 Baryt.

0,393 Grm., mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt,  
 gaben 0,522 Kohlensäure, 0,073 Wasser.

0,233 Grm. gaben 0,131 Chlorsilber.

0,549 Grm. des blafsgelben in Nadeln krystallisirten  
 Salzes verloren, bei 160° getrocknet, 0,027 Wasser =  
 1,80 Proc., was fast genau 1 At. = 3,08 Proc. entspricht.

0,190 desselben Salzes gaben 0,353 schwefelsauren  
 Baryt = 28,6 Proc. Baryt.

Hiernach ist die Zusammensetzung des wasserfreien  
 Salzes:

|                           | Ber.    | Gef.  |
|---------------------------|---------|-------|
| C <sub>16</sub> = 1222,96 | 37,49   | 36,72 |
| H <sub>10</sub> = 62,40   | 1,91    | 2,06  |
| N <sub>2</sub> = 177,04   | 5,42    |       |
| Cl <sub>2</sub> = 442,65  | 13,56   | 13,86 |
| O <sub>4</sub> = 400,00   | 12,29   |       |
| Ba = 956,88               | 29,33   | 28,82 |
| 3261,93                   | 100,00. |       |

Das hellgelbe Salz enthält außerdem 1 At. und das  
 dunkelgelbe 3 At. Wasser.

*Chlorisatinsaures Bleioxyd.* Die Bildung dieses Sal-  
 zetes bietet eine sehr merkwürdige Erscheinung dar. Setzt  
 man zu einer Auflösung von chlorisatinsaurem Kali essig-  
 saures oder salpetersaures Bleioxyd, so erhält man einen  
 orangefarbenen gallertartigen Niederschlag, der im Ver-  
 laufe einiger Minuten, besonders schnell beim Umschüt-  
 ten der Flüssigkeit, flockig wird und eine prachtvolle  
 perlachfarbene annimmt, welche der des Quecksilber-  
 salzes fast vollkommen gleicht. Die Umwandlung er-  
 folgt bisweilen plötzlich, bisweilen verbreitet sich die  
 Bildung von einzelnen Puncten aus langsam durch die

gänze Masse. Beobachtet man diese Erscheinung dem Mikroskope, so sieht man, daß der gelbe schlag pulvrig ist, ohne alle Andeutung krystall Beschaffenheit, daß aber in demselben plötzlich baumartige Verästelungen anschießen, während der Niederschlag verschwindet. Andere Male fehlen dritischen Krystalle und der Niederschlag wandelt sich in grössere krystallinische Körner und Zusammenhänge von solchen um, an denen man nur hier Andeutungen von regelmässigen Flächen bemerkt. Die Erscheinung der Farbenverwandlung ist also wohl durch eine Krystallisation des Bleisalzes bedingt.

In siedendem Wasser löst sich der rothe schlag zu einer gelben Flüssigkeit auf. Beim Lösen setzt sich das Salz in scharlachroten Flocken ab, an denen jedoch keine deutliche Krystalle wahrgenommen werden kann. Bei  $150^{\circ}$  —  $160^{\circ}$  getrocknet, verliert das Salz Wasser und nimmt eine schmutzig-ziegelrothe Farbe an.

0,366 Grm. des rothen Salzes verloren bei 100 $^{\circ}$  Wasser = 5,7 Proc. oder 2 At.

0,343 Grm. des entwässerten Salzes, mit Salzsäure geglüht, gaben 0,173 schwefels. Bleioxyd Proc. Bleioxyd.

0,233 Grm. des wasserhaltigen Salzes, bei gewöhnlicher Temperatur im luftleeren Raume getrocknet, mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt, 0,125 Kohlensäure, 0,056 Wasser.

0,324 lieferten bei  $17^{\circ}$  und 753 M.B. 12 Cb.C.

Das wasserfreie Salz ist hiernach  $C_{16} H_{10} N_2 + Pb = 37,68$  Bleioxyd; gefunden wurden 37,11

Das wasserhaltige Salz  $C_{16} H_{10} N_2 Cl_2 O_4 + 2 H_2 O$  enthält:

|                       | Berechnet | Gefunden      |
|-----------------------|-----------|---------------|
| Kohlenstoff . . . . . | 31,17     | 31,69         |
| Wasserstoff . . . . . | 2,22      | 2,32          |
| Stickstoff . . . . .  | 4,50      | 4,26 u. s. w. |

Von den übrigen Salzen der Chlorisatinsäure ist besonders das Kupfersalz wegen der Erscheinungen bei seiner Bildung bemerkenswerth. Beim Vermischen von chlorisatinsaurem Kali mit salpetersaurem oder schwefelsaurem Kupferoxyd entsteht im ersten Augenblicke ein gelbbrauner voluminöser Niederschlag von dem Ansehen des Eisenoxydhydrats; dieser nimmt aber plötzlich eine tief blutrothe Farbe an und setzt sich als ein körniges schweres Pulver zu Boden. Bei Anwendung von essigsaurem Kupferoxyd erfolgt die Umänderung des braunen Niederschlages in den rothen sehr langsam. Bei einer stark verdünnten Auflösung von chlorisatinsaurem Kali bringt essigsaures Kupferoxyd keinen Niederschlag hervor. Erwärmt man aber die Flüssigkeit, so entstehen voluminöse braune Flocken, die erst nach längerem Stehen roth und körnig werden. Bei dem bichlorisatinsauren Kupferoxyd, welches ein gleiches Verhalten wie das chlorisatinsäure zeigt, werde ich auf diese merkwürdige Erscheinung zurückkommen.

Die übrigen Salze der Chlorisatinsäure habe ich nicht genauer untersucht und mich begnügt, das Verhalten des chlorisatinsauren Kalis gegen einige Metallaufösungen zu prüfen.

Schwefelsaure Magnesia und Alaun geben keine sichtbare Veränderung.

Schwefelsaures Eisenoxydkali giebt einen rothbraunen Niederschlag.

Schwefelsaures Zinkoxyd giebt einen gelben Niederschlag.



Schwefelsaures Nickeloxyd und Chlornickel gel nach einiger Zeit einen schwachen gelben krystallischen Niederschlag.

Salpetersaures Quecksilberoxydul giebt einen hellgelben Niederschlag.

Salpetersaures Quecksilberoxyd giebt einen dunkelgelben Niederschlag.

Quecksilberchlorid giebt anfangs keine Veränderung, später eine schwache krystallinische Fällung.

Salpetersaures Wismuthoxyd giebt einen tief orangegelben flockigen Niederschlag.

Chlorcadmium giebt einen gelben Niederschlag.

Schwefelsaures Eisenoxydul giebt keine Fällung.

Chlorcalcium verhält sich wie Chlorbaryum und giebt ein gelbes krystallisirbares Salz.

### *Bichlorisatin.*

Diese Verbindung ist in den weingeistigen Lösungen des gechlorten Indigs enthalten, aus welchen das Chlorisatin herauskrystallisirt ist. Man destillirt den Alkohol mit Unterbrechungen ab, entfernt die beim jedesmaligen Abkühlen sich bildenden Anschüsse, welche eine Gemenge von Chlorisatin mit anfangs mehr und später mit immer weniger Bichlorisatin sind, bis die zuletzt sich absetzenden Anschüsse eine constante Zusammensetzung zeigen. Sie sind das Bichlorisatin. Um es zu reinigen, wird es in schwachem Alkohol umkrystallisirt oder auf die später anzugebende Weise in Kalisalz verwandelt und aus diesem wieder abgeschieden. Die zuerst erhaltenen Anschüsse von Chlorisatin und Bichlorisatin werden ebenfalls durch wiederholtes Umkrystallisiren getrennt; sie liefern dabei nach und nach reine Chlorisatin, während das Bichlorisatin gelöst bleibt. Das

Chlorisatin gleicht in allen seinen physischen und chemischen Eigenschaften so sehr dem Chlorisatin, daß es schwer ist, sie, ohne die Analyse anzustellen, zu unterscheiden. Ich kann nur zwei Mittel zur Unterscheidung der beiden Körper angeben: das erste gründet sich auf die größere Löslichkeit des Bichlorisatins in Alkohol, das zweite auf das verschiedene Verhalten der Bleisalze von Chlorisatin- und Bichlorisatinsäure. Man löst die Substanz in kochender Aetzkalilauge auf, presst das zwischen Löschpapier sich bildende gelbe Salz zwischen Löschpapier aus und krystallisirt es nach dem Trocknen in Alkohol um. Das bichlorisatinsäure Kali liefert mit Jodkaliumauflösungen einen gelben Niederschlag, welcher die Farbe unverändert beibehält, während das chlorisatinsäure, wie erwähnt, sich röthet. Indessen kann dieses Mittel nicht angewendet werden, um in einem Gemisch der beiden Körper einen geringen Gehalt des andern zu entdecken, da das chlorisatinsäure Kali, auch wenn ihm noch sehr viel bichlorisatinsäures beigemischt ist, noch einen rothen Niederschlag mit den Bleisalzen giebt. Bichlorisatinsäures Kali dagegen, welches viel chlorisatinsäure enthält, giebt einen gelben Niederschlag, aus welchem sich nach längerem Stehen rothe Körner abscheiden. Die Bestimmung der Löslichkeit könnte ebenfalls zur Erkennung der beiden Substanzen dienen, allein dieses Verfahren ist gewiß umständlicher und weniger zuverlässig als die Anstellung einer Analyse, welche hier in der That das einzig sichere Reagens ist. Man kann sich dabei auf die Kohlenstoffbestimmung beschränken. Chlorisatin muß in runder Zahl nicht unter 55, Bichlorisatin nicht viel über 46,5 Proc. Kohlenstoff liefern. Wenn die Producte dieser Zusammensetzung möglichst rein, so kann man sie nochmals umkrystallisiren und

ph. d. Pharm. II. Reihe. XXII. Bds. 3 Hft.

dann von der Reinheit des aus der Lösung des Chlorisatins zuerst und des aus der Lösung des Bichlorisatins zuletzt krystallisirenden oder in der Mutterlange zurückbleibenden Anthells überzeugt sein. Das Bichlorisatin erscheint, wenn es sich aus wässriger Lösung beim Abkühlen abgeschieden hat, als ein gelbrothes körniges Pulver oder bildet, bei langsamer Abkühlung der Lösung dendritische Verästelungen. Aus Alkohol krystallisiert es in kleinen morgenrothen glänzenden Nadeln und Blättchen. Bisweilen erkennt man deutlich vierseitige Krystalle. Beim Erhitzen im verschlossenen Raume sublimirt es zum Theil, während die größte Menge zu einer schwarzen kohligen Masse schmilzt. An der Luft erhitzt schmilzt es und verbrennt mit russender Flamme unter Zurücklassung von Kohle, welche beim Verbrennen der Alkoholflamme die Ränder derselben grün färbt. Das Bichlorisatin ist in Wasser etwas löslicher als Chlorisatin, wie man an der dunkleren Farbe der Auflösung bemerkt. Die Löslichkeit des Bichlorisatins in Alkohol ist viel bedeutender als die des Chlorisatins. 27,93 Grm. einer bei 14° gesättigten Auflösung von Bichlorisatin in Alkohol von 0,830 spec. Gew. hinterlassen beim Abdampfen 0,920 Grm. 100 Theile Alkohol vom angegebenen spec. Gew. lösen also bei 14° 3,40 Theile Bichlorisatin. Die Auflösung verhält sich ganz wie die des Chlorisatins.

Die Zusammensetzung des Bichlorisatins unterscheidet sich von der des Chlorisatins dadurch, daß es doppelt so viel Chlor enthält als jenes. Es enthält 10% Wasser und kann ohne Gewichtsverlust bei 160° getrocknet werden.

1) 0,213 Grm. Bichlorisatin, durch wiederholtes Umkrystallisiren von Chlorisatin befreit, gaben, mit chro-

rem Bleioxyd verbrannt, 0,036 Wasser, 0,360 Kohlen-  
säure.

2) 0,240 Gr., aus bichlorisatins. Kali bereitet, gaben  
Wasser, 0,402 Kohlensäure. 0,672 Gr. gaben 0,905  
Silber.

3) 0,201 Gr., durch Umkrystallisiren bereitet, gaben  
Wasser, 0,336 Kohlensäure. 0,599 gaben 35 Cb. C.  
Stoff bei 9° und 743 M. B.

Dies giebt in 100 Theilen:

|                 | 1.    | 2.    | 3.    |
|-----------------|-------|-------|-------|
| Kohlenstoff...  | 46,71 | 46,31 | 46,22 |
| Wasserstoff...  | 1,87  | 1,89  | 1,98  |
| Stickstoff..... |       |       | 6,89  |
| Chlor.....      |       | 33,22 |       |

Berechnend der Zusammensetzung:

|                           | Ber.   | Gef. Mittel |
|---------------------------|--------|-------------|
| C <sub>16</sub> = 1222,96 | 46,40  | 46,41       |
| H <sub>4</sub> = 49,92    | 1,89   | 1,91        |
| N <sub>2</sub> = 177,08   | 6,72   | 6,89        |
| Cl <sub>4</sub> = 885,30  | 33,59  | 33,22       |
| O <sub>3</sub> = 300,00   | 11,40  | 11,67       |
| 2635,26                   | 100,00 | 100,00.     |

### Bichlorisatin.

Das Bichlorisatin löst sich in Kalilauge in der Kälte  
in tiefrother Farbe auf. Beim Erhitzen verschwindet  
die Färbung, die Auflösung wird blafs-gelb und erstarrt  
beim Erkalten oder nachdem man sie abgedampft hat,  
zu einer Masse von glänzenden gelben Krystallschuppen,  
die man durch Auspressen und Umkrystallisiren in star-  
kem Alkohol reinigt. Sie sind das Kalisalz einer neuen  
Säure, der Bichlorisatinsäure, deren Zusammensetzung  
der des Bichlorisatins in demselben Verhältnisse steht,  
wie die Chlorisatinsäure zum Chlorisatin. Versetzt man



die concentrirte wässrige Auflösung des Bichlorisäuren Kalis in der Kälte mit Salzsäure, Salpetersäure, Schwefelsäure, Kleesäure oder Weinsäure, so wird Bichlorisatinsäure als ein gelbes Pulver niedergeschlagen. Essigsäure bewirkt keine Fällung. Die Bichlorisäure ist in Wasser ziemlich leicht löslich, sie deshalb nicht ausgewaschen werden, und aus verdünnten Auflösungen des Kalisalzes wird durch stärkere Lösungen nichts ausgefällt. Wenn man die gefällte Säure durch Auspressen zwischen Fließpapier so viel als möglich gereinigt hat, erscheint sie als ein dunkel aber gelbes Pulver. In Kali löst sie sich sehr leicht zu einer gelblichen Flüssigkeit auf, ohne dabei zuerst, wie Bichlorisatin, eine rothe Farbe anzunehmen. Zeigt bei der Auflösung zuerst eine rothe Farbe, so ist die Säure schon theilweise zersetzt und enthält Bichlorisatin. Obwohl die Bichlorisatinsäure beständiger ist als die Chlorisatinsäure, so gelingt es doch nur schwer, sie in einem einigermaßen reinen Zustande darzustellen, indem sie sich schon beim Trocknen im luftleeren Raume selbst in niedriger Temperatur, sehr leicht in Bichlorisatin und Wasser zersetzt. In Wasser löst sie sich in blafsgelber Farbe auf; erhitzt man aber die Lösung bis auf  $60^{\circ}$ , so färbt sie sich rothgelb und trübt sich, wenn sie concentrirt war, sogleich, unter Abscheiden von Bichlorisatin, oder sie setzt wenigstens beim Erhitzen Bichlorisatin in Krystallen ab. Selbst bei gewöhnlicher Temperatur erfolgt allmählig eine Zersetzung der aufgelösten Säure in Wasser und Bichlorisatin. Erhitzt man die trockne Säure bis  $100^{\circ}$ , so verwandelt sie sich unter Abgabe von Wasser in Bichlorisatin. Ich habe versucht, die Zusammensetzung der Säure auf die Wege direct zu bestimmen. Bichlorisatinsäure, wel-



rch Schwefelwasserstoff aus dem Bleisalze abgeschieden und dann unter der Luftpumpe bei gewöhnlicher Temperatur eingetrocknet worden war, hatte bereits beim Trocknen eine beginnende Zersetzung erlitten und zeigte an den Rändern der flockig krystallinischen Masse gelbrothe Färbung. Bei  $100^{\circ}$  getrocknet, verlor sie 17,1 Proc. Wasser. Eine durch Fällung des Kalisalzes mit Salzsäure, oberflächliches Waschen mit eiskaltem Wasser und wiederholtes Auspressen erhaltene im Vacuum getrocknete Portion, die aber ebenfalls beim Zusammenbringen mit Kali schon eine schwache rothe Färbung gab, verlor bei  $100^{\circ}$  7,239 Proc. Wasser. Diese Versuche, mit den Resultaten der nachfolgenden Analyse einiger Salze der Bichlorisatinsäure verglichen, zeigen, daß die freie Bichlorisatinsäure außer dem zu ihrer Constitution gehörigen Wasser noch 1 At. Hydratwasser enthält. Zuzufolge der Analysen ist nämlich das Atomgewicht der trocknen Säure = 2747,8, bei der Verwandlung in Bichlorisatin = 2635,3, unter Abgabe von 1 At. Wasser würde sie 4,9 Proc. verlieren; Bichlorisatinsäure + 1 At. Wasser aber = 2860,2, muß bei der Verwandlung in Bichlorisatin 7,8 Proc. Wasser abgeben, was sehr nahe mit dem Mittel aus den beiden Versuchen (= 7,7 Proc.) übereinstimmt.

*Bichlorisatinsaures Kali.* Dieses Salz bildet, nachdem es mehrmals in starkem Alkohol umkrystallisirt worden ist, blaßgelbe metallisch glänzende Blättchen und Nadeln. In kaltem Wasser löst es sich sehr leicht zu blaßströngelber Farbe auf. In siedendem löst es sich in noch größerer Menge auf, so daß die concentrirte Lösung beim Erkalten zu einer aus glänzenden Blättchen bestehenden Masse erstarrt, aus welcher die Mutterlauge nur durch Pressen entfernt werden kann.

In kaltem Alkohol ist es schwer, in siedendem leichter löslich, und zwar um so reichlicher, je weichtiger der Alkohol ist. Das Salz enthält Krystallwasser, welches es erst bei  $130^{\circ}$  vollständig und selbst dieser Temperatur nur schwierig abgiebt.

2,447 Grm., im luftleeren Raume bei  $130^{\circ}$  getrocknet, verloren 0,153 Grm. = 6,25 Proc.

1,340 Grm., bei  $160^{\circ}$  getrocknet, verloren 0,086 Grm. = 6,343 Proc.

Wird das Salz in absolutem Alkohol umkrystallisiert, so verliert es einen Theil des Krystallwassers.

0,212 Grm., aus absolutem Alkohol krystallisiert, verloren 0,009 Wasser = 4,2 Proc.

0,123 Grm. verloren 0,005 Grm. = 4,0 Proc.

2,360 Grm. verloren 0,109 Grm. = 4,6 Proc.

Erhitzt man das Salz über freiem Feuer, so schmilzt es sich zuerst und zersetzt sich dann plötzlich mit einer Art von Verpuffung unter Erglimmen und Ausströmen eines gelben Rauches, wobei eine schlackig aufgetrocknete kohlige Masse zurückbleibt, die durch Glühen in der Luft zu Chlorkalium mit Spuren von Kohlensäure wird. Dieses Verhalten des Salzes erschwert die Bestimmung des Kaligehalts durch Verbrennen des Salzes an freier Luft; auch macht sie es unmöglich, das Salz bei der Analyse im Schiffchen zu verbrennen. Mit kohlensaurem Kali gemengt, verbrennt es dagegen sehr leicht.

0,730 Grm. wasserfreies Salz, mit Salmiak gemengt und dann an der Luft geglüht, wobei die Zersetzung ruhig vor sich geht, hinterließen 0,198 Chlorkalium, 0,12524 Kali oder 17,1 Proc.

0,592 Grm., mit Salzsäure zersetzt und geglüht, hinterließen 0,157 Chlorkalium = 0,099 Kali oder 16,7 Proc.

Im Maximo von fünf Versuchen, bei welchen das Salz durch vorsichtiges Glühen an der Luft, um alles Verspritzen zu vermeiden, zersetzt wurde, erhielt ich 19,4 Proc. Kali, das Mittel betrug 16,75 Proc. Da indessen bei allen diesen Bestimmungen die Verdampfung von etwas Chlorkalium nicht vermieden werden konnte, so mußte die gefundene Menge von Kali natürlich etwas zu klein ausfallen.

0,6925 wasserfreies bichlorisatinsaures Kali, mit Kalk geglüht, gaben 0,749 Chlorsilber = 0,18475 oder 26,65 Proc. Chlor.

0,455 Grm. gaben, mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt, 0,6015 Kohlensäure.

0,567 Grm. gaben 0,760 Kohlensäure und 0,095 Wasser.

0,673 Grm. gaben 0,880 Kohlensäure.

0,751 Grm. gaben 0,124 Wasser.

0,419 Grm. krystallisirtes Kalisalz gaben bei 738 L. B. und 5° C. 17,5 Cb. C. Stickstoffgas.

Dies giebt für das wasserfreie Salz in 100 Theilen:

|                                              | 1.    | 2.    | 3.    | 4.   |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| Kohlenstoff....                              | 36,55 | 37,06 | 36,16 |      |
| Wasserstoff....                              |       | 1,84  |       | 1,83 |
| Chlor.....                                   | 26,65 |       |       |      |
| Stickstoff (auf wasserfreies Salz berechnet) |       |       |       | 5,33 |
| Kali (nach der höchsten Bestimmung)...       |       |       |       | 17,1 |

entsprechend folgender Zusammensetzung:

|                   | Ber.    | Gef.   | Mittel  |
|-------------------|---------|--------|---------|
| C <sub>16</sub> = | 1222,96 | 36,67  | 36,59   |
| H <sub>10</sub> = | 62,39   | 1,86   | 1,83    |
| N <sub>2</sub> =  | 177,08  | 5,30   | 5,33    |
| Cl <sub>4</sub> = | 885,30  | 26,50  | 26,65   |
| O <sub>4</sub> =  | 400,00  | 12,00  | 12,50   |
| K =               | 589,90  | 17,67  | 17,10   |
|                   | 3337,63 | 100,00 | 100,00. |

Das krystallisirte Salz enthält 2 At. Wasser = Proc. (gef. 6,22 Proc.); durch absoluten Alkohol demselben, wie es scheint, 1 At. Wasser = 3,26 (gefunden 4,2 Proc.) entzogen.

*Bichlorisatinsaurer Baryt.* Man erhält dieses krystallisirt durch Vermischen einer siedenden Aufl. von bichlorisatinsaurem Kali mit Chlorbaryum, schießt erst längere Zeit nach dem Erkalten der Flüssigkeit in goldgelben glänzenden Nadeln oder schneeförmigen Blättern an. Beim Vermischen einer kalten concentrirten Lösung von chlorisatinsaurem Kali mit Chlorbaryum fällt es als ein gelbes Pulver nieder.

Das krystallisirte Salz ist wasserhaltig und erfordert zur völligen Entwässerung eine sehr hohe Temperatur.

0,431 Grm. verloren bei  $160^{\circ}$  im luftleeren Raum getrocknet 0,025 Grm. = 5,80 Proc.

0,652 Grm. verloren bei  $160^{\circ}$  0,037 Grm. = 5,67 Proc.

0,871 Grm. wasserhaltiges Salz, im luftleeren Raum über Schwefelsäure von anhängender Feuchtigkeit befreit, gaben mit Schwefelsäure zersetzt, 0,322 schwefelsauren Baryt = 24,260 Proc.

0,436 Grm. desselben gaben, mit Salzsäure zerlegt, 0,147 Chlorbaryum = 24,832 Baryt.

0,376 desselben gaben 0,139 schwefelsauren Baryt = 24,26 Proc.

0,612 Grm. wasserfreies Salz gaben 0,240 schwefelsauren Baryt = 25,735 Baryt.

0,307 wasserfreies Salz gaben mit chromsaurem Natriumoxyd verbrannt 0,366 Kohlensäure und 0,0477 Wasser.

0,340 Grm. gaben 15 Cb. C. Stickstoff bei  $756^{\circ}$  und  $20^{\circ}$ .

0,709 Grm. gaben 0,685 Chlorsilber.

Dies giebt für das bei 160° getrocknete Salz folgende Zusammensetzung:

|                    | Ber.   | Gefunden |
|--------------------|--------|----------|
| $C_{16} = 1222,96$ | 33,01  | 32,96    |
| $H_{10} = 62,39$   | 1,68   | 1,72     |
| $N_2 = 177,08$     | 4,80   | 5,09     |
| $Cl_4 = 885,30$    | 23,89  | 23,83    |
| $O_4 = 400,00$     | 10,80  | 10,67    |
| $Ba = 956,90$      | 25,82  | 25,735   |
| <hr/>              | <hr/>  | <hr/>    |
| 3704,63            | 100,00 | 100,00.  |

Das wasserhaltige Salz enthält nach der Formel:



24,3 Baryt und 5,5 Wasser. Gefunden wurden im Mittel 24,45 Baryt und 5,8 — 5,67 Wasser.

*Bichlorisatinsaures Kupferoxyd.* Durch Fällung von Bichlorisatinsaurem Kali mit schwefelsaurem oder salpetersaurem Kupferoxyd erhält man im ersten Augenblicke einen voluminösen Niederschlag von der Farbe des Eisenoxydhydrates; in wenigen Augenblicken wird dieser flockig und blaß-grünlichgelb, zuletzt aber nimmt er eine sehr schöne carminrothe Farbe an und fällt als schweres körniges Pulver in der Flüssigkeit zu Boden. Beobachtet man diese Veränderungen unter dem Mikroskop, so sieht man, daß der zuerst entstehende Niederschlag vollkommen amorph und daß der Uebergang in die gelblichgrüne Färbung eine Krystallisationserscheinung ist.

Die ganze Masse des Niederschlags geht dabei plötzlich in Zusammenhäufungen durchscheinender haarförmiger und büschelförmig vereinigter Krystalle über, an denen man jedoch auch bei der stärksten Vergrößerung keine regelmässigen Flächen wahrnehmen kann. Im Momente des Rothwerdens, welches von einzelnen Puncten aus sich rasch verbreitet, verschwinden die Krystalle



wieder und statt derselben erscheinen einzelne unregelmäßig gestaltete, durchscheinende rothe Körner, an denen ebenfalls keine ausgebildeten Flächen zu bemerkt sind.

Es ist nicht möglich, das Salz in einem der beiden Zustände, welche dem Rothwerden vorangehen, einer Untersuchung zu unterwerfen; die Farbenveränderung erfolgt, ehe man im Stande ist, die Flüssigkeit zu entfernen. Essigsaures Kupferoxyd giebt mit dem bichlorisatinsauren Kali einen braunen Niederschlag, der nach längerem Stehen roth wird, ohne vorher die gelblichgrüne Farbe anzunehmen. Das rothe bichlorisatinsaure Kupferoxyd ist im getrockneten Zustande von caminrother Farbe; es würde als vorzügliche Malerfarbe dienen können, wenn es möglich wäre, dasselbe zu einem niedrigen Preise darzustellen. Mit einem harten Körper gedrückt, nimmt es Goldglanz an, welchen man auch schon, obwohl in schwächerem Grade, an dem Schimmer der Flüssigkeit bemerkt, woraus es sich absetzt.

0,318 Grm. bichlorisatinsaures Kupferoxyd, bei 15° getrocknet, wobei es Wasser verlor, das, seiner Menge nach zu urtheilen, nicht bloß hygroskopisch zu sein schien, wurden mit kohlensaurem Kali geglüht, die Masse mit Wasser ausgelaugt und das zurückbleibende Kupferoxyd an der Luft geglüht. Es wog 0,048 Grm.

0,913 Grm., durch Sieden mit starker Kalilauge zerlegt, hinterliessen 0,138 Kupferoxyd.

0,255 Grm. gaben 0,275 Chlorsilber.

0,257 Grm., mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt, lieferten 0,352 Kohlensäure und 0,045 Wasser.

0,257 Grm. gaben 12 Cb. C. Stickstoff bei 753 B. und 15°.

Hiernach ist die Zusammensetzung des Salzes:

|                   |         |        |         |
|-------------------|---------|--------|---------|
| C <sub>16</sub> = | 1222,96 | 37,73  | 37,86   |
| H <sub>10</sub> = | 62,39   | 1,92   | 1,94    |
| N <sub>2</sub> =  | 177,08  | 5,45   | 5,42    |
| Cl <sub>4</sub> = | 885,30  | 27,30  | 26,60   |
| O <sub>4</sub> =  | 400,00  | 12,32  | 12,93   |
| Cu =              | 495,70  | 15,28  | 15,25   |
|                   | 3243,43 | 100,00 | 100,00. |

*Bichlorisatinsaures Silberoxyd.* Das Salz wird durch Fällung von bichlorisatinsaurem Kali mit salpetersaurem Silberoxyd als ein blafsgelber Niederschlag erhalten, der in vielem siedenden Wasser auflöst. Aus der erhaltenden Lösung schießt das Salz in kleinen büschelartig vereinigten durchsichtigen Nadeln von gelblicher Farbe an. An der Luft erhitzt, schmilzt es zu einer dünnen Masse, aus welcher sich Bichlorisatin sublimirt. Nach dem Glühen bleibt metallisches kohlehaltiges Silber, mit etwas Chlorsilber gemengt, zurück.

Bei der Bestimmung des Silbergehalts durch Behandlung des Salzes mit Salzsäure und Alkohol begegnete derselben Schwierigkeit, wie bei dem chlorisatinsauren Silberoxyde; es lösten sich deutliche Spuren von Chlorsilber in dem salzsäurehaltigen Alkohol auf.

0,432 Grm. gaben 0,179 Chlorsilber = 33,52 Oxyd.  
 0,586 Grm. gaben 0,242 Chlorsilber = 33,4 Oxyd.  
 0,288 Grm., mit kohlensaurem Kali geglüht, ließen nach dem Auswaschen und Glühen 0,095 Silber zurück = 35,43 Oxyd.

Das Mittel dieser Versuche giebt 34,11 Silberoxyd.  
 1,394 Grm., mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt, gaben 1,468 Kohlensäure und 0,188 Wasser.

Dies giebt die Zusammensetzung:

|                    | Ber.          | Gef.    |
|--------------------|---------------|---------|
| $C_{16} = 1222,96$ | 29,12         | 29,07   |
| $H_{10} = 62,39$   | 1,48          | 1,47    |
| $N_2 = 177,08$     | 4,22          |         |
| $Cl_4 = 885,30$    | 21,07         |         |
| $O_4 = 400,00$     | 9,55          |         |
| $Ag = 1451,60$     | 34,56         | 34,11   |
|                    | <hr/> 4199,27 | 100,00. |

Die übrigen Verbindungen der Bichlorisatins habe ich nicht genauer untersucht. Das bichloris saure Kali giebt mit den Auflösungen der Metallsalze actionen, welche im Allgemeinen denen\* des chloris sauren gleich sind.

Mit salpetersaurem Wismuthoxyd liefert es ei orangegelben flockigen Niederschlag.

Quecksilberchlorid giebt keine Fällung.

Salpetersaures Quecksilberoxyd und salpetersaures Quecksilberoxydul geben gelbe Niederschläge.

Salpetersaures Nickeloxyd giebt eine geringe braun grüne Fällung; schwefelsaures Eisenoxydkali eine voluminöse braunrothe Fällung.

Schwefelsaures Manganoxydul, schwefelsaure Magnesia, Alaun und schwefelsaures Chromoxydkali geben keine Niederschläge.

### *Harzige Substanz.*

Beim Auskochen des mit Chlor behandelten Indigo bleibt, wie ich erwähnt habe, eine harzähnliche Substanz zurück, die ich für ein zufälliges secundäres Product halten geneigt bin, da ihre Menge, je nach den Umständen, sehr verschieden ausfällt. Man erhält sie in der größten Menge, wenn der Indigo in der Wärme mit Chlor behandelt wird, oder wenn man Indigoblau in Schwefelsäure auflöst und dann bis zur vollständigen

ersetzung mit Chlor behandelt. Ich erhielt in diesem eine braune Masse, die nur wenig Chlorisatin und Bichlorisatin enthielt und der Hauptsache nach aus harziger Substanz bestand. Ich bin jedoch nicht gewiss, ob das auf diese Weise erhaltene Product mit dem ohne Einwirkung von Schwefelsäure erhaltenen identisch ist. In der geringsten Menge erhält man sie, wenn die Einwirkung in der Kälte geschieht und man sie, ehe der Indigo vollständig zersetzt ist, unterbricht. Ich halte es sehr wahrscheinlich, daß die Bildung dieser harzigen Substanz mit der des Chlorindoptens und des Amariaks in Verhältniß steht. Wirklich glaube ich, das Chlorindopten immer dann in der größten Menge erhalten zu haben, wenn sich viel von dem Harze gebildet hatte. Durch Einwirkung von Chlor auf reines Chlorisatin oder Bichlorisatin bildet sich diese Substanz nicht. Ich lege den wenigen Versuchen, welche ich über diesen Körper angestellt habe, keinen besondern Werth bei, da ich durchaus nicht gewiss bin, ein reines Product untersucht zu haben. Ich bedaure, daß meine Arbeit in diesem Punkte unvollständig bleiben mußte, allein es ist fast unmöglich, sich die Substanz in der zu einer durchgeführten Untersuchung erforderlichen Menge vollständig rein zu verschaffen. Man würde zur Gewinnung von einigen Grammen des reinen Harzes eine sehr bedeutende Menge von vollkommen reinem Indigblau verwenden müssen. Das von mir angewandte Indigblau enthielt immer eine gewisse Menge Indigroth und das Product, welches dieser Körper mit dem Chlor liefert, blieb größtentheils bei dem Harze zurück.

Das Harz, wie es nach dem Auskochen zurückbleibt, enthält noch Chlorisatin und Bichlorisatin. Um es hier- von zu trennen, wird es mit verdünntem Aetzkali be-

es hier--75  
etkali be--90

handelt, worin es sich sehr leicht löst. Die abfiltrirte Lösung übersättigt man mit Essigsäure, wobei das Harz ausgefällt wird, während Chlorisatin und Bichlorisatin aufgelöst bleiben. Das ausgewaschene Harz löst man in Alkohol, welcher dasselbe nach dem Verdunsten als eine schwarzbraune, glasige, spröde Masse von starkem Harzglanze zurückläßt. In siedendem Wasser schmilzt es und löst sich dabei in geringer Menge auf. Die wässrige geistige Auflösung giebt mit Bleizucker einen Niederschlag von bräunlicher Farbe. Die Substanz enthält Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Chlor. 0,218 Grm. gaben 0,69 Wasser und 0,380 Kohlensäure. 0,347 Grm., mit Kalk geglüht, lieferten 0,412 Chlorsilber. 0,515 Grm. gabe bei 6° und 766 M. B. 15 Cb. C. Stickstoff.

Hiernach würde die Zusammensetzung in 100 Theilen betragen:

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Kohlenstoff...  | 48,19   |
| Wasserstoff...  | 3,51    |
| Chlor.....      | 29,28   |
| Stickstoff..... | 3,59    |
| Sauerstoff..... | 15,43   |
|                 | <hr/>   |
|                 | 100,00. |

Diese Zahlen nähern sich dem Verhältnisse:

Berechnet in 100 Th.

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| C <sub>20</sub> | 1528,7 | 49,27  |
| H <sub>16</sub> | 99,8   | 3,21   |
| Cl <sub>4</sub> | 885,3  | 28,53  |
| N <sub>1</sub>  | 88,5   | 2,85   |
| O <sub>5</sub>  | 500,0  | 16,14. |

Man würde dafür die Formel C<sub>40</sub> H<sub>32</sub> Cl<sub>8</sub> N<sub>2</sub> O<sub>10</sub> anstellen können.

Nimmt man diese Formel als richtig an, so kann man sich von der Vertheilung des Kohlenstoffs und Stickstoffs, bei der Zersetzung des Indigs durch Chlor &c.



Vorstellung machen, daß 20 At. Indig =  $C_{640} N_{80}$   
sich verwandeln in

|                          |   |                    |
|--------------------------|---|--------------------|
| 10 At. Chlorisatin.....  | = | $C_{160} N_{20}$   |
| 20 » Bichlorisatin.....  |   | 320      40        |
| 10 » Chlorindoptensäure. |   | 120                |
| 9 » Ammoniak.....        |   | 18                 |
| 1 » Harz.....            |   | 40      2          |
|                          |   | <hr/>              |
|                          |   | $C_{640} N_{80}$ . |

Es ist indessen sehr wahrscheinlich, daß sowohl Chlorindopten als Ammoniak und Harz unwesentliche wechselnden Verhältnissen entstehende Producte sind und daß unter günstigen Umständen die Reaction sich leicht auf die Erzeugung von Chlorisatin und Bichlorisatin beschränken würde.

|             |   |                                 |
|-------------|---|---------------------------------|
| 1 At. Indig | = | $C_{32} H_{20} N_4 O_3 Cl$      |
| 3 » Wasser  | = | 6      3                        |
| 16 » Chlor  | = | 16                              |
|             |   | <hr/>                           |
|             |   | $C_{32} H_{26} N_4 O_6 Cl_{16}$ |

könnten in diesem Falle liefern :

|                    |   |                                   |
|--------------------|---|-----------------------------------|
| 1 At. Chlorisatin  | = | $C_{16} H_8 N_2 O_3 Cl_2$         |
| 1 » Bichlorisatin  |   | 16      8      2      3      4    |
| 10 » Salzsäure.... |   | 10      10                        |
|                    |   | <hr/>                             |
|                    |   | $C_{32} H_{26} N_4 O_6 Cl_{16}$ . |

Es bedarf wohl kaum der Bemerkung, daß auch diese Gleichung nur als ungefähre Vorstellung zu betrachten ist, da natürlich Chlorisatin und Bichlorisatin auch in jedem andern Verhältnisse sich erzeugen können, ohne daß andere Producte entstehen müßten.

### Einwirkung des Broms auf das Indigblau.

Die Producte der Einwirkung des Broms auf das Indigblau sind denen, welche das Chlor liefert, überaus ähnlich. Wird die gelbe Masse, welche durch Behandlung von feuchtem Indigblau mit Brom entsteht, destillirt,

so erhält man das dem Chlorindopten entsprechende Product. Es gleicht ganz dem Chlorindopten, besitzt aber einen angenehmeren süßeren Geruch. Aus Mangel Material habe ich mich mit einer Bestimmung des Kohlenstoff- und Bromgehaltes der gemengten flüchtigen Substanz begnügen müssen. Beide Versuche waren aber nicht als völlig gelungen zu betrachten, machen aber doch wahrscheinlich, daß das Bromindopten dem Chlorindopten entsprechend zusammengesetzt ist.

0,276 Grm. gaben 0,494 Bromsilber = 75,1 Proc. Brom

0,257 Grm. gaben 0,203 Kohlensäure = 21,8 Proc. Kohlenstoff. Das Wasser ging verloren.

Nach der Formel  $C_{12}H_6Br_6O$  muß das Bromindopten enthalten 73,5 Brom und 22,9 Kohlenstoff.

Wird das Bromindopten mit Kali behandelt, so zerfällt es in das Bromindatmit, das zurückbleibende Bromindoptensaure Kali ist weit schwerer in Wasser löslich als das chlorindoptensaure.

### *Bromisatin.*

Durch Auskochen des mit Brom behandelten Ind erhält man ein Gemenge von Bromisatin und Bibromisatin. Es bleibt eine kleine Menge harzähnlicher Substanz zurück. Das Bromisatin habe ich nur in geringer Menge erhalten, das Bibromisatin dagegen in reichlichen Quantitäten. Beide gleichen den entsprechenden Chlorverbindungen. Mangel an Material hat mir nicht gestattet, das Bromisatin genauer zu studiren. Folgende Versuche sind jedoch hinreichend, seine Existenz darzuthun. Das durch Auskochen der mit Brom behandelten Masse erhaltene Product wurde in Alkohol umkrystallisirt.

0,433 Grm. des ersten Anschusses, mit Kupferoxyd

Die Anwendung von Sauerstoffgas, verbrannt, gaben  
24 Kohlensäure = 39,83 Proc. Kohlenstoff.

0,576 Grm. gaben 0,562 Bromsilber = 42,16 Brom.

0,6025 Grm. lieferten bei 14° und 744 M. B. 36 Cb.  
Stickstoff = 6,93 Proc.

Bei zweimaliger Verbrennung desselben Products mit  
Kupferoxyd in einem Strome von Sauerstoffgas erschien  
unvollendeter Verbrennung, als Sauerstoffgas im Ueber-  
flusse durch die Verbrennungsröhre geleitet wurde,  
daß Brom im Chlorcalciumrohre, das sich nach dem  
Zernehmen des Apparats deutlich als solches er-  
kennen liefs. Die erhaltenen Zahlen wurden hierdurch  
als unzuverlässig. Diese Entwicklung von freiem Brom  
bei Verbrennung von bromhaltigen Körpern mit Kupfer-  
oxyd im Sauerstoffstrome habe ich mehrmals gemein-  
schaftlich mit Marchand zu beobachten Gelegenheit  
habt. Bei Anwendung von chromsaurem Bleioxyd fin-  
det dieser Uebelstand nicht statt. Ein Theil des Pro-  
ductes, welches die angeführte Zusammensetzung zeigte,  
wurde nochmals in Alkohol umkrystallisirt und der An-  
theil mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt.

0,305 lieferten jetzt 0,472 Kohlensäure und 0,055  
Wasser.

0,225 gaben 0,342 Kohlensäure und 0,039 Wasser,  
100 Theilen also :

|                | 1.    | 2.    |
|----------------|-------|-------|
| Kohlenstoff... | 42,78 | 42,03 |
| Wasserstoff... | 2,00  | 1,92. |

Der geringe Rest der zu diesen Versuchen benutz-  
ten Substanz wurde nochmals mit Alkohol umkrystal-  
lisirt.

0,136 der erhaltenen sehr gut ausgebildeten kleinen  
Crystalle gaben 0,217 Kohlensäure = 44,1 Proc. Koh-  
lenstoff.

Dieser Kohlenstoffgehalt entspricht der Zusammensetzung

|            | Atome        | Berechnet   | Gef. |
|------------|--------------|-------------|------|
| $C_{16} =$ | 1222,9       | 44,8        | 44,1 |
| $H_8 =$    | 49,9         | 1,8         |      |
| $N_2 =$    | 177,0        | 6,5         |      |
| $Br_2 =$   | 978,3        | 35,0        |      |
| $O_3 =$    | 300,0        | 10,9        |      |
|            | <hr/> 2728,1 | <hr/> 100,0 |      |

Das Bromisatin verhält sich gegen Kali wie Chlorisatin. Die Bildung von bromisatinsaurem K erfolgt schon in der Kälte, bei längerem Stehen des Kalilauge übergossenen Bromisatins. Aus Mangel an nem Material habe ich die Salze der Bromisatinsäure nicht untersuchen können.

Nach der Berechnung ist das Atomgewicht der Bromisatinsäure = 2304,9.

### *Bibromisatin.*

Diese Verbindung bleibt in der weingeistigen Lösung des mit Brom behandelten Indigs zurück, nachdem das Bromisatin herauskrystallisirt ist. Es gleicht in allen seinen Eigenschaften dem Bichlorisatin, besitzt jedoch eine noch glänzendere orange Farbe als dieses.

0,3695 Grm., mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt, lieferten 0,442 Kohlensäure und 0,049 Wasser.

0,621 Grm. gaben 26 Cb. C. Stickstoffgas bei 7 M. B. und 16° C.

0,332 Grm. gaben, mit Kalk geglüht, 0,424 Bromsilber.

Diese Zahlen geben folgende Zusammensetzung:

|            | At.           | Ber.         | Gef.         |
|------------|---------------|--------------|--------------|
| $C_{16} =$ | 1222,96       | 33,00        | 33,07        |
| $H_8 =$    | 49,92         | 1,34         | 1,47         |
| $N_2 =$    | 177,08        | 4,78         | 4,85         |
| $Br_4 =$   | 1956,61       | 52,78        | 53,62        |
| $O_3 =$    | 300,00        | 8,10         | 6,99         |
|            | <hr/> 3706,57 | <hr/> 100,00 | <hr/> 100,00 |



*Bibromisatinsäure.*

Das Bibromisatin löst sich in Kali mit rother Farbe, die Lösung entfärbt sich aber nach einiger Zeit und es entsteht ein dem bichlorisatinsauren entsprechendes bibromisatinsaures Kali. Beim Erwärmen erfolgt eine Veränderung augenblicklich.

Das bibromisatinsaure Kali wird sehr leicht krystallisiert erhalten. Es bildet strohgelbe glänzende Nadeln, die in Wasser und Alkohol schwerer löslich sind als das entsprechende bichlorisatinsaure Salz. Die Krystalle sind wasserhaltig.

2,432 Grm. bichromisatinsaures Kali verloren, bei 100° im luftleeren Raume getrocknet, 0,113 Grm. = 4,64 Proc.

0,558 Grm. des entwässerten Salzes, mit Schwefelsäure behandelt, dann in einer Atmosphäre von kohlenstoffsaurem Ammoniak und zuletzt an der Luft geglüht, lieferten 0,136 schwefelsaures Kali = 0,07353 Kali.

0,344 Grm., mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt, lieferten 0,345 Kohlensäure und 0,0465 Wasser.

0,743 Grm. gaben 0,775 Bromsilber.

Diese Versuche geben folgende Zusammensetzung wasserfreien Salzes:

|                   | At.           | Ber.          | Gef.  |
|-------------------|---------------|---------------|-------|
| C <sub>16</sub> = | 1222,96       | 27,73         | 27,73 |
| H <sub>10</sub> = | 62,39         | 1,42          | 1,50  |
| N <sub>2</sub> =  | 177,08        | 4,02          |       |
| Br <sub>4</sub> = | 1956,61       | 44,37         | 43,79 |
| O <sub>4</sub> =  | 400,00        | 9,07          |       |
| K =               | 589,99        | 13,39         | 13,17 |
|                   | <hr/> 4409,03 | <hr/> 100,00. |       |

Das Atomgewicht der Bibromisatinsäure ist also: 19,04. Das krystallisirte Kalisalz enthält 2 At. Wasser, berechnet: 4,99 Proc., gefunden 4,64.



Zersetzt man die concentrirte Auflösung des bibromisatinsauren Kalis mit Salzsäure, so fällt die Bibromisatinsäure als ein gelbes in zugesetztem Wasser lösliches Pulver nieder; es ist indessen nicht möglich, die Säure trocken zu erhalten. Sie verwandelt sich beim Trocknen im luftleeren Raume über Schwefelsäure schon bei der gewöhnlichen Temperatur in Bibromisatin.

Die Reactionen des bibromisatinsauren Kalis sind denen des bichlorisatinsauren fast vollkommen gleich.

Mit schwefelsaurem Kupferoxyd giebt die Auflösung im ersten Augenblicke einen gelbbraunen gelatinösen Niederschlag, der in wenig Augenblicken sich grünlich-gelb färbt und flockig wird. In diesem Zustande verbleibt er einige Zeit, nach längerem Stehen wird er körnig und nimmt eine blutrothe Farbe an. Erhitzt man die Flüssigkeit, in welcher der gelbgrüne Niederschlag sich befindet, so erfolgt die Umänderung in Roth augenblicklich. Wenn man sich beeilt, den gelbgrünen Niederschlag auf ein Filter zu bringen, so gelingt es, ihn von der Flüssigkeit zu befreien, auszuwaschen und dann auf Filterpapier auszupressen, ohne daß er sich noch verändert hat. Allein beim Trocknen unter der Glocke oder in der Luftpumpe nimmt er dennoch die rothe Farbe an. Es muß also unentschieden bleiben, ob die Veränderung der Krystallform, welche dieser Veränderung der Farbe eben so wie der des bichlorisatinsauren Kupferoxyds Grunde liegt, von einer Veränderung des Wassergehalts begleitet ist.

Salpetersaures Silberoxyd giebt einen gelben körnigen Niederschlag, der sich beim Sieden auflöst und nach dem Erkalten krystallinisch ausscheidet.

Essigsaures Bleioxyd bringt einen hellgelben flockigen Niederschlag hervor, der sich ebenfalls beim Sieden

löst und sich nachher in rothgelben Körnern wieder scheidet.

Chlorbaryum und Chlorcalcium geben gelbe in siedendem Wasser lösliche Niederschläge, die sich aus den altenden Lösungen in Krystallen ausscheiden.

---

Im zweiten Theile dieser Arbeit werde ich die Produkte beschreiben, welche durch die Einwirkung verschiedener Reagentien, namentlich des Schwefelwasserstoffs, des Schwefelwasserstoff-Ammoniaks, des Chlors, Gegenwart von Alkohol, des Ammoniaks und der Salpetersäure, auf Chlorisatin und Bichlorisatin entstehen.

---

Über freie Bernsteinsäure, welche im Retinit, in den Braunkohlen und dem *Oleum empyreumaticum e ligno fossili* gefunden wird;

vom

Apotheker **Cerutti** in Camburg.

---

Vorgetragen in der Jussieu'schen Versammlung zu Neustadt a. d. Orla.)

In den Braunkohlenlagern bei Altenburg, Naumburg und Camburg findet man ein harziges Fossil nesterweise kleinen abgesonderten Stückchen, zwischen den flötzigen Lagen der Braunkohle; es ist mit Braunkohlilichen durchsetzt und mit vieler Mühe daraus abzuheben. Dieses Fossil hat schon früher die Aufmerksamkeit der Mineralogen auf sich gezogen, und dies mit Recht! Betrachten wir es als ein Erzeugniß der Natur, ist es nicht ohne Bedeutung; mag man aber auf seinen

Ursprung oder auf sein Erscheinen in den Braunkohlenglagern wegen seiner Aehnlichkeit mit dem angebern Bernstein Betrachtung anstellen, so muß man Product seine Aufmerksamkeit schenken, zumal, es unter die Seltenheiten rechnen muß, weil das Vorkommen nicht so leicht von statten geht.

Unter andern erwähnt dieses harzige Fossil der Professor Breithaupt in Freiberg in seiner Mineralogie, und giebt ihm den Namen *Retinit*. Dieser Name ist dem von dem Engländer Hatchet nicht ganz gegebenen Namen *Retinasphalt* vor. Es ist dieser von Hrn. Professor Bucholz und auch von Hr. theker Zellner in Pless chemisch untersucht, von Hrn. Professor Schubart in seiner vortrefflichen technischen Chemie unter diesem Namen mit aufgeführt worden, aber nichts von seinem Bernsteingehalt erwähnt worden, bis voriges Jahr im pharmaceutischen Centralblatt Rabenhorst bekannt machte, daß er in der Braunkohle zu Muskau Bernsteinsäure gefunden hat. Dies munterte mich auf, meine früher und später gemachten Untersuchungen und Resultate über diesen Stein und das käufliche jetzt zum medicinischen Gelbstein mit aufgenommene *Oleum empyreumaticum e ligno* zu der heutigen ersten Vereinsversammlung vorzutragen.

Die Farbe dieses Harzes ist bald blaßgelb, bald bräunlichgelb, bald schmutzig-gelblichweiß; die vorfindenden Stückchen sind äußerlich bestäubt, die bräunlich gefärbten haben zerbrochen einen Glanz, die gelblichweißen Bruchstücke sind glanzlos; leicht zerbrechlich, läßt sich mit den Fingern zu feinem zarten Pulver zerreiben, und zwischen den Fingern gehalten erweichte es sich nicht merklich, es schmilzt selbst in der Hitze nicht so leicht wie andere



im Schmelzen raucht es stark, wird braun wie Colonium und erstarrt, wenn es vom Feuer genommen wird, augenblicklich zu einem durchscheinenden Harz, brennt mit heller viel Ruß absetzender Flamme und verbreitet, auf Kohlen gestreut, einen Geruch nach Bernstein.

Dieses Erdharz wurde mit 80° Alkohol in Digestion gestellt, die Flüssigkeit hatte eine dunkel-röthlichbraune Farbe angenommen, in der Flüssigkeit schwammen einige Flocken und auf dem Boden lag ein schmutzig-grauer Niedersatz, dieser wurde durchs Filter geschieden und getrocknet. Derselbe war in Wasser unauflöslich, Aether wirkte selbst im kochenden Zustande nicht darauf ein. Wurde in einem Platinlöffel etwas des getrockneten Bodensatzes geglüht, so zeigte sich folgende Erscheinung: Es traten weisse atlasartige Krystalle hervor, diese hielten eine ziemlich hohe Temperatur aus, ehe sie verdampften und in weisse Asche zerfielen. Diese Krystalle in destillirtem Wasser gelöst, rötheten Lackmuspapier auffallend.

Das in Alkohol gelöste Harz wurde durch Destillation befreit; es war eine bräunliche extractartige Masse, erhielt sich gegen Terpentinöl unauflöslich, selbst im kochenden Zustande war die Einwirkung sehr schwach; siedendem Mohnöl wurde es leicht aufgelöst; ätzendes Kali wirkte äusserst schwach auf dieses Harz.

Das Harz einer trocknen Destillation unterworfen, ließ anfänglich etwas wässrige Flüssigkeit übergehen, dann ein bräunlich gelbes und späterhin ein dickes dunkles Oel.

Die wässrige Flüssigkeit wurde vom Oel abgeschieden, mit Thierkohle behandelt, zeigte sie weisse nadelförmige Krystalle, die sich durch Löslichkeit in warmem Alkohol, saure Reaction und ihr Verhalten gegen Eisenoxydsalze als Bernsteinsäure zu erkennen gaben; auch das durch

Destillation gewonnene Oel war ganz dem Bern ähnlich. Das jetzt im Handel vorkommende *Olea pyreumatic. e ligno fossili* wird durch die Destillation der Braunkohlen gewonnen, es ist von Consistenz stärker und schwärzer, hat einen viel stärkeren Geruch als der aus dem Harz gewonnene, ist in Aether bis auf  $\frac{1}{2}$  in der Kälte löslich, in 80° Weingeist löst sich in der Kälte und in der Wärme weniger auf. Dieses bei der trocknen Destillation unterworfen, bläht sich das Oel sehr stark auf, dann destillirt eine helle wässrige Flüssigkeit, später ein weingelbes, dann bei allmählich stärkerer Hitze ein dunkles Oel herüber. Die wässrige Flüssigkeit wurde mit destillirtem Wasser verdünnt und mit Thierkohle behandelt, zeigten sich weisse Krystalle, welche sich durch Löslichkeit in warmem Alkohol, saures Verhalten und Verhalten gegen Eisenoxydsalze als Bernstein zu erkennen gaben. Der Rückstand in der Retorte war zähe, schwarzbraun und verbrannte im Platinlöffel.

Aus diesen Untersuchungen ziehe ich folgende Resultate:

1) Dafs das Erdharz, welches in den Braunkohlenlagern gefunden wird, aus zwei Harzen besteht, eine, welches in Alkohol löslich ist, ist ein Pflanzenharz, welches eine besondere Natur angenommen hat; die andere durch die innere Verkohlung der Urwälder ist ein animalischer flufs der Harze von den verschiedenen Baumgattungen, so wie eine durch die innere Wärme erzeugte, welche die Schmelzung des Bernsteins entstanden; wir können daher mit Gewifsheit angeben, dafs der Bernsteinbaum zu dem Pinusgeschlechte gehört haben muß, da man bis jetzt noch den Bernstein in Preussen auf dem Lande als an den Seeküsten findet. Hier



Ich nun die freigewordene Bernsteinsäure mit dem Pflanzenharz und dessen ätherischen Oelen (es ist ja bekannt, daß ätherische Oele mit Säuren sich verdicken) in einem besondern Harze verbunden, denn daß es kein gewöhnliches Harz, wie Mastix, Colophonium ist, erkennt man daraus, diese lösen sich in Terpentinöl auf, dieses aber nicht.

2) Das andere, welches sich in Alkohol nicht auflöste, löst sich nicht allein beim Glühen, sondern auch durch die trockne Destillation als freie Bernsteinsäure enthaltend, welche an das Pflanzenharz gebunden ist, zu erkennen. Auch dies beweist das Destillat des käuflichen Braunkohlenöls mit Wasser vermischt, wo in der übergegangenen vom Oel entfernten wässrigen Flüssigkeit nur Bernsteinsäure und bituminöser Stoff enthalten waren, und der Rückstand in der Retorte flüssig blieb und brenzsch roch.

3) Findet man dieses Harz in den Braunkohlenlagern theilweise in kleinen Stückchen wie Erbsen oder eine Nuß groß und bestäubt, als wenn sie im Zerfallen begriffen wären, umgeben von schmutzig gelblich-bräunlichem Pulver, oder theilweise mit Unterbrechungen weit durch Braunkohlenlager sich hinziehen.

Dies beweist, daß hier größere Mengen gelegen haben, wo die in Pulver zerfallenen Verbindungen des Harzes mit der Bernsteinsäure nach und nach in gelöstem Zustande sich mit der Braunkohle vermischt haben. Auf diese Weise finde ich Rabenhorst's Angabe für richtig, daß er in 3 Pfd. Braunkohle 3 Gran Bernsteinsäure gefunden hat, indem ich aus einer Unze *Oleum pyrr. e. l. f.* einen Gran Bernsteinsäure durch Destillation erhalten habe.

Zum Schluß will ich noch erwähnen, daß in unserer

Gegend, ehe ich noch diese Untersuchung unter dieses Oel innerlich gegen Unterleibsgicht mit angewendet worden ist. Ich überlasse es nun den Medicinern, die wässrige bituminöse bernstei-Flüssigkeit nebst dem ätherischen bituminösen bernstei-sauren Oel in Anwendung zu bringen.

## Ueber die wahrscheinliche vorweltliche Bildung des Bernsteins;

von

Dr. Voget in Heinsberg.

**B**ernstein, — dieser seit dem grauen Alter bekannte merkwürdige Stoff, dessen Ursprung immer problematisch ist, beschäftigte seit langer Zeit Naturforscher. Bereits vor 10 Jahren stellte ich einfache Versuche an zur künstlichen Bildung des Bernsteins und seiner Producte — Säure, Oel, Harz. Es wurden Mischungen in verschiedenen Verhältnissen von Harz, Terpentin, *Bals. Copai.*, Eisen, *Natr. n.* — mit *rauchender Schwefelsäure* einer anhaltend ausgesetzt; diese Mischungen hierauf einer Destillation unterworfen, lieferten Säure, Oel, Harz etc. Das künstliche ist von ächtem *Ol. Succini* kaum zu unterscheiden. Es lieferte es zu 3 Th. mit concentr. Salpetersäure eine Mischung, *Mosch. artificial.* wie von ächtem Oel. Die geringe Ausbeute an Säuren erlaubte nur wenige Krystalle, wobei ich indess fand, daß diese Krystalle fast ganz identisch mit *Acid. Succin. impur.* waren.

Ein künstliches Succinum habe ich erhalten aus einer Mischung von 4 Th. *Tereb. venet.* mit

1. *sulphuric. fum.* 8 Tage in Berührung liefs, hiermit *Natr. muriatic.* und *Natr. carbonic.* durchknetete, rüsch und schmolz, und während 8 Jahren der Luft mirte (auf einer Glastafel.)

Dieser künstliche Bernstein besitzt zwar nicht die te des ächten, beim Verbrennen durch eine Flamme asen, gewahrt man aber eben so die leuchtenden dchen und den eigenthümlichen Geruch.

Meiner, sich auf obige Versuche stützenden Ansicht, wurde die Bildung des Bernsteins in der jüngeren welt herbeigeführt, indem *Schwefelsäure* oder deren bindungen, auf die *Harzflüsse* der *Coniferen*, anhalt mit Abschlufs der Luft, einwirkte. Es ist höchst rscheinlich, dafs Feuer, grofse Erdbrände, Meerwas- u. s. w. bei jenem grofsartigen chemischen Procefs thätig waren.

Auch unterliegt es übrigens keinem Zweifel, dafs *Jahrtausende* anhaltende innige Einwirkung andere ltate herbeiführt, als eine Mischung jener Stoffe, einigen Tagen und wenigen Jahren; besonders mag zur Ausbildung der *Bernsteinsäure* und der gröfse- Härte des *Succinums* beitragen.

Uebrigens wäre es in wissenschaftlicher Hinsicht t uninteressant, Mischungen in der von mir angege- n Weise eine lange Reihe von Jahren in die Erde graben, und nach dieser Zeit die Veränderungen an- erken, welche dieselbe erlitten hat.

Als Bestätigung meiner hier angedeuteten Ansicht ich hier noch einige Aussprüche verschiedener Na- orscher an.

Virey ist der Meinung, die Baumgattung, dessen z den Bernstein lieferte, müsse zu der Gattung der iferen gehört haben. Schweigger fand in der

Sammlung des Professors Reich zu Berlin einen Beweis, wodurch Virey's Ansicht bestätigt wurde. derselbe (Schweigger) ist der Meinung, daß Einwirkung der Schwefelsäure auf Harzflüsse den Bernstein bildet habe.

Morabelli sagt, daß Terpentin, der Einwirkung der Wärme ausgesetzt, eine Säure gebe, welche Bernsteinensäure halte (?).

Gumprecht in Nordhausen will im Terpentin Bernsteinensäurekrystalle gesehen haben.

Heldmann vermischte 4 *Ol. Tereb.* mit 1 *sulph.* und erhielt ein nach Anis riechendes Destillat. Der Rückstand roch wie *Ol. Petrae*.

Buchner sagt, die Bildung des Bitumens aus *Ol. Petrae* sei durch Einwirkung der Schwefelsäure, als oxydirter Schwefelkies, auf die Balsame, Terpentine der untergegangenen Waldungen vorgegangen.

Professor Hünefeld bemerkt, daß Honigstein und Bernstein wahrscheinlich einen gleichen Ursprung haben, vielleicht entstanden durch spätere Umbildung des Bitumens im Schooße der Erde, etwa durch die dämpfende Einwirkung basischer Stoffe, wofür Schübler Versuche und das Vorkommen des Bernsteins beizubringen möchten.

Nach Funke liefert der weiße Bernstein die reichliche Ausbeute an Säure, ein Th. Säure sei im Bernstein vorhanden, ein anderer werde erst beim Zusatz der Schwefelsäure und einer trocknen Destillation gebildet.

Lichtenberg bemerkt, daß der gegrabene Bernstein mehr Säure giebt, als der aus dem Meere gewonnene.

In der Gegend von Köthen wurde kürzlich ein bituminöses Fossil gefunden, welches alle Kennzeichen eines noch unvollkommenen Bernsteins an sich trug.



noch längerer Einwirkung des Sauerstoffs bedurfte, die Härte des Bernsteins zu erhalten. Das Bitumen wurde 2 Ellen tief in der Nähe von Torfmooren, Stein-Braunkohlen ausgegraben.

In der Sammlung des Hrn. Ayke zu Danzig finden interessante von Bernstein umflossene Wurzelfasern.

G. Rose sagt: Der Bernstein findet sich in einer Schicht mit Stücken von Braunkohle gemengten, sehr feinen, thonigen Sandschicht, die gegen den Fuß des hohen Ufers, welches hier eine Höhe von 100 bis 120 Fuß hat, ihr Ausgehendes hat. Diese Gewinnung, an der samländischen Küste, war wegen der darüber liegenden Sanddecke sehr beschwerlich.

Endlich mache ich auf die Bernsteingruben im Huthal in Birma aufmerksam. Je tiefer dort die Gruben liegen, desto besser ist der Bernstein; die am meist geschätzte glänzende blafgelbe Varietät findet sich in einer Tiefe von 40 Fuß, jederzeit im Thonmergel als Ganggebilde.

Die angeführten Ansichten mögen einstweilen genügen, um die von mir oben angeführte Hypothese »über die vorweltliche Bildung des Bernsteins« zu bekräftigen.



Bemerkung über den Bernstein zu vorstehendem Aufsatz;

von

*Rudolph Brandes.*

Hr. Dr. Voget hatte die Güte, in der General-Sammlung zu Pyrmont mir etwas von den Producten seiner Versuche mitzutheilen. Das Oel hat allerdings



eine große Aehnlichkeit mit *Ol. Succini*. Die gewonnene Säure ist in kleinen Krystallen, die der ungetriggerten Bernsteinsäure gleichen; die ganze Menge derselben (ohngefähr 1 Gran) erlaubte keine ausführliche Untersuchung, und leider keine Analyse; daß sie indeß Bernsteinsäure sein möchte, dürfte sich folgern lassen daraus, daß sie im Platinlöffel sich verflüchtigte, da sie in Wasser auflöslich war, diese Auflösung saure reagierte und nach Sättigung mit Ammoniak mit neutraler Eisenoxydauflösung einen ockerfarbenen Niederschlag gab, eben so wie Bernsteinsäure. Die Substanz, die den künstlichen Bernstein selbst darstellt, ist orangegelb, zerbröcklich, und scheint im Außern mehr dem Resin asphalt ähnlich zu sein, als dem eigentlichen Bernstein. Bekanntlich findet man aber unter dem opaken schwarzen, gelben und gelblichweißen Bernstein, der mitunter vorkommt, auch leicht zerbröckelnde Stücke. Alle diese zeigen das chemische Verhalten dieses künstlichen Bernsteins, zeigte, daß er vom wahren Bernstein ganz verschieden sei. Im Platinlöffel erhitzt, schmilzt der künstliche Bernstein, verbreitet dabei einen dem künstlichen Moschus etwas ähnlichen Geruch, und brennt dann mit stark rußender Flamme, ohne den eigenthümlichen und aromatischen Geruch des Bernsteins zu entwickeln. Von Aether wird er leicht und vollkommen aufgelöst, eben so ohne Anwendung von Wärme von Alkohol; Terpentinöl zeigte in der Kälte weniger Wirkung, beim Erhitzen entstand aber eine völlige Auflösung. Von dem Hauptbestandtheil des Bernsteins, dem sogenannten Bernsteinbitumen oder Succinin, war keine Spur vorhanden. Diese Substanz nähert sich daher mehr der *Resina alba* und kann mit dem Bernstein durchaus nicht identificirt werden.

Damit will ich aber keinesweges sagen, daß der Bernstein, wie er in der Natur vorkommt, nicht ein Product verschiedener Reactionen sein sollte, die das ursprüngliche Balsamharz verändert haben, bei und nach den Revolutionen, die den Bernsteinbaum begruben, durch die Verhältnisse seiner Ablagerung und durch die Einwirkung fremder, besonders schwefelsäurehaltiger Stoffe. Die Bestandtheile des Bernsteins sind nach den mehrfachen damit angestellten Analysen wesentlich dieselben, und die Differenzen, welche dabei der Bernstein in dem Gehalt an Succinin oder Bernsteinbitumen ergeben hat, dürften vielleicht mit in der verändernden Ursache begründet sein, welche das ursprüngliche Balsamharz in seinen jetzigen Zustand überführte, und die an verschiedenen Orten unmöglich gleich sein konnten. Man findet den Bernstein in verschiedenen Formationen; in solchen, die älter sein dürften als die Alluvialbildungen der Ostsee und anderer Küstenstriche, findet er sich nie in der Mächtigkeit wie in diesen. Wahrscheinlich erreichte der Bernsteinbaum erst in diesen jüngeren Formationen die große Ausdehnung und Verbreitung, welche jene bedeutenden Braunkohlenbildungen, Holzreste und Bernsteinproductionen zur Folge hatten. Unter den jetzigen Gewächsen kennen wir keins, das ein Product liefert, welches mit Bernstein identisch wäre. Es muß daher das Product einer ausgegangenen Baumart der Vorwelt sein, oder durch bedeutende Veränderungen in seine jetzige Beschaffenheit übergeführt worden sein. Wahrscheinlich gehörte der Bernsteinbaum den Coniferen an. Diese Familie liefert noch jetzt reiche Productionen von Balsamharz; ihre Arten sind in unermesslichen Wäldern auf der Erdoberfläche verbreitet; man hat tannenzapfenähnliche Strobili in den Bernsteinlagern gefunden; Bern-

steinsäure in einzelnen Terpentinararten entdeckt. Ich will hier eines schon vor zwölf Jahren angestellten Versuchs gedenken, der dieser Ansicht günstig zu sein scheint. Wenn man Terpentinöl auf concentrirte Schwefelsäure tröpfelt, so wird dieses erst in goldgelbe Tröpfchen verwandelt, dann entbindet sich Schwefellichtsäure und das Oel verdickt sich zu einem balsamähnlichen zähen Körper von dunkelbräunlich gelber Farbe und bemerklichem Geruch nach Bernsteinöl, den es nach achtmonatlichem Liegen an der Luft nicht verlor. Absoluter Alkohol wirkte in der Kälte wenig auf dieses Balsamharz, in der Hitze aber löste es sich zum großen Theile auf, beim Erkalten scheidet sich ein merklicher Theil wieder ab, während ein anderer Theil aufgelöst bleibt. Die durch diese Weise hervorgebrachte Veränderung des Terpentinöls hatte also ein Product geliefert, das zwar durch aus kein Bernstein war, auch nicht mit dem Namen künstlicher Bernstein belegt werden kann, indess der Natur des Bernsteins doch noch näher steht, als das von Hrn. Dr. Voget vorhin beschriebene. Wie dem auch sei, jedenfalls verdient der Gegenstand noch weiter verfolgt zu werden, und ist zu wünschen, daß Hr. Dr. Voget die Einwirkung der Schwefelsäure auf Terpentin und Terpentinöl einer ausführlichen Untersuchung unterwerfen möchte.



## Ueber Darstellung des Jodeisens;

vom

Apotheker Oberdörffer in Hamburg.

Nachdem das Jodeisen auch in den Arzneibüchern aufgenommen wurde, hat man sich mehrseitig be-

Vorschrift zu dessen Darstellung auszumitteln, welche bei der grossen Zersetzlichkeit und schwierigen Darstellung eines tadelfreien Eisenjodürs, den ärztlichen Anforderungen möglichst genügte. Auch bei uns wurde ein Präparat schon vor einigen Jahren verlangt, und zwar anfänglich nur in trockner Form, zur Benutzung als Pulver zu Pillenmassen, und mußte so denn auch den Apothekern eine Vorschrift zu dessen Bereitung mitgeteilt werden, da nirgend eine solche nachzuweisen war, welche als genügend angesehen werden durfte. Bei vielen vergeblichen Versuchen, dasselbe, wie Geigel solches anführt, krystallinisch zu erhalten, schien die in dem Nachtrage des *Cod. med. Hamb. 1837* angegebene, die am ehesten ausführbare, und wählten wir das Ausgießsen der bis zum Erstarren abgedampften Salzlösung in Stangenform deshalb, um dadurch die Einwirkung von Licht und Feuchtigkeit während dem Erstarren selbst abzuhalten, als auch dadurch des Zerreibens zu vermeiden, und die erstarrte Masse sofort in kleinen Gläsern zu bewahren.

Nach dieser Vorschrift wird die auf gewöhnliche Weise dargestellte concentrirte Auflösung von Eisenjod, aus 1 Unze Jod,  $\frac{1}{2}$  Unze Eisen und 4 Unzen Wasser in einer eisernen kleinen Pfanne, bei anfänglich starker, später vermindertem Kohlenfeuer so weit abgedunstet, bis sich auf der Oberfläche eine glanzlose graue Haut bildet, und eine herausgenommene Probe sogleich und vollkommen zu einer festen schwarzen Masse erstarrt, welche gleichzeitig durch anhaltende Zersetzung des am äussern Rande der Flüssigkeit befindlichen Jodeisens einige Joddämpfe entwickelt. Der richtige Punct ist schwer zu treffen. Ein krySTALLISCHES Erhärten findet schon früher statt, dann aber ist die Masse zu zerfallen. (Pharm. II. Reihe. XXII. Bds. 3. Hft.)

werden die erhaltenen Stangen bald feucht und zersetzt während man bei zu langem fortgesetzten Erhitzen anderweitig unter Jodentwicklung eine theilweise Zersetzung herbeiführt, und die Masse sich dann schwer ausgießen läßt. Niemals ist es zu vermeiden, daß die Salzmasse einzelne Flocken Eisenoxyd (von dem Rande zersetzten Jodür herrührend) schwimmend beigemengt enthält, wobei jedoch die eigentliche Salzmasse wenn man gerade den richtigen Punct traf, bei welcher die flüssige Masse in die mit Mandelöl ausgestrichene Höllensteinform ausgegossen wurde, bei ihrer Auflösung unter Abscheidung der gedachten beigemengten Flocken von Eisenoxyd, mit Wasser eine grünliche Auflösung giebt die jedoch von Tage zu Tage sich bräunlicher färbt wenn man zu dieser Auflösung das nämliche Eisenoxyd aus einem und demselben Glase genommen, verwendet während das aus einem andern früher noch nicht gebrauchten Glase derselben Bereitung genommen, bei gelungener Darstellung nach mehreren Wochen eine kaum gelbliche spielende Lösung giebt. Es ist daher zweckmäßig, das Präparat gleich bei der Bereitung in mehrere völlig trockne kleine Gläser zu vertheilen. Jedoch aber hängt die Darstellung desselben, wenn es ganz gelingen soll, auch bei noch so sorgfältiger Bereitung mehr von einem glücklichen Treffen als von der Geschicklichkeit des Arbeiters ab, und es verändert sich überdies das gelungenste Product während des Verbruchs wesentlich, daß es zu den unangenehmsten Präparaten für den Apotheker gehört, indem ihm bei einer dadurch unvermeidlichen verschiedentlichen Ansicht der Lösung desselben, abseits des Arztes wie des Kranken oft als Nachlässigkeit oder Fehler angerechnet wird was nur dem Präparat selbst beigemessen werden kann.



Um mich von der Zusammensetzung des so bereiteten trocknen Eisenjodürs zu überzeugen, wurden 2 Drachmen Jod mit 1 Drachme gröblicher Eisenfeile und einer Unze Wasser behandelt, nach stattgehabter Reaction die blafsgrüne Flüssigkeit mit 1 Unze Wasser wäscht, und das Filtrum völlig ausgewaschen. Das gelöste Eisen, rasch getrocknet, wog 34,5 Gran. Die 120 Gr. Jod hatten demnach sich mit 25,5 Gr. Eisenjodür verbunden, welches genau 1 Atom Eisen gegen 1 Doppelatom Jod entspricht. Die filtrirte Flüssigkeit wurde, wie angegeben, abgedampft und in Wasser ausgegossen, welche bei der Auflösung eine grüne Flüssigkeit mit einzelnen Flocken Eisenoxyd bildete, wozu betrug das in der vorher tarirten Pfanne gewogene Eisenjodür genau 3 Drachmen. Demzufolge waren 34,5 Wasser in dem krystallinisch erstarrten Eisenjodür enthalten, welche genau 4 At. Wasser entsprachen, und besteht das so bereitete trockne Eisenjodür in 100 Theilen aus:

|            |   |       |
|------------|---|-------|
| 1 At. Jod  | = | 67    |
| 1 „ Eisen  | = | 14    |
| 4 „ Wasser | = | 19    |
|            |   | <hr/> |
|            |   | 100,  |

Frederick Smith (*Journ. de Pharm.* 1836) dasselbe aus 100 Theilen Jod, 14 Eisen und 28 Wasser, welche 5 At. des letzteren entsprechen, bestehend betrachtete, welche Abweichung sich leicht erklärt.

Wenn nun obiges Salz, so lange es in Substanz gegeben wurde, einigermaassen genügte, so zeigte es sich bald mangelhaft, als es auch in aufgelöster Form verordnet wurde. Als dasselbe auch auf diese Weise im allgemeinen Krankenhause häufige Anwendung fand, brachte ich den Oberarzt darauf aufmerksam, ob nicht die Auflösung eines Sesquijodürs zu diesem Zweck ein

brauchbares Präparat liefern möchte, welches jedenfalls haltbarer sein müßte, und fertigte zu dem Ende eine *Liq. Ferri sesquijodet.*, der jedoch gewöhnlich nur *Liq. Ferr. jodet.* genannt wurde, an, in welchem 2 Drachmen desselben 9 Gran Jod + 1,28 Gr. Eisen = 10,28 Gr. Eisenjodür aufgelöst enthalten. Die Anfertigung desselben ist sehr einfach. Eine halbe Unze Jod wird mit anderthalb Drachmen Eisenfeile und 1 Unze Wasser in einem geräumigen Medicinglase vereinigt, und nach Beendigung der freiwilligen Reaction so lange geschüttelt, bis die rothe Farbe der Verbindung einer bleichgrünen gewichen war; die so erhaltene Auflösung wird dann unter Auswaschen des Filtrums mit 4 Unzen Wasser verdünnt und dieser Flüssigkeit etwa noch 2 Drachmen Jod zugesetzt, welche sich bald zu einer klaren Flüssigkeit lösen. Die so erhaltene dunkelrothbraune Tinctur wird dann mit so viel Wasser verdünnt, daß das gesammelte Fluidum 10 Unzen beträgt. Die so gebildete Flüssigkeit erhält sich lange ohne Trübung und Zersetzung, und setzt nur dann nach einiger Zeit ein oxyd ab, wenn man statt  $\frac{1}{2}$  At. nur  $\frac{1}{4}$  At. Jod Eisenjodür zusetzt, wenn auch anfänglich eine gleich schnelle Lösung dadurch erhalten wird. Im Krankenhause ist dieses Präparat seitdem fortdauernd innerlich und äußerlich angewandt worden, und ist man dort mit der Wirkung desselben zufrieden. Was die wirkliche chemische Verbindung anbetrifft, so hat schon Kerner die Meinung geäußert, daß diese Verbindung mehr als eine Auflösung von Jod in Eisenjodür zu betrachten sei, und sieht er das Bestehen eines wirklichen Eisenjodids zu bezweifeln. Ich möchte diese Ansicht theilen. Um mich über das chemische Verhalten dieser Verbindung zu überzeugen, wurden einige Unzen der so bereiteten Lösung

einer kleinen Porcellanschale mit darüber gestelltem, faß hohen weiten, oben offenen, und mit Löschpapier bedekten Glase im Dampfbade gelinde abgeraucht. Bei dieser Temperatur fand nur eine schwache Jodentwicklung statt, indem sich im Glasgefäße nur ganz schwache blaßviolette Dämpfe zeigten, die sich erst dann, als die Flüssigkeit Syrupsdicke erlangt hatte, etwas vermehrten. Die Schale wurde jetzt leicht bedeckt, in die Dampfbad gestellt, und fand sich bald, wie beim Eisenchlorid, die gesammte Masse unter einer geringen Menge flüssiger Flüssigkeit krystallinisch erstarrt, so daß sich der ganze Boden der Schale mit zusammenhängenden braunen verworren gruppirten nadelförmigen Krystallen bedeckt fand. Mit wenigem Wasser liefs sich die darüber befindliche Flüssigkeit schnell abscheiden; es so schnell aber zerfloß auch die Krystallgruppe wieder in derselben, und hatte sich bei Verdünnung des Jods nur sehr wenig Eisenoxyd abgeschieden. Die Lösung verhielt sich zu Reagentien, wie folgt:

Aetzendes Ammoniak gab anfangs einen blaugrauen, hernach mehr schmutzig-braunen Niederschlag.

Einfaches Cyaneisenkalium einen hellblauen Bodensatz, der auch später von dunkler Farbe erschien.

Anderthalb Cyaneisenkalium einen starken dunkelbraunen Niederschlag.

Schwefelblausaures Kali bewirkte keine bemerkliche Färbung, während

Amylumlösung intensiv violett gefärbt wurde, und stimmen diese Reactionen mit den von Kerner gegebenen völlig überein.

Zeigt nun auch die Krystallisation dieses Sesquijods auf eine begründete chemische Verbindung hin, so ist diese jedenfalls eine sehr lockere, wie dies auch

schon der starke Jodgeruch der Flüssigkeit angiebt, und zeigt die Reaction des Amylums unbezweifelt auf den freien Jodgehalt hin, der sich auch schon kund giebt, wenn eine Auflösung des oben angeführten festen Eisensjodürs (welches im möglichsten Grade der Reinheit ist, nicht, bei ganz geringer Zersetzung doch nur ganz undeutend auf Stärkelösung reagirt) in festem oder gelöstem Zustande durch Einwirkung von Luft und Feuchtigkeit sich in der Auflösung auch nur schwach bräunte, und sie dann durch Stärkelösung augenblicklich dunkelviolett gefärbt wird.

Unter solchen Umständen konnte es daher nur freulich sein, wenn ein Präparat wie das Jodeisen von mehreren Chemikern hinsichtlich seiner zweckmäßigsten Darstellungsweisen näher betrachtet wurde, unter welchen die durch Verbindung mit Zucker bereitete Syrupform für das Eisensjodür, wie *Frederking* sie zuerst empfahl, und *Wackenroder* (dieses *Arch. der Pharm.* 2. R. XIX, 176) sie verbesserte, gewiß die zweckmäßigste ist, indem, wenn auch eine geringe höhere Oxydation wie sie sich durch die bis zu einem gewissen Grade erfolgende Bräunung ergiebt, nicht vermieden werden kann, doch dadurch eine Flüssigkeit erhalten wird, die kein Oxyd abscheidet, und ein möglichst wasserleeres Präparat liefert. Mir scheint nur der nach *Wackenroder's* Angabe bereitete Syrup zu concentrirt, wenn es sich um die Anwendung von einigen Granen in Auflösung handelt, da die kleinen Gaben eines Syrups schwer zu wägen sind, und *Wackenroder* selbst bemerkt, daß man sie nicht tröpfeln dürfe, dem ich völlig beistimme.

Ich habe diesen *Syrup. Ferri jodati* daher noch einmal so schwach dargestellt, wobei ich zugleich den Vor-

il hatte, die Auflösung nicht erst zur Saftdicke ab-  
mpfen zu müssen, wodurch er auch heller von Farbe  
halten wurde \*).

Durch Vermischen von 3 Drachmen Jod, 1 Drachme  
feiner Eisenfeile und 1 Unze destillirtem Wasser  
in einem geräumigen Medicinglase wurde unter lang-  
samem Schütteln eine schwach grünlich gefärbte Lösung  
von Eisenjodür dargestellt, die Flüssigkeit durch ein  
feines Filtrum von dünnem Fließpapier in eine kleine  
Eisenschale Pfanne filtrirt, in welcher 2 Unzen feingepulver-  
ter weißer Zucker von bester Beschaffenheit befindlich,  
das Filtrum mit einer halben Unze Wasser nach-  
her ausgewaschen. Der so gebildete Zuckersaft  
wurde nun über gelindem Feuer mit leichtem Aufwal-  
len aufgeköcht, so daß die gesammte Flüssigkeit 30  
Drachmen wog, welche nun in mehreren kleinen Gläsern  
mit Glasstöpseln, welche völlig damit angefüllt wurden,  
aufbewahrt wurde. Jede Drachme dieses Syrups ent-  
hält nun 6 Gr. Jod und 1,28 Gr. Eisen, oder  $7\frac{1}{4}$  Gr. Ei-  
senjodür.

Es ließ sich voraussehen, daß der *Syrup. Ferri jodati* als  
die für das Eisenjodür bequemste und paßlichste Arznei-  
form bald eine allgemeine Anwendung finden würde. Wenn  
nun unser hochgeschätzter Freund Oberdörffer die von  
mir angegebene Vorschrift zu diesem Syrup etwas abän-  
dert, so bleibt doch das Wesentliche derselben. Mir lag  
daran, das Eisenjodür durch möglichst wenig Zucker zu  
conserviren, was, wie ich glaube, auch vollkommen erreicht  
wurde. Ein förmliches Aufkochen des Saftes schien mir  
durchaus unnöthig, und das Eindampfen des Saftes über  
einer Oelflamme eben so leicht, als ganz ohne Nachtheil  
für das Präparat. Was die Dispensation dieses Saftes anbe-  
trifft, so bin ich der Meinung, daß ein so heftig wirken-  
des Mittel in den gewöhnlichen Fällen kaum auf den mei-  
stens gebräuchlichen Tarirwagen abgewogen, sondern nur  
mittels der feinen Handwagen dispensirt werden müsse.

Wr.



Dasselbe stellt einen kaum schwach opalisirenden anfänglich kaum gelblich gefärbten Syrup dar, einer Althaesyrup ähnlich. Kömmt die Oberfläche mit der Luft in Berührung, so färbt sich oben eine bräunliche Schicht, die beim Schütteln die ganze Flüssigkeit weiß gelb färbt, und sich beim öftern Oeffnen des Glases bis zur Madeirafarbe erhöht, welche sie nicht zu überbieten scheint. In diesem Zustande, als in welchem dieser Syrup als officinell zu betrachten, giebt er nach mehreren Wochen, mit Wasser verdünnt, eine nicht merklich gefärbte völlig klare Lösung, die gegen alle Reagentien sich einem Oxydulsalze analog verhält, und Stärkelösung nur ganz schwach röthlich-violett färbt. Um ihn möglichst unverändert zu erhalten, ist es daher zu empfehlen, ihn in kleinen, ganz gefüllten Gläsern aufzubewahren. In diesem Zustande, nach dem Willen des Arztes mit einfachem Zuckersyrup oder Wasser verdünnt, giebt dieser Syrup ein zweckmäßiges Präparat, welches, so wie der oben erwähnte *Liq. Ferri sesquipedalis* bei uns als officinell aufgenommen worden, zu welchem letztern er sich hinsichtlich seines Eisengehalts in der Art verhält, daß 2 Drachmen des letztern 1,28 Gr. Eisen gegen 9 Gr. Jod enthalten, während in 1 Drachme Syrup 1,28 Gr. Eisen gegen 6 Gr. Jod gefunden werden.

Sollte das von Kerner (*Lieb. Ann. XXIX. u. XXX*) empfohlne trockne *Ferrum jodetum saccharatum*, was jedoch, seiner hygroskopischen Eigenschaft wegen wenig zu empfehlen ist, verlangt werden, so läßt sich dasselbe auf eine sehr leichte Art in ganz kleinen Quantitäten aus obigem Syrup darstellen, indem man eine Drachme *Syr. Ferri jodet.* mit 20 Gr. Milchzucker vermischt in einem Porcellanschälchen im Dampfbade so weit abdampft, bis sich die Mischung beim allmäligen Erkalten

1 Boraxweinstein ähnlich, in Blätter ziehen läßt, die, auf einer Marmorplatte rasch erkaltet, sich zu einem weissen, kaum grünlich gefärbten Pulver zerreiben lassen, welches dann, ebenfalls 1 Drachme schwer, Gehalt 1 Drachme des Syrups gleich ist, sich jedoch, wenn feucht zu werden, nicht lange aufbewahren läßt. Soll das Eisenjodür anderweitig in fester Form in Pillenmassen verwandt werden, so muß man seine Zuzugabe ferner zu dem in obiger Weise bereiteten Präparat nehmen, doch ist jedenfalls die flüssige Form vorzuziehen.

---

## Ueber Verbrennung des Eisens;

vom

Professor *Stratingh* in Gröningen.

---

Nach Hrn. Boerley in London soll ein weissender Eisenstab vor dem Strome eines kräftigen Gasbaldes nicht abkühlen, sondern heftiger verbrennen funkensprühend, wenn Sauerstoffgas angewandt war. Dieser Versuch ist von d'Arcet bestätigt worden. Er nahm einen eisernen Stab von 4" Länge und 5" Dicke, an einem Ende wurde durchbohrt und in die Oeffnung ein 6" langer Eisendraht gebracht, und hieran ein Ring, an welchem der Stab, nachdem er zum Rothglühen erhitzt war, bewegt wurde. Die Verbrennung des Eisens geschah vollkommen unter schnellem Abstoßen des gebildeten Eisenoxyds, einer sprühenden Sonne bei Feuerwerken gleichend.

Diesen Versuch habe ich mit gleichem Erfolg wiederholt und will Einiges darüber bemerken. Das eine Ende des Eisens muß noch merklich heiss sein und das

Runddrehen nach dem Herausnehmen aus dem Feuer ohne Zögerung geschehen, wodurch dann ein anhaltender Strom von grossen sternartigen Funken ausgeworfen wird, fast bis zur völligen Verbrennung des Stabes. Zweckmässig ist es, den Versuch mit einer Einrichtung für eine centrifugale Bewegung in Verbindung zu bringen, wodurch die Runddrehung des Stabes bequem und regelmässig ausgeführt werden kann. Der Eisendraht muss fest mit dem Eisen verbunden sein, da, wenn der Versuch vor Zuschauern angestellt würde, das Eisen losfliegen und Schaden verursachen könnte. Nach Döbereiner verbrennt der Phosphor in comprimирtem Sauerstoffgase mit ausserordentlichem Glanze; es dürfte wohl der Mühe werth sein, die Verbrennung von Eisen in diesem comprimирtem Gase zu versuchen.

Eine schöne fortdauernde Verbrennung von Eisen habe ich auch erhalten auf folgende Weise. Ein mit Sauerstoffgas gefülltes Gasometer wird mit einem Glasballon verbunden, der an der Seite eine Oeffnung hat, durch welche er mit dem Hahn des Gasometers in Verbindung steht, und unten eine zweite Oeffnung, in welche man einen Kork steckt, wodurch der Eisendraht, ein Stück Blech oder jedes andere Metall bis in die Mitte des Ballons geht. Der Glasballon wird jetzt mit Sauerstoff aus dem Gasometer gefüllt und dann der Metallstreifen, den man oben zuvor mit einem Stückchen brennenden Schwamm versehen hat, hineingebracht. Sogleich beginnt dann die schöne glänzende funkensprühende Verbrennung des Eisens, unter Schmelzen und Vermindern des Stabes, den man beständig durch die Hand oder durch einen einfachen Mechanismus an gleicher Höhe erhält. Der Hahn des Gasometers muss mit einer verlängerten bis in die Mitte des Ballons rei-

enden Röhre versehen sein, wodurch das Gas stets zu  
brennenden Eisen strömt und der Ballon damit ge-  
halten wird. Man könnte auf diese Weise eine  
brennende eiserne Fackel darstellen, wenn nicht zuletzt  
entstandene an den Wänden des Ballons anhaftende  
oxyd die Helligkeit benehmen würde.

---

## Ueber Darstellung einiger destillirten Wässer;

von

*Dr. Bley.*

---

Es ist für die Praxis bei Bereitung einiger destil-  
lirten Wässer ein unangenehmer Umstand, daß man sie  
nicht zu jeder Zeit frisch darstellen kann, indem man-  
che Vegetabilien nicht immer in frischer und guter Be-  
haltung zu haben sind. So ist dieses z. B. der Fall  
bei Darstellung des Wässers aus den Himbeerfrüchten,  
Orangeblüthen und den Rosen.

### *Himbeerwasser.*

Sowohl das aus frischen als gesalzenen Himbeeren  
destillirte Wasser zersetzt sich sehr bald. Es rührt die-  
s von einem Theils von der geringen Menge ätherischen  
Öls und der ansehnlichen Menge Säure in diesen Früch-  
ten her, wie meine Analyse derselben nachgewiesen hat.  
Ich bereite mir daher dieses Wasser auf die Weise, daß  
ich einen Theil der frischen ausgepressten Himbeeren  
mit zwei Theilen zur Stärke des Branntweins etwa auf  
einen Richter verdünnten gereinigten Alkohols und zehn  
Theile destillirten Wässers macerire, dann 3 Theile ab-  
destillire und zehn  
Theile ab-

destillire und von diesem concentrirten Wasser zu Gebrauch einen Theil mit 12 Theilen destillirtem Wasser vermische. Dieses so erhaltene Himbeerwasser besitzt nicht allein einen sehr angenehmen Geruch, sondern hält sich auch, zumal in gefüllten Flaschen, Monate lang unverändert. Die Erfahrung, welche Dr. Hänle, in *Buchn. Repert. II. Bd. XVII. 3*, mittheilt, daß ein solches Wasser sich schnell zersetze und dann einen übeln Geruch annehme, habe ich dabei niemals wahrgenommen, wohl aber bei dem einfach sowohl aus süßen als gesalzenen Himbeeren destillirten Wasser.

### *Orangenblüthenwasser.*

Die Bereitung des Orangenblüthenwassers aus ätherischem Oel, welche Dr. Hänle ebendasselbst empfiehlt, ist nur dann zulässig, wenn es gelingt, sich ein ganz ächtes feines Orangenblüthenöl zu verschaffen, häufig aber hat auch das feinste einen Nebengeruch, der sich dem Wasser mittheilt; deshalb habe ich es stets vorgezogen, mir ein concentrirtes Wasser, in Ermangelung frischer Blüthen, aus den eingesalzenen zu bereiten, indem ich auf 24 Unzen derselben 12 Unzen rectificirten Weingeist, 4 Pfd. destillirtes Wasser und 1 Unze Potasche nahm, über Nacht macerirte und davon 40 Unzen abdestillirte, von welchem zum Gebrauch ein Theil mit eben so viel destillirtem Wasser gemischt wurde.

### *Rosenwasser.*

Dieses habe ich auch schon aus dem orientalischen dargestellt und es ebenfalls sehr schön gefunden, doch ist es bei dem hohen Preise des ächten Oels zu theuer, deshalb habe ich es vorgezogen, aus frischen Blumenblättern ein concentrirtes Wasser darzustellen, indem



1. der Blätter mit 5 Pfd. rectificirtem Weingeist und Pfd. Wasser 12 Stunden lang macerirt und dann Pfd. abdestillirt wurden, welche man zum Gebrauch der doppelten Menge einfach destillirtem Wasser setzen kann.

---

### Dritte Abtheilung.

---

## Mineralwässer.

---

### Die Mineralquellen der Wallachei;

von

*Dr. Carl Friedrich Eduard Siller,*

Apotheker, kaiserl. russ. Rathe und Ritter des St. Annenordens 2ter Klasse, Secretair und wirklichem Mitgliede der Allerhöchst bestätigten St. Petersburgischen pharm. Gesellschaft und des Apothekervereins von Norddeutschland Ehrenmitgliede.

---

### Einleitung.

Als ich, nach Beendigung des Krieges der Russen gegen die Türken, mich im Jahre 1830 in Bucharest aufhielt, wurde mir von meinen Obern der Auftrag, in Gesellschaft des Stabsarztes Froloff den nördlichen Theil der Wallachei zu bereisen und die daselbst befindlichen Mineralquellen einer chemischen Analyse zu unterwerfen, wozu Hr. Froloff eine topographische Beschreibung der Orte geben sollte, in deren Gegend jene Quellen sich befinden. Wenn gleich, seit ich jene Analyse stellte, fast zehn Jahre verflossen sind, so ist dennoch jetzt, so viel ich weiß, über die Mineralquellen der Wallachei noch von Niemand etwas veröffentlicht worden, weshalb eine Mittheilung der Resultate jener Analyse, auch jetzt noch nicht ohne Interesse sein wird. Die erwähnte topographische Beschreibung kann ich lei-

der nicht mit beifügen, indem ich nur in Besitz des von mir verfaßten, die Analyse enthaltenden Manuscript bin. Bei Beurtheilung und kritischer Beleuchtung dieser Arbeit bitte ich um Nachsicht mit deren Mängeln die ich selbst sehr wohl fühle. Zur Begründung dieser Bitte mache ich auf den Umstand aufmerksam, daß ich zur Anstellung dieser Untersuchungen mit außerordentlich geringen und unvollkommenen literarischen und technischen Hilfsmitteln ausgerüstet war, durch deren Unzulänglichkeit ich oft in nicht geringe Verlegenheit gesetzt wurde. Auch ist mein Zweck bei Mittheilung dieser Arbeit kein anderer als der, die Aufmerksamkeit der Chemiker auf jene Quellen zu leiten; denn ich glaube gewiß, daß, obgleich ich schon damals bei den mitgetheilenden Untersuchungen auf Vieles sehr Interessantes traf, sich bei einer genauern, ausführlichen, unter Benützung aller wissenschaftlichen Hilfsmittel anzustellenden Analyse, das Ergebniss herausstellen würde, daß viele der Mineralquellen der nördlichen Wallachei durch die in ihnen nachzuweisenden arzneilichen Bestandtheile sich den berühmtesten Schwefelquellen Europas an die Seite stellen lassen.

Ehe ich zur speciellen Mittheilung der Analyse übergehe, schicke ich noch als allgemeine Bemerkung voraus, daß man sich in jener Gegend vergeblich nach Säuerlingen umsieht, deren doch das benachbarte Siebenbürgen mehre besitzt. Schwefel und Kochsalz sind die Stoffe, auf welche fast überall der Fuß in der nördlichen Wallachei tritt. Deshwegen finden sich denn auch Schwefelwasserstoff und Kochsalz fast in jeder Quelle jener Gegend in verschiedenen Verhältnissen vereinigt.

---

*I. Schwefelquelle bei dem Dorfe Bobotsch.*

Das Wasser dieser Quelle ist farblos, fast klar, mit feinen darin schwimmenden Schwefelflöckchen. Es hat einen merklich schwefeligen Geruch, einen Geschmack nach Schwefelleber und Kochsalz, eine Temperatur von  $9,5^{\circ}$  R. und bei  $12^{\circ}$  R. eine Eigenschwere 1,004. Seinen Schwefelwasserstoffgehalt verliert das Wasser beim Kochen gänzlich, weshalb es von den Bewohnern des Ortes auch zum Kochen der Speisen benutzt wird.

Zu Reagentien verhielt sich das Wasser wie folgt: Blaues und geröthetes Lackmuspapier blieben dadurch unverändert.

Barytsalze brachten in dem mit etwas Salpetersäure gesäuerten Wasser starke Trübung hervor.

Schwefelsaures Silber bewirkte in abgekochtem Wasser starke Trübung und Niederschlag.

Kleesaures Kali, starke Trübung.

Aetzkalklauge, nichts.

Galläpfeltinctur und Cyaneisenkalium brachten keine Veränderung hervor.

Brechweinstein bewirkte in dem frischen Wasser gelbe Färbung, in gekochtem nicht.

Von den in Barytwasser geleiteten Dämpfen des Wassers wird ersteres ein wenig getrübt. Diese Trübung nahm auf Zusatz von Salpetersäure zum Wasser nicht zu.

Der trockne Rückstand vom Abdampfen des Wassers brauste, mit Säure übergossen, nicht auf.

Der Geruch und Versuch *g* beweisen die Gegenwart freien Schwefelwasserstoffes; *h* etwas freie Kohlensäure; *c* sowie der Geschmack Chlornatrium; *b* Schwefelsäure und *d* Kalkerde. Die Abwesenheit freier Säure

(außer einer Spur Kohlensäure) und Alkali wird durch *a*, die Abwesenheit kohlensaurer Salze durch *i*, die Abwesenheit der Magnesiasalze durch *e*, und die des Eisens durch *f* bewiesen. Die Menge der anzeigten Stoffe wurden wie folgt ermittelt:

- a) Ein Pfund \*) des Wassers wurde in einer Tubuloretorte erhitzt und die Dämpfe in eine Auflösung des sauren essigsauren Bleies geleitet; es wurde hierdurch 5,5 Gran Schwefelblei erhalten, welche entsprechen 0,791 Schwefelwasserstoffgas.
- b) Eben so wurden die Dämpfe eines Pfd. Wasser in Barytwasser geleitet; obwohl Trübung entstand so konnte doch wegen der sehr geringen Menge des trübenden kohlensauern Baryts, derselbe nicht auf dem Filter gesammelt werden, weshalb doch in dem Wasser eine Spur freier Kohlensäure angenommen ist.
- c) Ein Pfd. des Wassers wurde zur Hälfte verdunstet und dann mit schwefelsaurem Silber gefällt. Der erhaltene getrocknete Chlorsilber wog 41 Gran welche 19,127 Gran Chlornatrium entsprechen.
- d) Ein Pfd. des Wassers wurde mit kleeaurem Kalk gefällt; es wurden hiedurch 2,3 Gran kleeaure Kalk erhalten, welche 1,058 Gran Kalkerde entsprechen.
- e) Ein Pfd. des Wassers wurde mit salzsaurem Baryt gefällt, der erhaltene Niederschlag wog 4,33 Gran darin sind 1,474 Gran Schwefelsäure enthalten welche genau bis auf einen unbedeutenden Decimalbruch, zur Sättigung der obigen 1,058 Gran Kalk

---

\*) In allen diesen Analysen ist unter Pfd. jederzeit das Nürnberger Apothekerpfund zu verstehen.



erde erforderlich sind und damit 3,206 Gran schwefelsaure Kalkerde bilden.

Hienach enthält also jedes Pfd. des untersuchten Wassers:

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 0,791  | Gran Schwefelwasserstoffgas, |
| 19,127 | » Kochsalz,                  |
| 3,206  | » schwefelsaure Kalkerde,    |
|        | eine Spur Kohlensäure.       |

## *II. Die Schwefelquelle bei dem Dorfe Finceshti.*

Dieses Wasser ist vollkommen klar und farblos; bei kurzem Stehen unter Zutritt der Luft wird es jedoch opalisirend; es besitzt einen schwefelleberartigen Geruch, einen eben solchen etwas salzig bitteren Geschmack, eine Temperatur von 10° R. und bei 12° R. eine Eigenwärme von 1,005. Die Quelle liefert in 2 Minuten 1 Pfd. Wasser, dasselbe verliert durch Kochen seinen Schwefelwasserstoffgehalt völlig.

Die angewendeten Reagentien brachten folgende Wirkungen hervor:

- 1) Die Reagenzpapiere wurden nicht verändert.
- 2) Brechweinsteinlösung bewirkte gelbe Färbung ohne Niederschlag; in dem gekochten Wasser aber keine Veränderung.
- 3) Die Dämpfe des Wassers in Barytwasser geleitet, ließen dasselbe fast ganz klar; aber auf Zusatz von Salpetersäure zum Wasser, wurde Kohlensäure frei und dadurch das Barytwasser stark getrübt.
- 4) Der trockne durch Abdampfen des Wassers erhaltene Rückstand brauste mit Säuren auf.
- 5) In dem mit Salpetersäure gesäuerten Wasser bewirkten Barytsalze Trübung und Niederschlag.
- 6) In abgekochtem Wasser bewirkte schwefelsaures Silber käsigen weißen Niederschlag.



- g) Kleesaures Kali bewirkte starke Trübung.
- h) Aetzkalilauge und Kalkwasser bewirkten nur lockere Niederschläge.
- i) Galläpfeltinctur und blausaures Eisenkali keine Wirkung.

Der Geruch und Versuch *b* beweisen das Dasein des Schwefelwasserstoff, *c* und *d* das Dasein der, auf Basis gebundenen Kohlensäure, *e* das Vorhandensein eines felsaurer, so wie *f* salzsaurer Salze; *g* deutet auf *h* auf Bittererde und *i* beweist die Abwesenheit des *h* so wie *a* die Abwesenheit freier Säuren und A.

Die Verhältnisse dieser Bestandtheile wurden folgt ermittelt:

- a) Die auf oben angeführte Art in saure es Bleilösung geleiteten Dämpfe eines Pfd. V lieferten 7,5 Gran Schwefelblei, entsprechen Gran Schwefelwasserstoff.
- b) Ein Pfd. des abgekochten Wassers mit reiner Salpetersäure gesäuert, gab mit schwefels. Silber 9,914 Gran Chlorsilber, entsprechend 9,914 Chlor.
- c) Ein Pfd. des Wassers gab mit oxalsaurem Kalk 2,15 Gran oxalsauren Kalk, dies entspricht kohlen-saurem Kalk (denn nach den Gesetzen der Wahlverwandtschaft, und in Berücksichtigung des Mangels alkalischer Reaction, muß hier die Kohlensäure, als in Ueberschuß an Kalkerde gedacht werden.)
- d) Ein Pfd. des mit Salpetersäure angesäuerten Wassers gab mit Chlorbaryum 14,5 Gran Schwefelsäure, welchem 4,915 Gran Schwefelsäure enthalten.
- e) Ein Pfd. des Wassers gab, mit Aetzkalilauge mischt, 1,25 Gr. Bittererde, welche mit 2,4 Gr. Schwefelsäure 7,204 Gr. Bittersalz bilden.

f) Der Rest der Schwefelsäure, 2,42 Gran, muß wegen nicht Vorhandenseins einer anderen Basis auf schwefelsaures Natron berechnet werden und bildet von diesem 9,773 Gran.

Ein Pfd. dieses Wassers enthält also :

|       |      |                         |
|-------|------|-------------------------|
| 1,078 | Gran | Schwefelwasserstoffgas, |
| 9,773 | »    | schwefelsaures Natron,  |
| 9,914 | »    | Chlornatrium,           |
| 7,204 | »    | schwefelsaure Magnesia, |
| 1,753 | »    | kohlensauren Kalk.      |

II. *Die Eisenquelle bei dem Dorfe Sibitschiudi Suz.*

Diese Quelle liefert in jeder Minute 3 Pfd. eines vollkommen farblosen, krystallhellen, geruchlosen Wassers, von stark styptischem, eisenhaften Geschmack, Temperatur und einer Eigenschwere bei 12° R. 1,006.

Die Reagentien zeigten folgende Wirkung:

- a) Blaues Lackmuspapier wurde bemerkbar geröthet.
- b) Cyaneisenkalium und Galläpfeltinctur zeigten in dem mit etwas Ammoniak gesättigten Wasser sehr stark die Gegenwart von Eisenoxydul.
- c) Die Barytsalze bewirkten starke Trübung.
- d) Hahnemann's Weinprobe, und
- e) schwefelsaures Silber bewirkten keine Veränderung.
- f) Kalkwasser und
- g) kleeaures Kali bewirkten, selbst nach längerem Stehen, nur eine kaum bemerkbare Opalisierung.
- h) Aetzkalklauge.
- i) Kohlensaures Kali und
- j) kohlensaures Ammoniak bewirkten sehr lockere kleisterartige grünliche Niederschläge, die sich sehr langsam ablagerten.

Es zeigte also hier *b* die Gegenwart des Eisenoxyduls, *a* die Gegenwart freier Säure, die sich durch *c* Schwefelsäure auswies, *h*, *i* und *k* zeigen die Gegenwart der Thonerde, *d*, *e*, *f* und *g* bewiesen die Abwesenheit anderer Metalle, so wie der salz- und kohlensauren Salze und Kalkerde.

Die Mengen der anwesenden Stoffe wurden, wie folgt ermittelt:

- a) Ein Pfd. des Wassers gab mit salzsaurem Baryt 48 Gran Schwerspath, in welchen 16,272 Gran Schwefelsäure enthalten sind.
- b) Ein Pfd. des Wassers wurde zur gemeinsamen Fällung des Eisenoxyduls und der Thonerde mit Cyaneisenkalium und kohlensaurem Ammoniak gefällt. Der blaue voluminöse Niederschlag wurde zur Trennung der Thonerde vom Cyaneisen in sehr verdünnter Schwefelsäure gekocht, filtrirt und der Rückstand getrocknet; dieser, aus reinem Cyaneisen bestehend, wog 2,583 Gran, was 1,7 Gran Eisenoxydul entspricht, die wiederum mit Schwefelsäure und Wasser 6,61 Gran Eisenvitriol bilden.
- c) Die im vorhergehenden Versuch erhaltene, Thonerde enthaltende Flüssigkeit, wurde mit kohlensaurem Ammoniak gefällt. Auf diese Weise wurde nach dem Trocknen 6,5 Gran Thonerde erhalten. 21,714 saurer schwefelsaurer Thonerde entsprechen.

Die eben angegebene Menge Schwefelsäure reicht genau zur Bildung der erwähnten Menge schwefelsauren Eisenoxyduls und saurer schwefelsaurer Thonerde.

Ein Pfd. dieses Wassers enthält demnach:

6,610 Gran Eisenvitriol,

21,714     „     saure schwefelsaure Thonerde.

Außer diesem hier analysirten Eisenwasser gibt

in der Umgegend noch mehre der Art, die in ihren Bestandtheilen demselben völlig gleich sind, nur mit Unterschied, daß sie als Mischungen desselben mit öhlichem Wasser zu betrachten sind, indem sie Bestandtheile in viel geringerer Menge enthalten.

*Die alkalische Schwefelquelle bei demselben Dorfe.*

Die Quelle liefert ein grünlich trübes Wasser, welches aber durchs Filtriren vollkommen klar und farblos wird, unter Zurücklassung eines grünlich schwarzen Niederschlags. Es riecht wie frische Schwefelleber, schmeckt ebenfalls schwefelleberartig; die Quelle hat eine Temperatur von  $12\frac{1}{2}^{\circ}$  R. und bei dieser eine Eigenschwere 1.006. In diesem Wasser ist der Schwefelwasserstoff nicht frei, sondern locker an Basen gebunden, und daher auch nur durch Glühen des nach dem Abpumpfen hinterbliebenen Rückstandes gänzlich entfernt.

Mit Reagentien zeigte das filtrirte Wasser folgende Eigenschaften:

- 1 Geröthetes Lackmuspapier wurde schwach gebläut,
- 2 Schwefelsäure verursachte schwaches Brausen.
- 3 Barytwasser wurde durch die Dämpfe des Wassers, dem in der Retorte etwas Säure zugesetzt war, stark getrübt.
- 4 Barytsalze bewirkten in dem, mit etwas Salpetersäure vermischten Wasser schwache Trübung.
- 5 Brechweinstein fällte häufige orangefarbene Flocken.
- 6 Etwas von dem Wasser wurde zur Trockne verdampft, der Rückstand geglüht, und in Wasser gelöst, gab mit schwefelsaurem Silber einen käsig-niederschlag, wiewohl die Flüssigkeit vorher mit Salpetersäure gesättigt worden war.



- g) Aetzkalilauge bewirkte schwache lockere Niederschläge.
- h) Kleesaures Kali bewirkte Trübung.
- i) Blausaures Kali und Galläpfeltinctur blieben ohne Wirkung auf das klare Wasser. Dagegen verhielt sich der oben erwähnte grünlich schwarze Niederschlag auf dem Filter ganz wie Schwefeleisen.
- k) Der vom Abdampfen des Wassers hinterbliebene getrocknete Rückstand schmeckte stark alkalisch und brauste mit Säuren stark auf.

Von diesen Versuchen bewiesen *a*, *b*, *c* und *d* die Gegenwart des kohlensauren Natrons und vielleicht auch anderer kohlensaurer Verbindungen; *g* die Gegenwart der Bittererde; *h* die der Kalkerde; *d* die Gegenwart von wenig Schwefelsäure; *f* die der Salzsäure; *e* die Gegenwart des Schwefelwasserstoffs, so wie in *i* die Gegenwart von etwas in dem Wasser schwebenden Schwefeleisens erwähnt ist.

Es wurden nun die Quantitäten dieser Bestandtheile auf folgende Weise ermittelt:

- a) Aus einem Pfd. des Wassers, dem in der Reife Salpetersäure im Ueberschuß zugesetzt wurde, entwichen die durchs Kochen gebildeten Dämpfe eine Lösung von salpetersaurem Blei; hieraus wurden 16 Gran Schwefelblei erhalten, welche entsprechen 2,299 Gran Schwefelwasserstoff.
- b) Ein Pfd. des Wassers zur Trockne verdampft, der Rückstand geglüht, in Wasser gelöst und mit Salpetersäure übersättigt, gab mit schwefelsaurem Ammonium 2,12 Gran Chlorsilber, welche entsprechen 0,6 Gran Chlornatrium.
- c) Ein Pfd. des Wassers wurde mit Salpetersäure gesäuert und darauf durch salzsauren Baryt



Gran Schwerspath gefällt, welche zu 2,4 Gran schwefelsauren Natrons berechnet werden müssen.

1) Auf die unter *a* angeführte Weise wurde aus einem Pfd. des mit Säure versetzten erhitzten Wassers, die Dämpfe in Barytwasser geleitet, wodurch 31,56 Gran kohlensaurer Baryt erhalten wurden, welche 6,976 Gran Kohlensäure ausgeben, wie nachfolgende Berechnung beweist.

2) Ein Pfd. Wasser mit Aetzkali gefällt, gab 2,3 Gran reine Bittererde, welche sich mit 2,216 Gran Kohlensäure zu 6,969 löslicher kohlensaurer Bittererde verbinden.

3) Ein Pfd. Wasser mit sauerkleesaurem Kali gefällt, gab 1,8 Gran sauerkleesauren Kalk, woraus sich 1,468 Gran kohlensaurer Kalk ergeben, die zu ihrer Bildung 0,64 Gran Kohlensäure erfordern.

4) Von den oben angeführten 6,976 Gran Kohlensäure sind nun  $2,216 + 0,64 = 2,856$  Gran zur Bildung löslicher kohlensaurer Bittererde und Kalks verbraucht worden. Der Rest von 4,12 Gran ist demnach auf kohlensaures Natron zu berechnen, und bildet von diesem 19,9 Gran.

5) Endlich wurde noch das, in einem Pfd. Wasser schwebende Schwefeleisen sorgfältig gesammelt und getrocknet. Es wog 0,75 Gran.

Ein Pfd. Wasser aus dieser Quelle enthält also:

|       |      |                           |
|-------|------|---------------------------|
| 2,299 | Gran | Schwefelwasserstoff,      |
| 1,0   | »    | Chlornatrium,             |
| 2,40  | »    | schwefelsaures Natron,    |
| 19,9  | »    | kohlensaures Natron,      |
| 6,969 | »    | kohlensaure Bittererde,   |
| 1,468 | »    | kohlensauren Kalk,        |
| 0,75  | »    | Schwefeleisen, schwebend. |

Außer dieser Quelle giebt es in der Nähe derselben noch eine Menge ähnlicher, in ihren Bestandtheilen selbst völlig gleicher Quellen, in denen nur die Menge des darin schwebenden Schwefeleisens variiert (4 Gran im Pfd.). Ihre Ergiebigkeit ist so groß, im Falle einer Badeeinrichtung, an Wasser wohl reichlicher Vorrath sein würde. Noch verdient bemerkt zu werden, daß die Bewohner der umliegenden Dörfer sich dieser Quellen mit Vortheil zu Bädern gegen Gicht etc. bedienen.

#### V. Die Kochsalzquelle unweit desselben Dorfes

Etwa drei Werste von diesem Dorfe ergießt sich ein kleiner Waldbach, der durch das Zusammenfließen mehrerer Quellen in einer, etwa  $2\frac{1}{2}$  Werste langen Schlucht entstanden ist, in einen größeren Bach. Das Wasser jenes kleinen Waldbaches zeigte einen scharf salzigen, jedoch nicht reinen Kochsalzgeschmack. Den Lauf dieses Baches bis zu seinem Entstehen verfolgend, fanden wir hier die Erdoberfläche, so wie die derselben liegenden Gegenstände, als Steine, Zäune, Laub und dergl., mit einer starken Salzkruste überzogen, die, dem Geschmack nach zu urtheilen, aus Kochsalz mit andern salzigen Beimischungen bestand. An mehreren Stellen quillt an diesem Orte ein Wasser aus der Erde hervor, das den erwähnten Geschmack in hohem Grade besitzt und dessen nähere Untersuchung hier nicht nöthig ist.

Dieses Wasser ist farblos und klar, nach dem Stehen jedoch läßt es einen geringen gelblichen Niederschlag fallen. Es ist geruchlos, hat eine Temperatur von  $11^{\circ}$  R. und besitzt die außerordentliche Eigenschaft, von 1,207.

Mit Reagentien geprüft, zeigte sich Folgendes:

- a) Reagenzpapiere blieben unverändert.
- b) Galläpfeltinctur färbte es hell violett und
- c) Cyaneisenkalium schwach bläulich.
- d) Aetzkali brachte einen lockern Niederschlag hervor.
- e) Kleesaures Kali bewirkte bedeutende Trübung.
- f) Salzsaurer Baryt bewirkte in dem, mit Salzsäure gesäuerten Wasser, starken Niederschlag.
- g) Barytwasser wurde durch die Dämpfe des Wassers, selbst des gesäuerten, nur wenig getrübt.
- h) Hahnemann'sche Weinprobe zeigte darin keine Veränderung.
- i) Schwefelsäure bewirkte weder im Wasser selbst, noch in dessen durch Abdampfen erhaltenem Rückstande, ein Aufbrausen.

Der Geschmack zeigte die Anwesenheit des Kochsalzes; Versuch b und c die Gegenwart von Eisenoxydul; Gegenwart von wenig Kohlensäure, die mit dem Eisenoxydul verbunden ist; d die Gegenwart der Bittererde; e die der Kalkerde; f die der Schwefelsäure; die Versuche a, h und i bewiesen die Abwesenheit freier Säure und Alkalien, die Abwesenheit anderer Metalle außer Eisen und anderer kohlensaurer Salze.

Die Verhältnisse dieser Bestandtheile wurden wie folgt ermittelt:

- a) Ein Pfd. der Salzsole mit etwas Salpetersäure versetzt und mit salpetersaurem Baryt gefällt, gab 43 Gran schwefelsauren Baryt, welcher 14,532 Schwefelsäure enthält.
- b) Zwei Drachmen der Sole, mit destillirtem Wasser verdünnt, gaben mit schwefelsaurem Silber 70 Gr. Chlorsilber, in welchem 13,324 Gran Salzsäure enthalten sind, was auf ein Pfd. der Sole 639,552

Gran Salzsäure beträgt, über welche später Benutzung geführt werden soll.

- c) Ein Pfd. der Salzsole, mit kleesaurem Kali gegeben 7,25 Gran klees. Kalk, welche 3,335 Gran Kalkerde enthalten, die sich wiederum mit 10,106 Gran Schwefelsäure zu 10,106 Gran schwefelren Kalk verbinden.
- d) Die übrigen 9,862 Gran Schwefelsäure müssen schwefelsaures Natron berechnet werden und den von diesem 39,927 Gran.
- e) Ein Pfd. der Salzsole, mit Aetzkali gefällt, gab 3,939 Gran reine Bittererde, welche sich mit 3,939 Gran Salzsäure zu 10,795 Gran salzsaurer Bittererde verbinden.
- f) Die übrigen 635,613 Gran Salzsäure sind auf Chlornatrium zu berechnen und bilden von diesem 1557,875 Gran oder 3 Unzen und 117,875 Gran.
- g) Der aus einem Pfd. der Sole, nach dem Abkochen und längerer Ruhe sich ablagernde Niederschlag wurde getrocknet und betrug nach dem Glühen 0,263 Gran Eisenoxyd, welche 0,263 Gran kohlensaurem Eisenoxydul entsprechen.

Ein Pfd. der untersuchten Sole enthält demnach

|         |              |                             |
|---------|--------------|-----------------------------|
| 3 Unzen | 117,875 Gran | Chlornatrium,               |
|         | 39,927       | » schwefelsaures Natron,    |
|         | 10,106       | » schwefelsauren Kalk,      |
|         | 10,795       | » salzsaurer Magnesia,      |
|         | 0,263        | » kohlensaures Eisenoxydul. |

Der Umstand, dass diese Salzsole mit Kochsalz vollkommen gesättigt ist, lässt vermuthen, dass in der Nähe des Ortes, wo sie zu Tage kömmt, ein Kochsalzberg vorhanden ist.

Das Wasser des oben erwähnten Waldbaches,



Das diese Quelle aufnimmt, enthält fast ganz dieselben Bestandtheile, nur in sehr geringer Menge. Sein specifisches Gewicht ist 1,0064, woraus sich ohngefähr ein Prozent Kochsalzgehalt ergibt. Eisen ist darin kaum mehr zu entdecken.

In dem Dorfe Poseschte befindet sich ein Schwefelwasser, welches aber so arm an Schwefelwasserstoff ist, daß Brechweinsteinlösung kaum gelbliche Färbung bewirkte. Es enthält außerdem sehr geringe Mengen von schwefelsaurem und kohlensaurem Kalk, sehr wenig Kochsalz, so wie eine Spur von Bittererde. Abgekocht schmeckt es wie reines Brunnenwasser.

In dem Dorfe Slun, nahe bei dem Städtchen Valeni, zeigte man uns gleichfalls eine sogenannte Schwefelquelle, welche aber noch weniger Schwefelwasserstoff, als die vorige enthielt, indem selbst essigsaures Blei kaum gelbliche Färbung darin veranlafste, sonst kommt dieses Wasser mit dem vorigen fast ganz überein.

Aus dem Dorfe Tscheraschi, gleichfalls nahe bei Valeni, brachte man uns ein sogenanntes Mineralwasser; es war dies aber weiter nichts, als ein unreines lehmiges Brunnenwasser, in welchem sich weder Schwefelwasserstoff, noch sonst irgend ein charakteristischer Bestandtheil darthun liefs.

Obgleich in dem Dorfe Boikoi, den in Bucharrest erhaltenen Nachrichten zufolge, sich eine Schwefelquelle befinden sollte, so verhält sich dies dennoch nicht so. Man zeigte uns hier nur eine Stelle auf einem lehmigen Boden, welche ganz trocken war, einen schwachen Geruch nach Steinöl besafs und wenn man Feuer darauf anlegte, in einem Umkreise von etwa 15 Schritten mit Flamme brannte. Wenn es regnet, so geräth das sich hier aufammelnde Wasser in eine dem Sieden ähnliche Be-



wegung. Sowohl das Brennen des Erdreichs, als dieses Aufwallen des Wassers ist dem, sich mit Bergöl zugleich bildenden Kohlenwasserstoffgase schreiben, welches, wenn der Ort trocken ist, unbemerkt entweicht, durch das sich ansammelnde Wasser mit Geräusch durchstreicht.

#### VI. Die Schwefelquelle bei dem Dorfe Bräsa

Diese Quelle liefert ein vollkommen klares, fasses Wasser, das nach Schwefelwasserstoff riecht, danach und etwas salzig schmeckt, eine Temperatur von  $8^{\circ}$  R., bei  $12^{\circ}$  R. eine Eigenschwere von 1,002 besitzt und durchs Kochen seinen Schwefelwasserstoff gänzlich verliert.

Reagentien wirken, wie folgt, darauf:

- a) Die Lackmuspapiere blieben unverändert.
- b) Brechweinstein bewirkt gelbe Färbung ohne Niederschlag.
- c) Salzsaurer Baryt in gesäuertem Wasser schwache Trübung.
- d) Barytwasser wurde durch die Dämpfe selbst gesäuerten Wassers nur schwach getrübt.
- e) Kleesaures Kali bewirkte Trübung.
- f) Aetzkali,
- g) Galläpfeltinctur und blausaures Kali bewirkten keine Veränderung.
- h) Schwefelsaures Silber bewirkte in dem abgedampften und mit etwas Salpetersäure versetzten Wasser schwache Trübung.

Hieraus erhellt, daß das Wasser nach Versetzen mit wenig Schwefelwasserstoff, nach c etwas Schwefelsäure, nach h etwas Salzsäure, nach d etwas gebundene Salpetersäure und nach e Kalkerde enthält. Dagegen be-

den die Versuche die Abwesenheit freier Säure und Alkalien, so wie der Bittererde und des Eisens.

Auf folgende Weise wurden die Verhältnisse dieser Bestandtheile ermittelt:

- a) Die Dämpfe von einem Pfd. Wasser in angesäuerte Bleizuckerlösung geleitet, bildeten 10,5 Gran Schwefelblei, welche entsprechen 1,51 Gran Schwefelwasserstoff.
- b) Ein Pfd. des Wassers gab, mit kleesaurem Kali gefällt, 3,75 Gran kleeausen Kalk, entsprechend 1,725 Gran reiner Kalkerde.
- c) Ein Pfd. Wasser gab mit Chlorbarium 1,01 Gran Schwerspath, welche 0,342 Gran Schwefelsäure enthalten, die mit 0,245 Gran Kalkerde 0,742 Gran schwefelsauren Kalk geben.
- d) Die übrigen 1,48 Gran Kalkerde bilden mit der in der Flüssigkeit enthaltenen Kohlensäure 2,624 Gran kohlensaure Kalkerde.
- e) Ein Pfd. Wasser bis auf eine Unze verdampft, dann erst mit einigen Tropfen Salpetersäure, hernach mit schwefelsaurem Silber gemischt, gab 1,3 Gran salzsaures Silber, welche entsprechen 0,608 Gran Kochsalz.

Es enthält also ein Pfd. dieses Wassers:

|       |      |                        |
|-------|------|------------------------|
| 1,51  | Gran | Schwefelwasserstoff,   |
| 0,608 | »    | Chlornatrium,          |
| 0,742 | »    | schwefelsaures Natron, |
| 2,624 | »    | kohlensauren Kalk.     |

Man führte uns noch zu einer andern Quelle in Bräsa, die nach der Meinung unsers Führers Eisen enthalten sollte. An dem Orte, wo dieses Wasser hervorquillt, befinden sich in demselben eine Menge kleiner Wasserpflanzen, durch die das Wasser einen fremdartigen un-

angenehmen Geruch und Geschmack erhält. Bei der chemischen Prüfung erwies sich die gänzliche Abwesenheit des Eisens, dagegen zeigte sich ein wenig kohlensaurer Kalk und eine kaum wahrnehmbare Spur Kochsalz. Die Eigenschwere dieses Wassers zeigte erst an der vierten Decimalstelle eine Differenz von der des destillirten Wassers.

### VII. Schwefeleisenquelle zu Otschin bei Bräsa.

Diese Quelle, welche bis jetzt noch sehr wenig ergiebig ist, und die sich gleichsam wie aus einem Schwamm, mühsam aus der Erde hervordrängt, giebt ein Wasser von schwärzlich-trübem Ansehen, das sich durch ruhiges Stehen unter Absetzung eines grünlich-schwarzen Bodensatzes klärt; es hat einen schwefelleberartigen eisenhaften Geruch und einen eben solchen, bitterlich-salzigem, höchst widerlichen Geschmack, seine Temperatur ist  $10^{\circ}$  R. und seine Eigenschwere bei  $12^{\circ}$  R. 1,00. Durchs Abdampfen bis zur Trockne und mäßiges Glühen des Rückstandes verliert es seinen Schwefelwasserstoffgehalt.

Die Reagentien wirkten auf das filtrirte klare Wasser, wie folgt:

- a) Reagenzpapiere blieben unverändert.
- b) In dem mit Salzsäure gesäuerten Wasser bewirkte Chlorbarium starke Trübung.
- c) Barytwasser wurde durch die Dämpfe selbst des gesäuerten Wassers nicht getrübt.
- d) Schwefelsaures Silber bewirkte in der angesäuerten Auflösung des geglühten Rückstandes starke Trübung.
- e) Das grünlich-schwarze, im Wasser schwebende Pulver erwies sich als Schwefeleisen; im filtrirten

**Wasser aber brachte weder Galläpfelinctur noch Cyaneisenkalium Veränderungen hervor.**

**f) Kleesaures Kali bewirkte starke Trübung.**

**g) Aetzkali desgleichen.**

**h) Brechweinstein bewirkte selbst in dem aufgekochten Wasser einen orange gefärbten Niederschlag.**

Von diesen Versuchen beweist **h** die Gegenwart zum Theil an eine Basis gebundenen Schwefelwasserstoffs; **g** die Gegenwart gebundener Schwefelsäure; **d** der Salzsäure, **e** im Wasser schwebendes Schwefeleisen; **f** Kalk, **b** und **g** Magnesia; so wie die Abwesenheit freier Kohlensäure und Alkalien, der Kohlensäure und ihrer Salze durch **a** und **c** dargethan ist.

Die Menge dieser Bestandtheile wurde auf folgende Weise ermittelt:

**a) Ein Pfd. des Wassers gab durch Filtriren 3,75 Gran Schwefeleisen.**

**b) Ein Pfd. des Wassers wurde in einer Retorte mit Salzsäure stark gesäuert und die beim Sieden entwickelten Dämpfe in salpetersaure Bleilösung geleitet. Hierdurch wurden 18,5 Gran Schwefelblei erhalten, welche entsprechen 2,658 Gran Schwefelwasserstoff.**

**c) Ein Pfd. filtrirtes Wasser, zur Trockne verdampft, den geglühten Rückstand in destillirtem Wasser gelöst, mit Salpetersäure angesäuert, lieferte mit schwefelsaurem Silber 10,75 Gran Chlorsilber, welche 5,015 Gran Kochsalz entsprechen.**

**d) Ein Pfd. filtrirtes Wasser gab mit Chlorbarium 25,5 Gran Schwerspath, enthaltend 8,644 Gran Schwefelsäure.**

**e) Durch Fällern mit oxalsaurem Kali wurden aus einem Pfd. des filtrirten Wassers 5,35 Gran oxalsaurer Kalk erhalten, in welchem 2,461 Gran reine Kalk-**

erde enthalten sind. Diese bilden mit 3,43 Gr. Schwefelsäure 7,457 Gran schwefelsauren Kalk.

f) Aus 1 Pfd. Wasser wurde durch Fälln mit Aetzkali 0,875 Gran Bittererde erhalten, welche sich mit 1,72 Gr. Schwefelsäure zu 5,043 Gr. Bittersalz verbinden.

g) Die übrigen 3,494 Gr. Schwefelsäure sind auf schwefelsaures Natron zu berechnen, und bilden zu diesem 14,111 Gran.

Es sind also in einem Pfunde dieses Wassers enthalten:

|        |      |                                                   |
|--------|------|---------------------------------------------------|
| 2,658  | Gran | Schwefelwasserstoff, zum Theil an Natron gebunden |
| 5,015  | »    | Chlornatrium,                                     |
| 14,111 | »    | schwefelsaures Natron,                            |
| 7,457  | »    | schwefelsaurer Kalk,                              |
| 5,043  | »    | Bittersalz,                                       |
| 3,75   | »    | Schwefeleisen, in Wasser schwebend.               |

### VIII. Schwefelquelle auf dem Flecken Putschos bei dem Dorfe Serboneschte.

Das Wasser dieser Quelle, welches sich in einem offenen hölzernen, etwa 6' tiefen Behälter ansammelt, ist etwas schwärzlich trübe, nach einiger Ruhe wird es unter Ablagerung schwärzlichen Pulvers, wasserhell; Geruch und Geschmack zeigen Schwefelwasserstoff und vielerlich schmeckende Salze. Die Temperatur der Quelle wechselt nach der der Luft, und die Eigenschwere beträgt bei 12° R. 1,0056. Durch längeres Kochen verliert es seinen Schwefelwasserstoff gänzlich.

Die Wirkung der Reagentien darauf war folgende:

- a) Die Lackmuspapiere blieben unverändert.
- b) Barytwasser wurde durch die Dämpfe des etwas gesäuerten Wassers merklich getrübt.



c) Salzsaurer Baryt trübte das mit Salzsäure versetzte Wasser stark.

d) In der mit Salpetersäure gemischten Auflösung des nach dem Abdampfen des Wassers erhaltenen Rückstandes bewirkte schwefelsaures Silber einen käsigen Niederschlag.

e) Brechweinstein bewirkte eine orange Färbung, ohne Niederschlag.

f) Aetzkali brachte einen lockern Niederschlag hervor.

g) Kleesaures Kali erzeugte einen Niederschlag.

h) Das sich aus dem Wasser absetzende schwarze Pulver verhielt sich wie Schwefeleisen; im filtrirten Wasser war weiter keine Spur Eisen zu entdecken.

Von diesen Versuchen beweist *e* die Anwesenheit Schwefelwasserstoffs, *b* gebundene Kohlensäure, *c* Schwefelsäure, *d* Salzsäure, *f* Magnesia, *g* Kalkerde, *a* weist die Abwesenheit freier Säuren und Alkalien.

Die Ermittlung der Menge der Bestandtheile geschah die oben angegebene Weise, weshalb es wohl genügt, die Resultate, wie folgt, anzuführen.

In einem Pfd. des genannten Wassers sind enthalten :

|        |      |                           |
|--------|------|---------------------------|
| 1,76   | Gran | Schwefelwasserstoff,      |
| 3,965  | »    | Chlornatrium,             |
| 15,942 | »    | schwefelsaures Natron,    |
| 4,403  | »    | schwefelsaurer Kalk,      |
| 32,651 | »    | schwefelsaure Magnesia,   |
| 3,746  | »    | kohlensaure Magnesia,     |
| 0,666  | »    | Schwefeleisen, schwebend. |

Etwa 10 Schritte von der Stelle, wo sich das betriebene Wasser ansammelt, befindet sich ein ähnlicher Wasserbehälter; das in demselben sich ansammelnde Wasser ist aber von gewöhnlichem Quellwasser nur durch verschieden, daß es durch eine Menge Frösche

und andere Wasserthiere etwas schmierig und widlich von Geruch und Geschmack geworden ist. In Mineralquellen kann es daher auf keine Weise zu zählt werden.

#### IX. Schwefelquelle bei dem Städtchen Kimpalungi

Das Wasser dieser Quelle besitzt eine etwas Grüne schillernde Farbe, läßt sich aber durch Filtriren vollkommen klar darstellen. Der trübende auf dem Filter zurückbleibende Stoff ist auch hier Schwefeleisen. Es riecht und schmeckt nach Schwefelwasserstoff, schmeckt außerdem salzig. Seine Temperatur ist, da es sich in einem offenen hölzernen Behälter ansammelt, von Luft und Sonnenschein abhängig. Seine Eigenschwere ist bei 12° R. 1,003. Durchs Kochen geht der Schwefelwasserstoff gänzlich davon.

Dies Wasser enthält, wie die Prüfung mit Reactionen bewies, weder kohlensaure noch schwefelsaure Verbindungen. Dagegen wurde darin gefunden in einem Pfunde des Wassers :

|        |      |                      |
|--------|------|----------------------|
| 0,826  | Gran | Schwefelwasserstoff, |
| 12,857 | ,    | Chlornatrium,        |
| 4,077  | ,    | salzsaurer Kalk,     |
| 0,166  | ,    | Schwefeleisen.       |

Zwei andere Quellen, von der eben beschrieben etwa 150 Klafter entfernt, wurden untersucht, und ihren Bestandtheilen und deren Mischungsverhältnissen der ersten völlig gleich befunden, mit dem einzigen Unterschiede, daß in beiden kein Schwefeleisen vorhanden war.

#### X. Schweflige Salzquelle bei dem Städtchen Kalimares

Dies Wasser ist farblos und krystallklar; es besitzt einen starken Geruch nach Schwefelwasserstoff, eine

en solchen stark salzigen Geschmack, 8° R. Temperatur, bei 12° R. eine Eigenschwere von 1,016, und verliert durchs Kochen seinen Schwefelwasserstoff vollkommen.

Die Reagentien zeigten darin viel Kochsalz, gebundene Kohlensäure, Kalk und Magnesiasalze, dagegen fanden darin schwefelsaure Salze, so wie freie Säure und Alkalien. In einem Pfd. des Wassers wurden jene Bestandtheile in folgenden Verhältnissen ermittelt:

|         |      |                      |
|---------|------|----------------------|
| 2,695   | Gran | Schwefelwasserstoff, |
| 104,384 | »    | Chlornatrium,        |
| 14,634  | »    | salzsaure Magnesia,  |
| 10,061  | »    | salzsaurer Kalk,     |
| 1,66    | »    | kohlensaurer Kalk.   |

Dies Wasser quillt an drei verschiedenen Stellen aus dem Städtchen Kalimaneste hervor, ist aber an allen drei Stellen sich seinen Bestandtheilen und deren Verhältnissen nach vollkommen gleich.

#### *XI. Schwefelsalzquelle bei dem Kloster Kosia.*

Diese Quelle liefert ein Wasser, das die nämlichen physischen Eigenschaften zeigt, wie das bei Kalimaneste, besitzt es eine geringere Eigenschwere, und zwar bei 12° R. 1,0064.

Reagentien zeigten in derselben die nämlichen Bestandtheile wie in jener an, und zwar wurden in einem Pfd. ermittelt:

|        |      |                       |
|--------|------|-----------------------|
| 1,039  | Gran | Schwefelwasserstoff,  |
| 39,495 | »    | Chlornatrium,         |
| 3,753  | »    | salzsaurer Kalk,      |
| 5,625  | »    | salzsaure Bittererde, |
| 0,631  | »    | kohlensaurer Kalk.    |

**XII. Schwefelsalzquelle nahe bei dem Dorfe Olonea.**

Auch dieses Wasser verhielt sich seinen physikalischen Eigenschaften nach wie die beiden vorigen, hatte die Temperatur und bei 12° R. 1,008 Eigenschwere.

Auch hier wiesen Reagentien die nämlichen Bestandtheile nach, wie in den beiden vorigen, mit Ausnahme des kohlensauren Kalks, welchen dasselbe nicht enthielt. Es wurden in einem Pfunde des Wassers gefunden:

|        |      |                       |
|--------|------|-----------------------|
| 1,673  | Gran | Schwefelwasserstoff,  |
| 50,233 | »    | Chlornatrium,         |
| 11,427 | »    | salzsaurer Kalk,      |
| 9,093  | »    | salzsaure Bittererde. |

**XIII. Schwefelquelle beim Dorfe Glogova.**

Auch dieses Wasser ist dem vorigen sehr ähnlich, nur von geringerem Salzgehalt. Es besitzt 10° R. Temperatur und eine Eigenschwere, die von der des gewöhnlichen Wassers fast gar nicht verschieden ist.

In einem Pfunde dieses Wassers zeigten sich folgende Bestandtheile:

|       |      |                      |
|-------|------|----------------------|
| 2,178 | Gran | Schwefelwasserstoff, |
| 2,082 | »    | Chlornatrium,        |
| 1,531 | »    | salzsaurer Kalk.     |



# Chemische Analyse der Mineralquelle zu Einbeck im Kreise Tecklenburg (Regie- rungsbezirk Münster);

von

*J. F. Albers,*

Apotheker zu Lengerich.

## I.

### Physische Eigenschaften des Wassers.

Das am 24. Jul. 1839 frischgeschöpfte Wasser hatte völlig klares Ansehen, wurde, nachdem es mehrere Stunden an der Luft gestanden hatte, kaum merkbar befeuchtet, und hatte einen geringen, jedoch deutlichen Geruch und Geschmack nach Schwefelwasserstoff, büßte er beide ein, wenn es einige Zeit an freier Luft gestanden hatte. Auch das in Krügen verschickte Wasser liert in sehr kurzer Zeit Geruch und Geschmack nach Schwefelwasserstoff.

Die Temperatur der bedeckten Quelle war  $+13\frac{1}{2}^{\circ}$  R., während die der naheliegenden unbedeckten  $+15^{\circ}$  R. und der Atmosphäre  $+17\frac{1}{2}^{\circ}$  R. zeigte.

## II.

### Qualitative Untersuchung.

#### A. Auf flüchtige Bestandtheile.

Ein Streifen Lackmuspapier wurde von dem Wasser kaum merkbar geröthet.

Das gekochte Wasser zeigte durchaus keine saure Reaction.



Mit frisch bereitetem Kalkwasser geschüttelt, und dasselbe milchigt. Zu zwei Unzen dieses Wassers den zehn Tropfen einer Auflösung des essigsauren pferammoniaks getröpfelt, wodurch das Wasser dunklere Färbung annahm, und nach kurzer Zeit setzte sich in demselben ein bräunlich-schwarzer Niederschlag.

Zu zwei Unzen desselben wurden ebenfalls Tropfen einer salpetersauren Silberammoniaksolution gesetzt, wovon das Wasser sofort eine schwärzliche Färbung annahm, und nach kurzer Zeit ein schwarzer Niederschlag sichtbar wurde, der alle Eigenschaften Schwefelsilbers besaß.

In eine zum Theil mit dem gedachten Wasser gefüllte und verkorkte Flasche wurde zwischen Kork und der Mündung der Flasche ein Streifen saures Fließpapier, das mit Bleiwasser befeuchtet war, gesteckt, das Papier wurde in sehr kurzer Zeit bräunlich und nahm ein metallisch-glänzendes Ansehen an.

Dieser Versuch wurde mit gekochtem Wasser wiederholt, wobei jedoch, wie zu erwarten stand, das Papier keine Veränderung erlitt.

In einer kleinen Porcellanschale wurde etwas saures salpetersaures Wismuthoxyd oberhalb des Wassers der bedeckten Quelle gestellt, wodurch dasselbe nach einer Stunde auf der Oberfläche ein schwärzliches Ansehen erhielt. Da ich mich hinreichend von der Gegenwart des Schwefelwasserstoffs überzeugt hatte, so hielt ich fernere Versuche für überflüssig.

#### B. Auf fixe Bestandtheile.

Geröthetes Lackmuspapier blieb von dem Wasser unverändert.

Chlorbariumsolution bewirkte eine geringe Trübung, die durch Zusatz von Salpetersäure nicht verstand.

Salpetersaure Silberoxydsolution erzeugte eine ziemlich starke, milchartige Trübung, die durch hinzugefügte Salpetersäure nicht verschwand; wurde das Wasser mit Ammoniakflüssigkeit versetzt, so entstand durch vorhandenes Reagens keine Veränderung.

Eisenblausaures Kali, so wie wässrige Galläpfeltincturen zeigten keine Reaction.

Oxalsaures Kali bewirkte eine weißliche Trübung; wurde das Wasser längere Zeit gekocht, so verursachte dieses Reagens ebenfalls eine deutliche Reaction.

Zu der von dem oxalsauren Kalke abfiltrirten Flüssigkeit, worin oxalsaures Ammoniak keine Reaction bewirkte, wurde basisches phosphorsaures Ammoniak gesetzt; die Flüssigkeit schien sich anfänglich nicht zu verändern, nach einiger Zeit wurde jedoch eine geringe Trübung und demnächst ein weißer Niederschlag sichtbar.

Nach diesen einleitenden Versuchen wurden etwa 1 Pfd. dieses Wassers in einer Porcellanschale abgedampft. Der erhaltene trockne, etwas hygroskopische Rückstand besaß eine graue Farbe. Derselbe wurde zweimal mit etwa dem fünffachen Gewichte Alkohol von 90 R. behandelt, die fast wasserhelle Flüssigkeit vom Rückstande abfiltrirt, abgedampft, und der Rückstand, der eine grünliche Farbe besaß, mit destillirtem Wasser übergossen, worin sich Alles, bis auf einen höchst geringen Antheil, der alle Eigenschaften eines harzigen Extractivstoffs besaß, löste. Die filtrirte Auflösung verhielt sich gegen Reagentien, wie folgt:

Kaliumeisencyanür, Gallustinctur und hydrothionsaures Ammoniak zeigten keine Reaction.

Ammoniakflüssigkeit bewirkte eine geringe weiße Trübung.

Aetzkalilauge erzeugte eine geringe Trübung, durch einen Ueberschuß des Fällungsmittels nicht verschwand.

Zu einem nicht geringen Theile der Flüssigkeit war salpetersaure Silberoxydlösung gesetzt, wodurch ein starker, *völlig weißer*, voluminöser Niederschlag erfolgte, der sich, nachdem er gehörig ausgesüßt war, *völlig* in Ammoniakflüssigkeit löste, wodurch die Anwesenheit einer Chlorverbindung, aber auch die Abwesenheit eines Jod- und Bromsalzes, erwiesen wurde.

Um mich *völlig* von der Abwesenheit eines Thor-erdesalzes zu überzeugen, so wurde der größte Theil der noch vorhandenen Auflösung mit Salzsäure versetzt und mit Ammoniak gesättigt, dadurch Chlorammonium gebildet, um die etwa darin gelöste Talkerde aufgelöst zu erhalten; hierauf Ammoniakflüssigkeit zugesetzt und das Glas verkorkt. Da nach längerer Zeit kein Niederschlag sichtbar war, so wurde die Flüssigkeit mit Chlorwasserstoffsäure gesättigt, dann mit oxalsaurem Ammoniak versetzt, wodurch eine weißliche Trübung entstand, die nur von einem Kalksalze herrühren konnte. In der von dem oxalsauren Kalke abfiltrirten Flüssigkeit entstand durch basisch-phosphorsaures Ammoniak eine noch deutliche Trübung, die die Gegenwart der Magnesia anzeigte. Die von der phosphorsauren Ammoniakmagnesia abfiltrirte Flüssigkeit wurde genau mit Salpetersäure neutralisirt und durch tropfenweise Hinzufügung des salpetersauren Bleioxydes von der vorhandenen Phosphorsäure gereinigt, demnächst filtrirt, zur Trockne abgeräucht und im Platintiegel geschmolzen, um das salpetersaure Ammoniak zu verflüchtigen. Ve

che, die mit dem Löthrohre, mit Platinsolution etc. gestellt wurden, ließen keine Spur eines Kali- und Natriumsalzes, wohl aber eines Natronsalzes vermuthen.

Der noch vorhandene Rest der wässrigen Auflösung wurde mit Goldblättchen, zu dem etwas Chlorwasserstoffsäure gesetzt war, gekocht; da die Flüssigkeit völlig wasserhell blieb, so konnte ich die Abwesenheit eines salpetersauren Salzes annehmen.

Der in Alkohol unlösliche Rückstand wurde demselben mit seinem fünffachen Gewichte destillirten Wassers digerirt, die Operation wiederholt, und die Flüssigkeit von dem unlöslichen Rückstande abfiltrirt und gedampft. Der gelbbräunliche Rückstand wurde mit seinem zwanzigfachen Gewichte destillirten Wassers übergossen, wobei ein kleiner Theil ungelöst blieb, einstweilen mit *a* bezeichnet wurde.

Die wässrige Lösung verhielt sich gegen Reagentien, wie folgt:

Essigsäure Baryterdesolution zu einem nicht unbedeutenden Theil der Auflösung gesetzt, erzeugte einen weißen Niederschlag, der, nachdem er gehörig abgesüßt und scharf getrocknet war, mit verdünnter Chlorwasserstoffsäure übergossen wurde. Der Niederschlag hatte durch Digestion am Gewichte nichts verloren, und in der salzsauren Flüssigkeit wurde, nach Sättigung derselben mit Ammoniak, keine Trübung sichtbar; ein Zeichen, daß schwefelsäure, aber keine phosphorsaure Verbindungen vorhanden waren.

Salpetersaures Silberoxyd erzeugte keine Reaction; ein Zeichen, daß sämtliche Chlorverbindungen sich in Alkohol aufgelöst hatten.

Oxalsaures Ammoniak bildete eine höchst geringe Fällung.



Ammoniakflüssigkeit brachte einen weissen, voluminösen Niederschlag hervor, der nach Zusatz von Salzsäure, durch Uebersättigung mit Ammoniak nicht wieder entstand.

Da dieser Versuch die Gegenwart der schwefelsauren Magnesia andeutete, so wurde der grösste Theil der Auflösung absichtlich mit einer Auflösung von Chlorammonium versetzt, demnächst eine Auflösung von kohlensaurem Ammoniak hinzugefügt, wodurch ein sehr geringer Niederschlag erfolgte, der mit *b* bezeichnet wurde.

In einem Theile der von dem Niederschlage *b* abfiltrirten Flüssigkeit verursachte basisches phosphorsaures Ammoniak sofort einen voluminösen, weissen Niederschlag, wodurch die Anwesenheit der schwefelsauren Magnesia ausser Zweifel gesetzt wurde.

Ein anderer Theil der von dem Niederschlage *b* abfiltrirten Flüssigkeit wurde abgedampft, geglüht, um ammoniakalischen Salze zu verflüchtigen, dann in destillirtem Wasser gelöst. Zu der Auflösung wurde essigsaure Baryterdesolution im Ueberschuss gesetzt, die Flüssigkeit von der erzeugten schwefelsauren Baryterde abfiltrirt, verdampft und geglüht, um die essigsauren Salze in kohlensaure zu verwandeln, dann die rückständige schwärzliche Masse mit dest. Wasser übergossen. Die filtrirte Flüssigkeit, welche sehr deutlich alkalisch reagirte, wurde bis auf einige Tropfen eingeeengt, dann mit einer spärlichen Auflösung des Platinchlorids versetzt, wodurch eine höchst geringe Trübung sichtbar und die Gegenwart des schwefelsauren Kalis angedeutet wurde.

Der Rest der wässrigen Auflösung wurde in einem kleinen Porcellantiegel abgedampft, der Rückstand, der ein hellbräunliches Ansehen hatte, geglüht, wobei er schwarz wurde, und einen eigenthümlichen, brenzlichen Geruch



reitetete, wodurch das Vorhandensein eines im Wasserlöslichen Extractivstoffs angezeigt wurde.

Der bei der zweiten Auflösung in Wasser gebildete a bezeichnete Rückstand wurde nun zur Untersuchung gezogen. Derselbe hatte ein weißes Ansehen, sich, nachdem er mit vielem destillirten Wasser in einem kleinen Reagensgläschen gekocht war, völlig zu einem Theile der Auflösung wurde oxalsaures, in einem andern Chlorbarium gesetzt, wodurch sich ein Niederschlag bewirkt wurde, der die Gegenwart des schwefelsauren Kalks bekundete.

Der Niederschlag b, welcher durch kohlensaures Ammoniak entstanden war, nachdem die Auflösung vor mit Chlorammonium versetzt war, konnte, da er gering war, nicht näher untersucht werden, konnte wohl nur von der Zersetzung eines kleinen Theils schwefelsauren Kalks herrühren.

Der in Alkohol, so wie in destillirtem Wasser unlösliche Rückstand besaß eine hellbräunliche Farbe, der wurde nun mit verdünnter Chlorwasserstoffsäure versetzt, wobei ein starkes Aufbrausen von entweicher Kohlensäure erfolgte. Die Flüssigkeit wurde vom unlöslichen Rückstande abfiltrirt, der Rückstand nachdem er ausgesüßt war, mit c bezeichnet. Das c hatte ein gelbliches Ansehen, und verhielt sich zu Reagentien, wie folgt:

Einige Tropfen desselben wurden mit Ammoniak versetzt und mit Kaliumeisencyanür zersetzt, wodurch eine bläuliche Färbung entstand. Da dieser Versuch die Gegenwart des Eisenoxyds andeutete, so wurde der größte Theil der sauren Flüssigkeit mit Ammoniak übersättigt, auf ein hellbräunlicher Niederschlag erfolgte, den in einigen Tropfen Chlorwasserstoffsäure auflöste,

worauf die Auflösung mit Ammoniak so viel wie thunlich neutralisirt und aus derselben durch benzoesaures Kali das Eisenoxyd gefällt wurde. In der von dem benzoesauren Eisenoxyde abfiltrirten Flüssigkeit war durch Ammoniak etc. keine Spur von phosphorsaurem Kalk, oder Manganoxyd etc. zu entdecken.

In der von dem Niederschlage, der in der sauren Auflösung entstanden war, nachdem dieselbe durch Ammoniak übersättigt worden war, abfiltrirten Flüssigkeit entstand durch oxalsaures Kali ein bedeutender, weißer Niederschlag, der das Vorhandensein des kohlensauren Kalks darthut. Da auch phosphorsaures Natron in der von dem oxalsauren Kalk abfiltrirten Flüssigkeit einen voluminösen, weißen Präcipitat hervorbrachte, so wurde die Anwesenheit der kohlensauren Magnesia außer Zweifel gesetzt.

Es blieb nun noch der in Alkohol, Wasser und Salzsäure unlösliche mit c bezeichnete Rückstand zu untersuchen übrig.

Zuerst wurde er mit einer hinreichenden Menge destillirten Wassers gekocht, und zu einem Theile der abfiltrirten Flüssigkeit Chlorbarium, zu einem andern oxalsaures Kali gesetzt. In beiden Flüssigkeiten entstand ein Präcipitat, wovon der erste in Salzsäure unlöslich war, wodurch nochmals die Gegenwart des schwefelsauren Kalks angezeigt wurde.

Ein Theil des in kochendem Wasser unlöslichen Rückstandes, der im feuchten Zustande ein schwärzliches im trocknen dagegen ein graues Ansehen hatte, wurde als er im Platintiegel geglüht wurde, unter Verbreitung eines brenzlichen Geruchs, weiß, weshalb ich auf die Gegenwart einer in Alkohol, Wasser und Salzsäure unlöslichen organischen Materie schließen konnte.

anderer Theil des genannten Rückstandes wurde mit kohlensaurem Kali und Wasser in einem kleinen Glase gekocht und der Rückstand mit Salpeter behandelt, da in der abfiltrirten sauren Flüssigkeit Schwefelsäure keine Trübung sichtbar wurde, so wich von der Abwesenheit der schwefelsauren Baryt-Strontianerde überzeugt sein.

Der noch übrige Theil des Rückstandes wurde mit kohlensaurem Natrium (Aetznatronlauge) im Platintiegel gekocht, worin er sich bräunte. Nachdem die Flüssigkeit abgedunstet und in glühenden Fluß gebracht war, blieb nach Abkühlen ein farbenloser Rückstand, der in Salzwasser gelöst, wiederum zur Trockne abgedunstet und mit destillirtem Wasser übergossen wurde, in welchem ein weißer, körniger Rückstand ungelöst blieb, die Eigenschaften der Kieselerde besaß.

Der von der Kieselerde abfiltrirten Flüssigkeit wurde durch Schwefelsäure kein, dagegen durch Ammoniumflüssigkeit ein Niederschlag, der auf Thonerde hindeutete, jedoch eine Spur Eisenoxyd enthielt.

#### *Untersuchung auf Fluor.*

5 Pfd. des Wassers wurden zur Trockne abgedunstet, der Rückstand in einem Platintiegel mit Schwefelsäure übergossen, über denselben eine mit Wachs beschmierte Glasplatte gelegt, worin einige Schriftzüge waren. Da nach einigen Stunden keine Veränderung auf den unbedeckten Stellen des Glases bemerkt wurde, so wurde der Tiegel gelinde erhitzt, wodurch kein Angriff auf die genannten Stellen sichtbar wurde, durch die Abwesenheit einer Fluorverbindung.

#### *Untersuchung auf Ammoniak.*

5 Pfd. des Wassers wurde in einer Tubulatretorte,



auf dessen Boden mittelst einer Glasröhre etwas Aetkalilauge gebracht war, der Destillation unterworfen. E an dem Halse der Retorte befestigter Streifen geröthtes Lackmuspapier blieb unverändert, und das überdestillirte Wasser zeigte auch keine alkalische Reaction.

### III.

#### Quantitative Untersuchung.

*A.* Zwanzig Pfd. des Wassers wurden in einer Porcellanschale, die zum größten Theil mit einer sauberen Glasplatte bedeckt war, bei höchst gelinder Wärme verdunstet. Der graugelbe, etwas hygroskopische Rückstand wurde so lange ausgetrocknet, bis kein Gewichtsverlust mehr bemerkbar war, demnächst noch wärgewogen. Das Gewicht desselben betrug 46 Gran.

*B.* Obiger Rückstand wurde in einem Cylinderglas mit seinem fünffachen Gewichte Alkohols von 90° R. bei der gewöhnlichen Lufttemperatur digerirt und die Operation mit derselben Menge Alkohols noch dreimal wiederholt, demnächst mit Alkohol von der angegebenen Stärke so lange ausgesüßt, bis die abgelaufene Flüssigkeit durchaus nicht von der salpetersauren Silberoxydsolution getrübt wurde. Der ausgesüßte und scharf getrocknete Rückstand wog 40 Gran.

*C.* Die filtrirten alkoholischen Auflösungen aus *B* die ein fast wasserhelles Ansehen hatten, wurden in einer Porcellanschale verdunstet, der Rückstand mit destillirtem Wasser übergossen, und die Flüssigkeit von dem geringen unlöslichen Rückstande abfiltrirt. Der auf einem scharf getrockneten und vorher von mir gewogenen Filter gebliebene harzige Extractivstoff betrug 0,4 Gran.

*D.* Nachdem der filtrirten wässrigen Lösung aus *C* einige Tropfen Salpetersäure zugesetzt waren, wurde

salpetersaure Silberoxydsolution zugetröpfelt, als ein Niederschlag erfolgte. Das ausgesüßte, getrocknet und geglühte Chlorsilber wog 13,9 Gran, wodurch 1 Gran Chlor angezeigt werden.

E. Die von dem Chlorsilber abfiltrirte Flüssigkeit D wurde durch hinzugefügte Salzsäure von dem schüssig hinzugesetzten salpetersauren Silberoxyd gereinigt, mit Ammoniakflüssigkeit gehörig neutralisirt und mit oxalsaurem Ammoniak versetzt. Die ausgeschiedene oxalsaure Kalkerde betrug, nachdem sie scharf getrocknet war, 0,2 Gran, die 0,062 Gran Calcium enthalten würden. Da nun dieses Calcium an Chlor gebunden ist, so würde sich ergeben:

$$\begin{array}{r} 0,062 \text{ Calcium,} \\ 0,104 \text{ Chlor,} \\ \hline 0,166 \text{ Gran Chlorcalcium.} \end{array}$$

Nimmt man an, daß die Salze durch das scharfe Trocknen des vereinigten Rückstandes ihr Krystallwasser verloren haben, so wäre dieses noch in Rechnung zu bringen, also:

$$\begin{array}{r} 0,166 \text{ Chlorcalcium,} \\ 0,199 \text{ Wasser,} \\ \hline 0,365 \text{ Gran krystallisirtes Chlorcalcium.} \end{array}$$

F. Die von der oxalsauren Kalkerde abfiltrirte Flüssigkeit aus E wurde mit phosphorsaurem Natron, dem Ammoniak zugesetzt war, vermischt. Der ausgeschiedene Niederschlag wurde geglüht, wodurch die phosphorsaure Ammoniakmagnesia in neutrale phosphorsaure Magnesia, die 4,5 Gran wog, verwandelt wurde, welche nach Berzelius's Analyse der neutralen phosphorsauren Magnesia 0,992 Gran Magnium enthalten würden,



|                                                |
|------------------------------------------------|
| 0,992 Magnium,                                 |
| 2,772 Chlor,                                   |
| <hr/> 3,764 Gran Chlormagnium,                 |
| 3,658 Wasser,                                  |
| <hr/> 7,422 Gran krystallisirtes Chlormagnium. |

G. Von den Chlormetallen blieb nun noch die Menge des Chlornatriums zu bestimmen übrig.

Die in *D* gefundene Chlormenge betrug 3,429 Gran davon gingen :

|                   |
|-------------------|
| 0,104 an Calcium, |
| 2,772 » Magnium,  |
| <hr/> = 2,876.    |

Es blieben also für Chlornatrium noch  $3,429 - 2,876 = 0,553$  Gran. Diese erfordern :

|                                |
|--------------------------------|
| 0,363 Natrium,                 |
| 0,553 Chlor,                   |
| <hr/> 0,916 Gran Chlornatrium. |

H. Der in Alkohol unlösliche, 40 Gran schwerer Rückstand aus *B* wurde mit seinem fünffachen Gewichte destillirten Wassers digerirt und diese Operation zweimal mit derselben Menge Wassers wiederholt. Die Unlösliche auf einem kleinen vorher gewogenen Filter gesammelt und ausgesüßt.

I. Die filtrirte Flüssigkeit aus *H* wurde in einem kleinen Porcellanschälchen zur Trockne verdunstet, der Rückstand, welcher ein gelbbräunliches Ansehen hatte, mit seinem 20fachen Gewichte destillirten Wassers übergossen, worin sich Alles bis auf eine höchst geringe Spur löste. Die Flüssigkeit wurde filtrirt und der auf dem Filter gebliebene, etwa 0,1 Gran schwere Rückstand zu dem in destillirtem Wasser unlöslichen Rückstande aus *H* gegeben.

K. Die weingelbe Flüssigkeit aus *I* wurde so lange mit einer Auflösung von essigsaurer Baryterde versetzt

noch ein Niederschlag erfolgte. Die gesammelte, gesüßte und geglühte, schwefelsaure Baryterde betrug Gran, welche 6,870 Gran Schwefelsäure entsprechen.

L. Nachdem die vom schwefelsauren Baryte abfiltrirte Flüssigkeit aus K, die von einer Auflösung des sauren Silbers nicht verändert wurde, von der übrig hingehesetzten essigsauren Baryterde und dem sauren Silber durch vorsichtig hinzugefügte Schwefel- und Salzsäure gereinigt war, wurde sie, nachdem mit Ammoniakflüssigkeit gehörig neutralisirt war, oxalsaurem Ammoniak versetzt. Der auf einem Filter gesammelte, ausgesüßte und scharf getrocknete oxalsaurer Kalk wog 0,2 Gran, welcher 0,070 Gran Kalkerde enthält, die 0,098 Gran Schwefelsäure erfordert.

0,070 Gran Kalkerde,

0,098 „ Schwefelsäure,

---

0,168 Gran schwefelsaure Kalkerde,

0,037 „ Wasser,

---

0,205 Gran krystall. schwefels. Kalkerde.

M. Die von dem oxalsauren Kalke abfiltrirte Flüssigkeit aus L wurde in zwei gleiche Theile getheilt, die eine Hälfte mit basischem phosphorsauren Ammoniak versetzt. Die gesammelte, ausgesüßte und geglühte neutrale phosphorsaure Magnesia betrug, auf die Menge berechnet, 5,8 Gran, welche 2,126 Gran Magnesia enthalten.

Diese würden an Schwefelsäure erfordern:

4,123 Gran Schwefelsäure,

2,126 „ Magnesia,

---

6,249 Gran schwefelsaure Magnesia,

6,478 „ Wasser,

---

12,727 Gran krystall. schwefels. Magnesia.

*N.* Die andere Hälfte der von dem oxalsauren K abfiltrirten Flüssigkeit aus *M* wurde abgedampft und lange in einem Platintiegel geglüht, bis alle ammoniakalischen Salze sich völlig verflüchtigt hatten. Die krügelige Masse wurde mit destillirtem Wasser ausgelaugt, die Auflösung filtrirt und mit einigen Tropfen einer sauren Platinchloridlösung versetzt. Die Flüssigkeit nahm nach einiger Zeit ein trübes Ansehen an, und sie abgedampft und der Rückstand mit destillirtem Wasser übergossen worden war, blieb ein gelbes Pulver zurück, welches auf einem kleinen Uhrgläschen getrocknet auf die ganze Menge des Mineralwassers berechnet 0,86 betrug, welche 0,128 Gran Kalium enthalten, die 0,13 Gran Kali anzeigen würden. Da nun dieses an Schwefelsäure gebunden im Mineralwasser anzunehmen ist, würde dieses erfordern:

$$\begin{array}{r} 0,130 \text{ Gran Schwefelsäure,} \\ 0,154 \text{ » Kali,} \\ \hline 0,284 \text{ Gran schwefelsaures Kali.} \end{array}$$

*O.* Die in *K* gefundene Menge Schwefelsäure betrug 6,870 Gran; davon gingen an Kalk in *L* 0,098, an Magnesia in *M* 4,123, an Kali in *N* 0,130 Gran. Nichts bleiben übrig von  $6,870 - (0,098 + 4,123 + 0,130) = 2,519$  Gran, die an Natron gebunden resultiren würden

$$\begin{array}{r} 1,964 \text{ Gran Natron,} \\ 2,519 \text{ » Schwefelsäure,} \\ \hline 4,483 \text{ Gran schwefelsaures Natron,} \\ 5,652 \text{ » Wasser,} \\ \hline 10,135 \text{ Gran krystall. schwefels. Natron.} \end{array}$$

*P.* Von den in destillirtem Wasser aufgelösten Stoffen bleibt nun noch die Menge des in demselben aufgelösten Extractivstoffs zu bestimmen übrig. Der in Alkohol unlösliche Rückstand aus *B* betrug 40 Gran. Nachdem derselbe mit destillirtem Wasser ausgezogen und

iederum scharf getrocknet war, wog er 24,5 Gran; waren mithin in destillirtem Wasser aufgelöst 40  $24,5 = 15,5$  Gran, welche bestanden aus:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 0,168          | schwefels. Kalkerde, |
| 6,249          | » Magnesia,          |
| 0,284          | » Kali,              |
| 4,483          | » Natron,            |
| <hr/>          |                      |
| = 11,184 Gran. |                      |

Zieht man nun diese 11,184 Gran von 15,5 ab, so bleibt ein Verlust von 4,316 Gran, welche, wie die qualitative Untersuchung gezeigt hat, als ein in Alkohol löslicher, in destillirtem Wasser dagegen sehr leicht löslicher Extractivstoff in Rechnung zu bringen sind.

Q. Der in destillirtem Wasser unlösliche graugelbe Rückstand aus *H*, welcher im scharf getrockneten Zustande 24,5 Gran wog, wurde mit Chlorwasserstoffsäure, mit Weingeist verdünnt war, digerirt. Sobald das Aufbrausen aufgehört und keine weitere Einwirkung stattfand, wurde die Flüssigkeit von dem geringen unlöslichen Rückstande durchs Filtriren geschieden, abgepft und der Rückstand mit destillirtem Wasser übersossen, worin sich Alles bis auf einen höchst geringen Theil, der zu dem in Chlorwasserstoffsäure unlöslichen Rückstande gegeben wurde, löste. Die filtrirte Flüssigkeit wurde, um Salmiak zu bilden, mit Salzsäure versetzt und mit Ammoniakflüssigkeit übersättigt, wodurch ein bräunlichgelber Niederschlag erfolgte, der nochmals mit Salzsäure gelöst und wiederum durch Ammoniakflüssigkeit gefällt wurde. Die von dem Eisenoxyde abfiltrirte Flüssigkeit wurde zu der vorstehenden Auflösung, woraus die kohlensauren Erden gefällt werden sollten, gegeben.

Das durch Ammoniak präcipitirte Eisenoxyd betrug



im geglühten Zustande 0,2 Gran. Da sich nun das senoxyd zum Eisenoxydul wie 11 : 10 verhält, so wü resultiren :

|                                            |
|--------------------------------------------|
| 0,190 Gran Eisenoxydul,                    |
| 0,119 „ Kohlensäure,                       |
| <hr/> 0,309 Gran kohlensaures Eisenoxydul. |

R. Der von dem Niederschlage, welcher durch Ammoniak entstanden war, abfiltrirten Flüssigkeit wurde, nachdem sie mit Salzsäure gehörig gesättigt, so lange oxalsaure Kalilösung zugesetzt, als noch Niederschlag erfolgte. Die Flüssigkeit wurde so schnell wie möglich von dem oxalsauren Kalk abfiltrirt, selbe mit verdünnter Oxalsäure ausgesüßt, getrocknet und schwach geglüht, wodurch der oxalsaure Kalk kohlensauren Kalk, dessen Gewicht 13,5 Gran betrug, verwandelt wurde. Da sich jedoch durch zu starkes Glühen leicht ein Theil des kohlensauren Kalks in Aetzkalk verwandelt haben konnte, wodurch ein Gewichtverlust hätte entstehen müssen, so wurde derselbe mit einigen Tropfen kohlensaurer Ammoniaklösung versetzt und über einer kleinen Spirituslampe erhitzt und gegossen. Das Gewicht stimmte jedoch genau mit dem zuerst erhaltenen überein, nämlich :

13,5 Gran kohlensauren Kalk.

S. Aus der vom oxalsauren Kalk abfiltrirten Flüssigkeit aus P wurde durch phosphorsaure Ammoniaklösung die Magnesia gefällt. Die geglühte neutrale phosphors. Magnesia betrug 10,5 Gran, die 3,850 Magnesia enthalten und mit Kohlensäure verbunden bilden würden

|                                        |
|----------------------------------------|
| 3,850 Gran Magnesia,                   |
| 4,102 „ Kohlensäure,                   |
| <hr/> 7,952 Gran kohlensaure Magnesia. |

T. Der in Salzsäure unlösliche Rückstand aus welcher 2,8 Gran wog, ein im trocknen Zustande grau



feuchten dagegen schwarzes Ansehen hatte, wurde destillirtem Wasser gekocht. Zu der abfiltrirten Flüssigkeit wurde Chlorbariumlösung gesetzt, wodurch geringer Niederschlag erfolgte, der im getrockneten geglühten Zustande 1 Gran wog. Da nun 1 Gran schwefelsaure Baryterde 0,343 Gran Schwefelsäure enthalten, so würde diese an Kalkerde erfordern:

0,243 Gran Kalkerde,

0,343    »    Schwefelsäure,

---

0,586 Gran schwefelsaure Kalkerde,

0,153    »    Wasser,

---

0,739 Gran krystall. schwefels. Kalkerde.

U. Der in destillirtem Wasser unlösliche Rückstand *T* wog 2 Gran. Ein Theil desselben wurde im Platel bis zur Weisse geglüht, wobei ein deutlich ammoniakalischer Geruch wahrzunehmen war. Gewichtsverlust, auf die ganze Menge des Rückstandes berechnet, zeigte 0,8 Gran einer stickstoffhaltigen organischen Materie an.

V. Der noch übrige Theil des Rückstandes wurde Aetznatronlauge gekocht, abgedampft und geglüht; geglühte weisse Masse hierauf in destillirtem Wasser und Salzsäure gelöst, zur Trockne abgedampft und der mit destillirtem Wasser übergossen, wobei ein wenig weisses Pulver, Kieselerde, ungelöst blieb, die ganze Menge berechnet 1 Gran wog.

W. In der von der Kieselerde abfiltrirten Flüssigkeit aus *V* entstand durch Ammoniakflüssigkeit ein geringer Niederschlag, der sich als Thonerde mit einem höchst geringen Antheil Eisenoxyd characterisirte, und die ganze Menge berechnet 0,2 Gran wog.

### *Bestimmung des Schwefelwasserstoffs.*

Eine Glaskugel wurde so viel wie möglich unter

dem Wasserspiegel der Quelle zum Theil mit gedachtem Wasser gefüllt, die Oeffnung mit einem genau passenden Korke, durch dessen Mitte ein Gasentbindungsröhr ging, ebenfalls unter der Oberfläche des Wassers verschlossen und demnächst verkittet; die Gasentbindungsröhre aber sofort in eine Wulfsche Flasche, die mit einer zweiten in Verbindung stand, in denen die Auflösung des salpetersauren Silberammoniaks befand, war, geleitet. Das Wasser wurde nun über einer Spirituslampe zum Kochen gebracht. Nachdem die atmosphärische Luft ausgetrieben war, nahm die wasserhaltige Silberammoniaksolution eine schwärzliche Färbung an und nach und nach wurden schwarze Flocken sichtbar, die sich am Boden des Glases sammelten. Sobald ich mich überzeugt hatte, daß sich das gebildete Schwefelsilber nicht mehr vermehrte, wurde mit dem Kochen aufgehört. Das sich gebildete, auf einem höchst klein vorher gewogenen Filter gesammelte, ausgesüßte und getrocknete Schwefelsilber betrug 1,8 Gran = 0,61 Kubikzoll Schwefelwasserstoffgas bei mittlerer Temperatur und mittlerem Luftdrucke.

Die zu diesem Versuche angewandte Menge Wassers betrug  $31\frac{1}{2}$  Unzen.

#### *Bestimmung der Kohlensäure.*

Eine zweite Glaskugel wurde unter denselben Vorichtsmaafsregeln mit dem Wasser theilweise gefüllt und die Gasentbindungsröhre mit zwei Wulfschen, die mit einer salzsauren Ammoniakflüssigkeit etwas Ammoniakflüssigkeit versetzt. Nachdem die Spirituslampe zum Kochen aufgehört hatte, wurde die Kugel umgedreht und sch

geknete kohlensaure Baryt betrug 3 Gran, die 0,6 = 1 Kubikzoll Kohlensäure, bei 28" Barometere und + 10° R. entsprechen. Zu diesem Entwicklungsversuche wurden 31 Unzen Wasser verwandt.

*Resultat der Untersuchung.*

Nach der vorstehenden Analyse enthält 1 Pfd. (16 Unzen) des Steinbecker Mineralwassers:

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Chlorcalcium, krystallisirtes.....                                | 0,018 Gran      |
| Chlormagnium, „ .....                                             | 0,371 „         |
| Chlornatrium .....                                                | 0,045 „         |
| Schwefelsaure Kalkerde, kryst.....                                | 0,047 „         |
| Schwefelsaure Magnesia, „ .....                                   | 0,636 „         |
| Schwefelsaures Kali .....                                         | 0,014 „         |
| Schwefelsaures Natron, kryst. ....                                | 0,506 „         |
| Kohlensaures Eisenoxydul.....                                     | 0,015 „         |
| Kohlensaure Kalkerde .....                                        | 0,675 „         |
| Kohlensaure Magnesia.....                                         | 0,397 „         |
| Kieselerde.....                                                   | 0,050 „         |
| Thonerde, mit einer Spur Eisenoxyd,<br>im Wasser als Silicat..... | 0,010 „         |
| Harzigen Extractivstoff.....                                      | 0,020 „         |
| In Wasser löslichen Extractivstoff..                              | 0,215 „         |
| Stickstoffhaltige organische Materie.                             | 0,040 „         |
| <hr/>                                                             |                 |
| Summa 3,059 Gran                                                  |                 |
| <hr/>                                                             |                 |
| Schwefelwasserstoff.....                                          | 0,309 Kubikzoll |
| Kohlensäure.....                                                  | 0,516 „         |



## Allgemeiner Anzeiger.

### I. Anzeiger der Vereinszeitung.

#### Notizen aus der Generalcorrespondenz des Directoriums.

Hr. Vicedirector Dr. Bley: Ueber die nächste Generalversammlung und über Angelegenheiten seines Vicedirectoriums — Die Herren Kreisdirectoren Dr. Voget und Gressler: Lesezirkel in ihren Kreisen betreffend. — Hr. Kreisdirector Schmedding: Ueber die in Münster zu haltende Kreisversammlung und Erweiterung dieses Kreises. — Hr. Kreisdir. Wackeroder in Burgdorf: Beitritt neuer Mitglieder und über Verkauf der auscirculirten Journale. — Hr. Apotheker Löfflein in Coburg: Meldung neuer Mitglieder für den Kreis Münden und über den süddeutschen und fränkischen Verein. Hr. Vicedirector Müller in Medebach: Ueber Sendungen des Archivs. — Hr. Apotheker Becker in Essen: Ueber Verbrüderung des Vereins und über die Zweckmäßigkeit der Kreisversammlungen. — Hr. Assessor Aschoff: Ueber die zu haltende Kreisversammlung in Bielefeld. — Hr. Vicedirector Boll: Ueber die in Freienwalde zu haltende Versammlung der Mitglieder des dortigen Vicedirectoriums. — Hr. Director Overbeck: Ueber Angelegenheiten mit der Thurn- und Taxischen Post, und über den Verkauf alter Journale. — Hr. Kreisdirector Lipowitz: Ueber den Beitrag der Lehrlinge zur Gehaltsunterstützungskasse. — Hr. Kreisdirector Giseke: Die Bildung eines neuen Kreises in Naumburg und Umgegend betreffend. — Hr. Apotheker v. Gimborn in Emmerich: Das Archiv betreffend. — Hr. Vicedirector Dr. Meurer in Dresden: Ueber die Angelegenheiten mit dem königl. sächs. Oberpostamt, wegen Portovergünstigung. — Hr. Vicedirector Dr. Fiedler: Ueber die dortige Kreiseintheilung. — Hr. Dr. Winkler: Ueber den Apothekerverein im Großherzogthum Darmstadt. — Hr. Kreisdirector Upmann: Erweiterung des Kreises Osnabrück.

Dankschreiben für die Ehrenmitgliedschaft des Vereins eingegangen: von Hrn. Geh. Rath Dr. Merbach in Dresden.

Unterstützungsgesuch von Hrn. Apotheker Hartmann in Stralsund. Dankschreiben für erhaltene Unterstützung von Hr. Apotheker Möhring in Wernigerode.

Beiträge zum Archiv gingen ein: von Hrn. Vicedirector Dr. Bley; von Hrn. Professor Fleischl in Wien; von Hrn. Apotheker Fränzel in Erfurt; von Hrn. Prof. Bart. Biasoletti in Triest; von Hrn. Kreisdirector Lipowitz; von Hrn. Apotheker Valsmer in Barenburg; von Hrn. Dr. Geiseler in Königsberg in der Neumark.

#### Versammlung im Vicedirectorium Bernburg.

Die diesjährige Versammlung der Mitglieder des Vicedirectoriums Bernburg, in welcher zugleich wegen des neuen Kreises



essau Berathung gehalten werden soll, wird Umstände hal- und weil einige Hoffnung vorhanden, alsdann unsern ver- n Oberdirector bei uns zu sehen, bis zur Mitte Septembers setzt. Die geehrten Herren Mitglieder werden von der Be- sung des Tages später näher in Kenntniß gesetzt werden.  
Dr. Bley.

### Zeige, über die diesjährige Kreisversammlung in Münster.

Auf den Wunsch mehrerer Mitglieder wird eine Kreisversamm- hieselbst statt finden, zu welcher nicht nur die sämt- n Mitglieder des hiesigen Kreises, sondern auch die be- harter Kreise freundlichst eingeladen werden. Es wird mir ehm sein, wenn Auswärtige, die uns mit ihrem Besuch reuen gedenken, zuvor darüber mir gütigst Nachricht ge- vollen. Die Versammlung wird am Morgen des 6. Juli statt e; das Nähere darüber ist bei den hiesigen Herren Mitglie- wie bei mir jederzeit zu erfragen.  
Münster, den 16. Mai 1840.

Dr. Schmedding,  
Kreisdirector des Vereins.

### Handelsnotizen.

Amsterdam, den 21. April. Roher Zucker bleibt im Preise; der letzten Zufuhr aus Surinam sind 300 F. zu  $26\frac{1}{2}$  —  $27\frac{1}{2}$  fl. ruft.

- Anfangs Mai. Die diesjährige Zufuhr von Surinam-Kaffee icht so gut wie die vorigjährige. Raff. Zucker viel Absatz, Melis 36 — 38 fl. Lumpen 33 — 35 fl. Syrup  $17\frac{1}{2}$  — 18 fl. . Reis  $13\frac{1}{2}$  fl., hier geschälter 12 —  $14\frac{1}{2}$  fl., geschälter ostind.  $11\frac{1}{2}$  fl., geschälter Tafelreis  $12\frac{1}{2}$  fl. Zante - Corinthen 25 fl. th-Rosinen  $8\frac{1}{2}$  Cs. Nelken 68 Cs. Macis und Muskatnüsse Umsatz. Banca-Zinn  $46\frac{1}{2}$  fl.

Amsterdam, Ende Aprils. Die Nachrichten über den Fischfang osfoden sind nicht sehr günstig, in Folge des schlechten ers. Brauner Leberthran kürzlich noch zu 12 Sps. gekauft zu 15 — 16 Sps. ausgestellt.

Bremen, den 1. Mai. Aus dem mittelländ. Meer sind uns e Zufuhren eingetroffen, dagegen brachten die Schiffe aus ika wenig Drogen, weshalb manche Artikel noch immer reise bleiben, so Aloe, Cacao, Jalapa, Senega, Serpentaria, arille. Von Sternanis gehen die Vorräthe sehr zusammen st gesunde Waare schwer zu finden. Mit Kampher ist es da niemand die hohen Preise anlegen will, und man nur othwendige kauft, doch sind die Vorräthe klein und muß reis bei den geringsten Nachfragen mehr anziehen. Von rber blieben noch immer Zufuhren von frischer Waare nd man ist meist auf russische beschränkt. Die neueren nisse in China werden uns lehren, wie es mit diesem Ar- und überhaupt den chinesischen Waaren gehen wird. Ein t aus China hier angekommenes Schiff brachte uns 3928 n Thee in verschiedenen Packungen und Sorten mit, sowie ubben rohen Kampher. Schellak ist in allen Sorten billig.



*Elasticum* bleibt preishaltend, obgleich es nicht an Zufuhr fehlt; man hat dasselbe jetzt in grossen Rollen, woraus sich allelei Platten schneiden lassen.

*Hamburg, vom 1. bis letzten April 1. J.* wurden unter and. eingeführt: *Cacao* 487 Säcke, *Kaffee* 95,396 Säcke, 1151 Faß, 1116 Ballen, 5444 Kilogr. *Candis* 2693 Kisten, 21,421 Faß, *Canel* 50 Kisten, 21 Ballen. *Cassia lignea* 109 Ballen, 50 Pfd. *Cassiae flores* 3 Kisten. *Cochennille* 30 Fässer, 13 Seronen, 6 Ballen, 4 Säcke. *Corinten* 124 Both, 10 Carrotels, 8 Fässer. *Faß* 235 Trommel, 16 Fässer, 2 Packen, 2 Matt., 2 Körbe. *Faß* 9 Säcke. *Blauholz* 14,042 Stück, 48 Tons, 390 Quintal, 1 Ladung, 1 Pack, 443,388 Pfd. *Brasil* 8 Bund. *Farbehholz* 27 Fässer, 13,732 2 Parthien, 2430 Quintal, 8122 Kil., 36 Tons., 45,600 Pfd. *Holz* 2614 St., 9728 Pfd. *Indigo* 329 Kisten, 48 Seronen, 1 2 Colli. *Ingwer* 82 Säcke, 3996 Colli. *Kork* 308 Bund, 100 Quintal, 20 Ballen. *Kümmel* 203 Säcke, 10 Ballen, 9 Fässer. *Labdanum* 404 Kisten. *Macis* 3 Fässer, *Muskatnüsse* 10 Fässer. *Nelken* 164 Ballen, 5 Fässer, *Nelkenstengel* 83 Ballen. *Oel* 115 Fässer, 115 Kisten, 68 Gal., 70 Pip., 4 Both, 6 Oxhoft, 13 Packen. *Pfeffer* 4062 Säcke, 2818 Ballen, 1 Fafs. *Propfen* 823 15 Säcke. *Piment* 611 Säcke, 129 Ballen. *Pomeranzen* 15 S. *Pottasche* 109 Fässer, 9 Geb. *Quercitron* 54 Oxh., 20 Fässer. 4609 Säcke, 1289 Tonn., 55 Ballen, 1 Kiste, 183 Tiercen. *Rosen* 3774 Fässer, 55 Kisten. *Rum* 382 Punch., 699 Pip., 51 F. 3 Oxh., 24 Gb., 6 Colli, 1 Kiste. *Sago* 1 Kiste. *Salpeter* 373 Säcke, 373 Fäss. *Schellack* 1048 Kist., 1 Sack. *Schmack* 727 St. 203 Ball. *Syrup* 148 Punch., 168 Fäss., 4 Geb., 2 Kisten. 355 Geb., 99 St., 203 Fässer, 110 Pip., 1 Kiste. *Thee* 612 K. 6 Packen. *Wachs* 9 Säcke, 43 Packen, 3 Körbe, 8 Bund, 19 Ser., 7 Colli, 14 Ballen, 28 St., 11 Kisten. *Zucker*, ostind. 1 Säcke, *Brasil*. 2613 Kisten, 522 Fässer, *Havanna* 17,240 Kil. 618 Fässer, *Amerika*, *England*, *Frankreich*, *Belgien* u. s. w. 1 Fässer, 1,412,617 Kilogrm., 345 Kisten, 153 Canaster, 22 K. 721 Brode, 4 Parthien.

— *Blanker und Leberthran* vermehrte Beachtung. *Bor* *Nelken* 11 fs. *Pfeffer* 4 fs. *Piment* 3½ fs. *Corinten* 36 Mk. *Sap* *Rosinen* 13½ Mk. *Süße Mandeln* gefragt, *bittere* nicht.

— *den 24. April.* An *Messina-Baumöl* wurden 20,000 H. 32 Mk. begeben. *Java-Reis* 6000 Säcke 8 — 9½ Mk.

— *Ende April.* *Malaga-Baumöl* wird zu 31 Mk. angetan. *Leberthran* bleibt begehrt, und wurde mehres von dem angetroffenen *Newfoundl.* zu 38 — 42 Mk. genommen.

— *Anfangs Mai.* Die Zufuhren an *Kaffee* in den letzten Monaten betrugen circa 19 Mill. Pfd. gegen circa 18½ Mill. Pfd. in dem entsprechenden Zeitraum von 1839. Es sind circa 300,000 Pfd. *Campeche-Blauholz* von *Tabasco* und 100,000 Pfd. von *New York* eingetroffen. An *Pfeffer* wurden 1600 Säcke zugeführt. Die engl. Preise von *Thee* haben bei uns noch keinen Einfluss, der Verkauf ist schleppend.

*Leipzig, Anfangs Mai.* *Leinöl* 11½ Thlr. *Mohnöl* 21 Thlr. *Baumöl* 19½ Thlr.

*London.* Der *Theevorrath* bestand am 1. Mai aus 35,472,611 Pfd.

— *Ende April.* In *Zucker* lebhafter Umsatz. *Standard* *Le* *pen* sind auf 83 sh., *Schmelzlumpen* auf 80 sh. gestiegen.

— *Anfangs Mai.* In den *Dünen* ist das Schiff *Anna* von

Domingo (Westindien) angekommen mit einer Fracht von 1000 Tonnen Schwefel, welcher ganz Erzeugniß der Insel ist. Schwefelgruben dieser Insel stellen sich als unerschöpflich dar und wird dieser Schwefel unserer westindischen Besitzung Südamerika sehr gesucht.

London, den 1. Mai. Die braunen und gelben westind. Zucker sind gestiegen. Kaffee, rein schmeckender, behauptet sich im Preise. Der Vorrath an Kaffee ist um die Hälfte geringer als im vorigen Jahre. Cochenille ist im Preise gestiegen um 2 d., die Honduras fanden rasche Abnahme, schwarze ord. Qual. 8 sh. 8 d. — 6 sh., gute feine 6 sh. 10 d. — 7 sh. 2 d., farbene geringe 4 sh. 9 d., gute 6 sh. Cassia lignea in 78 sh., für grobe Mittelwaare 88 — 90 sh., für dünne. Malabar - Pfeffer 4 — 4½ d. Malabar - Ingwer 15 — 17 sh. in guter Qualität 26 — 27 sh., geringere Waare 25 — 26 d.; unter 25 sh. ist keine trockne Waare zu haben.

Antwerpen, Anfangs Mai. Unser Vorrath an Mohnöl ist gering, da in Brabant die Preise so gestiegen sind, daßs von dort nichts zu beziehen ist, so wird es auch bei uns steigen.

Venedig, den 8. April. Schwefel ist jetzt hier um 4 — 5 T. billiger. Essenzen sind jetzt zu haben: Bergamotte Citronen 9½ T., Orange 9 T. Von süßen Mandeln ist wenig geblieben, von bitteren dagegen noch viel vorhanden.

Amsterdam, den 16. April. Heute kamen 484 Fässer Surinam-ickrie-Zucker in Auction und wurden zu 24 — 28½ fl. ft. In England geschälter Carol. Reis 15 fl., Tafelreis 13 fl. Java-Reis 9 — 11 fl., ord. 8 — 9 fl. Pfeffer 24½ Cs., 68 Cs., Cassia lignea 50 Cs., Muskatnüsse 210 Cs.

Triest, Anfangs Mai. Rüöl und Rappsöl wird höher bezahlt pt. und Oct. 10½ Thlr. Leinöl 9¾ — 9½ Thlr. Baumöl, Gallipoli 17½ — 17¾ Thlr. Malaga 16¾ Thlr. unversteuert. der Berger Leberthran 21½ — 22 Thlr.

Gallipoli-Baumöl auf 18 Thlr. unverst. erhöht, dagegen Malaga, um aus dem Schiff damit zu räumen, zu 16½ Thlr. t. erlassen. Palmöl 13½ — 13¾ Thlr. Südsee-Thran 9½ Thlr. Leberthran 21 — 21½ Thlr.; augenblicklich nichts davon ankam.

### Miscellen.

über die im Handel vorkommenden Spermaceti-Lichter;

von

Dr. Biasoletto in Triest.

Der vermehrte Gebrauch der Spermaceti-Lichter hat auch den Handel damit lebhafter gemacht, so daßs man in Triest oft viele Sendungen davon anlangen sieht. Da diese Lichter viel theurer sind als Wachslichter, so vermuthete Jemand noch fremden Zusatz darin, und bat mich daher, diese zu untersuchen.

Eine dieser Spermaceti-Lichtkerzen wog 6½ Loth, sie war durchscheinend, von schönem Perlmutterglanz, von einer festen Consistenz als ein Wachslight, und wenn man sie auch

lange in den Händen hielt, wurden die Finger nicht davon beschmutzt. Es wurde etwas von der Kerze abgeschabt, die Spalten waren sehr weifs, ohne Geruch und Geschmack, zwischen den Fingern, bei einer Temp. von  $12^{\circ}\text{R.}$ , liefsen sie sich zu Pulver zerreiben, ohne eine Spur von Fett zu hinterlassen. Mit einigen Tropfen Spiritus von  $36^{\circ}\text{B.}$  liefs sich diese Substanz in einem Mörser zu Pulver zerreiben, durch einen gröfseren Zusatz von Spiritus hielt man ein milchiges Fluidum, liefs man den Spiritus an der Luft verdunsten, so blieb ein pulvriger Rückstand, den man von dem Gegenstande, auf welchem er sich befand, wie von Wolle oder Seide, völlig wegputzen konnte, ohne dafs ein Fleck blieb. In Aether löste sich diese Substanz völlig auf. Sie schmolz in gelinder Wärme und krystallisirte nach Erkalten zu einer harten wie Kampher aussehenden Masse. In verdünnter Salpetersäure löste sie sich bei gelinder Wärme auf, in concentrirter schon in der Kälte, und wurde durch Wasser aus dieser Auflösung wieder gefällt. Mit kaustischem Kalium oder Natron bildet sie eine feste zerreibliche Seife, die mit Wasser eine trübe Lösung giebt. Mit Ammoniakflüssigkeit giebt sie eine Emulsion. In ätherischen und fetten Oelen löst sich diese Substanz auf.

Das Brennen der Kerze geschah mit einer hellen und schärferen Flamme als Wachslichter geben, ohne die gewöhnliche Dochtkohle zu bilden, und ohne abzufliefsen.

Aus vorstehender Prüfung ergibt sich, dafs die in Untersuchung stehenden Spermacetilichter reines Spermaceti enthalten. Das Spermaceti der Lichter scheint selbst reiner zu seyn als das im Handel befindliche.

### Anwendung des Ultramarins;

von

*Michal in Schweinfurt.*

#### *Bläuen der Leinen-, Seiden- und Baumwollen-Waaren mit dem Ultramarin.*

Wenn die zu bläuenden Gewebe keiner Appretur mehr bedürfen, so thut man die Farbe in einen leinenen oder baumwollenen Beutel, den man fortwährend im Wasser zwischen den Händen reibt, so dafs die Bläue gezwungen ist, durch das Gewebe zu dringen. Das Gewebe wird in dieses Wasser, welches jedoch vor dem Gebrauche in Bewegung halten mufs, getaucht und dann zusammengerollt.

Im Falle man unappretirtes Gewebe färbt, verfährt man oben, fügt das Kraftmehl hinzu und rührt während des Siebens. Der Ultramarin besitzt die Eigenschaft, beim Kochen mit Lösungen von Pottasche oder kaustischer Soda keiner nachtheiligen Veränderungen unterworfen zu werden.

#### *Bläuen des Papiers mit Ultramarin.*

Ein vierjähriger Gebrauch des Ultramarins, besonders in den Papierfabriken Frankreichs und Englands, hat alle Bedingungen kennen gelehrt, welche zur Erzeugung des schönen blauen durch Ultramarin erforderlich sind.

Die wesentlichsten sind folgende:

Will man einen Holländer Briefpapier, enthaltend 60



trockne Masse, bläuen, so wiegt man 8 — 12 Loth Ultramarin ab, welche man in einen leinenen oder baumwollenen Beutel bindet, in den Holländer hängt, und während die Cybellen in Bewegung sind, so lange unter Wasser drückt, bis der Beutel von Ultramarin leer geworden ist. Das Wasser wird durch die fortwährende Bewegung gleichförmig schön und nach kurzer Zeit der Papierteig ebenfalls azurblau.

Wenn das angewandte Wasser kalihaltig ist, so ist es nöthig, zur Befestigung des Ultramarins, auf den Holländer  $\frac{1}{2}$  Pfd. Wasser aufgelösten Alaun zuzusetzen, ist der Kaligehalt des Wassers bedeutend, so kann man die Quantität Alaun bis zu 1 Pfd. steigern. Bei einigen kleinen Versuchen ist es nicht nöthig, die Quantität Alaun, welche zum Wasser paßt, auszumessen, um für immer sicher zu stellen.

Soll das Papier nicht geleimt werden, so bleibt nichts mehr übrig, im andern Falle aber ist Aufmerksamkeit durchzuführen erforderlich. Man hat nämlich beim Leimen die Gewohnheit, Alaun zuzusetzen, wodurch der Leim allerdings besser wird; setzt man aber zu viel Alaun, so wird der Ultramarin durch die saure Eigenschaft jenes Salzes, wie durch Säuren zerstört, wegen bei einem richtigen Verhältniß durchaus keine Verfälschung des Ultramarins statt hat.

Man muß also zur Erhaltung der Schönheit des gebläuten Papiers nicht zu viel und zwar nur so viel Alaun dem Leim zusetzen, als zur Bemerkung erforderlich ist, daß gar kein Unterschied in der Schönheit zwischen dem ungeleimten Papier und dem geleimten ist. Die Büttlenleimung hat den Vortheil, dadurch niemals dem schönen Ultramarinblau geschadet wird, man hat hierbei nur allein zu berücksichtigen, daß die angewandte Harzseife gut bereitet sei und dieselbe durch den Leim nicht zersetzt werde (was übrigens selten ist), weil im andern Falle das Papier Flecken bekommt, die blauer als die übrigen Theile des Papiers sind.

Die Anwendung des Ultramarins hat gegen das Kobaltblau viele Vortheile, wovon einige wesentliche zu berücksichtigen sind.

Das Papier wird schöner blau, das Blatt wird auf beiden Seiten gleichförmiger blau, und ist der Ultramarin im Verhältniß zweimal billiger als Kobaltblau.

### Verkaufsanzeige.

Der Unterzeichnete empfiehlt den Herren Collegen sein von ihm fabricirtes haltbares und luftdicht schließendes, weiches *Druckzeug* zum Tectiren der Gefäße in Kellern etc., welches sich zugleich durch Glanz und hübsches Aeussere als Druck der Gefäße in Bezug auf Reinlichkeit auszeichnet. Der Preis für circa vier Quadratfuß ist 10 Sgr. oder 8 Ggr. Briefe und Gelder werden franco erbeten, worauf die Uebersendung der Berechnung der Emballage schleunigst statt finden soll.  
Im Mai 1840.

A. Lipowitz,  
Apoth. zu Lissa im Großh. Posen.

## II. Anzeiger der Verlagshandlung.

Leipzig. Von der Hahn'schen Verlagsbuchhandlung ist durch alle Buchhandlungen (in Hannover durch die Hahn'sche Hofbuchhandlung) zu beziehen:

**Roth, D. A. G., Manuale botanicum peregrinationibus botanicis accommodatum; sive prodromus enumerationis plant. phaenogam. in Germania sponte nascentium.** 3 Tomi. In Taschenformat. 4 Thle.

Das obige botanische Handbuch des verdienten Hrn. Verfassers ist als zweckmässig längst anerkannt, und kann zum Studium der Botanik im Allgemeinen, so wie vorzüglich auch zum Gebrauch beim Botanisiren und auf Reisen mit Recht empfohlen werden.

Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung in Hannover ist so eben erschienen und damit der Cyclus der »waterländische Mäßigkeits-Schriften«, welche sich auf sämtliche Staaten Norddeutschlands beziehen und durch reichhaltige statistische Mittheilungen über jedes einzelne Land die Größe und die verderblichen Folgen des Branntwein-Genusses anschaulich darstellen, beendet.

**Der Patriot.** Eine vorurtheilssfreie und gründliche Untersuchung über die Mäßigkeits-Angelegenheit. Allen gebildeten Bürgern Norddeutschlands, welche Sinn und Herz haben für Waterlandswohl, gewidmet vom

**Pastor Böttcher,**

zu Immen bei Alfeld im Königl. Hannover.  
gr. 8. 1840. 6 Bogen, geheftet. 5 Ggr.

Von demselben Herrn Verfasser sind bereits früher daselbst erschienen:

**Das Hauskreuz, oder: Was vom Branntweintrinken zu halten sei?** Kurz und erbaulich zusammengefasst ein Gespräch, so auf einem Dorfe in unserm Lande vorigen Winter wirklich gehalten ist. Zur Lehr und Warnung für Jung und Alt, für Reich und Arm, und zu Ruh und Frommen Jedermann an's Licht gestellt. **Zehnte Auflage.** gr. 8. 1840. 5 Bogen. geh. 3 Ggr.

**Das Mäßigkeits-Handbuch, oder: Ueber den Branntwein-Genuss, dessen Größe, Ursachen, Folgen und Heilung.** Ein Handbuch für Vorsteher und Freunde der Mäßigkeits-Gesellschaften. gr. 8. 1839. geh. 16 Ggr.

Das »Mäßigkeits-Handbuch« behandelt die Angelegenheit vollständig und umfassend und ist für Prediger, Beamte, Lehrer und für Alle bestimmt, welche für diese wichtige Sache in ihrer Kreise thätig sein und auf die Errichtung eines Vereins hinwirken wollen. Die beiden anderen Schriften sind kürzere Abhandlungen über denselben Gegenstand. Der »Patriot« ist zunächst für die gebildeten höheren Stände, das »Hauskreuz« aber vorzugeweise für die übrigen Volksklassen bestimmt und zur allgemeinsten Verbreitung und Vertheilung geeignet.

Bei Bestellungen größerer Parthien finden bedeutende Preis-Ermäßigungen statt.





Archiv und Zeitung  
des  
**APOTHEKER-VEREINS**  
in  
Norddeutschland.

---

Herausgegeben  
von  
Rudolph Brandes und Heinrich Wackendorf.

---

**Dritter Band**  
im  
*Vereinsjahr der Jussieu's.*

---

Hannover.  
Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung.  
**1840.**

**ARCHIV**  
der  
**PHARMACIE,**  
eine Zeitschrift  
des  
Apotheker - Vereins in Norddeutschland.

Zweite Reihe. XXIII. Band.  
Der ganzen Folge LXXIII. Band.

Herausgegeben

unter Mitwirkung der HH. *Bley, Duflos, Frenzel, Geiseler, Giseke, Jäger, Hansmann, Herzog, Jahn, Jonas, Krug, Lipowitz, Lohmann, Mabeck, Pleischl, Pöhlmann, Rabenhorst, Richter, Sasse, Schmedding, Schlothane, Stratingh, v. Tilesius, Venghaus, Vogel*

von

**Rudolph Brandes und Heinrich Wackenroder.**



---

**Hannover.**

Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung.

**1840.**



# Inhaltsanzeige.

## Erstes Heft.

### Erste Abtheilung.

#### Vereinszeitung.

1) *Vereinsangelegenheiten.* Directorialconferenz zu Salzuflen  
12. Mai 1840 S. 1. — Directorialconferenz zu Herford am 18.  
1840 1. — Generalversammlung des Vereins 2. — Eintritt neuer  
Mitglieder 3. — Generalkasse 3. — Anzeige, über die diesjährige  
Generalversammlung in Münster 4. — Versammlung der Kreise Gotha  
und Meiningen 4. — Versammlung im Vicedirectorium Bernburg 4.  
Anzeige 4. — Grundsätze des Apothekervereins in Nord-  
deutschland 5.

### Zweite Abtheilung.

#### Chemie.

Seite

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| über die Zersetzung der Benzoesäure durch Chlor und Brom;<br>von Dr. C. Herzög .....                      | 15 |
| Ursache über das Helenin; von Carl Gerhardt.....                                                          | 18 |
| sondere Esflorescenz des doppelt-schwefelsauren Kali; vom<br>Hofrath Professor Dr. Pleischl in Wien ..... | 29 |
| über Kobalttinten; vom Professor Stratingh in Gröningen                                                   | 31 |
| über Pelouze's grüne Verbindung des Cyans mit Eisen;<br>von L. Jonas, Apotheker in Eilenburg .....        | 33 |
| ne einfache Methode, Schwefel in Pflanzen nachzuweisen;<br>von Chr. Hansmann.....                         | 34 |
| neige Erfahrungen über Darstellung der Aepfelsäure; von<br>Dr. Bley.....                                  | 36 |
| merkung zur Nomenklatur einiger chemischen Stoffe.....                                                    | 36 |

### Dritte Abtheilung.

#### Physiologie und Toxikologie.

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ysiologisch-toxikologische Untersuchungen über das Coniin;<br>von Dr. A. Ch. A. Pöhlmann .....                  | 38 |
| opfervergiftung vermittelst Käse und gute Wirkung des Ei-<br>weißes dagegen; von Dr. Schlothane in Driburg..... | 57 |
| tersuchung von Oblaten, die mit Mennig gefärbt sind; von<br>A. Lipowitz, Apotheker zu Lissa.....                | 59 |
| merkungen über die Charactere der Arsenikvergiftung.....                                                        | 60 |
| über die Auffindung des Arsens bei Vergiftungsvorfällen;<br>von Orfila.....                                     | 62 |
| irksamkeit des Eisenoxydhydrats gegen Arsenikvergiftung                                                         | 68 |
| obachtung über die gegenseitige Einwirkung der Arsenicht-<br>säure und der Eisenoxyde; von Guibourt.....        | 69 |

### Vierte Abtheilung.

#### Literatur.

|                 |    |
|-----------------|----|
| ecensionen..... | 81 |
|-----------------|----|

### Fünfte Abtheilung.

#### Therapie.

|                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| merkungen über einige russische Volksarzneimittel; vom<br>Hofrath und Professor v. Tilesius in Leipzig..... | 101 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|



## Sechste Abtheilung.

### Allgemeiner Anzeiger.

*Anzeiger der Vereinszeitung.* Notizen aus der Generalcorrespondenz des Directoriums S. 117. — Generalversammlung des Vereins 117. — Versammlung im Vicedirectorium Bernburg 118. Aufruf und Bitte 118. — Handelsnotizen 118. — Blutegel 120. Berg- und Hüttenbetrieb 120. — Miscellen: Ueber die Conservation des Fleisches; von Legrip, Apotheker zu Chambon 120. — Ueber Leinölfirnis und dessen beste Bereitungsart mittelst Essig; von J. Liebig 121. — Copalfirnis 122. — Thonseife 122. — Dunn's Verbesserung im Seifensieden 123. — Ueber die Nutzung des als Nebenproduct häufig vorkommenden schwefelsauren Bleies 123. — Maschinenschmiere 123. — Darstellung künstlicher Rubine 124. — Emaillirung eiserner Gefäße; von Flach 124. — Ueber das Dämpfen des Nutzholzes; vom Prof. Brecht 126. — Goodwin's künstliches Brennmaterial 126. — Die gesuchte 126. — Apothekenverkauf 126.

### Zweites Heft.

## Erste Abtheilung.

### Vereinszeitung.

1) *Vereinsangelegenheiten.* Hohes Wohlwollen für den Verein. (Fortsetzung von S. 122 Bd. XXII. 2. R. des Archivs) S. 127. Portovergünstigung des Vereins im Königreich Sachsen 128. Generalversammlung des Vereins 129. — Eintritt neuer Mitglieder 129. — Bildung eines neuen Kreises 130. — Verschiedene Nachrichten 130.

2) *Medicinalwesen und Medicinalpolizei.* Ueber das Verhältniß der Apothekergehülfen; von Dr. Geiseler, Apotheker zu Köpenick in der Neumark S. 131.

3) *Gelehrte Gesellschaften und Anstalten.* Akademie der Wissenschaften in Berlin S. 148. — Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin 148. — Der naturwissenschaftliche Verein im Neumarkischen Kreise, Großherzogthum Weimar 148. — Der botanische Garten in Kiew 149.

4) *Personalnotizen* S. 150.

## Zweite Abtheilung.

### Chemie.

Ueber den Einfluß des Kalks bei der Darstellung des Zuckers; von J. H. F. Lohmann.....  
Bemerkungen über Kürbis- und Runkelrübenzucker; von Dr. Bley.....  
Zur Kenntniß des Alcornin; von Carl Frenzel in Erfurt.....  
Bemerkung über die Darstellung des Jodkalium-Quecksilberjodids; von Rudolph Brandes u. Gustav Böhm.....

## Dritte Abtheilung.

### Centralbericht.

Ueber das Salicin.....  
Ueber das Phloridzin.....

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| die Beziehungen zwischen Phloridzin und Salicin und ihre Zusammensetzung..... | 199 |
| die Bestandtheile von <i>Chelidonium majus</i> .....                          | 202 |
| Stellung des Solanins.....                                                    | 209 |
| zur chemischen Kenntniss des Chinins.....                                     | 210 |
| Versuche über den schwarzen und weissen Senf.....                             | 210 |
| den Amygdalingehalt der Pfirsich- und Kirschkerne.....                        | 212 |
| <i>Fermentoleum Vitis viniferae</i> und Weinbouquet.....                      | 212 |
| Essigsäure.....                                                               | 213 |
| Stellung der Benzoessäure.....                                                | 214 |
| des Pectins.....                                                              | 215 |
| Theorie der Essigbildung.....                                                 | 215 |
| graphische Darstellung des Essigäthers.....                                   | 218 |
| Stellung von reinem Salpeteräther.....                                        | 218 |
| Stellung des Essigäthers.....                                                 | 219 |
| Stellung der Oele.....                                                        | 219 |
| neue Untersuchung der Sprossen des Hopfens.....                               | 220 |

### Vierte Abtheilung.

#### Therapie und Arzneiformeln.

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Beachtungen über die Syrupe; von Gulbourn.....                                          | 220 |
| die Bereitung des Syrup. <i>Violarum</i> ; vom Apotheker Ed. Guéranger zu Mans.....     | 224 |
| <i>Conii</i> .....                                                                      | 225 |
| die Reinigung des Honigs; von Dr. Geiseler, Apotheker zu Königsberg in der Neumark..... | 226 |
| einige in der Wallachei gebräuchliche Volksmittel.....                                  | 228 |

### Fünfte Abtheilung.

#### Allgemeiner Anzeiger.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzeiger der Vereinszeitung. Notizen aus der Generalcorrespondenz des Directoriums S. 231. — Anzeige für die Herren Mitglieder des Vicedirectoriums Weimar 232. — Versammlung im Direct. Bernburg 232. — Berichtigung 232. — Handelsnotizen — Miscellen. Theepflanzungen in Assam 235. — Notiz über <i>gunum tinctorium</i> ; von Dr. Reufs 235. — Berg- und Hüttenwesen 236. — Topase von auferordentlicher Grösse 236. — Ueber Nachtheile des Nafsmachens der Steinkohlen; von Groß 236. — Argentan mit Silber zu plattiren 237. — Pharmaceutisches Institut in Jena 237. — Pharmaceutisches Institut in Dresden 237. — Kauf- und Verkaufsanzeigen 237. — Dienstgesuche 237. — Anzeiger der Verlagshandlung S. 238. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Drittes Heft.

#### Erste Abtheilung.

##### Vereinszeitung.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vereinsangelegenheiten. Kreisversammlung in Bielefeld am 1810 S. 239. — Bericht über die Kreisversammlung zu Münster am 6. Juli 1840 241. — An die Kreisversammlung in Münster — Bericht über die Versammlung des Luckauer Kreises, gehalten zu Luckau den 13. Juli. 247. — Bericht über die Jussieu'sche Versammlung des Mansfelder Kreises 249. — Eintritt neuer Mit- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

glieder 250. — Ehrenmitglieder 251. — Bitte um Hülfe 251.  
klärung 252.

2) *Medicinalwesen und Medicinalpolizei.* Ueber Ha-  
gungsmittel von L. Rabenhorst S. 252. — Zahl der A-  
Frankreich 253. — Nachweis indischer Medicinalpolizei  
als zwei Jahrtausenden, von Dr. Julius 253.

## Zweite Abtheilung.

### Physik.

Ueber die Anfertigung der Magnete; von Dr. Geiseler.  
Versuch über ein Verfahren, um auf dem Wege der Rechn-  
schnell auszumitteln, in welchem Grade man eine Flüss-  
keit von zu großem spec. Gew. noch verdünnen m-  
um ihr ein vorgeschriebenes spec. Gew. zu ertheilen;  
Georg Krug.....

## Dritte Abtheilung.

### Chemie.

Ueber den Wassergehalt der krystallisirten Citronensäure;  
H. Wackenroder.....  
Ueber das Guajakholz und die darin vermuthete Benzoesä-  
von Franz Jahn in Meiningen .....  
Ueber die Producte der Einwirkung der Salpetersäure  
Aloe; von A. Boutin.....  
Bemerkung über die ätherischen Oele des Senfs und Rai-  
von Boutin und Fremy.....  
Pharmaceutisch-chemische Notizen; von A. Duflos.....  
Ueber schwefelsaures Kali-Eisenoxyd; von W. Richter.  
Ueber die Umwandlung d. Calomels in Aetzsublimat; von Mia-

## Vierte Abtheilung.

### Mineralwässer.

Chemische Untersuchung einiger Salzquellen; von Dr. N. G-  
ger in Mühlhausen .....  
Vorschläge zur Darstellung nachgebildeter Mineralwässer,  
mentlich einiger Thermen; vom Ap. Venghaus in Rab-  
Künstliche Mineralwässer.....

## Fünfte Abtheilung.

### Naturgeschichte und Pharmakognosi

Ueber die in der Keuperformation beim Dorfe Kutzleben (pro-  
Regierungsbezirk Erfurt) vorkommende Kohle; von C-  
Frenzel in Erfurt.....  
Ueber das Vorkommen des kohlensauren Natrons als Ausblüh-  
an Mauern; von Chr. Hansmann zu Atens im Oldenbu-  
Bergtheer.....

## Sechste Abtheilung.

### Allgemeiner Anzeiger.

I. *Anzeiger der Vereinszeitung.* Notizen aus der Genera-  
pondenz des Directoriums S. 342. — Handelsnotizen 342.  
cellen. Ueber Platingefäße 346. — Methode der Stärkesfabrik-  
Kartoffeln; von Völcker 347. — Bemerkung über den Düng-  
— Pharmaceutisches Institut in Dresden 349. — Anzeigen.  
von Schmetterlingen 349. — Apothekenverkauf 349.

II. *Anzeiger der Verlagshandlung* S. 350.



7.

Vereinsjahr der Jussieu's.

1840.

J u l i.

**ARCHIV**  
**DER PHARMACIE,**  
**eine Zeitschrift**  
des  
Apotheker-Vereins in Norddeutschland.

zweite Reihe. Dreiundzwanzigsten Bandes erstes Heft.

Erste Abtheilung.

**Vereinszeitung,**  
redigirt vom Directorio des Vereins.

**1) Vereinsangelegenheiten.**

Directorialconferenz zu Salzuflen am 12. Mai 1840.

1) Die Revision der Statuten behufs der neuen Auflage ist fortgesetzt.

2) Damit die sämmtlichen Mitglieder des Vereins auf eine einfache und angemessene Weise in den Besitz der neuen Statuten gesetzt werden, sollen dieselben zugleich in der Vereinszeitung mit abgedruckt werden.

E. F. Aschoff. Brandes. Overbeck.

Directorialconferenz zu Herford am 18. Mai 1840.

1) Die Statuten wurden nochmals einer letzten Revision unterworfen, mit Berücksichtigung der von mehreren Seiten desfalls eingegangenen Vorschläge, und die nunmehrige Ausführung des Beschlusses beschlossen, mit Berücksichtigung des in der vorigen Directorialconferenz darüber Verhandelten.

2) Da das königl. sächs. hohe Ministerium der Finanzen auf die unterthänigste Eingabe und Bitte des Oberdirectors eine Portofreistellung für die Büchersendungen des Vereins, ähnlich wie

Arch. d. Pharm. II. Reihe. XXIII. Bds. 1. Hft.



im Bereich königl. preuss. Posten, zu bewilligen, hochgenehmigte Rücksicht genommen und das königl. sächs. Oberpostamt Leipzig deshalb mit dem Vicedirector des Vereins, Hrn. Dr. Meurer in Dresden, die nöthigen Vorkehrungen eingeleitet, so dass die deshalb von Hrn. Vicedirector Dr. Meurer eingeleiteten Acten in nähere Erwägung gezogen und die Resultate seiner Berathung dem Hrn. Vicedirector als Basis der weiteren handlung mitgetheilt. Hoffentlich werden unsere verehrten Collegen in Sachsen nun bald in dem Genuß dieser Vereine so wohlthätigen Vergünstigung sich befinden.

3) Ein Schreiben von Hrn. Dr. Schmedding, Kreisdirector des Vereins in Münster, wurde vorgelegt, mit der Nachricht einer am 6. Juli in Münster zu veranstaltenden Kreisversammlung. Diese Nachricht wurde mit erfreuender Theilnahme genommen. Mit Vergnügen benutzt das Directorium diese Gelegenheit, den verehrten Collegen des Kreises Münster für schönen und geregelten Gang des Vereins daselbst seine royalistische Hochachtung und Hrn. Dr. Schmedding seinen richtigsten Dank auszudrücken.

4) Ein Schreiben des Hrn. Apothekers Müller in Schönbach, des Vorstandes des im Erzgebirge seit längerer Zeit bestehenden besondern Vereins, wurde vorgelegt, in welchem dieser die Hoffnung äußert, daß jener Verein für die Forderung des unsrigen sich anschließen möchte, und daß auf der nächsten Versammlung des erzgebirgischen Vereins dieser Gegenstand wohl zur Sprache kommen würde. Das Directorium sieht diesen weitem Verhandlungen mit Interesse entgegen in dem zu hoffenden Anschluß dieser verehrten Collegen eine neue wichtige Erweiterung des Vereins.

5) Dem emerirten Apotheker Hrn. Hartmann in Stralsund wurde die nachgesuchte Unterstützung, Namens der Buch-Gehlen-Trommsdorff'schen Stiftung, pro 1840 bewilligt.

Der Oberdirector: Dr. R. Brandes.

Die Directoren: Dr. E. F. Aschoff. Overbeck. Wilk.

Die Assessoren: L. Aschoff. Faber.

### Generalversammlung des Vereins.

Die diesjährige Generalversammlung und Stiftungsfeier des Vereins wird nach Beschlufs des Directoriums in Leipzig gehalten werden, und zwar am 3. und 4. Sept. Es schließt sich mit das zweite Decennium der Anstalt ab. Die Wichtigkeit dieses Zeitabschnittes hat das Directorium vor allem dadurch an den Tag legen wollen, daß es denselben an den Namen Alexander v. Humboldt knüpfte, welcher Name die Versammlung und nächste Vereinsjahr schmücken wird. Die Mitglieder des Vereins, Freunde, Gönner und Ehrenmitglieder der Anstalt werden freilichst zu dieser Versammlung eingeladen. Alle, welche das Gedeihen des Instituts nützliche Vorschläge zu machen wünschen, werden ersucht, solche bei der Generalversammlung zu überreichen, namentlich bitten wir darum die Herren Kreisdirectoren insbesondere in Bezug ihrer Wünsche für die Literatur der Lesezirkel. Die Versammlung am 3. wird vorzugsweise der Stiftungsfeier des Vereins gewidmet, eine öffentliche sein,



1. eine private, zur Besprechung und Berathung innerer Angelegenheiten und besonderer pharmaceut. Verhältnisse.

Das Directorium des Vereins.

F. Aschoff. Brandes. Du Mênil. Wilken.  
Overbeck. Witting.

Die Assessoren: L. Aschoff. Faber.

### Eintritt neuer Mitglieder.

Hr. Apotheker Hentschell in Gefell ist, nach Anmeldung durch Hr. Kreisdirector Gressler, als wirkliches Mitglied des Vereins in den Kreis Saalfeld aufgenommen worden.

Desgl. Hr. Apotheker Deharde in Bodenburg, nach Anmeldung durch Hr. Kreisdirector Wackenroder, in den Kreis Hannover. Hr. Dr. Sertürner in Hameln ist in den Kreis Hannover wieder eingetreten.

Hr. Apotheker Krebs in Frankfurt a. d. Oder, früher Mitglied des Vereins im Kreise Osnabrück, ist, nach Anzeige von Hr. Vicedirector Bolle und Hr. Kreisdirector Strauch, in den Kreis Sonnenburg wieder eingetreten. Desgl. Hr. Apotheker Wittke in Neu-Ruppin, nach Anzeige von Hr. Kreisdirector Menzel, in den Kreis Ruppin.

Hr. Apotheker Gründler in Neustadt a. d. H. und Hr. Apotheker Müller in Königsberg (Herzogthum Coburg) sind, nach Anmeldung durch Hr. Hofapotheker Löhlein in Coburg durch Hr. Kreisdirector Jahn, in den Kreis Meiningen als wirkliche Mitglieder des Vereins aufgenommen worden.

Hr. Apotheker Sander in Hofgeismar ist, nach Anmeldung durch Hr. Vicedirector Dr. Fiedler in Cassel, als wirkliches Mitglied des Vereins in den Kreis Cassel aufgenommen worden. Desgl. Hr. Apotheker Hausleitner in Rawicz und Hr. Apotheker Schwetzke in Kozmin, nach Anmeldung durch Hr. Kreisdirector Lipowitz, in den Kreis Lissa.

Desgl. Hr. Apotheker Hartmann in Preuss. Oldendorf, nach Anmeldung durch Hr. Kreisdirector Faber, in den Kreis Minden.

Desgl. Hr. Apotheker Zuckeswerdt in Schmiedeberg und Hr. Apotheker Busse in Kamberg, nach Anmeldung durch Hr. Kreisdirector Jonas, in den Kreis Eilenburg.

Die Herren Apotheker Gading in Trebbin, Thieme in Wittenberg, Neumann in Belitz, Danneberg in Jüterbogk, sind durch Hr. Kreisdirector Jonas als wirkliche Mitglieder des Vereins angemeldet, und nach desfallsiger Benachrichtigung an Hr. Kreisdirector Dr. Erdmann in den Kreis Brandenburg aufgenommen worden.

Der Oberdirector des Vereins.  
Brandes.

### Generalkasse.

Abrechnungen von 1839 gingen ein: von Hr. Vicedirector Overbeck in Erfurt.

Abrechnungen von 1840 gingen ein: von Hr. Director Overbeck in Lemgo, für den Kreis Lippe; von Hr. Kreisdirector Wackenroder in Burgdorf, für den Kreis Hannover; von Hr. Vicedirector Dr. Bley in Bernburg.

Vorläufige Zahlungen an die Generalkasse für 1840 v  
übermacht: von Hrn. Vicedirector Bucholz in Erfur  
Hrn. Kreisdirector Giseke in Eisleben, Kreis Mansfeld  
Hrn. Vicedirector Fiedler in Cassel; von Hrn. Krei  
tor Lipowitz in Lissa; von Hrn. Kreisdirector We  
Schwelm; von Hrn. Vicedir. Dreykorn in Bürgel, Kre

Die Direction der Generalk

Dr. E. F. Aschoff.

Hölzerman

## Anzeige, über die diesjährige Kreisversamm in Münster.

Auf den Wunsch mehrerer Mitglieder wird eine Kreisve  
lung hieselbst statt finden, zu welcher nicht nur die  
lichen Mitglieder des hiesigen Kreises, sondern auch  
nachbarter Kreise freundlichst eingeladen werden. Es w  
angenehm sein, wenn Auswärtige, die uns mit ihrem  
zu erfreuen gedenken, zuvor darüber mir gütigst Nachri  
ben wollen. Die Versammlung wird am Morgen des 6. Ju  
finden; das Nähere darüber ist bei den hiesigen Herren  
dern wie bei mir jederzeit zu erfragen.

Münster, den 16. Mai 1840.

Dr. Schmeddin  
Kreisdirector des Ve

## Versammlung der Kreise Gotha und Meiningen

In Folge des Beschlusses der Versammlung zu Me  
im Sept. vorigen Jahrs soll die diesjährige Versammlu  
Kreise Gotha und Meiningen wieder in Meiningen abg  
werden. Sämmtliche Mitglieder dieser, wie der benac  
Kreise, sind zu dieser Versammlung, welche am 7. Sept  
Vormittags im Saale des Sächsischen Hofes zu Meiningen  
nen wird, freundlichst eingeladen. Diejenigen Herren C  
welche dieselbe zu besuchen gedenken, bitte ich bis 1  
Aug. mir darüber Nachricht zukommen zu lassen.

Gotha, den 10. Juni 1840.

Dr. Buche

## Versammlung im Vicedirectorium Bernburg

Die diesjährige Versammlung der Mitglieder des Vi  
toriums Bernburg, in welcher zugleich wegen des neue  
ses Dessau Berathung gehalten werden soll, wird Umstän  
ber, und weil einige Hoffnung vorhanden, alsdann unse  
ehrten Oberdirector bei uns zu sehen, bis zur Mitte Sept  
ausgesetzt. Die geehrten Herren Mitglieder werden von  
stimmung des Tages später näher in Kenntnifs gesetzt

Dr. Ble

## Anzeige.

Hr. Kreisdirector Schmithals hat, nach Verkauf  
Apotheke in Xanten, seinen Wohnsitz nach Wesel verleg  
ches wir den Herren Mitgliedern des Kreises Xanten hiert  
zeigen. Hr. College Schmithals, der seit der Begründu  
Vereins um die Anstalt so große Verdienste sich erworbe  
wird die fernere Verwaltung des Kreises gütigst fortführen,  
das Directorium seinen besten und anerkennenden Dank ab

# Grundsätze des Apothekervereins in Norddeutschland.

## Sechste Auflage.

### Cap. I.

#### Zwecke des Vereins.

##### §. 1.

Der erste Zweck des Vereins ist Vervollkommnung der theoretischen und praktischen Pharmacie und ihrer Hülfswissenschaften.

##### §. 2.

Der zweite Zweck des Vereins ist Verbesserung des Apothekers in seiner innern und äußern Stellung, so wie gegenseitige Erleichterung des Geschäftsbetriebes, und die Beförderung des gegenseitigen Nutzens bei merkantilischen Verhältnissen.

##### §. 3.

Der dritte Zweck des Vereins ist gegenseitige Unterstützung verschuldeten Unglücksfällen.

##### §. 4.

Der vierte Zweck des Vereins ist, würdige durch Alter oder Krankheit dienstunfähig gewordene mittellose Gehülfen zu unterstützen, so weit es die Kräfte gestatten.

### Cap. II.

#### Mittel zur Erreichung der im Cap. I. angegebenen Zwecke.

##### §. 5.

Zur Erreichung des ersten Zwecks dienen:  
die in allen Kreisen des Vereins eingerichteten *Lesezirkel*, die vorzüglich die der Pharmacie wichtigen Zeitschriften enthalten;  
die unter der Aufsicht eines Directors befindliche *Centralbibliothek*, welche durch Geschenke von Gelehrten, Mitgliedern und Ehrenmitgliedern gestiftet worden ist. Um die Bibliothek mit den neuen Werken zu vervollständigen, wird gewünscht, daß diejenigen Mitglieder des Vereins, die ein Werk im Druck herausgeben, nach dem Erscheinen desselben ein Exemplar davon an diese Bibliothek einsenden, und von Ehrenmitgliedern und anderen Gelehrten werden solche Beiträge dankbar entgegengenommen. Ein Exemplar von den in dem Kreise, worin diese Bibliothek sich befindet, circulirt habenden Zeitschriften, wird gleichfalls derselben einverleibt. Der Bestand der Bibliothek wird von Zeit zu Zeit in der Vereinszeitung angezeigt, und es stehen jedem Mitgliede gegen einen an den Director einzusendenden Schein die Bücher leihbar zu Gebote;  
das *Museum* des Vereins, zu dessen Vermehrung die Beiträge der Mitglieder dankbar entgegengenommen werden;  
das *Archiv*, als die Zeitschrift des Vereins, welche bestimmt ist, die wissenschaftlichen Arbeiten und Abhandlungen der Mitglieder, und überhaupt die die Pharmacie betreffenden wissenschaftlichen Fortschritte zur Kunde zu bringen, und das jedem Mitgliede eingesandt wird.



## §. 6.

Zur Erreichung des zweiten Zweckes des Vereins die Vereinszeitung, welche einen besondern Theil des Archiv macht. Sie enthält, ausser den Mittheilungen über Vereinlegenheiten, die Verfügungen und Anordnungen der Regier im Betreff der Medicinalpolizei, so wie Vorschläge und Vserungen der pharmaceutischen Angelegenheiten. In einer derselben verbundenen Anzeiger werden alle Nachrichten Kaufs- und Verkaufsgegenstände, Dienstgesuche u. s. w., die Mitglieder darin bekannt machen wollen, unentgeltlich genommen.

## §. 7.

Zur Erreichung des dritten Zweckes wird bei einem tretenden Unglücksfalle eines Mitgliedes die Milde und der thätigkeitssinn der sämmtlichen Mitglieder in Anspruch genommen.

Wir überlassen es, wie billig, in solchen Fällen jedem gliede, den Beitrag hierzu zu bestimmen. Ueber die eingemenen Beiträge und deren Verwendung wird im vorkomm Falle in der pharmaceutischen Zeitung gewissenhaft Rechnung abgelegt. Uebrigens müssen wir bemerken, dass bei einem Feuersbrunst veranlassten Unglücksfalle nur diejenigen der Unterstützung von Seiten des Vereins in Anspruch können, welche auch bei einer Feuerversicherungsanstalt betheiligt haben.

## §. 8.

Zur Unterstützung würdig ausgesdienter invalider Gehat die bisherige Unterstützungsanstalt des Vereins mit der Erfurt zu gleichem Zwecke bestehenden Institute sich verbunden, und ist solchergestalt eine gemeinsame Anstalt geworden, die den Namen führt: Buchholz - Gehlen - Trommsche Stiftung zur Unterstützung würdiger invalider Apothekgehülften. Das Statut dieser Stiftung ist in der *pharmaceutischen Zeitung*, Jahrgang 1837, No. 16., publicirt worden, und Majestät der König von Preussen dieser Stiftung Corporationenrechte zu ertheilen Allergnädigst geruhet. Zu wünschen bei der grossen Vermehrung der Ansprüche an diese Anstalt auch die Mitglieder des Vereins ihre Herren Gehülften zu fördern, dieselbe durch jährliche kleine Beiträge zu vermehren dankbar entgegengenommen werden.

## Cap. III.

*Von den Mitgliedern des Vereins.*

## §. 9.

Die Mitglieder des Vereins bestehen aus *ordentlichen Mitgliedern*, *ausserordentlichen Mitgliedern*, aus *Ehrenmitgliedern* und *correspondirenden Mitgliedern*.

## §. 10.

*Ordentliche Mitglieder* können nur anerkannt rechtsch Apotheker sein, so wie Pächter von Apotheken oder Administratoren derselben, so lange sie eine im Vereinsbezirke lie Apotheke verwalten.

## §. 11.

Als *ausserordentliche Mitglieder* werden auf Vorschlag

isbeamten auch Personen aufgenommen, welche an den wissenschaftlichen Anstalten unsers Instituts Theil zu nehmen können.

§. 12.

*Ehrenmitgliedern* des Vereins werden auf Vorschlag eines solchen Mitgliedes Gelehrte des In- und Auslandes aufgenommen, welche zur Vervollkommnung der Pharmacie und ihrer Wissenschaften beigetragen, so wie auch Personen, welche dem Verein besondere Verdienste erworben haben.

§. 13.

*correspondirende Mitglieder* werden diejenigen ernannt, für die wissenschaftlichen Anstalten des Vereins durch sie zu denselben wirken, und namentlich das Archiv durch ihre Arbeiten bereichern, besonders Apotheker außerhalb des Bezirks und ausgezeichnete Gehülfen, deren nähere Verbindung mit dem Vereine so erwünscht als ehrenvoll ist.

Cap. IV.

*dem Directorium, der Verwaltungsbehörde des Vereins.*

§. 14.

Die oberste Leitung des Vereins besorgt das Directorium.

§. 15.

Das Directorium besteht aus dem Oberdirector und aus mehreren Directoren.

§. 16.

Der Oberdirector wird aus den Directoren unter sich gewählt.

§. 17.

Im Directorio sind zwei Assessoren zugesellt, welche über die Verhandlungen und in den Directorialconferenzen insbesondere, die Interessen der Mitglieder wahrzunehmen haben, und bei den Beschlüssen mitstimmen.

§. 18.

Die Directorialgeschäfte sind so vertheilt, daß der Oberdirector die Generalverwaltung und die innern Angelegenheiten des Vereins besorgt, einer der Directoren als Bibliothekar der Bibliothek und den Lesegesellschaften vorsteht, einer das Museum leitet und ein anderer die Generalkasse führt. Die Verwaltung des Vereinskapitals und der Buchholz-Gehlen-Trommsdorff-Stiftung der Gehülfen - Unterstützungsangelegenheit, letztere in Verbindung mit dem Vorstande der gedachten Stiftung, geschieht von einer besondern, aus dem Directorio gebildeten Commission.

§. 19.

Für die ordnungsmäßigen Besorgung der durch die Vergrößerung des Vereins herbeigeführten vielfachen und sehr vermehrten Geschäfte der Verwaltung desselben sind noch zwei Assistenten angestellt, von denen der eine als Secretair dem Oberdirector und als Rechnungsführer dem Director der Kasse zur Seite steht, der andere als Archivar des Oberdirectoriums und Contrôleur der Generalkasse angestellt ist. Beide erhalten ein jährliches Gehalt.

§. 20.

Der Oberdirector führt das Siegel des Vereins mit der Umschrift: Der Apothekerverein in Norddeutschland, und der



**Inscription:** *Hora ruit*, als den Wahlspruch des Vereins. Die Directoren führen das Siegel ihrer Branche.

**Cap. V.**

*Von der innern Einrichtung des Vereins.*

**§. 21.**

Der ganze Verein ist in Kreise eingetheilt.

**§. 22.**

Jeder Kreis besteht, wo möglich, aus 15 bis 20 Mitgl.

**§. 23.**

Jedem einzelnen Kreise steht ein Kreisdirector vor.

**§. 24.**

Die Kreisdirectoren nehmen in ihren Kreisen alle E der Mitglieder zur Kasse ein, und senden solche sobald al lich, mit den nöthigen Berichten versehen, nebst gehörige nungsablegung nach Abziehung ihrer Auslagen der Gener des Vereins ein, wobei Folgendes genau zu beobachten i

**A.** Die Einsendung der Beiträge ist in Preufs. Coura in Preufs. Kassenanweisungen zu machen, und darnu Rechnung aufzustellen.

**B.** Die etwa gehabten Auslagen sind nur vom 1. Jan laufenden Jahrs an bis zum letzten Tage desselben i nung zu bringen.

**C.** Die Einsendung der Abrechnung des Kreises muß mal im ersten Monate des folgenden Jahrs geschehe Abrechnung ist in duplo auszufertigen und einzus ein Exemplar wird dem Kreisdirector quitirt als De zurückgesandt, und das andere der Generalkasse als beigefügt.

**D.** Damit die Generalkasse ihren bedeutenden Verpflich nachkommen kann, übermachen sie derselben währe Laufes des Jahrs abschlägliche Zahlungen, wenn sie gleich die ganze Abrechnung bewerkstelligen könne

**§. 25.**

Wenn bei Unglücksfällen eines Collegen die Milde d glieder in Anspruch genommen wird, so nehmen nach g hener Aufforderung die Kreisdirectoren die Gaben der M der ein, und senden solche der Generalkasse zu.

**§. 26.**

Die Kreisdirectoren setzen die für die Lesezirkel be ten Bücher bei den Mitgliedern ihres Kreises in Circulation nehmen nach geschעהner Circulation dieselben wieder zu Sie haben dafür zu sorgen, daß um die Journalhefte, zu sern Schonung derselben, stets noch ein Umschlag von st Papier umgenähet, daß jedem Hefte der Circulationszettel, cher die desfallsige Ordnung enthält, beigefügt werde, und jedes Buch, welches circulirt, aussen auf dem Umschlag dem ihnen zugesandten Vereinsstempel versehen sei, und so, daß derselbe beim Versenden, welches stets unter K band geschehen muß, von dem Kreuzbände nicht bedeckt w Endlich erstatten die Kreisdirectoren über die Veränderu die in ihren Kreisen vorkommen, Anmeldung neuer Mitgl u. s. w. dem Oberdirectorio Bericht.

## §. 27.

In den vom Directorio entfernten Gegenden bilden mehrere, zur Erleichterung und raschern Handhabung des Geschäftsganges, so wie zur Beförderung der geregelten Verwaltung, ein Vicedirectorium unter dem Vorstande eines Vicedirectors, der hier die Stelle des Directoriums vertritt, und nach dessen Instructionen die Verwaltung führt.

## §. 28.

Die Vicedirectoren besorgen die Bestellungen und Versendungen der Bücher für die Lesezirkel an die Kreisdirectoren der Vicedirectoriums, sie nehmen von den Kreisdirectoren die Beiträge zur Vereinskasse ein und bezahlen damit die Bücherbestellungen und ihre Auslagen; den Geldüberschuss, welchen sie darnach in Kasse haben, senden sie baldmöglichst als obligatorische Zahlung an den Rechnungsführer des Vereins zur Vereinskasse. Desgleichen senden sie die Beiträge für milde Beiträge, mit gehörigen Berechnungen und namentlicher Aufzählung der Geber, gleich nach Empfang derselben ein. Die jährliche vollständige Abrechnung eines Vicedirectoriums, zusammengesetzt aus den einzelnen Rechnungen der Kreisdirectoren desselben, muß jedesmal in duplo ausgefertigt und zwar im ersten Halbjahre des nächstfolgenden Jahrs dem Rechnungsführer einreicht werden, wobei zu bemerken, daß Reste vom vergangenen Jahre, zur Aufrechthaltung der Rechnungsordnung, so viel als möglich, zu vermeiden sind. Nach Richtigbefund der Rechnung des Vicedirectoriums wird dem Vicedirector von dem Director der Kasse und dem Rechnungsführer die Decharge übergeben, und das eine Duplicat als Belag der Generalrechnung beigelegt. Ueber Veränderungen in ihren Kreisen, Ein- und Austritt von Mitgliedern, erstatten die Vicedirectoren dem Directorio Bericht.

## §. 29.

Die Kreisdirectoren eines Vicedirectoriums verfahren eben so wie in den §§. 24., 25. und 26. angeführt ist, nur mit dem Unterschiede, daß sie alle ihre Einsendungen und Berichte an den Vicedirector machen.

## §. 30.

Die Bücher, welche in den Lesezirkeln gehalten werden, kommen, in der Regel bei der Generalversammlung des Vereins zu Besprechung, wozu auch die Vorschläge eines jeden Mitgliedes entgegengenommen werden, besorgt der Director der Bibliothek selbst durch geeignete Buchhandlungen für diejenigen Kreise, welche unter der unmittelbaren Leitung des Directoriums stehen, von den Vicedirectoren werden solche, nach erhaltener Genehmigung von dem Director der Bibliothek, für ihre Kreise bestellt. Die gewählten Bücher werden in so vielen Exemplaren beschafft, als es Vereinskreise giebt. Wie die Vicedirectoren die Anschaffung dieser Bücher für ihre Vereinskreise für die Ökonomie des Vereins am zweckmäßigsten finden, können sie die Lieferungen entweder für alle Kreise ihres Vicedirectoriums aus einer Buchhandlung besorgen lassen, oder den Kreisdirectoren die dafür geeigneten Aufträge ertheilen.

## §. 31.

Der Director des Museums nimmt von den Mitgliedern des

Vereins alle Beiträge an Pflanzen, von pharmakologischen, neralogischen und sonstigen naturhistorischen Gegenständen macht darüber einen Generalbericht und sendet diesen dem Directorio zur Niederlegung bei den Vereinsacten und zur kanntmachung ein.

### §. 32.

Unter dem Directorio der Kasse steht der Rechnungsführer und der Controleur. Der erstere besorgt die Geschäfte der Kasse, der andere führt die Controle. Beide legen vierteljährlich dem Director der Generalkasse eine Uebersicht ihrer Geschäftsvorfälle vor. Durch den Rechnungsführer geschehen alle Zahlungen, nachdem die Rechnungen vom Oberdirectorio und dem Director der Kasse attestirt worden sind. Er stellt die jährliche Generalrechnung des Vereins auf, welche die sämtlichen Einnahmen und Ausgaben, und alle dem Vereine gewordene Geschäfte an Geldbeiträgen, als außerordentliche Einnahme, enthält, den sämtlichen dazu gehörenden Belägen, übergiebt diese dem Director der Kasse, unter dessen Vorstände die Generalrechnung angefertigt worden ist, und dieser legt solche in extenso in der jährlichen Hauptversammlung, bei der Stiftungsfeier des Vereins vor, wo sie von den übrigen Directoren revidirt und nach Befund bestätigt wird, und wo jedem Mitgliede die Einsicht in alle Acten offen steht. Da bei der Generalversammlung eine genaue Revision dieser Rechnung durch alle anwesenden Mitglieder nicht wohl möglich ist, das Directorium aber die Uebersicht geben muss, über die gewissenhafte Führung des Rechnungswesens die größste Ueberzeugung den Mitgliedern zu geben, werden von der Generalversammlung selbst zwei oder mehrere Theilnehmer committirt, welche die Generalrechnung spezialrevidiren und den Befund derselben darunter zu bescheinigen haben. Nach der völligen Ablegung der Generalrechnung, deren Druck in der pharmaceutischen Zeitung angeordnet ist, so den sämtlichen Vereinsmitgliedern öffentlich Rechenschaft über die Verwaltung des Vereins abgelegt. Diese Rechnung wird zugleich, um jährlich die Namenliste der Mitglieder des Vereins bekannt zu machen.

### §. 33.

Der Geldüberschuss, welcher nach Abzug aller Ausgaben für den Verein in Kasse bleiben sollte, kommt zum Vereinscapital. Dieses Kapital selbst kann nur im Nothfalle angewendet werden, wenn die jährlichen Ausgaben des Vereins durch andere Veranlassung mittelst der jährlichen Beiträge nicht gedeckt werden sollten, sonst werden nur die Zinsen desselben zum Nutzen des Vereins verwendet.

### §. 34.

Der Oberdirector nimmt alle Specialberichte der Directoren ein. Er führt die Generalverwaltung des Vereins, so wie den Vorsitz in den Directorialconferenzen; er steht den innern und äußern Angelegenheiten des Instituts vor, leitet die Organisation neuer Kreise, führt die Generalcorrespondenz, und theilt jährlich in der Generalversammlung einen Bericht über den Zustand der Anstalt mit. Die Redaction des Archivs und der Vereinszeitung gehört zu den Geschäften des Oberdirectors.



§. 35.

Bei nicht schwierigen, desgleichen bei besonders dringenden, kann jeder der Directoren das für seine Abtheilung Nöthige beschließen, es müssen aber nachher bei dem Oberdirector die nöthigen Anzeigen gemacht, und diese ins Archiv niedergelegt werden. Bei streitenden Fällen entscheidet die Stimmmehrheit.

§. 36.

Die Vereinsbeamten verwalten ihre Aemter unentgeltlich. Die Auslagen haben sie, mit Belägen versehen, in Rechnung zu bringen, welche dann aus der Vereinskasse bestritten werden.

Cap. VI.

*den Pflichten und Vortheilen der ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder.*

§. 37.

Jedes ordentliche Mitglied des Vereins zahlt bei seiner Aufnahme in den Verein 2 Thlr. Eintrittsgeld, welche zugleich mit der Anmeldung eingesandt und als ein Beitrag zum Vereinsfunds berechnet werden. Mit dieser Einsendung wird die Aufnahme von dem Einzutretenden mit Namensunterschrift bekräftigt. Erklärung über die Verbindlichkeit der Statuten für den Verein verbunden, die im Archive des Vereins deponirt wird. Die Aufnahme wird hierauf durch das beim Oberdirectorio ausgestellte Diplom gültig.

§. 38.

Der Jahresbeitrag, welchen jedes Mitglied zur Generalverwaltung zu leisten hat, beträgt 5 Thlr. 16 Ggr. Cour. Hierin werden 2 Thlr. für den Lesezirkel und die Kreisverwaltung berechnet, 2 Thlr. 12 Ggr. für das Archiv, und mit dem übrigen Theile werden die Kosten und Ausgaben der Generalverwaltung und der Gehülfen-Unterstützungsanstalt bestritten. In jenen Staaten, wo dem Verein für seine Büchersendungen, das Archiv wie für die Lesezirkel, eine Portovergünstigung bewilligt ist, zahlt jedes Mitglied 12 Ggr. als Beitrag zur Aufbringung dieser Summe. Der Jahresbeitrag wird von jedem Mitgliede im ersten Jahre seines Eintritts, gleich nach Empfang des Diploms und der Statuten, bezahlt. Nachher wird dieser Beitrag in jedem Jahre noch vor dem 15. Januar eingesandt.

§. 39.

Jedes Mitglied, welches 4 Wochen nach Empfang der Rechnung den Betrag derselben nicht eingesandt hat, berechtigt dadurch den Kreisdirector, den Betrag durch Postvorschufs zu entnehmen. Sollte der Postvorschufs nicht realisirt werden, die Rechnung dennoch unterbleiben, so wird der Säumige aus der Liste der Mitglieder gestrichen, und ist der Kreisdirector ermächtigt, die Forderung des Vereins an gedachtes Mitglied auf gesetzlichem Wege einzuziehen.

§. 40.

Jedes ordentliche Mitglied verpflichtet sich, bei Annahme eines neuen Lehrlings denselben 2 Thlr. zur Gehülfen-Unterstützungskasse zahlen zu lassen, die er seinem Kreisdirector zur künftigen Besorgung einsendet.

## §. 41.

Nur nach vorhergegangener einjähriger Aufkündigung ein Mitglied aus dem Vereine austreten, d. h. zugleich mit Sendung des Beitrags für das laufende Jahr. Es macht die Anzeige dem Kreisdirector, welcher dem Oberdirectorio die Nachricht ertheilt. Nach seinem Austritt kann kein Mitglied irgend einen Anspruch an den Verein begründen.

## §. 42.

Jedes ordentliche Mitglied erhält das Archiv direct gesandt, als Eigenthum, und genießt die Vortheile der Lesegesellschaft, ist aber verbunden, die in dem jedem Buche beige beigefügten Circulationszettel vorgeschriebene Ordnung und Reihenfolge genau zu beobachten, nämlich: die Bücher vor Beschädigung Acht zu nehmen, widrigenfalls sie zu ersetzen, sie genau der festgesetzten Zeit weiter zu senden etc.

## §. 43.

Wenn ein Mitglied eines Lesezirkels von seinem Vorgänger in der Reihenfolge nicht alle 2 bis 3 Wochen Bücher erhält, wird dasselbe ersucht, diesen seinen Vorgänger zu erinnern, die liegen gelassenen Bücher zuzusenden; geschieht dieses in der nächsten Woche noch nicht, so ist solches sofort dem Kreisdirector anzuzeigen, welcher durch ein Schreiben das betreffende Mitglied an seine Verpflichtung erinnert, und wenn der Fall wieder eintritt, dasselbe vorläufig von der Circulation ausschließt, und dem Oberdirectorio darauf Bericht erstattet, wonach jenes nur dem Ganzen schadende Mitglied nach dem aus der Liste des Vereins gestrichen wird. In mehreren Vereinen sind die Mitglieder übereingekommen, in solchem Falle Conventionalstrafe zu zahlen.

## §. 44.

Die circulirenden Bücher können am Ende der Circulation eines jeden Jahrs von den Mitgliedern des Lesezirkels käuflich erworben werden, und haben dieserhalb die Vereinsmitglieder spätestens Ende Januars ihr Gebot ihrem Kreisdirector zu senden, der darüber an das Oberdirectorium berichtet. Der Betrag dafür wird von dem Rechnungsführer als außerordentliche Einnahme aufgeführt. Gehen bei dem Kreisdirector keine Gebote ein, so ist derselbe ermächtigt, die Bücher von Zeit zu Zeit nach seinem Ermessen zu verkaufen, und ist der Erlös der Generalkasse einzusenden.

## §. 45.

Die ordentlichen Mitglieder des Vereins haben das Recht, zu dessen Vervollkommnung geeignete Vorschläge zu machen, und sich hierüber an das Directorium zu wenden.

## §. 46.

Die außerordentlichen Mitglieder müssen in der Regel denselben Beitrag bezahlen wie die wirklichen Mitglieder, was dieselben Rechte genießten wie diese. Sie haben aber nicht das Recht, in die innern Vereinsangelegenheiten sich zu mischen.

## §. 47.

Alle Briefe und Sendungen der Mitglieder an das Directorium, die Vicedirectoren und Kreisdirectoren müssen portofrei eingesandt werden.



**Cap. VII.***Ueber die jährliche Versammlung des Vereins.***§. 48.**

jährlich findet eine Generalversammlung des Vereins und wird mit dem Orte, wo sie gehalten wird, gewechselt. In der Regel findet sie am 8. Sept., als dem Stiftungstage des Vereins, statt.

**§. 49.**

Die Versammlung, so wie das darauf folgende Vereinsjahr, jedesmal mit dem Namen eines um die Pharmacie und Naturwissenschaften hochverdienten Mannes benannt.

**§. 50.**

Die Generalversammlung wird von dem Oberdirector mit einem Bericht über den Zustand des Vereins eröffnet, und dann die Verdienste des Gefeierten gedacht, dessen Namen sie trägt. Die Directoren statten dann Bericht ab über die Verwaltung der Institutionen. Namentlich wird der Vereinshaushalt vorgelegt und die Generalrechnung mit ihren Belägen. Ueber alles, was ein Betreffende kann hier Rechenschaft gefordert und gegeben werden. Das wissenschaftliche Interesse der Versammlung wird durch Vorträge Seitens der Theilnehmer und durch Vorlesungen von Drogen und anderen Sammlungen erhöht. Für die Vollkommenung der Anstalt werden hier Berathungen gehalten und Beschlüsse gefasst.

**§. 51.**

Alle der Directoren wenigstens sind bei dieser Versammlung erscheinen verpflichtet.

**§. 52.**

Bei dieser Hauptversammlung können die einzelnen Vicedirectoren und Kreisdirectoren auch in ihren Kreisen Versammeln veranstalten, sind aber verpflichtet, über die darauf verhandelten Gegenstände dem Oberdirectorio Anzeige zu machen. Dies ist gewiss von großem Nutzen, wenn diese Kreisversammlungen in jedem Kreise wenigstens einmal alljährlich gehalten werden.

Die schönen Folgen, welche die collegialischen Besprechungen interessanter Angelegenheiten des Fachs mit sich bringend zu einleuchtend, als daß es nöthig wäre, dieselben durch schriftliche Auseinander zu setzen. Auch ist die Bemühung mehrerer Kreisdirectoren in dieser Rücksicht nicht ohne einen glänzenden Erfolg geblieben.

**Cap. VIII.***Von dem Vereinskapitale.***§. 53.**

Am Schlusse dieser Grundsätze des Vereins können wir nicht noch einer besondern Stiftung zu gedenken, welche verwirklicht worden ist, um eine möglichst unabhängige und dauernde Unterhaltung unsers Instituts zu bewirken.

Für alle Mitglieder des Vereins mußte es eine höchst erfreuliche Nachricht sein, daß Se. Majestät der König von Preussen höchst geruhten, im Jahr 1827 durch den hochverehrten Protector des Vereins, des Hrn. Geh. Staatsministers von Stein Excellenz, dem Vereine ein ansehnliches Geldgehalt zuzustellen. Das Directorium glaubte keine bessere

Anwendung von diesem Allerhöchsten Geschenke machen können, als dasselbe zu bestimmen, die Grundlage eines Fonds zu bilden, welcher einst eine dauerhafte Begründung des Vereins bezwecken würde.

Es wurde demnach in der am 9. Nov. 1827 gehaltenen öffentlichen Versammlung beschlossen, daß dieses Allerhöchste Geschenk den Grund eines Vereinskapitals bilden sollte, welches durch freiwillige Beiträge nach und nach so anwachsen, und durch dessen Zinsen die Verwaltungskosten des Vereins gedeckt würden, und deshalb eine Aufforderung an alle Gönner, Freunde und Mitglieder des Vereins zu erlassen, zur Verwirklichung dieses Vorhabens beizutragen. In der Ausführung dieses Beschlusses wurde das Directorium noch mehr bestärkt, als auch Se. Durchlaucht der Fürst zur Lippe ebenfalls durch ein ansehnliches Geschenk dem Vereine sein höchstes Wohlgefallen bezeugte.

Die Theilnahme Sr. Excellenz des Hrn. Staatsministers v. Altenstein, so wie Sr. Exc. des wirkl. Geh. Rathes, Oberpräsidenten von Vincke, und diejenige vieler anderer hochverehrter Personen ließen einen erwünschten Ausgang dieses Unternehmens schon vorher sehen, und in der That kamen auch darauf von Freunden, Ehrenmitgliedern und wirklichen Mitgliedern des Vereins so viele bedeutende Beiträge ein, daß gegenwärtig dieses Vereinskapital sich schon an 4000 Thlr. beläuft.

Die Verwaltung dieses Kapitals ist unter die besondere Aufsicht von drei Directoren des Vereins gestellt worden. Die Capitalien, welche dasselbe bilden, sind gegen sichere Hypothek ausgeliehen, und die jährlichen Zinsen werden wiederum dem Capitale zugelegt, so daß dasselbe eine Quelle der Vergrößerung schon in sich trägt. Um aber dereinst mit diesem Capitale um so höherm Grade den damit beabsichtigten Nutzen zu erreichen, kann nicht unterlassen werden, auf dessen Wichtigkeit für die Anstalt in den Statuten derselben aufmerksam zu machen und zu ferneren Beiträgen dazu alle Mitglieder des Vereins freundlichst aufzufordern. Auch hat das Directorium neuerlich die Einrichtung getroffen, daß jedes Mitglied 2 Thlr. Eintrittsgeld zu zahlen hat (S. § 37.), die dem Vereinskapitale zugewendet werden. Dieser Beitrag ist mit Absicht so gering angesetzt, ist aber jedem Mitgliede unbenommen, eine grössere Summe zu diesen Zweck einzusenden, welche gewissenhaft dem Vereinskapitale überwiesen wird. Ebenfalls wird diese Angelegenheit den Ehrenmitgliedern, so wie den außerordentlichen und correspondirenden Mitgliedern des Vereins bestens empfohlen.

Vorstehende Grundsätze sind von den Stiftern des Vereins zu Minden am 7. und 8. Sept. 1820 entworfen und festgestellt, und auf den späteren Directorialsitzungen nach Erforderniß der Umstände, zuletzt in den Conferenzen zu Salzuflen und Hannover am 10. Febr., 2. April, 27. April, 12. Mai und 18. Mai 1840 revidirt und verbessert.

Das Directorium des Apothekervereins in Norddeutschland.

Der Oberdirector: Dr. R. Brandes.

Die Directoren: Dr. E. F. Aschoff. Dr. Du Ménil. Overbeck. Wilken. Dr. Witting.

Die Assessoren: L. Aschoff. Faber.



## Zweite Abtheilung.

---

### Chemie.

---

#### Ueber die Zersetzung der Benzoessäure durch Chlor und Brom;

von

Dr. C. Herzog.

---

Bei der Vergleichung der Eigenschaften der Zimmt-  
re mit der Benzonsäure wiederholte ich auch die Ver-  
he über die Einwirkung des Chlors und Broms auf  
tere und habe dabei nicht ganz uninteressante Beob-  
tungen gemacht.

Bisher war man der Ansicht, die Benzoessäure werde  
er durch Salpetersäure noch durch Chlor und Brom  
directer Einwirkung dieser Körper verändert. Dafs  
eres der Fall ist, hat Mulder kürzlich durch seine  
st interessante Untersuchung über Nitrobenzinsäure  
urn. für pract. Chemie von Erdmann und Marchand.

XIX. pag. 362) auf eine eclatante Weise dargethan.  
Leitet man trocknes Chlorgas in trockne Benzoe-  
re, so findet eine Einwirkung im Schatten nur sehr  
sam statt; dem Einflusse des Sonnenlichtes aber aus-  
etzt, verändert sich dieselbe je nach der angewandten  
ge in kürzerer oder längerer Zeit (12—48 Stunden)  
eine feuchte, zähe, klebrige etwas röthliche Masse.  
andelt man diese mit einer Lösung von kohlensau-  
Kali in der Kälte, so löst sich dieselbe unter star-  
Aufbrausen zu einer braunrothen Flüssigkeit, indem  
ein Theil der braunrothen Substanz absetzt, welche  
er Luft harzig wird und einen ganz eigenthümlichen  
Benzoe entfernt ähnlichen Geruch besitzt. Um die



Flüssigkeit von diesen Stoffen zu befreien, wandte frisch ausgeglühte Thierkohle an und erreichte völlig meinen Zweck; worauf, nachdem verdünnte Salpetersäure zugesetzt war, ein völlig weißer krySTALLINER Niederschlag entstand. Auf einem Filtrum abgeseiht, wurde derselbe sorgfältig mit kaltem Wasser gewaschen, so daß durch Silberlösung nicht die Opalisierung mehr zu erkennen war.

Die auf diese Weise erhaltene Säure ist farblos, geruchlos, von etwas brennendem Geschmack, schmilzt bei  $98^{\circ}$  C.; ist in kaltem Wasser wenig, in siedendem Wasser, in Alkohol und Aether leicht löslich. Aus der wässrigen Lösung krystallisirt dieselbe wie Salzsäure; die alkoholische Flüssigkeit efflorescirt blumenkohlähnlich über die Ränder der Gefäße. Sie enthält Chlor so innig in ihrer Zusammensetzung, daß man dasselbe erst nach dem Schmelzen mit Kalium durch Silbersolution nachweisen kann.

Der braunrothe Körper enthält ebenfalls Chlor, doch ist dieses auch erst nach einer gleichen Behandlung mit Kali zu entdecken.

Durch Hineinleiten von Chlor in Benzoesäure entsteht also Salzsäure, eine neue Säure, die ich mit dem Namen *Chlorbenzoesäure* bezeichne, und ein körniger harziger Natur, in welchem auch Chlor substituiert ist.

Brom, welches man in verdichtetem Zustande Benzoesäure in einem mit Glasstöpsel versehenen Gefäße einwirken lassen kann, indem man es den Sonnenstrahlen aussetzt, wirkt rascher als das gasförmige Chlor bei gewöhnlichem Luftdrucke, und die bei statt findenden Erscheinungen sind etwas verschieden. Die Masse ist, nachdem man das überschüssige Brom an der Luft verdunsten läßt, härter, bröcklicher.

gelb. Beim Uebergiessen mit einer Lösung von kohlensaurem Kali löst sie sich ebenfalls unter starkem Brausen; jedoch unter Abscheidung eines grünlichen Körpers, der an der Luft fest und harzig wird, einen ähnlichen Geruch wie der obige besitzt, und Brom fest gebunden enthält.

Die Säure, welche sich aus der mit Thierkohle behandelten Flüssigkeit durch Salpetersäure abscheidet, ist ihren äusseren und chemischen Eigenschaften der Chlorzimmtverbindung analog.

Eine Brombenzoessäure kennt man zwar schon, jedoch muss diese nach der Art ihrer Entstehung anders zusammengesetzt sein, wie die von mir dargestellte; worüber die Elementaranalysen aber erst entscheiden werden, mit denen ich mich auch gegenwärtig beschäftige.

---

Bei Darstellung der Chlorzimmtsäure (*Archiv der Pharm.* 2. R. Bd. XX, 165) in gröfserer Quantität habe ich bemerkt, dass sich auch hierbei neben dieser noch eine andere Substanz bildet, welche einen eigenthümlichen pfefferartigen Geruch besitzt und sich bei Behandlung der Säure mit kohlensaurem Kali als ein weifser öliger Niederschlag abscheidet. Digerirt man die Flüssigkeit mit Thierkohle, so nimmt diese denselben auf und man kann dann aus der Kohle mittelst Alkohol wieder trennen. Er ist im Wasser sehr schwer-, leicht aber in Alkohol löslich; aus letzterem wird er durch Wasser gefällt. Auf Lackmuspapier verhält er sich indifferent. Durch Resolution wird nur nach vorheriger Behandlung mit Alkalien und Glühen Chlor angezeigt.

Die reine Chlorzimmtsäure ist geruchlos, so wie die reine Zimmtsäure, und musste der von mir in obiger



Abhandlung aufgeführten noch etwas von diesem Körper adhärirt haben.

---

## Versuche über das Helenin; von Carl Gerhardt.

---

Die Zahl der Pflanzenstoffe, welche in den büchern der Chemie noch isolirt stehen, vermehrt täglich, ohne daß die Wissenschaft einen besonderen Nutzen daraus zieht. Unter diesen ist eine, von Geoffroy dem Jüngern und Lefébure\*) erhalten wurde, die den wirksamen Bestandtheil der Alantzel (*Inula Helenium*) auszumachen scheint; gewiß im Interesse der Chemie, diese Substanz einer neuen Untersuchung zu unterwerfen, da man bisher so wenig davon weiß. Dumas ist der einzige, der mit einer Analyse derselben beschäftigt hat.

Das Helenin\*\*) erhält man am leichtesten, wenn man die frische Wurzel mit Alkohol von 36° B. auszieht, von den Auszügen den Alkohol abdestillirt, woraus die concentrirte Flüssigkeit nach Erkalten eine kleine Menge wenig gefärbter Krystalle sich ausscheidet, die man durch Wiederauflösen in Alkohol und Ueinstallisiren reinigt. Die getrocknete Wurzel eignet sich weniger zur Darstellung des Helenins; sie liefert eine Infusion, aus welcher zugleich eine braune und

---

\*) Auch von Hoffmann.

D. Red.

\*\*) Im Original, den *Annal. de Chim. et de Phys.*, steht Hellenin. Die Pflanze, worin dieser Körper enthalten ist, heißt *Inula Helenium*, nicht aber *Inula Hellenium*.

D. Re

ie sich absetzt, wovon das Inulin nicht leicht zu  
en ist. Durch Destillation der Wurzel mit Wasser  
man bekanntlich im Destillat sehr weisse glän-  
Flocken von Helenin, aber in sehr geringer Menge,  
die Ausziehung mit Alkohol vortheilhafter ist.  
Das Helenin bildet vierseitige weisse Prismen, von  
st geringem Geruch und Geschmack, und ist leicht-  
b Wasser. Es ist unlöslich in Wasser, leichtlös-  
in Alkohol und Aether, in ätherischen Oelen und  
ot. Es läßt sich leicht pülvern, wenn es nicht  
inem gewissen auch in der Wurzel enthaltenen  
e verunreinigt ist. Es schmilzt zwischen  $275^{\circ}$  und  
C. und verflüchtigt sich vor dem Kochen; bei die-  
Temp. aber wird es schon mehr oder weniger ver-  
rt, so dafs man die Dichtigkeit seiner Dämpfe nicht  
ennen kann.

Läfst man das Helenin bei mässiger Wärme schmel-  
so krystallisirt es beim Erkalten aufs neue in Masse;  
aber die Wärme nur einige Minuten lang un-  
lten, so zeigt die nach Erkalten wieder fest ge-  
ene Masse keine Spur von krystallinischer Textur  
ist im Ansehen dem Colophonium ähnlich.

Durch kaustische Alkalien wird das Helenin auch  
r Wärme nicht zersetzt. In einer wässrigen Kali-  
g löst es sich beim Erhitzen auf, und wird durch  
r Wasserstoffsäure unverändert daraus gefällt. Eine  
nöse Kalilösung verhält sich ähnlich. Wird es mit  
nem Kali erhitzt, so verflüchtigt es sich grössten-  
b, während ein anderer Theil sich verkohlt, der  
stand giebt mit Wasser eine braune Auflösung, wel-  
durch Säuren schwach getrübt wird.

Säuren üben, wie auf die meisten ätherischen Oele, so  
auf das Helenin eine charakteristische Wirkung aus.

In concentrirter Schwefelsäure löst sich das Helenin bei gewöhnlicher Temperatur mit weinrother Färbung auf, ohne Entwicklung von Schwefelsäure, wenn man Erhitzen vermeidet. Bei langer Einwirkung aber schwärzt sich die Mischung auch ohne Wärme. Die Auflösung enthält dann eine gewisse Menge einer eigenthümlichen Säure, die ich *Sulfheleninsäure* nennen werde.

Trocknes chlorwasserstoffsäures Gas wird vom Helenin in großer Menge absorbirt, es verwandelt sich in eine violette Flüssigkeit, die an der Luft chlorwasserstoffsäure Dämpfe ausstößt.

Salpetersäure mittlerer Concentration löst das Helenin ohne Entwicklung von Salpetergas auf; Wasser schied es daraus unverändert nieder. Beim Erhitzen aber wird das Helenin durch die Säure in ein azotisirtes Helenin umgewandelt, welches ich später unter dem Namen *nitrohelenin* beschreiben werde.

Von concentrirter Essigsäure wird das Helenin unverändert aufgenommen, und durch Wasser daraus wieder abgeschieden.

Wasserfreie Phosphorsäure wirkt auf Helenin, wie auf Kampher; sie verwandelt dasselbe nämlich in einen Kohlenwasserstoff, den ich, analog beim Kampher, *Phosphorhelenin* nennen werde.

Chlorgas wirkt in der Kälte, selbst unter Einwirkung directer Sonnenstrahlen, nicht auf das Helenin. Beim Erhitzen des Gemenges aber entwickelt sich Chlorwasserstoffsäure und es bildet sich ein harziger Körper, in welchem eine gewisse Zahl Wasserstoffatome durch eine gleiche Zahl Chloratome ersetzt ist; ich werde denselben *Chlorhelenin-Chlorhydrat* nennen.

Läßt man einen Tropfen Brom auf Helenin fallen, so entsteht unter Aufbrausen Bromwasserstoffsäure, und ein gelblich-rothes Product, welches in Alkohol löslich

nicht in Wasser, und wahrscheinlich eine ähnliche Zusammensetzung hat, wie das durch Chlor entstehende. Zinnchlorid und Antimonchlorür, letztes im geschmolzenen Zustande, färben das Helenin dunkelroth, eben durch concentrirte Schwefelsäure. Es scheint hier gleiche Action statt zu finden, nämlich eine directe Verbindung, denn die rothe Färbung, welche Schwefel- und diese Chlorüre mit den meisten ätherischen Oelen hervorbringen, sind nichts anders als wirkliche Verbindungen, die aber durch Wasser und selbst schon in feuchter Luft wieder zerstört werden.

Durch Destillation mit kaustischem Kalk giebt das Helenin eine gelbliche brennbare Flüssigkeit, die neu mit Wasser mischbar und im Geruch dem Aceton ähnlich ist.

### Zusammensetzung des Helenins.

Die Zusammensetzung des Helenins nach Dumas ist:

|                 |              | Versuch |
|-----------------|--------------|---------|
| Kohlenstoff...  | 14 At. 77,43 | 76,9    |
| Wasserstoff...  | 18 » 8,13    | 8,8     |
| Sauerstoff..... | 2 » 14,44    | 14,3    |
|                 | 100          | 100.    |

Meine Resultate stimmen damit nahe überein, ich erhielt nur etwas mehr Kohlenstoff, ohne Zweifel wegen geringerer Reinheit des Materials. Drei Versuche gaben:

|                |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|
| Kohlenstoff... | 77,32 | 77,40 | 77,98 |
| Wasserstoff... | 8,56  | 8,45  | 8,62  |
| Sauerstoff.... | 14,12 | 14,15 | 13,50 |
|                | 100   | 100   | 100.  |

Dieses stimmt nun zwar sehr mit der Formel von Dumas überein, indessen liefs sich diese nicht mit den Producten der Zersetzung des Helenins durch Chlor und Schwefelsäure vereinigen, daher ich die Formel  $C_{15}H_{10}$  vorziehe. Diese giebt in der That:



|                        |              |            |
|------------------------|--------------|------------|
| Kohlenstoff ... 15 At. | 1146,0       | 77,92      |
| Wasserstoff ... 20 „   | 124,8        | 8,41       |
| Sauerstoff ..... 2 „   | 200          | 13,67      |
|                        | <hr/> 1471,4 | <hr/> 100. |

Es fehlte mir an Substanz, um das Atomgewicht des Helenins durch Absorption von Chlorwasserstoffgas zu bestimmen, wenn man indess die Zusammensetzung des Helenin-Chlorhydrats,  $C_{15}H_{18}Cl_2O_2 + H_2Cl_2$ , erwägt, und der Kampherarten, die sich mit Chlorwasserstoffsäure binden, wie der Kampher selbst  $C_{20}H_{32}O_2$ , der Münzkampher  $C_{20}H_{40}O_2$  u. s. w., deren Molekül nämlich 2 Atome Sauerstoff enthält, so kann man nicht stehen, die oben entwickelte Formel für die eines Äquivalents Helenin zu nehmen. Uebrigens hat das Krönach nach Ettling's Analyse fast dieselbe procentische Zusammensetzung, wie das Helenin.

#### *Einwirkung der Schwefelsäure auf das Helenin*

Das Helenin löst sich in concentrirter Schwefelsäure mit rother Farbe auf, diese Verbindung ist aber so löslich, daß sie schon an feuchter Luft sich zersetzt, indem sie sich entfärbt und das Helenin unverändert sich absccheidet; Alkohol und Aether zerstören ebenfalls die rothe Farbe. Wird die Auflösung verschlossen gestellt, oder im Wasserbade erhitzt, so schwärzt sich unter Entwicklung von wenig Schwefelwasserstoff und Wasser fällt daraus schmutzig-braune in Alkohol unlösliche Flocken.

Durch rauchende Schwefelsäure wird das Helenin sogleich dunkelroth, und wenn man darauf sieht, ohne das Gemenge sich nicht erhitzt, so erhält man eine schwarze Masse, ohne Entwicklung von Schwefelwasserstoffsäure. Durch Wasser wird diese Masse grün und



iben gelbe harzähnliche in Alkohol mit goldgelber  
be lösliche Flocken zurück; diese sind ein besonde-  
Körper, der nicht flüchtig ist, dessen Zusammen-  
ung ich aber nicht ermitteln konnte, da es mir nicht  
ng, ihn ganz rein darzustellen. Wird endlich die  
den gelben harzigen Flocken gesonderte Flüssigkeit  
Baryt gesättigt, so erhält man aufer einer grossen  
ge von schwefelsaurem Baryt ein lösliches, sehr bit-  
schmeckendes Barytsalz, was aber schon beim vor-  
tigsten Verdunsten sich zersetzt in schwefelsauren  
yt und in ein Harz, das den oben erwähnten gelben  
ken gleich ist. Es geht hieraus deutlich hervor, daß  
ch die Einwirkung der Schwefelsäure auf das He-  
n sich eine analoge Verbindung bildet, als mit Al-  
ol, Kampher, Bittermandelöl u. s. w., und die wir  
*foheleninsäure* oder *Heleninschwefelsäure* nennen wollen.

Durch Destillation von Helenin mit concentrirter  
wefelsäure erhält man kein eigenthümliches Oel wie  
n Kampher, sondern es entsteht völlige Verkohlungs-  
er Entwicklung einer Menge Schweflichtsäure. Auch  
ch Erwärmen mit viel Schwefelsäure im Wasserbade  
nte ich das Helenin nicht in ein isomerisches Oel  
wandeln, wie es Delalande mit dem Kampher  
ng.

#### *Wirkung der Salpetersäure auf das Helenin.*

Salpetersäure löst in gewöhnlicher Temp. das He-  
in ohne Veränderung auf. Beim Erhitzen aber, oder  
in man rauchende Salpetersäure nimmt, wird es in  
rothes Harz verwandelt unter Entwicklung von Sal-  
ergas. Nur einmal erhielt ich hierbei einige wenige  
ine Krystalle, die aber keine Oxalsäure zu sein schie-  
n. Zur Darstellung des gelben Harzes, Nitrohelenins,

erhitzt man Helenin mit einem Ueberschuß von Salpetersäure mittler Concentration, bis eine Probe des Products in Ammoniak völlig sich auflöst, dann tröpfelt die salpetersaure Auflösung in Wasser, sammelt den ben Niederschlag, löst ihn nochmals in Alkohol an tröpfelt diese Auflösung wieder in Wasser, wo sich Harz ausscheidet. Setzt man umgekehrt das Wasser der alkoholischen Auflösung, so erhält man eine chigte Flüssigkeit, woraus sich das Nitrohelenin sch rig abscheidet.

Nitrohelenin, bei 100° C. getrocknet, erscheint eine gelbe pulvrige Masse. Es löst sich leicht in Ammoniak mit rother Farbe, und wird daraus durch ren als eine gallertartige Masse gefällt, fast wie E oxydhydrat, die im Wasserbade zu einer granatro durchscheinenden Masse eintrocknet. Die Ammon anflösung des Harzes fällt Silber- und Bleisalze voll men. Es ist nicht flüchtig, in Wasser schwerlös leichtlöslich in Alkohol. Durch Behandeln mit Salp säure wird es in Oxalsäure verwandelt. Durch Sch zen mit trockenem Kali entwickelt es Ammoniak. Zusammensetzung des Nitrohelenins ist:

|                       |        |                |
|-----------------------|--------|----------------|
| Kohlenstoff....15 At. | 1146,6 | 56,31          |
| Wasserstoff...18 „    | 112,3  | 5,51           |
| Stickstoff..... 2 „   | 177,0  | 8,69           |
| Sauerstoff..... 6 „   | 600,0  | 29,49          |
|                       |        | <hr/>          |
|                       |        | 2035,9    100. |

Die Salpetersäure übt sonach auf das Helenin eine ähnliche Zersetzung aus, wie auf die meisten ätherischen Oele, die dadurch in stickstoffhaltige Harze und Säuren umgewandelt werden, die durch einen Ueberschuß von Salpetersäure zu Oxalsäure werden. Einige dieser, wie Nelkenöl, werden augenblicklich, wenn sie mit concen-

er Salpetersäure vermischt werden, zu krystallisir-  
Oxalsäure, die mit gelbem Harze verunreinigt ist.

*Wirkung des Chlors auf das Helenin.*

Bei gewöhnlicher Temp. wirkt das Chlor nicht auf Helenin. Wenn man aber Chlorgas auf im Was-  
de erhitztes Helenin wirken läßt, so wird dieses erst  
ig, dann aber verdickt es sich nach und nach unter  
wicklung saurer Dämpfe. Durch Kochen der Masse  
Alkohol erhält man eine gelbe Auflösung, aus der  
Erkalten gelbe Flocken sich abscheiden. Diese ha-  
folgende Zusammensetzung:

|                        |              |            |
|------------------------|--------------|------------|
| Kohlenstoff.....15 At. | 1146,6       | 48,6       |
| Wasserstoff....20 „    | 124,8        | 5,3        |
| Chlor.....4 „          | 884,3        | 37,5       |
| Sauerstoff.....2 „     | 200,0        | 8,6        |
|                        | <hr/> 2355,7 | <hr/> 100. |

Diese Verbindung läßt sich auf zweierlei Weise  
achten; nach Berzelius als das Oxychlorür des Koh-  
wasserstoffs  $C_{15}H_{20}$ , nämlich  $(C_{15}H_{20})O_4 + C_{15}$   
 $Cl_2$ , nach Dumas als das Hydrochlorat eines Mo-  
ls Helenin, in welchem 1 Aequivalent Wasserstoff  
h ein Aequivalent Chlor ersetzt ist:  $(C_{30}H_{18}Cl_2)$   
 $H_2Cl_2$ . Das Hydrochlorat des Helenins würde sein  
 $(C_{30}H_{18}O_2) + H_2Cl_2$ .

Die Ansicht von Dumas ist hier der Wahrheit an-  
essen, denn alle Hydrchlorate dieser Art treten an  
stisches Kali die Menge Chlorwasserstoffsäure ab, die  
außerhalb des Radikals enthalten; die meisten Chlor-  
rate zersetzen sich schon durch Wärme in Chlor-  
wasserstoffsäure und chlorhaltige Körper. Man braucht  
an diese analogen chlorhaltigen Verbindungen des  
phthalins, Benzins und des ölbildenden Gases sich zu

erinnern, um allen Zweifel in dieser Rücksicht zu entfernen. Von dem Körper, der uns hier beschäftigt, gilt dasselbe. Durch geringes Erhitzen giebt er eine große Menge Chlorwasserstoffsäure aus, ohne sich zu verändern, sondern mit Hinterlassung eines chlorhaltigen ähnlichen Körpers. Durch Erhitzen mit kaustischer Kalilösung giebt er eine gelblichrothe Auflösung, die eine merkliche Menge Chlorwasserstoffsäure enthält, woraus Säuren rothe harzartige Flocken niederschlagen, die schwierig und mit einer grünesäumten Flamme brennen, die Anzeige der Gegenwart von Chlor.

Diese Thatsachen liefern einen neuen Beweis zu Gunsten der beiden von Dumas aufgestellten Hauptsätze der organischen Chemie: sie sind ganz conform den Substitutionen und beweisen die Beständigkeit der chemischen Eigenschaften bei Körpern, die von einem Typus durch Substitution abstammen. In der That, da Helenin verbindet sich direct mit Chlorwasserstoffsäure und das durch Substitution gechlorte Helenin bleibt mit der Chlorwasserstoffsäure verbunden, so wie diese entsteht.

Läßt man das Helenin nicht lange genug mit Chlor in Berührung, so erhält man ein Product, was in seinen chemischen und physischen Eigenschaften dem vorigen ähnlich ist, und dieselben Verhältnisse von Kohlenstoff und Wasserstoff enthält, aber weniger Chlor.

Das Chlorhelenin-Chlorhydrat erscheint trocken als ein gelbes, gepülvertes Colophonium ähnliches Pulver, ist leichter als Wasser, bei mäßigem Erhitzen geräth es in Fluß, und entwickelt Chlorwasserstoffsäure, ohne zu verkohlen. Es löst sich leicht in Aether, in kaltem Alkohol ist es schwerlöslich, in kochendem löst es sich leicht mit gelber Färbung, beim Erkalten zum Theil



wieder ausscheidend. Es ist unlöslich in Wasser, brennt schwierig mit einer grüngesäumten Flamme. Mit concentr. Schwefelsäure wird es schön carmoisin gefärbt.

Wird das Chlorhydrat in einer Röhre mit kautischem Kalk erhitzt, so erhält man eine große Menge kleiner weißer Blättchen von Naphthalin. Diese Reaction erklärt sich leicht, wenn man annimmt, daß der ganze Chlorgehalt des Chlorhelenin-Chlorhydrats vom Kalk aufgenommen werde als Chlorwasserstoffsäure, der Sauerstoff als Wasser. In der That, wenn man von einem Äquivalente der Verbindung die Elemente von 2 Äquivalenten Chlorwasserstoffsäure und 2 Äquivalenten Wasser abzieht, so bleiben die Elemente von  $\frac{3}{4}$  Äquivalent Naphthalin übrig:  $C_{15} H_{20} Cl_4 - 2 H_2 Cl_2 - 2 H_2 O = C_{15} H_{12} = \frac{3}{4} C_{20} H_{16}$ . Ich will jedoch bemerken, daß die Zersetzung vielleicht nicht so einfach ist, als diese Gleichung anzeigt, denn bei aller Sorgfalt bleibt in der Verbrennungsröhre eine große Menge Kohle.

Das Helenin verhält sich also gegen Chlor wie die meisten ätherischen Oele. Das Chlor entzieht ihm eine gewisse Menge Wasserstoff, die es in gleichen Äquivalenten ersetzt, die nun entstehende Chlorwasserstoffsäure bemächtigt sich sogleich des chlorirten Körpers, so ist das Product ein Hydrochlorat dieses letztern, analog den Hydrochloraten des Chlorcamphens, des Citronen- und anderer. Wenn man die Einwirkung Chlors auf das Helenin noch weiter treibt, so wird demselben gewiß noch mehr als 2 Atome Wasserstoff entziehen.

*Einwirkung der wasserleeren Phosphorsäure auf das Helenin.*

Wird Helenin über wasserleere Phosphorsäure de-



stillirt, so erhält man im Recipienten eine gelb schwach nach Aceton riechende Flüssigkeit, die leichter ist als Wasser. Nach mehrmaligen Behandlungen mit rauchender Schwefelsäure und Wasser, um sie von unzersetztem Helenin zu reinigen, Trocknen über Calcium und wiederholtes Destilliren, erhält man endlich von constanter Zusammensetzung. Diese

|                       |        |       |
|-----------------------|--------|-------|
| 15 At. Kohlenstoff .. | 1146,7 | 91,8  |
| 16 „ Wasserstoff ..   | 99,8   | 8,2   |
|                       | <hr/>  | <hr/> |
|                       | 1246,5 | 100.  |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Das Helenin           | $C_{15} H_{20} O_2$ |
| verliert 2 At. Wasser | $H_4 O_2$           |
| es bleibt             | <hr/>               |
|                       | $C_{15} H_{16}.$    |

Diesen Körper nenne ich *Helenen*, ein Kohlenwasserstoff, ganz analog dem Camphen, dem Ceten, Anthen u. s. w.

Durch die Action der wasserfreien Phosphor bildet sich außer diesem kein anderer Körper.

Das Helenen ist im reinen Zustande flüssig, fast leichter als Wasser, von scharfem Geschmack und sehr chem acetoneähnlichen Geruch; es brennt mit rußiger Flamme, kocht bei  $200^{\circ} C.$  und fleckt auf Papier. rauchende Schwefelsäure zeigt in der Kälte keine Wirkung darauf, daher man es dadurch von einem Rückhalte Helenin befreien kann; wird das Gemenge aber erhitzt wird es schwarz. Durch rauchende Salpetersäure wird es anfangs roth, darauf grün, setzt man dann Wasser zu, so schwimmt das Helenen oben auf, und scheint nicht verändert zu sein. Wird es mit Salpetersäure erwärmt, so verharzt es.

Es ergiebt sich aus den vorstehenden Versuchen, daß das Helenin wirklich als ein concentrirtes ätherisches Oel, als eine Art Kampher zu betrachten ist, das

ge seiner chemischen Eigenschaften an die Seite des gewöhnlichen Kamphers, des amerikanischen Pfeffermünz-, des Kartoffelnöls u. s. w. zu stellen ist \*), die nach Alant als wahre Alkohole anzusehen sind.

Nachstehendes ist eine Uebersicht der Formeln der untersuchten Verbindungen.

$C_{15}H_{20}O_2$  ..... Helenin,  
 $C_{15}H_{18}Cl_2O_2$  ..... Chlorhelenin,  
 $C_{15}H_{20}O_2 + H_2Cl_2$  .... chlorwasserstoffs. Helenin,  
 $C_{15}H_{18}Cl_2O_2 + H_2Cl_2$  chlorwasserstoffs. Chlorhelenin,  
 $C_{15}H_{20}O_2 + SO_3 + Aq.$  Sulfoheleninsäure,  
 $C_{15}H_{18}(Az_2O_4)O_2$  ..... Nitrohelenin,  
 $C_{15}H_{16}$  ..... Helenen.

aus den *Annales de Chim. et de Phys.* LXXII, 163.)

## Besondere Efflorescenz des doppelt-schwefelsauren Kali;

vom

Hofrath Professor Dr. *Pleischl* in Wien.

Es ist bekannt, daß doppelt-schwefelsaures Kali (*Sulfus Lixivae*) gern efflorescirt, welche Erscheinung dem Rande des Gefäßes beginnt; allein daß sich eine solche Efflorescenz mitten aus einer Flüssigkeit emporhoben und herausgebildet hätte, ist mir bisher noch nicht vorgekommen.

Das zweifach-schwefelsaure Kali hat mir schon einmal eine sehr schöne Lichterscheinung während des Ab-

\*) In den deutschen Handbüchern ist es stets unter die Kampherarten als Alantkampher aufgeführt. D. Red.

dampfens gezeigt, die ich in *Baumgartner's Zeitschrift für Physik und verwandte Wissenschaften* B. 3. Heft 3 S. 220 beschrieb; dasselbe Salz bietet mir jetzt im Effloresciren, im Ausblühen, eine nicht minder schöne Erscheinung dar.

Der Rückstand von der Bereitung der Salpetersäure mit 2 Mischungsgewichten Schwefelsäure auf 1 M.-Gewicht Salpeter vorgenommen, wurde in destillirtem Wasser gelöst, abgedampft, und zum Krystallisiren in einem ungeheizten Gemach, dessen Temperatur nur wenig Grade über 0° C. betrug, hingestellt. In kurzer Zeit bedeckte sich der Boden des Gefäßes mit Krystallen, an den Rändern der Flüssigkeit begann das Effloresciren, und zeigte hier schon sehr schöne baumartige Gebilde, die wenigstens 1½ — 2 Zoll über dem Flüssigkeitsspiegel sich frei in die Luft erhoben. Später zeigte sich die Erscheinung noch interessanter, es erhoben sich nämlich nicht am Rande des Gefäßes, sondern mitten in der Flüssigkeit, Inseln mögte ich sagen, über die Flüssigkeit selbst empor, und hier bildeten sich wieder die schönsten baumartigen Verzweigungen, mineralische Vegetationen, 2 Zoll hoch und darüber über dem Flüssigkeitsspiegel in die Höhe hinaufsteigend. Bemerkenswerth schien mir dabei der Umstand, daß sich nach und nach wärts in die Flüssigkeit die Krystallisation ebenfalls fortsetzte, so daß das Ganze die größte Aehnlichkeit mit dem keimenden Samen zeigte, bei dem sich der Blattkeim dem Lichte, der Wurzelkeim dem Finstern der Erde zuwendet.

Vielleicht gelingt es noch, eine bestimmte Form in den ausblühenden Theilchen nachzuweisen; bisher war dieses Bemühen leider vergeblich. Ich mag den Gedanken, wie wichtig diese Erscheinung in geologischer Hinsicht

t, bezüglich der Emporhebung der Gebirge etwa h werden könnte, für jetzt noch gar nicht weiter folgen, werde aber nicht unterlassen, darauf Bezug nennende Thatsachen zu sammeln, um in der Folge wieder darauf zurückzukommen.

---

## Ueber Kobalttöinten;

vom

Professor *Stratingh* in Gröningen.

---

Wegen der Eigenschaft der Kobaltsalze, auch im dünnsten Zustande durch Erwärmung gefärbt zu werden, hat man sie zu einer der schönsten Arten von symmetrischen Tinten angewendet, deren Züge in der Kälte gar nicht wahrnehmbar, durch Erwärmung aber in Folge der dadurch stattfindenden Abscheidung aller Feuchtigkeit unter verschiedenen Farben, je nach der Natur des Salzes sichtbar werden. So soll eine Auflösung von *essigsaurem Kobaltoxydul*, frei von Eisen und Nickel, eine schöne blaue Farbe geben; eine Auflösung von *Chlorkobalt*, mit etwas *Eisenchlorid* und *Chlornickel* vermengt, giebt dagegen eine schöne grüne Farbe; *salpetersaures Kobaltoxyd* eine schöne rothe Farbe, während man mit *Chlorkobaltoxyd* auch noch allenfalls Gelb auf diese Weise erzeugen kann. Es ist bekannt, daß man durch diese Tinten eine Winterlandschaft schnell in eine Sommerlandschaft umändern kann, wenn man die Farben der Bäume, des Grases, gelber, rother und blauer Blumen und Früchte mit diesen Tinten giebt, die dann erst sichtbar werden, wenn das Bild erwärmt wird, wodurch es aus der Wintervorstellung in den Farbenschmuck einer



Sommerlandschaft übergeht, und nur beim Erkalten Sommer dem Winter wieder Platz macht.

Um die Eigenschaften und verschiedenen Farbtöne, die von der Zusammenstellung, dem Grade Verdünnung und der verschiedenen Mengung d. Kobaltsalze abhängen, zu untersuchen und um die Entstehung und Unterscheidung der Farben angemessen zustellen, habe ich folgende einfache Einrichtung bequem gefunden. Ein mit einem Fuß versehener Cylinder von 25—30 Zoll Höhe und 4—5 Zoll Durchmesser wird von aussen mit einigen 1 — 1½ Zoll breiten Papierstreifen in angemessenen Zwischenräumen von einander beklebt, worauf man mit einem Pinsel oder einer Feder Striche oder Zeichnungen mit den Kobalttinten anbringt. Gießt man in diesen Cylinder nun heisses Wasser, so kommen fast sogleich die eigenthümlichen Farben der Tinten zum Vorschein. Man hat bei diesem Verfahren den Vortheil, daß die Farbe schnell zum Vorschein kommt und beim Erhitzen keine Beschädigung des Papiers oder der Zeichnung eintreten kann, auch daß man durch Zusatz von kaltem Wasser die Farbe sofort wieder verschwinden lassen kann. — Man kann auch zu manchen interessanten Spielereien dieses Verfahren benutzen, indem man einen sehr flachen Kasten von Zinkblech beklebt, an der einen Aussenfläche mit einer Landschaft von Kobalt pathetischer Tinte. Der Kasten hat oben eine Oeffnung und unten einen Hahn, und steht wie ein gewöhnlicher Lichtschirm auf Füßen. Stellt man diesen Schirm in einem Gesellschaftszimmer auf, und füllt ihn, ohne es jemand merkt, mit heissem Wasser, so erscheint auf dem Schirm, wie durch Zauberei, die Landschaft, die man durch Zugießen von kaltem Wasser schnell oder langsam wieder verschwinden lassen kann.

---



# ber Pelouze's grüne Verbindung des Cyans mit Eisen;

von

*L. Jonas,*

Apotheker in Eilenburg.

Die Zusammensetzung dieses Cyanürs \*) ist  $\text{Fe Cy}_2 + \text{Cy}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$ , es ist eine grüne Materie, entstehend unter  
ren Umständen, so verunreinigt sie z. B. die erste  
stallisation des Kaliumcyanferrids nach L. Gmelin's  
thode. Positiv wird sie nach Pelouze erhalten,  
in eine Auflösung von Cyanferrür- oder Cyanfer-  
-Kalium ein Ueberschufs von Chlor geleitet wird,  
färbt sich die Flüssigkeit weinroth und riecht stechend  
b Cyanchlorür und Blausäure. Wenn man jedoch nach  
nen Versuchen, anstatt Chlor, die Chlor- und Sauer-  
verbindung, — unterchlorige Säure — welche ent-  
t, wenn man Bleichkalk, — unterchlorigsauren Kalk  
mittelst Salzsäure zerlegt, in eine Auflösung von  
nferrür - Kalium in Uebermafs leitet, bis diese  
lösung dunkelgelb ins Grünliche übergehend gefärbt  
heint, so bemerkt man keine Entwicklung von Cyan-  
rür und Blausäure. Die Flüssigkeit und die aus  
er zu gewinnenden Krystalle, welche blafsrothgelb  
farbe und dem Gmelin'schen Ferridcyankalium ähnlich  
n, geben mit allen Eisenoxyd-Salzen in concentrirter  
lösung einen schönen beständigen grünen Nieder-  
lag, welcher von kochender Salzsäure nicht verändert  
d. Eisenoxydulsalze werden jedoch von diesem Salze  
niedergeschlagen. Dies grüne Cyanür läfst sich auf  
olle und Baumwollenzuge anheften, wird jedoch  
sch Waschen mit Seife blau.

\*) S. dieses Archiv 2. R. Bd. XIX, 109.

## Eine einfache Methode, Schwefel in Pflanzen nachzuweisen;

von  
*Chr. Hansmann.*

In *Buchner's Repert. f. d. Pharm.* 2. R. Bd. 8. Heft pag. 63. theilt *Creuzburg* eine neue Methode *minima* von Schwefel in Pflanzen nachzuweisen. Dieselbe besteht darin, daß man die Pflanze eine Zeitlang verdünnter Aetzkalklauge in einer Tubulatretorte erhitzen, dann verdünnte Schwefelsäure im Ueberschuß auf einmal in die Retorte gießt und beim Verstopfen des Halses ein mit kohlensaurem Bleioxyd imprägnirtes Papier mit einzwängt. *Creuzburg* fügt noch hinzu, daß die bisher benutzte Methode, nach welcher über die Pflanze Wasser abdestillirt und das Destillat auf Schwefel geprüft wurde, unzureichend sei. — Ich glaube, daß man zur Nachweisung des Schwefels in Pflanzen bequem folgender Methode bedienen kann, die zwar nicht verbürgt, daß der gefundene Schwefel nicht aus einem schwefelsauren Salze frei geworden ist, aber auch den Schwefel sicher wahrnehmen läßt, wo in der Pflanze noch ferner zu untersuchenden Pflanzenasche sich keine schwefelsauren Salze finden, was aber wohl selten der ganzen Pflanzen oder Pflanzentheilen vorkommen dürfte. Man glüht nämlich den zu untersuchenden Pflanzentheil in einer etwa drei Zoll langen, an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre über der Weingeistlampe so lange, als noch gasartige Producte daraus hervorgehen, und läßt die sich entwickelnden Gasarten an Papierstreifen, welches mit Bleiessig benetzt ist und den offenen Theil der Röhre locker verschließt. Man hat sich bei vorzusehen, daß nicht das brenzliche Oel der Pflanze

er beschmutze. Wenn sich auch nur kleine Mengen Schwefels im geprüften Pflanzentheile finden, wird sich das Papier mit dem eigenthümlichen metallartigen Ansehe bräunen. Nach dieser Methode, die immer mit Nutzen neben den anderen anzuwenden sein wird, konnte zwei Senfkörnern und in fünf Gran Angustura- und Angelikawurzel der Schwefel nachgewiesen werden. Außerdem liefs sich noch Schwefel in folgenden Pflanzentheilen auf diese Art nachweisen, deren Analyse früher weder Schwefel noch schwefelsaure Salze enthalten haben, als in:

*Radix Chinae reg.*, analysirt von Pelletier u. Caventou.

*Cascarillae*, analysirt von Trommsdorff.

*Cinnamomi*, analysirt von Vauquelin.

*Hippocastani*, analysirt von Pelletier, Caventou und Du Mênil.

*Quercus*, analysirt von Gerber.

*Resina Islandicus*, analysirt von Berzelius.

*Gummi Guajaci*, analys. von Hagen u. Trommsdorff.

*Radix Arnicae*, analysirt von Pfaff.

*Calami*, analysirt von Trommsdorff.

*Curcumae*, analys. von John, Pelletier u. Vogel.

*Iridis Florentinae*, analysirt von Vogel.

*Ononidis arvensis*.

*Malina fraxinea*.

Die Ansicht Creuzburg's, dass der Schwefel viel häufiger im vegetabilischen Reiche vorkomme, als bisher angenommen wurde und dass er bis dahin bei den meisten Pflanzenanalysen übersehen wurde, erscheint durch Angeführte gerechtfertigt.

## Einige Erfahrungen über Darstellung Aepfelsäure;

von

Dr. *Bley*.

---

**B**ei Bereitung der Aepfelsäure aus dem Saft der Vogelbeeren nach der Vorschrift von Trommsdorff durch Zersetzen des filtrirten Safts mittelst Bleizucker, eine unzureichende Menge verdünnter Schwefelsäure, Abscheidung des Bleigehalts durch Schwefelwasserstoff, Filtriren, Aufkochen mit Kohlenpulver, behutsames Abdunsten erhielt man eine noch gelblich gefärbte syropsdicke Flüssigkeit, welche nicht zur Krystallisation zu bringen war. Sie wurde deshalb mit gereinigter Thierkohle digerirt und so nach vorläufiger Filtration als gelbliche Krystalle erhalten, welche auch durch Auflösen und abermalige Behandlung mit thierischer Kohle nicht ganz entfärbt werden konnten. Ich versuchte die Entfärbung durch Digestion der Flüssigkeit mit einigen Granen chlorsauren Kalis zu bewirken, wobei ein brauner Niederschlag erhalten wurde, während die Flüssigkeit ungefärbt erschien und keine solche Krystalle gab. Zuletzt blieb abermals eine syropsdicke Flüssigkeit zurück, welche weder weiter entfärbt noch krystallisirt werden konnte.

---

## Bemerkung zur Nomenklatur einiger chemischer Stoffe.

---

**E**s scheint mir angemessener, überall den Namen eines Stoffes durch ein Hauptwort auszudrücken, als durch

satz eines Beiworts zu einem Collectivnamen. Aus dem Grunde dürfte die Benennung *Phosphorichtsäure*, *arsenichtsäure*, *Schweflichtsäure* und *Unterschweflichtsäure* Vorzüge haben vor den bisher üblichen Benennungen: phosphorige oder phosphorichte, arsenige oder arsenichte, schweflige oder schweflichte Säure. Schon in diesen Jahren habe ich mich dann und wann dieser Benennungsart bedient; ich glaube, daß sie sich durch Kürze, und durch Zweckmäßigkeit der Ableitung empfiehlt.

Man sagt zwar, der Name thut nichts zur Sache, und es ist eine gewisse Consequenz in einer wissenschaftlichen Nomenklatur ohne Zweifel kein Uebelstand. Die Bezeichnung verschiedener Oxydationsstufen gemacht man die Wörter Oxyd und Oxydul. Wäre es nicht angemessener, die unterscheidenden Endungen die Wörter auch auf die verschiedenen Verbindungen Chlors, Schwefels u. s. w. mit andern Körpern, Chlorid und Chloridul, Sulfurid und Sulfuridul u. s. w. zu übertragen, wie dieses schon hin und wieder geschehen, für die unteren dieser Stufen die gebräuchliche Benennung, Chlorür, Sulfür u. s. w. anzuwenden?

Ich finde es passend, für die Benennung neuerer Stoffe oder Verbindungen nur Namen zu wählen, die den Artikel des Sachgeschlechts führen und den Namen selbst auch eine diesem entsprechende Endung zu ertheilen, z. B. nicht die Jodine oder die Morphin, sondern das Jod und das Morphin, nicht der Aldehyd, sondern das Aldehyd, nicht der Quassit, sondern das Quassit.

Brandes.

---



## Dritte Abtheilung.

# Physiologie und Toxikologie.

## Physiologisch - toxikologische Untersuchungen über das Coniin;

von

Dr. A. Ch. A. Pöhlmann.

(Aus einer der med. Facultät in Erlangen vorgelegten h  
guralabhandlung.)

Schon Giseke machte mit seinem unreinen Coniine Versuche \*); 1 Gran desselben tödtete ein Vierteljahr altes Kaninchen in 55 Minuten. Die während der Wirkung des Giftes von ihm beobachteten Symptome waren ziemlich übereinstimmend mit denen der später vorgenommenen Vergiftung durch reines Coniin. 15 Minuten nach Einbringung des Giftes durch das Maul stellte sich Unruhe, ängstliches Umherhüpfen, dann Lähmung der hintern Extremitäten, Vermehrung des Herzschlags, Zittern des Körpers, hastiges Athmen ein; nach 20 Minuten Lähmung der vordern Extremitäten, Unvermögen den Kopf zu halten, heftige klonische Krämpfe; nach 40 Minuten Verminderung des Herzschlags, Fortdauer der Krämpfe, grosse Beschleunigung des Athems, allgemeiner, heftiger Krampf und Tod. Giseke schließt aus seinen Versuchen, daß das Coniin analog dem Strychnin auf das Rückenmark wirke.

Geiger's Versuche \*\*) sind zwar ziemlich zahlreich, aber meistens nur an kleinen Thieren angestellt und scheinen hauptsächlich nur der Beantwortung der Frage

\*) S. Archiv XX, 97. 11. 1827.

\*\*) S. Geiger's Magazin XXXV, 72.

gelten, ob das Coniin der wirksame Bestandtheil des kochten Schierlings sei, und er fand in der That, daß die Bestandtheile des Schierlings, z. B. das Satzmehl, Eiweiß etc., aus welchen das Coniin ausgeschieden wird, und welche nicht auf Coniin reagiren, wirkungslos sind. Die Wirkungen des Coniins sind nach seinen Versuchen übereinstimmend mit denen eines aus dem ausgepressten Saft des Schierlings bereiteten Extractes. Seine Versuche, die er mit Hunden, Geier, Sperlingen, Raben, Blindschleiche, Regenwurm etc. anstellte und in welchen er als Applicationsweg allein den Schlund und Magen benutzte, zeigen, daß der Genuß des Schierlinggiftes klonische Krämpfe (oft auch, besonders bei Tauben) starrkrampfähnliche Erscheinungen zur Folge hat. Ein Hund, welcher 8 Tropfen Coniin erhalten hatte, zeigte folgende Erscheinungen: Erbrechen eines schaumigen Schleims, Schwäche der Extremitäten, allgemeine Zuckungen der Haut, heftige convulsivische Bewegungen und Tod nach 5—6 Minuten. Nach dem Tode des Thieres fand Geiger die vorher nicht verengten Pupillen erweitert: sie zogen sich jedoch nach 6 Minuten wieder zusammen. Bei der Section fand er die Zusammenziehung und Erregbarkeit des Herzes erloschen, während die Muskeln der Bewegung, Zwerghaut und der Darmkanal sich noch lebhaft zusammenzogen. Das Herz und die großen Venen waren mit Blut angefüllt, das an der Luft bald gerann. Der Magen enthielt schaumigen Schleim und war gleichmäßig geröthet. Bei einer Taube fand Geiger nach dem Tode durch Schierlinggift noch schwache Zusammenziehungen des Herzens; sie waren aber nach seiner Meinung so unbedeutend, daß sie in keinem Verhältniß zu der noch vorhandenen Wärme standen. Er

scheint demnach geglaubt zu haben, daß das Coniin zugswise lähmend auf das Herz wirke.

Coniinsalze, namentlich mit Schwefelsäure getes Coniin, hatten bei weitem nicht so starke Wirgen, als das reine Alkaloid, ja eine wilde Taube, cher er ohngefähr  $\frac{1}{3}$  Tropfen vorher mit etwas Sfelsäure gesättigtes Coniin gab, zeigte gar keine Symptome der Vergiftung, während eine Haustaube in Viertelstunde an eben so viel reinem Coniin starb. Dieser Umstand bewog Geiger zur Annahme, daß Schierling deswegen milder als sein reines Al wirke, weil dieses in jenem an eine Säure geb enthalten sei.

Foderé nahm bei seinen mit selbst bereiteten Coniin angestellten Versuchen außer tetanischen Erscheinungen eine Erweiterung der Pupille wahr; Geiger behauptet, daß weder das Coniin noch seine Salze das Auge gestrichen diese Wirkung haben und Chasson's Beobachtungen stimmen hierin mit denen Geiger's überein \*).

Die vollständigsten Beobachtungen der Coniinkung verdanken wir Christison. Es drängte sich vor Allem die Frage auf, ob die Wirkungen des Coniins übereinstimmen mit denen des Schierlings. Die Widersprüche früherer toxikologischer Schriftsteller über die Schierlingswirkung einsehend, und die Unmöglichkeit, mit Hülfe jener Schriftsteller die Frage zu beantworten, bereitete er selbst aus den grünen Blättern und Samen des Schierlings mit absolutem Alkohol Extract und fand, daß dieses wirklich vollkommen übereinstimmende Wirkungen mit dem reinen Alkaloid

---

\*) S. a. a. O.

Symptome der Wirkung des Extracts (welches er 30 Gran gab), wie des Coniins (zu einigen Tropfen) waren folgende: Lähmung der hintern, dann der vordern Extremitäten mit leichten Convulsionen, Lähmung Athmungsmuskeln der Brust und des Unterleibs, Einstellung der Thätigkeit des Zwerchfells und Tod unter diesen Umständen. Die äussern Sinne, sowie die allgemeine Empfindung schienen bis zum Tode fortzuwähren und das Herz schlug im Widerspruche mit Geiger's Beobachtungen noch lange nach dem Tode, verlor aber durch Einwirken mit dem Gifte seine Reizbarkeit, nachdem es vorher noch einige Male stärker zusammengezogen wurde. Das Nämliche beobachtete Christison bei der Reizung der Gedärme. Die Reizbarkeit der willkührlichen Muskeln dauerte, wie die der unwillkührlichen, eine Zeit nach dem Tode fort. Die linke und rechte Herzkammer und die grossen Venenstämme waren mit dunklem Blute gefüllt, das an der Luft bald coagulirte (\*). Durch künstlich unterstütztes Athmen erhielt Christison ein durch 7 Tropfen Coniin vergiftetes Thierchen vom Augenblicke an als dem Thiere der Erstungstod nahe stand, noch eine Stunde lang am Leben. Die Schnelligkeit der Wirkung des Coniins fand Christison verschieden je nach der Art der Application des Giftes; blitzähnlich tödtete es, wenn es in die Lungen eingespritzt wurde.

Die Behauptung Geiger's, dass Coniinsalze nicht

---

Hiermit widerrief Christison seine frühere Behauptung, dass das Blut nach Schierlingsvergiftungen ungemein flüssig und nicht gerinnbar sei. S. *Abhandlung über die Gifte von R. Christison. Aus dem Englischen. Weimar 1831.* Auch Sobernheim führt diese Dünnsflüssigkeit des Bluts nach Schierlingsvergiftungen an. S. *Handbuch der practischen Toxikologie von Sobernheim und Simon. Berlin 1838. S. 595 ff.*



so wirksam seien, als das reine Coniin, fand Christ nicht begründet; er fand sogar, daß diese Salze, namentlich mit Salzsäure gesättigtes Coniin, noch intensiver wirken, als das reine Alkaloid, rechtfertigt also in Bezug auf Coniin die Erfahrung, daß Alkaloide ihrer Wirksamkeit nicht verlieren, wenn sie mit Säure gesättigt sind.

Die Thiere, womit Christison experimentirte waren: Hunde, Katzen, Kaninchen, Frösche, Floh, Igel etc.; seine Applicationswege: der Magen, die Bauchhöhle, das Zellgewebe unter der Haut, die Conjunctiva des Auges, die Venen, die Lungen.

### Beobachtungen des Verfassers.

#### I. Versuche mit Coniin an Thieren.

##### *Erster Versuch.*

Einem 3 Wochen alten Hunde wurden 30 Tropfen weingeistiger Auflösung des Coniins (10 Gran Coniin waren in 190 Gran Alkohol gelöst) durch eine kleine Oeffnung in die Brusthöhle gegossen. Schon in 1 Minute fiel das Thier nieder und es stellten sich kleine Krämpfe der Extremitäten zugleich mit etwas Erbrechen und Urinabgang und etwas Schaum am Maule ein. Die Krämpfe setzten oft aus und wiederholten sich freiwillig und nach Berührung des Thieres. Während der Intermissionen der Krämpfe riß es öfters das Maul. Nach 4 Minuten lag das Thier auf der Seite und nachwärts gestreckt; nach 5 Minuten war es todt. Bei der Eröffnung der Bauchhöhle bemerkte man peristaltische Bewegung der Gedärme, die bedeutend vermehrt wurde durch Betupfen des *plenus coeliacus* und *mesentericus* mit *Kali causticum*. Das Herz zog sich noch zusammen; galvanischer Reiz des *Nervus phrenicus* bewirkte



ine Zuckungen des Zwergfells (wohl deswegen, weil die Pole auf den Nerven applicirt wurden und nicht eine auf das Zwergfell selbst, der andere auf den Nerven). Die Pupille war nicht erweitert \*).

### Zweiter Versuch.

Einem starken Frosche wurden 15 Tropfen der nämlichen Lösung durch eine kleine Oeffnung in die Bauchhöhle gegossen. Nach einer Minute entstanden Zuckun-

Hierzu wurde ein vergleichender Versuch mit Strychnin gemacht. Einem Hündchen von demselben Wurf wurden 20 Tropfen wässrige Strychninlösung (2 Gran Strychnin waren in einer Drachme Wasser gelöst) durch das Maul eingegeben; worauf sich ausser reichlicher Darmentleerung (nach 5 Minuten) und allgemeinem Zittern nichts einstellte. Nach einer Viertelstunde wurden dem Thiere 25 Tropfen weingeistige Lösung des Strychnin (20 Gran Strychnin waren in 180 Gran Weingeist gelöst) in eine Hautwunde an der Brust gebracht, worauf abermals keine Folgen eintreten. Nach abermals einer Viertelstunde wurde die Brustwunde vertieft und penetrirend gemacht, und 25 Tropfen der letztern Lösung in die Brusthöhle gegossen und sogleich nach einer halben Minute traten tetanische Krämpfe ein. Die Vorder- und Hinterfüsse wurden zu gleicher Zeit öfters stofsweise zurückgerissen, wobei deutlich wahrnehmbar war, dafs dazwischen keine Attraction, sondern nur Nachlaß der Expansion statt fand. Es erfolgte Trismus, Tetanus, viel Speichelabgang, grofse Erweiterung der Pupille. Die Krämpfe, welche oft aussetzten, konnten nach Belieben durch Berührung des Thiers oder Bewegung seiner Unterlage erneuert werden. Nach 10 Minuten war das Thier todt. Bei der Section war die Bewegung der Gedärme noch vorhanden und man konnte sie durch Betupfen der Nervengeflechte des Unterleibs durch *Kali causticum* vermehren. Die Herzbewegung war 30 Minuten nach der letzten Vergiftung des Thiers noch vorhanden, eben so die Reizbarkeit des *Nerv. phrenicus*. Die Vorderfüsse zuckten auf angebrachten galvanischen Reiz der Nerven nicht mehr, doch war der Versuch undeutlich durch Verletzung der *Vena subclavia* und Blutextravasat.

gen, Lähmung und auſſer öfterem Aufheben des K und mühsamen Schlucken war keine Spur des Ath mehr vorhanden; nach 3 Minuten Tod. Galvan Reiz der Unterleibsschenkelnerven bewirkte noch nach dem Tode Zuckungen des entsprechenden Sche Das Herz schlug von selbst noch lange Zeit fort.

*Dritter Versuch.*

Einem ausgewachsenen kleinen Hunde wurden eine kleine seitliche Oeffnung 3 Tropfen Coniin in Weingeist aufgelöst in die Brusthöhle gegossen. Sod entleerte er etwas Koth und Harn, hatte weissen Scha am Maule. Nach einer halben Minute stellten sich klonische Krämpfe ganz nach Art der im ersten Vers angegebenen ein; er stiefs den Kopf mehrmals auf den Tisch, fiel nieder und bald konnte man Spur des vorher kurzen und beschleunigten Ath mehr wahrnehmen; doch fühlte die an den Thorax legte Hand heftigen Herzschlag. Die Augen blieben die Pupille wurde nicht erweitert; allmählig g die heftigen, intermittirenden, klonischen Krämpf schwächer und schwächer werdende Zuckungen Nach 5 Minuten war kein Lebenszeichen mehr vorhanden. Bei der sogleich angestellten Section fand beide Vorkammern und Kammern des Herzens ges voll dunklen Blutes, eben so die grossen Arterien Venen. Das Herz zog sich nicht mehr zusammen, entleerte Blut gerann an der Luft bald. Das Zwer zuckte auf angebrachten galvanischen Reiz, wenn den einen Pol an dasselbe, den andern an den *Nephrenicus* brachte. Wurmformige Bewegung war bei der Herausnahme der Gedärme zu bemerken. Stelle der Lunge war der Wunde im Thorax gegen deutlich und abgegrenzt geröthet.

*Vierter Versuch.*

Einem starken Kaninchen wurden 3 Tropfen Coniin das rechte Auge gebracht, worauf sich Thränen, Röthe der Conjunctiva, Mattheit der Cornea und Verengung der Pupille einstellten. Nach 3 Minuten allgemeine tonische Krämpfe, starkes Schlagen des Herzens; die auf die Brust gelegte Hand konnte kaum eine Spur von Widerstand empfinden, obgleich die Muskeln der Nase in voller Thätigkeit waren. Die hintern und dann die vordern Extremitäten zeigten bald einen hohen Grad von Lähmung, denn das Thier konnte seine offenbaren Absicht zum Fortlaufen nicht ausführen. Die Pupille des rechten Auges war noch verengert, die des linken 3mal; das Thier rifs das Maul öfters auf. Nach 9 Minuten trat der Tod ein und man fand sogleich, daß die Pupille des rechten Auges wieder etwas weiter, jedoch immer noch enger als die des linken war.

Bei der Section fand man Bewegung der Gedärme, kräftige Zusammenziehungen des Herzens und Verstärkung derselben durch Betupfen mit *Kali causticum*, Reizungen des Zwergfells auf angebrachten galvanischen Stichen. Beide Herzkammern gefüllt mit dunklem, gerinnbarem Blute.

*Fünfter Versuch.*

Drei Tropfen Coniin wurden einer *Coluber natrix* von bedeutender Gröfse durch eine Wunde in die Bauchhöhle gegossen. Nach 5 Minuten nahm man verminderte Beweglichkeit, Unvermögen den Kopf in die Höhe zu halten wahr, und nach 6 Minuten war das Thier todt.

*Sechster Versuch.*

Einem Hündchen von 7 Tagen wurden 3 Tropfen Coniin durch eine Wunde in die Brusthöhle gegossen.



Es erfolgte etwas Urin- und Kothabgang und nach 1 Secunden schneller Tod ohne auffallende Erscheinungen.

### *Siebenter Versuch.*

Einem ausgewachsenen Hunde von mehr als mittlerer Gröfse wurden 5 Tropfen Coniin auf ein atonisches Geschwür im Nacken geträufelt. Ausser öfterem Gähnen und Schütteln bemerkte man innerhalb einer Viertelstunde darauf nichts an ihm. Hierauf wurde das Geschwür durch eine oberflächliche Wunde erweitert und wieder 5 Tropfen Coniin darauf geträufelt; man konnte abermals während einer Viertelstunde keine Vergiftungssymptome wahrnehmen. Durch eine gemachte penetrierende Wunde wurden darauf 3 Tropfen Coniin in die Brusthöhle gebracht. Nach 50 Secunden schon zeigte sich Schwäche der Extremitäten und kurz darauf sprang das Thier in einem Krampfanfall in die Höhe, fiel wieder und hatte von nun an die charakteristischen klopfenden Krämpfe. Zuweilen versuchte das Thier aufzuspringen, fiel aber unter heftigen Krämpfen wieder auf die Seite. Zehn Minuten nach der letzten Application des Gifts bemerkte man öftere Anstrengung des Thieres zum Athmen, indem das Thier den Kopf öfters einwärts rifs und schnappende Bewegungen machte. Nach

---

\*) Auch hierzu wurde ein vergleichender Versuch mit einer Brucinauflösung, welche in 200 Gran Gewichts 196 Gran Weingeist und 4 Gran Brucin enthielt, gemacht. Ein Hündchen von demselben Wurf wurde 50 Tropfen davon durch eine Wunde in die Brusthöhle gebracht. Nach neunzig Secunden erfolgten deutliche tetanische Krämpfe ganz ähnlich denen nach Strychninvergiftung, doch schwächer. Der Tod erfolgte nach mehr als 10 Minuten noch nicht. Die Section wurde bei noch vorhandenen Zuckungen gemacht, und peristaltische Bewegung der Därme, Zusammenziehen des Herzens, kein Zucken des Zwerghells auf angebrachten galvanischen Reiz bemerkbar.

nten bewegten sich die Augenlieder noch, wenn man der Hand schnell an den Augen vorüberfuhr, während die Muskeln der Extremitäten nur durch Zuckungen noch Spuren der Lebendigkeit gaben. Nach 18 Minuten erfolgte der Tod unter Zuckungen aller Muskeln. Gleich im Anfange der Wirkung des Giftes erfolgte Sal- und Kothausleerung. Von dem ersten ging während der Wirkung des Giftes eine große Menge in fünfzig Ausleerungen ab und doch fand man die Blase der Section noch gespannt voll \*). Die übrigen Ergebnisse der Section waren die gewöhnlichen.

#### *Achter Versuch.*

Achtzig Tropfen der im ersten Versuche angegebene Lösung wurden einem halbjährigen Ziegenbock durch Maul eingegossen. Nach 5 Minuten zeigte sich Unruhe und Schwäche der Beine. Nach 6 Minuten wurden noch 30 Tropfen auf die nämliche Weise eingegeben; nach 10 Minuten schleppte das Thier die Beine, setzte kurz und schnell, streckte die Hinterbeine aus, setzte sich nieder; nach 18 Minuten stand es bei Annäherung des Menschen mit Mühe auf, stand mit ausgespreizten Beinen, die es von Zeit zu Zeit abwechselnd aufhob und niederstauchte. Die Empfindung war noch so lebhaft, daß das Thier selbst eine Fliege, die sich an seinem Bauche niedergelassen hatte, zu verscheuchen suchte. Es versuchte auch seinen Hals zu kratzen, konnte

---

Das *Pancreas Aselli* fand man bei diesem Hunde fast so groß als zwei mächtige Fäuste, fluctuirend. Nach einem Einschnitt in dasselbe floss eine Masse seröser, weißlicher Flüssigkeit, mit weißen Flocken ab. Sowohl die Flüssigkeit als die Flocken zeigten unter dem Mikroskop schöne Krystalle von rhombischer Form. Der Hund hatte einige Stunden vor dem Versuche Milch genossen.



aber das dazu erforderliche Hinterbein nicht bis an Hals heben und liefs es wieder fallen. Nach 24 Minuten erhielt das Thier abermals 30 Tropfen, wovon es jedoch nach einigen Minuten durch Erbrechen vom übrigen Schleim befreite. Die angegebenen Erscheinungen dauerten fort; 35 Minuten nach der ersten Application des Giftes zählte man 130maliges, kurzes, minimalathmen in einer Minute; das Thier lag beständig, erhob sich jedoch wieder langsam bei Annäherung Menschen; die Empfindung auch bei der geringsten Reizung der Haut dauerte fort. Der Bauch war 15 Minuten nach Einbringung der ersten Dosis an bis zu einer Stunde stark aufgetrieben. Das vorher ganz muntere und gesunde Thier frafs 2 Tage lang nichts, während dieser Zeit fast beständig und erholte sich langsam zu seiner vorigen Gesundheit \*).

#### *Neunter Versuch.*

Zwei Fröschen wurde das Herz durch vorsichtig in der Gegend dieses Organs gemachte Wunden durchschnitten und dem einen hierauf sogleich durch die Wunde 12 Tropfen der im ersten Versuch angegebenen Lösung eingeträufelt. Es stellte sich durchaus kein Symptom der Vergiftung ein. Beide Frösche waren dreistunden nach Ausschneidung ihrer Herzen und Application des Giftes in die Eingeweidehöhle des einen selbst noch nicht todt, während ein dritter Frosch, der den im zweiten Versuch angegebenen Erscheinungen

---

\*) Es muß bemerkt werden, daß das zu diesem Versuche verwendete Präparat bereits 3 Monate in einem Gläschen zwar mit einem eingeriebenen Glasstöpsel versehen, nicht voll war, aufbewahrt worden war. Wässrige alkalische Lösung entwickelte einen bei weitem nicht so starken Coniingeruch daraus als früher.

Minuten nach Einträufung von 12 Tropfen der angegebenen weingeistigen Lösung in die Bauchhöhle kein Lebenszeichen mehr wahrnehmen liefs. Dieser Versuch wurde wiederholt dieselben Resultate.

*Zehnter Versuch.*

Zwanzig Tropfen Coniin mit 10 Tropfen Essigsäure versetzt, wurden mit destillirtem Wasser auf 100 Gran wichts verdünnt und davon einem Frosche 6 Tropfen durch eine gemachte Oeffnung in die Bauchhöhle gegossen. Nach 4 Minuten waren die Extremitäten gelähmt, nach 5 Minuten traten Zuckungen ein und nach 7 Minuten waren alle äusserlich wahrnehmbaren Zeichen des Todes vorhanden. Man fand bei der Section Reizbarkeit der Muskeln; Pulsiren des Herzens durch unmittelbare Application des Coniins verstärkt, nach einigen Stunden noch noch nicht aufgehoben.

*Elfter Versuch.*

Zwanzig Tropfen des im vorigen Versuch angegebenen Diluts liefs man einem starken Kaninchen in den vordern Theil der Mundhöhle fallen. Nach 2 Minuten traten unter etwas Urin- und Kothabgang starke convulsive Krämpfe ein; das Thier fiel nieder, zog die Hinterbeine an und verfiel von Zeit zu Zeit in klonische Krämpfe. Nach 8 Minuten starb das Thier unter Zuckungen und Kinnbackenkrämpfen und öfterm Schnappen oder Schluchzen. Bei der Section fand sich Bewegung der Gedärme, die nach Aufträufung von Coniin andauerte, eben so durch unmittelbare Coniinapplication auf das Herz nicht gestörte Zusammenziehung desselben. Die willkürlichen Muskeln zuckten bei ihrer Durchschneidung, die unwillkürlichen durch angebrachten galvanischen Reiz.

*Zwölfter Versuch.*

Drei Tropfen Coniin wurden, mit 7 Tropfen Phosphorsäure versetzt, einem kleinen ausgewachsenen Hund in den Schlund geträufelt, worauf nach einer Minute Ausspreizen und Schwäche der Extremitäten, nach vier Minuten Erbrechen eines schaumigen Schleims und heftige klonische Krämpfe, nach 8 Minuten der Tod mit allgemeinen Zuckungen eintraten. Die Resultate der Section waren die im vorigen Versuch angegebenen.

*Dreizehnter Versuch.*

Einem Frosche wurde der Kopf abgeschnitten und hierauf sogleich etwas Coniin auf die Schnittfläche des Rückenmarks gestrichen. Anfangs war das Thier ruhig, nach 2 Minuten jedoch entstanden heftige Convulsionen, die Beine und alle Zehenglieder zuckten heftig. Nach dem Tode des Thieres (nach 4 Minuten) lagen die hinteren Extremitäten in Folge der Krämpfe nach vorwärts. Ein anderer Frosch, dem ebenfalls der Kopf abgeschnitten war, starb ohne eine Coniinapplication erst nach länger als einer Stunde.

*Vierzehnter Versuch.*

Ein halber Tropfen der im ersten Versuch angegebenen Coniinlösung wurde einem Kaninchen in das Auge gestrichen. Es erfolgte Thränenerguss, Röthe der Conjunctiva aber weder augenblicklich noch im Verlauf von einigen Stunden Erweiterung der Pupille.

*II. Beobachtungen der Coniinwirkung am Menschen.*

Während der Bereitung der bei der Beschreibung der Versuche an Thieren verwendeten Coniinlösung verursachte der eigenthümliche, durchdringende Geruch des Coniins mehreren dabei Anwesenden einen drückenden



opfschmerz in der Supraorbitalgegend, der bei mir selbst mehre Stunden anhielt.

Ich verdünnte einen Tropfen Coniin mit 99 Tropfen proc. Alkohols und nahm davon einen Tropfen ohne Auser dem widerlichen Geschmack des Coniins die gegebenen Beschwerden darauf zu fühlen. Vier Tropfen des Diluts, nach einigen Tagen genommen, hatten ebenfalls keine Folgen; 25 Tropfen abermals einige Tage nach den vorigen genommen, verursachten mir einen heftigen Schwindel mit dem Gefühle auffallender Schwere der Beine und Arme, besonders des linken Arms. Der Schwindel verschwand nach einigen Minuten wieder, das Gefühl der Schwere aber dauerte länger als eine Viertelstunde an. Der Puls, welcher vorher voll und kräftig war und 70 Schläge in der Minute gemacht hatte, war 10 Minuten nach Verschluckung des Giftes auffallend klein und machte nur 59 Schläge, nach 24 Minuten wieder 68 in der Minute und nach einer halben Stunde kehrte er in Völle und Zahl wieder seine vorherige Normalität.

Zwei Tage darauf nahm ich 50 Tropfen der nämlichen Lösung und schon nach 6 Minuten kehrte das Gefühl der Schwere, besonders des linken Arms, zurück und ein eignes Gefühl des Mißbehagens stellte sich ein. Der Puls, welcher vorher 72 Schläge in der Minute gemacht hatte, war nach 6 Minuten auf 62 und nach 8 Minuten auf 60 Schläge in der Minute gefallen, stieg aber nun an bis er nach einer halben Stunde die vorige Völle und Zahl wieder hatte. Das Gefühl der Schwere und des Mißbehagens verlief mich erst nach und nach und war nach einer halben Stunde noch nicht ganz verschwunden. Nach 3 Stunden empfand ich einen Schmerz in der linken Lumbalgegend, ähnlich dem durch einen

leichten Rheumatismus, der über zwei Stunden and und allmählig verschwand. Ob dieser Schmerz Folge Coniininwirkung war, kann ich nicht verbürgen, aber ist es, daß ich diesen Schmerz in jener Gegend des Körpers nie vorher empfunden hatte.

Eine Erweiterung der Pupille bemerkte ich in allen diesen Beobachtungen und Versuchen nicht.

Zur Zeit dieser Versuche war ich gesund und kräftig.

### *Schlussbemerkung.*

Nach diesen und den früheren Beobachtungen über die Coniininwirkung kann als Resultat etwa Folgendes gesehen werden:

Das Coniin wirkt auf zweierlei Art auf den menschlichen Organismus: 1) auf eine directe, 2) auf eine indirecte.

Die directe Wirkung des Coniins ist die unheimlichere, durch seine Schärfe als örtlicher Reiz ausgeübt. Es bewirkt Röthe, Schmerz, der damit unmittelbar nach Berührung kommenden gefäße- und nervenreichen Theile afficirt die Drüsen und bethätigt deren Function, verursacht durch seinen durchdringenden Geruch Kopfschmerz durch seinen widerlichen Geschmack Ekel und Erbrechen.

Die zweite oder indirecte Wirkung des Coniins ist seine vergiftende. Folgende Punkte sind darüber nützlich zu bemerken.

1) Die giftige Wirkung des Coniins stimmt überein mit den Versuchen Geiger's, Foderé's u. Christison's mit dem des gefleckten Schierlings oder wenigstens des aus ihm auf zweckmäßige Weise bereiteten Extracts überein.

2) Alle Thiere, an denen bis jetzt das Coniin ver-



e, also der Hund, die Katze, der Ziegenbock, das  
 schen, die Maus, der Geier, der Sperling, die Taube,  
 rosch, die Blindschleiche, die Natter, die Fliege,  
 loh, der Regenwurm können durch Coniin vergif-  
 erden. Der von mir vorgenommene Versuch mit  
 Ziegenbock zeigt doch deutlich, obgleich er we-  
 er theilweisen Zersetzung des Giftes den Tod des  
 es nicht zur Folge hatte, daß auch dieses Thier  
 en vergiftenden Wirkungen des Coniins nicht aus-  
 men ist. Daß es auch für den Menschen ein  
 : feines und schnell tödtendes Gift sei, beweisen  
 irkungen des gefleckten Schierlings auf den Men-  
 und die analogen Wirkungen des Coniins auf  
 e, besonders Säugethiere.

) Das Coniin wirkt schon in sehr kleinen Dosen  
 (einigen Tropfen) tödtlich und seine Salze sind nicht  
 r wirksam.

) Schwäche, klonische Krämpfe und Lähmung der  
 n und vordern Extremitäten, Lähmung der Ath-  
 muskeln der Brust und des Unterleibs, Lähmung  
 wergfells und Tod unter Zuckungen sind die haupt-  
 chsten Symptome der Coniinwirkung. Christi-  
 ah nur zuweilen schwache Convulsionen, Foderé  
 sche, Geiger zuweilen tetanische, zuweilen klo-  
 nische Krämpfe, ich hingegen in den bei weitem mei-  
 sten Fällen starke, klonische, nie tetanische der Strych-  
 nung ähnliche Krämpfe, und der Hund (siehe den  
 Versuch), der nach dem Tode durch Coniin rück-  
 gestreckt da lag, war offenbar nur durch seine  
 hungen zum Athmen in diese Lage gekommen.

) Der Tod erfolgt durch Aufhören der Thätigkeit  
 Nerven. Man könnte annehmen, daß der Tod  
 hst durch Erstickung nach Lähmung der Athmungs-

muskeln eintritt, wenn man die Bemühung vergifteter Thiere zu athmen beachtet; aber Frösche sterben an Coniin schon in einigen Minuten und doch können sie nach Johannes Müller 12 Stunden im reinen Wasserstoffgas, also ohne zu athmen, leben.

6) Durch künstlich unterhaltenes Athmen scheint das Leben nach Coniinvergiftung noch einige Zeit erhalten werden zu können. Die Erklärung dieses von Christison entdeckten Phänomens ist wohl in der Wechselwirkung des Blutes und der Nerven auf einander zu suchen. Indem die chemische Umwandlung des Blutes in den Lungen und die Circulation fort dauert, wird die drohende Lähmung des Nervensystems noch einige Zeit hinausgeschoben.

7) Der Heerd der Wirkung des Coniins ist vorzüglich das Rückenmark, und insbesondere der Theil des Rückenmarks, welcher der Bewegung vorsteht. Die Empfindung ist noch vorhanden, wenn jede Bewegung schon aufgehört hat; die Gehirnbewegungsnerven bleiben länger in Thätigkeit, als die Rückenmarksbewegungsnerven und die äußern Sinne scheinen der Coniinwirkung am fernsten zu stehen.

8) Die Reizbarkeit der willkürlichen und unwillkürlichen Muskeln ist nach dem Tode durch Coniin noch vorhanden, und am längsten dauert die Reizbarkeit des Herzens, welches von selbst noch lange fortschlägt nachdem oft die Reizbarkeit anderer Muskeln schon aufgehört hat.

9) Die Pupille wird durch jedwelche Art der Application des Coniins nicht erweitert. Foderé will Erweiterung der Pupille nach Coniinvergiftungen wahrgenommen haben, und in der *medizinischen Vereinszeitung* Nr. 52. 1837, ist angegeben, Hr. Apotheker Tromm-

orff in Erfurt habe bei der Bereitung des Coniins durch die blofse Ausdünstung desselben eine grofse Erweiterung der Pupillen erlitten. Geiger's und Christin's Beobachtungen sind dem ganz entgegen und ich mit Ausnahme der bei jeder Todesart vor dem Tode eintretenden und nach demselben wieder verschwindenden Erweiterung der Pupille, nie diese Erscheinung bei Coniinvergiftung.

10) Die Schnelligkeit der giftigen Wirkungen des Coniins steht im geraden Verhältniß mit der Schnelligkeit der Aufnahme desselben in die Blutmasse. Blitzartig tödtet es, nach Christison, wenn es unmittelbar in die Venen gelangt, sehr schnell, wenn es von der Wundhöhle aus absorbirt wird, weniger schnell, wenn es zuerst in den Magen und in das Zellgewebe unter der Haut gelangt. Die Erklärung der blitzähnlichen Wirkung des Coniins ist nicht leicht. Da man nicht annehmen kann, dafs es in so grofser Schnelligkeit in so kurzer Distanz zum Rückenmark gelangen könne, so hat man angenommen \*), dafs in die Blutgefäfsse gelangte Coniin seine Wirkung durch die Nerven der Gefäfsverbindungen fort und Sobernheim wendet dagegen \*\*), dafs nach Sömmerring die innere Membran der Gefäfsse keine Nerven habe, dafs nach Versuchen von Barry und Bouillard eine Vergiftung durch Cyanwasserstoffsäure nicht erfolgte, sobald die Resorption des Giftes durch Application von Schröpfköpfen auf eine vergiftete Wunde verhindert wurde, und dafs, nach dem

\*) S. die neuesten Entdeckungen in der *Materia medica*, von Dr. J. H. Dierbach. Zweite Ausgabe. Erster Band. Heidelberg und Leipzig 1837.

\*\*) Handbuch der practischen Toxikologie von Sobernheim und Simon. Berlin 1838. S. 595 ff.



von Herr bestätigten Experimente Foderé's, Vergiftung entstand, wenn auch beide Enden eines dem Gift ausgesetzten Arterienstücks unterbunden waren. Gegen diese Einwürfe Sobernheim's auf obige Theorie kann man jedoch sagen: 1) daß Sömmerring die mikroskopische Anatomie noch nicht kannte, nach welcher auch die innern Gefäßmembranen Nerven haben; 2) daß wenn die Application von Schröpfköpfen Absorption des Giftes verhinderte, auch die Fortleitung durch die innere Gefäßmembran wegfiel, mithin keine Vergiftung entstehen konnte; 3) daß das Gift selbst aus dem unterbundenen Arterienstücke absorbirt und der Blutmasse zugeführt werden konnte, wenn dieses Arterienstück nicht in seiner ganzen Continuität von den dasselbe umgebenden Theilen isolirt war.

Zu obiger Theorie der Fortleitung der Coniinwirkung durch die Gefäßwandungen sind jedoch die Fragen zu stellen: warum sollen nur die Nerven der Gefäßwandungen und nicht auch andere diese Fähigkeit der Fortleitung haben? und warum wirkt das Gift nicht schneller auf den gewöhnlichen Wegen, wenn man (wie im dreizehnten Versuch) das Coniin selbst auf die Substanz der Rückenmarks applicirt?

Da man nicht leicht eine Erscheinung wahrnimmt, ohne sich diese auch sofort erklären zu wollen, so erlaubt es mir, zu der vorhandenen Hypothese noch einiges hinzuzufügen. Gewiß ist, daß das Coniin erst nach seiner Aufnahme in das Blut giftig wirkt. Wer daran zweifelt, den verweise ich auf Christison's und meine Erfahrungen über die verschiedene Schnelligkeit der Coniinwirkung je nach der kürzer oder länger dauernden Absorption und Aufnahme des Giftes in das Blut, und besonders auf meinen neunten Versuch, nach welchem

ch Unterbrechung des Blutumlaufs keine Vergiftung  
tt finden kann. Sollte nun nicht anzunehmen sein,  
s die Blutmasse in Berührung mit Coniin gebracht,  
nell eine für das Nervensystem specifisch verderb-  
he Umwandlung erleide? Freilich müßte aber diese  
Umwandlung des Blutes erst nachgewiesen werden. Bis  
st hat man keine weitem Veränderungen in dem  
te der durch Coniin vergifteten Thiere wahrgenom-  
n, als die durch das Aufhören der chemischen Um-  
ndlung in den Lungen bedingte Venosität des Blutes  
der linken Hälfte des Herzens; selbst das Coniin  
nte man in dem Blute der durch dasselbe vergifte-  
Thiere durch die gewöhnlichen Reagentien nicht  
decken.

---

## Kupfervergiftung vermittelt Käse und gute Wirkung des Eiweißes dagegen;

von

*Dr. Schlothane* in Driburg.

---

Die Magd der Schumacherfamilie W. in P. wärmte  
re Milch in einem kupfernen Kessel, liefs selbe darin  
halten, und setzte sie durchgeseiht an einem warmen  
te in einem hölzernen Geschirr der Fäulniß aus. Als  
rauf das Mädchen nach einiger Zeit die Masse zur  
nd nahm und Käse daraus formte, nahm jeder der  
milie einen Käse für sich zum Frühstück. Der äl-  
he Vater und jüngere Sohn fanden Ekel dagegen und  
achen das Genossene bald wieder aus; zwei andere  
loch verzehrten jeder einen Käse. Diese beiden letz-  
n bekamen mehrere Stunden nach dem Genuß Uebel-  
it und kolikartige Schmerzen im Leibe, die sich nach



und nach vermehrten, und in Erbrechen einer grasgrünen schleimigen Masse mit reissenden schneidenden Schmerzen, öfterm Stuhlgang und Abgang einer dünnen, anfangs grünlichen, später selbst etwas röthlichen Masse übergingen. Diesen gesellten sich Mattigkeit und Schwere in den Beinen hinzu, so wie Ziehen in den Waden; das Gesicht wurde graugelb, eingefallen; die Augen traten in ihre Höhlen mehr zurück und wurden mit blauen Ringen umgeben; der Puls wurde klein, unrythmisch und Urin ging wenig ab. Der Vater und jüngere Sohn erhielten zur Vorsicht ein volles Brechmittel, worauf eine copiose Entleerung statt fand und bald alle Beschwerden verschwanden; den beiden wirklich Vergifteten wurde viel laues Getränk mit Eiweiss gereicht, worauf das Erbrechen reichlich fort dauerte; hinterher erhielten sie Eiweiss und Zuckerwasser, worauf der Zustand sich bald besserte; gegen die gastroarterischen Zufälle that später eine Mandelemulsion gut, nebst Blutegel auf den Leib und ein Breiumschlag aus *Herb. Conii*, *Hyosc.* und Mehl; gegen das Wadenziehen wurde eine Liniment aus *Ol. Terebinth.*, *Liquor. Amm. caustici* mit etwas Kampher mit Nutzen angewandt. Es blieb aber noch lange Zeit eine grosse Empfindlichkeit des Darmkanals zurück, die sich bald durch Druck nach dem Genuß von Speisen, bald durch Erbrechen oder Durchfälle kund gab und erst nach längerem Gebrauch des Opiums mit Schleichwuch.

---

## Untersuchung von Oblaten, die mit Mennig gefärbt sind;

von

*A. Lipowitz, Apotheker zu Lissa.*

In vielen Gegenden, besonders katholischen, werden Oblaten, sowohl rothe als weisse, mit Bildern versehen, zum Verkauf als auch zum Geschenk gefertigt, und dann nur zu häufig von Kindern gegessen werden. Vor längerer Zeit erhielt ich solche rothgefärbte Oblaten von einem Kirchendiener als Prätium, und als ich dieselben am Lichte verbrannte, fielen kleine reducirte Kugeln auf das untergelegte Papier, wodurch sich die Färbung mit Mennige kund gab. Vor Kurzem sah ich von einem Kinde eine solche Oblate verschlucken, und nahm den übrigen Theil derselben, ungefähr 2  $\square$  Zoll davon nach Hause, um die quantitative Menge des Bleies darin zu bestimmen.

Obiges Stück wog 2,07 Grm., und gab nach dem Verbrennen im Porcellantiegel reducirtes und oxydirtes Blei im Gewichte von 0,697 Grm. Um mich noch gewisser von der Quantität des Bleies zu überzeugen, löste ich dasselbe auf, präcipitirte es als oxalsaures Bleioxyd, und nach vorsichtigem Glühen erhielt ich 0,70 Grm. Bleioxyd, welches einem Gewichte von 0,716 Grm. Mennig ( $\text{Bi} + \text{Pb}$ ) entspricht. Hundert Gewichtstheile enthalten somit 34,6 Theile Mennig. Da die hier gebräuchlichen Oblaten eine Länge von 6 Zoll und Breite von 1 Zoll haben, so hatte das Kind den grössten Theil zu sich genommen, der ungefähr 2,506 Grm. beträgt, also mehr als eine halbe Drachme. Zwar habe ich hier von einem Vergiftungsfalle gehört; unmöglich können aber solche Genüsse ohne Folgen bleiben, und führen sicher

oft den Grund zu Krankheiten, deren Symptome Arzt schwer zu einer richtigen Diagnose gelassen lassen.

Bei dieser Gelegenheit führe ich zugleich an, lobenswerth es ist, daß viele Regierungen über den Verkauf der Gifte, als Färbemittel, in neuerer Zeit zu denken anfangen. Daher finde ich es eben so billig, man darauf dringt, die Pappschachteln und Convolver der Apotheker sollen aus mit unschädlichen Pflanzen ben gefärbten Papieren beklebt sein, denn diese Schachteln etc. werden oft von Kindern, wie auch ein Beispiels im vorigen Jahre es lehrte, zum Spielwerk benutzt, im Munde die Farbe beim Käuen aufgenommen. Verwechseln gleich die Kästchen an ihrem äußern Ansehen etc. so wird sich dieses durch schöne Pressungen etc. ersetzen lassen und so der Eleganz kein Abbruch geschehen.



## Bemerkungen über die Charactere der Arsenikvergiftung.

Ueber die Arsenikvergiftung hat Novati Versuche an Thieren angestellt, mehr in klinischer als in chemischer Beziehung, und ist zu dem Schluß gelangt, wie mehre Beobachter neuerer Zeit, daß man sich sehr mit der localen oder physico-chemischen Action des Giftes beschäftigt und darüber die dynamische Action vernachlässigt habe. Ohne diese Erwägung würde sich die Behandlung der Vergiftung sehr beschränken, denn von dem Moment, wo das Gift seinen dynamischen Effect ausübt, und schon in das Blut übergegangen wären, würden die neutralisirenden Mittel wenig mehr leisten.

Wie dem auch sei, es wird angemessen sein, un-  
mittelbar zu neutralisirenden chemischen und ausleeren-  
den Mitteln seine Zuflucht zu nehmen, wenn das Gift  
schon den Nahrungskanal eingeführt wurde, um auf den  
nicht resorbirten Theil zu wirken. Der nächste  
Zweck ist dann die Zerstörung des dynamischen Effects  
hierauf die der localen Wirkung.

Die Zerstörung der dynamischen Wirkungen kann  
in so weit durch die Mittel der Kunst gelingen,  
die Natur derselben genau erkannt ist, und ihre Hef-  
igkeit eine gewisse Grenze nicht überschreitet. In die-  
ser Beziehung macht das Studium der Gifte einen wich-  
tigen Theil der pathologischen Physiologie und Therapie  
aus. Dieser Gesichtspunct ist es, den Novati bei sei-  
nen Versuchen über Arsenik verfolgt.

Der erste bemerkenswerthe Umstand bei der Arse-  
nvergiftung, unabhängig von dem Erbrechen und den  
Stühleerungen, ist die außerordentliche Erschlaffung und  
Kleinheit des Pulses, so daß, wenn der Tod erfolgt,  
der Epoche der entzündlichen Reaction, in Folge  
des durch das Gift im Munde, Pharynx, Oesophagus,  
hervorgebrachten Cauterisationen, der Kranke  
in einem Zustande völliger Erschöpfung der Lebenskraft  
liegt. Rasori vergleicht den Tod durch Arsenik mit  
dem durch Blutungen. Wenn diese Angaben richtig  
sind, wie es die Versuche von Novati und Giacomini  
beweisen scheinen, so würden als die eigentlichen  
Mittel zur Bekämpfung der dynamischen Wirkungen des  
Arseniks im Allgemeinen Stimulantia angezeigt sein (Am-  
moniak, Aether, Alkohol, Opium, Zimmt u. s. w.), dann  
sind die durch die Aufätzungen entstandenen Wir-  
kungen, gegen die eine antiphlogistische Behandlung an-  
zuwenden werden muß.



Einen weitem wichtigen Umstand bei der Arsenikvergiftung bietet nach Novati das Blut dar. Es scheint flüssig und sehr schwarz, wie bei Cholerae. Ein solcher Umstand erfordert Aufmerksamkeit und schon eine Arsenikvergiftung vermuthen lassen. Doctoren Capsoni und Casorati faßten hierauf Bedacht, bei der Section des Leichnams eines ge- Catassi, und die geforderte gerichtliche Untersuchung bestätigte solchen. Durch Versuche an Thieren hat sich der Character als constant sich herausgestellt, das Blut mochte durch den Mund oder endermisch eingebracht sein; das Blut besaß stets eine schwarze Farbe, färbte Leinwand rothbraun, wie Kermes, war flüssig, zähe, opak und coagulirte nicht. Auch bei Leichen, die Novati untersuchte, fand es sich so. Man darf bei dieser Sache aber auch erwägen: 1) daß das Blut in mehreren Krankheiten einen ähnlichen Character zeigen kann; 2) daß andere Gifte vielleicht ähnliche Resultate geben können; 3) daß, wenn der Tod unmittelbar erfolgt, die entzündliche Reaction die Charactere des Bluts ganz verändern kann. Glücklicherweise sind diese übrigens nicht die einzigen, um eine Vergiftung zu erkennen. (*Journ. de Chim. med.* 2. Ser. V.)

## Ueber die Auffindung des Arseniks Vergiftungsvorfällen;

von

*Orfila.*

Eine neue große Arbeit ist von Orfila unter- nommen worden, um den Arsenik bei Vergiftungsfällen



decken, und ihn aus allen Organen darzustellen, die Gift absorbirt haben möchten (Vergl. *Journ. de Chim.* 2. Ser. V, 516). Statt der Verbrennung der organischen Substanzen durch Salpeter u. s. w., hält er es für zweckmässig, dieselben durch Erhitzen mit concentr. Salpetersäure zu zerstören, wobei aber ein gewisses bestimmtes Verhältniß der Säure zu beachten ist, weil sonst ein Erglühen und Entflammen der Masse statt findet, wodurch ein Theil des Arseniks verloren geht, wenn man nicht aufpasst.

Das Verfahren, welches bei Behandlung solcher Organe zu befolgen ist, giebt Orfila folgendermaassen an.

Man läßt die zerschnittenen Eingeweide sechs Stunden lang mit dest. Wasser, dem man 2 — 3 Gran durch Alkohol gereinigtes Kali zugesetzt hat, in einer Porcellanschale auskochen, das Decoct filtriren, mit Chlorschwefelsäure übersättigen und durch Schwefelwasserstoff fällen.

Wenn man Gliedmassen der Auskochung unterworfen hat, so muß man das Decoct vor dem Behandeln mit Schwefelwasserstoff erkalten lassen, damit das Fett nicht absondere, weil sonst die nachherige Verbrennung der übrigen Bestandtheile durch Salpetersäure zu leicht geschehen und man dadurch einen Verlust an Arsenik erleiden würde. Es trifft sich, daß die Auflösung nach einigen Tagen einen Niederschlag von Schwefelarsenik aus animalischer Materie absetzt, oder der Niederschlag aus letzter besteht. Die über dem Niederschlage stehende Flüssigkeit wird filtrirt, zur Trockne verdunstet, und der Rückstand mit Salpetersäure behandelt, um den Arsenik noch zu erhalten, welcher durch Schwefelwasserstoff nicht gefällt wurde.

Die mit Wasser ausgekochten Eingeweide werden dann in mässiger Wärme getrocknet und gewogen, und danach die Menge Salpetersäure zu bestimmen, die deren Zerstörung nöthig ist. Im Allgemeinen genügt zwar die durch kochendes Wasser erschöpften Organe keinen Gehalt von Arsenik mehr zu erkennen, doch ist es demohnerachtet nothwendig, sie noch mit Salpetersäure zu behandeln, weil sie durch noch nicht erklärte Ursachen immer noch etwas Arsenik zurückhalten können. Immer ist aber das vorherige Auskochen mit Wasser zu rathen, weil die Salpetersäure auf ein Organ, welches Arsenik enthält, nicht wirken kann, ohne einen merklichen Verlust des Giftes herbeizuführen; durch das vorherige Auskochen mit Wasser und Fällen des Extracts mit Schwefelarsenik, muß der unvermeidliche Verlust jedenfalls auf eine kleine Quantität des Giftes beschränkt werden.

Folgendes sind die Verhältnisse der Salpetersäure von 41° zu den verschiedenen getrockneten Substanzen, die Orfila am geeignetsten findet:

3 Unzen trocknes Blut: 7 Unzen Säure.

3 Unzen trocknes Product eines entfetteten Darms von Gliedmassen: 9 Unzen Säure.

Das grofse und kleine Gehirn eines Erwachsenen trocken 6 Unzen wiegend: 2½ Pfd. Säure.

Die beiden Lungen, getrocknet 5 Unz.: 1 Pfd. Säure.

Das Herz, getrocknet 1 Unze 6 Drachmen: 5 Unzen Säure.

Die trockne Leber, 12 Unzen: 3 Pfd. Säure.

Die trockne Milz, 1 Unze 2 Drachmen: 3½ Unzen Säure.

3 Unzen trockner Substanz des Magens und Darmkanals: 9 Unzen Säure.

Die beiden getrockneten Nieren, 2 Unzen: 6 Unzen  
 22 Unzen trocknes Muskelfleisch: 4½ Pfd. Säure.  
 Das Verfahren bei der Behandlung mit Salpetersäure  
 nach Orfila dieses: Die ganze Menge der Säure  
 in einer Porcellanschale über mäßigem Feuer er-  
 hitzt, und in Zwischenräumen von ungefähr 1 Minute  
 den Stückchen der organischen Materie hineingewor-  
 fen, es entwickelt sich sogleich Stickstoffoxydgas, die  
 Flüssigkeit kömmt ins Kochen, und die Substanz löst  
 sich auf. Würde man die organische Substanz auf ein  
 Reusen Sieb hineinbringen, so würde ein Aufschäumen und Ueber-  
 fließen eintreten. Die saure Flüssigkeit färbt sich nach  
 und nach dunkelroth, wird dick und fängt am Rande  
 an sich zu verkohlen, man wartet nun noch, bis die  
 Verkohlungs so weit vorgeschritten ist, daßs aus der  
 Schale so dicke weißse Dämpfe aufsteigen, daßs man  
 durch sie in selbige hineinsehen kann. Man nimmt die  
 Schale vom Feuer, läßt sie erkalten, die Kohle in einem  
 Porcellan- oder Glasmörser pülvern und 25 Minuten  
 mit 7—8 Unzen Wasser auskochen, um die durch  
 die Wirkung der Salpetersäure auf die Arsenichtsäure ent-  
 standene Arseniksäure aufzulösen und bringt die filtrirte  
 Flüssigkeit in einen zuvor geprüften Marsh'schen Apparat,  
 in welchem mit arsenikfreiem Zink und reiner Schwefelsäure  
 versehen ist. Sollte nun ein starkes Aufschäumen er-  
 eugnet werden, so gießt man die Flüssigkeit schnell in einen  
 weiten Trichter, den man unten mit einem Finger ver-  
 schließt. Ein großer Theil des Schaums bleibt in dem  
 Apparat hängen, den man mehrmals auswäscht, während  
 dieser Zeit hat die Flüssigkeit im Trichter sich in zwei  
 Theile geschieden, in eine obere schaumige und eine  
 untere flüssige; diese letztere läßt man nun in den Ap-  
 parat Arch. d. Pharm. II. Reihe. XXIII. Bds. I. Hft.

parat laufen. Nach einigen Minuten entwickelt *langsam* Arsenikwasserstoffgas, und in dem Maasse, dieses verbrennt, setzt es auf einer Porcellanplatte Arsenikflecken ab. Bei Beachtung dieser Vorsichtsregel bildet sich selten aufs Neue wieder Schaum, daß man nicht nöthig hat, Olivenöl zuzusetzen; wenn dieses dennoch erforderlich sein, so bringt man 2 Unzen Oel in den Apparat, und der Versuch geht ohne Schwierigkeit fort; verlangsamt sich die Gasentwicklung nach und nach, so muß man etwas Schwefelsäure zusetzen, selbst damit das Gas mit einer solchen Flamme brenne.

Nachdem man auf diese Weise den größten Theil des Arseniks abgeschieden hat, wird die ausgekohlte Kohle mit  $\frac{1}{2}$ , 1 oder 2 Unzen krystallisirten Salpeter gemischt und das Gemenge in einem hessischen Tiegel brannt; die Asche zersetzt man mit reiner concentrirter Schwefelsäure, bis sich kein Salpetergas mehr entwickelt.

Die abfiltrirte Flüssigkeit kann in dem Marsh'schen Apparat noch eine kleine Menge Arsenik ergeben, wenn Theil der in der Kohle enthaltenen Arseniksäure kohlensauren Kalk der Kohle in arseniksauren Kalk geändert hätte, der in Wasser unlöslich ist.

Wenn man die verdächtige organische Materie der Behandlung mit Salpetersäure nicht gehörig austrocknet, und sie noch feucht ist, so entsteht nachher bei der Einwirkung dieser Säure ein heftiges Aufschäumen, ein Uebersteigen, und man kann dadurch Verluste erleiden.

Jedenfalls ist noch zu erinnern, daß wenn man Salpetersäure anwendet, als die Vorschrift besagt, die Temperatur höher ist, und das Schälchen während der Verkohlung auf dem Feuer bleibt; die Zersetzung d



mit Entflammung vor sich geht, besonders bei Behandlung fetter Materien, und daß dadurch der Arsenik nützlich oder größtentheils sich verflüchtigen kann.

Von den mannichfachen Versuchen, die Orfila nach diesem Verfahren angestellt hat, wollen wir nur einige führen.

Ein Hund war mit 12 Gran in 4 Unzen Wasser auflöster Arsenichtsäure vergiftet, die in den Magen eingebracht wurde. Das *Blut*, das *Herz*, die *Lungen*, die *Leber*, die *Milz*, die *Nieren*, und das getrocknete Product der Auskochung der Gliedmaassen des vergifteten Hundes wurden, jeder Theil für sich, mit Salpetersäure behandelt. Die Kohle dieser zersetzten organischen Massen gab, mit Wasser gekocht und die Auskochung dem Marsh'schen Apparat geprüft, bemerkliche Mengen von Arsenik zu erkennen.

Die Flüssigkeit, welche man durch Auskochen des Leichnams eines gewissen an Gift gestorbenen Soufflard's in Wasser, dem etwas Salzsäure zugesetzt worden war, erhalten hatte, wurde mit Schwefelwasserstoff gefällt. Nach *drei Monaten* hatte sich viel Schwefelarsenik darin gesetzt. Die davon abfiltrirte Flüssigkeit roch noch nach Schwefelwasserstoff; sie wurde verdunstet und der Rückstand durch Salpetersäure verkohlt, worauf die Kohle mit Wasser ausgekocht wurde. Die Flüssigkeit gab bei ihrer Prüfung im Marsh'schen Apparat eine beträchtliche Zahl von Arsenikflecken. Diese Erfahrung bestätigt die frühere, daß Schwefelwasserstoff aus Flüssigkeiten, die organische Materien aufgelöst enthalten, alle Arsenik ausfällt.

Die Leber aus dem Leichname eines gewissen Nicolas Mercier, von dem man Verdacht schöpfte, daß er Vergiftung gestorben sei, und schon seit fünf Monaten



beerdigt war, gab durch Verkohlen mit Salpeter Auskochen der Kohle mit Wasser und Behandlung der Flüssigkeit im Marsh'schen Apparate, eine bedeutende Menge von Arsenikflecken.

Eine Madame M. hatte einen Theelöffel voll Salpetersäure eingenommen, um sich zu vergiften. Nach eingetretenen Zufällen nach zwölf Stunden einen Exitus nothwendig machten, wurde eine Vene geöffnet und 12 Unzen von dem erhaltenen Blut liefs man, nach Zusatz von 4 Gran reinem kaustischen Kali, eintrocknen und das Product,  $2\frac{1}{2}$  Unze, durch 5 Unzen Salpetersäure von  $41^{\circ}$  eintrocknen. Die Verkohlung ging rasch ohne Entzündung vor sich. Die voluminöse und schwarze Kohle gab durch Auskochen mit Wasser eine röthlich wenig sauer reagirende Flüssigkeit, die bei ihrer Behandlung im Marsh'schen Apparate einige zwanzig kleine gefärbte aber glänzende Arsenikflecken ergab. Das Wichtigste bei diesem Verfahren ist, wie man sieht, die Zerstörung der organischen Substanz durch die Salpetersäure. Die nachherige Auskochung der erhaltenen Kohle kann man dann dem Versuch in dem Apparat von Marsh unterwerfen, oder auch durch Schwefelwasserstoffgas und das erhaltene Schwefelarsenik reduciren.



## Wirksamkeit des Eisenoxydhydrats gegen Arsenikvergiftung.

Hr. Dr. Lüdicke in Breslau berichtet folgenden Fall. Ein Weinhändler trank am 4. Sept. 1837 Nacht von einem Fliegenwasser, das aus Unvorsichtigkeit aus alten Weinflaschen gerathen war, und das er für

feinrestgehalten hatte. Es trat bald Uebelkeit, reichliches Erbrechen und Magenschmerz ein. Eine halbe Stunde nach der unglücklichen Verwechslung sah L. den Kranken. Es wurde sogleich Milch, Zuckerwasser und Eis gereicht. Von dem Fliegenwasser mochten  $1\frac{1}{4}$  — Unzen verschluckt sein, die  $1\frac{1}{2}$  Gran weissen Arsenik enthalten hatten. Es wurden nun 4 Unzen Eisenoxydhydrat mit  $\frac{1}{4}$  Unze Mandelsyrup gereicht, alle halbe Stunde ein Eßlöffel voll, worauf Erbrechen und Schmerz aufhörten, und der Patient wieder so wohl wurde, daß er schon am Abend mit Appetit aß, und selbst seinen Berufe wieder vorstehen konnte. (*Schmidts Jahrb.* Bd. 159.)

---

## Beobachtung über die gegenseitige Einwirkung der Arsenichtsäure und der Eisenoxyde;

von

Guibourt.

---

Da das Eisenoxydul ausgezeichnetere basische Eigenschaften besitzt als das Eisenoxyd, so liefs sich erwarten, daß es für die Bindung der Arsenichtsäure noch wirksamer sein würde als dieses; was durch Versuche zu ermitteln war.

Es wurde eine Auflösung von reinem schwefelsaurem Eisenoxydul mit Ammoniak gefällt; die überstehende ähnliche Flüssigkeit behält bekanntlich einen Theil des Oxyduls aufgelöst, der sich erst abscheidet, wenn dieselbe an der Luft in den Zustand des schwarzen intermediären Oxydes übergeht. Durch diese Auflöslichkeit des Oxyduls verliert man daher einen Theil des-

selben, was indess kein Hinderniß seiner Anwen-  
als Gegengift sein würde, wenn es sich als solche  
wiese.

Das Auswaschen des Oxyduls läßt sich nicht  
Ausschluß der Luft bewerkstelligen, es hatte eine sch-  
liche Farbe angenommen und war also ein Gem-  
von Oxydul und Oxydul-Oxyd, welches aber auch  
sches schwefelsaures Eisenoxydul zurückhält. 100 G-  
men dieses feuchten Oxyduls hinterließen nach Gl-  
8,97 Grm. Oxyd.

33,45 Gram. des Oxydul-Magmas, die 3 Gram.  $\text{FeO}$   
entsprechen, wurden mit 35,64 Gram. einer Auflö-  
vermischt, welche 0,3 Grm. Arsenichtsäure ent-  
Die von dem oft umgeschüttelten Gemenge nach ei-  
Zeit abfiltrirte Flüssigkeit wird durch *Galläpfeltinktur*  
schwarz, durch *Ammoniak* gelb, durch *Kalkwasser*  
fangs gelb gefärbt, nachher reichlich gelblichblau ge-  
durch *Schwefelwasserstoff* dunkelbraun gefärbt,  
durch Salzsäure verschwindet, ohne daß die gelbe F-  
von Schwefelarsenik sich zeigt; durch *schwefelsaures*  
*Kupferoxyd* nicht verändert, durch *schwefelsaures*  
*pferoxyd-Ammoniak* gelb gefärbt, ohne Niederschlag.  
Durch den Marsh'schen Apparat giebt sie einen re-  
lichen Gehalt von Arsenik zu erkennen.

Das Eisenoxydul, wie man es in den Apotheken  
würde erhalten können, hat also keinesweges die Ei-  
schaft, die Arsenichtsäure unlöslich zu machen.  
diesen Versuchen ergeben sich überhaupt zwei un-  
unwichtige Resultate:

1) Daß wir eine Flüssigkeit gefunden haben,  
Auflösung des arsenichtsaren Eisenoxyduls, in welcher  
ohnerachtet ihres merklichen Gehalts an Arsenichtsäure

schwefelsaure Kupferoxyd-Ammoniak, eines der gewöhnlichsten Reagentien dafür, diese *nicht* anzeigt.

2) Dafs wir die Nothwendigkeit bewiesen haben, Gegengift der Arsenichtsäure ein Eisenoxyd anzubereiten, welches frei von Eisenoxydul ist.

Man hat mehrere Vorschriften zur Darstellung des Eisenoxydhydrats gegeben, und einige auch, um dasselbe *ex tempore* zu bereiten, in der Vermuthung, eine Stunde Zeit hinreiche, um das schwefelsaure Eisenoxyd darzustellen, die Fällung durch Ammoniak und Auswaschung des Niederschlages vorzunehmen, was bekanntlich mehr Zeit erfordert; überdies muß das Präparat als Gegengift des Arsens in großen Dosen angewendet werden. Es muß daher eine Verpflichtung der Apotheker sein, das Eisenoxyd, völlig zubereitet und unter Wasser aufbewahrt, vorrätzig zu halten. Es bedarf fast ein Liter des durch Abgießen von dem stehenden Wasser befreieten Magmas als Aequivalent 32 Grm. des geglüheten Peroxydes, und diese Menge ist nicht hinreichend für die Behandlung einer Arsenvergiftung.

Um die Menge des Eisenoxydes zu bestimmen, welche nöthig ist, die Wirkungen der Arsenichtsäure zu neutralisiren, wurden 31 Grm. des Magmas, gleich 2 Grm. geglühetem Eisenoxyd, mit einer Auflösung von Arsenichtsäure eine Viertelstunde lang geschüttelt; die abfiltrirte Flüssigkeit gab nach dem Verfahren von Marsh noch eine bemerkliche Menge Arsenik zu erkennen. Der Versuch wurde mit der doppelten Menge Magmas, gleich 2 Grm. geglühetem Eisenoxyd, auf 4 Grm. Arsenichtsäure wiederholt; nach zweistündiger Schüttelung gab die abfiltrirte Flüssigkeit noch merkliche Mengen von Arsenik zu erkennen. Als aber jetzt 93



Grm. des Magmas, mithin 3 Grm. wasserleeres Eisenoxyd mit 0,3 Grm. Arsenichtsäure eine Viertelstunde in Berührung gewesen und dann die abfiltrirte Flüssigkeit geprüft wurde, so gab sie keine Spur von Arsen mehr zu erkennen. Es sind also mehr als 7 und weniger als 10 Th. Eisenoxyd nöthig, um die Auflösung 1 Th. Arsenichtsäure völlig zu neutralisiren. Auf 1 Magma, in welchem Zustande das Präparat angewendet werden muß, bezogen, wird ein Liter desselben, welches ohngefähr 32 Grm. geglühetem Eisenoxyde entspricht, 3,2 Grm. Arsenichtsäure aus seiner Auflösung nicht schlagen. Da aber bei Vergiftungen diese Quantität Arsenichtsäure nur nach und nach in den Flüssigkeiten des Magmas sich auflösen kann, so muß das Gegengift auch nur successiv in gebrochenen Dosen gegeben werden.

Es handelte sich jetzt darum, zu wissen: 1) Ob toxiologische Versuche mit den chemischen Resultaten der Unwirksamkeit des Eisenoxyduls als Gegengift der Arsenichtsäure übereinstimmen würden. 2) Ob das Eisenoxyd ein absolutes Gegengift der Arsenichtsäure ist, nämlich ob die chemische Verbindung beider jederseits die giftige Wirkung beraubt, oder ob sie in Folge ihrer Löslichkeit in Wasser nur viel weniger giftig ist als die Arsenichtsäure.

Um dieses festzustellen, habe ich einer Commission der medicinischen Gesellschaft in Paris, den Doctoren Deville, Nonat und Sandras, nachfolgende Präparate übersandt:

1) *Feuchtes Eisenoxydul*, dargestellt aus schwefelsaurem Eisenoxydul mittelst Ammoniak, obgleich es etwas basisches Sulfat enthält und auch beim Auswaschen zum Theil sich weiter oxydirt, so werde ich es doch



den Unterschied der übrigen Präparate, wie oben be-  
merkt, bezeichnen. 100 = 19 geglühetes Peroxyd.

2) *Feuchtes schwarzes Eisenoxyd.* Man liefs Chlor  
eine Auflösung von schwefels. Eisenoxydul strö-  
men, in der Absicht, um dasselbe dadurch in schwefel-  
saures Eisenoxyd zu verwandeln. Die Oxydation über-  
trifft auf diese Weise die des schwarzen Oxydes nicht,  
welches aus der Auflösung durch Ammoniak gefällt  
wurde. 100 des auf diese Weise erhaltenen Magmas  
entsprechen nur 7 geglühetem Peroxyde, was um so be-  
merkenswerther ist, da das Magma eben so dick war  
als das vorige, ein Beweis, daß das mit dem schwarzen  
Oxyde gebildete Magma mehr Wasser zurückhält als  
das.

3) *Feuchtes Eisenoxyd,* dargestellt aus schwefelsau-  
rem Eisenoxydul, welches durch Königswasser oxydirt  
und dann durch Ammoniak zersetzt wurde. 100 des  
Magmas = 3,5 geglühetem Oxyde.

4) *Eisenoxydhydrat,* sogenanntes basisch-kohlensau-  
res Eisen, durch Zersetzen von schwefels. Eisenoxydul  
mit kohlens. Natron dargestellt. An der Luft, besonders  
während des Trocknens, oxydirt sich der Niederschlag  
allmählig und wird unter Verlust fast aller Kohlensäure  
zu Eisenoxydhydrat. 100 = 69 wasserleerem Oxyde.

Behufs einer gründlichen Vergleichung sind also  
zu nehmen:

|       |       |     |                |    |
|-------|-------|-----|----------------|----|
| 1     | Theil | von | N <sup>o</sup> | 4. |
| 3,63  | „     | „   | „              | 1. |
| 9,86  | „     | „   | „              | 2. |
| 19,71 | „     | „   | „              | 3. |

5) *Basisch-arsenichtsaurer Eisenoxyd.* Diese Ver-  
bindung ist diejenige, welche vermuthlich durch Ein-  
wirkung des Eisenoxydhydrates auf Arsenichtsäure im  
Vakuum sich bilden muß. Diese Verbindung wurde

dargestellt durch 620 Grm. des Eisenoxyd-Magmas, die 20 Grm. Oxyd enthielten und einer Auflösung, die 3 Grm. Arsenichtsäure enthielt. Die überstehende Flüssigkeit enthielt, wie wir bereits oben bemerkten, noch eine geringe Menge Arsenichtsäure; aber der wohl gewaschene Niederschlag trat an Wasser keine Spur Arsenik mehr ab. Nach dem Trocknen war er hart schwärzlich, von dichtem Bruch, aber nicht glasartig und glänzend wie das neutrale Arsenit. 2 Grm. hinterliessen nach Rothglühen 1,34 Grm. Eisenoxyd, welches noch eine gewisse Menge Arsenichtsäure enthielt, die nicht genau bestimmt werden konnte; annähernd aber die Zusammensetzung wahrscheinlich folgende:

|                  |       |
|------------------|-------|
| Eisenoxyd .....  | 65,00 |
| Arsenichtsäure.. | 14,50 |
| Wasser.....      | 20,50 |
|                  | <hr/> |
|                  | 100.  |

6) *Neutrales arsenichtsaurer Eisenoxyd.* Dieses Salz wurde auf folgende Weise dargestellt. Eine Auflösung von kaustischem Natron wurde in der Wärme mit Arsenichtsäure gesättigt, es löste sich eine außerordentlich große Menge auf, demohnerachtet behielt die Flüssigkeit ihre ganze alkalische Reaction, und setzte nach dem Erkalten einen krystallinischen Niederschlag von freier Arsenichtsäure ab. Die davon abfiltrirte Auflösung des arsenichtsaurer Natrons wurde mit einer Auflösung von schwefels. Eisenoxydul vermischt, das durch Zusatz von Königswasser bis zum Maximum oxydirt worden war, wegen der vorherrschenden Säure entstand aber kein Niederschlag, daher man anfang, sie mit Ammoniak zu neutralisiren. Selbst jetzt entstand unmittelbar kein Niederschlag durch das arsenichts. Natron; nach zwölfstündiger Ruhe aber hatte sich ein reich-

er gelber Niederschlag gebildet. Getrocknet hat die-  
eine rubinrothe Farbe, ist auf dem Bruch glasglän-  
d und durchscheinend, genau wie das natürliche  
enresinit, nur härter. Das Pulver ist goldgelb. Es  
eint nicht, daß das arsenichtsaurer Eisenoxyd bis jetzt  
gestellt und beschrieben ist. Berzelius führt nur  
theoretische Zusammensetzung an:  $2 (\text{Fe} : \text{O} : ) +$   
 $(\text{As} : \text{O} : )$ .

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Eisenoxyd . . . . .      | 34,47 |
| Arsenichtsäure . . . . . | 65,53 |
|                          | <hr/> |
|                          | 100.  |

Die Analyse dieser Verbindung bietet bedeutende  
wierigkeiten dar. In kaustischem Natron löst sich  
Arsenik völlig auf unter dunkelrother Färbung, und  
Auflösung wird weder durch Luft, noch durch  
durchgeleitete Kohlensäure getrübt. Durch Verdun-  
n der alkalischen Auflösung bis zur Trockne und  
wandeln des Rückstandes mit Wasser bleibt das Eisen-  
oxyd nicht zurück, sondern wenn auch nicht sogleich,  
so nach und nach löst sich fast alles wieder auf.

Durch Umwandeln des Arsenites in Arseniat mittelst  
sitzen mit seinem doppelten Gewicht Salpeter und  
wandeln des Rückstandes mit Wasser erhielt ich eine  
ke, nicht alkalische Flüssigkeit, aus welcher kohlen-  
saures Kali und Ammoniak das Eisenoxyd nicht völlig  
lösten, denn sie behielt nach dem Zusatz der Alkalien  
eine röthlichgelbe Farbe.

Durch vierstündiges Erwärmen im Wasserbade ver-  
lor das arsenichtsaurer Eisenoxyd 11,6 % Wasser; es hat  
er dadurch noch nicht alles Wasser verloren. Erhitzt  
man es nämlich nun in einer Retorte über der Spiritus-  
lampe, so giebt es noch Wasser aus, zugleich aber ent-  
weicht auch Arsenichtsäure.



Aus der Auflösung von 5,023 Grm. des Salzes Salzsäure wurden durch Schwefelwasserstoffgas 3, Grm. bei 100° C. getrocknetes Schwefelarsenik erhalten, die 3,23 Arsenichtsäure anzeigen. Hiernach erhalten 100 arsenichts. Eisenoxyd, 64,28 Arsenichtsäure was nahe mit der oben angeführten Berechnung übereinstimmt, und beweist, daß diese Formel richtig ist, das bei 100° C. getrocknete Salz fast wasserleer ist.

Wird das wasserhaltige arsenichtsäure Eisenoxyd einer anhaltenden Rothglühhitze ausgesetzt, so verliert es nicht nur seinen Gehalt an Wasser, sondern auch die Arsenichtsäure wird dadurch abgeschieden, so daß der Rückstand nur noch Spuren davon enthält, die man in dem Marsh'schen Apparate leicht entdecken kann. Man erhielt auf diese Weise von 5 Grm. des wasserhaltigen Arsenites 1,51 Grm. Eisenoxyd = 30%, für wasserleere 34,16%. Nach dem Vorstehenden kann man die Zusammensetzung dieser Verbindung festsetzen:

|                      |              | wasserhaltig | wasserleer |
|----------------------|--------------|--------------|------------|
| 3 At. Arsenichtsäure | ....3720,25  | 57,55        | 65,53      |
| 2 „ Eisenoxyd        | .....1956,82 | 30,27        | 34,47      |
| 7 „ Wasser           | .....787,36  | 12,18        |            |
|                      | 6464,43      | 100          | 100.       |

Nach dieser Entwicklung der chemischen Verhältnisse lasse ich eine Uebersicht der toxikologischen Versuche folgen, welche die Herren Deville, Nonat und Sandras mit diesen Eisenpräparaten angestellt haben.

Da es nothwendig war, bei diesen Versuchen den Oesophagus der Thiere, mit welchen man experimentiren zu unterbinden, so suchte man erst die mittlere Lebensdauer nach dieser Unterbindung zu bestimmen. Bei drei Hunden, die diesem Versuch unterworfen wurden, ergab sie sich zu 6—7 Tagen. Bei weiteren vorbereitenden Versuchen fand sich, daß 4—6 Gran Arsenichtsäure

einigen Stunden den Tod herbeiführen können, ohne materielle Spuren ihres Weges durch die Organe erkennen zu lassen, während eine Gabe von 12—36 Gran eine heftige Entzündung des Magens und erst nach 10–14 Stunden den Tod bewirkt. Diese anscheinend sich widersprechenden Resultate erklären sich leicht aus der Wirkungsart der Arsenichtsäure auf den thierischen Organismus. In kleinen Dosen wirkt sie schwach auf Schleimhäute des Magens, und geht durch Absorption rasch in die Blutmasse, wo sie ihre Wirkungen eben der Schnelligkeit ausübt, als wenn sie direct in das Venensystem injicirt worden wäre. In starken Dosen im Gegentheil wirkt sie lokal wie ein Aetzmittel; die Absorption findet langsamer statt, wie im vorliegenden Falle, und somit auch ihre Wirkungen; selten überleben in diesem Falle die Thiere 24 bis 25 Stunden.

Hiernach folgen die vorzüglichsten Resultate der Versuche über die Wirkung der oben angeführten Eisensubstanzen.

A. Das Oxydul und das feuchte schwarze Eisenoxydhydrat veränderten die Wirkung der Arsenichtsäure auf den Organismus nicht. Drei Hunde, welchen eine Drachme Arsenichtsäure beigebracht worden war, erhielten eine Quantität Oxydul und schwarzes Oxyd, im gleichen Zustande, die  $2\frac{1}{4}$ , 6 und 8 Drachmen wasserfreiem Eisenoxyde entsprach, starben eben so schnell wie andere, die bloß Arsenichtsäure bekommen hatten. Wenn nun die oben berührten chemischen Versuche zeigen, daß das Protoxyd und das schwarze Oxydhydrat die Eigenschaft besitzen, mit der Arsenichtsäure eine unlösliche Verbindung zu bilden, so wurde es für nöthig gehalten, die physiologischen Versuche über



diese beiden Oxyde weiter fortzusetzen, da ihre Unksamkeit aus dem Umstehenden sich sattsam ergibt.

**B.** Das von Bunsen und Berthold vorgene feuchte Eisenoxydhydrat verzögert den To so mehr, in je größeren Gaben es angewendet und neutralisirt endlich die giftigen Wirkungen Arsenichtsäure vollkommen, so dass die Thiere, welchen die Versuche angestellt wurden, eben so lebten als die, welche die bloße Unterbindung des Oesophagus erlitten hatten.

1) Einem starken Hunde waren 12 Gran Arsenich beigebracht worden; darnach wurden sogleich 12 Drachmen feuchtes Eisenoxydhydrat, entsprechend 3 Drachmen wasserleerem Oxyde, in den Magen gebracht, und der Oesophagus unterbunden. Das Thier starb drei Tage nach der Ingestion des Giftes.

2) Einem Hunde wurden 4 Gran Arsenich beigebracht, und dann ein halbes Liter des Eisenoxydhydrat-Magmas, entsprechend vier Drachmen wasserleerem Oxyde, worauf der Oesophagus unterbunden wurde. Dieser Hund starb erst am sechsten Tage, wie ein Hund, bei dem der bloße Ligatur.

Es geht hieraus hervor, dass das feuchte Eisenoxydhydrat ein wahres Gegengift der Arsenichtsäure ist, dass es aber in beträchtlicher Menge angewendet werden muss, um diese Wirkung völlig zu erfüllen.

**C.** Das trockne Eisenoxydhydrat, welches man bisher wenig geeignet hielt, die schädlichen Wirkungen des Arsens zu neutralisiren, dürfte wegen der Leichtigkeit, mit welcher man beträchtlichere Gaben nehmen kann, bei geringerem Volum nehmen kann, im Gegentheil besondere Vorzüge besitzen. Diese Ansicht geht aus folgenden Versuchen hervor:

1) Man liess Abends 3 $\frac{1}{2}$  Uhr einem ziemlich starken Hunde  $\frac{1}{2}$  Drachme Arsenichtsäure verschlucken, unmittelbar darauf brachte man ihm 1 $\frac{1}{2}$  Unzen trocknes Eisenoxydhydrat, in 4 Unzen Wasser eingeweicht, bei, darauf der Oesophagus wie gewöhnlich unterbunden wurde. Das Thier war am folgenden Morgen um 3 Uhr todt; es hatte einige Stunden länger gelebt, als die Hunde, nach der Ingestion der Arsenichtsäure sich selbst überlassen worden waren.

2) Einem ziemlich starken jungen Hunde wurden 4 Gran Arsenichtsäure und 2 Unzen Eisenoxydhydrat eingebracht, und dann der Oesophagus unterbunden. Das Thier starb erst am siebenten Tage nach der Operation, also in Folge der Ligatur.

3) Ein Hund mittler Grösse, dem 4 Gran Arsenichtsäure und 3 Unzen trocknes Eisenoxydhydrat, eingerührt in 3 Unzen Wasser, eingebracht waren, worauf der Oesophagus unterbunden wurde, starb ebenfalls erst am achten Tage nach der Einbringung des Giftes.

4) Einem kleinen und schwachen Hunde gab man 4 Gran Arsenichtsäure und 3 Unzen trocknes Eisenoxyd, in 3 Unzen Wasser eingerührt, ein, worauf der Oesophagus unterbunden wurde. Das Thier starb erst am Ende des sechsten Tages.

Eine halbe Unze trocknes Eisenoxydhydrat neutralisirt also die Wirkungen von einem halben Gran Arsenichtsäure. Diese Dosis ist ohne Zweifel sehr gross, dürfte man demohnerachtet das trockne Hydrat in seine feuchten Verbindung vorziehen, weil diese unter dem grossen Volum nur eine verhältnissmässig geringe Menge reines wasserleeres Oxyd enthält\*).

Dieser Gegenstand verdient gewiss einer noch ferneren Untersuchung; es scheint aber das trockne Eisen-

Was die giftige Wirkung des neutralen und basischen arsenichtsäuren Eisenoxydes betrifft, so läßt sich diese ohne Zweifel davon ab, daß diese beiden arsenichtsäuren Salze in dem Magensaft sich auflösen. Denn Wasser, welches  $\frac{1}{3}$  Essigsäure enthält, auflöst eine ziemliche Menge davon auf; noch mehr muß es von der Milchsäure und der Salzsäure des Magensaftes gelten. Die saure Auflösung giebt nach dem Verfahren von Marsh eine bemerkliche Menge Arsen zu erkennen; wenn man sie aber mit einem Ueberschuß von trockenem oder feuchtem Eisenoxyd schüttelt, wird die Arsenichtsäure völlig daraus abgeschieden. Es folgt auch hieraus die Nothwendigkeit, das Eisenoxydhydrat in einem großen Ueberschuß anzuwenden, damit die Säuren des Magensaftes nicht auf das arsenichtsäure Eisenoxyd wirken, und dadurch giftige Folgen herbeiführen.

Schließlich läßt sich folgern, daß es angemessen ist, auf jeden Gran Arsenichtsäure eine halbe Unze trocknes Eisenoxydhydrat, in eine kleine Menge Wasser eingerührt, zu rechnen; man muß so viel Eisenoxydhydrat geben als möglich ist, ohne die andern Mittel der Behandlung, welche die Kunst an die Hand giebt, zu vernachlässigen. (Vgl. *Journ. de Chem. med.* 2. V, 305.)

---

oxydhydrat nicht in so geeignetem Zustande zu sein, als die Arsenichtsäure sich zu verbinden, als das noch gallertartige Oxydhydrat.

## Vierte Abtheilung.

# L i t e r a t u r.

## Recensionen.

e in die Steppen des südlichen Russlands, unternommen von Dr. Fr. Göbel, Professor der Chemie und Pharmacie zu Dorpat u. s. w. I. u. II. Theil. Dorpat, bei Kluge. 1837 u. 1838.

Das vorliegende äußerst reichhaltige Werk, welches Ref. mit Freuden mitzutheilen durch die Güte des Hrn. v. Göbel in den Stand gesetzt ist, enthält im ersten Bande eine historische Darstellung der Reise, welche Hr. Prof. Göbel im Januar 1834 antrat, und zu der ihn der Wunsch, in den transwolgaischen Steppen im größeren Maass als es vor ihm ausgeführt wurde, chemische Untersuchungen der Salzseen, der Salzkräuter und des Steppenbodens, wie auch der drei Meere und der gasförmigen Exhalationen vorzunehmen anzustellen. Von seinen wissenschaftlichen Resultaten giebt insbesondere der zweite Band einen Aufschluss; die Wichtigkeit derselben leuchtet schon hervor, daß sich die angesehensten Naturforscher der Kaiserlichen Universität, die Herren v. Ledebour, v. Bunge, v. Parrot u. A. hierin vereinigt, um dieser Arbeit einen höheren Werth zu verleihen. — Was die chemischen Untersuchungen betrifft, so fand Hr. Göbel, daß unter 15 Salz- und Salzbächen der Kirgisensteppe und der Krimm, die Löslichkeit der trocknen Salze sich bei 9 zwischen 18,1 und 37,2 auf 100 Theile des Wassers; den größten Gehalt von Chlormagnesium 10½ Procent (außer 13,1 ½ Kochsalz) ergab der berühmte Inderskische See, dessen Salz hinreicht, gegen 10 Gouvernements von Asien mit bedeutendem Gewinn für die Krone damit zu versorgen; so z. B. wurden im Jahre 1824 3,842,162 Pud Salz aus dem See gebrochen, und im zehnjährigen Durchschnitt lieferte derselbe alljährlich nicht weniger als 1 Mill. 855,000 Pud, worauf der Krone einen jährlichen Gewinn vom Verkaufe von 195,000 Rubel ab. — Sehr interessant ist die *vergleichende* Analyse der Gewässer der drei erwähnten Meere; sie enthalten dieselben Salze, aber in sehr abweichenden quantitativen Verhältnissen; das schwarze Meer ist das reichste, das Asowsche Meer und der Caspische See gleicht mehr einem großen, äußerst schwachen Salzsee, dessen Gehalt an Talkerde wohl deutlich beweist, daß er außer Verbindung mit anderen Meeren ist, und durch das Bittersalz der angrenzenden Meere gespeist wird. Das Caspische Meer enthält nur ¼ vom Salzgehalt des schwarzen Meeres, und doch ist es mit Salz-

seen ringsum und am nördlichen Ufer mit festen Salzmassen besetzt! »Man möchte fast glauben,« sagt Hr. Göbel, das Caspische Meer sei einst ein *Süßwassersee* gewesen und habe allmählig aus der angrenzenden Steppe seinen Salzgehalt empfangen.

Dem zweiten Theil der Reise ist eine treffliche Arbeit von Claus einverleibt, welche für den Botaniker und Zoologen besonders Interesse sein wird, da derselbe seine Erfahrungen mit denen seiner Vorgänger, Pallas, Lepeschin, Tausch, Eversmann, Lessing und v. Bunge, zusammengestellt hat. Wir hier meines Wissens zum ersten Male ein möglichst vollständiges Bild von Gegenden erhalten, die ab und zu besucht, dennoch nicht so bekannt sind, wie sie es bei der Eigenthümlichkeit ihrer Flora und Fauna gewifs verdienen.

Der Himmel prangt in diesen öden Ländern fast mit bleichem Lasur; im Sommer ist die Hitze beinahe beständig zwischen 20 und 30° R., nur kalte Ostwinde mildern gewöhnlich die bei Windstille unerträgliche Gluth. Aber selbst in der kälteren Jahreszeit wird die Steppe öfter von verderblichen Schneestürmen heimgesucht, welche Tausende nützlicher Thiere tödten und vielen Nomaden das Leben kosten, während ein einziges Mal Heerden gefräßiger Heuschrecken im Nu ganze Landstriche ihres Pflanzenschmuckes berauben. — Die Winter sind sehr streng; das Therm. fällt bis — 20 ja 30° R., und kalte Schneestürme und Glatteis gehören zu den verderblichsten Ereignissen für die Steppenbewohner, denn ein großer Theil der Viehherden ihres Reichthums, geht dabei zu Grunde. Die Bedingungen der Entwicklung organischer Gebilde, die Wärmeextreme, der Mangel an Wasser, die einförmig unwirthbare Beschaffenheit des Bodens geben der Steppenvegetation einen eigenthümlichen Character. Nur eine geringe Zahl von Pflanzen vermögen die diesen Einwirkungen zu trotzen, bekleiden den Boden sparsam, theils in dichterem Gedränge den kalten Boden überziehen sich die meisten Steppenpflanzen mit einer grauen, reichen, grauen Hülle, welche sie gegen den Wechsel der Temperatur und die sengenden Strahlen der Sonne schützt und wenig atmosphärische Wasser anzieht; daher das unfreudige Bild einer Steppenvegetation, die uns ein schmutziges Gelb an der Stelle des erfreulichen Grüns vorhält; und struppige mannshohe Gräser scheinen hier den Mangel der Wärme ersetzen zu wollen, denn sonst findet das Auge keinen angenehmen Anhaltspunkt. — Dennoch zerfällt die Steppenflora, wie weit reichhaltiger erscheint, als die Vegetation der mehr ähnlichen Steppen, nach den Bodenverschiedenheiten in vier Regionen, nämlich in die *Lehm-, Salz-, Sand- und Gypsregion*, welche durch die verschiedenen Pflanzenarten, von denen sie bewohnt werden, eine eigenthümliche Physiognomie annehmen, während in einer fünften, der *Grenzregion*, welche die merkwürdige Obtschey-Syrt, die Vorberge des Süd-Ufers und die Wolga-Ufer angehören, zwar der Hauptcharacter der Steppenvegetation noch deutlich auftritt, aber durch einen weit reicheren Reichthum an gewöhnlichen europäischen Pflanzen gleichsam ein *Mittelglied* zweier verschiedenen Floren darbietet.

Von den in diesen fünf Regionen vorkommenden 1011



ten (Phanerogamen) gehören nur 528 der Steppe selbst an, doch ist es außer Zweifel, daß in Zukunft die Zahl der sibirischen Steppenpflanzen nicht mehr beträchtlich anwachsen wird. Eben so interessant als lehrreich für den Pflanzengeographen ist die Vergleichung der Steppenflora mit der von Deutschland unter gleichen Breitengraden, wie mit der Vegetation der Steppen des Altai und des Kaukasus. Die große Artmannigfaltigkeit der Vegetation ergibt sich am ehesten daraus, daß auf einem gleich großen Raum in Deutschland etwa 2000 Pflanzenarten vorkommen müßten, wo auf der Steppe sich nur 500 vorfinden.

Die beigegebene treffliche Karte von der Kirgisensteppe zwischen der Wolga und dem Ural ist vom Hrn. Prof. Kruse nach seinen odometrischen Messungen, nach den neuesten astronomischen Ortsbestimmungen und vorzüglich nach einer schriftlichen Karte, welche Hr. Göbel bei einem Kirgisen-Expeditionsvorstand, entworfen worden, und unstreitig eine große Belehrung für die Kunde jener Länder, da eine Menge Irrthümer selbst auf solchen Karten entdeckt wurden, welche in neuerer Zeit erschienen und durch ihr Detail zu der Ansicht verleiten mußten, als seien sie besonders zuverlässig. Durch einen tüchtigen Ueberblick dieser Karte muß sich jeder von der Förderung der geographischen Kunde dieser Gegenden durch Hr. Kruse's Bemühungen überzeugen. Unter andern geht aus Hr. Kruse's Untersuchungen hervor, daß die Orographie dieses Landes nicht ganz unwichtig ist, und daß die aufgefundenen Berge Höhenzüge schon den Alten bekannt gewesen (Ptolem.). Kruse giebt dann noch als Beilage zur Karte historische Andeutungen über den früheren Zustand dieser und der umliegenden Steppenländer zwischen Don und Wolga, besonders zu den Zeiten der Griechen und Römer; — und nicht weniger auffallend ist es, daß, so häufig auch der Völkerwechsel in diesen Gegenden war, wir jetzt noch vieles in ihren Sitten und in ihrer äußern Körperbildung wiederfinden, woran man nach dem Verlaufe von Jahrtausenden nicht denken sollte; offenbar nicht, weil dieselben Völker sind, welche noch jetzt den Boden bebauen, sondern weil die Natur ähnlich blieb und ähnliche Sitten erzeugte.

Endlich habe ich noch des im Innern eines Continents bestehenden relativen Höhenunterschiedes des Caspischen und des schwarzen Meeres zu erwähnen. Das Resultat der neuesten Messungen ist allgemein bekannt, daß nämlich das Caspische Meer 95 par. Fufs circa unter dem Niveau des schwarzen Meeres liegt; aber in zwei Abhandlungen von Hrn. Fufs vom Ende des vorigen Jahrs (Bull. Ac. Pét.) stellte derselbe wegen einer Fehleranhäufung bei der Bestimmung der Coefficienten der Reduction den Niveau-Unterschied von 81,8 par. Fufs corrigirt 79,6 par. herab, womit das Resultat aus den correspondirenden Beobachtungen: 68,6 Fufs nahe übereinstimmt. Ich habe eine Bemerkung, wonach also das Casp. Meer etwa — 70 Fufs unter dem Niveau des schwarzen Meeres liegt, vorausschicken müssen, um daran die für barometrische Höhenmessung wichtigen Resultate der Göbel'schen Expedition zu knüpfen, dessen, zum Theil eigene, zum Theil von mir veranlaßte Beobachtungen von Hrn. Parrot berechnet sind.

Aus *gleichzeitigen* Beobachtungen am Asowschen und schwarzen Meere und am Caspischen See vom 24. Juli bis zum 25. Aug. 1834 ergeben sich die auffallendsten Verschiedenheiten in Höhenangabe des Caspischen Sees; nach der Berechnung ist er die *geringste* Höhe am 24. Juli — 212 par. Fufs, die *höchste* am 3. Aug. + 104' par.; beide Resultate weichen also um weniger als 316 Fufs von einander ab! *Ein Jahr* lang fortgesetzte Beobachtungen in Astrachan und Sympheropol im Krimm, wobei Barometer und Thermometer dreimal täglich servirt wurden, und die Instrumente verglichen waren, gaben einen Höhenunterschied von — 99 Fufs.

Diese trefflichen Beobachtungen, aus denen jedoch Hr. Parrot durch gewisse Rücksichten auf Lokalverhältnisse, die Nichthorizontalität der Luftschichten u. s. w. den Schluß zieht, daß mit hohem Grade von Wahrscheinlichkeit zwischen den beiden Meeren *kein* Höhenunterschied von einiger Bedeutung statt findet, werfen ein eigenes Licht auf die barometrischen Höhenmessungen in jenen Gegenden, sobald nicht die Stationen *sehr nahe* an einander liegen; denn hier geben noch *keine Mittel* (dreimal) täglich angestellter Beobachtungen z. B. die Niveauhöhen des Caspischen Sees im Vergleich zum schwarzen Meere (0 Fufs):

*Minima der Niveau-Differenz*

Juli ..... — 6',6 par.

August..... — 9',0 „

September... + 37',2 „

*Maxima der Niveau-Differenz*

Februar... — 213',0 par.

März ..... — 186',0 „

April..... — 167',4 „

October... — 162',0 „

Dies beweist, wie außerordentlich vorsichtig man sein muß, wenn von barometrischen Höhenmessungen außerhalb der Caspischen Zone die Rede ist; und jene bedeutende Depression des Bodens in *Palästina* wird wahrscheinlich von ihrer gewöhnlichen Größe bald herabgesetzt werden, wenn es auch nicht ungewiß ist, daß sich dort Einsenkungen unter das Niveau des Mitteländischen Meeres finden.

Dr. Mahlmann in Berlin.

Ueber die wahrscheinliche Zusammensetzung der chemischen Grundstoffe; von Hugo Reinsch. Halle, Wunsiedel, bei Adolph Grau. 1839.

Die Haupttendenz des Werkes ist, die wahrscheinliche Zusammengesetztheit der chemischen Grundstoffe nachzuweisen.

So unter andern hält der Verfasser den Kohlenstoff für ein eigenthümliches Kaliumwasserstoffoxyd. Denn wird die Asche, welche durch alkalische Salze beim Wachsthum der Pflanzen ungemein vermehrt wird, verbrannt, so erhält man, wie bekannt, eine Asche, die sehr reich an kohlensaurem Kali ist, es scheint dieses demnach durch die Oxydation des Kohlenstoffs zu entstehen. Das Kalium sei vielleicht eine ähnliche Verbindung zwischen Kohlenstoff und Wasserstoff, wie das Ammoniak zwischen Kohlenstoff und Stickstoff.

Pag. 34, 35 und 36 wird die Bildung des salzsauren Natrons Meerwasser (indem bei der beständigen Oxydation des Wassers Chlor entstehe und der freiwerdende Wasserstoff sich mit Kohlenstoffe zu Natrium, während sich das Chlor mit letztem zu Kochsalz verbinde) ferner die Bildung des Jods in den Gewächsen erklärt; so wie pag. 37 u. 38 die Entstehung des phosphors in den Knochen der Animalien und pag. 39 die Bildung des Stickstoffs im thierischen Organismus.

Den Stickstoff hält der Verfasser pag. 40 für ein Oxyd des Kohlenstoffs, welches durch die Zersetzung der Kohlensäure durch Sonnenstrahlen erzeugt werde. Denn nur dadurch lasse das immer gleichbleibende Verhältniß zwischen den Bestandtheilen der Atmosphäre sich erklären, und das große Räthsel, durch den Sauerstoff, der durch die Verbrennung, Athmung Thiere und Pflanzen u. dergl. jährlich verzehrt werde, sei erst durch die Annahme, *dass die gebildete Kohlensäure durch Sonnenstrahlen beständig in Stickstoff und Sauerstoff zerlegt* werde.

Aus der zweifachen Potenzirung der Körper, und aus der Zusammengesetztheit der für einfach gehaltenen Körper, nach der darüber geäußerten Ansicht, glaubt der Verfasser den allgemeinen Satz feststellen zu können: Alle Körper seien Verbindungen von Sauerstoff und Wasserstoff und ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften hängen von dem verschiedenen Grade dieser Stoffe ab; denn auch das Radikal der Metalle sei eine Verbindung von Sauerstoff und Wasserstoff, nur in einem andern Zustande.

Den Hauptbeweis für die Vermuthung, dass die für einfach gehaltenen Stoffe, Sauerstoff und Wasserstoff ausgenommen, zusammengesetzte Körper seien, glaubt Hr. Hugo Reinsch nun in zu finden, dass er die Bildung und Zusammengesetztheit des Chlors durch die Wirkung der Voltaischen Säule, im Wasser, nachzuweisen sich bemüht.

Ich habe die Versuche des Hrn. Verfassers, unter den angegebenen Cautelen, mit einer kleinen Voltaischen Säule von 24 Zellen zweizölligen Kupfer- und Zinkplatten wiederholt, ohne dass es mir jedoch, nach einer vierwöchentlichen Thätigkeit der Säule, wobei eine nicht ganz unbeträchtliche Menge Zinkoxyd gebildet hatte, gelungen ist, Chlor in der Flüssigkeit zu entdecken.

Wiewohl ich nun an der Richtigkeit der Angabe des Hrn. Reinsch, Chlor, in dem Wasser, welches der Einwirkung einer Voltaischen Säule ausgesetzt war, gefunden zu haben, nicht zweifle, und obschon es sehr möglich, ja höchst wahrscheinlich ist, dass es der Chemie, wenn auch erst in ferner Zeit, gelingen wird, die meisten der bis jetzt für einfach zu haltenden Stoffe, namentlich die Metalle, zu zerlegen oder sie zusammenzusetzen und daher ihre Zusammengesetztheit entweder in analytischer oder in synthetischer Hinsicht nachzuweisen, so müssen wir doch, bis dieses Ziel erreicht sein wird, sie noch immer als einfache Körper betrachten, und es läßt auch das, in dem Wasser der Voltaischen Säule zum Vorschein gekommene Chlor, noch eine andere Deutung, wie die vom Verfasser gegebene, zu. Hr. Reinsch glaubt mit ziemlicher Gewissheit annehmen zu kön-



nen, daß das Chlor eine Oxydationsstufe des Wasserstoff und wahrscheinlich in dem einfachen Verhältnisse vom gleichen Volumen Wasserstoffgas und Sauerstoffgas. Die wasserfreie Säure, in Verbindung mit Basen, betrachtet er als aus 2 Volumen Sauerstoff und 3 Volumtheilen Wasserstoffgas, und wasserhaltige Salzsäure aus 1 Aequiv. Salzsäure und 1 A Wasser, oder aus 3 Aequiv. Sauerstoff und 5 Aequiv. Wasserstoff bestehend.

Es ist jedoch sehr wohl möglich, daß der Chlorgehalt in dem Hr. Verf. in dem Wasser der Voltaischen Säule enthalten haben will, von den Gefäßen in dasselbe übergeführt ist. Das Chlor ist, wie bekannt, in der Natur sehr verbreitet; wir finden es auch im Kali, welches zur Bereinigung des Glases verwendet wird, weshalb es denn auch denkbar ist, daß eine geringe Menge Chlor in inniger chemischer Verbindung im Glase enthalten und aus diesem in die Flüssigkeit, die Voltaische Säule ihre Wirksamkeit äußert, durch elektrische Potenz, übergeführt worden ist.

Diese meine Ansicht bitte ich jedoch nur als eine hingeworfene Idee zu betrachten, und indem ich zum Lesen der Schrift des Hrn. Hugo Reinsch auffordere, knüpfe ich den Wunsch, daß es einem erfahrenen Chemiker gefallen möge, eine Beurtheilung derselben zu veröffentlichen.

Demong.

**Adolph Duflos, die chemischen Heilmittel und die praktische Anleitung zur Erkennung und Prüfung ihrer Eigenschaften, mit steter Berücksichtigung der preuss. Pharmakopöe. Für Aerzte, Apotheker und Apotheker. Breslau, Ferd. Hirt. 1837. VII und S. 362. Nebst 1 Steindrucktafel.**

Dieses vor Kurzem erschienene Werk des thätigen Hrn. Verfassers bildet, einem zweiten Titel zufolge, den 2. Theil des Buchs der pharmaceutisch-chemischen Praxis von demselben Verfasser. Es ist jedoch auch ein selbstständiges Ganzes. Von der Brauchbarkeit und Tüchtigkeit dieses Buchs, welches die Prüfung der pharmaceutisch-chemischen Präparate mit der chemischen Analyse der Gifte zu vereinigen sucht, hinlänglich überzeugt, laube ich mir, eine Charakteristik desselben zu geben. Ich gebe sie aber nicht anonym, so befolge ich lediglich das stets bewahrte Princip, niemandem in seinem eignen Urtheil über ein Werk vorgreifen, und dem Verfasser selbst das gebührende Recht zur Geltendmachung seiner Ueberzeugung vollständig bewahren zu müssen.

Der Hr. Verf. giebt auf den ersten 53 Seiten eine Einleitung, worin zuerst die Reagentien und deren Verwendung, wie auch die zu qualitativen Analysen nöthigsten Instrumente kurz angeführt werden. Ausführlicher dagegen ist das Verfahren zur Ermittlung der chemischen Heilmittel, zur Prüfung der chemischen Heilmittel auf Aechtheit und Güte, und zur gerichtlich-chemischen Ausmittlung der chemischen Gifte in drei besondern Abtheilungen angegeben. Der Ausdruck chemische Heilmittel und chemische Gifte ist doppeldeutig. Er können nur die chemisch zubereiteten Heilmittel und Gifte

er verstanden werden. In allen drei Abtheilungen, besonders der ersten, findet man manche sehr gute Winke und Andeutungen, vermißt jedoch darin fast ganz die Anwendung des Feuers und der Flussmittel, während bei den einzelnen Präparaten auf ihr Verhalten in der Hitze Rücksicht genommen wird. Es kann aber kein Zweifel darüber sein, daß die Prüfung der Präparate auf trockenem Wege schnell die sichersten Resultate giebt und die Untersuchung auf nassem Wege am besten leitet und erleichtert. Wie mir scheint, so ist eine allgemein gültige, von einfachen Lücken freie Vorschrift für die qualitative Analyse zu entwerfen; für den Anfänger in der Kunst wird sie jedenfalls zu unübersichtlich. Räthlich wird es immer sein, sie möglichst kurz zu fassen und nur das Allgemeine hervorzuheben. Uebrigens kann niemand mehr, als ich, davon überzeugt sein, daß die qualitative Analyse das eigentliche Fundament der analytischen Chemie und Pharmacie ausmacht, und daß sie noch lange nicht für ein völlig abgebautes Feld anzusehen ist. — Auf Seite 54 an werden in 485 Paragraphen nicht allein die in der preuss. Pharmacopöe aufgeführten chemischen Präparate, sondern auch theils die wichtigsten rohen Stoffe und Kunstprodukte, welche denselben zu Grunde liegen, theils andere Präparate, die in einer nähern Beziehung zu den pharmaceutischen Präparaten stehen, wie z. B. Aldehyd, Mineralwässer, äther. u. dergl. abgehandelt, zuweilen auch nur kurz angedeutet. Die befolgte alphabetische Ordnung, obgleich sie der Einteilung der Pharmacopöe am meisten entspricht, stört doch den wissenschaftlichen Zusammenhang. Indessen hat der Hr. Verf. diesen Uebelstand durch Zusammenstellungen auch hie und da ausgeglichen. — Bei den Präparaten selbst ist die Darstellung derselben in wenigen Zügen, und zwar nach eigenem Ermessen in manchen Fällen gegeben worden. Sodann sind die wichtigsten Eigenschaften der Präparate genannt, weil auf diese die Erkennung und Prüfung derselben sich stützt. Erkennung der Präparate unterscheidet der Verf. noch besonders, obwohl nicht zu bezweifeln ist, daß in der Characteristik der Präparate die Erkennung derselben schon liegt. Die Prüfung in den meisten Fällen kurz, aber bündig, und fast durchgehend mit Voraussetzung der Bekanntschaft der Reagentien und der Anwendung angegeben worden. Die Ansichten der Pharmaceuten über die Prüfung der Präparate sind in dem Grade voneinander verschieden, daß keine allgemeine Uebereinstimmung zu erwarten ist. Die eigene Erfahrung über wirklich statt findende Verunreinigungen oder Verfälschungen nicht weniger, als die subjective Meinung von der Nachtheiligkeit oder Möglichkeit der Vermeidung derselben wird in den meisten Fällen Bestimmende im Urtheile sein. Alle möglichen Verunreinigungen und alle jemals vorgekommenen Verfälschungen der Präparate aufzuzählen, wird man wohl ziemlich, vielleicht ganz allgemein für eben so nutzlos als langweilig halten. Dagegen ist es, wie mir scheint, Verunreinigungen, welche sich als wirkliche Mängel der von den Pharmacopöen vorgeschriebenen Darstellungsmethoden, oder als leicht mögliche Fehler bei Anwendung dieser Methoden ergeben, ausdrücklich immer zu nennen. — Es würde zu weit führen, alle abgehandelten Prä-



parate einzeln durchzugehen, und indem ich nur die Prüfung einiger näher ins Auge fasse, hoffe ich dem Hrn. Verf. den Beweis davon zu liefern, daß ich seine Schrift mit vieler Interesse und mancher Belehrung genau durchgegangen bin. Meiner Meinung nach wäre zu bemerken gewesen, daß der Blei- und Zinnstein nicht ganz selten auch jetzt noch mit Kupferoxyd, Chlorsilber, die Aetzammoniakflüssigkeit mit Kalk, die Blei- mit Arsenik verunreinigt, vorkommen. — Die von dem Verf. angegebene Prüfung des Bittersalzes auf schwefelsaures Kalium und Natron durch Zusammenreiben desselben mit kohlensaurem Natron, wobei die Flüssigkeit alkalisch werden würde, scheint mir bedenklich zu sein. — Vom phosphorsauren Natron wäre noch anzumerken gewesen, daß dieses Salz nicht selten auch phosphorsaure Talkerde enthält, welche in die wässrige Auflösung mit übergeht. Wenn von diesem Salze bemerkt wird, daß es eine gute Beschaffenheit erkannt werde an dem Nichtgetrüben der durch einen Zusatz von Salpetersäure sauer gemachten wässrigen Auflösung durch Schwefelwasserstoff und durch saures Bleioxyd, so muß in Betreff des letztern Reagens ein Schreibfehler statt gefunden haben. — Von dem Chlorwasser führt der Verf. als längst berichtigten Irrthum an, daß dasselbe die Silbersolution nicht trüben müsse; indessen giebt er kein anderes Mittel an, die Salzsäure darin nachzuweisen. Ich glaube, daß man ein solches in dem ganz fein gepulverten Calomel findet. Man braucht nur eine kleine Menge Chlorwasser mit überschüssigem Calomel in einem Stöpselglase anzuhalten und schütteln, die geklärte Flüssigkeit zu decantiren und nun mit Chlornatrium zu versetzen. Verliert die Flüssigkeit ihre Reaction nicht vollständig, so war das Chlorwasser selbst haltig. — Die Prüfung des *Magist. Bismuthi* auf Bleioxyd geschieht am leichtesten durch Vermischen der salpetersauren Auflösung mit recht vieler verdünnter, versteht sich ganz reiner Schwefelsäure. Jede kleinste Beimengung von Blei macht sich durch eine Trübung bemerkbar. Es ist auffallend, wie man noch immer, obgleich ich, außer in meinen chemischen Tabellen und in meiner Anleitung zur qualitativen Analyse mehrfach bei andern Gelegenheiten ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht habe, das so wichtige Verhalten des Bleies aus allen selbst sehr sauren Auflösungen durch ein Uebersetzen von verdünnter Schwefelsäure vollständig gefällt zu werden, häufig beachtet. Da das schwefelsaure Bleioxyd in verdünnter Salpetersäure ziemlich reichlich auflöslich ist, so glaubt man, daß dieses Metall aus sauren Auflösungen durch Schwefelwasserstoff und schwefelsaure Salze nicht leicht oder nicht in kleiner Menge fällbar sei. Bei diesem gründlichen Irrthume hat man doch, wie ich glaube, ganz allgemeine Gesetz der Neutralisation, oder besser der *Ausgleichung* oder *Paralyse* (s. dies. Arch. 2. R. Bd. XV. S. 100) der Säuren nicht gehörig gewürdigt oder verstanden. — Die gute Prüfung des Zinnobers ist noch die vollständige Auflösung desselben in schwefelwasserstoffsäurem Ammoniak mit Zusatz einer angemessenen Menge Aetzkali. — Der Gehalt von Schwefelsäure in dem *Ferrum oxydatum* der preuss. Pharmacopoe constant, und schon deshalb sollte die Pharmacopoe demnächst auf eine bessere Vorschrift Bedacht nehmen. Dieses Eisen-

ert stets einen *Aethiops martialis*, welcher ziemlich viel Schwefel enthält. — Hinsichtlich des *Kali carbon. e tartaro* wäre Verunreinigung desselben mit Cyankalium zu gedenken gewesen, zumal die Vorschrift der Pharmakopöe zur Bereitung des Salzes ohne genügenden Grund den *rohen* Weinstein vorschreibt. Die Vorzüglichkeit des gereinigten Weinsteins glaube ich wenigstens vor einiger Zeit nachgewiesen zu haben. — Eine falsche Reaction des Jodkaliums ist, nach meiner Ansicht, nur als ein Fehler dieses Salzes zu betrachten, und gehört keineswegs zu den Eigenschaften desselben. — Von dem *Kali sulfuratum* wäre noch zu bemerken gewesen, daß dasselbe stets schwefligsaures Kali und zwar in solcher Menge enthält, daß dessen Gegenwart nicht etwa von Zufälligkeiten abzuweichen ist. Als gute Prüfung dieses Präparats halte ich auch die Vermischung der wässrigen Lösung mit einer Salmiaklösung, bei der ein reichlicher Niederschlag von Schwefelmilch entstehen muß, die Flüssigkeit noch gelblich gefärbt bleiben muß. — Die Verunreinigung des schwefelsauren Kalis mit Zinkvitriol war etwa 10 Jahren leider noch häufig genug und ist es vielleicht in einigen Gegenden noch. Ich habe dieses gefährliche Salz damals nicht allein in den Fabriken zu Nordhausen entdecken gesehen, sondern auch öfters in Apotheken angetroffen. Von dem *Liq. Ammon. succin.* der preuss. Pharmakopöe wäre zu bemerken gewesen, daß derselbe, genau nach der Vorschrift bereitet, zweifach-kohlensaures Ammoniak enthält. Die Vorschrift verdient, wie ich meine, eine Ergänzung und Verbesserung. — Die Prüfung des *Liq. Ferri muriatici oxydati* auf überflüssige Säure und auf Eisenoxydul wäre gewiß zu beachten gewesen. — Die *Mixtura sulphurico-acida* der preuss. Pharmakopöe ist eigentlich die *Aq. Rabellii*, folglich schwächer an Schwefelsäure, als das ursprüngliche *Elisir. acid. Halleri*. — Das gewöhnliche *Natrum carbonicum* wird wohl immer nach Uebertragung mit Essigsäure (oder auch Salpetersäure) einen Niederschlag mit Bleizucker geben. Ich würde hier immer die Anwendung des Chlorbaryums vorziehen. — Zu bemerken wäre ferner, daß das *Stibium oxydat. alb.* immer Arsenik und schwefelures Bleioxyd enthält. Der Arsenikgehalt in vielen, vielleicht in allen unsern Antimonialpräparaten, verdient alle Aufmerksamkeit. Ich glaube nicht, daß irgend ein von Arsenik freier Brechweinstein angetroffen wird. In unserm pharmaceutischen Institute sind auch hierüber vielfältige Versuche angestellt worden, welche mich zu einer Ansicht geführt haben, schon vor längerer Zeit bis zu einem gewissen Grade von mir gehegt wurde. Die Vorschrift der preuss. Pharmakopöe, das Schwefelantimon aus *Regul. Antimonii* und Schwefel zu stellen, scheint mir eher unzweckmäßig, als zweckmäßig zu sein, weil das käufliche Antimonmetall stets reicher an Arsenik ist, als das reinere natürliche Schwefelantimon aus Ungarn. — Die Schwefelmilch ist gar nicht selten mit Eisen und Kalkerde, auch wohl mit Blei und Arsenik verunreinigt. Auch die Verunreinigung derselben mit wohl 25 Proc. Gyps ist mir schon einmal vorgekommen. — Bei den weinsteinsäuren Salzen, insbesondere dem *Tart. boraxatus* und *Kali tartaricum* muß häufige Verunreinigung mit Eisen berücksichtigt werden;

sion hinzu, die Fabrikanten die Gefährlichkeit dieses Zus von Arsenik anerkannt, und alsbald auch nach einer von i neuauftgefundenen Methode vorzügliche Stearinkerzen ohne Arsenik hergestellt und der Commission zur Beurtheilung gelegt hätten: so dürfte nunmehr den Fabrikanten von der Polizei kein weiteres Hinderniß des Verkaufs ihres tadellosen Products in den Weg zu legen sein. Aus diesem stande erklärt sich, warum der verdrießliche Vorfall so unbekannt und unbeachtet blieb, bis Prof. Everitt am Scott zu London auf die in England verkäuflichen Stearzen aufmerksam wurden und im Herbst 1837 die *Weat society* zu einer umfassenden sanitätspolizeilichen Untersuchung dieser Kerzen veranlaßten. Das von der Societät erwähl mité, welchem außer Everitt auch Richard Phillip Golding Bird als Chemiker beigegeben waren, ermittelte die Herstellung der Stearinkerzen erst dann den Londonbrikanten glückte, als ein Individuum das Geheimniß einesatzes von weißem Arsenik zu dem Fette an die Fabrik verkaufte. Diese Aussage der Fabrikanten ward um so zweifelhaft, als Prof. Everitt in einigen Sorten London Stearinkerzen wirklich Arsenik nachwies, in andern Sorten doch, die von geschlossenen Gesellschaften und Privatpersonen zur Prüfung mitgetheilt worden, so wie auch in Wachs-, Parath- und Talgkerzen durchaus keine Spur von Arsenik decken konnte. Die Menge des weißen Arsens in den guten Kerzen variierte von 10 bis 18 Gran im Pfunde, und in der feilsten Sorte dieser Lichter waren nur  $4\frac{1}{2}$  Gran Arsenik halten. Everitt überzeugte das Comité, daß diese Kerzen weißen Arsenik nicht chemisch gebunden, sondern nur mechanisch beigemengt enthielten, woraus sich denn leicht erklärte, warum in der Spitze der Kerzen ungefähr Zweidrittel, in dem Ende derselben aber nur Eindrittel des ganzen Gewichts an Arsenik vorhanden waren.

Man fand, wie nicht anders zu erwarten ist, daß beim Brennen dieser Kerzen feine Dämpfe von arseniger Säure entweichen und an kalte Körper, etwa an eine Glastafel oder Becherglas, die man in einiger Entfernung, z. B. von 16 Zoll, über der Flamme hielt, sich anlegten. Indessen stellte Golding Bird noch besondere Versuche in der Absicht an, den Zustand zu bestimmen, in welchem das Arsenik bei der Verbrennung arseniger Fette verflüchtigt werde. Er bewies, was man vermuthen konnte, daß bei gewöhnlicher ungestörter vollständiger Verbrennung des Fettes nur arsenige Säure entweicht, aber bei behindertem Luftzutritte auch metallisches Arsenik selbst das höchst gefährliche Arsenikwasserstoffgas entweichen kann. Man kann jedoch nach meiner Ansicht wohl sicher annehmen, daß die arsenige Säure nur als Arsenik in die Flamme der Kerzen gelange und dann wieder zu arseniger Säure verbrenne, weil, wie bekannt, eben von diesem oxydationsprocesse der knoblauchartige Geruch des Arsens abhängt. Es wäre sonst nicht erklärlich, daß, zufolge der Untersuchung einiger Zeit zu Wien von Sachverständigen angestellt wurde, schon  $\frac{1}{1000}$  weißer Arsenik in den Stearinkerzen genügt, um diesen die Eigenschaft zu ertheilen, beim Brennen

anten arsenikalischen Geruch zu verbreiten. Auch bemerkt reul in einem, in dem Anhang zu dem *Report* mitgetheilten Briefe an Dr. Granville ausdrücklich, daß die arsenigten Kerzen den Knoblauchgeruch beim Brennen und zwar erst gleich nach dem Auslöschen der Flamme entwickelt.

Die Quantität des weissen Arseniks in den Londoner Kerzen bestimmte übrigens Everitt durch Auskochen derselben mit Wasser und durch Fällen des Arseniks mit Schwefelwasserstoffgas.

Wegen der grossen Einfachheit und Leichtigkeit, jede Spur von Arsenik in Kerzen aller Art schon durch den Geruch zu erkennen, halte ich es für höchst unwahrscheinlich, daß jemals ein Kerzenfabrikant in Deutschland, der Heimath des viel benutzten weissen Arseniks, auf den unklugen Gedanken verfallen sollte, seinem Fabrikate eine sich sofort selbst verderbende schädliche und gefährliche Beimischung zu geben. Man kann daher die Verdächtigungen der Millykerzen, wie sie zuerst in Wien vorkamen, für ganz absurd erklären. Man kann man inzwischen nach der Absicht, in welcher einige französische und englische Fabrikanten ihren Kerzen weissen Arsenik hinzumischen, so stellt sich als die grössere Wahrscheinlichkeit heraus, daß sie der Flamme ihrer Kerzen einen hellern Schein verschaffen wollten. Das Comité der *Westminster society* hat jedoch der Angabe eines Fabrikanten, daß nämlich der Zusatz von 1 Pfd. weissen Arsenik zu 120 Pfd. Stearinlichter bei einer Temperatur von 90° C. die Cohäsion der Stearinvermehrte, Beifall schenken zu müssen, ohne durch eigene Versuche die Richtigkeit der Angabe zu bestätigen. Mittlerweile dürfen wir annehmen, daß an dem ärgerlichen Geheimnisse der Kerzenfabrikanten nicht mehr war, als an dem Geheimnisse, mittelst Kupfervitriols eine gute Hefe aus Malz zu erzeugen, worüber ich schon vor mehreren Jahren einen gutachtlichen Bericht an eine Behörde im Hannöverschen abzustatten oder an dem damit zusammenhängenden Geheimnisse belächelter Brodbäcker, heillosen Andenkens, welche vor etwa 10 Jahren ihrem Brode Kupfervitriol hinzugemischt hatten. Höchst wahrscheinlich war nur die Anwendung der Wärme von 90° C. der damals noch nicht gewürdigte Unterschied in der Art des Pressens der Stearinsäure das Wesentliche bei jenem zu dem Berühmtheit gelangten und anderweitig ausgebeuteten Geheimnisse der Pariser und Londoner Kerzenfabrikanten. Wie es scheint, jetzt in allen Stearinfabriken befolgte, noch wenig allgemein bekannte Procedur besteht darin, den mit ätzendem Kalk zu verseifen, die Seife durch Schwefelsäure wieder zu zersetzen, die fettigen Säuren bei etwas erhöhter Temperatur einem möglichst starken Drucke auszusetzen, die auf solche Weise von der Oelsäure vollständig befreite Stearinsäure durch Umschmelzen zu reinigen. Ehe die Stearinsäure in die metallnen Giefsformen ausgegossen wird, setzt man ihr ein wenig Wachs hinzu, damit sie ihre Krystallisirbarkeit und Sprödigkeit verliere. Letzteres zu erreichen, ist nun das Hauptbestreben der Fabrikanten. Das Räthsel glücklich zu lösen zu können, macht das vornehmste Geheimniß derselben aus. Daß ein bloßer Zusatz von Wachs, auch wenn er



25 Proc. der Stearinsäure, welche aus guter Hausseife rein gestellt worden, beträgt, den Zweck nicht erreichen lassen. Ich habe mich schon vor mehreren Jahren angestellte Versuche vollkommen überzeugt. Nunmehr erfahren wir Gouffier - Besseyre (*S. Journ. f. pract. Chem. Bd. 18.*) daß ein anfangs kaltes und dann erst warmes Auspressen der Stearinsäure den Zusatz von Wachs ganz entbehrlich ist. Das Comité der *Westminster society* führt von den Stearinkerzen, die man in England auch *deutsche Kerzen* nennt, an, daß der geflochtene Docht derselben in verdünnte Schwefelsäure getaucht werde, bis er fast zerstört sei, und daß man die Stearinsäure mit Gummigutt färbe, um das Fett dem Wachs ähnlicher zu machen. In Deutschland thut man, wie ich schon erwähnt, weder das Eine, noch das Andere, und je weißer und reinere diese Kerzen sind, desto gesuchter sind sie. Die Kerzen müssen zopfförmig geflochten sein, und werden während noch in der Form etwas gedreht, weil sie alsdann beim Brennen keine festhängenden Schnuppen, wodurch die Lichtstärke vermindert wird, erzeugen sollen. Die Stearinsäure-Lichter, wenigstens die bei uns jetzt in großer Menge benutzten von Mögeldorf, zeichnen sich durch ihre größere Härte und den starken Klang beim Anschlagen vor den Wachs- und Wallrathkerzen aus. Auf ihrer Außenfläche erscheinen sie zwar glänzend, weil sie durch Reiben mit Flanell polirt worden, aber beim Bruch sind sie matt. Beim Reiben mit einem harten Körper geben sie eine matte, pulverige Oberfläche, aber eine glatte und glänzende, wie die Wachs- und Wallrathkerzen. Die Wachskerzen zerspringen beim Zerschlagen in concentrischen Lagen, die Wallrathkerzen sind auf dem Bruch uneben und nicht so glänzend. Die Stearinsäure erkennt man aber am besten, wenn man von der angezündeten Kerze einige Tropfen auf eine Porcellantasse fallen läßt. Die Tropfen erstarrt zu einer glänzenden Oberfläche, können aber leicht mit den Fingern zerrieben werden. Uebrigens verfertigt man auch in Deutschland, z. B. in Braunschweig, durch Pressen des Talges, Kerzen aus eigentlichem Stearin (etymologisch richtiger Steatin). Obgleich diese Kerzen von ringerer Qualität sind, als die aus Stearinsäure bereitet, so gewährt die Fabrikation derselben doch den großen Vortheil, daß das ausgepresste Olein zur Bereitung einer sehr guten Hausseife tauglich bleibt, während die Oleinsäure nicht anders als nur mit einem Zusatze von festen Fetten oder Harzen darstellbar werden kann.

Niemand wird im mindesten daran zweifeln, daß der Gebrauch brennender arsenikhaltiger Kerzen der Gesundheit nachtheilig werden könne und müsse. Gleichwohl hat das Comité der Pariser Aerzte noch besondere Versuche mit großer Sorgfalt angestellt, welche, wie mich dünkt, ein nicht geringes sanitäres und polizeiliches Interesse haben. Es wurden nämlich zwei ziemlich große Behälter mit der Vorkehrung eingerichtet, dieselben den erforderlichen Luftzug hindurchlassen zu können. In dem einen dieser Behälter erhielt man 3 bis 4 arsenikhaltige Londoner Stearinlichter 7 Tage hindurch, jeden Tag etwa 12 Stunden lang, brennend, in dem andern aber eben so viel



chter. In jedem Behälter hielt man ein Kaninchen und Meerschweinchen, und in dem erstern auch zwei Hänflinge gesperrt, daſs man die Thiere, die mit hinlänglicher Nahversorgung wurden, genau beobachten konnte. Die Vögel, denen man successive fünf in den Käfig brachte, starben sogleich, als die gegen schädliche Dünste aller Art empfindlichen Thiere. In den Leichnamen der Vögel wurde, jedoch ohne Schwierigkeit, das tödtliche Gift in sehr geringer Menge wieder nachgewiesen, gar nichts davon aber auf dem Gerdesselben entdeckt. Die übrigen, den Arsenikdämpfen fortwährend ausgesetzt gewesenen Thiere erkrankten zwar, aber nur übergehend und, wie man nach dem Berichte glauben darf, nicht mit nachhaltigen Folgen für ihren Gesundheitszustand. Das fortwährende Wohlbefinden der in dem zweiten Käfig gefangen gehaltenen Thiere gab den Maassstab zur Beurtheilung ab. Einerseits beweisen also direct diese Versuche die Schädlichkeit des Dunstes, welchen arsenikhaltige Lichter beim Brennen verbreiten. Mithin muſs der kleinste Zusatz von Arsenik zu irgend einem Beleuchtungsmaterial in dieselbe Kategorie der Gefährlichkeit fallen, wohin der Zusatz von Bleioxyd zum Wachs, die Färbung der Conditorenwaaren mit giftigen, namentlich arsenikalischen Farben (vergl. meine Untersuchung im *Journal der Pharmacie B. 33. pag. 123. Jahrg. 1829*), u. d. m. n. Andererseits zeigen aber auch diese Versuche, daſs, selbst einmal ein Kaninchen oder Meerschweinchen durch Einathmen von etwa 36 arsenikhaltigen Stearinkerzen, in denen nach Angabe zufolge, nicht wenig arsenige Säure enthalten ist, im Verlauf einer Woche getödtet wurde, auch nicht so eine besonders schädliche oder gar tödtliche Wirkung zu erwarten ist, wenn man den arsenikalischen Geruch einer Kerze wahrnehmen sollte, und wenn man nur dafür sorgt, daſs die Kerze nicht weiter verbraucht werde. Es ist ja eine hinlänglich bekannte Thatsache, daſs man stärkere arsenikalische Dämpfe, als sich aus einer brennenden Kerze entwickeln können, B. bei Löthrohrversuchen, auf kurze Zeit ohne sonderlichen Nachtheil ertragen kann, obwohl es immer rathsam ist, das Einathmen der Arsenikdämpfe möglichst zu vermeiden. Es ist daher zu warnen und sie auf unbekannte Gefahren aufmerksam zu machen\*), und sie durch absichtlose oder gar durch eine irgendwie motivirte Uebertreibung in unnöthige

Bei dieser Gelegenheit muſs ich, namentlich sanitätspolitische Behörden auf das jetzt sehr verbreitete, allenthalben verkäufliche und darum sorglos benutzte »Fliegenpapier«, welches mit *arseniksaurem Kali* getränkt ist, hinweisen. Zur Prüfung des giftigen Stoffes in diesem Papiere wurde ich im vorigen Sommer durch einen hiesigen Arzt veranlaſst, nachdem ein Kind, welches an dem in der Stube ausgelegten Papiere gekauet hatte, unter Symptomen einer Vergiftung erkrankt war. — So eben lesen wir auch in den Zeitungen die in gleichem Sinne gehaltene Warnung L. Gmelin's in Heidelberg gegen die allgemeine und rücksichtslose Benutzung der mit Schweinfurter Grün gefärbten Tapeten.

Wr.

Furcht und Angst zu setzen, dazwischen besteht sicherlich großer Unterschied. Ich kann es daher auch nicht billigen, daß Hr. Dr. Grofs in dem Vorworte zu dem *Report* die unverbürgte Geschichte von der versuchten Vergiftung des Kaisers Leopold I. als »historischen Beitrag« anführt. In obigen Buchhändleranzeige erscheint sie vollends als eine gemachte Thatsache, während, wie ich glaube, leicht nachzuweisen ist, daß sie nebst ihrer Zugabe von dem Mordsinne Jesuitenprocurators eine in die Geschichte eingedrungene Lüge ist, welche aufzudecken schon im Interesse der gerichtsärztlichen Medicin liegt. Dr. Grofs erzählt die pikante Geschichte nach den Mittheilungen Remer's in seiner »gerichtlichen Chemie I. pag. 302, Remer aber nach der, wie es scheint, einzigen Quelle, nämlich nach der Uebersetzung eines hinterlassenen Manuscriptes eines gewissen Franz Borri in dem *Morgenblatt von 1811. Nr. 174*. Remer hat bei seiner anerkannten Genauigkeit gewiß auch hier ganz treu nacherzählt, und es scheint mir nichts darauf anzukommen, die Erzählung in dem Morgenblatte nicht selber prüfen zu können, da Borri in der Literatur der Alchemie ein hinlänglich berühmter Name ist. In meiner historischen Skizze der Alchemie, im *Arch. der Ph. 2. R. A. X. H. 1. Jahrg. 1838*, habe ich Folgendes über ihn zu sagen Veranlassung gefunden. »Zu den anmaßlichen Betrügnern gehört Borri, ein wegen Vergehen gegen die Hierarchie aus Italien geflüchteter Mailänder, in Diensten König Friedrich III. von Dänemark, welcher vorgab, unter dem Einflusse eines alchemistischen Geistes zu stehen. Dieser Geist, den Borri seinen *Humunculus* nannte, hatte einst den Bau eines Ofens angeordnet. Als der König den Ofen in seiner nächsten Nähe haben wollte, mußte der unantastbare Ofen sammt dem Hause, worin er sich befand, mittelst Maschinen über den Schloßswall gehoben werden. Der Nachfolger König Friedrich's theilte nicht den Glauben an die Alchemie, und Borri wurde entlassen. Ihn aber wegen Nachrichten über die Erfolge der Alchemie in Griechenland, Aegypten und der Türkei, so wie Gerüchte von den alchemistischen Bestrebungen des Ali Bassa von Kahira und des Mahomed Kiuperli, Großveziers unter Muhamed IV, nach Finnland jähriger Thätigkeit in Kopenhagen, 1670 nach dem Orient zu schicken. In Ungarn ward er aber festgenommen und unter dem Vorwande des früher gegen ihn ausgesprochenen Kirchenbannes in Rom 25 Jahre lang, bis zu seinem Tode in Gefangenschaft gehalten. Der Umstand, daß dem gewandten Italiener in der Engelsburg ein eignes Laboratorium zur Ausarbeitung des Secretes der Weisen eingerichtet wurde, beweist die ganz veränderte Ansicht des damaligen Kirchenoberhauptes von der Wahrheit der Alchemie.« Diese Erzählung stützt sich hauptsächlich auf die Angaben Schmieder's in seiner *Geschichte der Alchemie pag. 463*, und kann jetzt um so eher, wenigstens ihren Grundzügen nach, als völlig wahr und richtig betrachtet werden, nachdem es mir geglückt ist, auch außer dem Bereiche der vielleicht einseitigen alchemistischen Schriftsteller eine kurze Charakteristik Borri's aufzufinden, welche zu jener Erzählung vollkommen paßt. In Joecher's *allgemeinem Gelehrtenlexicon* *1750*. heißt es nämlich: »Franziscus Borri, ein berühmter

hymist von Mailand, wurde wegen Erfindung des *lapidis philosophorum*, wegen gerühmter Offenbarungen und anderer vereimten Dinge in Verdacht der Ketzerei gesetzt, dannen-  
 er sich von Rom nach Straßburg, Amsterdam, Hamburg, Coppenhagen retiriret; und als er sich von da nach der  
 kei wenden wollen, ward er nach Wien geführt, dem  
 ste nach Rom ausgeliefert und daselbst zu Abschwörung  
 der Lehren und ewigen Gefängniß verdammet, doch endlich  
 die Engelsburg geführt, allwo er seine Zeit mit Studien  
 chymischen Operationen zugebracht, bis er 1695 im 79.  
 re gestorben. Er lehrte, die Mutter Gottes sei eine wahr-  
 ige Gottheit, und eigentlich der eingefleischte heilige Geist;  
 Seele des Menschen sei von der Substanz der bösen Geister  
 Ausfluß, und daher sterblich; der Pabst sei der Antichrist;  
 Fall des Lucifers habe darin bestanden, daß er den Sohn  
 die heilige Jungfrau nicht habe anbeten wollen.« Unter  
 hren andern Schriften soll Borri, nach Joecher's Angabe,  
 1670 eine Autobiographie geliefert haben. Letztere ist  
 hat wahrscheinlich identisch mit den Memoiren Borri's, wel-  
 des Morgenblatt von 1811 mittheilt. Dieses historische Do-  
 nent, die Quelle einer seit Jahren in der Wissenschaft mit  
 geschleppten Erdichtung, ist verdächtig genug, um mich zu  
 der Widerlegung der letztern zu veranlassen. Man kann  
 Al zugeben und muß selbst nach dem Brauch der Alchemi-  
 es höchst wahrscheinlich finden, daß Borri auf seiner Fahrt  
 Morgenland 1670 (nicht 1760, wie Dr. Grofs schreibt) auch  
 Kaiser Leopold I. in Wien aufsuchte, da dieser Kaiser der  
 Chemie sehr ergeben war und schon im Jahre 1660 den Kün-  
 des berühmten fahrenden Alchemisten Monte Snyders gro-  
 Aufmerksamkeit geschenkt hatte, und sogar der Mäcen fah-  
 der Adepten genannt wurde. Auch ist sehr wohl möglich,  
 Borri freiwillig oder unfreiwillig zu glücklicher Stunde  
 Wien anlangte, um in Gemeinschaft mit dem Leibarzte von  
 elli zwei Monate lang den Kaiser ärztlich behandeln zu kön-  
 n. Physisch unmöglich ist indessen das, was Borri über die  
 Wachskerzen, durch deren längeren Gebrauch in des Kaisers  
 ummern eine eben so unbegreifliche, als unbesiegbare Kränk-  
 keit dieser fürstlichen Person, und zwar wie man glauben  
 es, ausschließlich veranlaßt worden sein soll, ziemlich aus-  
 ürlich berichtet. Diese Wachskerzen sollen 10 Procent wei-  
 ßen Arsenik enthalten haben. Wenn dieselben aber bei solch  
 diesem Zusatz von Arsenik nicht ganz auseinander fielen und  
 überhaupt nur zum Brennen tauglich blieben, so müssen sie  
 mindestens einen wahrhaften Qualm von Arsenikdämpfen ver-  
 eitet haben, mehr als hinreichend, alle Bewohner der Kaiser-  
 chen Burg bis auf den Burgherrn selbst auszutreiben. Diesen,  
 en Kaiser, nehmen wir billig aus, da er als guter Alchemist  
 gegen die Arsenikdämpfe noch unempfindlicher geworden sein  
 achte, als die Arbeiter in seinen böhmischen Arsenikhütten,  
 jedoch, so viel man weiß, niemals ihr Geruchsorgan gänz-  
 ch einbüßen. Nun sollen aber jene Wachskerzen nur mit  
 öhlicher Flamme gebrannt, umhergespritzt und einen feinen  
 weißen Dunst verbreitet haben, und nur der Docht derselben  
 oll mit Arsenik überzogen gewesen sein. Da hierbei des pene-

tranten knoblauchartigen Geruchs nicht gedacht wird, paßt schon aus diesem Grunde die Beschreibung von der Art des Brennens dieser Kerzen auf die Zumischung eines jeden andern Stoffes eher, als auf die von Arsenik. Gesetzt aber, wenn dem Kaiser noch irgend Jemandem in seiner Umgebung der arsenikalische Geruch aufgefallen, und der weisse Arsen hätte nur so wenig, wie in den Londoner Kerzen, d. h. etwa 1000 betragen, so ist vollends unerklärlich, wie die Decke des kaiserlichen Zimmers mit Arsensublimat überzogen werden konnte. Borri muß noch andere und noch feinere Mittel zur Auffindung des Arsens gekannt haben, als wir gegenwärtig. Schade, daß er nichts davon sagt, sondern mit unverschämter Dreistigkeit angiebt, in dem Schweisse des Kaisers, der nach den von ihm verordneten Mitteln eingestellt haben sei viel Arsenik enthalten gewesen. Ist aber wohl jemals ein größerer Unsinn in einer offenbaren Unwahrheit ausgesprochen worden? Wenn Borri seine Angaben mit der Insinuation abschließt, daß, nach einer Aeußerung des Kaisers gegen den Primas von Savoyen, ein Jesuiten-Procurator die Lieferung der verordneten Kerzen besorgt habe: so können und wollen wir, da dem in der Engelsburg eingesperrten, von der Hierarchie bedrückten, armseligen Goldmacher und unglücklichen Knecht eine Rache dieser Art gern nachsehen, nur dürfen wir auf keinen Fall solche Erdichtungen anders, als in Form eines Märchens nacherzählen. Es könnte sich bei Nichtachtung dieses Grundsatzes sonst wohl ereignen, daß auch das Geklätsch einiger französischen Zeitungen, denen zufolge auf den Spiegeln in Dom Pedro's ehemaligem Schlafzimmer in Lissabon und Oporto Niederschläge von Arsenik gefunden sein sollen, allmählig in ein historisches Factum verwandelt würde. Herr Dr. Grofs hätte, meiner Ansicht nach, die Unentschiedenheit seines Urtheiles in Betreff der Wahrheit dieser Nachrede sehr wohl durch die Frage beseitigen können, welcher Chemiker denn auf dem Staube auf Dom Pedro's Spiegeln Arsenik entdeckt und nachgewiesen habe? Schwierig wäre wohl immer hier die Ermittlung des Arsens gewesen, und für den Kammerdiener des Herzogs von Braganza, wenn er nicht etwa zugleich ein guter Analytiker war, ganz gewiß rein unmöglich.

Jena, im Januar 1840.

H. Wackenroder.

*Histoire des embaumements et de la préparation des pièces d'anatomie normale, d'anatomie pathologique et d'histoire naturelle. Par J. N. Gannal. Paris: Ferra, 1838.*

Die Methoden Gannal's zum Balsamiren von anatomischen Präparaten und dem Einbalsamiren von Leichen sind schon vielfach besprochen worden. In vorstehendem Buche handelt der Verf. speciell davon (Vergl. *Zeitschrift f. die gesamte Medicin* von Fricke u. Oppenheim, IX. 174).

Die beiden ersten Capitel dieses Buchs handeln vom Einbalsamiren überhaupt und von den natürlichen Mumien, das dritte und vierte von den Einbalsamirungen bei den Guanchen von Egyptern. Nach dem von Bory St-Vincent beschriebenen

fahren nahmen die Guanchen die Eingeweide des Unterleibs der Leiche heraus, wuschen Alles mit Salzwasser und füllten die Höhlen des Körpers mit gewürzhaften Pflanzen. Die Leiche wurde dann an der Sonne oder im Ofen getrocknet, mit einer aus wohlriechenden Pflanzen, Fichtenrinde, Harz, Bimsstein und Ziegenfett bestehenden Salbe eingerieben, in Ziegenfelle eingnähet und in eine Grabhöhle gelegt. In den Egyptern kamen dreierlei Arten von Einbalsamirungen vor. Bei der ersten wurde das Gehirn durch die Nasenlöcher, die Eingeweide durch einen Einschnitt in die linke Bauchseite entfernt, und in Palmenwein gewaschen, der Körper hierauf mit wohlriechenden Substanzen, Myrrhe, Aloe, Zimmt und Cassia gefüllt und nachdem er 70 Tage in Natron (das Natron der Alten war ein Gemenge von kohlen., schwefels. und salzs. Natron) gelegen, abgewaschen und mit baumwollenen oder leinenen Binden umwickelt. Die erste Einwicklung um Rumpf und Extremitäten ist mit Harzen überzogen, auf diese folgen andere, den ganzen Leib umhüllende Binden, ohne harzige Materie. Bei der zweiten minder kostspieligen Art wurde die Leiche, ohne einzuschneiden, mit Cedria, einem flüssigen Harze aus der Arabien, ausgespritzt, und dann in Natron eingesalzen. Die dritte theilweise Art war der zweiten gleich und nur die eingespritzte Substanz eine andere, wahrscheinlich Asphalt. Auffallend ist, daß die alten Schriftsteller des wichtigsten Theils der Operation, der Austrocknung der balsamirten Leiche in der Hitze, noch erst die innige Verbindung der Harze mit dem Körper erwähnt wurde, nicht erwähnen.

Das fünfte Capitel handelt von den Einbalsamirungen späterer Völker, bei Juden, Griechen, Römern u. a. Das Verfahren größtentheils unbekannt, und von diesen Mumien sind keine in unsere Zeit gekommen.

Im sechsten und siebenten Capitel werden neuere Methoden der Einbalsamirung und Conservirung anatomischer Präparate miteinander verglichen. Das achte Capitel betrachtet das Verfahren Gannal selbst. G. hat alle bisher vorgeschlagenen Mittel zur Conservirung thierischer Substanzen geprüft. Säuren zerlegen die thierischen Stoffe um so mehr, je concentrirter sie sind; verdünnte Salpetersäure erhält die Nerven, erweicht aber die Muskeln und macht die Muskeln und Eingeweide welk und farblos. Arsensäure schützt vor Verwesung, befördert aber die Austrocknung. Essigsäure verspätet die Fäulniß, erweicht aber die Knochen und Muskeln. Concentrirte alkalische Laugen lösen die thierischen Stoffe auf und verdünnte wirken ebenfalls zerstörend darauf ein. Salze erhalten das Fleisch nur, wenn sie trocken oder in concentr. Auflösung angewandt werden; zur Conservirung von Präparaten, die zum Seciren bestimmt sind, lassen sich nicht benutzen, weil die concentr. Salzlösungen beim Absetzen Krystalle absetzen. Von Metallsalzen sind nur Kupfer- und Merkurialsalze anwendbar, aber nicht ohne Gefahr. Alkohol schützt zwar die thierischen Stoffe gegen Fäulniß, aber verhärtet und verhärtet sie, und wird wegen seiner leichten Verunstaltung kostbar. Gerbstoff und Kreosot sind nicht anwendbar.

Am genügendsten fand G. die Alaunerdensalze, deren Basis sich mit der thierischen Gallerte verbindet, während die Säure



frei wird. Er löst 2 Alaun, 2 Kochsalz, 1 Salpeter in Wasser zu  $10^0$  Areometer auf. Die mit dieser Auflösung injicirten Cadaver conserviren sich sehr gut, wenn sie zugleich die Flüssigkeit eingebracht werden, die Temp. darf aber nicht über  $10^0$  C. steigen. Bei höherer Temp. muß auch die Auflösung erwärmt und so viel des Salzes darin aufgelöst werden, daß die Auflösung  $25 - 30^0$  am Ar. zeigt. Alaunsalze, die leichter löslich als Alaun, als essigs. und salzsaure Thonerde, sind dem Alaun vorzuziehen. Leichen, welche in eine Wanne concentr. Lösung von essigs. Thonerde gelegt wurden, haben sich nach zwei Monaten so wenig verändert, daß die Auspurgung der Gefäße vollkommen gelang. Aus der Wanne herausgenommen, trockneten die Muskeln ein, ohne zu faulen, und tiefer liegenden Organe litten keine Veränderung. Diese Methode haben aber, abgesehen von den Kosten, den Nachtheil, daß die Haut gerben und hart machen. Eine Leiche, die mit einer Auflösung von essigs. Thonerde von  $20^0$  Ar. injicirt war, erhielt sich vom August bis Januar, obgleich sie frei auf dem Tisch lag; nach den ersten vier Wochen fing sie an zu trocknen, weshalb ein Theil derselben mit Firnis überzogen wurde; die Leiche liefs sich im Januar wie ein frischer Cadaver seciren, während die nicht überfirnissten Theile vollständig mumificirt waren.

Am besten entspricht die Auflösung von einfach-schwefels. Thonerde. Injicirt man die Gefäße einer Leiche mit einer Auflösung von 1 Kilogramm. schwefels. Thonerde in 2 Liter Wasser, so erhält sie sich 3 Monat frisch, und schon die bloße Einspritzung durch Mund und After reicht hin, sie 4 — 6 Wochen zu erhalten. Je heißer die Temp. ist, um so stärker muß die Auflösung sein, deren man sich zur Injection bedient.

Auf den Wunsch einer Commission der Akademie der Medicin in Paris, auf deren Antrag G. den Monthyon'schen Preis für Erfindungen, welche die schädlichen Einflüsse eines Gewerbes auf die Gesundheit aufheben, erhielt, stellte G. auch einen Versuch mit der Methode Tranchina's an, der ein Gemisch von 20 Pfund Arsenik in 20 Pfund Wasser oder Weingeist injicirt. Die Leiche erhielt sich 8 Tage gut, trocknete aber ein, so daß sie schon nach 5 Wochen zu anatomischen Untersuchungen unbrauchbar und nach 7 Wochen völlig eingetrocknet war. Der Arsenik ist aber so schwerlöslich, daß die eingegabene Flüssigkeit die größte Menge des Pulvers ungelöst enthält; für anatomische Theater ist dieses Mittel wegen der Gefahr für die Präparirenden durchaus unzulässig.

Für die Conservirung von Thieren und anatomischen Präparaten giebt G. folgendes Verfahren an: 1) eine Auflösung von 1 Kilogramm. einfach-schwefels. Thonerde in 6 Liter Wasser, 2) eine Auflösung derselben Menge des Salzes in 6 Liter Arsenik gesättigtem Wasser, 3) eine Auflösung von essigs. Thonerde zu  $5^0$  Ar. mit Arsenik gesättigt.

Die Präparate werden 14 Tage lang in die erste Flüssigkeit gelegt, darauf 3 — 5 Monate in die zweite und endlich in die dritte, wo sie sich Jahrelang erhalten. Will man die Präparate im trocknen Zustande aufbewahren, injicirt man die Gefäße durch die Carotis mit 5 — 7 Liter einer Auflösung von essigs. Thonerde zu  $20^0$ , welche 50 Grm. Arsenik enthält. Sollen die

o präparirt werden, so injicirt man sie 4 Tage darauf die Aorta mit  $\frac{1}{2}$  Liter einer Mischung aus gleichen Theilen Serpentin und Firnistinctur, und dann mit einer erwärmten Injectionsmasse aus gleichen Theilen Talg und Fichtenharz, so die Arterien roth, für die Venen schwarz oder blau ist. Das Präparat wird dann in der Sonne oder im Ofen getrocknet.

Die Einbalsamirungsmethode selbst hält G. noch geheim. Sie ist von dem eben bemerkten Conservationsverfahren wesentlich verschieden und folgende Vorzüge besitzen. Sie kann in einer halben Stunde beendet werden, die dazu nothwendigen Mittel sind leicht zu handhaben, ohne Gefahr für den Leichnam und ohne Nachtheil für die Instrumente; eine Oeffnung in einigen Linien zum Injiciren der Carotis macht alle Operationen möglich, so wie das Ausnehmen der Eingeweide überflüssig ist. Die Farbe und Weichheit der einzelnen Organe erleidet keine Veränderung und die Kosten belaufen sich nicht über 300 Rthlr. Die Zuverlässigkeit seiner Methode beweist G. durch Beispiele. Eine von ihm einbalsamirte Leiche wurde nach 10 Jahren, eine andere nach  $\frac{5}{4}$  Jahren ausgegraben und beide vollkommen wohl erhalten gefunden, während die mit kohlensäurehaltiger oder schwefels. Thonerde behandelten Leichen sich zwar im Gebrauch der Anatomie lange genug conserviren, in der Luft aber eintrocknen und in feuchtem eingeschlossenen Zustande gelblich und schwarz werden, und sich ohne Fäulniß zerfallen, wie Leder an feuchten Orten oder unter der Erde.



## Fünfte Abtheilung.

# **T h e r a p i e.**

## Bemerkungen über einige russische Volks- Arzneimittel;

vom

Dr. Rath und Professor v. Tilesius in Leipzig.

Daß die *Sauerkraut-* und die *Gurkenlake* sehr gute harntreibende und abführende Kräfte haben, ist bekannt. Die Russen sehr gut und halten viel auf diese wohlschmeckenden Säfte, so daß sie selbst in dem hitzigen Fieber sogleich ihre Zuflucht zu ihnen nehmen, und sobald sie Besserung spüren, den

Gebrauch derselben so lange fortsetzen, bis die An-  
rungen durch Urin und Stuhlgang die ganze Kran-  
in der Geburt erstickt haben. Ein sehr geschickte  
erfahrener moskowitischer Arzt, der Staatsrath  
Professor Dr. Richter, sagt ausdrücklich\*), die  
kenlake ist ein kühlendes, gelindes und unschäd-  
Abführmittel, besonders bei anfangenden hitziger  
bern. Die ärmere und niedere Volksklasse bedien  
dieses Hausmittels noch bis auf den heutigen Ta-  
dem besten Erfolge, und die Erfahrung bestätigt,  
mehrere Gläser ohne Schaden genommen werden kö-  
Ich selbst, da ich sah, daß mir mehrere Mittel  
mir die gemeinen Russen riethen, so wohl bekam  
mir manche Krankheit in der Geburt erstickten,  
von der Gurkenlake bei jeder Gelegenheit, wo ich  
antiphlogistisches Abführmittel nöthig zu haben glau-  
den wohlthätigsten Gebrauch gemacht, und habe  
um so eifriger die russische Volksarzneikunst studirt,  
da ich bemerkte, daß bei diesen Leuten nichts The-  
sondern alles Praxis und Empirie\*\*) war. Nicht  
in Rußland, sondern auch hier in Deutschland bin  
diesem Hausmittel hold geblieben und habe sogar  
einem meiner Freunde, der das Vorurtheil gegen  
Hausmittel überwinden konnte, damit geholfen, an-  
die das nicht konnten, habe ich es in einem 12 Un-  
haltigen Arzneiglase als ein geheimes Specificum  
ihrer nachmaligen Zufriedenheit gerichtet. (Prä-  
sagte mein alter heiterer Präceptor Krause, *est  
tiplex!*)

---

\*) In seinem Werke: die Geschichte der Medicin in Ruß-  
land. Moskau 1813.

\*\*) Richter loc. cit. I, p. 137. Hildebrandt in observationes  
medico-chirurg. 1805.



Mit andern russischen Arzeneimitteln, die sich nicht leicht translociren und verpflanzen lassen, oder in dem Klima nicht dieselben Kräfte behalten, wie z. B. Himbeeren, die Vogelbeeren, die Moosbeeren u. s. w. Ich nicht so glücklich gewesen, in Deutschland wie- das Kräftige und Wirksame daraus zu erhalten, ich in Rußland daraus erhielt, und was ich den Erfahrungen der gemeinen Russen verdankte. Im Jahre hatte ich mich nach einer starken Bewegung und Ermüdung im Sommer, nach welcher ich in einen Schlaganfall mit heftigem Winde gerieth, so erkältet, daß heftige rheumatische Schmerzen in Armen und Beinen bekam, welche mir mein Laberschnik\*), ein gemein- gutmüthiger Russe im Erdgeschosse unsers Hauses, folgende Art curirte: Er brachte eine Düte getrock- neter Himbeeren (*Malina Russ, Rubi Idaei*), die er in seiner Küche in einem mit passendem Deckel wohl verschlossenen Topfe mit Wasser auskochte, durchsei- bte und mir die Colatur oder das Decoct tassenweise trinken gab. Die Himbeeren hatten ganz das Anse- hen, den Geruch und Geschmack der unsrigen, aber anderweit mehr energische und so heftig schweiß- treibende Kräfte, daß ich bald, nachdem ich zwei Tas- sen voll im Bette getrunken hatte, in starken Schweiß gerieth, zu dem sich, als er mir auch die dritte und letzte Tasse aufgenöthigt hatte, ein Erbrechen gesellte, welches die beiden ersten genossenen Tassen Himbee- thee wieder ausleerte und den Schweiß noch ver- mehrte, wobei sich die Schmerzen im Rücken, Armen und Beinen ganz verloren und ich nach wenigen Stun- den wieder vollkommen gesund war. Einige Jahre dar-

---

\*) Ein russischer Krämer, welcher mit Spezereien und Vic- tualien handelt, sein Kaufladen wird Laoka genannt.

nach versuchte ich dasselbe Mittel in einigen ähnlichen Fällen bei einem invaliden Soldaten und bei zwei Mädchen, die in meinen Diensten standen, mit eben so schnell und glücklichem Erfolge durch eben dieselben Wirkungen.

Als ich aber nach Deutschland wieder zurückgekehrt war und dasselbe Verfahren mit unsern deutschen Heerebeeren versuchen wollte, gelang es nicht; ich kann diese Verschiedenheit nicht anders erklären, als durch den Einfluß des Klimas und Bodens, und ich habe einige andere Parallelen und Beispiele zur Hand, welche mir diese Erklärungsart zu bestätigen scheinen, z. B. der *Fliegenschwamm*, welcher bei uns ein Gift ist, hält sich in seinen Wirkungen nicht eben so in Island, noch weniger in Kamtschatka, wo der wässrige Aufguß desselben, wenn er im wohlverschlossenen Gefaße einige Tage oder Wochen lang im Sommer der Sonne digerirt, ein berauschendes, bei den Koriaken sehr beliebtes Getränk liefert. Diese, den Rausch liebenden, halbwilden Völkerschaften essen den Fliegenschwamm auch roh, trinken viel Wasser nach und digeriren ihn auf diese Art sogleich im Magen und Stomach (Steller\*), der lange Zeit unter ihnen lebte, liefert die folgende Erzählung: »Der Fliegenschwamm (russisch: *Muchamor*, kamtschadalisch: *Cughakop*) steht in großem und sonderlichem Werth. Um die russischen Ostrogoth (Dörfer) ist dieses zwar schon lange außer Gebrauch; hingegen am Tigil und nach den koriäkischen Grenzen zu desto mehr im Gebrauch; sie trocknen diese Schwämme essen solche ungekaut in ganzen Stücken und trinken eine gute Portion kaltes Wasser darauf; nach Ver-

\*) Steller's Beschreibung von dem Lande Kamtschatka. Frankf. u. Leipzig 1774. 8. pag. 92.



er halben Stunde werden sie davon toll und besoffen, bekommen allerlei wunderliche Phantasien. Die Jakaken und Jukagiren sind dieser Speise noch mehr ergeben und darauf dergestalt erpicht, daß sie ihn über von den Russen aufkaufen; die sich aber aus Armuth nicht anschaffen können, fangen den Urin von den Beinen auf und trinken ihn aus, werden davon eben besoffen und noch toller, und so wirket der Urin auf den vierten oder fünften Mann. Ohngeachtet dieses in meinen Observationen von 1739 schon ausführlich berichtet hatte, ist mir doch solches von Jedem in Zweifel gezogen und widersprochen worden, so habe ich dahero mehr aus Liebe zur Wahrheit, für meiner Worte Autorität streitend, mich an dem selbst nochmals um den Grund der Sache bemühet erfahren, daß es sich also verhalte, ohne daran zu zweifeln zu dürfen: über dieses wurde mir von glaubwürdigen Leuten sowohl unter der russischen, als Cosackischen Nation referiret, ja von dem Sin Bojarsky Jukow selbst, der die Aufsicht über die Cassantherie hat, daß die Rennthiere diesen Schwamm essen, da sie großen Appetit zu Schwämmen tragen, nachher niedergefallen und als Besoffene eine Zeitlang ruhet, darauf in einen tiefen Schlaf gefallen. Wo die Jakaken also ein wildes Rennthier antreffen, binden sie ihm die Füße, bis es ausgeschlafen und der genossene Schwamm seine Kräfte verloren hat. Alsdann erst stehen sie dasselbe todt: bringen sie solches im Schlafe um in der Trunkenheit um, so gerathen alle diejenigen, welche von dem Fleische des Thieres essen, in eben dieselbe Raserei oder Trunkenheit, als ob sie den Fliegenwamm selbst gegessen hätten.«

Dies Alles sind Beweise, daß die Arzneikräfte

nicht blofs durch die Digestion, sondern auch durch die Secretionen des menschlichen Körpers extrahirt werden, und da ich erfahren hatte, dafs dem seligen Steller selbst von Akademikern, seinen damaligen Gegnern, war widersprochen und mehre seiner Berichte in Zweifel gezogen worden, so schrieb ich dem Herrn Dr. Langsdorf, der auf seiner Landreise durch Kamtschatka am Tigil und unter den Koriäken verweilte, selbst schon lange vorher, als wir noch im Peterpaulshafen in Kamtschatka zusammen waren, wo ich einige grofse Exemplare von Fliegenschwämmen nach der Natur für ihn abgebildet hatte, auf diese Schwämme aufmerksam geworden war, er möchte doch diese Versuche unter den Koriäken wiederholen und auf die Wirkungen genau Acht haben. Als er selbst von dieser Landreise zurückkam, bestätigte er die Beobachtungen des seligen Steller vollkommen und stattete selbst die Academie der Wissenschaften in St. Petersburg über diese seine Prüfungen und Wahrnehmungen Bericht ab, die vollkommen mit den Steller'schen übereinstimmten. Wenn wir hier unsere giftigen Fliegenschwämme mit Wasser übergießen und in verschlossenen Gefäfsen ein Paar Monate lang an der Sonne digeriren lassen wollten, so zweifele ich sehr, ob dieses Infusum blofs berauschende Kräfte äufsern würde. Von unsern Himbeeren aber erhalten wir, wenn sie mit Essig und etwas Essigäther übergossen und nach dieser Methode in wohlverschlossenen Gefäfsen an der Sonne digerirt werden, eine liebliche, harntreibende und antiscorbutische Arznei. Schon der in allen Haushaltungen bekannte und beliebte Himbeeressig und Himbeersyrup wird von Kindern genossen und äufserte keine so starke schweifstreibende und Erbrechen erregende Wirkung, wie ich

vier Tassen russischen Himbeerenthees in Peters-  
empfang.

Von den in Rußland wegen ihrer Heilkräfte ge-  
zten Säften der Vogelbeeren, *Sorbus aucuparia*,  
der Moosbeeren, *Vaccinia oxycoccos*, sagt Richter  
it. p. 98 und 105 Folgendes: »Die in Rußland so  
hnliche Vogelbeere *Sorbus Aucuparia* giebt, sobald  
mit Wasser übergossen und in Gährung gebracht  
ein bitteres, säuerliches, gelind abführendes Ge-  
. Vornehme pflegen, um den Geschmack angeneh-  
zu machen, es mit Zucker zu nehmen: auch der  
Zucker eingekochte Saft (*gelatina ex succo Sorb. Au-  
iae*) dieser Beere wird gleichfalls als ein angeneh-  
abfuhrmittel und oft auch als wurmtreibendes Mit-  
gebraucht.«

Die Russen essen bekanntlich nicht nur viel Knob-  
, Senf, Zwiebeln, Rettig und Meerrettig mit Essig,  
ern übergießen auch diese kräftigen Vegetabilien  
Wasser und digeriren sie mit frischer Raute als  
scorbutische Arzeneien in verschlossenen Gefäßen  
längere Zeit auf dem mäßig warmen Ofen oder  
er Sonnenwärme. Schon Nitsch\*) sah die heil-  
Wirkung und besonders des Rettigs (*Raphanus  
anistrum*) im Scorbute, mit dem zu seiner Zeit viele  
ke in Wiburg geplagt waren. Der in Rußland so  
e und saftige Rettig\*\*) wird zuerst auf einem Reib-

---

Commercium Noricum ab anno 1734, pag. 166.

Die japanischen Rettige sind noch weit milder und saftrei-  
cher als die russischen, sie haben nicht die Schärfe unse-  
rer deutschen Rettige, sondern kommen unsern weißen  
Rüben näher, sind aber nicht so süß, sondern mehr erfri-  
schend und so reich an kohlensaurem Gas, daß sie Aufsto-  
ßen verursachen, als hätte man ein gegohrnes Getränk  
getrunken. Man findet nirgends bessere Rettige als in Japan.

eisen gerieben oder geschabt und der Saft ausgedrückt ohne Zumischung von Wasser noch anderer Flüssigkeit. Man giebt diesen Saft, welcher eins der gebräuchlichsten und wirksamsten Brustmittel ist, frisch gleich dem er ausgepresst worden, im Keichhusten und andern migen Brustbeschwerden und Scorbut nach dem verschiedenen Alter des Kranken bald zu einem Theelöffel bald zu einem Eßlöffel, ja zu einem Weinglase ohne allen weitem Zusatz. Die zu allen Zeiten bewährte Wirksamkeit des Rettigsaftes hat ihm neben andern Arzneimitteln den höchsten Rang bei den Russen erworben. In den nördlichen Provinzen Rußland, besonders in der Gegend von Archangel und Wologda, so auch in Kamtschatka, wächst eine Pflanze welche *Rubus Chamaemorus* genannt wird und eine vorzügliche Kraft hat, dem Scorbut zu widerstehen und denselben zu verhüten. Eine ähnliche Kraft hat auch die hier so häufige Moosbeere, *Vaccinium oxycoccos*, und die Preusselbeere, *Vaccinium vitis idaea*.

So große Liebhaber auch die Russen vom Branntwein sind und ihre Stärkungsmittel\*) mit Branntwein übergießen, so hüten sie sich doch, die antiscorbutischen Beeren und die abführenden und harntreibenden Pflanzwächse mit einem andern Auflösungsmittel als Wein zu übergießen, aber sie digeriren sie lange an der Sonne. z. B. Isop (*Hysoppus officinalis*) und Schwertlilie Veilchenwurzel, *Iris Florentina*). Diese beiden Auf-

---

\*) Zu ihren Stärkungsmitteln gehört Alant, *Inula Helena*, Knoblauch, *Tscheremtscha*, Ingwer, *radix Zingiberis*, *ursinum*, Schafgarbe *Achillea millefolium*, Wermuth *thium*, Tausendgüldenkraut *Centaureum minus*, Beifuß *temisia*, unreife Pomeranzen oder *Cortex Aurantii*, Kümmel, *Semina Carvi*, *Anisum sellati*, *Coriandri*, *Foeniculi*, *Meliloti*, *Levistici* etc. S. Richter loc. cit. p. 108.



hen sie in schleimigen Brustkrankheiten gegen die  
e und Catharr; ist convulsivischer Husten dabei, so  
i sie Baldrian und Sternanis, auch wol Anis, Fen-  
und Coriander-Aufguß zu.

ei dem Bluthusten brauchen die Russen eine Man-  
ch oder eine wässerige Emulsion aus dem Samen  
Iariendistel, *Leucocantha vel Carduus Mariae*, und  
das nicht bald helfen will, einen kalten Aufguß  
schafgarbe tassenweise alle Stunden genommen.  
eigen und dem *frischen Honig schreiben sie nicht*  
*Grund Heilkräfte in Brustkrankheiten zu und ver-*  
*mit diesen beiden ihre Fruchtsäfte aus Himbee-*  
*erdbeeren, Heidelbeeren, Preusselbeeren und Moos-*  
*a, die sie auch in solchen Krankheiten reichen und*  
*anwenden.*

linder wichtig scheinen mir ihre Mittel, die sie  
den tollen Hundsbiss und tollen Wolfsbiss brauchen,  
den monatelang in verschlossenen Gefäßen dige-  
Aufguß der frischen Klettenwurzel, *Radix Bar-*  
*, der Steinwurzel, Radix Agrimoniae*, des Oder-  
ig und des *Eupatorium cannabinum*. Auch wird  
die vielgerühmte Milch der zerschnittenen, ge-  
hten und ausgepressten Löwenzahnsäfte, *Leontodon*  
*racum*, wenig helfen. Auf die Bisswunde legen sie,  
sie ausgeschnitten, mit heißen Schropfköpfen aus-  
en und mit warmer Aschenlauge ausgewaschen  
en, geschabten Rettig, Knoblauch, Meerrettig und  
sie trinken auch das warme Blut einer wilden  
das stark nach Bisam riecht, *Anas moschata*, *Pal-*  
*nograph. Ross Asiat. pag. 258. und St. Petersburg.*  
*ng, Jahrgang 1830, 11. November № 90. Bekannt-*  
*ung der Behandlung, Olwiopol den 10. October 1813.*  
die Entdeckung Marochetti's, das Erscheinen der



Giftblase unter der Zunge am Bändchen und auf d  
Öffnen und Ausdrücken derselben halten sie sehr u  
versäumen es nie, diesen Erscheinungen nachzuspüre

Beim Schlangenbiss wird innerlich Theriak gegeben  
auch Knoblauch in Bier gekocht, äußerlich aber frisch  
Brennesseln mit Salz auf die Bisswunde gelegt, na  
dem sie erweitert und mit warmen Schröpfköpfen a  
gesogen worden ist. Bei andern nordischen Völkern  
findet man dieselben Mittel, die in den Russischen alt  
Volks-Arzeneibüchern anempfohlen worden, von no  
dischen Geschichtschreibern eben so angerühmt.

Bei Vergiftungen, sie mögen sein von welcher A  
sie wollen, wird das *Sempervivum* oder *Sedum* ~~mit~~  
mit Wermuth, mit Wasser abgesotten, als gewöhnliche  
Getränk gebraucht.

Den Wolossaetnick oder Wasserfadenwurm (*Gon  
dius aquaticus, Filaria*) welcher in der Newa sehr häu  
ist und den in diesem Flusse Badenden unbemerkt  
zwischen die Muskeln kriecht, nach dem er sich in d  
Haut eingebohrt hat, behandeln sie ganz passend äußer  
lich mit Aschenlauge und fassen ihn, sobald er si  
sehen läßt, mit dem Haken, welchen sie an einer Wund  
befestigen, mit der sie ihn allmählig wieder herausw  
den. Manche abergläubige Russen halten aber diese  
Haarwurm für wirkliche Haare in den Geschwüre  
und wenden Kornähren und andere abgeschmackte Mittel  
an, welche, wie sie glauben, die Haare aus den Knochen

---

\*) Olaus magnus in historia septentrionalium gentium. Lugd  
Batav. 1645. p. 579. »Sunt serpentes veneni acumine le  
minem interficientes, nisi remediis opportunis occurrat  
Theriaca scilicet veneta aut allio cum cerevisia cocto bibito  
aut succo fraxini expresso et epoto aut farfure more  
platri opposito.«

ziehen sollten \*). Bei Scropheln und Kropfdrüschwülsten und bei Sugillationen wird ein in der sehr häufig vorkommendes vegetabilisches Product die *Badiaga* oder der Fluß- und Sumpfschwamm, *Badiaga fluvialis* Sp., *palustris* L., *Ephedasia* Lamour. u. s. w., äußerlich gebraucht. Wenn es getrocknet auf Haut zerrieben wird, so macht es ein heftiges Jucken und Röthe \*\*); ich habe aber nie gesehen, daß ein Uebel dadurch geheilt worden wäre.

Bei dem Hämorrhoidalübel pflegen die Russen den Saft des Flohkrauts, *Polygonum persicaria*, zu trinken, was es auch im Russischen Hämorrhoidalkraut genannt wird. Bei Krämpfen und Convulsionen geben sie einen spirituösen Aufguß des Benzoeharzes, *Tinctura Benzoe*, selbst Kindern beim Durchbruch der Zähne, bei Epilepsie und Convulsionen. Unter dem gemeinen Namen ist es auch Gebrauch, eine Kupfermünze in die Wunde zu geben, oder einen Ring an den Finger zu stecken, oder Schwefel auf die Haut zu binden (ohne daß man etwas von Electricität wissen), bei Schlaflosigkeit brauchen die Russen weder Opium noch Theriak, noch Mohnsamenmilch; alles dies sind Merkmale einer unvernünftigen Erfahrung und der Liebe zur Einfachheit. Bei der Mundfäule und den Schwämmchen brauchen sie den Saft von *Vaccinium myrtillus*.

Am meisten leiden die Russen von der Lustseuche, was ist bekannt, daß zur Heilung dieser Krankheit viel erfordert wird und daß sie in einem kalten Klima weit schwieriger zu heilen ist als in einem warmen.

\*) Fische loc. cit. p. 130—131. und Gmelins Reise. Fische Versuch einer allgemeinen medicinisch-praktischen Geographie. Zweiter Band. Leipzig 1792. p. 514.

\*\*) Pallas, Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. Erster Theil, erste Section, p. 14.

men, und dem Russen ist es fast unmöglich, bei in der warmen Stube zu bleiben, er springt lieber dem heißen Dampfbade in den Schnee. Daher für die heroischen Curen dieser Krankheit eingeführt und brauchen die spirituöse Sublimatauflösungen haben sie früher gebraucht als andere europäische Nationen. Sie war hier bekannt, sagt Richter, loc. cit. de van Swieten den Gebrauch dieses äusserlich wirkenden Heilmittels allgemein in Europa verbreitet. Man löste nämlich einen Solotnik oder eine Sublimat in 3 Pfund Kornbranntewein auf, hiervon einen Eßlöffel voll jeden Morgen. Es ist aber eine Russische Natur dazu, eine solche Menge zu vertragen. Der Portugiesische Arzt Ribeiro S. welcher sich eine geraume Zeit in Rußland aufhielt und dem wir eine eigene Abhandlung über die Krankheit verdanken, lernte dieses Mittel in unser Land kennen \*), sagt Richter. In den niedern Völkern werden auch die Räucherungen mit Zinnober gebräuchlich, welchen aller Unzulänglichkeit und aller Ungenauigkeit ungeachtet Richter dennoch nicht alle Wirklichkeit abspricht. Auch haben die Russen ein eigentümliches Mittel, sich von der Uebersättigung mit Quecksilber zu befreien. Sie sonach nie ganz sicher sind, zu befreien. Sie empfinden ein mehrmaliges Schaudern, nehmen einen Löffel voll gefeiltes Kupfer in den Mund ohne etwas davon zu verschlucken, oder nähern einen Beutel, der einige Stunden lang im Mund gehalten wird; untersucht man die Kupferfeile darauf, so ist sie weiß geworden \*\*).

---

\*) Mit der Entdeckung von Amerika brach die Lust nach Europa aus, aber schon 1499 äusserte sie sich in

\*\*) S. Richter loc. cit. p. 125.



Wenn aber auch dies der Fall sein sollte, so wird er wenig Quecksilber dadurch entfernt sein, die Refelleber würde in diesem Falle bessere Dienste thun. Ich sehe aber davon nichts in den russischen Arzneibüchern. Die Liebhaberei der Russen für Venus zeigte sich schon frühzeitig; die medizinischen Bücher des 16. und 17. Jahrhunderts erwähnen häufig der venerischen Eiterbeulen und der Hautschläge, wodurch sich diese Seuche in den frühesten Jahren vorzüglich auszeichnete, ehe sie in neuern Jahrhunderten den gelindern und nun sporadischen Charakter annahm \*). Es finden sich in einigen grossen Hospitälern Nachbildungen in Wachs von tödtlichen venerischen und skorbutischen Verletzungen und Zerstörungen des menschlichen Körpers.

Brustthee von *Herb. Tussilaginis*, Malven und Königsblumen - Blumen (*Flor. Verbasci*) mit Sternanis giebt man Kindern, Erwachsene trinken ihn auch, setzen aber

Alant und *Ledum palustre* hinzu. Kommt aber Schleimfieber hinzu, das hier nicht selten aus dem Arrh und der Grippe entsteht, so nehmen sie frisches gestossenes Knoblauch oder Bären- oder Lachenschlauch mit einer hinlänglichen Menge frischen Honig vermischt und digeriren diese Mischung mehrere Tage und Nächte hindurch in einem zugedeckten Topf.

Durch den anhaltenden Gebrauch dieses Mittels wird der Husten sehr gemässigt und gestillt. Hat sich Appetit bei dieser Krankheit verloren, so wird gekochter Ingwer mit Honig gekocht und klein gestoßener Senfsamen zugemischt. Ihr wichtigstes Mittel in dieser Krankheit bleibt aber immer der geschabte Ret-

---

S. Richter loc. cit. p. 122.

tig mit Honig. Zu dem Rettigsaft haben sie ihr  
tes Zutrauen, so wie auch zum Knoblauchsft mit  
*Prunus padus*.

Zum Schlusse darf ich die mechanischen Hül  
tel nicht übergehen, mittelst deren die Russen  
klemmte Brüche heilen, welche unsere Aerzte  
nichts anders, als durch die Herniotomie zu c  
für möglich gehalten hätten. Diese Hülfsmittel  
bestehen in einer wohlberechneten Anwendung g  
Schröpfköpfe oder sogenannter Ventosen, welch  
wärmt auf den eingesperrten Bruch aufgesetzt w  
einen luftleeren Raum bilden und den eingeklem  
Bruchsack durch ihr kraftvolles Ansaugen aus  
beschränkten Lage hervorziehen und ihn wieder  
lösen. Die Auslösung wird dadurch bewirkt, da  
Oberhaut mit aller Gewalt in den luftleeren Rau  
großen erwärmten Topfes, der hier anstatt eine  
sen Schröpfkopfes aufgesetzt wird, sich hinein  
und somit den an ihr hangenden Bruchsack mit h  
zieht. Derselbe kräftige Zug nach oben findet  
eine glückliche Anwendung bei den örtlichen I  
heiten der Gebärmutter, z. B. bei einer schiefen  
der Gebärmutter und bei dem unvollkommenen  
falle derselben; sie wird durch die äufsere anzie  
Kraft wieder in ihre natürliche Lage heraufge  
Der gelehrte Arzt und Professor der Anatomie b  
Universität, der Staatsrath Joh. Conrad Hildebr

---

\*) Johann Conrad Hildebrand, *Commentatio de no  
hernias incarceratas reducendas remedio caeteris long  
stantiore — in observationibus medico-chirurgicis I  
Imperii. Petropoli 1805. Vol. I. pag. 179.*, erklärt die  
klemmung des Bruchsackes und die Auslösung des  
durch die dem Widerstande der Einklemmung über  
Zugkraft des großen Topfes, in welchen sich die



die großen Wirkungen eines so kräftigen Verfahrens, welches bloße Empirie und gesunder Menschenverstand erzeugte, und welches dem ohnedies schon an Herzen leidenden Kranken eine schmerzhaftere Operation verhütet, eingesehen und dem Verdienste seiner Leute in einer eigenen Schrift Gerechtigkeit widerfahren lassen, und der mehrerwähnte verdienstvolle Rath Richter \*) selbst hat als Professor der Entbindungskunst über die zweite glückliche Anwendung der Methode eine ebenfalls anerkennende eigene Abhandlung geschrieben.

Ich weiß recht gut und ebensowohl als die, welche eine solche Einwendung machen können, daß es bei uns in Deutschland Volkssitte ist, bei gewissen unbedeutenden Beschwerden einen erwärmten Topf den Leib zu setzen und bei Blähungen, Krämpfen, Engbrüstigkeit von diesen Ursachen Linderung zu erwarten: *sed duo cum faciunt idem, non semper est* ! bei uns sind es die alten Weiber in den niederen Volksklassen, welche diese Sitte eingeführt haben, welche überhaupt bei jeder Gelegenheit zu quackern geneigt sind, diese können mit ihren kleinen, mit benetzten, nicht hinlänglich erwärmten Töpfen einen eingeklemmten Bruch reduciren noch auslösen, oder weniger eine gesunkene oder schiefliegende Gebä-

---

Oberhaut hineinzieht nach vorhergegangener Erweichung der Theile durch feuchte Wärme und allmähliche Ausdehnung und Erschlaffung.

Guilielmus Michael Richter *Synopsis praxeos medico-obstetriciae. Mosquae 1810. in 4to. Cap. IX. pag. 92.* Er selbst hat den glücklichen Erfolg dieser Methode sehr oft beobachtet und sich von der großen Wirkung dieser Zugkraft überzeugt. — Wer keine Luftpumpe hat, sollte sich auf der Glasfabrik 6mal größere Schröpfe bestellen.

mutter wieder in ihre natürliche Lage zurückziehe sie sind schon zufrieden durch das Einziehen der Oberhaut in den kleinen Topf eine Bewegung unter derselben zu bewirken, durch welche die Blähungen als Ursache dieser Engbrüstigkeit und Beklemmung entfernt werden und abgehen. Wie würden sie aber erstaunen wenn vor ihren Augen die Glocke einer Luftpumpe auf eine solche Stelle gesetzt würde und nur durch zwei Züge ein luftleerer Raum gebildet würde — und sie die weit größern Effecte derselben beobachten sollten? —

Die Russen hingegen, ein wahrhaft empirisches Volk, welches Alles versucht und vieles erreicht, was man für unerreichbar hielt, haben auch hier von den Bähungen oder ihre Dampfbäder versucht, durch deren Wärme die Haut geschmeidig gemacht und dann durch ihre durch kochendes Wasser erhitzten großen Töpfe auf die hervorzuziehende Stelle gesetzt, wodurch die Zugkraft unglaublich vermehrt wurde und sie ihre Absicht erreicht sahen. Wo ist ein Volk zu finden, welches sich der gemeine Mann auf alle nur mögliche Handwerke appliziert und sie in so kurzer Zeit erlernt, daß der gemeine Russe, der in wenigen Wochen ein Tischler, ein Zimmermann, ein Schmidt, Schlosser, Wagen Drechsler wird, und der alles nachahmt, die feinsten Stuccatur- und Bildhauerarbeiten liefert, weil er es von seines Gleichen sieht und nichts für unerreichbar hält.



## Sechste Abtheilung.

### Allgemeiner Anzeiger.

#### Anzeiger der Vereinszeitung.

#### Notizen aus der Generalcorrespondenz des Directoriums.

Hr. Vicedirector Dreykorn: Die Regulirung des Kreises betreffend. — Hr. Kreisdirector Dr. Schmedding: Ueber in Münster zu haltende Kreisversammlung. — Hr. Vicedirector Meurer: Ueber die nächste Generalversammlung. — Hr. Director Overbeck: Ueber Archivsendung und die neue Auflage Statuten. — Hr. Professor Göppert und Hr. Dr. Duflos: Die Gründung des Vereins in Schlesien betreffend. — Hr. Kreisdirector Jonas: Anmeldung neuer Mitglieder. — Hr. Postmeister Pothmann: Die Portovergünstigung auf den Thurn- und Taxischen Posten betreffend. — Hr. Kreisdirector Schmitt: Ueber Archivsendung. — Hr. Kreisdirector von Senden: Angelegenheiten des Kreises Emden. — Hr. Generalconsul Chev. da Castilho Barreto: Ubersendet das Journal der pharm. Gesellschaft in Lissabon. — Hr. Kreisdirector Vogt: Ueber Angelegenheiten des Kreises Achen. — Hr. Apotheker Wrede: Wiederherstellung des Kreises Bonn betreffend. — Hr. Kreisdirector Dr. Tuchen: Die Begründung des Kreises Naumburg betreffend. — Hr. Vicedirector Bucholz: Ueber die Versammlung in Meiningen. — Hr. Vicedirector Grischow: Die Portovergünstigung in Mecklenburg-Schwerin betreffend. — Hr. Vicedirector Dr. Herzog: Bemerkungen zu den neuen Statuten, die in Blankenburg zu haltende Kreisversammlung. — Hr. Kreisdirector Erdmann, Hr. Hofapotheker Dr. Wittstock, Hr. Vicedirector Dr. Bley: Ueber die Angelegenheiten des Vereins in Berlin. — Hr. Director Dr. Du Menil: Ueber den Verkauf der auscirculirten Journale. — Hr. Vicedirector Müller: Angelegenheiten des Kreises Medebach. — Hohe Herzogl. Sächsl.-Altenb. Landesregierung: Wohlwollende Anerkennung des Vereins.

Unterstützungsgesuche: Von Hrn. Kreisdirector Kersten, dem invaliden Apotheker Hrn. Käppel; vom Hrn. Vicedirector Dr. Fiedler, für den Apothekergehülfen Hrn. Stahl; von Hrn. Vicedirector Bucholz, für den durch Brand verunfallten Apotheker Hrn. Biedermann in Schweina.

Beiträge zum Archiv gingen ein: von Hrn. Gehülfen Krug; von Hrn. Dr. Duflos; von Hrn. Vicedirector Dr. Herzog; von Hrn. Kreisdirector Grefslor; Hrn. Apotheker Heineke in Lemgo; Hrn. Kreisdirector Lipowitz in Lissa.

#### Generalversammlung des Vereins.

Es ist S. 2 dieses Heftes des Archivs angeführt, daß die



diesjährige Generalversammlung des Vereins am 3. und 4. in Leipzig statt finden werde. Auf den Wunsch des Hrn. directors Dr. Meurer und der Herren Collegen in Leipzig die Versammlung auf den 8. und 9. Sept. verlegt worden.

Der Oberdirector des Vereins  
Brandes.

### Versammlung im Vicedirectorium Bernburg

Die diesjährige Versammlung der Mitglieder des Vicedirectoriums Bernburg, S. 4 dieses Heftes des Archivs, wird am 1. August in Bernburg statt finden, und werden die verehrten Mitglieder unserer und benachbarter Kreise dazu ergötzt eingeladen.

Dr. Bley.

### Aufruf und Bitte!

Die Herren Collegen Bucholz in Gotha und Jahn in Meiningen theilen uns folgenden Unglücksfall mit:

Am Sonntag Nachmittag den 10. Mai gegen 2 Uhr regnete über das Dorf Schweina, bei Liebenstein am Thüringer Wald ein Gewitter zusammen. Der Blitz schlug in die Wohnung des dortigen Collegen Biedermann und zündete. Nur er hat sich aus der Feuersbrunst retten lassen! Die Statuten unseres Vereins fordern in solchen Unglücksfällen zu gemeinsamer Hülfe auf. Das Directorium hält es für seine heilige Pflicht, hieran zu erinnern, und die verehrten Mitglieder die so oft schon zur Milderung solcher Unglücksfälle beigetragen, dringend zu bitten, auch hier zu helfen. O gewiss, nicht vergebens wird die Hoffnung der Unglücklichen sein, die auf unsere Hülfe rechnen. Wir ersuchen die Mitglieder, ihre Gaben ihren Kreisdirectoren einzusenden, und solche der Direction der Generalkasse zu übermachen, oder es ihnen gelegener ist, den Herren Collegen Bucholz in Gotha oder Jahn in Meiningen, in solchem Falle aber auch der Direction der Generalkasse ein vollständiges Verzeichniß bald zukommen zu lassen. Die Noth ist groß; möge die Hülfe bald erscheinen.

E. F. Aschoff. Brandes. Overbeck. Wilke.  
L. Aschoff. Faber.

### Handelsnotizen.

Amsterdam, den 26. Mai. Ord. Cheribon Kaffee 29 Cs., 30 — 30½ Cs. Rohe Zucker, ohne Lebhaftigkeit, blonde Havanna 34½ fl., raff. Zucker, in Folge des kleinen fertigen Quantums preishaltend. Dampfmelis auf 35½ — 37 fl. Syrup 17½ fl.

— im Juni. Von Kaffee sind Javasorten gefragt, guter Cheribon 31 — 32 Cs., ord. 29 Cs. Von rohem Zucker Surinam 26½ — 27 fl., blonde Havanna 34 fl. Syrup 17 fl. Südseetheran 30 fl. Lebertheran, blanker 40 fl.

*Bergen, den 24. Mai.* Brauner Leberthran ist in diesen Tagen mit 14 Sps. bezahlt.

*Berlin, Anfangs Juni.* Die Preise des Spiritus wollen sich nicht namentlich bessern.

— *den 10. Juni.* Rohes Rüböl  $12\frac{1}{2}$  Thlr., raff.  $12\frac{3}{4}$  — 13 Thlr. Leinöl  $10\frac{1}{2}$  —  $10\frac{1}{4}$  Thlr.

*Breslau, Ende Mai.* Rohes Rüböl 11 Thlr. Zink  $6\frac{1}{2}$  Thlr.

*Hamburg, den 15. Mai.* Seit Dienstag wurden verkauft an Pfeffer 1800 Säcke Rio zu  $4\frac{1}{2}$  —  $4\frac{7}{8}$  fs., 800 S. Domingo  $4\frac{3}{4}$  — 5 fs., 1000 S. Laguayra  $5\frac{1}{2}$  —  $6\frac{1}{2}$  fs., 500 Cs. Havanna zu  $5\frac{1}{2}$  —  $5\frac{3}{4}$  fs., 1000 Pfd. Cuba zu  $6\frac{1}{2}$  —  $8\frac{3}{4}$  fs. Für St. Domingo Blauholz 6 Mk. Rothholz  $9\frac{1}{2}$  —  $11\frac{1}{2}$  Mk. Gelbholz ist in hohem Preise. 1800 ostind. Pfeffer sind zu 4 —  $4\frac{1}{2}$  fs. verkauft, 200 Tonnen Carol. Pfeffer  $13\frac{3}{4}$  — 16 Mk., 1000 S. Java 6 — 8 Mk.

— *den 2. Juni.* Die Preise von span. Baumöl haben etwas abgelassen. Palmöl, 50,000 Pfd. wurden zu  $22\frac{1}{2}$  Mk. erlassen.

— *den 9. Juni.* Baumöl, span. und Messina 30 —  $30\frac{1}{2}$  Mk.

— Waareneinfuhr vom 1. bis letzten Mai 1840: Arac 20 Leisten, 1 Kiste, 6 Fafs, 92 Gebinde. Cacao 384 Säcke, 46 Fässer. Pfeffer 69,389 Säcke, 1826 Fässer, 315 Ballen. Candis 872 Kist., 14 Kilogr. Canel 1 Kiste, 17 Ballen, 18 Packen. Cassia 216 Kisten, 1598 Matten. Cassia lignea 111 Kisten. Cochenille 29 Fässer, 8 Ser., 1 Ball., 12 Säcke. Corinten 191 Both, 316 Carroten, 27 Fässer, 40 Pipen. Feigen 1 Fafs, 119 Körbe. Blauholz 297 Stück, 206 Tons, 4065 Quintal, 4 Parth., 174,000 Pfd. Rothholz 1359 Stück, 5600 Quintal, 4 Pack. Farbholz 7 Fässer, 17 St., 2 Parth., 2208 Quintal, 22 Ballen, 14,000 Pfd. Gelbholz 14 St., 56 Tons, 20 Quintal. Indigo 808 Kisten, 80 Seronen, 51 Colli, 51 Pack. Ingwer 974 Säcke, 670 Colli, 2 Parth. Korh Band, 16 Ballen. Krapp 320 Fässer. Kümmel 33 Säcke. Berberitzen 300 Kisten. Macis 56 Fässer. Mandeln 37 Fäss., 40 Seronen, 1 Sack, 39 Ballen, 6 Colli. Nelken 74 Säcke, 487 Ballen, 1 Fässer. Oel 75 Fässer, 39 Kist., 55 Geb., 118 Pipen, 1 Both. Pfeffer 1469 S., 15 Ball. Propfen 468 Ball, 1 Sack. Piment 1798 Kiste, 250 Ball., 1 Fafs. Pomeranzen 6 Fafs. Pottasche 144 F., 1 Gebinde. Rosinen 2049 F., 50 Kisten. Rum 271 Punch., 346 Geb., 64 Fafs, 1 Oxh., 15 Geb., 2 Kist. Sago 23 Fafs, 43 Geb. Schellack 600 Kist. Schmach 186 S. Thee 2709 Kist. 50 Packen, 2 Colli. Wachs 18 S., 20 Packen, 1 Korb, 10 F., 11 Colli, 1 Ball., 4 Kisten. Weinstein 56 Fafs. Zucker ostind. 614 Canaster, Brasil Lissab. und Porto 5442 Kist., 144 F., 1325 Sack, Hannah 16,820 Kist., 77 Fafs. Amerika, Frankreich, England, Belgien 446 F., 461,303 Kilogr., 1592 Kisten, 143 Canaster, 1200 Toden.

*Leipzig, den 11. Juni.* Rüböl  $12\frac{1}{2}$  Thlr. Leinöl  $11\frac{3}{4}$  Thlr. Leinöl  $20\frac{1}{2}$  Thlr. Gall. Baumöl unverst. 19 Thlr. Berger Leberthran wird höher gehalten.

*London, den 22. Mai.* Maurit. und ostind. Zucker halten auf höhere Preise; weißer Havanna, gute Qualität 39 — 40 sh., ord. 2 — 33 sh. Umsatz in Thee beschränkt; Comp. Congos 2 sh. 3 d., ord. freier Congo 2 sh. 6 d., Tonkay 2 sh. 3 d. Pfeffer Malabar —  $4\frac{1}{2}$  d. Piment begehrt 3 —  $3\frac{1}{2}$  d. Cassia lignea fest, kleine

3 d.,  
Malabar  
t, kleine



Posten mittler Qualität 78 — 80 sh. Ostind. Ingwer fest in B Salpeter gefragt. Die Zufuhren von ostind. Reis in den letzten 7 Tagen betrugen 14,000 Säcke.

London, Ende Mai. Das Totalquantum an Indigo für Auction am 14. Juli dürfte 10,000 Kisten betragen.

— Anfangs Juni. Kaffee Demerari 90 — 105 sh., C 86 — 91 sh. Die Preise für Thee wegen der kriegerischen Verhältnisse von China wieder belebt, Congo 2 sh. 2½ d., T 2 sh. 3½ d. — 2 sh. 4½ d., Comp. Congo 2 sh. 3¾ d. — 3 sh Pfeffer wenig gesucht 3½ — 3¾ d. Süsse Mandeln 63 sh., bittre

Mainz, den 11. Mai. Oelpreise im Steigen. Der höchste zahlte Preis für Rübol im coulantem Geschäft ist per Ma Oct. 46¾ Thlr.

— den 14. Mai. Wegen des jetzt trefflichen Standes Rappsfelder ist die Aussicht auf hohe Oelpreise schwanken worden.

Neapel, den 28. Mai. Ein Steigen der Oelpreise läßt erwarten. Am Ende November vorigen Jahrs waren in Napoli circa 40,000 Salmen vorräthig, dazu kommen in diesem Monat 15,000 Salmen; davon wurden verladen circa 45,000 so daß zusammen höchstens 10,000 Salmen übrig bleiben. Oelbäume stehen gut, doch versprechen diejenigen, welche vorigen Jahre Früchte hatten, gegenwärtig nur wenig, und geachtet hofft man auf eine gute Ernte.

Sicilien. Die Ausfuhr von Schwefel im Entrepot von Genti von 1. Mai bis 31. Dec. 1839 betrug 4900 Cantar nach London, 4650 nach Liverpool, 26,705 nach Falmouth, 17,589 Rouen, 74,294 nach Marseille. Das Lager der franz. Gesell. beträgt gegenwärtig 450,000 Cantar.

## Blutegel.

Die Pforte hat, nach Nachrichten in öffentlichen Blättern den fremden Gesandten wissen lassen, daß in Folge eines Utilitätsrathes beschlossenen Maafsregel der Blutegelfang türkischen Reiche künftig im Wege öffentlicher Versteigerung an den Meistbietenden überlassen werden sollte, und daß zur Kenntniß ihrer Landsleute bringen möchten, daß oberschied der Nation Jedermann bei dieser Licitacion zugeworfen werden würde. In Folge dessen las man auch bereits im März eine Bekanntmachung des Handels-Ministeriums, daß die Pachtversteigerung am 28. desselben Monats im Hotel des Handelsministers statt finden sollte.

## Berg- und Hüttenbetrieb.

Im Königreich Preussen wurde 1838 die Production des Bergbaues im Ganzen in 1719 Gruben und durch 35,412 Arbeiter gefördert, und ein Geldwerth an den Ursprungsorten von 64 Millionen Thlr. erzielt. Der Steinbruchbetrieb trug aus 923 Brüchen durch 4398 Arbeiter 459,565 Thlr. Der Hüttenbetrieb betrug bei 1093 Hütten und 17,317 Arbeitern auf 16,953,387 Thlr.

th am Ursprungsorte, so wie von den 20 Salinen durch 1540  
eiter für 1,350,286 Thlr. Salz aller Art hergestellt ward.

### Miscellen.

#### Ueber die Conservation des Fleisches;

VON

*Legrip*, Apotheker zu Chambon.

Fleisch, welches man conserviren will, muß frisch und gut  
von Fett und starken Knochen möglichst gereinigt sein,  
schneidet es in Stücken von beliebiger Länge und Breite,  
aber nur  $\frac{1}{4}$  bis 2 Zoll dick sein dürfen und legt diese 15 bis  
Stunden in ein gewürztes Salzbad, welches besteht aus 1000  
Theiliger Kochsalzlösung, 32 Petersilienwurzel, 16 Sellerie-  
wurzel, 32 Möhrensamen, 1 Nelken. Das aus dem Bade genom-  
mene leicht abgetrocknete Fleisch wird hierauf in eine säuer-  
liche Gummilösung getaucht, die durch Auflösen von 1 gröblich  
zerhackten Gummi in 3 Wasser bereitet wurde, worauf man  
guten Essig zusetzt und aus diesem Bade wird das Fleisch  
in einer Wärme von 40° getrocknet.

So hält sich das Fleisch so lange man will, und es läßt  
sich zu See wie zu Lande transportiren. Man hat besonders für  
Transporte zu beachten, daß es in neue hermetisch verschließ-  
bare Fässer gepackt wird. Die Fleischstückchen werden in  
den abwechselnd mit trockenem Sand oder Kohlenpulver ge-  
schichtet, so daß letztere an beiden Boden die erste Lage aus-  
machen. (*Journal de Chim. med.* 2. Ser. IV. 463.)

#### Ueber Leinölfirnis und dessen beste Bereitungsart mittelst Bleiessig;

VON

*J. Liebig.*

Zur Darstellung im Großen soll man in einer Flasche 1 Pfd.  
Zucker mit 5 Pfd. Regenwasser übergießen und wenn die  
Lösung vollendet ist, 1 Pfd. sehr fein geriebene Bleiglätte  
setzen, durch Hinstellen an einen mäßig warmen Ort und  
Umschütteln die Auflösung der Bleiglätte befördern, so daß man  
als vollendet ansehen kann, wenn keine sichtbaren Flitter  
mehr bemerkbar sind. Die erhaltene Auflösung dient zur  
Herstellung von 20 Pfd. Firnis, sie wird mit ihrem gleichen  
Gewichte Regenwasser verdünnt und nach und nach unter häu-  
figem Umschütteln zu 20 Pfd. Leinöl gegossen, in dem man vor-  
her 1 Pfd. fein geriebene Bleiglätte sorgfältig verbreitet hat.  
Wenn man die Berührung der Bleiauflösung mit dem Oele durch  
häufiges Umschütteln 3 — 4mal erneuert und das Gemenge als-  
dann an einem warmen Orte klären läßt, so hat man den klaren  
gelben Firnis. Die wässrige Flüssigkeit enthält nach dem  
Filtriren die unveränderte Menge Bleizucker, den man ursprüng-  
lich genommen hat, sie kann bei allen folgenden Bereitungen

anstatt der frischen Lösung von Bleizucker in Wasser zu setzen, nachdem man derselben 1 Pfd. Bleiglätte zusetzt hat.

Um den Firniss wasserhell zu haben, muss man ihn durch grobes Fließpapier oder Baumwolle filtriren, wodurch er von einem feinen weissen Schlamme befreiet wird. Durch Setzen an das Sonnenlicht kann man ihn bleichen. Um bleioxydfrei zu haben darf man nur etwas verdünnte Salpetersäure zusetzen, schütteln und dann ruhig hinstellen.

Die Meinung, als wenn das Bleioxyd dem Leinöl entzöge und hierauf die Firnissbereitung beruhe, fand keine Begründung. (*Annal. der Pharm.* XXXIII, 110.)

### Copalfirniss.

Folgende Vorschrift zu einem concentrirten und gefärbten Copalfirniss von R. Böttger giebt ein Rezept zum Poliren feiner Hölzer wie zum Ueberziehen von Lederarbeiten, Landkarten u. s. w. nichts zu wünschen übrig. Man löse 1 Loth Kampher in 12 Loth Schwefeläther auf, setze hinzu 4 Loth aufs feinste gepulverten Copal, unter öfterm Umschütteln stehen bis zur theilweisen Auflösung und Aufschwellung des Copals, und füge dann noch 4 Loth Alkohol von 90 — 95 % hinzu und  $\frac{1}{2}$  Loth rectificirten Terpentinöl. Man schüttle alles durch einander und der Firniss ist fertig. Er stellt ein fast homogenes dickflüssiges Fluidum dar, so wie ein Firniss, weil Copal bekanntlich nur in ätherischen oder öligen Flüssigkeiten auflöslich ist. Nach mehrtägiger Ruhe scheidet sich der Firniss deutlich in 2 Schichten, wovon die untere die mehr copalhaltige, die oben stehende aber die wasserhelle sehr copalreiche und ganz ausgeglichene Firniss ist. Er bildet aufgetragen einen vollkommen gleichmässigen Ueberzug, wie eine Glasschicht, blättert nicht ab, ist hinlänglich elastisch und doch sehr hart. Die untere durchsichtige Schicht des Firnisses, die noch viel Copal in Lösung enthält, kann man nochmals mit Schwefeläther und Kampher behandeln.

### Thonseife.

Die Anwendung verschiedener Thonarten, der Thonseife zum Walken der Tücher und um diese von dem Oel, das die wollenen Fäden imprägnirt, zu befreien, hat eine Art feiner Seife hervorgerufen, die bei Paris verfertigt wird. Sie hat Form und Ansehen der Seife, blähet sich in kaltem Wasser auf, wird durchscheinend, und bleibt ganz unlöslich. Beim Reiben in der Hand verhält sie sich wie eine weiche, fettige Masse, sie macht die Haut geschmeidig und reinigt sie von fettigen und andern Unreinigkeiten; auch Oelflecken in Leinwand werden mittelst dieser Seife und Wassers sehr gut weggenommen. Lassaigne hat eine Analyse dieser Seife angestellt, wonach sie besteht aus:

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Thonerde .....              | 26,0 |
| Kiselerde.....              | 49,4 |
| Wasser .....                | 23,3 |
| Eisenoxyd und Manganoxyd... | 1,3  |

---

 100.

Diese Seifenmasse erscheint also als ein Hydrat von doppelt-säurehaltiger Thonerde,  $\text{Al Si}_2 + \text{Aq.}$ , und weicht dadurch von den gewöhnlichen Thonen ab, die 3 — 4 At. Kieselerde auf 1 At. Thonerde enthalten. Ohne Zweifel ertheilt dieser Ueberschuss an Kieselerde dieser Masse ihre Seifenqualität (*Journ. de Chim. med. Ser. IV, 499.*)

### Dunn's Verbesserung im Seifensieden

Besteht einfach darin, daß er die erforderliche Mischung von Palmöl, Harz und Aetznatronlauge — wozu bei Bereitung von Silica Soap noch Kieselerde oder eine Auflösung von Feuerstein in Aetzlauge kommt — mittelst Dampf in Kesseln kocht, welche so eingerichtet sind, daß das Kochen unter starkem Druck also bei sehr hohen Temperaturen, welche den Verseifungsprocess, besonders bei Darstellung der Harzseifen und der Silica-Soaps sehr beschleunigen, statt finden kann. (*Polytechn. Centralbl. No. 22. 1840.*)

Über die Benutzung des als Nebenproduct häufig vorkommenden schwefelsauren Bleies.

In vielen Druck- und Färbereien häuft sich das benannte Präparat durch Zersetzung des Alauns mit *Plumb. acetic.* oft so an, daß die Besitzer jener Fabriken nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Im *Journal für pr. Chemie* theilte H. A. Werner früher 2 Vorschriften zur Reducirung desselben mit. Ich dürfte aber weit vortheilhafter sein, das schwefelsaure Blei als Anstrich als Oelfarbe zu verwenden, indem es in vielen Fällen recht gut das viel theuere Bleiweiß ersetzen kann, wobei zu beachten ist, daß dasselbe sich viel feiner zertheilen läßt. Auch als *Fensterkitt* ist das Präparat anzuwenden, und ist weit besser als der gewöhnliche Kitt aus Kreide und Oel, wie ich aus eigener Erfahrung versichern kann.

Dr. Voget.

### Maschinenschmiere.

#### Schmiere für bewegliche Theile an Maschinen.

I. 8 Unz. Soda werden in 8 Liter Wasser gelöst und 3 Pfd. Oel u. 6 Pfd. Palmöl für jeden Liter Flüssigkeit zugesetzt, und unter Rühren bis  $93^{\circ}$  C. erhitzt. Nach dem Abkühlen hat das Gemisch Butterconsistenz und kann zum Schmieren der Maschinen angewendet werden.

II. Eine andere Schmiere für bewegliche Theile an Maschinen wird von 8 Liter der obigen Sodalösung, 8 Liter Leinöl und 4 Unzen Seife erhalten, die man bis  $93^{\circ}$  C. erhitzt.



**Eisenkitt.**

**I.** Rostfreie Feilspäne von Gufseisen 100, gepulverter Schwefel 5, werden mit einer Auflösung von 5 Salmiak in 4 — Wasser zu einem dichten Brei angerührt, nach 3 — 4 Tagen wird dieser Kitt außerordentlich fest.

**II.** Ziegelmehl, gebr. Kalk, gebr. Gyps, Silberglätte, gepulv. Glas, Kochsalz von jedem 1 Th., gepulverter Hammerschlag 1 Th. und etwas Feilspäne werden mit Rindsblut zu einem Teig gemacht. (*Verhandl. d. Coblenz. Gewerbevereins. 1837.*)

**Darstellung künstlicher Rubine.**

Vor längerer Zeit machte Gaudin bekannt, daß es ihm gelungen sei, Rubine auf dem Wege der Kunst darzustellen. Herr Dr. R. Böttger in Frankfurt a. M. hat hierauf mittels eines einfachen Knallgasgebläses ähnliche Versuche angestellt, die vollkommen gelangen. Man stellt den Versuch am besten so an, daß man frisches, gehörig ausgesüßtes, auf die gewöhnliche Weise aus Alaun dargestelltes Thonerdenhydrat in einem Uhrgläschen in einer messerrückendicken Lage ausbreitet und mit einem oder zwei Tropfen neutraler oder saurer chromsaurer Kalilösung befeuchtet, die Masse dann gleichförmig mittelst des Fingers durchknetet, und dann das Ganze *langsam* auf einem gewöhnlichen Stubenofen trocken werden läßt, mit der Vorsicht, die beim Austrocknen der Masse entstehenden kleinen Risse mit Thonerdenhydrat stets wieder auszufüllen. Wenn die Masse *vollkommen trocken* geworden ist, fast man etwa ein Zoll langes Stück davon mit der Pincette und leitet die Flamme des Knallgasgebläses, nicht wie Gaudin angiebt, unmittelbar in die *Mitte* der Thonscheiben, sondern weit vortheilhafter auf irgend einen Theil des *Randes*. Schon nach wenigen Minuten entstehen die schönsten Rubinkügelchen, von mehreren Millimetern Durchmesser, die so hart sind, daß sie Glas, Quarz und Topas deutlich ritzen; je nachdem man mehr oder weniger chromsaures Kali anwendet, ist die Farbe dunkel- oder hellroth, gerade wie die rohen natürlichen Rubinen, von denen auch Kenner sie nicht unterscheiden dürften. (*Annalen der Pharmacie XXIX, 85.*)

**Emaillirung eiserner Gefäße ;**

von

**Flach und Keil.**

Man wählt rein und glattgegossene Eisengeschirre und macht sie noch durch Feilen, Scheuern mit scharfen Steinen, Glühen, wenn sie fettig sind, zur Aufnahme der Emaille geschicklich. beizt solche dann mit Essigsäure, wozu Holzessig, Bier, Fruchtsaft oder Weinessig dient, indem man sie in die Flüssigkeit stellt und auf 20 — 25° R. erwärmt. Nach 6 Stunden nimmt man sie heraus, wischt sie mit Lappen aus und legt sie nochmals hinein und läßt sie noch 4 — 6 Stunden darin, dann in warmem Wasser gespült, mit Lappen und Sand abgescheuert, bis sie blank sind, mehrmals mit Wasser gut gespült und schnell wieder ge-



Wasser gelegt; kurz vor dem Emailliren werden die Ge-  
 e nochmals mit Wasser gespült.

Die Emaillemasse besteht aus Kieselerde, Borax und Thon.  
 re beiden Ingredienzien werden zusammengeschmolzen,  
 Thon dient als Bindemittel. Als Kieselerde nimmt man rei-  
 senfreien Quarz, Bergkrystall, reine nicht kalkige Feuer-  
 , oder reine Flusksiesel. Diese Steine werden rein gewa-  
 roth geglüht und in einem reinlichen Gefäße mit kaltem  
 er abgelöscht zur Erbsengröße gestossen, zu feinem Pulver  
 len, geschlemmt. Der Borax wird aufs Feinste gepulvert.  
 Thon nimmt man ganz weissen, der nach dem Brennen  
 weifs bleibt, den man pulvert, mit reinem Wasser zur  
 anrührt, schlemmt und bei  $8^{\circ}$  R. Wärme trocknet. Er  
 mit Säuren keine Kohlensäure entwickeln. Man mengt dann  
 eile Kieselerde mit 8 Thl. Borax in Tiegeln von Thon, die  
 älfte gefüllt sind, in Muffelofen dunkelroth geglüht, doch  
 in Flufs kommend. Von dieser Masse, welche fein gerieben  
 fällt man einen Tiegel bis zu  $\frac{5}{6}$  seiner Höhe, drückt stark  
 edeckt mit einer Thonplatte, stellt diesen in den Muffelofen  
 giebt eine, Messing dünnflüssigmachende Hitze, während  
 den bei geringen Massen, länger bei grössern Massen, stellt  
 Tiegel noch warm aus dem Ofen und läßt ihn erkalten,  
 nach dem Erkalten den Tiegel zerschlagen, die Stücke des  
 ls werden sorgfältig entfernt, die Masse wird in Thonscherben  
 warm geglüht, in kaltem Wasser abgelöscht, fein zerrie-  
 nd gemahlen, geschlemmt, dieses Grundmassenpulver mit  $\frac{1}{4}$   
 Gewichts von oben erwähnten Thonpulver trocken ver-  
 t, so dafs 5 Gewichtstheile aus 4 Grundmassenpulver und  
 on bestehen. Die Glasur besteht aus einem wirklichen  
 , welches aus Kieselerde, gereinigter calcinirter Soda und  
 zusammengesetzt ist. Es werden 6 Thl. Kieselerde, 3 Thl.  
 und 2 Thl. Sodapulver auf einer Reibschale genau ge-  
 t im Tiegel geglüht, bis kein Aufschäumen mehr statt fin-  
 dann fein gerieben in einem Schmelztiegel von 2 — 5 Pfd.  
 t eingedrückt, wohl bedeckt und anfänglich gelinder, her-  
 stärker zusammengeschmolzen, bei fast Glasofenhitze. Man  
 das Glas in kaltes Wasser. Die Glasurmasse wird fein  
 lvert.

Die Grundmasse wird in einem Porcellan- oder emaillirten  
 Geschirr mit  $30^{\circ}$  heissen, vorher gekochtem Wasser mit-  
 eines hölzernen Spatels eingerührt, so dafs die Masse die  
 istenz des Zuckersyrups besitzt und ganz gleichförmig ist.  
 nimmt dann die Geschirre aus dem Wasser, trocknet sie  
 Leinentüchern aus, erwärmt sie im Muffelofen, dafs sie  
 violett anlaufen; kühlt sie auf  $60 - 70^{\circ}$  ab und giefst  
 der  $30 - 35^{\circ}$  warmen Grundmasse mittelst eines Löffels  
 trägt sie mit einem Borstenpinsel gleichförmig auf, so lange  
 ie Geschirre auf etwa  $30^{\circ}$  erkaltet sind, an die Geschirre, mit  
 Rande nach unten gekehrt, wird einigemal von aussen mit  
 n Stocke angeschlagen, dann die Glasur aus Battistbeuteln auf-  
 igt,  $\frac{1}{15} - \frac{1}{12}$  Zoll hoch, auf eine heisse Stelle gebracht, auf  
 -  $90^{\circ}$  erwärmt und 10 — 15 Minuten so erhalten, dann im  
 elofen eingebrannt. (Polytechn. Centralbl. No. 31, 1840.)

## Ueber das Dämpfen des Nutzholzes;

vom

Professor Brecht.

Es ergaben sich folgende Resultate:

- 1) Die Farbe des Holzes wird in Folge des Dämpfens dunkler als sie vorher war.
- 2) Das gedämpfte Holz ist um 5 — 10 Pfd. leichter, als auf gewöhnliche Weise behandelte Holz.
- 3) Es zieht aus der Luft viel weniger Feuchtigkeit an, gewöhnliches trockenes Holz und ist daher dem Aufquellen, Schwinden, Werfen und Aufreißen gar nicht, doch nur in sehr geringem Maasse unterworfen.
- 4) Das ausgelaugte Holz wird nicht vom Trockenmoder, Schimmeln und Würmern angegriffen.
- 5) Zum Zerbrechen erfordert das ausgelaugte Holz einen 10ten bis 4ten Theil grössere Kraft, biegt sich durchschnittlich eben so stark und bricht mit splitterigem Bruch.
- 6) Durch Wasserdämpfe wird das Holz so erweicht, daß es im warmen Zustande in jede beliebige Krümmung gebracht werden kann, in welcher es dann auch nach dem Erkalten verbleibt. (*Polytechn. Centralblatt No. 14. 1840.*)

## Goodwin's künstliches Brennmaterial

ist ein Gemenge von Thon, Lehm, Steinkohlentheer, Kohlenkleie und Strassenstaub, welches trocken gemahlen, mit Wasser wieder zum Teige angeknetet, in Ziegel geformt und getrocknet wird. (*Polytechn. Centralbl. Nr. 22. 1840.*)

## Dienstgesuche.

Ein junger Mann von gehöriger Vorbildung und guter Ziehung, welcher Lust hat, sich der Pharmacie zu widmen, sucht unter billigen Bedingungen Gelegenheit zur Ausbildung beim Apotheker

Dr. Bley in Bernburg.

Ein junger Mann, welcher sich der Pharmacie widmen will und die nöthige Schulbildung besitzt, kann zu Michaeli in meine geschäftsreiche Apotheke unter billigen Bedingungen eintreten, und bemerke nur noch, daß er bei mir auch Gelegenheit hat, sich in der technischen Chemie practisch auszubilden.  
Burg bei Magdeburg. Der Apoth. Dr. G. Reich.

## Apothekenverkauf.

Eine besonders vortheilhaft belegene Apotheke, reines Medicinalgeschäft, die einzige in einer sehr lebhaften ansehnlichen Stadt der sächsischen Herzogthümer, zu deren Uebernahme nur 12,000 Rthlr. Baarzahlung erforderlich ist, soll wegen hohem Alters des Besitzers verkauft werden.

Nähere Nachricht hierüber ertheilt der Apotheker

E. Grefsler zu Saalfeld in Thüringen.

8. Vereinsjahr der Jussieu's. 1840.

August.

**ARCHIV**  
**DER PHARMACIE,**  
eine Zeitschrift  
des  
Apotheker-Vereins in Norddeutschland.

zweite Reihe. Dreiundzwanzigsten Bandes zweites Heft.

Erste Abtheilung.

**Vereinszeitung,**  
redigirt vom Directorio des Vereins.

1) Vereinsangelegenheiten.

Hohes Wohlwollen für den Verein.

(Fortsetzung von S. 122 Bd. XXII. 2. R. des Archivs.)

XIV.

Dem Hrn. Hofrath und Medicinalrath Dr. Rudolph Brandt zu Salzuflen im Fürstenthum Lippe wird auf seine unterm 27. Mon. anher bewirkte Eingabe andurch eröffnet, daß die kgl. Landesregierung in Anbetracht der löblichen Zwecke unter seiner Direction gebildeten »Apothekervereins in Norddeutschland,« denen hierdurch die gebührende Anerkennung gewährt wird, ein Bedenken gegen den Anschluß der inländischen Apotheker an selbigen nicht beiegt, wobei er zugleich benachrichtigt wird, daß Verordnungen ergangen sind, das vom Verein ausgegebene »Archiv der Pharmacie« für die hiesige medic. Bibliothek zu halten.

Altenburg, am 4. Juni 1840.

Herzogl. Sächs. Landesregierung.

A. Freiherr v. Seckendorff.

Hrn. Hofrath und Medicinalrath, Ritter  
königl. preuss. Rothen Adlerordens  
1. Classe mit der Schleife, Dr. Rudolph  
Brandt zu Salzuflen im Fürstenth. Lippe.

Arch. d. Pharm. II. Reihe. XXIII. Bds. 2. Hft.



## XV.

Das Ministerium wird in Anerkennung der achtbaren Leistungen und der verdienstlichen Leistungen des Apothekervereins in Norddeutschland, demselben nach wie vor, seine besondere Theilnahme zu widmen gern bereit sein. Es nimmt daher auch das von Ew. Wohlgeboren in Ihrer Verfügung vom 20. Mai d. J. gemachte Anerbieten, mit der Sendung eines Exemplars des Archivs der Pharmacie für Sie, mit Dank an, und es wird demselben angenehme Nachrichten den wichtigeren, den Verein betreffenden Ereignissen und von Zeit zu Zeit Kenntniss zu erhalten.

Berlin, den 3. Juli 1840.

Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.

Ladenberg.

An den Hof- und Medicinalrath  
Hrn. Dr. R. Brandes, Wohlgeboren zu Salzuflen.

## Portovergünstigung des Vereins im Königreich Sachsen.

In Folge der gehorsamsten Vorstellungen und Einreichungen der königl. sächs. hohen Ministerien des Innern und der Finanzen, Seitens des Oberdirectors des Vereins und des Vize-Directors Dr. Meurer in Dresden, hat das königl. sächs. Ministerium der Finanzen dem Verein für die Sendungen des Archivs an die Kreisdirectoren und Mitglieder des Vereins im Königreich Sachsen, so wie für die Sendungen der Bücher der Lesezirkeln des Vereins, eine Portovergünstigung gewillig bewilligen geruht, auf ähnliche Weise, wie solche in Preussen statt findet.

Auf den Grund der desfallsigen Verhandlungen hat das königl. Oberpostamt in Leipzig dem Vicedirector Dr. Meurer die näheren Bestimmungen mitgetheilt, welche bei der Portovergünstigung zu beachten sind.

1) Die Portovergünstigung erstreckt sich allein auf die Sendungen des Archivs von Leipzig ab zu den Kreisdirectoren von diesen zu den Mitgliedern, so wie auf die Bücher der Lesezirkel eines jeden Kreises. Jede Briefeinlage, so wie eine offene Correspondenzeinlage in diese Büchersendungen ist aus verboten und müssen wir die sämmtlichen Herren der im Königreich Sachsen auf die Beachtung dieser Vorschrift um so mehr aufmerksam machen, als eine Verletzung derselben als ein Mißbrauch angesehen wird, der die Aufhebung und Entziehung der ganzen Vergünstigung nach sich ziehen soll.

2) Die Sendungen des Archivs an die Kreisdirectoren gehen von Leipzig aus in Paketen, die außen mit dem Vereinsstempel bedeckt sind, die Versendungen an die Mitglieder besorgt der Kreisdirector unter Kreuzband, und eben so die Bücher der Lesezirkel versandt, alle mit dem Vereinsstempel.

sichtbar, versehen. Der Name des Absenders muß jedesmal auf der Adresse angegeben werden.

Die Vergünstigung fängt mit dem 1. Juli d. J. an, und das hohe Ministerium auf unsere unterthänigste Bitte Genehmigung ertheilt, daß für das Halbjahr bis Ende Dec. l. J. nur die Hälfte des, auf ein ganzes Jahr nach der Anzahl tretenden Mitglieder zu bemessenden Aequivalents entrichtet werde.

Indem wir nun den verehrten Herren Collegen im Königreich Sachsen den Eintritt dieser wohlthätigen Vergünstigung anerkennen, bitten wir, die Bedingungen, unter welchen dieselbe bewilligt worden ist, und namentlich, daß die Büchersendungen in keinem Falle zu Correspondenzeinlagen benutzt werden dürfen, genau zu beachten. Wir fühlen uns verpflichtet, den Staatsbehörden, die auf eine solche Weise die wissenschaftlichen Zwecke des Vereins, die Erleichterung der Fortbildung und der Vervollkommnung der Pharmacie förderten, den Dank dafür darzubringen.

Der Oberdirector des  
Vereins.

Dr. R. Brandes.

Der Vicedirector des Vereins  
im Königreich Sachsen.

Dr. Fr. Meurer.

## Generalversammlung des Vereins.

Die diesjährige Generalversammlung und Stiftungsfeier des Vereins wird nach Beschluß des Directoriums in *Leipzig* gehalten werden, und zwar am 8. und 9. Sept. Es schließt sich damit das zweite Decennium der Anstalt ab. Die Wichtigkeit dieses Zeitabschnittes hat das Directorium vor allem dadurch angedeutet, daß es denselben an den Namen *Alexander von Humboldt* knüpfte, welcher Name die Versammlung des nächsten Vereinsjahr schmücken wird. Die Mitglieder des Vereins, Freunde, Gönner und Ehrenmitglieder der Anstalt werden freundlichst zu dieser Versammlung eingeladen. Alle, die für das Gedeihen des Instituts nützliche Vorschläge zu machen wünschen, werden ersucht, solche bei der Generalversammlung einzureichen, namentlich bitten wir darum die Herren Reichsdirectoren insbesondere in Bezug ihrer Wünsche für die Literatur der Lesezirkel. Die Versammlung am 8. wird, vorwiegend der Stiftungsfeier des Vereins gewidmet, eine öffentliche, die am 9. eine private, zur Besprechung und Berathung innerer Vereinsangelegenheiten und besonderer pharmaceutischer Verhältnisse.

Das Directorium des Vereins.

L. Aschoff. Brandes. Du Mênil. Wilken.  
Overbeck. Witting.

Die Assessoren: L. Aschoff. Faber.

## Eintritt neuer Mitglieder.

Der Apotheker Neunert in Xanten ist, nach Anmeldung



durch Hrn. Kreisdirector Schmithals, als wirkliches Mitglied des Vereins in den Kreis Xanten aufgenommen worden.

Desgl. Hr. Apoth. Petersen in Schwelm und Hr. Belli in Hagen, nach Anmeldung durch Hrn. Kreisdir. W. in den Kreis Schwelm.

Desgl. Hr. Apotheker Talbotz in Aubel (Königreich), nach Anmeldung durch Hrn. Dr. Voget, in den Kreis

Desgl. Hr. Apotheker Witzel in Frankenberg, nach Anmeldung durch Hrn. Vicedirector Müller, in den Kreis Med

Desgl. Hr. Apotheker Reber, Administrator der Herold Apotheke in Münster, und Hr. Apotheker Clüsener in G nach Anmeldung durch Hrn. Kreisdirector Professor Dr. Schding, in den Kreis Münster.

Desgl. Hr. Apotheker Wunderlich in Ebeleben, nach Anmeldung durch Hrn. Kreisdirector Commissionsrath Rstedt, in den Kreis Sondershausen.

Hr. Droguist Schulte in Münster ist, nach Anmeldung durch Hrn. Kreisdirector Dr. Schmedding, als außerordentliches Mitglied des Vereins in den Kreis Münster aufgenommen worden.

### Bildung eines neuen Kreises.

Durch die verdienstlichen Bemühungen des Hrn. Apoth. Dr. Tuchen in Naumburg ist ein neuer Kreis des Vereins dortiger Gegend begründet worden. Die Mitglieder desselben

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Hr. Apotheker Dr. Tuchen in Naumburg, |                                   |
| » »                                   | Brückner in Dürenberg,            |
| » »                                   | Guichard in Zeitz,                |
| » »                                   | Günther in Bibra,                 |
| » »                                   | Güterbock in Laucha,              |
| » »                                   | Hoffmann in Mücheln,              |
| » »                                   | Rudolph in Teuchern,              |
| » »                                   | Schnabel in Freiburg a. d. Unstr. |
| » »                                   | Schröder in Zeitz,                |
| » »                                   | Vetter in Wicha.                  |

Hr. College Dr. Tuchen hat die Güte gehabt, das directorium des Kreises Naumburg zu übernehmen, und wir die Herren Mitglieder dieses Kreises freundlichst willkommen heißen, ersuchen wir Sie, in allen Vereinsangelegenheiten an Hrn. Kreisdirector Dr. Tuchen gütigst sich zu wenden.

Der Oberdirector des Vereins  
Dr. Brandes.

### Verschiedene Nachrichten.

Hr. Apotheker Kay in Wilsnak hat seine Apotheke verkauft, wird aber in seinem künftigen, noch zu bestimmenden Wohnorte, dem Vereine wieder beitreten.

Hr. Apotheker Pielke in Strzelno und Hr. Apoth. Sch. in Znin sind, nach Verkauf ihrer Apotheken, aus dem Vereine ausgetreten.

Mit tiefem Bedauern zeigen wir an, daß die Herren Ogen Trommsdorff in Langansalza, Lachwitz in Herz

Gieser in Lubischin durch den Tod aus unserm Vereine hieden sind.

## *Medicinalwesen und Medicinalpolizei.*

Ueber das Verhältniß der Apothekergehülfen;

von

Dr. Geiseler,

Apotheker zu Königsberg in der Neumark.

In allen Kreisen der Gesellschaft wird heut' zu Tage mehr, je, eine Unzufriedenheit der Menschen mit dem Bestehenden bemerkbar. Als natürliche Folge davon entsteht der Wunsch, jene bestimmte Grenzen zu überschreiten, der dann auch eine Uebertretung derselben nach sich zieht. Wie nachdrücklich ein solches Sehnen, Streben und Vollbringen im Allgemeinen ist, das darf ich hier nicht erst auseinander setzen, ich muß auch nicht erst beweisen, daß ein wahres, vernünftiges Fortschreiten auf diese Weise keinesweges befördert wird. Denn, im Staate jedem einzelnen Staatsbürger, jedem einzelnen Bediener ein bestimmter Kreis der Wirksamkeit angewiesen dadurch die Berufsthätigkeit eines Jeden bedingt ist, und durch das Beharren in dieser allein das Bestehen des Staates und das Wohl der Glieder des Staates bewirkt wird; wie Familien nicht nur dadurch die sichere Basis eines Staates bilden, daß jede unter einem Oberhaupte steht und die einzelnen Glieder sich willig den Anordnungen des Oberhauptes fügen, keines sich außerhalb der angewiesenen Marken bewegt, sondern auch dadurch Wohlstand und Zufriedenheit in ihrer Mitte einheimisch machen, daß Alle unter der Leitung dieses Oberhauptes das vorgesteckte Ziel in harmonischem Einklange verfolgen; wie endlich die Wirksamkeit und Thätigkeit in jedem Organismus nur durch eine in ihrer Form beharrliche Anordnung der einzelnen Organe und dadurch deren Unterordnung unter einen gemeinsamen Zweck erklärlich wird; so sind auch in allen Künsten, in allen Instituten, durch den angestrebten Zweck die Grenzen der Thätigkeit für jedes einzelne Individuum, das dem gemeinschaftlichen Zwecke mitwirkt, bezeichnet und durch Fortbildung der einzelnen Organe innerhalb der gegebenen Sphären ist eine unverkümmerte Fortbildung des Ganzen denkbar. Es wird überhaupt also nur eine solche Thätigkeit für ersprießlich gehalten werden können, die eine bestimmte Richtung unabänderlich verfolgt, bei der das verrichtende Individuum gleichsam als Eins erscheint mit seiner Verrichtung nur vorhanden für diese in Bezug auf einen gegebenen Zweck, ist dies unabänderliche Verfolgen einer bestimmten Richtung um so nothwendiger, wenn mehrere Individuen zur Erreichung eines Zweckes verbunden sind, da wir in der That beobachten, daß Störungen und Stockungen überall dann eintreten, wenn selbst scheinbar kleinliche Verrichtungen aufgegeben werden und daß ähnliche Erscheinungen sich bemerken lassen, wie

für das Geschäft in Anspruch genommen, es bleiben ihnen Morgen- und Abendstunden zu selbstgewählten Beschäftigungen und in den Apotheken, wo auch zu diesen Zeiten ihre Thätigkeit für das Geschäft erfordert wird, werden dafür häufig sogenannte Ausgehstage gewährt. Ferner erhalten die Apotheken auch bequeme Ruhelager, in, wenn es die Localität gestattet, freundlichen Räumen, und sehr häufig werden ihnen andere Lebensbedürfnisse gereicht. Es geschieht aber auch mehr, die Principale theilen, obgleich sie gar keine Verpflichtung dazu haben, ihren Tisch mit ihren Gehülften und erren ihre ganze Lebenszeit hindurch der traulichen Unterhaltung im engeren Familienkreise beim Mahle, zu dem sich Vater und Mütter und Kinder zur angenehmsten Erholung sammeln, bei dem ökonomische und andere Familienangelegenheiten besprochen werden, die man nicht gern von fremden Ohren vernommen wünscht und während dessen die Gespräche oft eine solche Wendung nehmen, daß dieselben auch den vertrautesten Freunden verborgen bleiben müssen. Einen großen Genuss, der von denen gar nicht genug gewürdigt wird, täglich haben und dessen grossen Werth insbesondere Apotheker, die ins Privatleben übergetreten sind, bestätigen, ist der Apothekenbesitzer nur aus dem einzigen Grunde, um die Gehülften für ihre Mühe und Arbeit zu entschädigen und sie an der Annehmlichkeit, die das Familienleben gewährt, nehmen zu lassen. Das Opfer, welches hier die Principale geben, haben, wie mich dünkt, die Gehülften besonders hoch geschlagen und darin gewiss eine grosse Begünstigung zu sehen.

Zieht man nun auch noch in Erwägung, daß der Apothekergehülfe eigentlich nicht darum conditionirt, nicht Gehülfe ist, um einem Apotheker seine Kräfte zu verleihen und sich seinen Unterhalt zu erwerben, sondern nur darum sich fähig zu machen zur dereinstigen selbstständigen Ausübung seiner Kunst, so hätte er füglich auf gar keine andere Begründung Anspruch zu machen, da er es schon dankbar erdulden mußte, wenn ihm die Erlaubniß gegeben würde, sich in der Apotheke zu beschäftigen und somit die Gelegenheit, in seinem Fache zu vervollkommen und diejenige Reife zu erlangen, die später der Staat von ihm fordert, wenn er als Apothekenbesitzer auftreten will. Sein Verhältniß ist vollkommen vergleichbar dem der Auscultatoren und Referendare bei Gerichten und Regierungen im Preussischen, die beschuldigt werden, ohne Gehalt zu erhalten, dem der angehenden Advokaten die in öffentlichen Krankenanstalten die Heilkunde üben, eine andere Entschädigung, als die ihnen die Uebung in der medicinischen Praxis gewährt, dem der Schulamtskandidaten an Bildungsanstalten umsonst unterrichten, um sich im Lehren zu üben, dem der Präparanden beim Postfach, beim Studienrat und bei anderen Landescollegien, die ohne Besoldung an der Feder arbeiten müssen, um eine Beamtenstelle zu erlangen, deren Leistungen wirklich angestellte Personen der Anstalt gegen eine angemessene Entschädigung oder Gehalt übertragen. In sofern hat also der Apothekergehülfe einen Vorzug vor allen Anderen, die in ähnlichen Verhältnissen leben; die Entschädigung für seine Mühe erhält er nicht wie die genannten



in, allein dadurch, daß ihm die Aussicht zu einer dereinstigen Anstellung eröffnet wird, sondern er bezieht auch noch andre Emolumente, die keiner der genannten Personen zu Theil wird, er erhält diese Emolumente von seinem Principal, einem Herrn, der einer öffentlichen Staatsanstalt nur vorsteht, der Herr, um sich selbst seine Geschäfte zu erleichtern, der Hülfe bedarf, der aber auch aus einer höheren Rücksicht, gewiß meistens zu einem höheren Zwecke die Gehülfen in seiner Apotheke beschäftigt. Nur eine engherzige Beurtheilung könnte die Darstellung des Standes der Apothekergehülfen in dieser Beziehung eine unwahre nennen, nur eine Entwürdigung diesen Stand würde es sein, wenn man ihn dem der Handgehilfen und Handwerksgesellen an die Seite stellen wollte, wenigstens aber würden unsere besseren Gehülfen selbst damit zufrieden sein; sie wissen es zwar, daß größer der Aufwand an Mühen und Anstrengungen ist, sie wissen es zwar, daß die Folge eben so wenig die glänzenden Reichthümer der großen Handels- und Fabrikherrn zu Theil werden können wie irgend einem anderen, von Arbeiten umlagerten Staatsbeamten, sie wissen es aber auch, daß Thätigkeit und insbesondere die Thätigkeit des Geistes weniger auf Belohnung durch zeitliche Güter, als vielmehr auf Belohnung durch ein schönes Selbstbewußtsein hingewiesen ist. Und dies wird und muß zu Theil werden in einem Grade, wie selten den Bekannten irgend eines Berufes, am seltensten solchen, die nur für bloßen Geldlohn ihre Kräfte aufwenden.

Noch kenne ich bis jetzt nicht die Schrift des Dr. Probst über das Apothekertaxwesen, aus dem, was Dr. Bley (*Archiv Pharm. XIX, 246* etc.) über dieselbe sagt, entnehme ich aber, auch er, davon ausgehend, daß die Apotheken nützliche und notwendige Staatsanstalten und die Apotheker nicht blos günstig gestellte Staatsdiener sind, wohl einem höheren Schwünge unsers Fachs hold, dasselbe gern einer gemeinen öffentlichen Beurtheilung entzogen und darum die Entschädigung der Apothekenbesitzer in einer anderen Weise, als durch eine Einkommensteuer gesichert sehen möchte. Auch dieser Ehrenmann, nach seinen aus Dr. Bley's Beurtheilung erkennbaren Ansichten und Principien zu urtheilen, gewiß die wahre Entschädigung der Apothekergehülfen nicht in den Gewährungen erblickend, in denen sie gewöhnlich gesucht werden, auch er muß in den höheren Leistungen finden, die die Principale ihren Gehülfen zu Theil werden lassen. Finden diese Leistungen aber wohl wünschenswerthe Anerkennung bei unseren Gehülfen, so werden auch sie, zu einer freieren Anschauung emporgehoben, es nicht mehr verkennen, daß sie ihren Principalen auf eine Weise dankbar sein müssen, die nicht nur jede Gemeinheit ausschließt, sondern auch ihren ganzen Stand als einen der Erhebung in jeder Beziehung würdigen bezeichnet. Wenn die erwähnten höheren Leistungen nun auch nur darin bestehen, daß der Apotheker in seinem Geschäfte seinen Gehülfen Gelegenheit giebt, sich zu vervollkommen und ihnen in ihrem Hause eine freundliche Aufnahme gewährt, so haben sie doch schon deshalb einen um so größeren Werth, als die Gehülfen darauf, wie auf ein Recht, das ihre Principale selbst ihnen

eingerräumt haben, hingewiesen sind; sehr häufig aber wird an diesem Verhältnisse auch ein wissenschaftlicher Verkehr, der für die Gehülfen von den erspriesslichsten Folgen ist, und der wenn er auch nur die Mittheilung von Geschäfts- und Lebensverhältnissen in sich schließt, zwar nicht von den Gehülfen ein Recht in Anspruch genommen werden darf, welches die Bestimmungen von Seiten des Staates ihnen einräumen, aber doch als eine werthvolle Vergünstigung, die ihnen ihre Principals gewähren, und als eine Belohnung für ihre Dienste betrachtet werden muß.

Als eine solche Vergünstigung und Belohnung ist es auch zu betrachten, daß der Gehülfe von seinem Principal überhaupt in dessen Apothekengeschäft aufgenommen wird. Der Staat verlangt, daß jeder Apotheker eine Reihe von Jahren hindurch conditionirt haben soll, ehe er zur Prüfung und demnächstigen selbstständigen Ausübung seiner Kunst zugelassen wird; derselbe Staat sichert ihm aber keineswegs das Recht, in einer Officin als Gehülfe aufgenommen zu werden, er stellt vielmehr die Aufnahme allein in die Willkühr der Apothekenbesitzer. Diese sind zwar angewiesen, Gehülfen zu halten, es steht ihnen aber eine ungebundene Wahl unter den qualificirten Gehülfen frei, und denjenigen in ihr Geschäft aufzunehmen, gegen welche sie vielleicht zufällig eingenommen sind, ihn aufzunehmen, wenn seine Qualification auch die vorzüglichste ist, dazu zwingt der Apotheker kein Gesetz. Die angeführte gesetzliche Bestimmung über eine festgesetzte Conditionirzeit der Gehülfen könnte der Apothekenbesitzer daher auch noch weiter führen, sie könnte z. B. den einmüthigen Entschluß veranlassen, Gehülfen nur ohne Gehalt, ohne Beköstigung und ohne dergleichen Engagements zu engagiren. Ein solcher Fall liegt nicht außerhalb der Grenzen der Möglichkeit, ja man könnte ihn sogar bei dem Walten so vieler Umstände, die nachtheilig auf die Pharmacie influiren, nicht so ganz unwahrscheinlich halten, scheint doch selbst diejenigen Staaten, in denen die Pharmacie am meisten blüht, eben deshalb, weil keine Gesetze in dieser Beziehung vorhanden sind, darauf hinzuweisen, daß die Gehülfen auf eigene Kosten sich die nöthige Qualification erwerben, und, wie der Arzt oder jeder andere Staatsbeamte, dadurch ihre Entscheidung erhalten sollen, daß ihnen in der Folge durch die Erlaubniß, eine Apotheke zu acquiriren, eine Anstellung und eine Soldung zugewiesen wird.

Wenn sonach die Entschädigungen und Belohnungen der Apothekergehülfen, von denen bis jetzt die Rede gewesen ist, mehr durch die Apothekenbesitzer, als durch Staatsvorschriften festgestellt sind, so geben dieselben einerseits den Beweis einer fortschreitenden schönen Selbstentwicklung auch der pharmaceutischen Verhältnisse, werden aber auch anderseits in den Augen der Gehülfen einen um so größeren Werth haben müssen, als in ihnen ein Anerkennniß gewährt wird der Mühen und Aufopferungen, die jeder Apotheker kennt, da sie sich ihnen selbst eine Zeit lang hat unterziehen müssen, und zwar ein Anerkennniß, das freiwillig und ohne Zwang gegeben, die Leistungen der Gehülfen gewiß vollständig aufwiegt. Zieht man nun auch noch in Erwägung, daß die Opfer, welche



Gehülfen während der Conditionirzeit vielleicht bringen, ja wenige Jahre hindurch gefordert werden, daß sie denen, im langjährigen Gehülfendienste ergraut, keine Opfer mehr, denn Gewohnheiten sind, und daß auch für diese alten er-  
 raten Diener der leidenden Menschheit durch Apotheker wie-  
 am jetzt mehr, als je, auf die menschenfreundlichste Art ge-  
 et wird, so wird man gewiß einräumen müssen, daß dem  
 te der Apothekergehülfen, auf Belohnung und Entschädi-  
 g-Ansprüche zu machen, mehr als vollkommen genügt wird.

Die Stellung der Apothekergehülfen als Mitarbeiter der Apo-  
 kenbesitzer giebt ihnen ferner auch noch das Recht, von den  
 rlingen, die auch ihrer Fürsorge mit anvertraut sind, Ge-  
 sam und zwar den pünctlichsten Gehorsam zu fordern, sie  
 bt den Gehülfen das Recht, den Lehrlingen Geschäfte zu über-  
 gen und sie zu deren strenger Erfüllung anzuhalten. In die-  
 Rechte aber werden die Gehülfen nicht nur durch ihre  
 cipale geschützt, sondern es wird ihnen auch in dieser Be-  
 eung gewiß immer diejenige Unterstützung gewährt, auf die  
 so gerechte Ansprüche haben, da bei der gemeinschaftlichen  
 eziehung junger Leute, wie sie hier statt findet, nur dann et-  
 s Gutes erreicht werden kann, wenn alle Anordnungen in  
 er vollkommenen Uebereinstimmung der gemeinschaftlichen  
 ezieher gemacht werden und das von der einen Seite her Ge-  
 tne von der andern Seite her nicht verboten wird.

Auch vor willkürlicher Entlassung aus dem Geschäfte ihres  
 smaligen Principals sind die Apothekergehülfen durch ein  
 ht geschützt, das sie den auf Kündigung angestellten Beam-  
 gleichstellt; sie können nämlich verlangen, daß ihr Prin-  
 al, wenn er ihre Dienste nicht mehr in Anspruch nehmen  
 d, ihnen diese längere Zeit vorher kündigt. Eine willkühr-  
 e Entlassung des Gehülfen, wenn dieser seine Pflichten er-  
 lt hat, ist durchaus nicht erlaubt nach den Gesetzen, wie  
 wenigstens in Deutschland im Laufe der Zeit das sich im-  
 vortheilhafter entwickelnde Verhältniß der Apothekerge-  
 en hervorgerufen hat. Tritt eine solche Entlassung des Ge-  
 en ohne seine Schuld dennoch ein, so hat er auf Schadloshaltung  
 d Entschädigung ein vollständig begründetes Recht. Eben so  
 er aber auch das Recht, seine Stellung als Gehülfe in einer  
 ein aufzuheben und sie zu verlassen, wenn er eine festge-  
 e Zeit vorher seinen Principal von seinem Abgange in Kennt-  
 a gesetzt hat; er bleibt dadurch nur immer auf eine gewisse  
 it, die er nach Belieben abkürzen oder verlängern kann, an  
 Apotheke gebunden und kann sich also auch dem Despotis-  
 a, wenn ein solcher vielleicht von seinem Principale über  
 a ausgeübt werden sollte, auf eine gute Art entziehen. Wohl  
 a Gehülfen, die sich dieses Rechtes mit weiser Mäßigung be-  
 enen! Viele glauben, von einer Stelle zur andern fliegend,  
 e Erfahrungen und Kenntnisse vermehren zu können, viele  
 en, mit jeder Veränderung auch auf eine Verbesserung, kei-  
 r aber bedenkt, daß die Gewöhnung an bestimmte und ge-  
 dnete Verhältnisse in der Jugend einen großen Werth für  
 e künftige Leben hat, keiner erwägt, daß nicht das unruhige  
 eiben, nicht das rastlose Eilen von einem Orte zum andern,  
 adern nur stetige Ruhe und bedächtiges Verweilen der Ver-

vollkommenheit in der Wissenschaft und der Vermehrung wissenschaftlicher Kenntnisse' günstig sind. Und, was despotische Principale betrifft, so glaube ich behaupten zu können, daß ihre Zahl jetzt nur noch sehr gering ist, ja ich bin überzeugt, daß sie bald gar nicht mehr vorhanden sein werden, da Anstand, Bildung und Intelligenz unserer Gehülfen mehr und mehr zunehmen und ihnen gegenüber der Despotismus sein unvermeidliches Grab finden muß.

Die Apothekergehülfen haben endlich noch das Recht, was sie, je nachdem es die in den verschiedenen Staaten verschiedenen Vorschriften verlangen, kürzere oder längere Zeit conditionirt haben, ihre Qualification zur selbstständigen Verwaltung einer Apotheke durch Prüfung etc. zu bewirken. Das Recht ist in den meisten Staaten ein ausschließliches der Apothekergehülfen, da andere Personen, wenn sie auch die nöthigen Kenntnisse sich angeeignet haben, dennoch nicht zum Examen zugelassen werden und deshalb auch niemals die Berechtigung erlangen können, eine Apotheke zu acquiriren oder die Condition zur Anlegung einer Apotheke nachzusuchen. Die königl. preuss. Apothekerordnung bestimmt in dieser Beziehung Folgendes: »Zur Besitzfähigkeit des Erwerbers einer Apotheke gehört, daß er selbst eingelernter Apotheker und als solcher von der Medicinalbehörde approbirt sei.

So möchte denn wohl im Kurzen und Allgemeinen Erwähnung geschehen sein von den Rechten der Apothekergehülfen mit Angabe der Entschädigungen und Belohnungen, die sie für ihre Dienste erhalten, und wir dürften daher zur Betrachtung der Leistungen, die von ihnen gefordert werden, übergehen und somit versuchen können, den Kreis der Verbindlichkeiten und Pflichten dieser Personen näher zu bezeichnen. Dabei wird es zuvörderst nöthig sein, wieder darauf zurückzukommen, was schon oben erwähnt ist, daß die Gehülfen dem Apotheker Mitarbeiter sind. Es werden deshalb die Pflichten der Apotheken im Allgemeinen auch die der Gehülfen sein, sie werden denselben Gesetzen des Staates nachleben und nach ihnen ihre Kunst ausüben, sie werden gegen die vorgesetzten Behörden, gegen Aerzte und gegen Publicum in denselben Kreisen, wie die Apothekenbesitzer sich bewegen müssen, sie werden aber auch gegen diese, als ihre nächsten Vorgesetzten, noch besondere Verpflichtungen zu genügen haben.

Wenn nun zwar durch die Anforderungen, die der Staat an die Apothekergehülfen macht, insbesondere die Eigenschaften, welche ihnen beiwohnen müssen, bedingt sind, wenn die Gehülfen also diejenige Ausbildung in der theoretischen und practischen Pharmacie erlangt haben müssen, welche von ihnen nach den bestehenden Gesetzen gefordert wird, wenn sie thätig, aufmerksam und genau in Ausübung ihrer Kunst, wenn sie überhaupt gewissenhaft in Erfüllung derjenigen Pflichten sein müssen, die den Apothekenbesitzern, deren Mitarbeiter sie ja sind, durch die Staatsgesetze auferlegt und die theils oft genug ausgesprochen, theils auch in den Apothekerordnungen der verschiedenen Staaten enthalten sind, so wird doch das Verhältniß zu ihren Principalen den Gehülfen immer noch besondere Obliegenheiten zuerkennen, durch deren Hervorhebung jene Eigenschaften

vermehrt und erweitert erscheinen werden. Indem ich voraussetze, daß die Gehülfen diejenigen Eigenschaften haben, welche sie fähig machen, Mitarbeiter der Apotheker zu sein, indem ich voraussetze, daß sie im Besitz der erforderlichen theoretischen und practischen Ausbildung sind, gehe ich zugleich zu Verpflichtungen über, die sie zunächst in Bezug auf ihren Principal übernehmen. Begründet sind zuvörderst diese Verpflichtungen dadurch, daß der Staat nur den geprüften Apothekenbesitzer zur selbstständigen Ausübung der pharmaceutischen Kunst autorisirt, ihn zum Leiter, Ordner und Vorsteher öffentlich ernennt und ihn also dazu bestimmt hat, die Kräfte, die er außer der eignen bedarf, zu wählen und auf die gesetzte Art in Thätigkeit zu setzen, wie dies im Eingange schon ausführlich erörtert ist. Aus dem hieraus sich ergebenden den Apothekenbesitzern untergeordneten Verhältnisse der Apothekergehülfen wird aber zu folgern sein, daß pünktliche Ausführung der Anordnungen des Principals, vor allen Dingen also *Gehorsam* eine der ersten Pflichten des Apothekergehülfen gegen seinen Principal ist. Welchen Nutzen haben die besten Einrichtungen, die besten Anordnungen, wenn sie nicht auch wirklich ausgeführt werden? Wie kann selbst die beste Sorgfalt des Principals irgend erspriesslich werden, wenn nicht auch seinen Wünschen gemäß von seinen Mitarbeitern befolgt wird? Wie kann ein nur durch gemeinschaftliche Thätigkeit zu erstrebender Zweck erreicht werden, wenn nicht ein Plan befolgt wird, den nur Einer entwerfen kann und wenn nicht alle Kräfte im Sinne dieses Einen in Thätigkeit gesetzt werden? Wie ein Feldherr über alle seine Streitkräfte frei zu verfügen im Stande sein muß, wenn er eine entworfenen Kriegsstrategie auch wirklich und glücklich ausführen will, wie ein Bauwerk nur dann gelingen kann, wenn treu nach dem Risse, den der Baumeister aufgenommen, gearbeitet wird, wie jeder lebende Organismus nur dann den Zweck des Lebens erfüllt, wenn er der festgesetzten, vorgeschriebenen Ordnung alle einzelnen Theile desselben ihre Functionen verrichten; so kann eine Apotheke auch nur dann ihrem Zweck entsprechen, wenn alle Thätigkeiten auf die geeignetste Art in Wirksamkeit gesetzt, einem Hauptzustreben, welches nur der in seiner ganzen Ausdehnung überblicken haben soll, der als Leiter und Ordner diesem Institut vorsteht, zu seinem Vorsteheramte auch vom Staate allein anerkannt und autorisirt ist, die zur Erreichung seines Zwecks nach Ort, Zeit und Umständen auch verschiedenen Mittel, innerhalb auch ihm vorgeschriebener gesetzlicher Bestimmungen zu benutzen. Ohne den strengsten Gehorsam seiner Untergebenen kann er nichts leisten können. Es wird dieser Gehorsam von Seiten der Gehülfen aber keineswegs als ein besonderes Opfer angesehen, als eine schwer zu erfüllende Pflicht betrachtet werden können, wenn sie in Erwägung ziehen, daß Verbindlichkeit gegen seine Nebenmenschen ein Jeder übernehmen muß, und sie bedenken, daß sie mit ihrem Eintritt in das Geschäft der Apothekers die Anordnungen ihres Vorgesetzten treu zu befolgen sich anheischig gemacht haben, wenn sie berücksichtigen, daß sie für ihre Verpflichtung zum Gehorsam ja hauptsächlich die ihnen werdenden Entschädigungen erhalten, wenn



zten, ihre Frauen  
 daß sie von  
 Is sie bestanden  
 heidene Gemüthe  
 r seine Pflicht  
 mnten Verhältnisse  
 nd vorzüglicher  
 esen ist. Das  
 ehm machen  
 3, Gleichheit  
 nicht nütze. Aber  
 ne mit seinen  
 n anderer Weise  
 nen gelernt. Aber  
 mildern war  
 önnten, zu der  
 veg ist unzureichend  
 wenn es  
 ste ausbleiben  
 zen sie die  
 it. Und was  
 cheidenen  
 racterisirt  
 issigen, zumeist  
 ipalen die  
 ck zu werden  
 ihren gemein  
 sein, als die  
 überraschend  
 theils in der  
 r Gefälligkeit  
 n, die die  
 zten zu st  
 hlen, die  
 l Beschaffen  
 daß die  
 id daß die  
 gen ganz  
 s alle Theile  
 unter P  
 te zu  
 Beherrsch  
 stlich  
 en. Alle  
 innerlich  
 ähmender  
 nhe, in  
 hält  
 dem Mangel an Füg-

huldnen  
 rafs sie  
 lafs in  
 wird,  
 n sich  
 nerkt,  
 ellen,  
 Seiten  
 Con-  
 ange-  
 Ver-  
 n der  
 anteh-  
 mufs,  
 enge  
 finge  
 auch  
 elben  
 schül-  
 cheit  
 lage  
 sich  
 stel-  
 len,  
 gen-  
 her  
 Ge-  
 er-  
 en  
 r-  
 on,  
 n-  
 i-  
 h-  
 r  
 n  
 n  
 d  
 n  
 n  
 er  
 ags-  
 gehör-  
 oben er-  
 n möchten,  
 ach sehr klein  
 rer wohlverstan-  
 dem Mangel an Füg-

vorhanden sein die Apothe-  
 um berührt werden. Jeder,  
 , verrichtet seine Ge-  
 en nur halb und



sie endlich im Auge behalten, daß sie nur in der Schule der Abhängigkeit zu wahrer Freiheit gelangen können. Wollen wir nun die Grenzen bezeichnen, bis zu welchen sich der Gehorsam der Gehülfen gegen ihre Principale erstrecken muß, würden wir allerdings dieselben nicht füglich über den pharmaceutischen Geschäftskreis hinaus erweitern können, wenn wir indessen erwägen, daß der Character des Menschen sich in seinen Handlungen abspiegelt und daß die aus diesen gezogenen Schlüsse selten trügen, so wird man gewiß den Gehülfen für den besten und pflichttreuesten halten, der, da er als Jüngling des Lebens Ernst noch nicht zu erfassen im Stande gewesen ist, gern auf die freundlichen Ermahnungen des erfahrenen Mannes Rücksicht nimmt, so wird der Gehülfe gewiß meistens in den Augen der Welt nicht nur, sondern auch sich selbst und seine ganze Zukunft gewinnen, der die Weisung befolgt, die ein wohlmeinender Principal ihm ertheilt. Wird also der Gehorsam solcher Gehülfen, die es mit sich und ihren Principalen gut meinen, weit den gewöhnlichen Geschäftskreis überschreiten und gern wird der jugendliche Gehülfe dem Munde seines gereiften Vorgesetzten dessen Worte vernehmen und sie erfüllen, ja es wird sein Gehorsam sogar zuvorkommende Gefälligkeit sich verwandeln müssen; aber wird es als ein Beweis schlechter Erziehung und gewöhnlichen Characters selbst älterer Gehülfen gelten, wenn dergleichen Wünsche von ihnen nicht erfüllt werden, immer wird sich aus auf einen Mangel an Bescheidenheit schließen lassen, gewöhnlich auch ein Mangel an Bildung zu Grunde liegt.

In jedem Verhältnisse des Lebens ist *Bescheidenheit* eine Tugend, die selbst den größten Tugenden erst die wahre Folie auflegt. Ihrer müssen sich auch die Apothekergehülfen befleißigen, ja es ist eine strenge Pflicht für sie, dieselbe insbesondere gegen ihre nächsten Vorgesetzten auszuüben. Schon in der Lehre wird der angehende Apotheker zur Bescheidenheit erzogen, er muß sie anwenden lernen wie gegen Jeden, der die Apotheke besucht, so besonders gegen seinen Principal und die Mitarbeiter, die Gehülfen, sie muß ihm so zur andern Natur geworden sein, daß er sie als ein unentwendbares Eigenthum mit hinübernimmt in den Gehülfenstand. Nur Dünkel und Anmaßung können sie verscheuchen und ist sie wirklich gelöst, dann sind die edelsten Bande unter den Menschen gelöst, sind die Rücksichten geschwunden, die Gebildete unter Umständen gegen einander nehmen müssen. Dünkelhafte anmaßende Apothekergehülfen werden, weil sie in ihrem Willen immer die Bescheidenheit verletzen, ihren Wirkungskreis niemals auszufüllen im Stande sein, sie sind als pflichtvergessen ihres Standes unwürdige Subjecte zu betrachten, die weder bar für ihren Beruf, noch fähig erscheinen, dem ehrenwerthen Apothekerstande anzugehören. Wie Bescheidenheit gegen Mitmenschen überhaupt Pflicht eines Jeden ist, der auf seine Ansprüche macht, wie nur durch sie gegenseitige Achtung wirkt wird, wie besonders jeder Untergebene sie seinem Vorgesetzten schuldig ist, wenn der Kitt nicht gelöst werden soll, der jedes Verhältniß zusammenhält, so ist sie also auch Pflicht der Apothekergehülfen wie gegen Alle, so vorzüglich gegen

nächsten Vorgesetzten, ihre Principale, und immer werden bedenken müssen, daß sie von diesen nur unter der Bedingung engagirt sind, daß sie bescheiden sich betragen im höchsten Grade. Der unbescheidene Gehülfe wird hienach also durch Bescheidenheit immer seine Pflicht verletzen, da er aus dem angewiesenen bestimmten Verhältnisse heraustritt, er wird auch sich selbst und vorzüglich dem Wirkungskreise schaden auf den er angewiesen ist, denn er wird diesen nicht nur sich selbst unangenehm machen, da so oft im Leben, so und dies auch sein mag, Gleiches mit Gleichem vergolten wird, sondern auch in so fern nicht nützen können, als er allein durch bescheidene Rücksprache mit seinem Principal auf wirkliche Verbesserungen, die er in anderen Verhältnissen und selbst durch Studium kann kennen gelernt haben, hinzuwirken, harte strenge Befehle zu mildern und Mängel, die sich vielleicht einschlichen haben könnten, zu heben im Stande sein wird. Dieser angedeutete Weg ist unstreitig auch der einzig richtige den die Gehülfen, wenn sie einen wohlthätigen Einfluß auf den Gang der Geschäfte ausüben wollen, einzuschlagen haben, indem sie andern verletzen sie die ihren Principalen schuldige Pflicht der Bescheidenheit. Und wenn sie dann noch bedenken, daß die Uebung der Bescheidenheit vorzüglich in jeder Sphäre der Ehrenmänner characterisirt, so werden sie sich derselben um so mehr befleißigen, so werden sie sich selbst bemühen, ihren Principalen als Ehrenmänner zu erscheinen, als solche denen Glück zu wünschen ist zu einem Prädicate, sie selbst adelt und ihren ganzen Stand erhebt.

Es würde überflüssig sein, alle die Pflichten, die der Gehülfe seinem Principal übernimmt, jetzt hier noch namentlich aufzuführen, sie liegen theils in den beiden angeführten, theils in sie aus ihnen. Zur Gefälligkeit, Anspruchslosigkeit, Treue allen den Tugenden, die das innige Bestreben verrathen, Liebe ihrer Vorgesetzten zu erhalten, werden sich alle die Gehülfen verpflichtet fühlen, die ihr Verhältniß erkannt und darauf sam zu leisten und Bescheidenheit zu üben gelernt haben. Es werden es erkennen, daß die Vernunft, als Geist der Menschheit, das Gute fordert und daß in dem Auflehnen der willkührlichen Triebe und Neigungen gegen die Vernunft der Same alles Bösen beruht und wie sie alle Triebe und Begierden durch Vernunft beherrschen und unter Pflicht die innere oder sittliche Nothwendigkeit, das Gute zu thun, verstehen werden, so werden sie auch durch diese Beherrschung und durch diese Pflichtübung erst wahrhaft sittlich frei und immer unabhängiger dem Aeußeren werden. Alle Pflicht beruht ja darauf, daß Vernunftwesen sich innerlich widersprechen würde, wenn es sich als sich selbst bestimmendes Vernunftwesen und die Vernunft als seine Würde ansähe, in dem Einwirken auf die Umgebungen und in dem Verhältniß zu denselben aber diese Würde nicht verleugnete, daß es einem andern Gesetze huldigte und dem Antriebe der sinnlichen Natur überliesse, der kein Fühlen, keine sittliche Nothwendigkeit, keine Gesetzmäßigkeit, keinen Rechtszustand und keinerlei aus diesem entspringende Verbindlichkeiten der Menschen gegen einander anerkennt. Der beharrliche Zustand der Pflichtübung oder der Herrschaft der Ver-

nunft über die Sinnlichkeit ist aber Tugend und der Wille, die Pflicht will, ist ein guter Wille. Von diesem Grundsatz ausgehend wird guten Apothekergehülfen dann auch Pflichterfüllung in der weitesten Ausdehnung nicht mehr als eine Forderung gelten, sondern als Das, was ihre edelsten Neigungen befriedigt; sie werden den Umfang ihrer Pflichten in den verschiedensten Verhältnissen nicht nur selbst erkennen, sondern ihre Uebung auch weit über den gewöhnlichen Geschäftsbereich ausdehnen und unter allen Umständen der wahren Freiheit theilhaftig werden, in der sich auf das Vollkommenste die unabhängige Kraft des Geistes, welche das edelste Gut desselben ist, macht, mit der Unterwürfigkeit unter die Gesetze der Pflicht vereinigt.

Wer indessen eine solche Vollkommenheit von den Gehülfen verlangen wollte, daß sie in ihren Verhältnissen alle Rechte und Tugendpflichten erfüllen sollen, der würde offenbar zu weit gehen, immer wird zu bedenken sein, daß Rechte und Pflichten sich gegenseitig bestimmen und daß erst dann, wenn der erste ganz genügt wird, eine ungeschmälerte Erfüllung des letzteren zu verlangen ist, immer wird in Betracht gezogen werden müssen, daß schon das Streben nach Vollkommenheit, das schon das Streben, seine Pflichten zu erfüllen, den guten Apotheker und den guten Gehülfen bezeichnet und zwar um so mehr, als Unvollkommenheiten ja allen irdischen Wesen anhaften. Doch so viel steht fest, daß die Gehülfen, welche genug davon zu haben glauben, wenn sie die Geschäfte der Apotheke besorgen und so die Dienste verrichtet haben, für die sie bezahlt werden, fast nur gewöhnlichen Miethlingen zu vergleichen sind und auf einer niedrigen Stufe der Bildung stehend niemals Freunde ihrer Principale werden, niemals ihrem Stande Ehre machen und ihn erheben können. Ja wie weit sich der Geschäftskreis solcher Gehülfen erweitern müsse, das glaube ich im Laufe dieser Darlegung hinlänglich angedeutet zu haben, aus welcher zugleich hervorgehen dürfte, welche Stellung der Apothekerhülfe zu seinem Principal und umgekehrt der Principal zu seinem Gehülfen einnimmt. Die Berücksichtigung dieser Stellung wird aber auch zu der Erkenntniß führen, daß die Klagen, welche zuweilen Apotheker über ihre Gehülfen führen, nicht unbegründet sind.

Habe ich selbst bisher das Glück gehabt, grösstentheils gute Gehülfen in meinem Geschäft gesehen zu haben, so werde ich zwar weniger aus eigener Erfahrung sprechen können, als das, was ich so oft gehört habe und was mir von sehr vielen Collegen bestätigt ist, glaube ich angemessen bei dieser Gelegenheit beleuchten zu können, und einen neuen Beweis zu liefern, wie sehr dem Apotheker sein Geschäft oft erschwert wird. Folgende Umstände werden insbesondere als Klagen hervorgehoben:

1) *Ungehorsam.* Es ist nicht in Abrede zu stellen, daß eine übertriebene Forderung derer, die zu befehlen haben, auch Fehler bei denjenigen erzeugt, die gehorchen müssen. Von diesem Gesichtspunkte gehen gewiß insbesondere diejenigen Gehülfen aus, die zu der angeführten Klage Veranlassung geben, sie sind schuldigen damit aber nicht allein den Fehler des Ungehorsams

alle Handlungen, die sie sich als tadelnswerthe zu Schulden kommen lassen, sondern sie glauben auch nicht einmal, daß sie haupt ein Unrecht begangen haben, da sie wähnen, daß in Anordnungen, deren Ausführung ihnen übertragen wird, die Grenzen überschritten werden, bis zu welchen sich Gehorsam nur erstrecken darf. Schon oben habe ich bemerkt, es allerdings schwer ist, hier gewisse Grenzen festzustellen, warte indessen, um alle Klagen, die sich von beiden Seiten her könnten, niederzuschlagen, die Schließung eines Contracts, in welchem die gegenseitigen Leistungen genau angegeben und nach den an verschiedenen Orten verschiedenen Verfassungen gemodelt wären, angerathen werden. Doch in der Bestimmung dieser Grenzen würde jedenfalls eine Entcheidung des ganzen Standes liegen, da man davon ausgehen muß, hier gebildete Männer von beiden Seiten und nicht strenge Arbeiter auf der einen und gewöhnliche dienende Miethlinge auf der andern Seite stehen. Mag dies Verhältniß nun aber auch Principalen zuweilen verkannt werden, so werden dieselben immer in ihre Schranken zurücktreten, wenn die Gehülfen so benehmen, wie ich, als ich von der Bescheidenheit der Gehülfen sprach, angeführt habe und es wird also die Klage Ungehorsam von selbst wegfallen, wenn die Gehülfen sich ergeben und nachgiebig zeigen, was ihnen schon ihre Stellung zu einer unerläßlichen Pflicht macht, nicht zu gedenken, wie dazu auch ihre Jugend dem Alter der Principale gegenüber veranlassen müßte. Unter allen Umständen wird daher Grund zu der angeführten Klage in dem Betragen der Gehülfen zu suchen sein, indem sie in den Anordnungen ihrer Vorgesetzten da Fehler zu sehen glauben, wo diese nicht vorhanden sind, indem sie in ihrer oft beschränkten, wenigstens durch Erfahrung nicht geläuterten Ansicht für Kleinigkeit das halten, was oft zur sichern Erreichung eines Zweckes höchst nothwendig ist, indem sie nur zu geneigt sind, die Marken zu überschreiten, welche ihnen ihre Stellung anweist, indem sie sich für durch selbstständig halten, was sie nicht sind, indem sie ihrer Dunkel bemächtigt, der zu nichts Gutem führen kann, indem sie endlich der Bescheidenheit ermangeln, welche sie mehr adeln würde, als jener Ungehorsam, durch den sie zu widerspenstigen Thieren herabsinken, gegen welche die Gesetze der Polizei und des Rechts geltend gemacht werden können. So tragen denn, zu der bescheidenen Rücksprache mit ihrem Principale, wenn es wirklich gefehlt haben sollte, niemals geneigt, in der Erfüllung der Rechts- und Tugendpflichten in ihrem Wirkungskreise und in ihrem Verhältnisse immer verdrossen, ungehorsam die Gehülfen dazu bei, daß ihr Stand nicht so gehoben erscheint, wie alle Apotheker ihn gern gehoben sehen möchten, geben solche Gehülfen, deren Zahl jetzt freilich sehr klein ist, mag, den Beweis, daß sie den Begriff wahrer wohlverstandener Freiheit nicht aufgefaßt haben; aus dem Mangel an Fähigkeit wird dann aber auch bei ihnen:

2) *Unzufriedenheit*, durch deren Vorhandensein die Apothekenbesitzer ebenfalls sehr unangenehm berührt werden. Jeder, der mit seiner Lage unzufrieden ist, verrichtet seine Geschäfte widerwillen, widmet sich ihnen nur halb und verwendet



seine Kräfte nicht in dem Maasse, als nöthig ist, um den Zweck zu dessen Erreichung auch er mitwirken soll, zu erfüllen. Apothekergehülfen, die nicht zufrieden mit ihrem Schicksale sind, können daher in einer Apotheke, in der sie thätig sein sollen, nicht als treue Mitarbeiter ihrer Principale, wofür sie sich ergeben, angesehen werden, sie sind also, da sie ihre Pflichten nicht vollständig erfüllen, unbrauchbar und erschweren so ihren Vorgesetzten nicht nur die Geschäftsführung, sondern verbittern ihnen und sich selbst auch das Leben. Oft sind aber die Gehülfen nicht sowohl mit ihrem Schicksale überhaupt unzufrieden, als besonders mit den Einrichtungen, die sie in dem Hause und den ökonomischen Verhältnissen ihres Principals finden, sie sind frech, daß sie sich erlauben, die Speisen zu tadeln, die ihnen gereicht werden und die ihr Principal gewöhnlich mit Theilnahme theilt, sie verlangen wohl gar, immer Theilnehmer an den Gesellschaften zu sein, die zuweilen der Principal vielleicht zu seiner Erholung um sich versammelt und in denen er selbst seine Familie und seine Freunde genirt sein müssen, wenn er vor Zeugen, die oft nur kurze Zeit in einem Hause weilen, vertraute Gespräche führen wollen, sie verlangen dies selbst dann, wenn sie als Gehülfen allein in einem Geschäfte angestellt sind und also in der Abwesenheit ihres Principals beständig in der Apotheke gegenwärtig sein müssen und bedenken sowohl als überhaupt nicht, daß erst durch längere Dauer des Aufenthalts in einem Hause das Vertrauen und die Freundschaft ihres Principals erworben werden kann, deren Besitz einer grösseren Annäherung vorausgehen muss. Dergleichen tadelnde Bemerkungen, Wünsche und Ansprüche beweisen daher einerseits eine Unbescheidenheit, anderseits eine Gemeinheit der Gesinnung, die sich für keinen Gebildeten und also auch nicht für einen Gehülfen ziemt, sie zeugen von Dünkel und arten in einen noch grösseren Fehler aus, nämlich in

3) *Egoismus*. Um Anspruchslosigkeit zu lernen und dadurch reif zu werden zur Selbstständigkeit, das ist mit Grunde Grund, aus dem der angehende Apotheker als Gehülfe condirirt; durch diese Anspruchslosigkeit wird er sich aber auch die reinsten und schönsten Freuden bereiten, denn, wer ihr nachhuldigt, der wird kalt behandelt von seinen Mitmenschen, er gewinnt nie das Herz derer, mit denen er in einer Gemeinschaft lebt. Am meisten aber verlieren Untergebene, also auch Apothekergehülfen, wenn sie ihren Vorgesetzten, also ihren Principalen gegenüber einen Dünkel blicken lassen, der theils keinen Grund hat, weil der Gehülfe gehorchen muss, der theils aber auch jedem Fortschreiten in Kunst und Wissenschaft unübersteigliche Hindernisse in den Weg legt. Wird nun gar, was nur zu häufig der Fall ist, aus diesem Dünkel Eigenliebe und Selbstsucht, dann wird das heftige Verlangen nach Befriedigung persönlicher Bedürfnisse in der weitesten Ausdehnung eine beschwende Begierde, dann werden die Pflichten gegen Andere um ihr Wohl nicht mehr berücksichtigt, dann bildet sich der Egoismus aus, der keiner gesetzlichen Ordnung mehr huldigt und der die Apothekergehülfen, deren er sich bemächtigt hat, in ihrem Geschäfte, das Selbstverleugnung und Fügen in gewisse Formen erfordert, untauglich macht. Sehr häufig soll



Der Egoismus bei Gehülfen finden, die durch ihr abgelegtes Examen bereits die Fähigkeit, selbst eine Apotheke zu acquiesciren, erlangt haben; diesen letzten möchte ich insbesondere ins Herz legen, daß sie aufhören müssen, Gehülfen zu sein und solche zu engagiren, wenn sie ihren Willen dem Willen der nächsten Vorgesetzten nicht mehr unterzuordnen geneigt sind, daß sie von der gereifteren Erfahrung noch Manches lernen können, wie ja niemand zu lernen aufhört, daß sie bedenken mögen, wie sie dem eigenen Etablissement so nahe, wohl dem Betragen ihrer Gehülfen sich wünschen und daß sie es klar erkennen müssen, wenn ihnen von einem Apothekenbesitzer noch eine Gehülfsstelle übertragen wird. Solche dünkelhafte egoistische Gehülfen, die es so weit bringen, daß sie ihre Meinung als den Probirstein des ächten Pflichtbegriffs, der doch durchaus ein allgemein geltendes Princip sein muß, ansehen, solche Gehülfen pflegen sehr häufig, da sie ihre Ohnacht mit bitterem Groll gegen ihre Vorgesetzten, in denen sie ihre Unterdrücker zu sehen vermeinen, denn doch erkennen, durch an den Tag zu legen, daß sie schmollen oder maulen. Es sehr verdrießlich muß ihnen dadurch aber nicht ihre Stellung werden? Durch bescheidene Rücksprache mit ihrem Principale erwerben gute Gehülfen sich das Vertrauen desselben, die schmollende Egoisten aber werden verachtet, baldmöglichst entlassen und als rohe ungebildete Individuen betrachtet, in denen kein Heil für die Pharmacie zu erwarten ist.

4) *Trägheit und Mangel an Ordnungsliebe* sind ferner zuweilen Gegenstände, die an den Apothekergehülfen zu Tadel und Beschwerde gegründete Veranlassung geben. Nur zur Verrichtung der Geschäfte ist der Gehülfe in der Apotheke, nicht zum Nichtsth. Manche Gehülfen glauben nun, wenn sie nur schnell und darum oft unzuverlässig die nothwendigen Berufsgeschäfte verrichtet, die übrige Zeit für sich und nach ihrer Willkühr zu verwenden zu können, sie halten sich dann besonders über allen Tadel erhaben, wenn sie diese Zeit auf wissenschaftliche Beschäftigungen verwenden. Darunter leidet aber immer das eigentliche Geschäft und mit ihm der Principal. Die Erfahrung lehrt, daß in den Apotheken, wo Gehülfen und Lehrlinge am liebsten bei den Büchern sitzen, eben sowohl, wie in solchen Officinen, in denen träge Gehülfen fungiren, Kapseln, Signaturen, Titel u. dergl. Vorräthe fehlen, daß die abzuholenden Arzneien niemals zu gehöriger Zeit fertig sind, daß die Defecttafel entweder voll oder das Fehlende nicht angeschrieben ist, daß die Ladengefäße oft nicht an ihren Plätzen stehen, daß Unsauberkeit überall herrscht, daß Versehen vorkommen und überhaupt mit den billigsten Ansprüchen nicht genügt wird. Ich liebe die Wissenschaften und freue mich sehr, wenn junge Pharmaceuten sich ihnen mit Eifer widmen, aber »Alles zu seiner Zeit« und »Ordnung regiert die Welt« das sind Sprichwörter, die für den Apotheker eine tiefe Bedeutung haben müssen. Aus den oben genannten Mängeln entsteht in den Apotheken Unordnung, oft sogar völlige Verwirrung; die Nachtheile derselben will ich nicht erst hier anführen, ich will nur erwähnen, daß der Pharmaceut, der nicht die Ordnung liebt, auch nicht pünktlich und nicht pünktlich in seinen Verrichtungen sein

kann. In der Trägheit glaube ich auch den Grund davon suchen zu müssen, daß manche Gehülfen meinen, nur gewisse Geschäfte verrichten zu dürfen, andere dagegen, als z. B. Anfertigung von Salben und äußerlichen Arzneien, Abfassen, Besorgung des Handverkaufs etc. als ihrer unwürdig von sich weisen zu müssen. Wie gewaltig ihr Irrthum in dieser Beziehung ist, geht schon daraus hervor, daß alle Principale in ihren Geschäfte überall helfend zutreten, wo die Noth es erfordert, wiewohl sie aber wirklich fehlen, das beweist die mit der Weigerung, allen nöthigen Geschäften sich zu unterziehen, verbundenene Zurückweisung der Vorschriften und Anordnungen ihrer Principals, dem sie zu gehorchen verpflichtet sind. Kein Apotheker wird von seinem Gehülfen verlangen, daß er den ganzen Tag hindurch stoßen, schneiden und scheuern soll, wiewohl sich der Gehülfe aber scheut, im Falle der Noth dergl. Arbeiten einmal zu verrichten, dann ist er des Namens eines guten Apothekers nicht würdig, dann ist er auch nicht fähig, in der Folge Opfer zu bringen, die sein Stand von ihm fordert. Ich kenne keinen Beruf, der Thätigkeit und Ordnungsliebe so sehr erfordert, als der Apothekerstand und jeder practische Pharmaceut wird mir beipflichten, wenn ich behaupte, daß selbst in den infrequentesten Apotheken immer noch etwas zu thun übrig bleibt; in so fern werden also Gehülfen, die in einer Apotheke nicht beschäftigt sind und entweder die Hände unthätig in den Schößen legen oder außer den Morgen- und Abendstunden zu den Müchern greifen, wenn noch irgend ein Vorrath anzufertigen oder irgend ein Stäubchen von den Gefäßen zu entfernen ist, stets gerechten Tadel verdienen und in ihren Berufsgeschäften trübsal genannt werden. An diese Trägheit der Gehülfen schließt sich auch noch an:

5) *Neigung zum Ausgehen.* In geschäftsreichen Officinen, wo mehre Gehülfen gehalten werden und diese sich gegenseitig vertreten und unter einander abwechseln können, haben gewöhnlich die Gehülfen in jeder Woche einen freien ganzen oder halben Tag. Eines solchen bedürfen sie auch nicht allein zu ihrer Erholung, sondern auch, da sie im Geschäfte gewöhnlich vom frühen Morgen bis zum späten Abend thätig sein müssen, um Muße zu ihren Studien zu gewinnen. Ganz anders ist ihr Verhältniß in den Apotheken kleiner Städte, in denen die Geschäfte nicht so bedeutend sind und in denen gewöhnlich nur ein Gehülfe ist. Wenn ein solcher darauf Anspruch machen wollte, sich eben so oft ganz aus der Apotheke zu entfernen, so würde er jedenfalls zu viel verlangen, einmal von seinem Principal, da ihn dieser nur allein vertreten kann, an dieser Vertretung aber durch sein Verhältniß als Familienvater, Hausherr, Staatsbürger u. s. w. oft gehindert oder auch durch sein Alter zu derselben weniger geeignet gemacht wird, zweitens aber auch in so fern, als in kleinen Geschäften der Gehülfe ja die Morgen- und Abendstunden zu wissenschaftlichen Beschäftigungen wenig und selten gestört verwenden kann. In weniger beschäftigten Apotheken wird daher der Gehülfe seine Entfernung aus der Officin immer den Umständen anpassen und ein zu häufiges Ausgehen vermeiden müssen; thut er das Gegentheil, so verdient er gerechten Tadel. Noch mehr tadelnswerth aber ist

wenn er sich erlaubt, heimlich ohne Vorwissen seines Principals die Apotheke zu verlassen, er verletzt, indem er dann leicht einem unerfahrenen Lehrlinge die Geschäftsführung anvertraut, die heiligsten Pflichten, da er nicht nur seinen Principal täuscht, sondern auch das Publicum gefährdet. Ein Gefesse, der sich solche Pflichtverletzungen erlaubt, verliert das Vertrauen und giebt zu gerechten Klagen dringende Veranlassung.

Dies sind wohl nun die Untugenden, über deren Vorhandensein bei den Gehülfen jetzt noch zuweilen laute Beschwerde führt wird, ich kann, wie ich glaube, mit Recht andere, als Bescheidenheit gegen das Publicum, Mangel an Gefälligkeit, Höflichkeit, die üble Gewohnheit des Tabackrauchens am Tage sogar während des Receptirens, Untreue und Unsittlichkeiten dlicher Art übergehen, da diese wohl nur selten und nur ganz rohen, ungebildeten Individuen vorkommen dürften. Aber diese, so wie alle zuweilen noch bemerkte und seit einer Zeit leider sich wieder vermehrende Klagen in einem Untersuchen der Gehülfen gegen die Anordnungen der Vorgesetzten ihren Grund haben, so geben sie einen sprechenden Beweis an, daß auch unter den Apothekergehülfen einige gar sehr leicht sind, die Grenzen zu überschreiten, die ihnen ihre Stellung und insbesondere ihr Verhältniß zu ihren Principalen weist und daß auch sie gern der Zeit voraneilen und Rechte verletzen möchten, zu denen sie erst in der Zukunft gelangen können und sollen. Im Laufe dieser Darlegung und besonders am Anfange habe ich schon darauf hingewiesen, daß das Bestehen eines Ganzen ohne harmonische Mitwirkung aller einzelnen Theile unmöglich ist, ich wiederhole es hier nochmals, daß nur durch williges Fügen der Gehülfen in die bestehenden Verhältnisse, Aufrechterhaltung der Ordnung und die Erreichung des Zweckes, wozu dessen willen die Apotheken vorhanden sind, in ihnen möglich ist. Selten nur treten in geschäftsreichen Officinen große Städte die Fehler der Gehülfen hervor, da in ihnen der Apotheker von seinen Gehülfen mehr entfernt lebt und jedem Gehülfen gewöhnlich ein bestimmter Kreis von Geschäften angewiesen wird, darum mögen in ihnen auch wohl die Gehülfen besser gefallen, als in den geschäftssärmern Apotheken kleiner Städte, wo sie in eine weit nähere Berührung mit ihrem Principale treten und wo sie mit ihrer einen Kraft oft vielen Operationen dienen und also eine vielseitigere Thätigkeit entwickeln müssen; darum mögen aber auch wohl die häufiger vorkommenden Klagen der Apotheker in kleinen Städten über manche Gehülfen nicht ganz ungegründet sein, da eben die vielseitigere Betheiligung auch leichter zu Pflichtverletzungen Veranlassung giebt.

Wenn nun aber aus Allem, was hier angeführt ist, zu entnehmen sein dürfte, welche Eigenschaften ein guter Gehülfe besitzen muß, um des Namens eines solchen werth zu sein und hat in dem Bewußtsein treuer Pflichterfüllung den reichsten und schönsten Lohn zu empfangen, so darf ich gewiß mit vollem Rechte hinzufügen, daß auch die Principale stets geneigt werden, ihren Mitarbeitern mit Freundlichkeit und Liebe entgegen zu kommen und selbst milde Nachsicht auszuüben, wenn sie an ihren Gehülfen nur Güte des Herzens und das Bestreben, zu vervollkommen, wahrnehmen.

Und darum wende ich mich denn auch schließlic noch an Sie, meine werthen jüngeren Standesgenossen, die Sie diese

ich noch

Zeilen vielleicht lesen und in denselben die Absicht, Ihnen zu nützen, erkennen, ja ich wende mich an Sie, meine theuren Collegen, die Sie dem Gehülfenstande noch angehören, mit der Bitte, durch Erfüllung Ihrer Pflichten nicht nur, sondern auch durch Uebung jeglicher Tugend und durch Ausdehnung der guten, den Apotheker zierenden Eigenschaften über den gewöhnlichen Geschäftskreis weit hinaus sich selbst das Leben annehm zu machen, den Dank und die Liebe ihrer Principale zu erwerben, die Ihnen oft nützlich sein können und durch ihr wahrhaft edles Betragen einen Stand zu erheben, dessen höhere Würdigung herbeizuführen auch Ihnen am Herzen liegen muß.

### 3) Gelehrte Gesellschaften und Anstalten.

#### Akademie der Wissenschaften in Berlin.

Gesammtsitzung am 13. Febr. Kunth: Bemerkungen über die Familie der Aroideen. — Gesamtsitzung am 27. Febr. Ritter: Schluss seiner Abhandlung über die Verbreitung des Zuckerrohrs.

#### Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin.

Sitzung am 21. April. Ehrenberg: Ueber wirkliche Kieselchenbildung bei kieselchaligen Galionellen, und über krustenförmige und bergmehlartige Ablagerungen am Neuchateller See, durch Conserven und Infusorien gebildet, nach Mittheilung von Agassiz so wie über den kürzlich in Paris zur Sprache gekommenen grünen Schnee, welcher leicht nur der Jugendzustand des rothen Schneepflänzchens, *Spherula nivalis*, sein könnte. — Henle: Ueber eine eigenthümliche Art von Fasern, welche in vielen Geweben die primitiven Bündel spiral- oder ringförmig anordnen. So bilden sich die Fasern der innersten Haut der Gefäße durch Ablagerung von Streifen und Resorption der Interstitien aus einer einfachen Membran. Im Zellgewebe kommen an vielen Stellen Bündel vor, von Spiralfasern umwickelt, die sichtbar werden, wenn das Zellgewebe mittelst Essigsäure durchsichtig gemacht wird. Sie entstehen aus einzelnen Kernen, die zu Fasern verschmelzen; ähnliche laufen auch zwischen den Zellgewebebündeln und nähern sich, durch Verdickung und Neubildung, den elastischen Fasern, mit denen sie oft verwechselt werden. — Link: Ueber die Samenschläuche von *Lichen stictica* Achar., eine Lichenosa. Es sind wahre Samenschläuche und keine Infusorien; die Bewegungen sind aber thierisch, sie geschehen langsamer, schneller, fortschreitend nach einer bestimmten Richtung, entweder durch ein seitliches Zittern, oder ein Ueberschlagen der Länge. — Müller: Ueber die Nebentuben und Pseudobranchien der Störe.

#### Der naturwissenschaftliche Verein im Neustädter Kreise, Großherzogthum Weimar.

Der im Jahre 1837 auf Veranlassung des Apothekers G. zu Münchenbernsdorf gestiftete naturwissenschaftliche Verein im Neustädter Kreise feierte am 11. März l. J. in einer Versammlung

zu Münchenbernsdorf unter Vorsitz des Hrn. Geist dabei seinen Jahrestag. Nachdem der Secretair des Vereins, Hr. Prediger Meder, eine kurze Uebersicht der inneren und äußeren Angelegenheiten des Vereins mitgetheilt hatte, hielt nächst Hr. Geist einen Vortrag über den großen Einfluss, welchen die Naturwissenschaften auf das Leben üben. Hierauf folgte Hr. Landkammerrath Schorler seine practischen Erfahrungen über die zweckmäßigsten Methoden, Wiesen zu bewässern, so wie die Art und Weise, wie man auch ohne den gewöhnlichen Dünger (Mist) auf wohlfeile Art seine Felder und Gärten mit Vortheil düngen kann, mit. Nachdem noch mehrere interessante Vorträge gehalten worden, wurde in der allgemeinen Besprechung beschlossen, unsere Diplome nach denen des Gärtnervereins von Norddeutschland anfertigen zu lassen, so auch *Hora ruit* zum Wahlspruch unsers Vereins zu wählen. Am Schlusse der Verhandlungen wurde die nächste Versammlung auf den 17. Juni a. c. zu Großsebersdorf bestimmt. — Ein solches Mahl beschloß die Feier dieses Tages.

### Der botanische Garten in Kiew.

Der botanische Garten in Kiew, etwa 10 Meilen von London, nimmt ungefähr 15 engl. Meilen ein. Ein Theil ist der Kultur der Bäume und Sträucher gewidmet, der andere mit Treibhäusern, Gewächshäusern, Blumen, Rabatten und offenen Plätzen zur Aufnahme der Treibhauspflanzen im Sommer, bedeckt. Das Palmenhaus, 60 Fufs lang, hat neuholländische und Cappflanzen, ein anderes, 40 Fufs lang, hat neuholländische und Cappflanzen, ein drittes, das Botanibayhaus, 110 Fufs lang, ist reich an neuholländischen und anderen Prachtgewächsen; diese Pflanzen werden besonders sorgfältig cultivirt. Bei dem jetzigen mangelhaften Verwaltungssystem ist der Garten ohne den Einfluss auf die Wissenschaft, den er haben könnte; sein wesentlicher Vortheil ist der eines angenehmen Spazierganges für das Publicum, und er dient den Gewächshäusern zu Windsor und den übrigen Palästen an Hoffesten Blumen und Pflanzen liefert. Er war ursprünglich auf Kosten der königl. Familie angelegt, und wird jetzt zu königl. Besitztungen gerechnet. Die Reparaturen, Baukosten u. s. w. werden von dem Dep. der Forsten und Wälder getragen, sie beliefen sich in 4 Jahren auf 7941 Pfd. 13 sh. Prof. Rodley hat vorgeschlagen, den Garten zu Nationalzwecken zu benutzen, was zweckmäßig wäre, da in der Nähe von London kein bedeutender bot. Garten vorhanden ist. Durch Hinzufügung der 10 engl. Morgen von den benachbarten Lustgärten könnte man den bot. Garten von Kiew zum Mittelpunkt aller bot. Studien in Großbritannien machen, und zur unmittelbaren Controle über die Gärten in den Colonien, namentlich in Calcutta, Bombay, Saharunpur, Isle de France und Trinidad, die jährlich viele Tausend Pfd. kosten, während ihr Nutzen durch den Mangel eines festen Systems vermindert wird. Die ersten Kosten zur Gründung eines solchen Instituts würden, nach L., etwa 20,000 Pfd., die jährlichen 400 Pfd. betragen.



#### 4) Personalnotizen.

Am 28. April starb Robiquet, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Pariser Akademie der Medicin, einer der ausgezeichnetsten Chemiker der neuern Zeit, der um Vervollkommnung der Pharmacie und die pharmaceutische Wissenschaft in Paris die größten Verdienste sich erworben, an einer Entzündung.

Hr. Dr. Schimper wird, im Auftrage des Kronprinzen von Baiern, eine geognostische Reise durch Baiern unternehmen.

Die Herren Professoren Dr. Büniger, Dr. Ulmann und Dr. Wenderoth in Marburg sind zu Geheimen Medicinalrath ernannt worden.

Hr. Geh. Medicinalrath Dr. Caspar und Hr. Dr. Ehrberg, bisher außerordentliche Professoren, sind zu ordentlichen Professoren der med. Fakultät in Berlin ernannt worden.

Se. Majestät der König von Preussen haben dem Prof. Freiherrn v. Berzelius den rothen Adlerorden 2r Klasse mit Eichenlaub zu verleihen geruht.

Hr. Professor Dr. Schönlein ist von der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu Petersburg zum Mitgliede erwählt worden.

Hr. Regierungs- und Medicinalrath Dr. Niemann in Petersburg ist zum Geh. Medicinalrathe ernannt worden.

Die Herren Professoren Paolo Savi und Pietro in Pisa, Prof. Visconi in Padua, Prof. Orsini in Ascoli, Dr. Werneck in Salzburg, Dr. Focke in Bremen und Medicinalrath Dr. Siebold in Danzig sind zu auswärtigen Mitgliedern der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin erwählt worden.

Die Akademie der Wissenschaften in Paris hat den besten Geologen Leopold von Buch zu ihrem auswärtigen Mitgliede erwählt, an die Stelle Blumenbach's. Sie hat in einem der Begründer der neuern Geologie, der am meisten zu beigetragen, derselben die Strenge und den Character der Wissenschaft zu geben, dem Nachfolger Werner's, dem Entdecker der canarischen Piks und der Tiefen des Harzes, und vieler anderer Gebirge, dem Freunde Alexander's von Humboldt, das gebührende Verdienst erweisen wollen.

Hr. Poisson, einer der ausgezeichnetsten Gelehrten Frankreichs, berühmt als Mathematiker und Physiker, ist zu St. Petersburg im Alter von 58 Jahren gestorben. Er war Pair von Frankreich, Präsident der Akademie der Wissenschaften, Professor der Mechanik, Mitglied des Längenbüreaus, Examiner der Aspiranten der polytechnischen und Artillerieschule, Mitglied der meisten gelehrten Gesellschaften Europas, Commandeur der Ehrenlegion u. s. w.

Hr. Dr. Bergemann in Bonn ist zum ordentlichen Professor an der philosophischen Fakultät zu Bonn ernannt worden.

Hr. Geheimerath Bessel, Director der Sternwarte in Königsberg, ist zum auswärtigen Mitgliede der Akademie der Wissenschaften in Paris erwählt worden.

Hr. Dr. Fricke und Hr. Dr. Simon in Hamburg sind zu Mitgliedern der Gesellschaft russischer Aerzte in St. Petersburg erwählt worden.

## Zweite Abtheilung.

**C h e m i e.**

## Der den Einfluß des Kalks bei der Darstellung des Zuckers;

von

*J. H. F. Lohmann.*

Einer der ausgezeichnetsten unter den neuern französischen Chemikern, Eugène Peligot, schließt die Beschreibung seiner mit Zuckerrohr aus Martinique unternommenen Versuche \*) mit folgenden Worten: Unachtet des Interesses, welches die Eigenschaften der verschiedenen Zuckerarten darbieten, sind bis auf den heutigen Tag diese Eigenschaften nur sehr unvollkommen bekannt. Und doch haben die Umstände, unter denen diese Körper sich vorfinden, sich erzeugen und verändern, ihr reichliches Vorkommen im Pflanzenreich, ihre commercielle Wichtigkeit, endlich die Schwierigkeiten, welche ihre Bereitung darbietet, sie lange Zeit unter die Zahl der wichtigsten Substanzen gerechnet, welche das Studium der organischen Körper verdient. Man muß sich wundern, daß die Chemiker diese Substanzen so sehr vernachlässigt haben und daß ihre Geschichte nicht eben so genau, wie die so vieler anderer, bekannt ist, welche in jeder Hinsicht geringeres Interesse verdienen und doch weit genauer untersucht worden. Die Richtigkeit dieser Bemerkungen leuchtet vollkommen ein, wenn erwogen wird, daß die Fabrikation des Zuckers bis vor etwa 30 Jahren nur eine außerpäische war, betrieben von Negern und an wissenschaftlicher Bildung ihnen wohl nicht sehr überlegenen Sklaven aus Europa, die darauf sich zu beschränken hatten, in dem einmal eingeführten Betriebsgange zu arbeiten, daß mithin diese Fabrikation, in mehrerer Hinsicht, die wichtigste unter allen, ausgeschlossen war

von dem Kreise der wissenschaftlichen Thätigkeit, w von Europa ohne Zweifel der Mittelpunkt ist. Nur Betreff der mechanischen Vorrichtungen, das Rohr stker auszupressen um mehr an Saft zu erhalten, oder um an Brennmaterial zu ersparen, die Darstellung des Zuckers zu beschleunigen, die Fabrikation zu erleichtern, überhaupt um an Betriebskosten zu gewinnen, forschte man von Zeit zu Zeit nach Verbesserung allein was den chemischen Theil anlangt, wie der Saft am vortheilhaftesten zu klären, wie dessen Färbung zu verhüten, oder, wenn entstanden, auf leichte Weise den Nachtheil hinwegzunehmen, wie die Zuckergehalte zu reine Ausbeute unzersetzt gewonnen, Producte von geringem, fast nutzlosem Werth, hervorgebracht zu werden durch die Kraft fortgehender Vegetation im Zuckerrohr, theils durch electrochemische Einwirkungen, durch große Hitze, entstandene Gährung, oder auch durch zweckwidrige Bearbeitung, vermieden, oder, einmal vorhanden, brauchbar gemacht werden könnten, überhaupt wie die Darstellung des Zuckers anzusehen, ob Edelsack oder Product und welche Theorie dabei zum Grunde liege, um der Praxis leitend vorzuleuchten — das war meist weniger Gegenstand der Untersuchung. Erst durch Marggraf's herrliche Entdeckung, um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, daß auch Continentalgewächse vornämlich die Runkelrübe, krystallisirbaren Zucker zu zeugen, hervorgegangen aus den Resultaten chemischer Versuche und durch Acharn's Streben, am Ende des 18ten Jahrhunderts, diese Entdeckung ins Leben einzuführen wurde der Werth der Wissenschaft erkannt und es wurde bemüht, die Fabrikation dadurch zu gründen und zu unterstützen.

So groß die Verdienste Acharn's um die Runkelrübenzucker-Fabrikation sind, so ist doch zu bedauern, daß er den von dem Entdecker eingeschlagenen Weg nicht verfolgte, und, wie dieser, nicht Weingeist anzuwenden versuchte, da, wie auch in neuerer Zeit vorgeschlagen worden, die Zuckerfabrikation aus Rüben mit dem Branntwein



inbrennen leicht sich vereinigen ließe und beides in  
ser Vereinigung nur gewinnen könnte, wenn der ab-  
ende Lutter in mit Rübenscheiben oder mit Rüben-  
gefüllte Fässer, statt der Kühlfässer, geleitet, nach  
ndigung der Destillation die Masse ausgepresst, die  
ssigkeit auf der Weinblase abgezogen, der Rückstand  
r auf Zucker weiter bearbeitet würde — ein Verfah-  
, wodurch die Brennereien ihr Bestehen sichern könn-  
was durch die Mäfsigkeitsvereine und die immer  
r sichtbaren schädlichen Folgen des Branntweins ge-  
det ist, und was dazu dienen könnte, einen reinen  
arzneilichen Gebrauch tauglichen Weingeist zu ge-  
men, ja, was selbst hinsichtlich der Branntweinpro-  
tion nur vortheilhaft sein könnte, insofern die ausge-  
ste von Zuckerstoff nicht ganz entleerte Rübenmasse  
Gährungsmaischnen zugesetzt würde.

Achard hatte über die Beschaffenheit des Zucker-  
der Runkelrüben eine eigene Ansicht. Er bemerkt\*):  
Zucker im Saft der Runkelrüben ist zur Krystal-  
tion sehr geneigt, dessen Abscheidung durch Kry-  
lisation würde daher schon dadurch bewirkt werden  
nen, daß man dem Saft durch zweckmäßige Ein-  
kung so viel Wasser entzöge, daß der darin enthal-  
e Zucker wegen Mangel an Auflösungsmittel davon  
trennte. Weil man aber durch bloße Entziehung  
Wassers nicht allein die Zuckertheile, sondern auch  
im Runkelrübensafte sonst noch vorhandenen Stoffe  
aneinander bringen würde, so könnte dies nicht  
lers als die Annäherung der Zuckertheile erschweren  
den Zucker verunreinigen. Es muß daher erst eine  
ennung des Fremdartigen statt finden, welche Opera-  
n die Klärung zu nennen. Zu den im Runkel-  
bensafte enthaltenen Stoffen, die der vortheilhaften  
cheidung des Zuckers am meisten im Wege stehen,  
hört der Eiweißstoff. Aus dessen Gerinnbarkeit bei  
em gewissen Grade der Hitze scheint zu folgen, daß

\*) Deussen europäische Zuckerfabrikation, S. 110.

durch Erhitzung des Saftes bis zum Kochen schied die Abscheidung geschehen müsse, auch findet dies theils statt; allein die Gerinnung erfolgt in so kleinen Flocken, daß die Absonderung auf einem im technischen vortheilhaften Wege nicht möglich ist. Die Abscheidung des Eiweißstoff vollkommen und in größern Massen, ist nur durch zweckdienliche Zusätze zu bewerkstelligen, wobei jedoch diejenigen zu verwerfen, die den Zucker selbst eine dessen Mischung verändernde Wirkung haben. Aus diesem Grunde schloß sich A. Kalk und die Laugen alkalischer Stoffe ganz aus.

Durch angestellte Versuche hatte A. von der Unsetzbarkeit des Zuckers durch Kalk sich überzeugt. Erfolgte solche in dem Verhältnisse von 1 Th. Zucker zu 5 Th. Kalk, wie 1 : 50 und 1 : 100. Je mehr Zucker, desto mehr Kalk. Eine Mischung erhielt einen Zusatz von  $2\frac{1}{2}$  Pfd. Wasser, blieb eine Nacht hindurch stehen, wurde dann eine Stunde gekocht, mit Milch geklärt und filtrirt. Vollkommen durchsichtigen Flüssigkeiten zeigten sich durch den Geschmack, als durch die mittelst Oxidation Schwefelsäure und Kohlensäure erhaltenen Niederungen Kalkgehalt. Hierdurch wurde A. nun bei der Suche nach einem andern das Gerinnen bewirkenden Stoffe stehen geblieben, was die Anwendung der Schwefelsäure zur Klärung hatte. Obgleich nun dadurch der Saft geklärt wurde, so gelang die Krystallisirung des Zuckers, nachdem die Säure durch Kreide hinweggenommen worden, doch nicht. Den Grund suchte A. in der dadurch enthaltenen Kohlensäure, die theils mit dem Saft sich vermischt, größtentheils aber in Gestalt darin mehr aufsteigender kleiner Blasen schwebend erhalten werde. Es sei nöthig, solche zu binden, wozu der gebrannte Kalk das beste Mittel sei, da solcher strebe, die durch das Kochen verlorne Kohlensäure, sich wieder anzueignen. Nun aber, wie A. ferner annahm, der gewöhnliche Kalk wegen Unreinheit dazu nicht taue, so müsse gebrannte Kreide angewandt werden, weshalb A. das Brennen der Kreide selbst unternahm. Hier fand sich nun, daß



so viel dem Saft zugesetzt wurde, als nöthig, die durch das Glühen entbundene Kohlensäure wieder aufnehmen, doch nur schwierig die Krystallisation des Zuckers erfolgte, was nach A. durch den Salmiak verursacht werde, der fast immer im Saft der Runkelrüben vorhanden, weshalb nun solchen zu zersetzen, eine angemessene Menge von gebrannter Kreide noch über der Absorption erforderlichen zuzusetzen nöthig sei.

Wie mangelhaft diese Theorie auch erscheint und beachtend es ist, daß die durch Schwefelsäure bewirkte Zersetzung nicht bloß den sich abscheidenden Eiweißstoff, sondern den Saft in seiner ganzen Mischung treffend und eben so zersetzend auf den Zuckerstoff wirken, als auf das, was schon im Aeußern dadurch sich verändert zeigt, so ist Achard's Verfahren doch fast allgemein nachgeahmt worden und noch vor wenig Jahren wurde in einer der bedeutendsten Fabriken Frankreichs noch gearbeitet und auch in den Runkelrübenzuckerwerken, die in Böhmen entstanden, wird es befolgt. Es wird es je mehr und mehr verlassen, als man sich überzeugt, daß bloß durch Kalk die Klärung vollständig bewirkt werden könne. Aber eben diese Ueberzeugung hat nun zu der Meinung geführt, daß es besser eher zu viel, als zu wenig Kalk zu nehmen, wozu Brunfaut unstreitig beigetragen, indem er bemerkt\*): „daß der Kalk das Mittel ist, die fremdartigen Theile abzuscheiden, so muß man, da es bisher nicht möglich war, das Verhältniß davon mit Genauigkeit zu bestimmen, bis zu einem kleinen Ueberschusse sich vornehmen.“ Man ist daher in Frankreich dahin gekommen, daß man bis zu 21 Grammen auf das Liter Saft Kalk zusetzt. Auch in Deutschland ist man, nach der Entbehrlichkeit der Schwefelsäure eingesehen, die Sorgfalt, womit Achard die Anwendung gewöhnlichen Kalks vermied, als unnöthig erkannt worden, zu dem andern Extrem übergegangen, so daß

z. B. nach Hermbstädt \*) 96, 150 — 200 Gran Kalk auf das Berliner Quart Saft genommen werden sollen. Diesen Angaben lag das Verfahren zum Grunde, was bei der in den Jahren 1813 bis 1817 von dem verstorbenen Nathusius unternommenen Fabrikation beobachtet wurde. Auf 100 Quart frisch gepressten Runkelrübensaft nahm man  $1\frac{1}{4}$  Pfd. Kalk, mithin 96 Gran auf 1 Quart; alles obwohl sehr schöner Zucker erhalten wurde, der bis zu dem höchsten Läuterungsgrade, bis zur feinsten Raffinade, gebracht werden konnte, so entsprachen die gewonnenen Mengen weder den aus den Analysen erhaltenen Resultaten, noch befriedigten alle übrigen bei der Fabrikation sich ergebenden Erscheinungen. Vorzüglich war der Dunst unausstehlich, den nach dem Klären der kochende Masse ausstiefs, worin die Gegenwart von Ammoniak deutlich zu erkennen war. Eben so mußte die vom Rohzucker abfließende Melasse als Versäuerungsmittel als unbrauchbar erkannt werden und nur, nachdem sie verdünnt, mit so viel Schwefelsäure versetzt wurde, daß das anfangs stark braun gefärbte Kurkumapulver unverändert blieb, liefs sich die wieder eingedickte Bodensatz abgesonderte Flüssigkeit zu einigen Species als Syrup gebrauchen. In Frankreich hat man die Melasse zeither nur als Viehfutter benutzen können, welche Erfahrung, verbunden mit jener von den nur zu erzielenden geringen Ausbeuten an Zucker, was den Untersuchungen über offnem Feuer und dadurch erfolglosen Zersetzungen zugeschrieben und wodurch höchst kostspielige Dampf- und Luftapparate veranlaßt worden, zwei gelehrte Gesellschaften, die *Société d'encouragement* und die *Société d'agriculture*, veranlaßt haben, Preise auszusetzen: »Wie eine zweckmässigere Behandlung, zumal im Grofsen, erlangt werden könne?« »Wie der gröstmögliche Ertrag und die möglichste Güte des Products durch Einfachheit des Verfahrens zu erreichen sei?« Auch in Deutschland macht man fortwährend

\*) Gehlen, Journ. für Chem. u. Phys. Bd. 8. S. 605.

iche ungünstige Erfahrungen. So enthielt das *Archiv Pharmacie* im *Augusthefte* 1839 aus den schlesischen Anzialsblättern folgende Nachricht: »Der Werth des Melrübenroh-zuckers ist durchschnittlich 15 Thlr. für Centner. Es ist eine leicht verkäufliche Waare; daher wird es dagegen, die Melasse zu verwerthen möchte es zu den schwierigsten, doch gewiß sehr werthen Ermittlungen gehören, diesem Theil des Geschäfts einen ergiebigen Abzugsweg zu ermitteln.« Gleich man nun, was sowohl von Achard, als von Berzelius, vor und nach ihm, über die Verbindungsfähigkeit des Zuckers mit Kalk beobachtet worden und was über die Oxydabilität des Zuckers und der Basicität des Kalks von selbst sich zu ergeben scheint, eine Eigenschaft, die mächtiger wirken muß, wo sie, wie beim Melrübenzuckerstoffhaltiger Säfte, noch durch andere Kräfte unterstützt wird — so kann kein Zweifel sein, daß die besten Erfolge durch gegenseitige Anziehung der in der Mischung tretenden Stoffe veranlaßt werden. Schon Berzelius nahm wahr\*), wenn Zucker mit Kalk eine Zeit mit Wasser in Berührung sich befindet, eine Verbindung entstehe, woraus Weingeist weiße Flocken ausschlägt, die verdunstet, eine halbdurchsichtige Substanz zurückläßt, die zäher als der dickste Syrup, von rauhen, bitteren, etwas süßlichem Geschmack sei. Berzelius, welcher fand\*\*), daß der nach England kommende Rohzucker vielen Kalk enthalte, daß, nach dem Waschen des Zuckers, derselbe bald hart und krystallinisch, wie graues Mehl und teigartig sei, daß letzterer, welcher Zucker genannt, beim Raffiniren verworfen wird und starker Zucker mit der Zeit in schwachen Zucker sich verwandle, oder, in der Sprache der Zuckererzeuger, salziger werde, was, nach D. davon abzuleiten, daß der Kalk in den kohlensauren Zustand übergeht — Versuche an, theils, welche Veränderungen schon

Chemischer, Journal, 1. Bd. S. 367. 3. Bd. S. 289.

Prommsdorff, Journal, 4. Bds. 1. St.

durch die Zeit und bei gewöhnlicher Temperatur vor gehen, wenn Zucker mit Kalk in Mischung gesetzt werden, theils, was bei höhern Wärmegraden geschieht. Hier fand D., daß, wenn man 1000 Zucker, 600 Kalk und 1500 Wasser eine halbe Stunde kocht, man die Flüssigkeit erhalte von 16,5 Kalk und 33,2 Zucker, die mit der Zeit diese Auflösung sich aber so verändert, daß nach Verlauf eines Jahrs nur noch kohlenwasserhaltiger Kalk und Schleim gefunden werde. Bei ruhigem Stehen bilden sich kleine sehr spitze Rhomboedern, die die Auflösung nimmt die Beschaffenheit einer Gallerte an, geschmacklos, teigartig und in kochendem Wasser sich auflöst. Ähnliches beobachtete Becquerel in ganz verstopfter Luft abgesperrten Gefäßen \*), um die von Pelouze und Andern aufgestellte Ansicht zu widerlegen, als ob die Kohlensäure der Atmosphäre das von Davy niell Wahrgenommene. Pelouze und mit ihm Mellin laguti, Bouchardat und Andere behaupten \*\*), habe mit unreinem Zucker gearbeitet. Anders verhält sich der Krümelzucker, Trauben-, Frucht-, Honig- und Stärkezucker, welcher durch Kalkwasser in braunem und krystallisirbaren bittern Syrup, später in Ulmin umgewandelt werde, was durch Wasserentziehung geschehe und wieder anders Rohrzucker, der sein Wasser fester halte, beim Erwärmen in unkristallisirbaren Syrup und endlich in Krümelzucker sich verwandelt. Melasse entstehe aus dem Zucker dadurch, daß die Lösung mit Kalkwasser längere Zeit der Wärme ausgesetzt werde, sie bestehe aus unverändertem Zucker, Krümelzucker und Syrup. Auf das Ansehn dieser Chemiker fanden sich die Fabrikanten bewogen, die Siedungen auf offenem Feuer einzustellen und sich der Dampfvorrichtungen und luftverdünnter Räume zu bedienen, da, wie nur zu wahrscheinlich, die ungünstigen Resultate, die sie bei den Apparaten auf offenem Feuer erhielten.

\*) Froriep, Notizen, 1832. S. 668.

\*\*) Polytechn. Centralblatt, 1836. No. 2.

doch nur dem bei der Klärung im Uebermaasse zuzutenden Kalke zuzuschreiben waren.

Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes haben mehrere mikroskopiker denselben in neuerer Zeit wieder aufgenommen. So stellte Braconnot \*) ein Kalksacharat in fester Form dar, von weißer zäher Beschaffenheit, das fast in einem Stück mittelst einer Glasröhre aus dem Glase gewonnen werden konnte, worin es sich aus einer mit Kalk gesättigten Zuckerlösung gebildet hatte. Salpetersäure zerlegte es mit Aufbrausen auf und es ergab sich, daß die Substanz kohlensauren Kalk enthielt. Außerdem fand man bei dieser durch Kalk geschehenen Entmischung des Zuckers: Kohlensäure, Oxalsäure, Essigsäure, Aepfel- und unkrystallisirbaren Zucker. Weiter noch hat Braconnot in den obengedachten Versuchen diesen Gegenstand verfolgt. Das in einer wässrigen Zuckerauflösung mit gelöschtem Kalk entstandene Sacharat zeigte sich trocknet farblos, brüchig, harzförmig; es enthielt 14 % Zuckerbasis. Bei gewöhnlicher Temperatur war dies Salz in sehr großer Menge in Wasser löslich; erhitzte man es, so wurde die klare und durchsichtige Auflösung, so sah man sie anfangs opalescirend werden, allmählig gerinnen, nachher sich in eine undurchsichtige Masse umwandeln. Gelöst durch Wärme, wurde die Flüssigkeit beim Abkühlen wieder durchsichtig. Wurde die alkalische Lösung des Zuckers einige Zeit sich selbst überlassen, so wurden ihre ätzenden Eigenschaften nach und nach schwächer, nach Verlauf eines Monats liefs sich kein Alkali, das sich anfangs verhielt, als wenn es freie Base und das folglich mittelst Kohlensäure abgeschieden werden konnte, nicht mehr durch einen Strom dieses Gases fallen. Bediente man sich zur Entfernung des Zuckers der Oxalsäure, aber nicht im Ueberschufs, so erhielt man eine Flüssigkeit, die auf Lackmuspapier stark alkalisch reagiert; der angewandte Zucker war zerstört und die Elemente erzeugten eine kräftige Säure, welche

Archiv der Pharmacie, 2. R. Bd. 17. H. 2.

Arch. d. Pharm. II. Reihe. XXIII. Bds. 2. Hft.



das Alkali völlig sättigte. »Hinsichtlich dieser Eigenschaften,« bemerkt P. ferner, »läßt sich die Frage aufwerfen, ob dieselben nicht einigen Einfluß auf die Zuckerfabrikation aus Runkelrüben äussern. Da bekanntlich der Kalk bei der Klärung in einem Maasse angewandt wird, daß der Saft fast immer sich alkalisch zeigt, so ist es wahrscheinlich, daß der darin befindliche Zucker sich wenigstens zum Theil mit dem angewandten Kalk verbindet.« Was P. hier als Vermuthung ausspricht, das wurde während der vor etwa 24 Jahren in Altdamdensleben betriebenen Fabrikation fast bis zur Gewissheit gebracht und dabei ein Verfahren zur Klärung des Safts ausgemittelt, wodurch die zerstörende Wirkung des Kalks beseitigt wurde, ohne daß dem nothwendigen und unentbehrlichen Einflusse desselben Eintrag geschah. Die obengedachten ungünstigen Erscheinungen machten ein solches höchst wünschenswerth; doch suchte man lange darnach vergebens, bis endlich ein Zufall, ein aus England kommender Reisender, welcher berichtete, daß in den englischen Zuckerraffinerieen statt des Kalks eine Mischung von diesem mit Alaun gebraucht werde, das auf leitete. Obwohl der Zweck des Raffinirens ein anderer ist, als der des Fabricirens, da jenes mehr die Entfärben, dieses aber das Entstehen des Zuckers zur Aufgabe hat, so wurde die gedachte Mischung aus Kalk und Alaun doch sofort zum Klären des rohen Safts versucht und wenn auch der Erfolg der Erwartung nicht völlig entsprach, da wohl ein Niederschlagen des Saft Trübenden und Wasserhelle, nicht aber jene Durchsichtigkeit und Weinfarbe erfolgte, was der Kalk bewirkt, auch beim Versieden eines so geklärten Safts Zucker nicht erhalten wurde, so munterten die gelungenen Erfolge doch zur Fortsetzung der Versuche auf und ließen jene Mischung wenigstens als zweckmäßiges Zuckermittel erkennen und was auch theilweise den Kalk

\*) Ueber den gegenwärtigen Zustand der Zuckerfabrikation in Deutschland. Magdeburg, 1818.

etze. Eine Reihe dieserhalb angestellter Versuche ergab, daß ohne Kalk Zucker nicht dargestellt werden konnte und daß solcher auch nicht bloß zur Entsäuerung diene, da Aetznatron wohl die Säure des rohen Zuckers hinwegnahm, zur Zuckerdarstellung aber untauglich sich erwies. Auch zeigten diese Versuche, daß es eine Mischung von Kalk und Alaun, woraus ein mit Aetznatron vermengter schwefelsaurer Kalk sich bildet, bedürfe, sondern daß roher sowohl als gebrannter natürlicher Gyps deren Stelle vollkommen ersetze, dessen Anwendung ein in der Nähe befindlicher mit einem Gypsbrennerei verbundener Gypsbruch Gelegenheit gab. Bei solchen mit Gypsmehl bewirkten Vorklärungen, worauf der bis zur entstehenden Weinfarbe erforderliche Zusatz von Kalk erfolgte, verschwand gänzlich der flüchtige mephitische Dunst beim Verkochen des Zuckers, derselbe klärte sich schnell und — was das Wichtigste war — krystallisirte fast durchaus. Diese Erscheinung war am vollkommensten bei einem Verhältniß von 10 Gran Kalk und 60 Gran Gyps auf 1 Quart Saft, wobei eine nur ganz geringe Menge Melasse ablief, die in Bezug auf den Geschmack dem beim Raffiniren zu gewinnenden reinen Syrup gleichzustellen war. Noch ergab sich ein anderes merkwürdiges Resultat. Als nämlich die Versuche dahin fortgesetzt wurden, daß immer weniger Kalk auf 1 Quart Saft genommen wurde, wobei das Verhältniß von Gyps dasselbe blieb, so erfolgte das Krystallisiren des Zuckers langsamer, obgleich in größern kandisartigen Krystallen, die Melasse wurde dagegen immer süßer und reiner, und als das Verhältniß des Kalks so vermindert wurde, daß der Zusatz von Kalk nur 15 Gran über der zur Sättigung des rohen Zuckers erforderlichen Menge, mithin 30 Gran auf 1 Quart Saft betrug, so konnte die zur Syrupsdicke gedampfte Saftmasse als Syrup verkauft werden, der wegen seiner intensiven höchst reinen Süße reichlich Absatz fand. Leider gestatteten die Umstände, die zur Beendigung der Fabrikation drängten, es nicht, die in

Betreff der Zuckerproduction angestellten Versuche im Großen zu wiederholen; doch aber war es noch möglich, jene letztern die Syrupserzeugung bezweckenden durch fabrikmässige Ausführung zu bestätigen und solche durch genaue Berechnung zu beweisen \*). Nach diesem Calcul wurden von 300 Centner Rüben beim Reiben und Pressen 120 Ct. an Abfall erhalten, wirklich verarbeitet wurden daher nur 180 Ct. Hiervon wurden 29 Ct. Syrup gewonnen, wovon der Ct. auf 4 Thlr. 13 Ggr. 5 Pf. zu stehen kam, für 10 Thlr. aber verkauft werden konnte und der solchen Beifall fand, daß vermehrte Nachfragen nicht zu befriedigen waren. Nach der aufgestellten Berechnung ergab sich aus der Verarbeitung von 180 Ct. Rüben ein Gewinn von 157 Thlr. 19 Ggr., der in einer Woche, vom 17. Nov. bis 22. Nov. 1817 erzielt wurde. Für den Abfall kamen 15 Thlr. in Rechnung. Gewiss ist es zu bedauern, daß diese Erfahrungen nicht sehr bekannt geworden, um unter veränderten Umständen nachgeprüft werden zu können. Ohne Zweifel ist daran Schuld, daß bald nach dem Erscheinen der Schrift, worin sie mitgetheilt wurden, die Rübenzuckerfabrikation für Deutschland entschlimmerte, indem sie nach aufgehobener Continentsperre durch das Eindringen des indischen Zuckers zu immer niedrigeren Preisen, als unnöthig, wenigstens als enthehrlich erschien. Irgend ein Impuls von Aussen hat sie im laufenden Jahrzehend wieder in Anregung gebracht, wozu jene Anpreisungen Arnold's und Hanewald's in Verbindung mit Dr. Zier unstreitig viel beigetragen haben. Ob Letzterer sie benutzt hat, als er (mit seinem Associé) seiner unschätzbaren Erfindung wegen der größte Wohlthäter des Menschengeschlechts genannt wurde, ist nicht wohl zu ermitteln, da sie nur gegen 100 Louisd'or zu erkaufen war. Daß er sie gekannt ist gewiss, wenn es mit seiner Erklärung in seinem Beitrag zur Geschichte der Verbreitung und Vervollkommen-

\*) a. a. O. S. 60.

ng der R. Z. F. in Deutschland,« ernstlich gemeint  
resen, worin er sagt: »Nach möglichst genauer lite-  
ischer Bekanntschaft mit dem, was bereits geleistet,  
ndem daraus das Bessere aufgesucht worden, war zu  
ersuchen, ob es für Deutschland passe. So mühevoll  
d kostspielig dieser Weg auch erschien, so blieb doch  
eben er zunächst zu wählen; Alles Bekannte mußte  
erst geprüft werden, um, wo möglich, schon hier ein  
les Licht da und dort zu finden.« Sollte ihm bei  
em Aufsuchen nun nicht jenes, wenn auch nur schwa-  
Licht, entgegen gedämmert haben, das in jener in  
Magdeburg erschienenen Schrift aufgestellt war, da  
dem Wohnorte des Dr. Zier so nahe liegt?

Erst im Jahre 1835, als der Gewerbeverein im Kö-  
reich Hannover sich bildete und der verdienstvolle  
erbergcommissair Brandé in das Directorium gewählt  
rde, zeigte sich Gelegenheit, von den frühern Erfah-  
gen einigen Gebrauch zu machen, indem der Direc-  
Brandé in einem Privatschreiben darauf aufmerk-  
gemacht und demselben die Runkelrübenzuckerfa-  
kation als ein beachtenswerther Gegenstand des Ge-  
bvereins empfohlen wurde. Auch fand diese Erin-  
ung Eingang und man las bald in den öffentlichen  
tern und in den »Mittheilungen des G. V.« folgende  
chricht: »Nach Brandé wird der gepresste Runkel-  
ensaft auf 100 Quart mit  $1\frac{1}{4}$  Pfd. Gypsmehl angerührt,  
allmählig erhitzt, bis er zum gelinden Kochen kommt,  
man so lange unterhält, bis eine kleine Probe durch  
ockpapier filtrirt, eine völlig klare mehr oder weni-  
dunkle bouteillengrüne Flüssigkeit giebt. Ist dieser  
ct eingetreten, so wird das Feuer unter dem Kessel  
fernt, der an die Oberfläche gekommene Schaum mit-  
t eines Schaumlöffels abgenommen und der Saft durch  
lene Spitzbeutel gegossen, wonach er vollkommen  
erscheint. Der so mit Gyps behandelte Saft wird  
der in den gereinigten Kessel gebracht, auf 100 Quart  
Loth gelöschter Kalk zugesetzt, tüchtig umgerührt  
langsam wieder bis auf  $65 - 70^{\circ}$  R. erhitzt. Diese

Temperatur wird  $\frac{1}{4}$  Stunde lang erhalten und während der Zeit untersucht, ob ein auf einige Augenblicke in die Flüssigkeit getauchtes Kurkumäpapier so gebräunt wird, daß sich die braune Farbe merklich hält, in diesem Fall erscheint der filtrirte Saft weinhell und giebt ohne thierische Kohle und ohne ein Merkliches an Flüssigkeit zurückzulassen, verdunstet einen hellgelblichen Zucker.« Ueber diese Klärung äußert sich Dr. Otto auf folgende Weise\*): »Die Benutzung des Gypses als Läuterungsmittel ist eine allgemeine geworden und ich würde dieselbe ganz unerwähnt haben lassen können, wenn nicht wieder in der neuesten Zeit durch Brande der Gyps als ein sehr beachtungswerthes Läuterungsmittel empfohlen worden wäre.« Hier folgt nun das oben beschriebene Verfahren und Dr. O. setzt hinzu: »Ich wage keine feste Behauptung aufzustellen, wie der Gyps hier wirksam ist, ob z. B. die in dem Saft vorkommenden Kalisalze denselben theilweise zerlegen, oder ob, was mir am wahrscheinlichsten, die Wirkung rein mechanische ist, daß nämlich der pulverförmige Gyps die Partikeln des durch Erhitzen im geronnenen Zustande abgeschiedenen Eiweißes umhüllt und dadurch leichter abscheidbar macht. Aus dem Angeführten scheint die Wirkung vollkommen erklärlich, man würde nach meinem Erachten an die Stelle des Gypses mehrere andere Substanzen, z. B. gröblich pulverisirte Knochenkalk, Ziegelmehl, setzen können.« Diese Ansicht kann wohl nicht als die richtige angesehen werden. Ein in Wasser vollkommen löslicher Stoff, wie der Gyps, der leicht um aufgelöst zu werden, nach Bucholz 470 Theile Wasser fordert, kann nicht auf mechanische Weise wirken und dem ganz unauflöslichen Ziegelmehl gleichgestellt werden, sondern es müssen physisch-chemische Anziehungen und Verbindungen geschehen, daß die Wirkung erfolgt. Sehr wahrscheinlich ist diese dreifache

\*) Lehrbuch der rationellen Praxis der landwirthschaftlichen Gewerbe. Braunschweig 1838.



1) niederschlagend, insofern ein Aufgelöstes ein  
in Suspension Gehaltenes, wie die den Saft trüben-  
Theile, verdrängt, 2) zersetzend, in Betreff der ka-  
chen Salze, wofshalb nach Payen ein Tausendtheil  
Gyps zugesetzt werden soll, 3) aneignend, in  
ziehung auf den Kalk, damit eine basische Verbin-  
g zu vermitteln und den zerstörenden Einfluss auf  
Zucker zu verhüten, da anzunehmen, dass die Schwe-  
säure des Gypses wenigstens noch 12 der Basis auf-  
nehmen kann und welche Verbindung da entstehen muss,  
die einander anziehenden Körper in aufgelöstem  
stande sich befinden. Bis jetzt ist zwar ein basischer  
schwefelsaurer Kalk nicht bekannt, aber schon Scheele  
merkt \*), dass der Gyps noch mehr Kalk aufnehmen  
kann und nach der Theorie müssen die 58 Schwefel-  
säure, die nach Berzelius die 42 Kalk im wasserlee-  
schwefelsauren Kalk als Gyps darstellen, noch eben  
viel Kalk sättigen können, als, fast umgekehrt, die  
Schwefelsäure im Schwefelspath 65 Baryt neutralisi-  
t. Eben so ist anzunehmen, dass die Cohäsion meh-  
gleichartigen Theile gröfser sei, als die Anziehung  
gleichartiger, dass mithin der vom Gyps und vom  
Zuckerstoff gleichmäfsig angezogene Kalk in die Ver-  
bindung mit jenem eher eingehen werde, als mit diesem  
letzterm bei einem genauen Verfahren nicht mehr  
Aneignung überlassen könne, als die Cohärenz zu-  
re. Ist diese Theorie richtig, so bestätigt sich dadurch  
Ligot's Vermuthung, dass der in den rohen Säften  
enthaltene Zuckerstoff bei der Klärung mit Kalk damit  
Theil sich verbindet. Auch ergibt sich dies aus  
von P. späterhin angestellten Versuchen \*\*). Es hatte  
derselbe Zuckerrohrsaft verschafft, der auf Mar-  
que nach Appert's Methode bei 100° erhitzt und in  
der Luft abgeschlossenen Gefäfsen ihm gesandt wor-  
war. Dieser Vezou hatte filtrirt und verdampft, eine

\*) Dessen chemische Schriften, Bd. 2. S. 159.

\*\*) Erdmann-Marchand'sches Journal, 18. Bds. 3. H.

feste, harte, farblose Masse geliefert, die fast völlig reiner krystallisirter Zucker war. Man gelange, wie P. bemerkt, auf noch sicherern Wege zu demselben Ziele, wenn man die Flüssigkeit bei gewöhnlicher Temperatur unter der Luftpumpe verdampfe, wobei jedoch der sehr bemerkenswerthe Umstand eintrete, daß der sehr dicke Syrup, den man erhalte, keine krystallisirbare Substanz selbst nach einer sehr langen Zeit liefere. Das Hinzusetzen einer kleinen Menge Alkohol, um das vorhandene Eiweiß zu scheiden, scheine nothwendig, um die Krystallisation zu Stande zu bringen, welche dann auch in einigen Stunden vollendet sei. P. beschreibt die Beschaffenheit der Krystallisation nicht und es ist daher anzunehmen, daß sie noch nicht wirklicher Zucker gewesen, sondern, wie aus obiger Beschreibung der Eigenschaften sich ergibt, demselben sich nur genähert habe. Erst nach Behandlung mit Kalk erschien der Zucker und zwar beim Verdampfen über freiem Feuer in festem Zustande ohne die geringste Spur von Melasse. Die Asche des verbrannten Vezous enthielt schwefelsauren Kalk, den auch Proust bei seiner Untersuchung des Mallagaschen Zuckerrohrs fand und so scheint es, daß um zuckerstoffhaltige Säfte auf Zucker zu bearbeiten die Gegenwart von hydratischem und schwefelsaurem Kalk nöthig sei und daß, wo letzterer fehle, wie im Saft der Runkelrüben, welche nach Payen und Peligot Untersuchungen nichts davon enthalten, solcher in solchen Fällen bei der Bearbeitung zugesetzt werden müsse, was auf irgend eine Weise entweder durch Weingeist, oder durch das Trocknen der Runkelrüben und deren Ausziehung mit Wasser, nicht theilweise schon der Saft klar erhalten werden kann, man daher weniger in Gefahr ist, Kalk im Uebermaass anzuwenden.

Peligot's vorangeführte Arbeiten haben in Frankreich großes Aufsehen erregt und lobpreisende fast prählende Ankündigungen in den öffentlichen Blättern zur Folge gehabt \*). Nach ihnen hat ein junger Chemiker

\*) Hamburger Correspondent 1840, St. 32.

eligot, eine Entdeckung gemacht, die dem Rohrzucker in so entscheidendes Uebergewicht verspricht, daß an den Wettkampf des Rübenzuckers bald nicht mehr zu denken sein wird. Vor dem Appert'schen Verfahren merken sie, konnte man nie wohlerhaltenes Zuckerrohr nach Europa bringen. Vauquelin untersuchte bloß veränderte und ihres Zuckergehalts zum Theil beraubte Exemplare. Erst P. erhielt wohl erhaltenes Rohr und Syrup von Martinique und nachdem er es geprüft hatte, that er den Ausspruch, in jenem Rohr fanden sich mindestens  $18 \frac{0}{100}$  Zucker. Bisher zog man  $8 \frac{0}{100}$  daraus. Sobald daher die Colonien ein besseres Verfahren annehmen, ist den Rüben mit ihren  $6 - 10 \frac{0}{100}$ , die noch dazu nicht bloß mit Wasser, wie im Zuckerrohr, sondern mit allen möglichen Substanzen verbunden, also weit schwerer zu trennen sind, jedes Rivalisiren vollkommen unmöglich. Am 27. Januar berichteten Bénard und Pelouze der Akademie der Wissenschaften über diese Entdeckung. Ihr Ausspruch lautete durchaus günstig und der Handelsminister hat schon Befehl gegeben, daß man von allen Sorten des Zuckerrohrs Proben einsenden soll, um diese denselben Prüfungen zu unterwerfen.« Die hier in Beziehung auf den Rübenzucker geschehene wegwerfende Zusammenstellung mit dem Rohrzucker kann, genauer betrachtet, als in der Zeitungsnachricht versucht worden, keineswegs zum Nachtheil des erstern ausfallen, so daß man vor der Hand der Fortdauer des Wettkampfs mit letzterm ruhig entgegensehen kann. Was Vauquelin begegnete, der zum Theil zersetztes Zuckerrohr zu untersuchen hatte, das dürfte noch fernerhin vorkommen. Massey von diesem, wie sie in den Colonien gebaut werden, nach Appert zu isoliren und den äußern Einwirkungen zu entziehen, dürften Schwierigkeiten eigenthümlicher Art unterliegen, was selbst bei beschleunigtem Transport durch Dampfschiffe bei hohen atmosphärischen Breiten immer nur unvollkommen in Saftmischungen wird gelingen können, die alle Bedingungen, durch



Gährung zersetzt zu werden, enthalten, wie sich dies in P. Versuchen fand, in denen der Saft schon so weit entmischt war, daß er sich filtriren liefs, ohne daß derselbe gleichwohl krystallisirte. Unwahr ist es auch, wie jener Bericht sagt, daß der Zucker im Rohr bloß mit Wasser verbunden sei. Proust fand darin aufer schwefelsauren und salzsauren Kalk und Eiweißstoff, auch Gummi und Aepfelsäure, und Avequin, der die in Louisiana cultivirten Spielarten des Zuckerrohrs untersuchte, fügt den genannten Mischungstheilen auch harzige und fette Stoffe bei. Ferner ist der Gehalt an Zuckerstoff im Rohr keineswegs constant 18 %, sondern der Grad der Reife des Rohrs hat darauf einen so entscheidenden Einfluß, daß nach Du Trône der Saft von 5—10° Beaumé variirt und im Mittel nur 10 — 12 % Zucker erhalten werden. So viel geben bei sorgfältiger Behandlung auch die Runkelrüben und wenn deren Saft gemischterer Art ist, als der des Rohrs, so ist Zucker sowohl als Syrup doch vollkommen rein daraus darzustellen; die Mischungstheile werden theils durch Entziehung ihres Auflösungsmittels beim Verdampfen getrennt, theils werden sie durch die Klärung zersetzt und entweder niedergeschlagen oder verflüchtigt. Ein wesentlichen Vorzug hat die Rübenzuckerfabrikation vor der des Rohrs durch die Einfachheit, mit der sie betrieben werden kann, indem bei Anwendung feilenartiger Reiben, oder durch Zerschneiden in Scheiben der Saft bloß durch Handarbeit zu gewinnen ist, da das Rohr nur in Stampfmühlen sich auspressen läßt. Ebenfalls ist es wichtig, durch eigne Cultur das Material erzielen zu können, ohne eines kostspieligen Transports zu bedürfen. Uebrigens muß man gestehen, daß, wenn die Rübenzuckerfabrikation wie bisher fortbetrieben werden sollte, wenn sie Anlagen fordert, die 80,000 Franken kosten, wenn Filtrirapparate erfordert werden, um die durch Kalk geschehenen Färbungen zu entfernen, sowohl durch ihre zusammengesetzte Beschaffenheit, als durch den Aufwand an thierischer Kohle, die in ein-

im Verbrauch angemessenen Vorrath kaum anzuschaffen ist, die Betriebskosten sehr vermehren, daß in diesen Fällen diese Fabrikation gegen die des Rohrzuckers Nachtheil steht. Bei Befolgung des angegebenen Verfahrens, wobei alle jene Hindernisse beseitigt werden, währt sie aber die Bürgschaft eines sichern Gewinns, sofern Zoll- und Steuerverhältnisse nicht entgegenwirken, sondern vielmehr die Aufmunterung ihr geschenkt wird, die jedes Aufkeimende erfordert und der Gewinn sich noch vermehren, als man sich mehr für die Syrupfabrikation entscheidet, wodurch ein wohlfeileres und den Zucker fast in allen Fällen ersetzendes Süßungsmittel entsteht, das auch weit geringere Anforderungen fordert. Diese ist dann besonders von Vortheil, wenn durch Frost, oder durch in einem Rübenhaufen entstandene Gährung, bei warmer Witterung, der Saft zum Theil entmischt worden, wo selbst bei vergrößertem Zusatz von Kalk Zucker nur schwierig zu erlangen ist, wogegen Syrup leicht daraus erzielt werden kann, der jedoch, was merkwürdig ist, immer einen lakritzartigen Geschmack hat und deshalb weniger zur Versüßung von Speisen, als mehr zu einem (mummeartigen) Bier geeignet. Daß getrocknete und gedörrte Runkelrüben den besten Ersatzkaffee geben und das Eigenthümliche des Kaffees fast gar nicht verändern, dessen Farbe im Aufguss aber verbessern, ist bekannt. Es ist daher zu wünschen, daß die R. Z. F. fortan mit Eifer und überall da betrieben werden mag, wo das Gewächs gedeiht, um den vorhandenen durch Concurrenz nur zu überfüllten Nahrungszweigen einen neuen zuzugesellen, der die Hände vielseitig beschäftigen und die bedeutenden für den Zucker ins Ausland gehenden Summen für den inneren Verkehr erhalten und noch zu andern industriellen Unternehmungen führen kann.

---



# Bemerkungen über Kürbis- und Runkel- rübenzucker;

von

Dr. Bley.

## *Benutzung des Kürbis auf Zucker.*

**M**an hat in Ungarn angefangen, Zucker aus Kürbissen darzustellen und soll nach einigen Nachrichten gute Resultate erlangt haben. Um zu erfahren, wie die Ausbeute aus diesen Früchten bei uns ausfallen würde, liefs ich 33 Pfd. derselben, nachdem sie geschält und von den Kernen befreit waren, fein reiben, den Brei auspressen, noch mit einigen Pfunden heifsem Wasser übergießen, gut durchrühren, pressen, den Saft, 20 Pfd., mit Kalk läutern, wovon sehr wenig erforderlich war, den filtrirten Saft mit Thierkohle kochen, wiederum durch ein Filter geben und eindampfen. Man erhielt 1 Pfd. 9 Unz. einer honigdicken Masse von sehr süfsem und angenehmen Geschmack, dem des geläuterten Honigs ähnlich, der jedoch nur Spuren von krystallisirtem Zucker gab. Die Ausbeute an Zuckermasse betrug mithin 5,062 Proc., welche indess dem gröfsern Theile nach aus Schleimzucker bestand.

Bei einem andern Versuche, in welchem der Kürbisbrei mit Spiritus ausgezogen wurde, erhielt man etwas mehr Zucker, nämlich 6 Proc., dessen Gehalt an krystallisirtem Zucker aber nicht bedeutend gröfser war.

Ein dritter Versuch lieferte kaum 2 Proc. Zucker, da der benutzte Kürbis wenig Süfsigkeit zeigte, aber reich an Schleimgehalt war.

Hieraus ergiebt sich als Resultat, dafs die Benutzung des Kürbis auf Zuckergehalt (Syrup) für die Haushaltungen allerdings beachtenswerth sei, und vielleicht um so mehr, als der diesjährige kalte Sommer im Allgemeinen der Zuckerbildung nicht zuträglich gewesen sein dürfte, dafs man aber in unserm Klima auf die fabrikmässige Auscheidung des krystallisirten Zuckers aus dieser Frucht werde verzichten müssen.

*Stärkegehalt des Kürbis.*

1500 Theile Kürbis wohl zerrieben und in einembeutel aus feiner Leinwand in kaltem Wasser so lange gewaschen, als dasselbe noch etwas auszog, lieferten Stärke 60 Theile von gelblichweisser Farbe.

Vermöge dieses Stärkegehalts, so wie des Gehalts an Zucker und sehr vielem Schleim eignet sich der Kürbis nicht wohl als Nahrungsmittel für Menschen und auch für das Vieh.

*Versuch der Benutzung der Rückstände auf Potasche*

gab ein negatives Resultat, indem 1000 Theile Kürbis, 8 Theile trockner Masse, diese bei der Einäscherung 10 Theile Asche lieferten, welche nur 2 Theile in Wasser lösliche Salze, bestehend aus salzsaurer und schwefelsaurer Kalk- und Talkerde nebst einer Spur phosphorsaurem Natron und 48 Theile in Wasser unlösliche Salze, bestehend aus kohlensaurer Kalk- und Talkerde, Thonerde und Kieselerde gaben.

*Ueber Zuckergehalt der Kohlrübe (Brassica Rapa).*

Der sehr süsse Geschmack diesjähriger Kohlrübe veranlasste mich zur Prüfung ihres Zuckergehalts. 100 Theile fein zerriebenen Kohlrüben gaben 40 Theile Saft, diese nach dem Läutern mit Kalk, Filtriren, Reinigen mit Kohle und Eindampfen 3 Theile Zuckermasse, welche nur wenig krystallisirten Zucker enthielt und größtentheils aus Schleim bestand, der einen unangenehm eigenthümlichen beissenden Nebengeschmack zeigte.

*Versuch zur Reinigung der Runkelrübenmelasse vom unangenehmen Geschmack.*

Hr. Professor Schwartz, Director des landwirthschaftlichen Instituts bei Stockholm, sprach bei einem Besuche auf seiner Durchreise geschenkten Besuche die Hoffnung aus, daß diese, wie bekannt mit einem unangenehmen Nebengeschmacke begabte Melasse, sich durch sorgfältige Behandlung mit Schwefelsäure von demselben befreien lassen dürfte und forderte mich zu einem

Versuche auf. Diesem zu entsprechen liefs ich 100 Theile Melasse mit 50 Theilen Wasser verdünnen, dem  $1\frac{1}{2}$  Th. concentrirter Schwefelsäure zugemischt waren und das Ganze eine Stunde lang gelinde kochen, mit Kalk neutralisiren, filtriren und eindampfen, nachdem der schwefelsaure Kalk, so viel möglich, entfernt war. Auf dem Filtrum blieb schwefelsaurer Kalk nebst braunem Humus ähnlicher Substanz zurück. Die Melasse fand ich indess durch dieses Verfahren nicht von jenem unangenehmen Geschmacke befreit, der wahrscheinlich durch die zu reichliche Behandlung mit Kalk entsteht, wodurch sich Peligot's *acide kali-sacharique* bilden mag. Es kann daher nicht genug vor der überflüssigen Anwendung des Kalkes gewarnt werden.

*Ueber die Läuterung des Runkelrübensaftes mit phosphorsaurem Kalke.*

Bei Versuchen über die Läuterung des Runkelrübensaftes mit verschiedenen chemischen Agentien fand ich, daß der Kalk, der phosphorsaure Kalk und der schwefelsaure Thonerdekalk, das Ferment aus dem Saft am vollständigsten entfernten, besonders gute Resultate gab der phosphorsaure Kalk, welchen ich auf die Weise anwendete, daß ich ungereinigte Phosphorsäure, aus Knochen bereitet, sogenannte Knochensäure zu  $\frac{1}{2}$  — 1 Drachm auf ein preuss. Quart Saft nahm und bei Erwärmung auf  $50^{\circ}$  R. ganz mit der nöthigen Menge Kalkmilch sättigte. Die Säure wurde dargestellt, indem 10 Theile in offenem Feuer weifs gebrannter Knochen, mit 6 Theilen concentrirter Schwefelsäure und 60 Theilen Wasser übergossen, einige Tage lang unter öfterm Umrühren an einem warmen Ort gestellt, zwischen Leinwand gepresst und nach dem Absetzen die Flüssigkeit hell abgegossen wurde.

*Potaschengehalt der Runkelrüben.*

100 Theile Runkelrüben gaben nach dem Auspressen 12 Theile Rückstand, nach dem Austrocknen 21 Theile Faser, diese an Asche 0,282, welche enthielt



salensaurem Kali 0,0365 Theile, welches jedoch nicht von schwefel- und salzsaurem Kali war.

Bei einem 2ten Versuche mit Rüben aus anderm Bogen gaben 100 Theile derselben nur 0,198 Asche, diese 315 Potasche, welche ebenfalls nicht frei an Gehalt an salzsaurem und schwefelsaurem Salze war.

### *Versuche über die Ausbeute an Branntwein aus der Melasse.*

Krause berechnet, daß 200 Pfd. Melasse 30 Maafs Branntwein oder nahe zu 200 Pfd. geben. Dieses ist bei ganz guter Melasse der Fall. Gewöhnlich kommt nur in geringer Qualität in Handel, so daß aller kryallisirter Zucker durch öfteres Wiedereinkochen hergezogen ist. In der Regel ist aber die Qualität der Melasse durch allzureichlichen Gebrauch von Kalk sehr ringert und folglich muß die Ausbeute an Weingeist h geringer ausfallen.

100 Maafstheile einer solchen Melasse wurden mit Theilen Wasser soweit verdünnt, daß die Flüssigkeit ein specifisches Gewicht von 1,050 Beaumé zeigte, und mit Hefen in Gährung gesetzt, welche in etwa 7 Tagen vollendet war. Die Ausbeute betrug 41,25 Maafstheile Branntwein von 50° Tralles.

In einem andern Versuche gab die Melasse derselben Ertrik, aber von einem andern Fasse nur 37,25 Maafstheile Branntwein, welche Ausbeute nicht einmal den Werbetrag nach preuß. Steuer decken würde. Der Preis der Melasse betrug 1 Thlr. 5 Sgr. pr. 110 Pfd.



## Zur Kenntniss des Alcornin;

von

*Carl Frenzel* in Erfurt.

In der zweiten Abtheilung des ersten Bandes des Handwörterbuchs der Chemie von Poggendorff und Reichenow hat auch der von Bilz in der Alkornokorinde (*Alchornea latifolia*) gefundene eigenthümliche Stoff, das

Alcornin, eine Stelle gefunden. Da nun mehrere andere Chemiker, Trommsdorff, Hopf, Rein und Geiger, die diese Rinde analysirten, diesen Stoff nicht fanden, und auch in genanntem Handwörterbuche bloß angegeben ist, daß man ihn nach Bilz erhalten soll, so hielt ich es nicht für überflüssig, obgleich die Arbeiten von Bilz gewiß das größte Vertrauen verdienen, ihn darzustellen zu suchen.

Die von Bilz angegebene Darstellungsmethode besteht darin, daß man die mit Wasser erschöpfte Rinde mit Alkohol auszieht, den Auszug mit Wasser versetzt und abdampft, den Rückstand mit kaltem Aether auszieht, aus welcher Lösung das Alcornin in spiefsigen Krystallen anschießt. Oder man zieht die Rinde unmittelbar mit Aether aus, wo man den Stoff aber gelblich und stark riechend erhalten soll. Nach beiden Methoden erhielt ich den Stoff, jedoch auch nach ersterer etwas gefärbt; ganz farblos erhielt ich ihn, indem er in heissem Weingeist gelöst, die Lösung mit Thierkohle gekocht und dann heiss filtrirt wurde, wo er beim Erkalten und langsamen Verdunsten des Weingeistes in ganz farblosen, spiefsigen, weissen, seidenglänzenden Krystallen erhalten wurde. Aus einem halben Pfunde Rinde erhielt ich 47 Gran ganz reines Alcornin. Der Körper hat alle die Eigenschaften, die Bilz angiebt, nur das von ihm beobachtete Verhalten gegen Schwefelsäure stimmt nicht mit dem von Bilz angezeigten überein; concentrirte englische Schwefelsäure löste ihn mit braungelber Farbe ohne Gasentwicklung auf, die Lösung mit Wasser vermischt, wurde milchigt, und schied einen weissen Niederschlag aus, der unverändertes Alcornin zu sein schien. Von concentrirter nordhäuser Schwefelsäure wurde es schöner rother Farbe ohne Gasentwicklung gelöst, durch Wasserzusatz und nachheriges Filtriren erhielt ich eine braungelbliche saure Flüssigkeit und auf dem Filter blieb ein kohliger Rückstand. Hierbei bildet sich aber keine neue Säure, wie man vermuthen könnte, da die saure Flüssigkeit mit kohlensaurem Kalk gesättigt.



terliefs auf einem Filter nur schwefelsauren Kalk, die abfiltrirte Flüssigkeit gab verdunstet eine gelbe Masse, die aus einem extractivstoffartigen Körper etwas kohlensaurem und schwefelsaurem Kalk bestand.

---

## Anmerkung über die Darstellung des Jodkalium-Quecksilberjodids;

von

*Rudolph Brandes und Gustav Böhm.*

Da die Verbindung von Jodkalium mit Quecksilberjodid oder Doppeltjodquecksilber in arzneilichen Gebrauch gezogen wird, und zuverlässig zu den kräftig wirkenden Mitteln gehört, so bedarf die Darstellung desselben wohl einiger Beachtung, damit ein richtiges Arzneimittel dispensirt werde. Da das Salz, welches nur aus der Verbindung dieser beiden Jodide resultirt, in feuchter Luft leicht zerfließt, so liegt darin, in Betracht, daß es nur in kleinen Gaben verordnet wird, kein bedeutendes Hinderniß, dasselbe in reiner Form vorrätzig zu halten; besser ist daher eine zweckmäßige Magistralformel dafür und der Jodkalium-Quecksilberjodid-Syrup, nach der Vorschrift der Hrn. Tognio und Würtzler ist gewiß der Berücksichtigung werth\*). Darstellung des Salzes ist hier so gegeben, daß man eine bestimmte Menge Jodkalium in Wasser auflöst, so viel Quecksilberjodid zusetzt, als noch aufgenommen wird und darauf die Auflösung verdunsten läßt. Würtzler wendet hierbei die Auflösung des Jodkaliums möglichst concentrirt an.

In mehreren Magistralformeln für die medicinische Anwendung dieses Salzes hat man gleiche Theile Jodkalium und Jodkalium-Quecksilberjodid vorgeschrieben, sowohl als die Lösung in Wasser, als auch sogleich zur Verarbeitung in eine passende Pillenmasse; es sind aus dem *Journ.*

---

Diese Zeitschr. 2. R. XXII, 101.

*de Chimie med.* 2. Ser. V. zwei Vorschriften dazu auch in diese Zeitschrift übertragen (2. R. XXII. Bd. 103.).

Nach allem scheint es, daß man in medicinischer Rücksicht die Verbindung haben will von gleichen Atomen beider Jodide. Nun ist das Atom des Quecksilberjodids,  $\text{Hg J}_2$ , 2845,32, das des Jodkaliums,  $\text{K J}_1$ , aber 2069,42. Es ist also offenbar, daß wenn die Atomzahlen dieser beiden Jodide auch nicht weit von einander abstehen, sie doch keinesweges gleich sind, und es durchaus unangemessen ist, wenn für diese Formeln der Arzt gleiche Gewichtstheile beider Jodide verordnet, um das gleichatomige Jodkalium-Quecksilberjodid zu erhalten. Es wird in solchem Falle immer ein gewisser Theil Quecksilberjodid zu wenig und Jodkalium zu viel vorhanden sein. Wir sind weit davon entfernt, aus unserer Sphäre als Apotheker hervorzutreten, und uns ein Urtheil zu erlauben, in wie weit dieser Gehalt von freiem Jodkalium den von der reinen Verbindung, dem Jodkalium-Quecksilberjodid, gehegten Erwartungen Eintrag thun würde; wir haben eine Menge Composita, die in Bezug auf ihre Bestandtheile keine mathematisch scharfe Bestimmung zulassen: indessen wo diese möglich ist, muß unsers Bedünkens nach, dieselbe ausgeführt werden, durch sie erhält das Medicament erst einen wahren wissenschaftlichen Character, durch sie die Therapie eine begründete Basis.

Wenn es sich also handelt von der Anwendung des Jodkalium-Quecksilberjodids als Arzneimittel, und die Bereitung desselben soll, wegen der großen Leichtigkeit womit beide Körper sich vereinigen, durch bloßes Schütteln mit Wasser, und um die oben bemerkten Nachtheile die mit der Dispensation des vorrätbig gehaltenen Salzes statt finden können, zu vermeiden, *ex tempore* geschehen, so muß es als ein Fehler angesehen werden, das Jodkalium und das Quecksilberjodid zu gleichen Theilen zu verordnen. Das Quecksilberjodid kann mit dem Jodkalium mehrere Verbindungen eingehen. Es kommt also auf die Untersuchung der Umstände an, unter wel-

en sich diese Verbindungen bilden, und als solche bei der Auflösung beider Jodide in Wasser entstehen. Wäre das der Fall, so würde kein Quecksilberjodid ungelöst bleiben, wenn man auch mehr desselben setzte als die gleichen Atome betragen, sondern die eichatomige Verbindung mit geringen Theilen einer eichatomigen an Quecksilberjodid verunreinigt sein, wir gen verunreinigt, weil sie nicht in der Absicht des Präparats liegt und dieser Fall wäre bei dem Verfahren vom Apotheker Würtzler ins Auge zu fassen.

Polydor Boullay hat bereits im Jahre 1827 \*) die Gegenstand in seiner Abhandlung über die Doppelure gründlich erforscht, und wir wollen der Wichtigkeit der Sache wegen seine Versuche hier anführen, il sie sogleich die hier in Frage stehenden Verhältnisse auflösen.

1) Wenn man in eine concentrirte Auflösung des Jodkalium bei der Wärme einen Ueberschufs an Quecksilberjodid bringt, so löst sich dieses schnell auf, aber wie die Auflösung erkaltet, schlagen sich eine Menge rhombischer und octaedrischer prismatischer Krystalle daraus nieder, die Quecksilberjodid sind, und eine glänzende Farbe besitzen. Mit Hülfe der Wärme liefsen sich der concentrirten Auflösung von 1 Atom Jodkalium 3 Atome Quecksilberjodid auflösen; die Flüssigkeit war er nun so dick, dafs sich nichts mehr darin auflösen liefs, dafs sie nicht länger flüssig gehalten werden konnte. Die Verbindung war also  $\text{KJ}_2 + 3\text{HgJ}_2$ . Es entsteht so in der Wärme ein Salz mit 3 Atomen Quecksilberjodid, das in der Kälte aber nicht bestehen bleibt. In D ist es zusammengesetzt aus

Jodkalium.....19,5

Quecksilberjodid....80,5

---

100.

Alkohol verzögert die Fällung eines Theils des Quecksilberjodides aus dieser Verbindung, nach einiger Zeit

aber und wenn ein Theil des Alkohols verdunstet ist, findet sie statt, und ein Theil des rothen Quecksilberjodides scheidet sich in blättrigen Krystallen ab.

2) Wenn man mit weniger concentrirten Flüssigkeiten operirt als die vorigen, so enthalten die Auflösungen nach Erkalten und Abfiltriren des Ausgeschiedenen noch eine bedeutende Menge Quecksilberjodid aufgelöst, und liefern lange gelbe, dem Schwefel ähnliche, prismatische auch octaëdrische Krystalle, die nach dem Trocknen einen Stich ins Grünliche annehmen. Dieses Salz ist an trockner Luft beständig. Durch Wasser wird es sofort zersetzt, indem sich ein Theil des Quecksilberjodids ausscheidet. Beim Erhitzen verliert es erst eine geringe Menge Wasser, fließt dann zu einer rothen Flüssigkeit, aus welcher Quecksilberjodid sich abscheidet. Alkohol und Aether zersetzen dieses Salz nicht, wie solches durch Wasser geschieht, sondern lösen dasselbe unverändert auf, und durch freiwilliges Verdunsten dieser Auflösungen erhält man dasselbe im krystallisirten Zustande. Dieses Salz ist ein *Zweifach-Quecksilberjodid-Jodkalium*,  $KJ_2 + 2HgJ_2$ , und besteht aus:

Jodkalium.....26,6

Quecksilberjodid.....73,4

---

100.

Es enthält so viel Wasser, daß dasselbe die Umwandlung der beiden Jodüre in Hydriodate bewirken würde; es würde dies  $4,19\%$  betragen, der Versuch gab 4,5. Die Formel des krystallisirten Salzes wäre somit  $KJ_2 + 2HgJ_2 + 6Aq.$  und dieses Salz würde enthalten:

Jodkalium.....25,51

Quecksilberjodid.....70,30

Wasser.....4,19

---

100.

Die Existenz dieses krystallisirbaren Doppeljodsalzes beweist, daß beim Erkalten der heißen Auflösung des Salzes mit 3 Atomen Quecksilberjodid 1 Atom des Jodids sich ausscheidet und somit das Salz mit 2 Atomen sich bildet, das krystallisationsfähig ist.



3) Das Salz mit 2 Atomen Quecksilberjodid wird, wie wir bereits angeführt haben, durch Wasser zersetzt und es wird aus demselben genau noch ein Atom Quecksilberjodid ausgeschieden, so daß eine Verbindung von gleichen At. Quecksilberjodid und Jodkalium übrig bleibt. Diese Verbindung ist leichtlöslich in Wasser, scheint nicht krystallisationsfähig zu sein, sondern bildet eine gelbliche amorphe Masse,  $KJ_2 + HgJ_2$ . Die Bestandteile dieser sind:

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Jodkalium.....        | 42,05 |
| Quecksilberjodid..... | 57,95 |
|                       | <hr/> |
|                       | 100.  |

Wir haben die Versuche Boullay's wiederholt, und sind zu denselben Resultaten gelangt, so daß wir die Genauigkeit seiner Beobachtungen völlig bestätigen können. Wir wollen nur einige unserer Versuche anführen.

a) 2,0 Grm. Jodkalium wurden in ohngefähr der zehnfachen Menge Wasser aufgelöst und dann die gleiche Gewichtsmenge Quecksilberjodid zugesetzt, die völlig gelöst wurde, als man noch 0,4 Grm. zusetzte, trat derselbe Erfolg ein, ein weiterer Zusatz von 0,2 Grm. wurde nicht mehr aufgenommen.

b) 2,07 Grm. Jodkalium und 2,84 Grm. Jodquecksilber, was genau den Atomzahlen beider Verbindungen entspricht, wurden mit 10 Th. Wasser in Berührung gebracht. Die Auflösung erfolgte leicht und rasch ohne Anwendung von Wärme. Nach dem Abdampfen wurde eine gelbliche Salzmasse erhalten, welche so lange getrocknet, bis keine Gewichtsabnahme mehr entstand, dem Gewicht der beiden Präparate zusammengenommen verglichen, nämlich bis auf eine unbedeutende Differenz übereinstimmte. Die einfache Verbindung besteht aus:

|                     |       |       |
|---------------------|-------|-------|
| Jodkalium.....      | 2070  | 42,16 |
| Jodquecksilber..... | 2840  | 57,84 |
|                     | <hr/> |       |
|                     | 4910  | 100.  |

c) 2,07 Grm. Jodkalium und 5,68 Grm. Quecksilber-



jodid wurden mit der zehnfachen Menge Wasser digerirt und es fand weder durch vermehrten Zusatz von Wasser, noch durch Erhitzen bis zum Kochen eine völlige Auflösung des Quecksilberjodides statt. Der ungelöste Rückstand wurde gesammelt und betrug 2,82 Grm. Die Hälfte des angewandten Quecksilberjodides war also ungelöst geblieben, und die Auflösung mußte mithin ein Salz mit gleichen Atomen enthalten. Durch Verdampfen der Auflösung wurde auch ein Salz erhalten, welches dem in *b* beschriebenen völlig gleich.

d) Zur Ueberzeugung dieses Verhaltens des Wassers gegen ein Gemenge von Jodkalium und Quecksilberjodid wurden 2,07 Grm. Jodkalium mit 7,52 Grm. Jodquecksilber und der zwölffachen Menge Wasser gekocht, also auf 1 Atom Jodkalium 3 Atome Quecksilberjodid. Es wurden 5,65 Grm. Quecksilberjodid ungelöst wieder erhalten. Es war also auch jetzt das gleichatomige Salz gebildet, welches nach Verdampfen der Auflösung auch mit allen Eigenschaften desselben zurückblieb.

e) Die Salze, welche aus den Auflösungen in *c* und *d* erhalten worden waren, wurden in Gläsern zugleich in Sandbade erwärmt, um beide gleichmäßig von der noch anhängenden Feuchtigkeit zu befreien, und als sie nicht mehr im Gewichte abnahmen, sogleich von jedem 2 Grm. abgewogen und in Wasser aufgelöst. Beide Auflösungen fällte man mit salpetersaurem Silberoxyd und erhielt dadurch zwei im Gewichte nahe übereinstimmende Niederschläge; sie wogen 2,4 Grm. 100 der Verbindung geben sonach 120 Jodsilber, diese enthalten 61,5 Jod. In 100 der Verbindung müßten sich eigentlich 63,2 Jod befinden. Wir haben hier etwas mehr Jod erhalten, wahrscheinlich enthielt der Niederschlag noch etwas Feuchtigkeit zurück.

Diese Reihe von Versuchen bestätigt also völlig, daß wenn Jodkalium mit vielem Quecksilberjodid und einer reichen Menge Wasser zusammenkommt, stets nur ein wenig von dem letztern Jodide aufgenommen wird, daß die

ichatomige Verbindung entsteht, die nach unsern synthetischen Versuchen enthält:

Jodkalium.....42,16

Quecksilberjodid ....57,84

100.

f) Die Anwendung dieser Verbindung in der Medizin kann sowohl in Form von Auflösung in Wasser als auch in Syrup geschehen, und kann im Augenblick durch die beiden Bestandtheile Jodkalium und Jodquecksilber, die man in dem Verhältniß 42:58 in Wasser aufgelöst vorrätzig hält, bereitet werden. Auf die wässrige Solution, die alkoholische Solution, so wie auf den Syrup, kann man auf die gleiche 4 Gran der Verbindung rechnen, so daß jede Dosis  $\frac{1}{2}$  Gran des Quecksilberjodid-Jodkaliums entspricht.

g) Aus dem Vorstehenden ergibt sich weiter, daß die Verbindung von 2 At. Quecksilberjodid mit 1 At. Jodkalium, in sofern man davon eine medicinische Anwendung machen will, eine besondere Berücksichtigung erfordert, da dieselbe in wässriger Auflösung nicht beständig sein kann, sondern sogleich zerfällt zu 1 At. Quecksilberjodid, was sich ausscheidet und zu der Verbindung von 1 At. Quecksilberjodid und 1 At. Jodkalium, die aufgelöst bleibt. Wir haben diese Verbindung auf folgende Weise dargestellt: 1 At. Jodkalium wird mit 2 At. Quecksilberjodid und wenig Wasser, ohngefähr so viel, wie das Gewicht des Jodkaliums beträgt, zusammengerieben, und in mäßige Wärme gestellt, worauf bald eine vollständige Auflösung erfolgt. Die Auflösung ist durchsichtig, gelblich gefärbt, und nach Erkalten erhält man eine krystallinische Salzmasse, die aus kleinen Prismen besteht und die eine gelbe, wenig ins Grünliche ziehende Farbe besitzen.

Die Verbindung entsteht ferner sehr leicht, wenn man beide Jodide in den angezeigten Verhältnissen mischt und das Gemisch erhitzt, bis es in Fluß kömmt.

Endlich kann man beide Jodide in den angeführten

Mengen in Alkohol von 90 % auflösen und die Auflösung verdampfen. Am besten ist es, die Auflösung unter die Glocke einer Luftpumpe über Chlorcalcium zu stellen. Man erhält dann gelbe nadelförmige oder feine prismatische zum Theil büschelförmig und strahlig zusammengehäufte Krystalle.

b) Dieses Salz besitzt folgende weitere Eigenschaften. Durch Erhitzen wird es erst citrongelb, schmilzt und fließt dann wie Oel, nach Erkalten erstarrt es zu einer grünlich-gelben, im Bruch krystallinisch-strahligen Masse. Bei stärkerem Erhitzen verliert es die gelbe Farbe und stellt zuletzt eine braune Flüssigkeit dar, die beim Erkalten zu einer im Bruch körnigten Masse erstarrt. Beim Erhitzen in einer Glasröhre giebt es zuerst Wasser aus, beginnt dann zu schmelzen, färbt sich dunkelbraun und es sublimirt zuletzt Quecksilberjodid. In trockner Luft ist es beständig, in feuchter Luft aber zieht es Feuchtigkeit an, und bei einer schon geringen Menge derselben wird es roth, indem es sich zersetzt. So wie ihm mehr Wasser zugeführt wird, als zu seiner Constitution gehört, geht diese Zersetzung an. Auf Papier gelegt, welches kaum feucht erscheint, wird das Salz, wo es das Papier berührt, und letztes selbst roth. Wenn man eine spirituöse Auflösung des Salzes in einer flachen Schale verdampfen läßt, und auf den darin entstandenen gelben Ueberzug einigemal haucht, so wird die gelbe Farbe desselben sogleich in Roth verwandelt, man hat statt des gelben einen rothen Ueberzug; stellt man die Schale in die Wärme, so wird, mit der Entfernung der Feuchtigkeit, die ursprüngliche gelbe Farbe wieder hergestellt. Läßt man auf das Salz einige Tropfen Wasser fallen, so scheidet sich sofort überall, wo dieses hintrifft, ein schöner scharlachrother Niederschlag ab, der nach und nach die ganze Salzmasse durchdringt. Gelbe Krystalle, die vom Dunste des Wassers berührt werden, erscheinen sogleich roth, mit Beibehaltung ihrer Form. Wird die Flüssigkeit mit dem rothen Niederschlag wieder der Wärme ausgesetzt, so wird die gelbe

bindung in Krystallen wieder hergestellt. Man kann diesen Versuch mit derselben Masse nach Belieben wiederholen. Alle diese Erscheinungen beruhen darauf, daß die Verbindung durch Wasser sofort zersetzt wird, indem das eine Atom Jodquecksilber dadurch sich ausscheidet. Diese Verbindung zeigt also mit Wasser keine Löslichkeit. Sie wird dadurch sofort aufgehoben, ähnlich wie manche Metallsalze durch Wasser zersetzt werden, wie z. B. basisch-salpetersaures Wismuthoxyd, nur die Zersetzung in der Art verschieden, daß bei dem Wismuthsalze eine basische Verbindung ausgeschieden wird, bei der in Rede stehenden Jodverbindung aber der Factor der Verbindung zwar auch nur theilweise, doch im unverbundenen Zustande niederfällt.

Aether, so wie Alkohol von 70 — 98 % lösen die Verbindung unzersetzt auf. Die Auflösung läßt sich in diesen Verhältnissen mit diesen beiden Flüssigkeiten machen, ohne daß die geringste Ausscheidung erfolgt.

Die Auflösung in einem wasserhaltigen Alkohol von 70 % bietet eine interessante Erscheinung dar, wenn man sie langsam oder freiwillig verdunsten läßt. Man erhält nämlich nach einiger Zeit darin schöne rubinrothe Krystalle, die das Licht ganz ausgezeichnet reflektiren und einen lebhaften Demantglanz besitzen, diese Krystalle scheinen Rhomboeder und Rhombenoctaeder zu sein, wenn man sie unter der Lupe betrachtet; die Differenz in den spitzen und stumpfen Winkeln des Rhomboeders scheint aber nicht groß zu sein.

Boullay hat bei seinen Versuchen diese Erscheinungen ebenfalls beobachtet. Die Krystalle sind reines Quecksilberjodid. Diese Krystallisation verdient Aufmerksamkeit. Man erhält das Quecksilberjodid bekanntlich bei der gewöhnlichen Art seiner Darstellung nur als scharlachrothen Niederschlag, und nur beim Erhitzen zerfällt es durch Sublimation schwefelgelbe rhombische Krystalle. In der oben bemerkten Weise durch die Zersetzung des Einfach-Quecksilberjodid-Jodkaliums aber scheint es zwar eine entsprechende Form zu haben, wie



bei den bei der Sublimation entstandenen Krystallen, aber die Farbe ist davon ganz verschieden, nicht schwefelgelb, sondern dunkelrubinroth oder granatroth. Offenbar ist es bei dieser Bildung der Krystalle die langsame Verdunstung des Alkohols und die dadurch allmähig nur zunehmende relative Vermehrung des Wassergehalts der Flüssigkeit, welche eine so langsame Ausscheidung der Moleküle des Salzes gestattet, daß sie zu einer regelmäßigen Configuration gelangen können. Die Synthese der Verbindung, die wir hier einer nähern Untersuchung unterworfen haben, zeigt nun deutlich, daß dieselbe bestehe aus:

|                       |         |      |
|-----------------------|---------|------|
| 1 At. Jodkalium.....  | 2069,42 | 26,6 |
| 2 „ Quecksilberjodid. | 5690,64 | 73,4 |
|                       | <hr/>   |      |
|                       | 7760,06 | 100. |

i) In Bezug auf die medicinische Anwendung dieses Salzes, die vielleicht dem Arzte in besondern Fällen genehm sein könnte, wo er das Quecksilberjodid in dieser Form im leichtlöslichen Zustande anwenden wollte, scheint es nach dem ganzen Verhalten dieses Salzes nicht ratsam, dasselbe in trockner Form zu dispensiren. Eine Auflösung desselben in Wasser kann nicht statt finden, eben so wenig läßt es sich mit Syrup verbinden, auch durch diesen wird es sofort zersetzt, wie durch Wasser. Am zweckmäßigsten möchte es sein, das Salz in starkem Alkohol aufzulösen, in Alkohol von 90  $\frac{1}{2}$ , und auf die Unze desselben 4 Gran des Salzes zu rechnen, so daß jede Drachme der Auflösung  $\frac{1}{2}$  Gran des Salzes enthält, analog den oben gegebenen Formeln für die Verbindung mit 1 At. des Quecksilberjodides.

k) Was die Verbindung des Jodkaliums mit 3 At. Quecksilberjodid betrifft, so verhält es sich damit ganz wie Boullay angegeben hat; sie existirt nur in der Wärme, wenn man in eine möglichst concentrirte Auflösung von Jodkalium 3 At. Quecksilberjodid bringt; wie die Auflösung erkaltet, scheidet sich 1 At. des letztern wieder aus. Diese Verbindung kann nicht wohl Gegenstand arzneilicher Anwendung sein.







## Dritte Abtheilung.

**Centralbericht.****Ueber das Salicin;**

Eine wichtige Arbeit über das Salicin hat R. Piria bekannt gemacht, woraus wir das Wesentlichste mittheilen.

Das Salicin wie viele andere organische Substanzen geht nach Döbereiner durch Behandeln mit Manganperoxyd und Schwefelsäure bekanntlich Ameisensäure, wird es aber nach Piria mit einem Gemenge von saurem chromsauren Kali und Schwefelsäure als oxydirendes Agens behandelt, so entsteht außer Kohlensäure und Ameisensäure noch ein den ätherischen Oelen ähnlicher Körper, der sich dem Benzoylwasserstoff analog verhält, und den P. deshalb *Salicylwasserstoff* nennt.

Das Radikal des Salicylwasserstoffs ist das *Salicyl*, das noch nicht isolirt dargestellt ist. Es hat die Formel  $C_{14}H_{10}O_4$  und unterscheidet sich von dem *Benzoyl*,  $C_{14}H_{10}O_2$ , dadurch, daß es 2 Atome Sauerstoff mehr enthält. Man könnte es daher auch als eine höhere Oxydationsstufe des Benzoyls oder beide Radikale als Oxyde eines Kohlenwasserstoffs,  $C_{14}H_{10}$ , betrachten. Dumas betrachtete vor einigen Jahren das Benzoyl und die wasserfreie Benzoessäure als zwei Oxyde dieses hypothetischen Kohlenwasserstoffs, den er *Benzogen* nannte. Salicyl und Salicylsäure wären zwei andere Oxyde des Benzogens, welches hienach folgende Oxydationsstufen hätte:



Der *Salicylwasserstoff* erscheint unrectificirt als ein öthes Oel, durch Destillation wird er farblos, an der Luft röthet er sich wieder, hat einen brennend aromatischen Geschmack, riecht etwas bittermandelartig, ist in Alkohol und Aether leicht-, in Wasser schwerlöslich, röthet Lackmuspapier nicht, wird durch Eisenoxydsalze violett, durch Eisenoxydulsalze und andere Metallsalze nicht verändert. Sein sp. G. bei  $17,5^\circ C.$  ist 1,1731, er kocht bei  $196,5^\circ C.$  und  $0,760^m B.$  In kaustischen Alkalien löst er sich unter Wärmeentwicklung, in kohlensauren Alkalien unter Ausreibung der Kohlensäure. Durch Chlor oder Brom wird er

in Chlor- oder Bromsalicyl unter Entwicklung von Chlor- oder Bromwasserstoffsäure verwandelt; Jod aber löst sich ohne weitere Erwärmung darin auf. Durch concentrirte Salpetersäure wird er erst zu einem gelben Körper, *Nitrosalicyl*, und dann zu Kohlenstickstoffsäure; die Darstellung des Salicylwasserstoffs geschieht am besten auf folgende Weise. 4 Th. saures chromsaures Kali werden in Wasser gelöst, mit 3 Th. Schwefelsäure vermischt. Andererseits erhitzt man Salicin mit seiner sechsfachen Menge Wasser in einer Retorte, die mit einer mit kaltem Wasser umgebenen Vorlage versehen ist, und nach Auflösung des Salicins giebt man durch den Tubus die saure Salzlösung in kleinen Portionen hinein. Bei jedem Zusatz entsteht eine lebhafte Reaction, das Gemenge färbt sich grün durch Bildung von schwefelsaurem Chromoxyd und ein milchiges Wasser geht über, worin der Salicylwasserstoff nach einiger Zeit sich absetzt.

Die Analysen des Salicylwasserstoffs führten zu folgender Zusammensetzung:

|                     |         |       |
|---------------------|---------|-------|
| 14 At. Kohlenstoff. | 1070,16 | 69,26 |
| 12 „ Wasserstoff.   | 74,88   | 4,84  |
| 4 „ Sauerstoff...   | 400,00  | 25,90 |
|                     | 1545,04 | 100.  |

Der Salicylwasserstoff ist also mit der wasserhaltigen Benzoesäure isomer. Die Dichtigkeit seines Dampfes nach dem Versuch ist 4,276, genau wie der der wasserhaltigen Benzoesäure. Jedes Volum Salicylwasserstoffdampf enthält also:

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| 3½ Vol. Kohlenstoffdampf.... | 2,9512  |
| 3 „ Wasserstoff.....         | 0,2064  |
| 1 „ Sauerstoff.....          | 1,1026  |
|                              | 4,2602. |

Ebenso die krystallisirte Benzoesäure. In der That hat die Chemie wenig Fälle einer so vollkommenen Isomerie, wo zwei gänzlich verschiedene Materien neben derselben Elementarzusammensetzung auch dasselbe Atomgewicht, und eine gleiche Verdichtung ihrer Elemente im Gaszustande haben. Nach allen Reactionen des Salicylwasserstoffs ist er als eine Verbindung des Salicyls mit einem Aeq. Wasserstoff zu betrachten, und würde also die Formel haben:  $C_{14}H_{10}O_4 + H_2$ .; er ist wie die Blausäure eine wirkliche Wasserstoffsäure, Metalloxyde geben ihren Sauerstoff an das eine Aequivalent Wasserstoff ab, wodurch ein Salicylmetall entsteht. Die Isomerie des Salicylwasserstoffs mit der Benzoesäure geht auch durch die entsprechenden Verbindungen mit Basen

ort, diese Isomerie der Salicylmetalle mit den wasserfreien benzoesauren Salzen ist leicht begreiflich, denn

$$C_{14}H_{10}O_4 + M = C_{14}H_{10}O_3 + MO.$$

### Salicylmetalle.

*Salicylkalium* entsteht durch Vermischen von Salicylwasserstoff mit einer concentrirten Lösung von kautischem Kali. Man erhält eine von der Flüssigkeit leicht abscheidbaren Masse, die man zwischen Papier presst, und durch Auflösen in Alkohol reinigt. Es bildet goldgelbe fettig anzufühlende quadratische Tafeln, ist leicht löslich in Wasser und Alkohol, reagirt alkalisch, trocken ist es luftbeständig, feucht wird es aber erst grün und bald darauf schwarz. Es enthält Krystallwasser, wovon man es nicht ohne Zersetzung befreien kann, indem das Salz beim Erhitzen immer etwas Salicylwasserstoff entwickelt. Im wasserfreien Zustande besteht das Salz aus 1 Aeq. Salicyl und 1 Aeq. Metall.

*Salicylammonium* entsteht, wenn Salicylwasserstoff mit concentrirtem Ammoniak in Berührung kommt, es bildet eine gelbe in Wasser wenig lösliche Masse. Ammoniakgas wird von Salicyl absorbirt, in diesem Falle entstehen gelbe nadelförmige Krystalle. Das Salicylammonium entwickelt schon an freier Luft Ammoniak und wird zersetzt, indem dadurch das Oel frei wird.

Das *Salicylbarium* ist ein gelbes krystallinisches in Wasser schwer lösliches Pulver, welches 2 At. Krystallwasser enthält.

*Salicylkupfer* bildet sich durch Einwirkung eines Ueberschusses einer Auflösung von Salicylwasserstoff auf frisch gefälltes Kupferoxydhydrat. Es ist ein leichtes grünes in Wasser und Alkohol unlösliches Pulver.

### Salicylsäure.

Erhitzt man Salicylwasserstoff mit einem Ueberschuss von Kali, so wird das Gemenge erst rothbrann, entfärbt sich dann unter Entwicklung von Wasserstoff, und wenn nach Beendigung dieser die Masse in Wasser aufgelöst und durch Salzsäure zersetzt wird, so schlägt sich eine eifse der Benzoessäure ähnliche krystallinische Masse nieder, die man durch Auflösen mit heissem Wasser und kalten vollkommen weiß und krystallisirt erhält, und *salicylsäure* ist. Sie ist in kaltem Wasser wenig, in heissem Wasser, Alkohol und Aether leichtlöslich, sublimirbar in langen Nadeln wie Benzoessäure, schmeckt etwas süßlich, den Schlund reizend. Durch concentr.

Salpetersäure entsteht bei Erwärmen lebhafte Zersetzung und die Auflösung giebt nach Verdunsten kleine bitter schmeckende gelbe Krystalle. Die Analysen dieser Säure führen zu folgender Zusammensetzung:

|                       |         |       |
|-----------------------|---------|-------|
| 14 At. Kohlenstoff... | 1070,16 | 61,32 |
| 12 » Wasserstoff..    | 74,83   | 4,29  |
| 6 » Sauerstoff....    | 600,00  | 34,39 |

1745,04 100.

Das *salicylsaure Silberoxyd* ist ein weißes in Wasser unlösliches Pulver, seine Zusammensetzung:

|                       |         |       |
|-----------------------|---------|-------|
| 14 At. Kohlenstoff... | 1070,16 | 34,70 |
| 10 » Wasserstoff..    | 62,40   | 2,02  |
| 5 » Sauerstoff....    | 500,00  | 16,22 |
| 1 » Silberoxyd...     | 1431,61 | 47,06 |

3084,17 100.

*Veränderung des feuchten Salicylkaliums an der Luft.*

Feuchtes Salicylkalium wird an der Luft, wie bereits bemerkt, grün, und nach und nach in eine schwarze Masse verwandelt, die beim Auflösen in Wasser ein geschmackloses schwarzes kienrussähnliches Pulver hinterläßt, das in Wasser unlöslich, in Alkohol, Aether und ätzenden Alkalien löslich ist, die kohlensauern Alkalien unter Aufbrausen zersezt, und aus den alkalischen Auflösungen durch Säuren wieder gefällt wird. P. nennt diese Materie ihrer Farbe wegen *Melansäure*. Die Zusammensetzung dieser Säure ist:

|                        |        |       |
|------------------------|--------|-------|
| 10 At. Kohlenstoff.... | 764,40 | 58,16 |
| 8 » Wasser.....        | 49,92  | 3,80  |
| 5 » Sauerstoff.....    | 500,00 | 38,04 |

1314,32 100.

Mit Silberoxyd bildet sie eine schwarze in Wasser unlösliche Verbindung. Die Zusammensetzung des *melansauern Silberoxydes* ist  $C_{10}H_8O_5 + AgO$ .

Außer der Melansäure bildet sich bei der Veränderung des Salicylkaliums an der Luft nur noch Essigsäure, und zwar so viel, daß mit dem Kali neutrales Salz entsteht, auf jedes Atom Salicylkalium also 1 At. Essigsäure. Zählt man zu 1 At. Salicylkalium 3 At. Sauerstoff und die Elemente von 2 At. Wasser, so hat man 1 At. Melansäure und 1 At. essigsaures Kali. Nämlich  $C_{14}H_{10}O_4 + K + O_3 + H_4O_2 = C_{10}H_8O_5 + (C_4H_6O_3 + KO)$ .

### Chlorsalicyl.

Leitet man Chlorgas durch Salicylwasserstoff, so erhitzt sich die Flüssigkeit unter Entwicklung von Salzsäure, und nach Erkalten entsteht eine krystallinische



lbliche Masse, die durch Auflösen in Alkohol reines Chlorsalicyl giebt.

Dieses bildet farblose perlmutterglänzende rechteckliche Tafeln, schmeckt pfefferartig und riecht unangenehm, ist in Wasser und Säuren unlöslich, löslich in Alkohol und Aether, und auch in fixen Alkalien. Aus letzter Auflösung wird es durch Säuren unverändert gefällt, und weicht hierin also ganz vom Chlorbenzoyl, das sich unter diesen Umständen unmittelbar in Salicylsäure verwandelt. Seine Zusammensetzung ist:

|                       |         |       |
|-----------------------|---------|-------|
| 14 At. Kohlenstoff .. | 1070,16 | 54,18 |
| 10 » Wasserstoff ..   | 62,40   | 3,16  |
| 4 » Sauerstoff ....   | 400,00  | 20,25 |
| 2 » Chlor .....       | 442,65  | 22,41 |

1995,21 100.

Das Chlorsalicyl verbindet sich direct mit Basen. Die Kaliverbindung entsteht durch Auflösen von Chlorbenzoyl in der geringsten Menge einer heißen Auflösung von Kali von 45° B. Es bildet rothe strahlig-gruppirt e huppige Krystalle. Die Barytverbindung ist ein gelbes unlösliches Pulver =  $C_{14}H_{10}O_4Cl_2 + BaO$ .

### Bromsalicyl.

Man erhält Bromsalicyl durch Zusammenbringen von Brombenzoyl mit Salicylwasserstoff; es entwickelt sich Bromwasserstoffsäure und das Gemenge gesteht zu einer krystallinischen Masse, die man durch Krystallisation aus Alkohol reinigt. Es krystallisirt in kleinen farblosen Tafeln, und verhält sich übrigens dem Chlorsalicyl ganz analog. Seine Zusammensetzung ist:

|                       |         |       |
|-----------------------|---------|-------|
| 14 At. Kohlenstoff... | 1070,16 | 42,62 |
| 10 » Wasserstoff..    | 62,40   | 2,48  |
| 4 » Sauerstoff....    | 400,00  | 15,94 |
| 2 » Brom.....         | 978,31  | 38,96 |

2510,87 100.

### Einwirkung des Ammoniaks auf Chlor und Bromsalicyl.

Bei Einwirkung von Ammoniakgas auf Chlorbenzoyl bilden sich Salmiak und Benzamid, das man als eine Verbindung von Benzoyl mit dem Körper  $N_2H_4$  betrachten kann. Auf Chlorsalicyl wirkt das trockne Ammoniakgas anders. Die Chlorverbindung wird in eine gelbe harzige Masse verwandelt, unter Bildung von Wasser. Die gelbe Masse krystallisirt aus den heißen Aufgüssen in absolutem Alkohol oder Aether in gelben gebogenfarbig schillernden Krystallen. Diesen Körper nennt P. Chlorosamid. Eine andere Verbindung



erzeugt sich hierbei nicht, es ist kein Salmiak dabei gebildet. Gegen die relative Verwandtschaft des Chlors und Sauerstoffs zum Wasserstoff entzieht also das Ammoniak dem Chlorsalicyl Sauerstoff und kein Chlor, und es bildet sich Wasser und kein Salmiak.

Das Chlorosamid krystallisirt in kleinen gelben Schuppen, ist in Wasser fast unlöslich. Es ist löslich in Alkohol und Aether, mehr in heissem. Wasserfreier Alkohol löst es unverändert, wässriger und heisser entwickelt daraus Ammoniak. Durch Erhitzen mit sauren oder alkalischen Flüssigkeiten nimmt es die Elemente des Wassers wieder auf, es bildet sich Ammoniak und eine Verbindung von Chlorsalicyl mit dem Alkali bei Anwendung von alkalischen Flüssigkeiten, oder ein Ammoniaksalz und ein Sublimat von Chlorsalicyl bei Anwendung von sauren Flüssigkeiten. Die Zusammensetzung des Chlorosamids ist:

|                                |         |       |
|--------------------------------|---------|-------|
| 14 At. Kohlenstoff...          | 1070,16 | 56,52 |
| 10 » Wasserstoff..             | 62,40   | 3,30  |
| 2 » Sauerstoff....             | 200,00  | 10,57 |
| $\frac{4}{3}$ » Stickstoff.... | 118,00  | 6,23  |
| 2 » Chlor.....                 | 442,65  | 23,38 |

1893,21 100.

Das Bromsalicyl wird durch Ammoniak genau auf dieselbe Weise verändert und das sich bildende Bromosamid ist dem Chlorosamid vollkommen analog. Seine Zusammensetzung ist:

|                                |         |       |
|--------------------------------|---------|-------|
| 14 At. Kohlenstoff...          | 1070,16 | 44,06 |
| 10 » Wasserstoff..             | 62,40   | 2,56  |
| 2 » Sauerstoff....             | 200,00  | 8,25  |
| $\frac{4}{3}$ » Stickstoff.... | 118,00  | 4,86  |
| 2 » Brom.....                  | 978,31  | 40,27 |

2428,87 100.

### *Salicin im verbundenen Zustande.*

Weder Säuren noch Ammoniak und die Oxyde der meisten Metalle lassen sich mit Salicin direct verbinden, nur Bleioxyd macht eine Ausnahme. Diese Verbindung stellte P. dar durch Fällen einer Auflösung von Salicin mit dreifach-basisch essigsaurem Bleioxyd, mit Rücksicht, dafs noch ein grosser Theil Salicin ungelöst bleibt. Das Salicinbleioxyd ist ein weisses leichtes süßlich und bitter schmeckendes Pulver. Es wird durch die schwächsten Säuren zersetzt. Nach den Analysen dieser Bleiverbindung entscheidet sich Piria dahin, das Salicinbleioxyd als ein dreibasisches Salz zu betrachten und giebt dafür die Formel  $C_{11}H_{14}O_5 + 3 PbO$ .

Das wasserfreie Salicin hat sonach die Zusammensetzung:

|                       |         |       |
|-----------------------|---------|-------|
| 21 At. Kohlenstoff... | 1607,24 | 60,49 |
| 24 „ Wasserstoff..    | 149,76  | 5,63  |
| 9 „ Sauerstoff....    | 900,00  | 33,80 |
|                       | <hr/>   |       |
|                       | 2657,00 | 100.  |

Das Salicinbleioxyd besteht aus:

|                              |        |      | Versuch |
|------------------------------|--------|------|---------|
| 1 At. wasserfreiem Salicin.. | 2657,0 | 38,8 | 36,89   |
| 3 „ Bleioxyd.....            | 4183,5 | 61,2 | 63,11   |
|                              | <hr/>  |      |         |
|                              | 6840,5 | 100. | 100.    |

Das krystallisirte Salicin ist zusammengesetzt aus:

|                       |         |       |
|-----------------------|---------|-------|
| 21 At. Kohlenstoff... | 1607,24 | 55,76 |
| 28 „ Wasserstoff..    | 174,72  | 6,06  |
| 11 „ Sauerstoff....   | 1110,00 | 38,18 |
|                       | <hr/>   |       |
|                       | 2881,96 | 100.  |

### *Einwirkung der Säuren auf Salicin.*

Durch Erhitzen von Salicin mit schwefelsäurehaltigem Wasser bildet sich nach Braconnot beim Erkalten der Flüssigkeit eine in Ansehn und der Krystallform von Salicin abweichende Materie. Diese Substanz hat nach P. aber sonst dieselben Eigenschaften und dieselbe Zusammensetzung wie das Salicin. Sie scheint sich aber nicht in allen Fällen zu bilden. Durch concentrirte Schwefelsäure und Salzsäure wird das Salicin in eine Art Harz verwandelt, wie Braconnot fand; auch die meisten andern Säuren in sehr verdünnter Auflösung bewirken nach Piria diese Veränderung, wenn die Flüssigkeit bis zum Sieden erhitzt wird. P. nennt diese harzartige Substanz *Saliretin*. Je verdünnter die Säure war, desto reiner im Allgemeinen ist das Product. Das Saliretin ist in Wasser und Ammoniak unlöslich, löslich in Alkohol, Aether und Essigsäure. In verdünnter Kali löst es sich auf, wird durch Säuren selbst wieder durch Kohlensäure als weißer gallertartiger Körper dargestellt. Durch concentr. Schwefelsäure wird es in Harz und durch Salpetersäure in Kohlenstickstoffsäure verwandelt. An der Umwandlung des Salicins in Saliretin hat der Sauerstoff der Luft keinen Antheil. Die abgesonderte Flüssigkeit enthält noch eine geringe Menge Materie aufgelöst, die Zucker und mit dem Rohrzucker völlig identisch ist.

### *Einwirkung des Chlors auf Salicin.*

In Wasser vertheiltes Salicin wird durch Chlorgas in eine orangegelbe Flüssigkeit aufgelöst, bei anhaltender Einwirkung d. Pharm. II. Reihe. XXIII. Bds. 2. Hft.

tendem Hineinleiten von Chlorgas tritt ein Zeitpunkt ein, wo die Flüssigkeit sich trübt und eine gelbe Materie sich abscheidet. Nach dem Auswaschen und Trocknen erscheint sie als eine gelbe perlmutterglänzende aus mikroskopischen Krystallen bestehende Materie, sie riecht unangenehm, schmeckt pfeffermünzartig, ist in Wasser und absolutem Alkohol wenig löslich, löslicher in wässrigem Alkohol. Ihre Zusammensetzung ist:

|        |                |         |       |
|--------|----------------|---------|-------|
| 21 At. | Kohlenstoff... | 1607,24 | 42,94 |
| 24 »   | Wasserstoff..  | 149,76  | 4,00  |
| 5 »    | Chlor .....    | 885,30  | 23,65 |
| 11 »   | Sauerstoff.... | 1110,00 | 29,41 |
|        |                | 3342,30 | 100.  |

Das Salicin verliert bei dieser Einwirkung 4 At. Wasserstoff und nimmt dafür 4 At. Chlor auf.

Läßt man Chlorgas in das Gemenge strömen, während man das Wasser auf ohngefähr 60° C. erhält, so bildet sich eine andere Substanz, eine ölarartige rothe an dem Boden sich ansammelnde Flüssigkeit, die die Consistenz des Terpentins und einen pfefferartigen Geschmack besitzt, in Wasser und Säuren unlöslich, in Alkohol Aether und Alkalien aber löslich ist. Die Zusammensetzung dieser Materie ist:

|        |                |         |       |
|--------|----------------|---------|-------|
| 21 At. | Kohlenstoff... | 1607,24 | 38,61 |
| 17 »   | Wasserstoff..  | 108,08  | 2,55  |
| 7 »    | Chlor.....     | 1549,27 | 37,22 |
| 9 »    | Sauerstoff.... | 900,00  | 21,62 |
|        |                | 4162,59 | 100.  |

Bei dieser Reaction verliert also das Salicin sein Wasser und verbindet sich im wasserfreien Zustande, indem es 7 At. Wasserstoff verliert, mit 7 At. Chlor.

Liebig bemerkt zu diesen Versuchen Piria's, daß nach seiner Ueberzeugung das Atomgewicht des Salicins eben so hoch angenommen werden müsse, als das des Amygdalins und zum Ausdruck seiner Zusammensetzung nach den übereinstimmenden Analysen von Piria, Otto Mulder, Jules, Gay-Lussac, Erdmann u. Marchand die Formel  $C^{42}H_{58}O_{22}$  gewählt werden müsse. Diese giebt:

|        |                |          |       |
|--------|----------------|----------|-------|
| 42 At. | Kohlenstoff... | 3221,017 | 55,69 |
| 58 »   | Wasserstoff..  | 361,905  | 6,26  |
| 22 »   | Sauerstoff.... | 2200,000 | 38,05 |
|        |                | 5782,932 | 100.  |

Was die Bildung des Saliretins betrifft, so haben wir, wenn von 1 At. Salicin die Elemente von 1 At. Traubenzucker sich trennen ( $C_{42}H_{58}O_{22} - C_{12}H_{22}O_{11}$ ),

( $C_{30}H_{30}O_8$ ), die Zusammensetzung des Saliretins zu:

|                       |         |       |
|-----------------------|---------|-------|
| 30 At. Kohlenstoff... | 2293,05 | 69,90 |
| 30 » Wasserstoff..    | 187,19  | 1,70  |
| 8 » Sauerstoff....    | 800,00  | 24,40 |

---

3280,24 100.

Damit stimmt auch Piria's Analyse überein. Er erhielt von einem andern Producte abweichende Resultate. Dieses liegt darin, daß dieses Product als wasserreiches Saliretin betrachtet werden muß; bestehend aus:

|                       |         |       |
|-----------------------|---------|-------|
| 30 At. Kohlenstoff... | 2293,05 | 72,38 |
| 28 » Wasserstoff..    | 174,71  | 5,51  |
| 7 » Sauerstoff....    | 700,00  | 22,11 |

---

3167,76 100.

Die Zusammensetzung des *Chlorsaliretins* betreffend, merkt Liebig, so ist es klar, daß darin 8 und 14 Wasserstoff durch ihre Aequivalente Chlor ersetzt werden. Die Zusammensetzung des einen ist also:

|                       |          |       |
|-----------------------|----------|-------|
| 42 At. Kohlenstoff... | 3221,027 | 42,93 |
| 50 » Wasserstoff..    | 311,987  | 4,16  |
| 8 » Chlor.....        | 1770,600 | 23,59 |
| 22 » Sauerstoff....   | 2200,000 | 29,32 |

---

7503,614 100.

Die Zusammensetzung des andern:

|                       |          |       |
|-----------------------|----------|-------|
| 42 At. Kohlenstoff... | 3221,027 | 38,59 |
| 36 » Wasserstoff..    | 224,631  | 2,67  |
| 14 » Chlor .....      | 3098,550 | 37,11 |
| 18 » Sauerstoff....   | 1800,000 | 21,63 |

---

8344,208 100.

Nimmt man an, daß im Salicinbleioxyd 6 At. Wasser sich getrennt haben und durch 6 At. Bleioxyd ersetzt wurden, so würde man folgende Zahlen für die theoretische Zusammensetzung erhalten:

|                       |          |       |
|-----------------------|----------|-------|
| 42 At. Kohlenstoff... | 3221,027 | 23,90 |
| 46 » Wasserstoff..    | 287,028  | 2,14  |
| 16 » Sauerstoff....   | 1600,000 | 4,87  |
| 6 » Bleioxyd....      | 8367,000 | 62,09 |

---

13475,055 100.

In der Voraussetzung, daß sich, wie Piria vertheilt, nur 4 At. Wasser abscheiden, und an dessen Stelle 6 At. Bleioxyd aufgenommen würden, was unahrscheinlich ist, würde man erhalten:

|                       |          |       |
|-----------------------|----------|-------|
| 42 At. Kohlenstoff... | 3221,027 | 23,51 |
| 50 » Wasserstoff..    | 311,987  | 2,27  |
| 18 » Sauerstoff....   | 1800,000 | 13,14 |
| 6 » Bleioxyd ....     | 8367,000 | 61,08 |

---

13700,014 100.

Piria nimmt nun diese letztere als die wahrschein-

lichere an, allein der constant grössere Bleioxydgehalt, welchen seine Analysen ergeben, wenn man nicht voraussetzen will, daß dem Bleioxydniederschlage basisch essigs. Bleioxyd beigemischt war, spricht für die grössere Wahrscheinlichkeit der ersten. Zudem ist zu bemerken, daß Erdmann bei Untersuchung des Salicinbleioxyds so abweichende Resultate erhielt, daß er keine Formel dafür zu berechnen vermochte. Jedenfalls läßt sich aus allem diesem schliessen, daß die Analyse dieser Bleiverbindung keinen sichern Anhaltspunct für die Festsetzung der Zusammensetzung des wasserfreien Salicins abgeben könne. (*Annal. der Pharmacie* XXX, 151 u. 185.)

## Ueber das Phloridzin.

Eine ausführliche Untersuchung über das Phloridzin hat St a f s unternommen \*), ähnlich der von Piria über das Salicin. Das Phloridzin läßt sich leicht darstellen, wenn man eine kochende concentrirte Abkochung der Apfelrinde erkalten läßt, und die ausgeschiedenen Krystalle reinigt. Diese Methode genügt aber nur bei Arbeiten in kleinen Quantitäten. In der Wurzelrinde des Apfelbaums ist nämlich ausser anderen Substanzen noch eine feste, farblose, unkrystallisirbare, adstringirend schmeckende Materie enthalten, welche den Sauerstoff der Luft rasch anzieht und dadurch in ein rothes Harz umgewandelt wird, das die Krystallisation des Phloridzins hindert. Diese Materie wirkt natürlich besonders nachtheilig während der Zeit, die zum Auskochen grosser Mengen der Rinden nöthig ist. Am besten ist es, die Rinde mit Spiritus von 50 bis 60 Proc. auszuziehen, den Alkohol abzudestilliren und das auskrystallisirte Phloridzin durch Behandeln mit Thierkohle zu reinigen.

Die Zusammensetzung des krystallisirten Phloridzins bestimmt St. nach seinen Analysen zu:

|                         |         |      |
|-------------------------|---------|------|
| 32 At. Kohlenstoff..... | 2448,64 | 54,2 |
| 42 „ Wasserstoff.....   | 262,50  | 5,8  |
| 18 „ Sauerstoff.....    | 1800,00 | 40,0 |

4511,14    100.

Bei 100° C. verliert das Phloridzin sein krystallinisches Ansehn unter Verlust von Wasser, bei 109° ist es völlig geschmolzen, darauf wird es wieder fest und bei 130° ist es hart wie arabisches Gummi, bei 160°

\*) Annales de Chemie et de Physic. LXIX, 367.



milzt es von neuem, über  $200^{\circ}$  kommt es in lebhaftes Kochen, giebt Wasser ab und wird bei  $350^{\circ}$  C. zersetzt. Bei  $106^{\circ}$  verliert das Phloridzin seinen ganzen Wassergehalt, 7,8 Proc.; der rothe Körper, den es bei  $200^{\circ}$  bildet, ist eher das Resultat einer Zersetzung einer bloßen Wasserentziehung.

Das bei  $106^{\circ}$  geschmolzene und bei  $130^{\circ}$  wieder erst gewordene Phloridzin besitzt noch alle seine vorerwähnten Eigenschaften. Das durch Schmelzen dieses entstandene Product hat ebenfalls noch alle chemischen Eigenschaften des Phloridzins, es ist aber weniger löslich in Wasser und scheidet sich aus seiner Auflösung krystallisirt ab; wird die wässrige Auflösung einige Zeit gekocht, so erlangt es wieder Krystallisationsfähigkeit. Es scheint also hier ein Fall von Dimorphismus vorhanden zu sein.

Der Gewichtsverlust, welchen das krystallisirte Phloridzin in der Wärme erleidet, entspricht 3 Atomen Wasser, 7,5 Proc. Die Elementaranalyse des getrockneten Phloridzins führte diesem entsprechend zu der Zusammensetzung:

|                         |         |      |
|-------------------------|---------|------|
| 32 At. Kohlenstoff..... | 2448,64 | 58,6 |
| 36 » Wasserstoff....    | 225,00  | 5,4  |
| 15 » Sauerstoff.....    | 1500,00 | 36,0 |
|                         | <hr/>   |      |
|                         | 4173,64 | 100. |

Das krystallisirte Phloridzin verliert also durch Wärme 3 Atome Wasser, durch seine Verbindung mit Bleioxyd verliert es noch 3 Atome Wasser. Hieraus ergeben sich  $C_{32}H_{30}O_{12}$  = wasserfreies Phloridzin,  $C_{32}H_{30}O_{12} + 3H_2O$  = getrocknetes Phloridzin,  $C_{32}H_{30}O_{12} + 3H_2O + 3Aq.$  = krystallisirtes Phloridzin.

Was das Phloridzinbleioxyd betrifft, so stellte St. dasselbe durch Fällen von basisch essigs. Bleioxyd mit eiskochenden Auflösung von Phloridzin dar, die im reichlichen Ueberschuß angewandt wurde. Aus den Analysen des Niederschlags berechnete St. folgende Verhältnisse.

|                        |         |      |
|------------------------|---------|------|
| 32 At. Kohlenstoff.... | 2448,64 | 26,0 |
| 30 » Wasserstoff....   | 127,50  | 1,9  |
| 12 » Sauerstoff.....   | 1200,00 | 12,9 |
| 4 » Bleioxyd.....      | 5578,00 | 59,2 |
|                        | <hr/>   |      |
|                        | 9414,14 | 100. |

Die darin enthaltene organische Materie, das wasserfreie Phloridzin, ist also zusammengesetzt aus:

|                        |        |      |
|------------------------|--------|------|
| 32 At. Kohlenstoff.... | 2448,6 | 63,8 |
| 30 » Wasserstoff....   | 187,5  | 4,9  |
| 12 » Sauerstoff.....   | 1200,0 | 31,3 |
|                        | <hr/>  |      |
|                        | 3836,1 | 100. |

*Einwirkung der Säuren auf Phloridzin.*

Das Phloridzin löst sich in allen verdünnten Mineralsäuren, auch in Oxalsäure in der Kälte auf; wird die Auflösung aber auf 80 bis 90° erwärmt, so entsteht eine analoge Zersetzung wie beim Salicin, es bildet sich ein krystallinischer Niederschlag, *Phloretin*, und in der Auflösung findet man *Traubenzucker*. Alle verdünnte Säuren bewirken diese Zersetzung, ausgenommen Salpetersäure und Chromsäure.

Das Phloretin ist weiß, krystallisirt in Blättchen, schmeckt süßlich, ist in kaltem Wasser unlöslich, in kochendem Wasser und Aether schwerlöslich, in Alkohol und Holzgeist leichtlöslich. Bei 160° erhitzt, so wohl für sich, als in Verbindung mit Bleioxyd, verliert es kein Wasser; bei 180° schmilzt es und wird bei stärkerem Erhitzen zersetzt. In Säuren löst es sich unzersetzt auf. Salpetersäure endlich verwandelt es in einen rothen Körper, gleich dem den dieselbe Säure mit Phloridzin bildet; durch Chromsäure wird das Phloretin in Ameisensäure und Kohlensäure verwandelt. Von den Auflösungen der Alkalien wird es unverändert aufgenommen, wenn kein Luftzutritt statt findet, gegen theils wird Sauerstoff absorbirt und das Phloretin in einen orangegelben Körper umgeändert, wahrscheinlich denselben, den das Phloridzin unter gleichen Umständen bildet.

Die Zusammensetzung des Phloretins berechnet Stafs nach seinen Analysen zu

|                        |      |      |
|------------------------|------|------|
| 24 At. Kohlenstoff.... | 1836 | 66,2 |
| 22 „ Wasserstoff.....  | 137  | 4,9  |
| 8 „ Sauerstoff.....    | 800  | 28,9 |

---

2773 100.

Es absorbirt 13,5 bis 14,18 Proc. Ammoniak, wobei es kein Wasser verliert. In concentrirter Ammoniakflüssigkeit löst es sich auf, fällt aber als Ammoniakverbindung in kleinen gelben Körnern nieder. Die Auflösung dieser Verbindung fällt Mangan-, Eisen-, Zink-, Kupfer-, Bleioxyd-, Silbersalze. In dem Phloretinbleioxyd sind 4 At. Bleioxyd enthalten, die organische Materie darin ist aber ebenso wie in dem Phloretinbleioxyd von derselben Zusammensetzung wie das freie Phloretin. Es wird also durch die Basen kein Wasser daraus abgeschieden.

Die Zersetzung des Phloridzins durch Säuren wird folgende Gleichung versinnlichen: trocknes Phloridzin

$2 \text{H}_{36} \text{O}_{15} = \text{Phloretin}, \text{C}_{24} \text{H}_{22} \text{O}_8 + \frac{1}{2} \text{At. wasser-}$   
 er Traubenzucker,  $\text{C}_6 \text{H}_{14} \text{O}_7$ .

Diese Zersetzung des Phloridzins wie des Salicins  
 ch Säuren, wobei sich Zucker ergibt, dürfte auf  
 Vorstellung von der Bildung des Zuckers in den  
 ichten Einfluß haben. Der Zucker, der sich in den  
 ichten vorfindet, könnte wohl das Resultat zersetzen-

Einwirkung der Säuren sein, die sich in diesen  
 ichten stets finden, auf noch nicht isolirte oder in  
 ser Richtung noch nicht untersuchte Materien.

Durch Behandeln mit concentrirter Salpetersäure  
 ed das Phloridzin in Oxalsäure und eine dunkelrothe  
 terie verwandelt. Letzte wird durch Auflösen in  
 em Alkali und Fällen durch eine Säure gereinigt.  
 als nennt sie *Phloretinsäure*. Sie ist dunkelbraun,  
 krystallisirbar, unlöslich in Wasser, löslich in Alko-  
 und Alkalien, unlöslich in verdünnten Säuren, von  
 centrirter Schwefelsäure wird sie mit blutrother  
 be aufgelöst. Phloretin liefert durch Salpetersäure  
 selbe Substanz.

Die Analyse der Phloretinsäure führte zu folgender  
 sammensetzung:

|                         |      |      |
|-------------------------|------|------|
| 24 At. Kohlenstoff..... | 1836 | 55,1 |
| 20 » Wasserstoff....    | 125  | 3,7  |
| 2 » Stickstoff.....     | 177  | 5,3  |
| 12 » Sauerstoff.....    | 1200 | 25,9 |

333,8 100.

Aus der Vergleichung dieser Formel mit der des  
 oretins ergibt sich, daß jedes At. Phloretin 2 At.  
 usserstoff verliert und  $\text{N}_2 \text{O}_4$  aufnimmt. Das Phlo-  
 zin zerfällt in dieser Zersetzung gewissermaßen erst  
 Zucker und Phloretin, erster giebt die Oxalsäure,  
 ulensäure, Wasser, letztes die Phloretinsäure.

#### *Einwirkung des Ammoniaks.*

Das krystallisirte Phloridzin absorhirt 10 bis 12  
 c. Ammoniak, schmilzt erst darin und bildet nach  
 Sättigung eine farblose Masse. Wird diese der  
 wirkung feuchter Luft ausgesetzt, so vermindert  
 sich, wird orange, purpurroth und endlich blau un-  
 Aufnahme von Sauerstoff. Die Untersuchung dieser  
 en Masse ist sehr schwierig, weil sie ebenfalls  
 zersetzt wird, und andere Producte entstehen,  
 sie verunreinigen. Wenn die Masse keinen gro-  
 Ueberschuß von Ammoniak enthält, so läßt sich  
 blaue Körper durch starken Alkohol scheiden. Man  
 gt die in wenig Wasser zertheilte Materie in einen

großen Ueberschuß von Alkohol, wodurch ein blauer Niederschlag entsteht, das noch beigemengte Phloridzin und der extractartige Körper, der sich mit bildet aber aufgelöst bleiben. Der Niederschlag wird zwischen Löschpapier gepreßt, in absolutem Alkohol gekocht, um einen Rückhalt löslicher Materien noch zu entfernen und nach Auflösen in Ammoniak unter einer Klocke verdampft, die trocknes Kali enthält. Die so erhaltene Substanz ist purpurblau mit Kupferschein, fest, unkrySTALLISIRBAR, an trockner Luft beständig, leichtlöslich in kaltem Wasser mit schöner blauer Farbe, welche Auflösung schon beim Erwärmen zersetzt wird, indem unter Entwicklung von Ammoniak ein rother Körper niederfällt. Durch desoxydirende Mittel, Schwefelwasserstoff, Schwefelwasserstoff-Ammoniak, und in Kali gelöstes Zinnoxydul, wird die blaue Materie entfärbt; an der Luft aber absorbiert die farblose Auflösung rasch Sauerstoff und wird wieder blau. Die Auflösung fällt Eisen-, Zink-, Blei- und Silbersalz, indem ein entsprechendes Ammoniaksalz in Auflösung bleibt.

Offenbar ist die blaue Materie das Ammoniaksalz des rothen Körpers, eines neuen Farbstoffs, den St. m. dem Namen *Phloridzein* belegt, und den man am besten auf folgende Weise darstellt. Die nach oben angegebene Weise erhaltene blaue Ammoniakverbindung wird in wenig Wasser aufgelöst und dieser Auflösung tropfenweise mit Essigsäure versetzter Alkohol zugefügt, aber nicht im Ueberschuß, der Niederschlag wird mit starkem Alkohol ausgewaschen und ist das Phloridzein.


Das Phloridzein ist fest, amorph, in Masse von Ansehen eines rothen Harzes, auf dem Bruch glänzend, in dünnen Stücken durchsichtig, gepulvert dem unter ähnlichen Umständen aus dem Orcin entstandenen Orcin völlig gleichend, es schmeckt etwas bitter und wird durch Erhitzen zersetzt, ohne zu schmelzen oder zu sublimiren. In kochendem Wasser ist es löslich, in kaltem löst es sich wenig auf; Alkohol, Holzgeist und Aether färben sich braun damit, durch Chlor und Salpetersäure wird es zersetzt, und durch Alkalien verwandelt es sich bei Zutritt der Luft in eine bräunliche Materie, von concentrirten Säuren wird es mit blauer rother Farbe aufgelöst. Die Analysen des Phloridzeins führen zu folgender Zusammensetzung.

|    |                      |      |      |
|----|----------------------|------|------|
| 64 | At. Kohlenstoff..... | 4897 | 48,0 |
| 90 | » Wasserstoff.....   | 562  | 5,5  |
| 6  | » Stickstoff.....    | 531  | 5,1  |
| 42 | » Sauerstoff.....    | 4200 | 41,4 |

---

10190    100.

Die wissenschaftlichen Formeln für diesen Körper und mehrere seiner Verbindungen sind:



### *Einwirkung der Alkalien.*

Das Phloridzin löst sich in Alkalien mit blafsgelber Farbe auf, die Auflösung verändert sich bei Luftabfluß nicht. Eine kochende Kalilauge von 45° B. scheint wie die Säuren zu wirken, sie verändert den Zucker in eine schwarze Säure. Setzt man Phloridzin in einer Kalkmilch, so wird Kalk darin aufgelöst und wird die Auflösung unter der Luftpumpe rasch eingedampft, so erhält man eine gelbe krystallinische Masse, die einer zweibasischen Verbindung des bei 106° C. getrockneten Phloridzins entspricht. Sie besteht aus

|                                                  |              |            |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|
| $\text{C}_{32} \text{H}_{36} \text{O}_{15}$ .... | 4173,6       | 75,4       |
| 2 Ca O.....                                      | 712,0        | 14,6       |
|                                                  | <hr/> 4885,6 | <hr/> 100. |

Ganz analog verhält sich die Barytverbindung, sie besteht aus

|                                                  |              |            |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|
| $\text{C}_{32} \text{H}_{36} \text{O}_{15}$ .... | 4173,7       | 68,9       |
| 2 Ba O.....                                      | 1913,7       | 31,1       |
|                                                  | <hr/> 6087,4 | <hr/> 100. |

Durch Einwirkung der Luft werden die Auflösungen der Verbindungen des Phloridzins mit Alkalien ersetzt, unter Verschwinden der alkalischen Reaction werden sie rothbraun, unter Entwicklung von Kohlensäure, Essigsäure und einem rothbräunlichen Farbstoff.

Wahrscheinlich bilden hierbei die Elemente, die unter Einfluß der Säuren in Zucker übergehen, Essigsäure und das Phloretin die bräunliche Materie. Dieselbe Materie bildet sich auch, wenn das Phloretin der Einwirkung der feuchten Luft und eines Alkalis ausgesetzt wird.

## Ueber die Beziehungen zwischen Phloridzin und Salicin und ihre Zusammensetzung.

Die Aehnlichkeit zwischen Phloridzin und Salicin veranlaßte schon Mulder, zwischen beiden Beziehungen aufzusuchen. Er nimmt nach seinen Analysen \*) an, daß das krystallisirte Phloridzin die Elemente

\*) Annalen der Pharmacie. XXIX, 298.



von einem Atom Wasser mehr enthalte als das krystallisirte Salicin, in der Bleiverbindung aber beide gleiche Zusammensetzung haben, indem das Salicin darin 2 At., das Phloridzin 3 At. Wasser verliere. Liebig stellt eine andere Interpretation der Analysen auf, wonach er das Phloridzin für Salicin + 2 At. Sauerstoff erklärt, und ihm demgemäß die Formel ertheilt:  $C_{42}H_{58}O_{14}$ , die folgende Verhältnisse giebt:

|              |          | Mittel der Analyse<br>von Stafs. | Mittel der Analyse<br>von Mulder. |
|--------------|----------|----------------------------------|-----------------------------------|
| $C_{42}$ ... | 3221,027 | 53,83                            | 53,77                             |
| $H_{58}$ ... | 365,905  | 6,05                             | 6,09                              |
| $O_{14}$ ... | 2400,000 | 40,12                            | 40,14                             |
|              | 5986,932 | 100.                             | 100.                              |

Diese Formel ist nicht nur der nächste Ausdruck für diese Analysen, sondern auch der Schlüssel zu den von Stafs beobachteten Zersetzungsproducten.

Der Wasserverlust des Phloridzins durch Trocknen bei  $106^{\circ}$  C. beträgt nach dieser Formel 4 At. Das getrocknete Phloridzin besteht aus

|              |          | Stafs. | Mulder. | Erdmann. |
|--------------|----------|--------|---------|----------|
| $C_{42}$ ... | 3221,027 | 58,21  | 57,42   | 57,67    |
| $H_{50}$ ... | 311,987  | 5,63   | 5,66    | 5,89     |
| $O_{20}$ ... | 2000,000 | 36,16  | 36,92   | 36,44    |
|              | 5533,014 | 100.   | 100.    | 100.     |

In dem *Phloridzin-Bleioxyd* nimmt Stafs 4 At. Bleioxyd an, diese müßten 6 At. Wasser des krystallisirten, oder 3 At. Wasser des trocknen Phloridzins vertreten, was nothwendig einer Bestätigung bedarf. Aus den Versuchen von Stafs geht hervor, daß die Menge des Bleioxyds in der Verbindung nach der Temperatur wechselt, in welcher die Fällung vorgenommen wird, und zwar von 55 bis 60 Proc. Liebig giebt für die Verbindung die Formel:

|                        |           |       |
|------------------------|-----------|-------|
| 42 At. Kohlenstoff.... | 3221,027  | 23,56 |
| 46 » Wasserstoff....   | 287,028   | 2,09  |
| 18 » Sauerstoff.....   | 1800,000  | 13,17 |
| 6 » Bleioxyd.....      | 8367,000  | 61,18 |
|                        | 13675,055 | 100.  |

Bei der Bildung des *Phloridzinkalks* werden 3 At. Wasser aus dem Phloridzin abgeschieden und durch 3 At. Kalk ersetzt.

|                                  |          |            |
|----------------------------------|----------|------------|
| 1 At. wasserfreies Phloridzin... | 5533,027 |            |
| 3 » Kalk.....                    | 1068,060 | 15,6 Proc. |
| 1 » Wasser.....                  | 112,47   |            |
|                                  | 6713,53  |            |

Die *Barytverbindung* enthält:

|                                  |           |            |
|----------------------------------|-----------|------------|
| 2 At. wasserfreies Phloridzin... | 11066,028 |            |
| 5 „ Baryt.....                   | 4784,000  | 30,3 Proc. |
|                                  | 15850,028 |            |

Wenn die Zersetzung des Phloridzins durch Mineralsäuren in Zucker und Phloretin, der des Saliretins er gleichen Umständen ähnlich ist, so muß das Phloretin dieselbe Zusammensetzung haben wie das Saliretin 2 At. Sauerstoff. Die Elemente des Phloridzins,  $H_{58} O_{24}$ , — der des Traubenzuckers,  $C_{12} H_{22} O_{14}$ , lassen die Formel des Phloretins geben,  $= C_{30} H_{30}$ . Entspricht die für das Phloridzin gewählte Formel Wahrheit, so muß die Analyse des Phloretins mit hier entwickelten Formel übereinstimmen.

| Analysen von Stafs. |         |       |      |      |       |
|---------------------|---------|-------|------|------|-------|
| 30 C ..             | 2293,05 | 65,89 | 65,9 | 65,4 | 65,70 |
| 30 H ..             | 187,20  | 5,37  | 5,4  | 5,4  | 5,26  |
| 10 O ..             | 1000,06 | 28,74 | 28,7 | 29,2 | 29,04 |
|                     | 3480,2  | 100.  | 100. | 100. | 100.  |

Der einfachste Ausdruck für die Zusammensetzung Phloretins würde sein  $C_3 H_3 O$ , welches 4 mal genommen die Menge ist, die sich mit 1 At. Ammoniak bindet, 13,5 Proc., was mit den Versuchen von Stafs übereinstimmt. Man könnte hieraus schließen, daß Phloretin 1 Aeq. Wasser enthält, was durch Bleioxyd einem basischen Salze nothwendig ersetzt sein muß. Ammoniakverbindung müßte hiernach sein  $C_{12} H_{12} O_3 + N_2 H_5 O$ , die basische Bleiverbindung  $C_{12} H_{12} O_3 + 2 Pb O$ . Dieser Gegenstand bedarf noch einer weiteren Untersuchung.

Die Zusammensetzung der *Phloretinsäure* kann mit größerer Wahrscheinlichkeit durch die Formel  $C_{30} H_{24} N_2$  oder durch  $C_{24} H_{18} O_{12} N_2$  ausgedrückt werden.

Das *Phloridzein* entsteht durch gleichzeitige Einklinkung von Ammoniak und Sauerstoff auf das Phloridzin auf ähnliche Weise wie das Orcin aus dem Orcein.

1 At. Phloridzin .....  $C_{42} H_{58} O_{24}$   
 + 2 Aeq. Ammoniak und 8 At. Sauerstoff  $H_{12} O_8 N_4$

— 6 At. Wasser.....  $C_{42} H_{70} O_{32} N_4$   
 $H_{12} O_6$

Diese Formel giebt:

| Mittel der Analysen von Stafs. |          |       |      |
|--------------------------------|----------|-------|------|
| 42 At. Kohlenstoff...          | 3221,027 | 49,16 | 48,8 |
| 58 „ Wasserstoff...            | 361,906  | 5,58  | 5,6  |
| 26 „ Sauerstoff....            | 2600,000 | 39,81 | 40,4 |
| 6 „ Stickstoff.....            | 354,080  | 5,45  | 5,2  |
|                                | 6537,013 | 100.  | 100. |

Die Formel für die Verbindung des Phloridzeins dem Ammoniak entsteht durch die des Phlorid + 1 Aeq. Ammoniak; sie ist:

|                       |          |       | Mittel der Analyse<br>von Stafs. |
|-----------------------|----------|-------|----------------------------------|
| 42 At. Kohlenstoff... | 3221,027 | 47,77 | 45,9                             |
| 64 „ Wasserstoff...   | 399,344  | 5,90  | 6,2                              |
| 26 „ Sauerstoff.....  | 2600,000 | 38,48 | 41,4                             |
| 6 „ Stickstoff.....   | 531,020  | 7,85  | 6,5                              |
|                       | 6751,491 | 100.  | 100.                             |

Wenn in der Bleioxydverbindung, die durch die Auflösung von Phloridzein-Ammoniak mit dreifach basisch essigs. Bleioxyd entsteht, 2 At. Wasser des Phloridzeins durch 2 At. Bleioxyd vertreten sind, so muß 100 Th. der Verbindung 30,6 Procent Bleioxyd enthalten, Stafs erhielt 30,55 und 30,87.

Die Formeln des Salicins und Phloridzins sowie ihrer Verbindungen sind demnach folgende:

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Salicin .....                | C <sub>42</sub> H <sub>46</sub> O <sub>16</sub> + 6 aq.                         |
| „ in der Bleiverbindung..... | C <sub>42</sub> H <sub>46</sub> O <sub>16</sub>                                 |
| Salicinbleioxyd .....        | C <sub>42</sub> H <sub>46</sub> O <sub>16</sub> + 6 Pb O                        |
| Erstes Chlorsaliretin.....   | C <sub>42</sub> H <sub>50</sub> O <sub>22</sub> Cl <sub>3</sub>                 |
| Zweites „ .....              | C <sub>42</sub> H <sub>36</sub> O <sub>18</sub> Cl <sub>14</sub>                |
| Erstes Saliretin.....        | C <sub>30</sub> H <sub>30</sub> O <sub>8</sub>                                  |
| Zweites „ .....              | C <sub>30</sub> H <sub>28</sub> O <sub>7</sub>                                  |
| Phloridzin.....              | C <sub>42</sub> H <sub>46</sub> O <sub>18</sub> + 6 aq.                         |
| „ bei 100° C. getrocknet     | C <sub>42</sub> H <sub>46</sub> O <sub>18</sub> + 2 aq.                         |
| „ hypothet. wasserfrei...    | C <sub>42</sub> H <sub>46</sub> O <sub>18</sub>                                 |
| Kalkverbindung.....          | C <sub>42</sub> H <sub>46</sub> O <sub>18</sub> + 3 Ca O<br>3 aq.               |
| Bleioxydverbindung.....      | C <sub>42</sub> H <sub>46</sub> O <sub>18</sub> + 6 Pb O                        |
| Phloridzein .....            | C <sub>42</sub> H <sub>58</sub> O <sub>26</sub> N <sub>4</sub>                  |
| Ammoniakverbindung.....      | C <sub>42</sub> H <sub>58</sub> O <sub>26</sub> N <sub>4</sub> + N <sub>1</sub> |
| Bleioxydverbindung.....      | C <sub>42</sub> H <sub>58</sub> O <sub>26</sub> N <sub>4</sub> + Pb O           |
| Phlorethin .....             | C <sub>30</sub> H <sub>30</sub> O <sub>10</sub>                                 |

## Ueber die Bestandtheile von *Chelidonium majus*.

Wir verdanken Hrn. Poley die Entdeckung neuer Stoffe im Chelidonium oder Schöllkraut. Gleichzeitig hat auch Hr. Dr. Probst in Heidelberg mit der Untersuchung dieses Krautes sich beschäftigt. Wir wollen die Resultate seiner Untersuchung hier führen. Er fand in der Pflanze folgende besondere Stoffe:

\*) Dieses Archiv 2. R. XVI, 77.

\*\*) Annalen der Pharmacie. XXIX, 113.

Eine eigenthümliche Säure, *Chelidonsäure*

Ein mit Säuren neutrale Salze bildendes Alkaloid, *Chelerythrin* genannt, wegen der rothen Farbe.

Ein Alkaloid, welches nur saure Salze bildet, *Chelidonin*.

Einen indifferenten krystallisirbaren gelben Bitterstoff, *Chelidoxanthin*.

#### *Chelidonsäure.*

Man stellt diese Säure auf folgende Weise dar. Die Wurzel oder Wurzel werden mit kohlensaures Natronigem Wasser digerirt (durch den Natronzusatz verhindert man, daß Chelidonin und Chelerythrin und einige andere Substanzen mit in den Auszug übergehen), der Auszug wird mit Salpetersäure übersäuert, und dann mit salpetersaurem Bleioxyd gefällt. Der gelblichgraue Niederschlag wird mit Wasser, dem  $\frac{1}{30}$  Salpetersäure zugesetzt ist, angerührt, durch die freie Salpetersäure vermeidet man die gleichzeitige Mitfällung von Apfelsäure, Citronensäure, Weinsäure und Phosphorsäure, und noch einigen anderen Substanzen, die durch die freie Salpetersäure weggenommen werden. Der Niederschlag wird dann durch Schwefelnatrium zerlegt, sammt dem Bleisulfid mit Thierkohle aufgekocht, während zur Zersetzung des überschüssigen Schwefelnatriums Säure zugefügt wird. Die neutrale Lösung wird hierauf filtrirt, eingedunstet und mit verdünnter Schwefelsäure versetzt, lange noch Chelidonsäure sich abscheidet, die man abmilt, und durch wiederholtes Auflösen in kochendem Wasser reinigt. Ist die Säure noch nicht rein, giebt sie

mit Natron noch braune oder gelbe Auflösungen, so kocht man sie nochmals an salpeters. Blei, digerirt mit salpetersäurehaltigem Wasser und verfährt wie oben.

Die *Chelidonsäure* ist farblos, bildet kleine Krystalle, schmeckt stark sauer, wird durch Erhitzen, ohne zu sublimiren, zersetzt. Die bei 100° C. getrocknete Säure erfordert 166 Th. Wasser von 8° C. zur Auflösung, und 709 Th. Alkohol von 75° R. und 22° C. Von siedendem Wasser erfordert sie 26 Th.; die Lösung erstarrt beim Erkalten breiartig. Die Lösung der Säure in kaltem Wasser wird durch Kalkwasser in der Kälte nicht getrübt, beim Erhitzen aber entsteht ein flockiger Niederschlag, wenn Kalküberschuß vorhanden ist, nicht bei neutraler Schmelze. Bleisalze bringen in der Lösung der Säure sogleich weißse Niederschläge hervor; setzt man zur Lösung der Säure etwas Salpetersäure und dann salpetersaures Bleioxyd zu, so erfolgt der Niederschlag

vorwiegend in seinen säubenschülferartigen Nadeln: dies ist eine charakteristische Reaction der Säure.

Das *chelidonsaure Kali* krystallisirt in fadenförmig vereinigten Nadeln, ist sehr leicht löslich in Wasser. Das *chelidonsaure Natrium* bildet kleine Prismen, ebenfalls sehr leicht, löst sich in 15,5 Wasser von 15° C. *Chelidonsaures Ammoniak* ist leichter löslich und schwieriger krystallisirbar, als die vorigen Salze. *Chelidonsaure Baryt* erscheint als ein körnig krystallinisches schwachliches Pulver. *Chelidonsaures Strontium* und *chelidonsaure Kalk* krystallisiren in rarten verfilzten Nadeln, *chelidonsaure Magnesia* in quirlförmig vereinigten Gruppen und verwittert an der Luft. Das *chelidonsaure Zinkoxyd* schmeckt süßlich schrumpfsend, reagirt sauer, erfordert 146 Wasser von 16° C. zur Auflösung, voll von ger heisses. Das *chelidonsaure Kupferoxyd* bildet graue in Wasser schwerlösliche Prismen. Das *chelidonsaure Silberoxyd* erscheint als käsiger Niederschlag, ist in Salpetersäure und Ammoniak leichtlöslich, wird bei 100° C. noch nicht zersetzt, in höheren Temperaturen mit starkem Verpuffen; es besteht aus 43,5 Säure und 56,5 Silberoxyd.

#### *Chelerythrin.*

Zur Darstellung dieser Substanz eignen sich am besten die Wurzeln, da der Krautsaft nur wenig davon enthält. Frische oder getrocknete Wurzeln oder den nach der Ausziehung mit kohlensaurem Natron bei der Bereitung der Chelidonsäure gebliebenen Rückstand zieht man mit Wasser, dem man etwas Schwefelsäure zugesetzt, aus, und fällt den Auszug mit Ammoniak. Der Niederschlag ausgewaschen und durch Pressen möglichst vom Wasser befreit, wird noch feucht mit schwefelsäurehaltigen Alkohol digerirt, der Auszug mit Wasser versetzt, der Alkohol abdestillirt und die Auflösung dann durch Ammoniak gefällt, der Niederschlag in sehr geringer Wärme getrocknet, zerrieben und mit Aether ausgezogen. Der Aetherauszug hinterläßt nach Verdunsten eine klebrige terpentinartige grünliche Masse, die mit wenig Salzsäure und Wasser behandelt wird, wobei eine harzartige Substanz ungelöst bleibt. Die salzsaure Auflösung ist dunkelroth, sie wird zur Trockne verdampft und dann mit Aether ausgewaschen, der das salzsaure Chelerythrin ungelöst läßt. Dieses löst man in der kleinsten Menge Wasser auf, wobei salzsaures Chelidonin zurückbleibt; die davon getrennte Auflösung wird wieder zur Trockne verdunstet und wieder aufgelöst, so lange als sich noch



saures Chelidonin abscheidet. Die letzte Lösung läßt verdampfen, nimmt den Rückstand in absolutem Alcohol auf und läßt freiwillig verdunsten, worauf das saure Chelerythrin zurückbleibt. Oder man fällt letzte wässrige Auflösung mit Ammoniak, löst den Niederschlag in Aether und läßt die Lösung verdunsten, das Chelerythrin zurückbleibt. So lange die Lösung in Säuren durch Ammoniak nicht so gefällt werden, die Flüssigkeit wasserklar und farblos wird, ist es rein.

Das Chelerythrin erscheint, aus seinen Auflösungen in Säuren gefällt, als ein käsiger Niederschlag, der getrocknet sich pülvern läßt und dessen Staub heftiges Niesen erregt; aus der Auflösung in Aether erhält man es als eine zähe, harzartige Masse, die nach und nach harzig glänzend erhärtet; aus absolutem Alkohol krystallisirt es durch freiwilligem Verdunsten in warzigen Krystallgruppen. Es ist unlöslich in Wasser, die Lösung in Alcohol hat einen brennend scharfen Geschmack, ist etwas bitter. Durch Säuren färbt sich das Chelerythrin orange, diese Farbe besitzen auch die Salze desselben. Die unlöslichen Salze schmecken brennend scharf und wirken narkotisch giftig. Die Farbe des Kurkumäpapiers ändert es nicht.

Das *schwefelsaure Chelerythrin* krystallisirt schwierig, ist leicht löslich in Wasser und Alcohol, nicht in Aether, luftbeständig, schmilzt beim Erhitzen wachsartig.

Das *phosphors. Chelerythrin* krystallisirt leichter, ist in Wasser und wasserhaltigem Weingeist leichtlöslich, in absolutem Alcohol aber schwerlöslich, in Aether unlöslich. Das *salzsaure Chelerythrin* ist krystallisirbar, in Wasser und Alcohol leichtlöslich, in Aether ebenfalls unlöslich. Das *chelidonsaure* und *essigsaure Chelerythrin* sind im Wasser und Alcohol ebenfalls leichtlöslich. Die Auflösungen der Chelerythrine werden durch Gallustinctur gefällt, der Niederschlag in Alcohol löslich.

### *Chelidonin.*

Das Chelidonin, schon von Geoffroy 1824 entdeckt, wurde von Leo Meier widersprochen, findet man in der Wurzel, dem Kraut und den unreifen Samenkapseln, reichlichsten in der Wurzel. Man erhält es auf folgende Weise: Der bei der Darstellung des Chelerythrins erhaltene mit Aether digerirte Ammoniak-Niederschlag wird in wenig mit Schwefelsäure versetztem

Wasser aufgelöst, und der Lösung das Doppelte concentrirter Salzsäure zugemischt. Es bildet sich bald ein körnig krystallinischer Niederschlag, den man mit ammoniakhaltigem Wasser digerirt, zur Entfernung der Säure, dann in schwefelsäurehaltigem Wasser auflöst und aufs Neue durch Salzsäure fällt, worauf man den Niederschlag wieder mit Ammoniak digerirt, in schwefelsäurehaltigem Wasser auflöst, durch Ammoniak fällt, und das Präcipitat mit kochendem Alkohol behandelt, wo nach Erkalten und Verdunsten das Chelidonin in farblosen Täfelchen krystallisirt. Da das Chelidonin viel Alkohol zu seiner Auflösung erfordert, so kann man es besser auch in Essigsäure auflösen, beim Verdunsten der Essigsäure wird es in schönen ausgebildeten Krystallen erhalten, indem die Essigsäure grösstentheils entweicht, das letzte aus den Mutterlaugen kann man durch Ammoniak abscheiden.

Das *schwefelsaure Chelidonin* krystallisirt bei freiwilligem Verdunsten der Auflösung, in der Wärme trocknet diese zu einer gummiartigen Substanz ein; es ist luftbeständig, in Wasser und Alkohol leichtlöslich, schmilzt bei  $60^{\circ}$  C., ohne zersetzt zu werden. Das *phosphorsaure Chelidonin* verhält sich ähnlich. Das *salpetersaure Chelidonin* bildet ansehnliche Krystalle und ist in Wasser schwerlöslich. Das *salzsaure Chelidonin* bildet krystallinische Salzkrusten und feine Krystalle, löst sich in 325 Wasser von  $18^{\circ}$  C. Das *essigsäure Chelidonin* ist leichtlöslich in Wasser und Alkohol und trocknet zu einer gummiartigen Masse ein, beim Verdunsten in der Wärme setzt die Auflösung Chelidonin ab. Die Chelidoninsalze werden durch Galläpfeltinctur gefällt.

Was die Wirkung der beiden beschriebenen Alkaloide betrifft, so ist das Chelidonin nicht giftig; 6 Gran schwefelsaures Chelidonin wurden einem Kaninchen eingegeben, ohne dass bemerkenswerthe Symptome darauf sich gezeigt hätten.  $\frac{1}{3}$  Gran schwefelsaures Chelerythrin brachte aber bei einem Kaninchen dieselben Vergiftungssymptome hervor, als das *Extract. Chelidon.*; der Tod erfolgte indess erst nach 10 Stunden.

#### *Chelidoxanthin.*

Das Chelidoxanthin findet sich in Wurzel, Kraut und Blüthe. Man stellt es am besten auf folgende Weise dar. Die zur Bereitung der Basen mit Schwefelsäure ausgezogene Wurzel wird mit heissem Wasser ausgezogen, so lange sich dieses noch gelb färbt, und

zug mit Bleizucker versetzt, so lange noch ein Niederschlag entsteht. Dieser wird entfernt, und dann der Flüssigkeit noch überschüssige Bleizuckerlösung hinzugefügt, worauf sie durch Schwefelwasserstoff gefällt wird, Schwefelblei wird mit kaltem Wasser, bis dieses den bitteren Geschmack und gelbe Farbe annimmt, gewaschen, worauf man es so lange mit Wasser auskocht, bis sich solches noch stark gelb färbt. Die gelben Ausfällungen läßt man verdampfen, den Rückstand mit Ammoniak digeriren, und dann mit Aether, und das Unlösliche mit absolutem Alkohol auskochen, welcher ein feines Pulver zurückläßt; die alkoholischen Auflösungen lassen verdunsten, und den Rückstand wäscht man kalt mit verdünnter Schwefelsäure, dann mit Ammoniak und schließlich mit Aether aus, worauf das Chelidoxanthin rein bleibt, das man durch Lösen in heißem Wasser und langsames Verdunsten (schwierig) in Krystallen erhalten kann.

Das Chelidoxanthin bildet eine gelbe bröckliche oder krystallinische Krusten und kurze nadelförmige Krystalle. Es ist in kaltem Wasser schwerlöslich, leichter in heißem; in Alkohol ist es ebenfalls löslich, leichter in wasserhaltigem, und unlöslich in Aether. Es ist sehr bitter. Seine Lösungen sind intensiv gelb, ein Theil färbt über 1000 Theile Wasser noch gelb. Säuren und Alkalien ändern die Farbe nicht um; concentrirter Schwefelsäure aber wird es mit gelber Farbe unter Entwicklung von Gasblasen aufgelöst. Chelidoxanthin gehört mit zu den wirksamen Bestandtheilen des Chelidoniums.

Ein flüchtiges Alkaloid liefs sich aus dem Chelidonium nicht abscheiden.

Hr. Apotheker Reuling in Umstadt bei Darmstadt hat sich ebenfalls mit einer Untersuchung des Schöllkrauts beschäftigt, und daraus ein Alkaloid dargestellt, welches er *Chelidonin* nennt\*).

Drei Pfund gröblich gepulverter Wurzel wurden mit Alkohol ausgezogen, der Weingeist wurde nach Zuvor von Wasser abdestillirt, der Rückstand mit verdünnter Schwefelsäure angesäuert, bis auf 4 Pfd. eingedampft, ein Pfd. schwefelsaures Natron darin aufgelöst, dann wieder 10 Unzen kohlenaures Kali zugesetzt; der dadurch erhaltene Niederschlag mit Alkohol 90% ausgezogen, die spirituösen Tincturen mit Thierseife behandelt, dann der Alkohol durch Destillation

entfernt, die rückständige Flüssigkeit, auf 24 Unzen eingedampft, wurde mit verdünnter Schwefelsäure stark angesäuert, zum Kochen erhitzt, filtrirt, 8 Unzen Glaubersalz darin aufgelöst und dann 4 Unzen kohlensaures Kali, der entstandene Niederschlag getrocknet, mit Thierkohle vermenget und hieraus das Chelidonin mit Aether ausgezogen. Die ätherischen Tincturen wurden mit 24 Unzen Wasser vermischt, der Aether abdestillirt, die rückständige Flüssigkeit mit etwas Schwefelsäure angesäuert und bis zur Auflösung des Chelidonins erwärmt, worauf es durch Ammoniakflüssigkeit wieder gefällt wurde. Es läßt sich auch aus dem spirituösen Schöllkrauttracte darstellen, welches man mit Aetzlauge vermischt, wiederholt mit Aether behandelt, den Aetherauszug verdunstet, den Rückstand, welchen dieser hinterlassen, in schwefelsäurehaltigem Wasser auflöst, mit kohlensaurem Kali fällt, und durch Wiederauflösen in Schwefelsäure und Fällen mit Ammoniak reinigt.

Das so dargestellte Chelidonin ist ein weißes krystallinisches Pulver, geruchlos, von bitterem, dem Chinin ähnlichen Geschmack, aber hintennach kratzend und scharf, jedoch nicht so scharf als das unreine Chelidonin, welches seine Schärfe einer besondern Substanz, wahrscheinlich die narkotische Wirkung bedingt, verdankt. Mit Wasser destillirt, ist es flüchtig; beim Erhitzen schmilzt es zu einer gelben harzartigen Masse, brennt mit gelber Flamme und hinterläßt eine glänzende poröse Kohle. Es ist schwerlöslich in Wasser, leichter in Aether und sehr leichtlöslich in Weingeist und aetherischen Oelen, auch in fetten Oelen ist es löslich. Aus der concentrirten spirituösen Auflösung krystallisiert es in Rhomboedern. Von concentrirter Salpetersäure wird es mit dunkel orangegelber Farbe aufgelöst, von Schwefelsäure mit karmoisinrother, zuletzt ins Schwarze übergehender. Wird es in heißer concentrirter Salpetersäure aufgelöst, so fällt es nach Erkalten als salzsaures Chelidonin nieder. Verdünnte starke Säuren färben es orangegelb, welche Färbung charakteristisch ist. Es bildet auch gelb gefärbte Salze, die einen bitteren Geschmack besitzen.

Das Chelidonin, welches Reuling dargestellt hat, enthält, wie die Vergleichung lehrt, auch Chelerythrin von Probst; Reuling erhielt orangegelb gefärbte Salze, während die des Chelidonins, nach Probst, farblos sind. Der Hauptsache nach mußte es aber auch aus dem Chelidonin (nach Probst) bestehen, da Reu-



g anführt, daß er etwa 5 Gran seines schwefelsauren Chelidonins eingenommen habe, ohne durch etwas mehr den bittern kratzend scharfen Geschmack belästigt sein; das Chelerythrin wirkt aber nach Probst sehr eig.

Die Darstellung der Alkaloide des Schöllkrauts, wie Pölex solche beschrieben hat, scheint auf eine einfache Weise zum Ziele zu führen. Das Chelidonin stimmt in seiner Beschreibung wesentlich mit dem von Probst gestellten überein, und das Alkaloid, welches er Pyrrin nennt, ist das Chelerythrin von Probst. Ein drittes Alkaloid konnte auch Pölex im Schöllkraute nicht auffinden.

## Darstellung des Solanins.

Ueber die Darstellung des Solanins hat Apotheker Pölex in Umstadt einige practische Bemerkungen getheilt\*). 1 — 4 Zoll lange gepülverte Kartoffelknollen werden mit schwefelsaurem Wasser ausgezogen;

Auszug versetzt man mit einem Ueberschuß von Ammoniak, erhitzt bis zum Kochen, und läßt den Niederschlag austrocknen, zerreibt und wäscht ihn auf einem Filter aus, bis die Flüssigkeit kaum noch gefärbt ist, darauf der Niederschlag getrocknet wird und eine schwarzbraune Masse darstellt, die zerrieben mit der gleichen Menge Weingeist von 85 Proc. einige Minuten gekocht und filtrirt wird. Die durchlaufende hellgelb gefärbte Flüssigkeit erstarrt schon während der Filtration zu mehr gelatinösen als krystallinischen Massen. Der auf dem Filter gebliebene Rückstand wird nochmals mit der 60fachen Menge Weingeist ausgekocht, Filtrat ist jetzt farblos und setzt eine beträchtliche Menge Solanin in Krystallen ab, die getrocknet blendend weiß und seidenglänzend erscheinen.

Die gelatinöse Beschaffenheit des ersten Niederschlages durch Ammoniak wird, wie schon Otto bemerkt\*\*) durch einen fremden harzigen Körper bewirkt, die Krystallisation verhindert. Man entfernt nach Pölex's Beobachtungen den fremden Körper am besten durch Ammoniak. Zu dem Ende behandelt man den durch Ammoniak erhaltenen Niederschlag von rohem Solanin, vor der Auskochung mit Weingeist, mit Am-

\* Annalen der Pharmacie XXX, 225.

\*\*) Siehe dieses Archiv 2. R. Bd. XVIII, 85.



moniak; man wäscht ihn damit aus bis die Flüssigkeit farblos abläuft und erhält dann schon bei der ersten Auskochung mit Spiritus vollkommen krystallisirtes Solanin. Hat man eine concentrirte Solaninlösung, welche kein krystallisirtes Solanin liefert, also mit Harz verunreinigt ist, so kann die Krystallisation leicht bewirkt werden, wenn man spirituöse Ammoniaklösung zusetzt und bis zum Kochen erhitzt.

## Beitrag zur chemischen Kenntniss des Chinins.

Nach Magouty\*) ist das Chinin im Wasser leichter löslich als man gewöhnlich angiebt, und leichter löslich in heissem Wasser als im kalten.

Bei 60° C. wird es wasserfrei. Aus einer wässrigen Auflösung ist es leicht, das Chinin krystallinisch darzustellen, während es bei einer alkoholischen schwer gelingt. In der Kälte werden die Chininsalze von Ammoniak nur theilweise zersetzt, wie dieses auch bei den Magnesiasalzen der Fall ist; ja M. fand, dass bei der Temperatur des kochenden Wassers die Ammoniaksalze vom Chinin zersetzt werden können.

## Neue Versuche über den schwarzen und weissen Senf.

Robiquet, Boutron und Fauré zeigten 1831 an, dass der schwarze Senf kein ätherisches Oel besitze, dass sich dasselbe aber sogleich erzeuge, sobald Wasser mit Senfmehl in Berührung komme, dass indessen diese Bildung verhindert werde, wenn das Wasser freie Schwefelsäure oder freies Kali enthalte, ferner, dass auch durch starken Alkohol die Schärfe des Senfmehls vernichtet werde. Simon zeigte nun, dass das Sinapisin desselben Samens wie das Amygdalin und so ätherisches Oel erzeuge. Derselbe zeigt auch den Unterschied zwischen weissen und schwarzen Senf, dass erster zwar Schärfe im Geschmack wahrnehmen lasse, wenn er mit Wasser angestossen werde, aber kein ätherisches Oel gebe.

\*) Journ. de med. pratique de Bordeaux. Mai 1839.

Boutron u. Fremy fanden dieselben Resultate. Sie, daß das Emulsin des schwarzen Senfs mit dem Bestandtheil desselben, welcher nach Bussy saures Kali ist, mit Wasser nur in sofern ätherisierbar erzeuge, als es im Wasser löslich ist, ist es durch Erhitzen bis zu 70 bis 80° C. oder durch Alkohol durch Schwefelsäure coagulirt, so daß es nachher Wasser nicht mehr aufgelöst wird, dann ist es nicht mehr fähig, ätherisches Senföl zu erzeugen. Die Substanz, welche aus dem weißen Senf durch Erhitzen entwickelt wird und kein ätherisches Oel ist, wird ebenfalls durch Einwirkung des Senfemulsins in Wasser auf Sulfosinapisin: außerdem werden noch andere Stoffe und namentlich Schwefelblausäure erzeugt. Das aus weißem Senf dargestellte Emulsin bildet mit dem bitteren Stoffe des schwarzen Senfs und Wasser ebenfalls ätherisches Senföl; allein mit süßen Mandeln und Leinsamen konnten Boutron und Fremy dasselbe nicht erzeugen.

Zu gleicher Zeit hatte auch Bussy seine Versuche der Akademie bekannt gemacht. Bussy erkannte den bitteren Stoff mit dem Namen Sinapin oder Sinapisin als einen natürlichen Kalisalz einer einzelnen Senfsäure, welche er Myronsäure nennt. Das Sinapin nennt er Myrosine. Die Myronsäure ist geruchlos, nicht flüchtig, von bitterem Geschmack, in kaltem Wasser farblose Auflösungen, welche nicht krystallisiren. Beim Kochen der wässrigen Lösung der Myrosine entwickelt sich etwas Schwefelwasserstoff. Im Aether ist die Säure löslich, im Aether nicht. Mit Platin, Ammoniak, Baryt, Kalk, Blei und Silber bildet die Myronsäure in Wasser lösliche Salze, von denen die vier ersten krystallisiren. Die Salze sind geruchlos und schmecken bitter. Um die Myronsäure darzustellen, wird schwarzer Senf bei 100° C. zerquetscht, ausgepresst, zerrieben, im Deplacirungsapparat zuerst mit kaltem, dann bis zu 50 — 60° C. mit dem Alkohol von 85 Proc. behandelt, das Pulver abgeseiht, mit kaltem oder warmem Wasser behandelt, um das myrons. Kali aufzulösen; durch Abdampfen concentrirt man die Lösung, behandelt mit wässrigem Ammoniumcarbonat, filtrirt und krystallisirt durch langsames Abkühlen. Das myrons. Kali wird mit Weinstein ersetzt oder myrons. Baryt dargestellt und durch Schwefelsäure zersetzt. Die Bestandtheile der Säure sind Kohlenstoff, Schwefel, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff.



## Ueber den Amygdalingehalt der Pfirsich- und Kirschkerne.

**G**eiseler unternahm durch Versuche den Amygdalingehalt dieser Kerne auszumitteln \*), welche das Resultat gaben, daß die Pfirsichkerne zur Gewinnung des Amygdalins nicht nur zweckmässig verwendet, sondern auch bei Bereitung des ätherischen Bittermandelöls und Wassers gewiß ohne Anstand gebraucht werden können. Sie geben 3 Proc. Amygdalingehalt, während Liebig und Wöhler aus den bitteren Mandeln nur 2,5 Proc. desselben erhielten. Die mit Kirschkernen angestellten Versuche zeigen, daß dieselben bei der Destillation mit Wasser ein blausäurehaltiges Destillat liefern, sie lassen es aber unentschieden, ob wirklich krystallisirbares Amygdalin in ihnen enthalten ist. Jedenfalls geben Geiseler's Versuche einen Belag mehr dafür, daß das in den Prunusarten enthaltene Amygdalin, wenn dieses in ihnen überhaupt allein der in Blausäurehaltiges Oel verwandelt werdende Bestandtheil ist, nicht auf die Weise aus ihnen krystallisirt erhalten werden kann, wie aus den Blausäure liefernden Theilen der Amygdalusarten.

## Ueber *Fermentoleum Vitis viniferae* und Weinbouquet.

**D**ie interessanten Gähröle verschiedener Vegetabilien veranlaßten Dr. Bley \*\*), auch Versuche zur Darstellung eines solchen aus den Weinblättern anzustellen. Es gelang, aus 1 Cent. Weinblätter etwa 2 Drachmen Aetheröl zu erhalten, es war dem Geruche der Weinblüthen und Reseda ähnlich und von brennend süßem gewürzhaftem Geschmack; dasselbe stimmte keineswegs mit dem Oenanthsäureäther Liebig's und Pelouze's überein, und Bley glaubt, daß dieses Fermentol einer von den den Weingeruch der Blume, Bouquet, gebenden Stoffen sei, der hier schon in den Blättern vorhanden sich zeigte und wünscht, daß Chemiker, welche durch ihren Wohnort begünstigt, leicht Versuche der Art anstellen können, dieselben auf verschiedene Reinsorten ausdehnen möchten.

\*) Buchners Repert. 2. R. XIX. H. 3. 1840.

\*\*) Daselbst 2. R. XIX. H. 3. 1840.

## Veratrumsäure.

Eine neue Säure im Sabadillsamen ist von E. Merck entdeckt worden \*). Sie wird auf folgende Weise dargestellt. Sabadillsamen wird mit Weingeist und Schwefelsäure erschöpft, die Tinctur mit Kalkhydrat versetzt, von der filtrirten Flüssigkeit der Weingeist abdestillirt. Die bei dem Rückstande über dem ausgeschiedenen Veratrin sich befindende Flüssigkeit enthält die Säure in Verbindung mit Kalk, aus welcher dieselbe nach Uebersättigung mit Schwefelsäure nach Entfernung des Gypses und gehöriger Concentration sich scheidet. Die erhaltenen Krystalle werden durch Bedampfen mit Weingeist und kalkfreier Thierkohle gereinigt. Die neue Säure, *Veratrumsäure* genannt, bildet kleine Spielschen oder vierseitige Prismen, röthet Lackmusch, ist unlöslich in Aether, löslich in Alkohol, in kaltem Wasser schwerlöslich, leichter löslich in heissem. Veratrumsäure Kali und Natron sind leichtlöslich in Wasser, krystallisirbar, luftbeständig. Salpetersaures Silber und essigsaures Blei bringen in der concentrirten Lösung des veratrumsauren Ammoniaks weisse Niederschläge hervor, die sich auf Zusatz von mehr Wasser oder Weingeist völlig wieder auflösen. Rauchende concentrirte Schwefelsäure und Salpetersäure von 40° B. wirken nicht zerstörend auf die Säure zu, durch eine Mischung der erwähnten beiden Säuren aber wird sie gelb. Auf Platinblech erhitzt verlieren die Krystalle ihren Gehalt an Wasser, werden milchweiss, schmelzen zu einer farblosen Flüssigkeit und verflüchtigen sich bei der Verkohlung; die Eigenschaft zu sublimiren ist die einzige, welche die neue Säure mit der von Pelletier und Caventou im Sabadillsamengefundenen gemein hat. Professor Schrötter in Grätz hat die Veratrumsäure einer Analyse unterworfen \*\*).

Die krystallisirte Säure enthält 1 At. Wasser, was auch eine andere Basis ersetzt werden kann, die krystallisirte Säure gab bei der Analyse folgende Zusammensetzung.

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kohlenstoff...  | 59,95 |
| Wasserstoff...  | 5,49  |
| Sauerstoff .... | 34,56 |

---

100.

\*) Annalen der Pharmacie XXIX, 183.  
 \*\*) a. a. O. 190.



Das veratrumsaure Silberoxyd besteht aus:

Veratrumsäure... 60,705

Silberoxyd..... 39,974

100.

Die in diesem Salze enthaltene Säure ist zusammengesetzt aus:

Kohlenstoff.... 37,294

Wasserstoff... 3,194

Sauerstoff..... 19,588

60,076

Die Formel für diese Säure ist  $C_{18}H_{18}O_7 = 218$ , die für die krystallisirte  $C_{18}H_{18}O_7 + H_2O = 230$ .

## Darstellung der Benzoessäure.

Es scheint, daß seit der Einführung der chemisch reinen Benzoessäure als Arzneimittel, dieses Präparat an Anwendung verloren habe, die neue französische Pharmakopöe hat daher die sublimirte Säure allein aufgenommen. Zur Darstellung derselben giebt Mohr in den *Annalen d. Pharmacie B. XXIX*, 178, folgendes Verfahren als sehr zweckmäfsig an. Auf den Boden eines runden flachen Topfes von Gufseisen oder Schwarzblech bringt man 1 Pfd. gröblich zerstoßenes Benzoecharz, spend über die Oeffnung des Topfes ein Blatt trocknes Löschpapier, das man über die Ränder des Topfes mit Kleister festklebt und stellt einen Hut von dickem Packpapier darüber, welcher ziemlich über die Ränder des Topfes schließt und mit einer Schnur darum festgebunden wird. Die gleichmäfsige Vertheilung der Wärme bewirkt man am besten, daß man zuerst eine grössere Metallplatte auf einen Dreifuß legt, darauf etwas Sand schüttet und auf diesen den Sublimirtopf fest aufstellt. Man giebt nun 3—4 Stunden lang gelindes Kohlenfeuer; von der Regelmäfsigkeit und Langsamkeit der Operation hängt die Güte des Präparats ab. Die untergelegte Platte bewirkt aufer der Wärmevertheilung, daß der aufsteigende Zug des Feuers den Papierhut nicht berühre. Nach vollendeter Operation und völligem Erkalten drehet man den ganzen Apparat um, bindet die Schnur los, und hat nun die schönsten Benzoeblumen im Hute liegen. Aus diesem Grunde ist die Hutform von der Gestalt und Gröfse eines gewöhnlichen Männerhuts einem Papierhute vorzuziehen. Die wesentlichsten Vortheile dieser Methode bestehen in dem übergezogenen Löschpapier.



odurch die Dämpfe der Benzoessäure hindurch dringen müssen und worin sie ihr stinkendes und färbendes Oel fast ganz absetzen; sie erscheinen blendendweiss und riechen stark aber angenehm nach Benzoe. Das Papier verhindert ferner, dass die sublimirten Blumen nicht mehr in den Harzkuchen zurückfallen können, wodurch sonst eine stets wiederholte Sublimation und ständige Zersetzung der Säure statt findet; endlich schützt das Papier die schon verdichteten Benzoeblumen vor dem Einflusse der strahlenden Wärme des Bodens, so dass die Condensation mit grösster Leichtigkeit geschieht, weshalb auch gar keine Oeffnung in dem Papierhute angebracht ist. Die Ausbeute an sublimirten Blumen ist stets geringer wie bei der Scheele'schen Methode; man erhält gewöhnlich 4 Proc., genau wie die französische Pharmakopöe angiebt.

### Natur des Pectins.

**P**oumarède sagt darüber:\*) Was man bis jetzt Pectin nannte war nur organisches Gewebe wie das Zellgewebe der Früchte, Wurzeln, Stengel, Rinden, nichts anders, als dieses Pectin ist. Die Pectinsäure existirt nicht in den Pflanzen, sie ist ein Product chemischer Reactionen.

### Zur Theorie der Essigbildung.

**H**ierüber theilt Liebig folgende Bemerkungen mit (\*\*). Wein, Bier und alle der geistigen Gährung fähigen Flüssigkeiten wurden schon in den frühesten Zeiten zur Darstellung des Essigs benutzt; Malzauszug und saure Flüssigkeiten liefern ebenfalls Essig. In letzteren Fällen geht die Bildung des Weingeistes, geistige Gährung, der Essigbildung voraus, die, wie man schon früher beobachtete, der Lufteinwirkung bedarf, ohne welche die Essigbildung nicht stattfindet. Da aber in den gegohrenen Flüssigkeiten, welche den gewöhnlichen Essig liefern, noch andere Substanzen enthalten sind, die durch die

\*) Journ. de Chem. med. Jan. 1840.

\*\*) Annalen der Pharm. XXX, 144.

Luft ebenfalls verändert werden, so verhinderte dieser complicirte Umstand die wissenschaftliche Erklärung des wahren Vorgangs. Man verglich den Essigbildungsproceß mit der Gährung des Traubensaftes, womit aber die Umänderung des Weins in Essig nichts gemein hat, als daß sie bei Luftzutritt vor sich geht, ohne daß man sonst etwas hinzubringt, daher die Bezeichnung *Essiggährung* von dieser Zeit her.

Durch die Entdeckung J. Davy's, daß Platin-schwarz den Alkohol in Essigsäure umändert, und die Versuche Döbereiner's wurde der Proceß der Umwandlung des Alkohols in Essig aufgehehlt. Döbereiner zeigte, daß hierbei von 1 At. Alkohol 4 At. Sauerstoff absorbirt werden, daß nur Wasser und Essigsäure hierbei entstehen, 1 At. Alkohol und 4 At. Sauerstoff,

$$C_4 H_{12} O_2 + 4 O = C_4 H_6 O_3 + 3 H_2 O.$$

Die Essigbildung auf gewöhnlichem Wege bedarf wegen der dabei nothwendigen Mitwirkung fremder organischer Materien noch einige Aufklärung, nämlich wie diese dazu beitragen, die Absorption des Sauerstoffs durch den Alkohol einzuleiten und zu begünstigen. Der chemische Proceß selbst ist ein Verbrennen in niedriger Temp., die man, sofern sie organische Materien betrifft, Verwesung nennt. Reiner oder mit Wasser verdünnter Alkohol säuert an der Luft sich nicht, was aber der Fall ist, wenn noch fremde organische Substanzen dabei sich befinden, Weintrestern, Hefe, Malz-extract, Honig, oder fertiger Essig, ebenso wie Wein oder Bier. Diese Materien ertheilen also dem Alkohol eine Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen, die er für sich nicht besitzt.

Die Rolle dieser Materien ist ganz analog der des Stickstoffoxydgases beim Proceß der Schwefelsäurebildung, das den Sauerstoff auf die Schwefelsäure überträgt. Obige organische Substanzen absorbiren den Sauerstoff der Luft und versetzen ihn in den Zustand vom Alkohol aufgenommen zu werden. Nach Versuchen von v. Saussure absorbiren gährende Pflanzestoffe, feuchte Dammerde u. s. w., mit Sauerstoff und Wasserstoffgas bei gewissen Temperaturen in Berührung, diese Gase genau im Verhältniß der Wasserbildung. Bei Abschluß des Wasserstoffgases müssen lediglich Oxydationsprocesse der organischen Materien selbst entstehen; ist es durch Weingeistdampf ersetzt, so hat man alle Bedingungen der Essigbildung. Feuchte Hebel- oder Sägespäne von Holz absorbiren rasch Sauer-

Gas und verwesen zu Kohlensäure und eine im Wasser lösliche Verbindung. Diese Absorptionsfähigkeit hat dem Holze, wenn es mit Weingeist befeuchtet, aber der Sauerstoff tritt dann an den Alkohol und entsteht Essigsäure.

Beim feinzertheilten Platin ist es ganz analog; es bindet sich aber mit dem verdichteten Sauerstoff nicht. Durch Befeuchten mit Weingeist aber giebt das Präparat den absorbirten Sauerstoff an den Wasserstoff des Alkohols ab, es entsteht erst Aldehyd, was mehr Sauerstoff in Essigsäure übergeht. Während das Platin hierbei sich nicht verändert, nehmen im Ueberschusse jene organischen Materien in der höheren Stufe des Essigbildungsprocesses und durch den Einfluß des Sauerstoffs neue Formen an, es bilden sich in warmer Flüssigkeit wie in warmen Mineralquellen, in thümliche Vegetationen, den sogenannten *Thermapflanzen* ähnlich, die *Essigmutter*.

Wein und Bier werden nur dann an der Luft sauer, wenn sie Substanzen enthalten, die den Sauerstoff anziehen. Klarer junger Wein setzt in Kellern noch lange *Unterhefe* ab; das Resultat der Oxydation im Wein noch gelöst gewesener azotisirter Materien. Solcher Wein wird in höherer Temp. zu Essig, so lange noch eine Spur jener Materien darin enthalten ist; abgeregelter Wein verliert mit deren Abnahme diese Bildungsfähigkeit in Essig. Ebenso Bier, das bei gewöhnlicher Temp. in Fässern gegohrene, durch *Oberhefe*, enthält noch viel azotisirte Materie und wird sauer. Läßt man aber das Bier in einer niedern Temp., welche die Essigbildung verhindert, in weiten offenen Gefäßen gähren, was 4 bis 6 Wochen dauert, so tritt der Sauerstoff der Luft an diese azotisirte Materien, werden in eine unlösliche Substanz verwandelt, die als *Unterhefe* ablagert; ist diese Abscheidung vollständig erfolgt, so hat das Bier seine Fähigkeit verloren, bei gewöhnlicher Temp. sauer zu werden. (*Baiersches Brauereigesetz*).

Alle frischen Pflanzentheile oder fleischigen Früchte halten sich gegen den Sauerstoff der Luft wie das zertheilte Platin, bei Gegenwart von wasserhaltigem Alkohol anlassen und unterhalten sie die Säuerung, die Oxydation des Weingeistes.

Man hat die Wirkung der organischen Materien im Essigbildungsproceß der *katalytischen* Kraft zuschreiben wollen; es ist keine Frage, daß man die Schwefel-

rien  
schrei-  
schwefel-



säurebildung ebenfalls zu den sogenannten katalytischen Processen gerechnet haben würde, wenn nicht zufällig die Färbung des Stickstoffoxydgases bei Gegenwart von Sauerstoff und die Entfärbung der entstandenen Salpetrichsäure durch Schwefelsäure bei Gegenwart von Wasser, die wahre Rolle, die dieses Gas in der That übernimmt, entschleierte hätte.

## Vortheilhafte Darstellung des Essigäthers

Folgende Vorschrift giebt hierüber Liebig:\*) Theile feingepulvertes kryst. essigs. Natron werden mit einer wiedererkalteten Mischung von 15 Th. Schwefelsäurehydrat und 6 Th. Alkohol von 80 — 85° der Destillation unterworfen. Das Destillat versetzt man in einer tubulirten Retorte so lange mit Kalihydrat, als noch saure Reaction bemerklich ist, giebt dann ein gleiches Volum Chlorcalcium hinzu und rectificirt im Wasserbade. Die Ausbeute an reinem Essigäther ist dem Gewicht des Weingeistes gleich. Die letzten Spuren eines Rückstandes von Alkohol entfernt man durch eine neue Digestion mit Chlorcalcium, worauf man zum zweiten Male rectificirt. Beigemischter Aether geht im Anfang der Rectification über.

## Darstellung von reinem Salpeteräther

Die bekannten Methoden zur Darstellung des Salpeteräthers geben stets Gemenge von salpetrigsaurem Aethyloxyde mit Aldehyd in wechselnden Verhältnissen. Nachfolgendes Verfahren von Liebig liefert ihn vollkommen rein\*\*). Es beruht darauf, Salpetrichsäure durch verdünnten Weingeist zu leiten. Man bringt in einer geräumigen Retorte 1 Th. Stärkmehl und 10 Th. Salpetersäure von 1,3 spec. Gew., der Retortenhals wird durch eine weite, rechtwinklicht gebogene Glasröhre mit einer zweihalsigen Flasche verbunden, so daß das eine Ende der Röhre bis auf den Boden der Flasche reicht, welche eine Mischung von 2 Th. Weingeist von 81° und 1 Th. Wasser enthält, und in kaltem Wasser steht. Die zweite Oeffnung der Flasche steht mittelst einer

\*) Annalen der Pharmacie XXX, 144.

\*\*) Dasselbst XXX, 142.

in weiten Glasröhre mit einem guten Kühlapparate Verbindung. Das Erhitzen der Stärke geschieht im Wasserbade, es entwickelt sich dann Salpetrichsäure, welche durch den Weingeist geleitet, damit sogleich zu Aether sich verbindet, der als salpetrichsaures Aethyl- überdestillirt. Durch Waschen mit Wasser reinigt man den Aether von beigemischtem Alkohol, und Chlorcalcium vom Wasser. Die Erhitzung des Weingeistes muß sorgfältig vermieden werden, weil bei einem gewissen Grade der Sättigung mit Salpetrichsäure sonst von selbst in das heftigste Sieden geräth, von diesem Augenblick an kein reiner Salpeteräther erhalten wird.

Der auf oben bemerkte Art dargestellte Salpeteräther ist blaßgelb, riecht höchst angenehm nach Aepfeln und Ingarwein, siedet bei  $16,4^{\circ}\text{C.}$ ; sein spec. Gew. bei  $16^{\circ}\text{C.}$  ist 0,947; er mischt sich mit einer weingeistigen Lösung von Kali ohne Bräunung, unter Bildung von salpetrichsaurem Kali und Alkohol. Auf Wasser gegossen sinkt er bei schwachem Blasen mit dem Munde in wenigen Secunden sein gleiches Volum Wasser zum Grunde. Der gewöhnliche Salpeteräther ist ein Gemenge von Aldehyd mit salpetrichsaurem Aethyloxyd, siedet bei  $22^{\circ}\text{C.}$ , und färbt sich mit einer weingeistigen Lösung von Kalihydrat tief dunkelbraun.

---

### Reinigung des Essigäthers.

Kircher\*) bedient sich des Aetzkalks, den er zerstoßen, in eine Retorte giebt, mit dem Essigäther übergießt und destillirt, wobei der Aether rein erhalten wird.

Das essigsaure Aethyloxyd scheint mit dem Kalk eine Verbindung einzugehen.

---

### Ausdehnung der Oele.

Reiſſer macht auf einen bisher wenig beachteten keineswegs unwichtigen Gegenstand aufmerksam nämlich auf die Ausdehnung der Oele durch die Wärme\*\*), welche bedeutend genug ist, um sehr bemerkbare Maafsdifferenzen hervorzubringen.

---

Pharmaceut. Centralbl. No. 15. 1840.

polytechn. Centralbl. No. 18. 1840.



Sie beträgt für Leinöl und Baumöl für jeden Grad  $\frac{1}{1150}$  des Volums. 1200 Kannen bei einer Temperatur von  $-5^{\circ}$  im Winter gekauften Oeles machen im Sommer bei  $+25^{\circ}$  1230 K. Daraus gehen zwei practische Regeln hervor: 1) in der Kälte die Oelfässer nie ganz anzufüllen, da sie sonst im Sommer springen oder Oel entlassen; 2) dafs es vortheilhaft ist, im Winter Oel zu kaufen und im Sommer zu verkaufen, wobei man durch Volumvermehrung 1—2 Proc. gewinnt. Rübsöl zeigte nämlich eine Ausdehnung von  $\frac{1}{1115}$ , Nufsöl  $\frac{1}{1115}$ , Wallfischthran  $\frac{1}{1050}$ , Rindsklauenöl  $\frac{1}{980}$  für jeden Grad.

## Chemische Untersuchung der Sprossen des Hopfens.

Nach F. G. Leroy in Brüssel\*) enthalten die Hopfensprossen folgende Bestandtheile:

Lösliches Eiweifs. Unlösliches Eiweifs. Gummi oder Schleim. Zuckerstoff. Extractivstoff. Röthlichen Farbstoff. Asparagin. Harz. Oel. Gerbsäure. Aepfelsäure. Sauren äpfelsauren Kalk. Schwefelsaures Kali.

## Vierte Abtheilung.

### Therapie und Arzneiformeln.

#### Beobachtungen über die Syrupe;

von

Guibourt.

Hr. Apotheker Emil Mouchon hat vor einiger Zeit eine Abhandlung über die Syrupe (*Saccharoles liquides*) bekannt gemacht; ich war beauftragt, darüber eine Anzeige für das *Journ. de Chim. med.* zu machen; überhäuften andere Arbeiten verhinderten dieses. Die Abhandlung von Mouchon ist unterdeß so bekannt geworden, daß eine Anzeige dieses Werkes jetzt überflüssig sein würde. Mehre Beobachtungen aber, zu welchen ich durch die

\*) Journ. de Chim. med. Janvier 1840.

Werk geleitet wurde, möchten der Beachtung werth sein, weshalb ich solche hier mittheile.

In der ersten Ausgabe der Pharmakopöe von Henry (ater) und von mir, ist angegeben, der gekochte Zuckersyrup (*Syrupus sacchari*), siedend  $30^{\circ}$  B., = 1,261 spec. w., hat nach Erkalten  $35^{\circ}$  B. = 1,321 und besteht an nahe aus  $\frac{2}{3}$  Zucker und  $\frac{1}{3}$  Wasser. Dr. Pecan, ein geschickter Mathematiker, theilte mir mit, daß der Zuckersyrup, der kochend  $30^{\circ}$  B. zeige, nur  $34^{\circ}$  B. nach Erkalten wiegen müsse, und wenn er mehr zeige, dieses vom Verdunsten während des Filtrirens und Erkalstens herrühren könne. Da meine Beobachtungen mit dieser Rechnung aber nicht übereinstimmten, so ließ ich die erste in der zweiten Ausgabe unserer Pharmakopöe ändern.

Kürzlich hat Beral bei Gelegenheit einer interessanten Arbeit über den *Syrupus Cerasorum* eine Tafel über die Dichtigkeit des Zuckersyrups mitgetheilt:

| <i>Syrup. Sacchari</i> | kochend                    | kalt                       |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| mit 28 Unzen Zucker    | $30\frac{1}{4}^{\circ}$ B. | $34\frac{1}{4}^{\circ}$ B. |
| „ 30 „ „               | 31 „                       | 35 „                       |
| „ 32 „ „               | $31\frac{3}{4}$ „          | $35\frac{3}{4}$ „          |

Hieraus ergibt sich, daß der Syrup, welcher kochend  $30^{\circ}$  B. zeigt, kalt  $34^{\circ}$  nicht übersteigen darf, wie Pector angegeben, und daß er weniger als 28 Unzen Zucker enthält, während man allgemein annimmt, daß er auf 28 Unzen Wasser 32 Unzen Zucker enthalte. Die Entscheidung dieser Sache schien für die Pharmacie nicht von Interesse.

Um das Verhältniß der Dichtigkeit des kochenden und kalten Syrup zu bestimmen, verfuhr ich auf folgende Weise: In eine mit kochendem Zuckersyrup gefüllte Probirgale tauchte ich ein offenes Probirglas, welches ich von Zeit zu Zeit herausnahm und mit dem Syrupmesser abgemessen prüfte. Als bei dem Verlauf der Versuche der kochende Syrup nun genau  $30^{\circ}$  B. zeigte, bedeckte ich das Probirglas mit einer Glastafel, und stellte es in einen Keller, wo die Temperatur  $15^{\circ}$  C. Am folgenden Tage

zeigte der zu dieser Temperatur erkaltete Syrup genau 35°.

Um das wahre Verhältniß des Wassers zum Zucker im Syrup, der kochend 30 und erkaltet 35° zeigt, zu bestimmen, nahm ich weissen harten klingenden krystallinischen Santerre-Zucker, der bei zweistündiger Aussetzung einer Wärme von 100° C. nichts am Gewicht verlor, und bereitete damit 3 Syrupe, indem ich in drei Gefäßen 28, 30 und 32 Unzen Zucker mit 16 Unzen Wasser übergoss, und dann die Gefäße verschloß. Die 28 Unzen Zucker waren nach einigen Tagen völlig aufgelöst, die andern nicht. Alle drei Gefäße wurden zur völligen Auflösung erhitzt und dann dem Erkalten überlassen.

Ein geübtes Auge kann sogleich beim Schütteln dieser Syrupe wahrnehmen, daß der Syrup von 28 Unzen weniger consistent ist, als der officinelle *Syrupus sacchari*, und daß er sich nicht lange hält, auch bald einen unangenehmen Geschmack annimmt; eben so ist gewiß, daß der Syrup mit 32 Unzen zu dick ist und mit der Zeit candirt. Der Syrup mit 30 Unzen Zucker auf 16 Unzen Wasser muß als der Normalsyrup angesehen werden. Das specifische Gewicht dieser drei Syrupe war :

| Syrup | Dichtigkeit | Areometergrad |
|-------|-------------|---------------|
| 28    | 1,311       | 34,2          |
| 30    | 1,320       | 35            |
| 32    | 1,323       | 35,15         |

Der Syrup mit 30 Unzen Zucker entspricht somit auch hier dem concentrirten Syrup von 35° bei der Klärung oder 30° beim Kochen.

*Klärung mit Eiweiß.* Viele rathen, den Zucker in einer grossen Menge eiweißhaltigem Wasser schmelzen zu lassen. Da aber vor der Coagulation des Eiweißes aller Zucker noch nicht aufgelöst ist, so wird ein Theil desselben mit in den Schaum gezogen, und man hat bei diesem Verfahren auch keine Notiz genommen von der wichtigen Rolle, welche die Luft bei dieser Klärung

lt. Das coagulirte Eiweiß bildet gleichsam ein Netz, welches die in der Flüssigkeit suspendirten Partikeln einschließt. In dem geschlagenen Eiweiß ist es nun dadurch eingeführte Luft, welche, durch die Wärme ausdehnend, diesen Schaum leichter macht als die Flüssigkeit, so daß er auf die Oberfläche treibt. Wenn man nun den Zucker mit dem eiweißhaltigen Wasser gleich auf das Feuer bringt, so entweicht ein Theil der zwischengelagerten Luft und geht für den Effect der Reinigung verloren, während, wenn man das geschlagene Eiweiß nach und nach zusetzt, man die Quantität der zwischengelagerten Luft vermehrt und damit die Kraft, welche diese dem Eiweiß ertheilt, die Unreinigkeiten des Syrops auf die Oberfläche zu bringen.

Wenn man endlich den Vorgang am Ende der Klärung abachtet und lufthaltiges Wasser zusetzt, um den Rest des Eiweißes und der fremden Körper auf die Oberfläche des Syrops zu bringen, so scheint es, daß man mit luftigem Wasser allein die Klärung des Zuckers bewirken könne, und dieses ist wirklich der Fall. Ich ließ Brod Zucker von 6,250 Kilogrm. Gewicht in 3 Pfd. Wasser auflösen, und nach Kochen und Abschäumen brachte ich in 10 Portionen 2,500 Kilogrm. filtrirtes Wasser hinzu, und erreichte so eine vollständige Klärung des Syrops, mit einer Quantität Schaum, die nur 4 Unzen wog. Wegen der Zeit aber, die dieses Verfahren erfordert, will ich dasselbe nicht eigentlich empfehlen, da sich der Schaum leichter, wenn er durch coagulirtes Eiweiß verbunden ist, sondern ich führe es nur an als einen Beweis der Wirkung, welche die Luft in der Klärung des Eiweißes ausübt und über den Vorzug des Eiweißes, dem man eine gewisse Menge Wasser incorporirt hat. (*Journal de Chimie med.* 2. Ser. 1852.)

## Ueber die Bereitung des *Syrup. Violarum*; vom

Apotheker *Ed. Gueranger* zu Mans.

**D**ie Medicamente müssen nicht allein sorgfältig bereitet werden, der Apotheker muß ihnen auch, wo es angeht, das gefällige Aeußere ertheilen, welches gleichsam der guten Bereitung und Sorgfalt dafür das Siegel aufdrückt. Ueber die Darstellung eines guten *Syrup. Violar.* ist schon viel verhandelt worden und selbst die Vorschrift der neuen Auflage der *franz. Pharmacop.* giebt nie einen Veilchensyrup von einer schönen Farbe. Diese Vorschrift besteht darin, die Blumen mit warmem Wasser auszuwaschen, auszudrücken, dann mit 2 Th. kochenden Wassers zu infundiren und in der Infusion das Doppelte ihres Gewichts weißen Zucker auflösen zu lassen. Gegen diese Vorschrift lassen sich folgende Bemerkungen machen.

1) Durch das Auswaschen mit dem warmen Wasser soll den Blumen eine gelbe extractive Materie entzogen werden, die mit blauem Farbstoff der Blumen verbunden dem Waschwasser eine grüne Farbe giebt, durch das Auswaschen wird aber der Blume ein Theil ihrer reichenden und löslichen Bestandtheile entzogen, und überdies enthalten sie auch keine gelbe färbende Materie, die grüne Färbung des Waschwassers rührt sowohl von der großen Verdünnung her, in welcher sich darin etwas des blauen Farbstoffs aufgelöst befindet, als auch von einem Gehalt an kohlensaurem Kalk und kohlensaurer Bittererde, die in dem Wasser sich finden und den blauen Farbstoff grünen. Wendet man dest. Wasser an, so erscheint der Auszug nicht grün.

2) Dadurch, daß die Blumen der Vorschrift zufolge nach dem Auswaschen nur schwach ausgedrückt werden sollen, bleibt in diesen noch ein beträchtlicher Theil zurück, welcher mit dem für die Infusion vorgeschriebenen sich vermischt, so daß diese weniger con-



trirt werden muß und die Verhältnisse des Syrups stets dieselben bleiben.

3) Halte ich die Menge Zucker, welche der Codex schreibt, 34 Unzen auf 17 Unzen Infusion zu groß, lern, nach Baumé, auf 17 Infusion 32 Unzen Zucker gemessen; bei einer größern Menge Zucker krystallisiert der Syrup und wird verdünnt. Dieses gilt gleichweise noch für viele andere Säfte des Codex.

Durch Anwendung von dest. Wasser und ohne Ausschütten der Blumen erhalte ich eine sehr schöne blaue Lösung, aber damit ist noch nicht alle Schwierigkeit beseitigt, denn bei der Vereinigung der Infusion mit Zucker büßt dieselbe oft sehr an Farbe ein, wesshalb Baumé u. A. riethen, den Zucker bei einer niedrigen Temp. darin aufzulösen; allein auch dieses ist nicht immer von Erfolg. Ich vermuthete hierauf, daß der Zucker von der Raffinirung her, noch etwas alkalische Materie von Blut oder etwas Kalk enthalten möchte, daß durch Neutralisation dieser Basen ihre Wirkung auf den Farbestoff gehemmt würde; ich setzte dem Syrup, der seine Farbe sehr eingebüßt hatte, einige Tropfen sehr verdünnter Schwefelsäure zu, worauf die schönste blaue Farbe wieder hervortrat. Man sieht hieraus zugleich, daß die Farbe des Syrups nicht durch eine Säure, wie man häufig annimmt, verliert, sondern daß im Gegentheil die veränderte Farbe dadurch zu ihrem ursprünglichen wieder zurückgeführt wird. Veilsyrup, der 1837 auf die eben angeführte Weise behandelt wurde, hat bis jetzt noch völlig seine schöne Farbe behalten. (*Journ. de Chim. med. 2. Ser. p. 131. Auszug.*)

## Syrupus Conii.

Hierzu giebt Righini folgende Vorschrift: 6 Unzen frisches gequetschtes *Hb. Conii* werden mit 18 Unzen *Syrupus Sacchar.* in einer verkorkten Flasche 24 Stunden lang im Wasserbade digerirt und dann ausgeseiht. Der Rückstand wird hierauf nochmals mit 12

Unzen Syrup. *Sacchari* behandelt und nach dem Auspressen der Saft mit dem ersten vermischt. Man setzt dann so viel Syrup zu, daß das Ganze 36 Unzen werden. Der Syrup hat einen bitteren Geschmack, einen narkotischen Geruch nach Schierling und eine grüne Farbe. Man braucht ihn als Resolvens in chronischen Krankheiten der Eingeweide und der Leber. Die Dosis für einen Erwachsenen ist 1 — 2 Unzen. Jede Unze entspricht 4 Scrupel trockenem Schierling.

## Ueber die Reinigung des Honigs;

von

Dr. Geiseler,

Apotheker zu Königsberg in der Neumark.

**D**ie häufig bemerkte Schwierigkeit, den Honig zu reinigen, welche die Vorschläge zu verschiedenen Zusätzen, als von Eiweiß, Kreide, Knochenkohle, Gips, Äpfeln, Blut u. s. w. hervorgerufen hat, scheint mir alle darin ihren Grund zu haben, daß der Honig nicht mit einer hinreichenden Menge Wasser und nicht lange genug gekocht wird. Durch die angeführten Zusätze geht man zwar allerdings das längere Kochen, was man aber in Erwägung zieht, daß durch sie eben die wirksamen Theile entzogen werden können, als durch längeres Erhitzen und daß dieses selbst unter Anwendung jener Zusätze bei dem Abdampfen immer noch ganz wird vermieden werden, nicht zu gedenken, daß wenigstens ein einmaliges Aufwallen doch immer nöthig ist, und daß dieses bei einem geringen Wasserzusatz und einer dadurch bedingten höheren Temperatur nachtheiliger sein dürfte, als ein längeres Kochen bei einem größeren Wasserzusatz und einer darum auch niedrigeren Temperatur, so wird man gewiß geneigt sein müssen, den nachtheiligen Einfluß eines längeren Siedens minder hoch anzuschlagen, als bisher geschehen ist. Deshalb habe ich denn auch alle jene Zusätze nicht angewendet und auch nur einer geringen Quantität,

gepulverter Holzkohle zur Verstopfung der gröfse-  
 n Oeffnungen des wollenen Seihetuches beim Coliren  
 bedient, dessen ungeachtet aber stets ein klares *Mel-*  
*lumatum* erhalten, das sich nur dann von ausgeschiede-  
 nem Zucker trübte, wenn es bis zu einer starken Con-  
 sistenz evaporirt war. Mein Verfahren ist folgendes:

Der Honig wird mit seinem gleichen Gewichte Was-  
 ser vermischt und in einem zinnernen oder verzinnten  
 fernen Kessel zum Sieden gebracht. Während des  
 Siedens und namentlich, wenn das Gemisch überzuko-  
 chend droht, wird kaltes Wasser hinzugegossen und die-  
 ser Wasserzusatz, der ungefähr der verdampften Wässrig-  
 keit gleich sein muß, so oft wiederholt, bis die Flüssig-  
 keit sich fast ganz klar gekocht hat, was bei einem gu-  
 tem Honig sehr bald, bei einem weniger guten aber erst  
 nach einiger Zeit eintreten wird. Erst jetzt wird der oben auf-  
 schwimmende Schaum abgenommen, die Flüssigkeit dann  
 mit wenig gröblichen Holzkohlenpulver (3j auf 2 Pfd.  
 Honig) vermischt und auf einen wollenen mit Wasser  
 feuchten Spitzbeutel gebracht, auf den sie so lange  
 abgeseigt wird, bis sie ganz klar abläuft. Dann wird  
 im Dampfbade zur gehörigen Consistenz evaporirt.  
 Immer habe ich es bei Ausführung dieser Arbeit  
 zweckmäfsig gefunden, das Gemisch aus Honig und  
 Wasser recht stark aufwallen zu lassen und während  
 dessen das kalte Wasser hinzuzugiefsen, indem eines-  
 theils hiedurch das Kochen gemildert, andern Theils  
 auch beim wieder beginnenden Sieden die Abschei-  
 dung neuer Unreinigkeiten befördert wurde\*). Ein, wäh-  
 rend der ganzen Dauer des Kochens fortgesetztes Ab-  
 seigen bewirkt einen bedeutenden Verlust an Honig,  
 Unreinigkeiten vermischen sich auch bei längerem  
 Sieden nicht wieder mit der Flüssigkeit, sie erlangen  
 sehr eine festere Consistenz, sinken auf einen klei-  
 nen Raum zusammen und lassen sich dann, wenn die  
 Flüssigkeit klar kocht, ohne viel Honig in sich einge-  
 schlossen zurückzuhalten, leicht und vollständig mit dem  
 Wasser vergl. oben Guibourt über den Einfluß der Luft bei der  
 Klärung.

Schaumlöffel abnehmen. Das Coliren geht zwar immer sehr rasch von statten, aber doch auch nie so langsam, daß ein Sauerwerden des noch verdünnten Honigs zu befürchten wäre; die Verzögerung des Ablaufens, über welche sich Viele beklagen, hat nur einer zu starken Consistenz des zu reinigenden Honigs und also in einer unzureichenden Verdünnung des Honigs durch Wasser seinen Grund.



## Ueber einige in der Wallachei gebräuchliche Volksmittel.

Der Zustand der Medecin hat in den letzten Jahren in der Moldau und Wallachei zwar sehr sich verbessert, indessen ist die Quacksalberei noch in bedeutendem Grade vorhanden und man wird schwerlich eine Krankheit nennen, gegen der Wallache nicht einige Arzneimittel wendet. Einige Proben hiervon wird das Folgende darbieten.

Bei Cephalalgie (*Duréri de Kap*) wenden sie frische Blätter von *Brassica capitata* (*Kucéki*) oder Meerrettichpflaster (*Chrián*), mit Salz und Essig angemacht. Bei Kopfrothe (*Orbaltz la Kap*) Waschungen mit einer Mischung von Branntwein (*Rekiu*), Kampher (*Kamper*), Seife (*Sopon*) und Oel. Bei Gesichtsröthe (*Orbaltz Obrás*) Waschungen, Umschläge von Lindenblüthen (*de Téi*) und Hirsenmehl (*Malái*), später Dampfbäder, indem sie in ein Decoct von Zweigen von *Cornus corymbosa* (*Korn*) heiße Steine legen und den Kranken in den aufsteigenden Dampf halten.

Chronische Ophthalmien behandeln sie mit einem Decoct von *Chelidonium majus* (*Burujaina Rindurá* oder *Rostopást*) oder mit einem Brei von gebratenen Sesamsamen und Honig, oder mit einem Decoct von Quercus samen (*Simburi de Gutéi*), mit gebranntem Alaun (*ákra*), Nachts legen sie ein Pflaster mit Verwundungsaugen auf. Bei Zahnschmerzen ziehen sie den Dampf von einem gepulverten, auf Kohlen gestreuten Pferdehufe.

re vorzüglichsten Zahnmittel sind Salbei (*Schälgie*) und Serpillum (*Tschimbrischor*). Bei Stomacace (*Studi-ze*) brauchen sie ein Decoct von Aepfelbaumzweigen (*Pyrus malus dulcis*, *Mor dultschi*), *Lamium album* (*rsika moásta*) mit gebranntem Alaun und Kupfervitriol (*iatra vúnata*). Bei Angina (*Giltsch*) gurgeln sie sich mit dem gegohrnen sauren Saft von *Beta Cycla rubra* (*tékli*), äußerlich legen sie mit Milch gekochte Schwalbenester als Cataplasma um.

Als Brustmittel gebrauchen sie *Tussilago Farfara* (*edbál*) mit Zucker gekocht, oder einen Brei von Meerrettig mit der doppelten Menge Candiszucker (*Sachár Giatze*), wovon 3 — 4mal täglich ein Theelöffel voll genommen wird. Ihre übrigen Brustmittel sind: *Veracum Thapsus* (*Lumunária Domnului*), *Daucus Carota* (*orkow*), *flores Tiliae*, *Triticum repens* (*Kir*), *Leontodon Taraxacum* (*Popodié*), *Sambucus Ebulus* (*Biz*), *Fumaria officinalis* (*Fumaritza*, *Fumul Pomuntului*), *Lamium album*, *Fragaria vesca* (*Fradzi*), *Fragaria elatior* (*Ehrh. apuschini*), *Asplenium Scolopendrium* (*Limba Tschernui*), *Arctium Bardana* (*Brustus*), *Althea off.* (*Nálba ri*). Zur Vermehrung der Milch gebrauchen sie Hirse und Senf (*Muschtár*), Petersilienwurzeln (*Pitrinschel*), Rosmarin (*Rosmarin*) und Muscatblumen. Gegen Carie wenden sie Branntwein, Pfeffer, Kampher, Zinnober (*Cinabor*) und Salmiak (*Cipirig*) an.

Gegen Colik wenden sie einen Trank an, der durch Infusion von Anis (*Anisson*), Raute (*Ruta*), Tausendgüllkraut (*Potróaka*), Krausemünze (*Minta*), Thymian (*chimbru de Kimp*), *Chelidonium majus* (*Rostopást*), Cichorie (*Tschukóari*), Muskatennuß (*Nuskuschoa*), Zimmt (*ortzeschoara*) und Nelken (*Kuischoari*) mit Branntwein bereitet wird. Gegen Cholera und Diarrhöen brauchen sie die Asche gebrannter Frösche, und reiben den Unterleib ein mit Infusionen von Calmus (*Kalisch*), Berberitzen (*Agrisch roschu*) und Wermuth.

Bei Harnverhaltungen nehmen sie Pillen aus Terbinthin (*Trimintina*) und Bohnenmehl, und reiben Wa-



cholderöl (*Juniper*) auf den Unterleib ein. Bei schmerzhaften Hämorrhoiden legen sie Salben aus ranzigem Schweinefett und Schwefel, oder einen Brei von gekochten Bohnen und Olivenöl, bei *Metritis abdominis* einen Brei von Weizenkleien, zerriebenen Möhren, Oel und Brantwein auf.

Bei intermittirenden Fiebern helfen sie sich mit einem Decoct von *Inula Helenium* (*Jarba mari*), auch mit dem dest. Wasser von *Pulsatilla nigricans* (Decoct), welches so lange genommen wird, bis Erbrechen erfolgt. Bei acuten Fiebern mit einem Decoct von *Vitis*.

Bei Geschwüren wenden sie gebratene Zwiebeln, ein Decoct von *Alchemilla vulgaris* (*Kretzischor*), *Cyanus off.* (*Limba Kinelui*), auch *Plantago media* (*Plantain*) gegen den *Tschalparik*, einer Krankheit, die mit den sogenannten Radesige, eine Krankheit in Norwegen viel Aehnlichkeit hat, brauchen sie ein Pulver von gebrannten Fischschuppen, gebranntem Alaun, Mastix (*Mastix*) und Zucker, zum Aufstreuen auf die Geschwüre und eine Salbe aus Mastix, Myrrhen, Olivenöl und essigsaurem Pech (*Rischine alba*) zum Einreiben; innerlich ein Decoct von *Rad. Fragariae*, *Graminis*, *Taraxaci*, *Albi*, *Lapathi acuti* (*Stevie*), *Fol. Pyri Mali dulcis*, *Salbae* (*Saltsche*) et *Herb. Jaceae* (*Guscha Poran*). Gegen die bei dem gemeinen Volke vorkommende *s. Rana Trinzilor* benannte Krankheit, wo die Haut trocken, schuppig und rissig wird, wenden sie Erbsenbungen an von einem Extracte aus der inneren Rinde von *Sambucus nigra*, Oel, Wachs, weißem Pech und gebranntem Kupfervitriol; innerlich Salpeter. (*S. Constant. Nobil. a Vernau. 1836.*)

---

\*) Vergl. Rust's Handb. der Chirurgie, XIV, 121.

## Fünfte Abtheilung.

# Allgemeiner Anzeiger.

## I. Anzeiger der Vereinszeitung.

### Notizen aus der Generalcorrespondenz des Directoriums.

Se. Excellenz, der Geh. Staatsminister und Generalpostmeister Nagler: Ausdehnung der Portovergünstigung auf den neuen Naumburg. — Hohe Großherzogl. Mecklenburg-wer. Landes-Regierung: Wohlwollende Anerkennung Vereins. — Hochfürstl. Lipp. Regierung in Detmold: geneigte Aufnahme der neuen Statuten. — Se. Exc. Hr. Präsident von Vincke: Desgl. — Königl. Preufs. Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten: Erfreuliche Zusicherung auch des hohen Wohlwollens für den Verein, nach dem Tode des verehrten Protector's der Anstalt. — Se. Exc. Hr. Geh. Rath von Humboldt: Dankschreiben für den Beschluß des Vereins, das nächste Vereinsjahr ihm zu weihen. — Hr. Kreisdirector Müller in Arnberg und Hr. Kreisdirector Reich in Burg: Angelegenheiten ihrer Kreise. — Hr. Director Dr. Witt in Höxter und Hr. Apotheker Bärwinkel in Leipzig: Die nächste Generalversammlung in Leipzig betreffend. — Vicedirector Dr. Meurer in Dresden: Ueber denselben Gegenstand, über die Portovergünstigung im Königreiche Sachsen über die Bemühungen des Apoth. Lohmeier in Meißen Ausbreitung des Vereins in Schlesien. — Hr. Vicedirector Herzog in Braunschweig: Die Versammlung in Blanken- betreffend. — Hr. Director Overbeck in Lemgo: Ueber Versammlung in Bielefeld. — Hr. Vicedirector Dr. Bley in Burg, Hr. Vicedirector Dreykorn in Bürgel und Hr. Kreisdirector Müller in Driburg: Ueber die zu haltenden Kreis- versammlungen. — Hr. Apotheker Müller in Königsberg in ken: Meldet seinen Beitritt zum Verein. — Hr. Kreisdirector Jonas in Eilenburg: Die Archivsendung betreffend. — Hr. idirector Ramstedt in Sondershausen: Ueber denselben Gegenstand. — Hr. Kreisdirector Weber in Schwelm: Meldet ein Mitglied. — Hr. Medicinalrath Bergmann in Hildesheim: et den Beitritt der Apotheker in Hildesheim und Umgegend Verein. — Die Herren Kreisdirectoren Dr. Schmedding in ster und Rabenhorst in Luckau: Ueber die abgehaltenen versammlungen. — Hr. Apotheker Riegel in St. Wendel: Ausbreitung des Vereins in dortiger Gegend betreffend. — Apotheker Herberger: Ueber Angelegenheiten des süd- lichen Vereins.

Dankschreiben für die Ehrenmitgliedschaft des Vereins gin- ein: von Sr. Exc. Hrn. Oberpräsidenten Graf von Werni- ode in Magdeburg; von Sr. Exc. Hrn. Oberpräsidenten von elschwingh in Coblenz; von Hrn. Prof. Piefel in Prag.

Unterstützungsgesuche: Hr. Apotheker Mühling in Wernigerode; Hr. Apotheker Peithmann in Rhoden; von Hrn. Vicedirector Dr. Bley für Hrn. Apotheker Schmidt in Franenstein.

Beiträge zum Archiv gingen ein: von Hrn. Director Witting in Höxter; von Hrn. Apotheker Schröter in Cahn; von Hrn. Apotheker Hentschel in Gefell; von Hrn. Kreisdirector Rabenhorst in Luckau; von Hrn. Apotheker Valsner in Barenburg.

### Anzeige für die Herren Mitglieder des Vicedirectoriums Weimar.

In der Döbereiner'schen Versammlung am 27. Aug. v. J. wurde der Beschluß gefaßt, daß die nächste Zusammenkunft in Jena gehalten werden sollte. Demgemäß werden die Mitglieder der Kreise Jena, Weimar, Saalfeld und Altenburg eingeladen, sich zu der am 11. Sept. d. J. zu haltenden Versammlung im Gasthaus zum Engels in Jena einzufinden. Wünschenswerth wäre es sein, wenn die Herren, welche theilnehmen wollen, es den betreffenden Herren Kreisdirectoren oder Unterzeichneten einige Zeit vorher anzeigen wollten.

Bürgel, im Juni 1840.

Dreykorn.

### Versammlung im Vicedirectorium Bernburg.

Die diesjährige Versammlung der Mitglieder des Vicedirectoriums Bernburg wird am 29. August in Bernburg statt finden und werden die verehrten Herren Mitglieder unserer und benachbarter Kreise dazu ergebenst eingeladen.

Dr. Bley.

### Berichtigung.

In der Vereinszeitung S. 125 des XXII. Bds. 2. R. des Archivs muß es heißen: Hr. Apotheker Frick in Mühltröff, statt: Hr. Apotheker Schmidt.

### Handelsnotizen.

Amsterdam, den 23. Juni. In gestriger Auction 454 F. S. rinam-Zucker  $23\frac{1}{2}$  —  $28\frac{1}{2}$  fl., Java 27 — 31 fl.

— den 7. Juli. Melis 1ma 44 — 45 fl., 2da feiner 39 — 41 fl., ord.  $35\frac{1}{2}$  fl., Dampfmelis  $35\frac{1}{2}$  — 38 fl., Lumpen  $33\frac{1}{2}$  — 34 fl., Bastards 19 — 42 fl., Candis  $33\frac{1}{2}$  — 35 fl., Syrup 17 fl.

Antwerpen, den 3. Juli. Reis Carolina 12 —  $12\frac{1}{2}$  fl., Batavia  $8\frac{1}{2}$  —  $9\frac{1}{2}$  fl., Batavia  $7\frac{1}{2}$  —  $8\frac{1}{2}$  fl.

Bremen. Kampher, welcher bisher eine sehr bedeutende Rolle spielte, ist schon billiger zu haben, obschon die Vorräthe in Verhältniß früherer Jahre sehr gering sind. Dem Mangel der Einfuhr von Rhabarber ist durch die gute moskowitische geholfen, welche nur eine Kleinigkeit höher einsteht, als man gesunde halbgeschälte chinesische beziehen wollte. Der Verbrauch von Cassiablüthe und -Oel, Sternanis, Galange ist

nzen zu unbedeutend, als daß dieses eine wesentliche Steigerung hätte herbeiführen können, zumal immer noch einige alter der Nachfrage genügend begegnen.

Bei dem schon früher notirten erhöhten Preise der *Aloes* lassen wir beharren, da wir uns von der Quelle noch keine billigere Waare in tadelsfreier Qualität verschaffen können; selbe gilt von *Mandeln*, auf welche Frucht die im Frühling röhlich eintretenden Nachfröste nachtheilig wirken. Die Zufuhren von *Cacao* sind seither sehr spärlich gewesen, während der Bedarf zugenommen hat. *China* und *Chinin* behaupten die Preise bei beschränktem Umsatz. *Fol. Sennae alex.* sind nicht in der Qualität zu bekommen, wie man selbige früher gehabt war, da stets eine fremde Beimischung von *Cinanthum* zugebendlich, welches man, obschon sie sonst schön und kräftig von Geruch sind, nicht gern sieht; wir haben uns daher veranlaßt gesehen, neben dieser Sorte auch die schönen grünen *Tripolier* anzuschaffen, welche den Anforderungen genügen werden. *Senna India* ist jetzt auch mehr in Gebrauch gekommen, und wegen des beinahe gar nicht gebrochenen Blattes und weniger Feile, sehr empfehlungswerth. Die Zufuhren von *Jalapa* sind gering, daher Preise sich hoch halten. Von *Vanille* ist beinahe alles vergriffen und kaum der Nachfrage bei sehr hohen Preisen zu genügen. Die Ernte der *Oliven* ist im verwichenen Herbst so schlecht ausgefallen, daß wir die daraus bereiteten Oele nur zu hohen Preisen erhalten konnten.

Dagegen sind billig: *Ammonium carbon. et muriat.* bestes chinesisches, *Bacc. lauri*, *Balsam Copaivae et de Peru*, *Colocynthis* hübschen weißen Aepfeln, *Cort. aurant. et citri* neue Malaga, *und Jodkalium*, *Manna*, sicilianische Essenzen, *Pfeffermünzöl*, *peppermintöl*, *Opium*, sowohl ägyptisches als smyrnaer, *Rad. liquir.*, *anisia* in schlanken Wurzeln, *Sem. cynae* in hübscher grüner körniger Waare, *Lycopodium*, beste schwarze *Tamarinden* einige andere, während die meisten übrigen Artikel mehr oder weniger preishaltend geblieben sind.

*Calcutta*, den 15. April. Die Indig-Ausfuhr vom 1. Nov. v. J. April l. J. betrug: nach England 21,808, Frankreich 7256, *Bay* und den pers. Golf 1923, den Verein. Staaten 1071 und anderen Häfen 15, zusammen 32,073 Kisten oder 112,873 Pds. Wenn die Dürre anhält, könnte die künftige Ernte gering sein.

*Halle*, Ende Juni. Kümmel ist gesucht und wird es noch mehr werden.

*Hamburg*, den 16. Juni. Leberthran bleibt gesucht, und es wird schwer, mit 29 Mk. per Tonne durchzudringen. Der Vor- von *Südseethran* in erster Hand ist bis auf 100 T. geräumt. — den 19. Juni. Die jüngst eingetroffenen 150 Kisten und 1000 *Matten Cassia lignea* werden zu 8½ fs. angetragen. Der Arzneihandel ist augenblicklich ohne Leben. *Malaga Baumöl* zu 10 Gal. zu 30 Mk. begeben. 200 T. *Carol. Reis* zu 13 — 14 Mk., 800 S. *Java* zu 6½ — 10 Mk. *Smyrn. Rosinen* 13½ — 14 Mk. *Zante Corinten* 35½ — 36 Mk.

Vom 1. bis letzten Juni wurden unter andern eingeführt: 277 S., 75 Colli. *Canel* 5 K., 14 B. *Cassia* 254 K., 4700 Pds. *Cochenille* 13 F., 23 Ser., 3 B., 4 S. *Feigen* 117 Matt.,

100 Trommeln, 25 P., 2 Schachteln. *Fenchel* 93 S., 23 B., 4 F. *Indigo* 345 K., 164 Ser. *Ingwer* 590 S., 311 Colli, 1 Parthie, 20 K., 1 B. *Kork* 200 Quintal, 100 P. *Krapp* 16 F. *Kümmel* 31 S., 19 B. *Lakritzen* 83 K. *Macis* 15 F. *Muskatnüsse* 13 F. *Nardeln* 19 F., 65 Ser., 29 S., 76 B. *Nelken* 94 S., 36 B., 25 P. *Ordiv.* 998 F., 68 K., 120 Geb., 11 Kruken, 138 Pipen, 24 Kch. *Pfeffer* 2034 S., 3 B., 225 Colli, 1 Parthie. *Piment* 1057 S. *Pomeranzen* 25 S. *Pottasche* 92 F., 21 Geb. *Sago* 157 F., 10 L., 10 S. *Salpeter* 444 S., 1 F. *Schellack* 67 K. *Thee* 6684 K., 29 P. *Weinstein* 151 F., 63 K. *Zucker* ostind. 2010 S., Brasil, Lissab., Porto 5114 K., 281 F., 280 S., Havanna 9586 K., 33 F., Amerika, Frankreich, England, Belgien 596 F., 515,724 Kilogr., 20 L., 153 Canaster, 13 Parthien, 61 Krajans.

*Hamburg, den 3. Juli.* Die Preise für *Kaffee* sind fester, da sich herausstellt, daß unsere Vorräthe, trotz einer Plusimportation von 7 Mill. Pfd. während der ersten 6 Monate, keine größere Quantität nachweisen und sich in 15 — 18 Mill. Pfd. erschöpfen. *Domingo* 4½ — 4¾ fs., *Brasil* 4¼ — 4¾ fs., *Havanna* 5 — 5½ fs., *Laguayra* 5 — 5½ fs., *Portorico* 5¼ — 6½ fs.

— *den 10. Juli.* *Leberthran* ist in erster Hand gänzlich geräumt.

— *den 20. Juli.* Die heutigen Vorräthe an *Salpeter* beschränken sich auf 800 Säcke. *Südsee* 11 Mk. 12 fs. u. 700 ostind. 18 — 20 Mk.

*Havanna, Mai.* Ausfuhr von *Kaffee* und *Zucker* vom 1. Jan. bis 30. April:

|                 | Zucker in Kisten |         | Kaffee in Aroben |         |
|-----------------|------------------|---------|------------------|---------|
|                 | 1839.            | 1840.   | 1839.            | 1840.   |
| Havanna .....   | 93,917½          | 124,278 | 784,663½         | 784,681 |
| Matanzas .....  | 58,245           | 87,392  | 101,906          | 140,681 |
|                 | 152,162½         | 211,670 | 886,569½         | 925,361 |
| Es gingen nach: |                  |         |                  |         |
| Belgien.....    | 10               | 7,727   | 888              | 4,982   |
| Holland.....    | 4,060            | 5,344   | 4,833            | 2,655   |
| Bremen.....     | 3,624            | 7,822   | 46,935           | 36,813  |
| Hamburg.....    | 18,472           | 42,091  | 75,870           | 84,619  |

*London, den 12. Juni.* Die Verkäufe von *Zucker* am westl. Markte beliefen sich auf 1700 Osh. und Tiercen. *Mauritiuszucker* sind 12,565 S. versteigert worden zu vollen frühern Preisen, nur die geringen Sorten waren 6 d. billiger, 3486 S. *Bengal*, im Ganzen zu vorigen Preisen.

— *den 19. Juni.* *Palmöl* 31 Pfd. per Tonne. *Ostind. Cacao* ist noch vernachlässigt. *Salpeter* ist in Begehr, feiner 27 — 28 sh. mittel 26 sh., ord. 25 sh. *Granada Cacao* 51 sh. 6 d. — 51 sh. 6 d., *Trinidad* 54 sh. — 54 sh. 6 d. *Cassia lignea* mittel 70 sh. — 73 sh. 6 d. *Ingwer* ord. 16 sh. 6 d. *Piment* 2¼ — 3 d. *Ind.* ord. Congo 2 sh. ¼ d., *Tonkay* 2 sh. 1 d., ord. *Haysan* 2 sh. 1 d. *Comp. Congo* 2 sh. 1 d. — 2 sh. 1½ d.

— *den 26. Juni.* In heut. Auction 122 F., 100 S. *Trinidad Cacao* 50 — 51 sh. *Salpeter* 800 S. 26 — 27 sh.

— *den 3. Juli.* Für *Cassia lignea* Nachfrage, der Markt ist geräumt, 74 — 77 sh. für mittel, 77 — 80 sh. für gute u. feine Qualität. *Pfeffer* auf frühere Preise gehalten, die Eigener wollen nicht unter 3½ d. verkaufen. Für *Piment* Begehr. *Ostind. Ingwer* 2 sh. niedriger. Der *Kaffee*-Markt ist träge, doch werden



geringeren Preise bewilligt, 862 S. Rio 42 — 44 sh., 1707 S. la Rica 47 — 50 sh. Die früheren Preise für Zucker behauptet sich, Mauritius gute feine gelbe 83 — 85 sh, 5 d., mittel — 83 sh., geringe 70 — 76 sh. Cocosöl gefragter, 646 F. 7 Tons in Auction zu 32 sh. 7 d. Palmöl begehrt, erste Qualität 37 Pfd. 10 sh. Der Reis-Vorrath ist bedeutend, 154,590 S. in 50,000 in 1839 zur selbigen Periode, Carol. 34 — 36 sh., 8 sh. 6 d. — 8 sh., Bengal 12 — 13 sh.

London, den 10. Juli. Piment ord.  $2\frac{3}{4}$  d., mittel  $3\frac{1}{2}$  d. Cassia lignea h. 6 d. — 80 sh. für gute, 75 — 78 sh. für mittel. Barba Ingwer 42 sh. 6 d. Sumatra Pfeffer  $3\frac{1}{2}$  d. In Auction Cacao h., 37 B. Trinidad 51 — 54 sh. 6 d. Salpeter fest auf frühere Preise gehalten, 1030 S. Calcutta in Auction 25 sh. 6 d. — 26 sh. Neapel, Anfangs Juni. Da die Olivenblüthe theilweise gelitten so rechnet man in Puglien auf nicht mehr als ein Viertel der gewöhnlichen Ernte. Gallipoliöl ist auf  $26\frac{1}{2}$  Duc. gestiegen. Rotterdam, den 19. Juni. Nelken 67 Cs. Muskatnüsse 200 Cs. Katblüthe 140 — 150 fl. Pfeffer 24 Cs. Carol. Reis geschält fl., amerik.  $13\frac{1}{2}$  fl., Tafelreis 12 —  $12\frac{1}{2}$  fl., Java geschält. 10 fl., ord. 8 — 9 fl. Stettin, den 10. Juli. Blauholz camp.  $4\frac{1}{2}$  —  $4\frac{1}{2}$  Thlr., Jam. St. Domingo  $3\frac{3}{4}$  Thlr.

### Miscellen.

#### Theepflanzungen in Assam.

Der Director der Theepflanzungen, Bruce, hat wieder 195 in Thee nach Calcutta gesandt, von ausgezeichneter Güte. Er glaubt, daß die Theecompagnien mit den gegenwärtigen Mitteln im laufenden Jahre 2000 Kisten fabriciren können. Man glaubt auch in den Nelgherris in der Präsidentschaft Madras eine große Quantität guten Thee fabricirt, aber Assam bietet bis jetzt keine Vortheile für die Betreibung dieser Cultur im Großen, so daß man alle Mittel auf diese Provinz concentriren sollte.

#### Notiz über *Polygonum tinctorium*;

von

Dr. Reufs.

Das Vaterland der Pflanze ist China. Sie enthält Indigo und wird in mehreren Gegenden Frankreichs mit Erfolg cultivirt, erfordert wenig Pflege und kommt auf einem seichten Boden fort. Ihr Gehalt ist größer als in der *Isatis tinctoria*. Nach Jaume Laire liefert ein Morgen Landes von 32,400 Quadratfuß 600 Pfd. Blätter, welche nach Baudrimont 80 — 100 Pfd. geben können. 90 Pfd. würden einen Ertrag von 630 Fr.

In gutem Boden kann der Ertrag doppelt so hoch steigen. Der Indig soll sich bloß im Parenchym der Blätter finden. Die beste Methode der Darstellung nach Baudrimont ist die, man die Blätter mit so viel kochendem Wasser übergießt, wie sie nur davon bedeckt werden und nach 12 Stunden durch die Infusion aber noch zweimal wiederholt. Den sämmtlichen Flüssigkeiten setzt man 1 Proc. Schwefelsäure zu, rührt

um und läßt in flachen Gefäßen an der Luft stehen, den Bodensatz sammelt man nach 24 Stunden, indem man die Flüssigkeit abgießt und filtrirt, wobei es gut ist, die Flüssigkeit bis zum Sieden zu erhitzen, weil sich dann der Indig zusammenballt und nicht die Filter verstopft. Baudrimont glaubt, daß der Indig in den Blättern nicht in blauem Zustande vorhanden sei, was Robiquet indess bezweifelt. Die *Société de Pharmacie* hat eine Preisaufgabe für eine chemische Prüfung ausgesetzt.

### Berg- und Hüttensegen.

Die *Bergwerke in Toscana* wurden in früheren Zeiten ausgedehnter betrieben als jetzt. Die bedeutendsten sind die *Eisenbergwerke auf Elba*, die in den Jahren 1825 — 34 jährlich im Durchschnitt 1600 Centi oder 1785 Tonnen Gewicht lieferten, à 1 Pfd. Sterl. — 1 Pfd. 4 sh. per Tonne. Die *Schwefelgrube in Pisa* (Provinz Geosseto) lieferte in einem Zeitraume von 10 Jahren jährlich 413,000 Pfd., könnte aber bei weitem mehr liefern. Das *Kupferbergwerk bei Monte Catino* im Thal von Cacena giebt jährlich 100,000 Pfd., und könnte ebenfalls mehr liefern. In dem *Kupferbergwerk von Montieri* und in dem *Eisenbergwerke von Pistoia* sind die früheren Arbeiten wieder aufgenommen, doch ohne große Ermuthigung. Die *Silberbergwerke von Pietra Santa* scheinen keinen Vortheil zu bringen. Es werden 10 *Massebrüche* bearbeitet, der von *Saravezza* ist dem von *Carara* gleich zu setzen. Die *Lagunen von Monte Cerboli* liefern jährlich 600,000 Pfd. Boraxsäure, ein Sechstheil davon benutzt man zur Bereitung von *Borax*. In *Massa* giebt es reiche Adern von *Kupfererz*. In *Montroni* *Alaunwerke* und in der *Maremma* *Bleigruben*, die jetzt nicht bearbeitet werden.

### Topase von außerordentlicher Größe.

In den Granitbergen zwischen der *Unda* und dem *Urde* hat man unlängst *Aquamarine* und *Topase* von kolossaler Größe gefunden. Das Museum des Berginstituts hat unter andern ein weingelbes Topas erhalten, krystallisirt als abgestumpftes rhomboidal-Prisma, welcher 31 Pfd. 31 Solotn. wiegt, und in welchem ein rauchfarbener Bergkrystall eingewachsen ist.

### Ueber die Nachtheile des Nassmachens der Steinkohlen.

von

Großs.

Großs zeigt, daß man häufig aus Unkunde den Steinkohlen, welche meistens schon 15 — 20 Proc. Feuchtigkeit enthalten, noch mehr Wasser zusetzt, in der Meinung, die Heizkraft zu vermehren, daß dadurch aber gerade das Gegentheil bewirkt werde, indem die Kohlen nur etwa 10 Proc. Wasser mit Vortheil für ihre Heizkraft ertragen könnten und es klar sei, daß die Kohlen nicht früher brennen und ihre Wirkung befähigt könnten, als bis das darin enthaltene Wasser daraus verdunstet sei, wodurch natürlich wieder ein Theil der Heizkraft verlohren wird. (*Polytechn. Centralbl.* Nr. 18. 1840).

**Argentan mit Silber zu plattiren**

von A. T. Merry, welcher sich darauf ein Patent geben  
das Verfahren hat natürlich das Gute, daß beim Gebrauch  
an, wo sich Silber abscheuert, nicht roth werden, son-  
dern dem Silber ähnliches Ansehen behalten. (*Polytechn.*  
No. 22. 1840.)

---

**Pharmaceutisches Institut in Jena.**

Das pharmaceutische Institut zu Jena können zu Michaelis  
neue Mitglieder eintreten. Anmeldungen zum Eintritt sind  
frühzeitig an den Unterzeichneten zu richten. Der 5te  
über diese seit 1829 bestehende Lehranstalt findet sich  
in der *Archiv der Pharm.* Jan. 1839.  
am Juli 1840.

H. Wackenroder.

---

**Pharmaceutisches Institut in Dresden.**

Am 1. October dieses Jahrs beginnt in unserm Institute wie-  
der neuer Cursus; die Herren Pharmaceuten, welche geson-  
nen daran Theil zu nehmen, ersuchen wir hiermit, sich  
bei uns zu melden, damit wir die bessern Wohnungen  
reserviren können.

Vertrauen, welches uns bisher schon so vielfach bewie-  
sen ist, verpflichtet uns zu dankbarer Anerkennung und  
stets in unserm Streben ermuntern, die Einrichtungen  
des Instituts immer mehr zu vervollkommen.

Dr. O. R. Abendroth. Dr. Fr. Holl.

---

**Kauf- und Verkaufsanzeigen.**

Der häufige Anbau des Anis in hiesiger Gegend bietet mir  
Gelegenheit dar, sowohl mein durch Dampf bereitetes ächtes  
als auch reinen guten Anis, in kleinen und großen Quan-  
titäten einem billigen Preise, meinen Herren Collegen, wie  
Herren Droguisten, ablassen zu können.

Ich bei Weimar,  
Juni 1840.

Wilh. Engelhardt,  
Apotheker.

---

Westphalen soll eine Apotheke verkauft werden. Wo  
welchen Bedingungen erfährt man bei Unterzeich-

ten, den 1. Juli 1840.

Müller, Apotheker.

---

Ein zahlungsfähiger zum Apothekenbesitz qualificirter jun-  
ger sucht ein frequentes Apothekengeschäft zu kaufen.  
Käufer wollen ihre desfallsigen Bedingungen an Unter-  
zeichneten in portofreien Briefen gefälligst abgeben.

Dr. Reich, Apotheker in Burg bei Magdeburg.

---

**Dienstgesuche.**

Am 1. October auf Michaelis ist eine Gehülfeustelle zu besetzen  
bei Hofapotheker Schütz in Berleburg.

Auf nächsten Michaelis wird in meiner Apotheke ein hülfenstelle vacant, zu deren Besetzung ich einen jungen maceuten suche, der sich über sein bisheriges Wohlvermögen genügend ausweisen kann.

Meschede, den 1. Juli 1840.

L. Wrede, Apotheker

## II. Anzeiger der Verlagshandlung

(Inserate werden mit 1½ Ggr. pro Zeile mit Petitschrift, oder für den Raum derselben, berechnet.)

Hannover, im Verlage der Hahn'schen Hof-Buchhandlung sind so eben erschienen:

### Die Versteinerungen des norddeutschen Kreidegebirges

Von

**F. A. Roemer.**

Königl. - Hannoversch. Amts-Assessor, Mitgliede der Société géologique de France und andrer gelehrten Gesellschaften.

Erste Lieferung mit 7 lithograph. Tafeln. gr. 4.  
geh. 1½ ₰.

Der Herr Verfasser wird in diesem Werke das norddeutsche Kreidegebirge und dessen organische Reste mit gleicher Genauigkeit, wie früher das Oolithgebirge beschreiben und wird es das umfassendste auf dem Continente bis jetzt in dieser Beziehung überall ist; es dürfte dieses Unternehmen daher um so mehr Interesse erwecken, als gerade jetzt das Kreidegebirge Gegenstand eifrigsten Untersuchungen in so vielen Gegenden ist und die ehrenvollste Anerkennung gefunden haben. Die zweite Hälfte wird bald nachfolgen.

Das früher erschienene Werk: **Die Versteinerungen des norddeutschen Oolithen-Gebirges von F. A. Roemer.** Mit 16 lithogr. Tafeln. Fein Velinoppr. erschienen 1836. nebst Nachtrag dazu. Mit 5 lith. Tafeln. gr. 4. Ebendaselbst. kostet 9¼ ₰.

Bei Joh. Fr. Baerecke in Eisenach ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Artus, W. Dr., Handbuch der Pharmacie nebst Gebrauch für angehende Apotheker und Aerzte. sorgfältig bearbeitet. gr. 8.



9. Vereinsjahr der Jussieu's. 1840.

September.

**ARCHIV**  
**DER PHARMACIE,**  
eine Zeitschrift  
des  
Apotheker-Vereins in Norddeutschland.

zweite Reihe. Dreiundzwanzigsten Bandes drittes Heft.

Erste Abtheilung.

**Vereinszeitung,**

redigirt vom Directorio des Vereins.

1) Vereinsangelegenheiten.

Versammlung in Bielefeld am 3. Juli 1840.

Der Director Dr. Aschoff von Herford führte den Vorsitz der Versammlung und Director Overbeck von Lemgo fungirte als Secretair.

Der Director Dr. Aschoff eröffnete die Versammlung unter Mittheilung einiger Nachrichten über den Kreis Herford und den gegenwärtigen Bestand, legte sodann die Controle der Rechnung vor vom zweiten Quartal l. J., und bemerkte, daß die Generalrechnung von 1839 so weit geordnet sei, daß deren Abschluß bewirken könne, ein Resultat, was für die Ordnung des Haushaltes des Vereins sehr erfreulich ist. Er wählte den anwesenden Rechnungsführer, Hrn. Lieutenant Hölmann, ließ er die Generalrechnung vorlegen und das Wichtigste daraus referiren, mit dem Bemerken, daß der ordnungsmäßige Abschluß demnächst in der Generalversammlung zu bewirkt werden solle.

Der Herrselbe hielt darauf einen Vortrag über die verschiedenen Arten des Catechu, und deren Prüfung und Verfälschung, und dann über die Darstellung des *Extracti Ratanhiae* durch die Destillation.

Apoth. Lieckfeld von Schildesche, Hr. Apoth. Melminghausen und Hr. Apoth. Witter von Werther theilten ihre Erfahrungen über diese Darstellungsweise von Extracten mit.

d. Pharm. II. Reihe. XXIII. Bds. 3. Hft.

16

Melminghausen  
theilten  
Erfahrungen mit.



Hr. Assessor Aschoff in Bielefeld sprach über das in neuen Zeiten wieder angeregte Gelbwerden von *Ungt. plumbicum*. Er legte drei Proben dieser Salbe vor, von vorzüglicher Weisse die mit *Ol. Olivar*, *Cera alba* und *Cera japonica* bereitet waren, er wies nach, daß in den Salben Spuren von margarinsäure Bleioxyde enthalten sein.

Hr. Apotheker Upmann aus Neuenkirchen, Kreisdirector des Kreises Osnabrück, theilte mehrere Nachrichten mit über den erfreulichen Zustand des Vereins in diesem Kreise.

Hr. Apotheker Scheffer aus Halle bei Bielefeld sprach über die verschiedenen Düngmittel, und legte ein Düngpulver vor, welches der Hauptmasse nach aus gepulverter Kohle bestand, wahrscheinlich noch mit verschiedenen Salzen vermischt, dessen Composition aber er erst angeben wollte, wenn es sich in drei Jahre nachhaltig für den Boden bewähren würde. Nach den bereits gewonnenen Erfahrungen glaube er sich einen guten Erfolg von diesem Düngmittel zu versprechen, welches aus den Vortheilen einer größeren Wohlfeilheit vor dem gewöhnlichen Dünger voraus habe.

Hr. Dr. Wach, Director der Gewerbeschule in Bielefeld machte hierauf Mittheilungen über von ihm unternommene Versuche über künstlichen Dünger, der der Hauptmasse nach aus Humus, Torf, Kalk u. s. w. bestand, und auf eine Reihe verschiedener Pflanzen, in vergleichenden Versuchen, die vorthellhaftesten Resultate hervorgebracht hatte. Pflanzen, in diesem künstlichen Dünger und in gewöhnlich gedüngter Gartenerde gezogen, gaben in kräftigem und üppigem Wuchs einen bedeutenden Unterschied zu Gunsten der ersten zu erkennen. Dasselbe Resultat hatte ein in der Nähe von Bielefeld wohnender Landmann erhalten, der einen Getreideacker zur Hälfte mit gewöhnlichem zur andern Hälfte mit diesem künstlichen Dünger bestellt hatte. Der Unterschied der Vegetation war der Art, daß die Ähren auf dem letzten Theile des Feldes fast noch einmal so groß waren, als die auf der ersten Hälfte.

Director Overbeck sprach über den verschiedenen Gehalt an Inulin, der zu verschiedenen Jahreszeiten gesammelten Wurzeln von *Leontodon Taraxacum*. Die ihm Frühjahr gesammelte Wurzel enthält eine nur sehr geringe Menge Inulin, während im Herbst dieser Gehalt so bedeutend ist, daß er aus 1 Pfd. trockner Wurzeln 2½ Unze trocknen Inulins abgeschieden werden kann.

Es wurde hierauf über mehr pharmaceutische Angelegenheiten gesprochen. Fast alle Mitglieder klagten über den Aufschwung, welcher jetzt mit dem Arzneihandel durch Kaufleute und Krämer getrieben würde, und wodurch dem Apotheker nur die Mittel entzogen würden, den ihm obliegenden Pflichten nachzukommen, sondern auch so mancher Nachtheil und Schaden dem Publicum erwüchse. Allgemein war der Wunsch, doch endlich diese so wichtige Angelegenheit die ernste Berücksichtigung der Behörden auf sich ziehen möchte, um diesem heillosen Unwesen zu steuern.

Hr. Assessor Aschoff hatte eine schöne Sammlung von Drogen und Präparaten aufgestellt, die der Unterhaltung und Belehrung einen eben so anziehenden als reichlichen Stoff boten. Nach einem freundschaftlichen Mahle trennte sich die

ellschaft erst spät Abends, mit dem Wunsche, im nächsten  
e sich wieder zusammenzufinden.

Overbeck.

## Bericht über die Kreisversammlung zu Münster am 6. Juli 1840.

Außer den Mitgliedern des Kreises beehrten die Versamm-  
lung auch der Hr. Oberdirector Hofrath und Medicinalrath Dr.  
Medes, so wie die zahlreich anwesenden Mitglieder des hie-  
rigen Königlichen Medicinalcollegii und des ärztlichen Vereines  
ihre Gegenwart.

Den Vorsitz der Versammlung führte der Kreisdirector Dr.  
Schmedding, das Secretariat der Apotheker Greve.

Die Sitzung eröffnete der Kreisdirector Dr. Schmedding  
mit einem Vortrag über den Nutzen und die Wirksamkeit der  
Vereine überhaupt und des Apothekervereines insbesondere.

Nachdem er nämlich die Bedeutung und den Zweck dieser  
Kreisversammlung angegeben und darauf hingewiesen  
war, wie durch einen solchen persönlichen Verkehr der Mit-  
glieder eines Kreises diese engeren Vereinigungen erst ihren  
Werth und Nutzen erreichten, zeigte er andererseits auch,  
welche Vortheile aus der Gemeinschaft mit jenem größeren und  
heutigen Verbandsverbande der Apotheker Norddeutschlands ent-  
sprängen.

Um dieses näher darzuthun, gab er eine kurze historische  
Uebersicht der Bildung der Vereine überhaupt, woraus hervor-  
ging, daß vorzugsweise die Bedürfnisse des Handels und der  
Kunst einerseits und der Wissenschaft andererseits die Ent-  
stehung und Entwicklung derartiger Vereine (als kaufmänni-  
sche und industrielle Vereine, Gewerbe, Zünfte, Universitäten,  
Academien u. s. w.) veranlaßt hätten, so daß die Geschichte  
der meisten Städte des Mittelalters zugleich die Geschichte der  
Entwicklung gewerblicher Corporationen sei. Er zeigte, daß  
in der Natur der Sache gegründet liege, und daß eben  
so auch unsere Zeit als die Blüthezeit für Industrie und  
Wissenschaft zugleich die Zeit der Vereine sei. Keine Wissen-  
schaft habe deren so viele aufzuweisen, als die Erfahrungs-  
wissenschaften. Und die Naturforscher und Aerzte seien es  
gewesen, welche die große und schöne Idee einer jähr-  
lichen Versammlung aller Wissenschaftsgegnossen aus allen Ge-  
genden Deutschlands ins Leben gerufen hätten. Die immer rege  
Theilnahme an diesen Versammlungen und die vielfache Nach-  
wirkung, welche dieses Beispiel in andern Ländern und Wissen-  
schaften gefunden, verbürge hinlänglich ihren großen Nutzen.  
Es liege aber nicht allein in jenen ostensibeln Erfolgen der-  
selben, welche sich durch die wissenschaftlichen Vorträge kund-  
geben, sondern wesentlich auch in den mehr unscheinbaren, aber  
nicht minder wichtigen und erheblichen Wirkungen,  
welche durch den lebendigen Ideenverkehr, durch die Anregung  
zur Auffrischung des Geistes, so wie durch mancherlei Veran-  
lassungen zu wissenschaftlichen Bemühungen hervorgebracht

würden. Es sei ein still vom Baume fallender Same, der bald hier, bald dort aufgehe und Früchte trage.

Die Anwendung des Gesagten ergab sich aus der einfachen Bemerkung, daß der Apotheker sowohl dem Stande des Kaufmannes und Fabrikanten als dem des Gelehrten angehöre und daher eine doppelte Aufforderung fühlen müsse, sich um die leichteren Erreichung der gemeinschaftlichen Zwecke und Wünsche willen zu vereinigen. Und es bedürfte keiner weitläufigen Ausführung mehr, um zu zeigen, wie gut der norddeutsche Apothekerverein seine zwiefache Aufgabe löse, sowohl die materiellen Interessen als auch die wissenschaftlichen Bestrebungen seiner Mitglieder zu fördern; und wie namentlich sein Organ, das Archiv der Pharmacie, hierzu wesentlich beitrage, indem es die Fortschritte der pharmaceutischen Wissenschaft und Technik unverzüglich zur Kunde seiner Mitglieder bringe, um auch die merkantilischen Interessen des Vereins durch das Lesen der Vereinszeitung bestens wahrnehme. Außerdem aber besitze der Verein einen Unterstützungsfond für wohlthätige Zwecke und vor allem das nützliche Institut der jährlichen Generalsammlungen. Diejenigen aber, welche daran nicht Theil nehmen könnten, fänden in den Kreisversammlungen theilweisen Ersatz, und sei es darum so wünschenswerth, daß diese Versammlungen eine rege und ausgedehnte Theilnahme finden.

Darauf hielt der Herr Oberdirector eine Rede, worin er das glücklichen Gedeihens und der wachsenden Ausbreitung des Vereins, aber auch des betrübenden Verlustes gedachte, welchen derselbe durch den jüngst erfolgten Hintritt seiner hochgeachteten Gönner, Sr. Majestät des Königs von Preussen, eines der besten Ministers, des Hrn. v. Altenstein Exc., des besten Protector des Vereins, erlitten hat \*).

Derselbe benutzte zugleich die Gelegenheit, um unter Vorlage der Generalrechnung für 1839 nebst deren Belegen die Mitglieder des Kreises Münster mit dem Resultate derselben, wie mit dem wohlgeordneten Zustande der Rechnungsführung von Seiten der Direction der Generalkasse bekannt zu machen und erwähnte endlich auch der neuesten Auflage der Statuten so wie der Art und Weise, wie die Direction dieselben zum Kenntniß aller Mitglieder zu bringen beschlossen habe. Es wurden einige Exemplare dieser Auflage an die besuchenden Fremden vertheilt, um auch diese mit der Einrichtung des Vereins näher bekannt zu machen.

Nach Beendigung seiner Rede legte der Hr. Oberdirector eine eben sowohl für die anwesenden Herren Aerzte als für die Mitglieder des Kreises interessante Reihe von aus Frankreich erhaltenen Geheimmitteln und deren marktschreierischen Ankündigungen vor, woraus sich der unerfreuliche Zustand der Pharmacie in Frankreich und der nachtheilige Erfolg der die Pharmacie angewendeten Systems der Gewerbefreiheit erkennen gab, wie dieses auch durch die Mittheilung vieler Erfahrungen bestätigt wurde, welche der Hr. Oberdirector aus Frankreich selbst zu machen Gelegenheit gehabt hatte.

\*) Auf mehrfachen Wunsch ist diese Rede mit abgedruckt S. im Folgenden.

Hr. Regierungs-Medicinalrath Dr. Busch, Hr. Medicinal-Dr. Tourtual und mehre der verehrten Herren Aerzte then über diese und verwandte sich daran knüpfende Ge-  
stände.

Der Hr. Oberdirector sprach darauf über die Verbindungen odquecksilbers und Jodkaliums, die schon früher von Boul-  
untersucht wurden, und neuerdings Gegenstand der *Materia*  
geworden sind. Er zeigte die durch das Wasser augen-  
lich bewirkte Zerlegung einer Verbindung, welche aus zwei  
Jodquecksilber und einem Atom Jodkalium besteht.  
Wasser scheidet nämlich das eine Atom Jodquecksilber  
und verändert dadurch die gelbe Farbe der Verbindung in  
chöne und intensiv rothe des Jodquecksilbers. Die Reac-  
war so empfindlich, daß schon der Hauch des Mundes die  
fingliche Farbe merklich, die Berührung mit Wasser sie  
völlig veränderte.

reisdirector Schmedding theilte ein Schreiben des Hrn.  
ekers Libeau in Wadensloh mit über eine seltene und  
irte Betrügerei mit Moschus, welche darin bestand, daß  
einerer Moschusbeutel in einem größeren entleerten steckte,  
sch die Ausbeute an Moschus so sehr vermindert wurde,  
er von der Arzneytaxe dafür ausgeworfene Verkaufspreis  
etrag der eigenen Auslagen nicht erreichte. Das *Corpus*  
wurde vorgewiesen, und nach dem Wunsche des Einsen-  
lem Hrn. Oberdirector eingehändigt.

r. Professor Dr. Becks, Ehrenmitglied des Vereins, theilte  
Auszug mit aus einer Abhandlung über das Vorkommen  
ie Zusammensetzung des jüngst in der Gegend von Hamm  
scheberg entdeckten Strontians, und legte von diesem Mi-  
eine Reihe ausgewählter Handstücke vor. Der Hr. Ober-  
r theilte ebenfalls das Resultat der von ihm unternom-  
Analyse dieses Fossils mit. Das Mineral zeigt einen ver-  
ichen Gehalt an kohlensaurem Kalk, enthält aber keine  
von kohlensaurem Baryt.

r. Apotheker Hackebrom aus Dülmen legte mehre in  
the von Dülmen gefundene und für das Vereinsmuseum  
nte Fossilien vor.

in nicht unbeträchtliches Stück Bernstein in einer gerin-  
en Tiefe unter der Oberfläche gefunden. (Ein anderes  
stück von demselben Fundorte, welches vorgezeigt wurde,  
war beinahe faustgroß).

linige merkwürdig geformte (röhrenförmige) Exemplare  
ines eisenhaltigen Quarzgeschiebes.

ehr schöne und große Stücke Asphalt von Hangenau.

r. Apotheker Albers von Lengerich gab Nachricht über  
vorläufige analytische Versuche, die er mit dem Wasser  
ehr eisenhaltigen bei Tecklenburg vorkommenden Quelle,  
man zu Bädern zu benutzen beabsichtige, angestellt hatte.  
Gegenstand gab Veranlassung zu einer vielseitigen Dis-  
über die Benutzung, den Gehalt und die Wirksamkeit  
westphälischer Quellen, worüber insbesondere der Hr.  
nralrath Dr. Busch interessante Erfahrungen beibrachte.  
f Ersuchen des Hrn. Apothekers Aulicke hieselbst hatte  
Professor Dr. Haindorff die zur Aufnahme von Licht-

zeichnungen dienenden Apparate, so wie auch einige Lichtbilder mitgebracht. Unter den letzteren zeichneten sich ein Paar Exemplare aus, welche darthaten, daß die Aufnahme von Portraits mit diesen Werkzeugen recht gut gelinge. Es waren auf den vorgezeigten Platten Gesellschaften von 6 bis 8 Personen abgebildet, deren Züge mit hinlänglicher Schärfe und Deutlichkeit ausgeprägt waren. Die von Acherson angegebene Methode der Jodirung der Platten mittelst einer Auflösung von Jod in Spiritus hatte der Besitzer unzweckmäßig gefunden, indem nicht gleichförmige Färbung hervorbringe, wogegen der Dr. Schmedding versicherte, daß ihm dieselbe allerdings gelungen sei. Die Benutzung amalgamirter Platten hingegen zur Anzeichnung des Bildes hatte Hr. Dr. H. anwendbar gefunden. Hr. Prof. Haindorff, so wie Hr. Apotheker Aulicke, erläuterten den Daguerre'schen Apparat.

Zum Schlusse der Sitzung berichtete der Kreisdirector Dr. Schmedding über einige Versuche, die er über die Nachbildung von Medaillen u. dergl. mittelst des Galvanismus angestellt hatte, und sprach namentlich über die vortheilhafte und leichte Anwendung dieser Entdeckung zur Anfertigung unverwundlicher Documente und anderer Schriftwerke, und wie das durch vorgelegte Exemplare nach.

Nachdem die übrige Zeit des Tages dem geselligen Verkehr gewidmet gewesen war, führte gegen Abend der Hr. Prof. Beck die Gesellschaft zur Besichtigung des botanischen Gartens. Als dieses geschehen war, trennten sich die Mitglieder in dem Bewußtsein, nicht bloß einen nützlichen, sondern auch trotz des ungünstigen Wetters, einen genussreichen Tag verbracht zu haben.

Münster, den 21. Juli 1840.

Dr. Schmedding.

## An die Kreisversammlung in Münster.

Hochgeehrte Herren!

Es ist das Gefühl wahrer Theilnahme, was mich heute Ihre Mitte ruft; dieses schreibt mir vor, Ihnen auszudrücken, wie werth es uns war, daß Sie in der Begründung des Vereins in Münster unserm Vereine beitraten, und dadurch demselben die Kräfte zuführten für die Erreichung der Zwecke, die da in seinen Bestrebungen sind.

Die vollkommnere Blüthe selbst ist es, die als der Lohn der vereinten Arbeit uns erfreuet; indem wir alle zu einem Ziele streben, gewinnt in dem Vortheile des Ganzen jeder Einzelne zugleich durch die eigene Thätigkeit, da er durch solche die gemeinsamen Zwecke sie knüpfend, diese, wie sich selbst wesentlich fördert. Unser Fach bietet uns das schöne Verhältniß dar, daß darin Alles einem hohen, einem edlen Zweck dienen muß, und jedes wahrhafte Streben des Einzelnen dasselbe ein wahrer Gewinn ist für das Ganze, ein Resultat send eben die Summe aller dieser einzelnen Thätigkeiten.

Es giebt unstreitig wenig Fächer, die eine so sorgfältige Beobachtung mannichfacher Verhältnisse erfordern, als das unsere verlangt, wenn es von einem erfolgreichen Gedeihen begleitet

dar,  
enen muß,  
asselbe ein w  
end eben di  
Es giebt  
beobachtung  
Es giebt  
Es giebt



II. Allen voran aber steht die Hauptaufgabe: die Arznei der vollkommensten Güte dem Kranken zu übergeben, der Krankheit und den Absichten des Arztes gemäß. Das ist der Act, in welchem alle Sorgfalt des Apothekers zuletzt sich zu erfüllen muß. Das ist die schöne Mission, die wir zu erfüllen. Haben wir dieses vor Augen, so werden viele andere Bedürfnisse, in denen wir zu uns selbst, zu unserm Geschäftsfeld, zu den Aerzten, wie zu dem Publicum stehen, und von der zartesten Natur sind, eine angemessene Auflösung finden, sei es in wissenschaftlicher, wie in practischer Hinsicht. Wird ferner die Bedeutung der Arzneimittel von den Behörden in ihrer ganzen Wichtigkeit aufgefaßt, so dürfen wir die Hoffnung hegen, daß durch angemessene Verordnungen die mannichfachen Nachtheile beseitigt werden, die jetzt so stark drücken, und so viele Klagen herbeigeführt haben. Neben auf der andern Seite die schöne Genugthuung, daß die Pharmacie gegen frühere Zeiten eine bedeutende Umgestaltung erfahren hat, das Streben nach gründlichen wissenschaftlichen Methoden darin zu arbeiten, hat dieses zu einem hohen Grade von Vollkommenheit geführt. Hier ist eine moralische Höhe für dasselbe hervorgegangen, deren Erreichung unsere angelegentlichste Mühe sein muß; aus diesem Endpunkte fließen uns zwar stets höhere Verpflichtungen auf, auch wirkungsreicher treten damit die Erfolge auf, unser Fach zu leisten bestimmt ist.

Diese moralische Höhe ist das wesentliche Streben unsers Vereins, zu ihr führt das Bewußtsein in Verbindung mit vielen andern Collegen demselben edlen Ziele zuzusteuern. In diesem zwanzigjährigen Wirken ist das immer der Brennpunkt, in welchem alle einzelnen Thätigkeiten der Anstalt sich vereinen. Daß dieses Ziel unverrückt im Auge behalten wurde, das hat mit dem Verein zu seiner bedeutenden Entwicklung gebracht, das ihm das Wohlwollen der höchsten Behörden erworben, und das ihm die erfreuliche Theilnahme bewiesen hat, die der hochverehrte Oberpräsident dieser Provinz unselben angedeihen läßt, und wofür wir dem in segensreichem Wirken so hochstehenden Manne den tiefsten Dank sagen.

Seit zwanzig Jahre auch waltete schützend und hebend über unsern Verein das Auge eines Mannes, dessen reicher Geist alles umfaßte, was edel, schön und groß in Wissenschaft wie im Leben, der in allen Zweigen seines Amtes Gerechtigkeit und Humanität hervorrief, auf eine Weise, daß deren Erinnerung eine feste Marke sein werden in dem Denkbuche der Geschichte.

Dieses Auge ist für die Erdenwelt geschlossen, um nicht mehr in irdischen Lichte zu schauen die Vollendung, der hier sein Auge unverrückt zugewendet war. Lassen Sie die Pflicht der Gerechtigkeit mich erfüllen, und dem Gedächtnisse des verstorbenen Ministers von Altenstein auch unsere Versammlung gewidmet sein. Unter seiner Leitung wurde unser Verein gegründet, und bis zu seinem Tode der Beschützer desselben, und das Wohlwollen dafür bedacht. Die Geschichte unserer Anstalt, wie sie in den Zeitschriften derselben verzeichnet ist, wird als die erfreulichsten Beläge dar, welche große Theil-

nahme der verewigte Protector derselben schenkte. In seinem Wohlwollen erhob sie sich, und bildete sie sich aus. Die Erweiterung des Vereins, die Befestigung desselben, die Begründung des Vereinskapitals, die Ausdehnung des Unterstützungsinstituts für würdig ausgesiente invalide Gehülfen, die *Leuzer* und Zeitschriften des Vereins, alle einzelnen Zweige der Wirksamkeit des Institutes entgingen seiner Aufmerksamkeit nicht und wurden durch diese, so wie durch seine einsichtsvollen Rathschläge und wirksamen Unterstützungen vervollkommen geloben. In seinem Geiste die Verwaltung des Vereins zu führen, ist das unablässige Streben des Directoriums gewesen; die Blüthe der ganzen Anstalt ist der schönste Beweis, daß dieser der wahre und richtige Weg war; in seinem Geiste sie fortzuführen, das soll auch ferner unser Streben sein, das bleibende Gefundene sei uns auch das Bleibende, das Dauernde; damit wir den alle unsere verehrten Collegien einverstanden sein; sie mit uns einverstanden sein, daß wir so auf das Verdienst das Gedächtniß des hochgefeierten verewigten Mannes begründet das aus unserm Vereine nimmer verschwinden kann; das Gedächtniß des großen Mannes, unter dessen Schutze die Anstalt entstand und emporwuchs, das sei festgehalten auch in ihrer künftigen Wirksamkeit, und diese selbst wiederum das beste Zeichen der vollen Dankbarkeit, die uns für immer bei dem Namen Altenstein erfüllt.

Wer enträthelt die Wege der Vorsehung! Kaum war sich der Grabeshügel über dem Mann, der im weitverreichten Dienste so Großes in allen ihm anvertrauten und untergebenen Aemtern für den Staat, für die Menschheit hervorrief, da trauerte eine ganze Nation an dem Sarkophage des Königs, da trauerte eine ganze gemeinsame Vaterland, und überall wo Edles empfunden und verstanden wird, um den Tod des besten der Könige. Auch unser Verein trauert um diesen Tod. Des vollendeten Königs Majestät, unter dessen glorreicher Regierung so Großes vollendet wurde für Vaterland, für Wissenschaft, für Kunst und Industrie, beachtete auch unsern Verein mit Allerhöchster Huld. Die Königliche Gnade war es, die 1827 \*) den Grund zu dem Vereinskapitale legte, und hierin die gute Sache auf eine dauernde erhebbende Weise anerkannte, als werththätig sie förderte. Der feste Fond des Vereins wurde auf dieses Allerhöchste Königl. Geschenk begründet, und so ist auch dieses und damit eine wichtige Stütze des Vereins ein Denkmal der Huld des Königs, der nach Kampf und Sieg die Segnungen des Friedens wohlthätig überall verbreitete. Nicht zurückhalten wollen wir das Gefühl der tiefempfundenen Trauer, was den ganzen Verein ergreift um den Tod des überall verehrten, des gerechten und milden Monarchen, und wie beschränkt auch unser Kriegermühe, so erachte ich es doch als eine mir obliegende Pflicht, diese Trauer des Vereins hier öffentlich auszusprechen.

Das Gefühl aber, welches diese hervorrief, das soll es nicht wieder erheben, und wenn ich bereits erwähnte, daß der jetzige vollkommene Zustand der Pharmacie eine moralische Höhe beiegeführt habe, der das wesentliche Streben auch unsern

\*) S. d. Vereinszeitung v. 1827. 161.

es gilt, so wollen wir aus der Trauer zu dieser unsere Blicke heben, ihr unser Streben weihen und darin das Gedächtniß des großen Geschiedenen in unserm Kreise auf die würdigste Weise begehren, vertrauend, die Zukunft werde die Wünsche erfüllen, die wir für unsern Verein hegen, und der wohlwollende hohe Schutz der Anstalt ferner verbleiben, unter welchem bis dahin so wirksam fortschritt.

Rudolph Brandes.

## **Bericht über die Versammlung des Luckauer Kreises, gehalten zu Luckau den 13. Juli.**

Den 13. Juli früh 10 Uhr hatten sich in dem dazu bestimmten Locale eingefunden:

- 1) Hr. Apotheker Göllnitz,
- 2) „ Kreisphysicus Dr. Schramm,
- 3) „ Apotheker Sasse,
- 4) „ „ Franke,
- 5) „ „ Krüger,
- 6) „ „ Schumann,
- 7) „ „ Wedel,
- 8) „ „ Luckwaldt,
- 9) „ „ Rabenhorst.

Nachdem College Sasse als Secretair der heutigen Versammlung einstimmig gewählt worden war, eröffnete der Hr. Kreisdirector Rabenhorst die Versammlung mit einer Rede, in der er zuerst über die Entstehung, den sehr erfreulichen Fortgang und die so schnelle Erweiterung des Kreises Luckau referirte, darauf seine Ansicht über die französische Botanik, insbesondere aber über die natürlichen Systeme vergleichend mit dem Linné'schen Sexualsysteme mittheilte und zwar in Rücksicht des Jussieu'schen Vereinsjahrs; ferner auf die Nützlichkeit und das eigentliche Wesen und die Tendenz der jährlichen Versammlungen aufmerksam machte, besonders hervorhebend, wie sehr sie die wahre Collegialität befördern, wie sehr der mündliche Austausch von Ideen und Meinungen anregend auf das Studium unserer Wissenschaft sei; er gedachte dabei der Blüthezeit des hellenischen Alterthums, daß das alte Geschlecht die den Werth des lebendigen Wortes zu schätzen gewußt habe und schloß seinen inhaltsreichen Vortrag endlich mit eigenen Wünschen und Hoffnungen, die wir von unserm neuen Vorstande und Herrn zu hegen uns wohl berechtigt fühlen dürfen.

Hierauf legte

2) der Hr. Kreisdirector die Rechnungen des Kreises vor und bemerkte, daß die meisten Mitglieder pro 1840 nur 6 Thlr. gesandt hätten, während der Beitrag doch 6 Thlr. 5 Sgr. betrage und bat um Berichtigung dieser Differenz.

3) Wurden die bereits circulirten Journale verkauft, wofür 6 Thlr. 5 Sgr. zur Kasse kamen. Es wurde hierbei beschlossen, daß das Polytechnische und Pharmaceutische Centralblatt von 1841 ab nicht mehr mitgehalten, dagegen die medicinische Central-Zeitung von Sachs angeschafft werden solle.

4) Theilte der Hr. Kreisdirector eine Einladung zur General-

versammlung, welche den 8. und 9. September l. J. in Leipzig statt finden werde, an sämtliche Mitglieder mit.

5) Wurde über das Gelbwerden des *Ungt. plumb.*, alle möglichen Gründe erwägend, weitläufig debattirt. Die Ansichten bleiben jedoch getrennt, indem sich jeder auf seine gemachten Erfahrungen stützte. Der Gegenstand mußte deßhalb zur weiteren Prüfung für die nächste Versammlung zurückgegeben werden.

6) Trug Hr. College Franke einen wohl sehr zu beschätzenden Plan zu einem allgemeinen Feuerversicherungsverbande unter den Apothekern des ganzen Vereines vor. Er wurde einstimmig acceptirt und beschlossen, daß beim Oberdirectorio darauf angetragen werden solle, die Stimmen der einzelnen Kreise über diesen höchst wichtigen Gegenstand zu hören und wohl zu berücksichtigen. Die Details dieses Planes sollen seiner Zeit ausführlich mitgetheilt werden.

7) Theilte Hr. Kreisdirector Rabenhorst eine interessante Abhandlung über *Extr. Pulsatillae* mit, sprach über die Bereitung des Anemonins und der Anemonensäure, über ihre Eigenschaften und über die Resultate, die nach der endermatischen Anwendung dieser verschiedenen Stoffe bei scrophulösen Augenleiden sich ergeben hätten.

8) Nahm Hr. Kreisphysicus Dr. Schramm das Wort, sprach mit liebevollen und sehr verbindlichen Worten seinen Dank wegen Aufforderung zur Theilnahme an der heutigen Versammlung aus, und versicherte, bei allen künftigen Versammlungen so es seine Berufspflichten nur einigermaßen gestatten würden, niemals zu fehlen, indem er von der Wichtigkeit des Vereins im Allgemeinen, so wie von der Zweckmäßigkeit und dem hohen Werthe der mündlichen Berathungen tief durchdrungen sei.

9) Legte Hr. Kreisdirector Rabenhorst seine neu entdeckte *Carex Graßmanniana* mit ihren verwandten Arten, als *C. humilis* und *pilulifera* vor, erläuterte ihre specifische Verschiedenheit und theilte jedem der Anwesenden getrocknete Exemplare mit. Hierauf legte derselbe auch die *Pulmonaria saccharata* Mart. mit allen andern deutschen Arten und Varietäten vor, erläuterte ihre Charactere und erinnerte, daß er hierzu nur durch die vom Professor Bartling im Maiheft d. J. unsers Archivs S. 28. gegebenen Notiz, daß die *P. saccharata* nur Varietät der *P. officinalis* sei, veranlaßt sich fühle und versprach, seine Untersuchungen über die Pulmonarien, je nachdem es seine Zeit gestatten würde, dem Archiv zu übergeben.

10) Sprach College Schumann den Wunsch aus, daß der Verein eine Vereins-Sammlung, alle naturhistorischen Gegenstände einschließend, vorzugsweise aber von seltneren Drogen und chemischen Präparaten anlegen möchte. Dieser Wunsch wurde nach einigen Erörterungen allseitig bestens acceptirt, jedes Mitglied versprach seine Mitwirkung und der Hr. Kreisdirector übernahm es gütigst, für eine zweckmäßige Aufstellung und Conservirung der Gegenstände Sorge zu tragen.

11) Wurde als Versammlungsort im Jahre 1811 einstimmig wiederum Luckau gewählt, hoffend, daß die Herren Mitglieder sich zahlreicher, als diesmal einfinden werden. Hierauf gab es nichts weiter zu erinnern und die Versammlung wurde geschlossen. Doch blieben die Anwesenden vereinigt zu einer



gemeinschaftlichen Mittagsmahle. Den Toasten des Hrn. Kreisdirectores auf Se. Maj. Friedrich Wilhelm IV., unserm Oberdirector Dr. Brandes, das Ehrenmitglied Hrn. Kreisphysicus Schramm folgten zahlreiche andere, meist in sehr gehaltenen Worten. Gegen 7 Uhr Abends wurde die Tafel aufgetragen und die Anwesenden nahmen gemeinschaftlich die Treppe der Herren Gebrüder Beckh und darauf die Anlagen Kunst- und Handelsgärtners Goerner in Augenschein. Am Abend trennten sich die Mitglieder unter herzlichen Wünschen, daß der Himmel uns im nächsten Jahre in bester Gesundheit und Zufriedenheit wieder zusammenführen möge.

Luckau, den 13. Juli 1840.

Der zeitige Secretair,  
Apoth. R. Sasse.

## Bericht über die Jussieu'sche Versammlung des Mansfelder Kreises.

Die diesjährige Versammlung des Vereinskreises fand am 1. Juli hier in Eisleben wieder in dem freundlichen Sommerlothe der Erholungsgesellschaft statt. Es hatten sich, nach vorgangener schriftlicher Einladung, dazu eingefunden: die Herren Collegen Hornung und Krüger aus Aschersleben, Becker aus Netra, Kypke aus Quersfurt, Benemann aus Merseburg, Fischer aus Lauchstädt, Bonte aus Hettstädt, Wachsmuth aus Ermsleben, Blankenburg aus Sondersleben, Weis aus Alsleben, Drechsler aus Sangerhausen, Haefslers und Seke aus Eisleben. Als Gäste waren wir so glücklich bei uns zu sehen: Hrn. Chemiker Böttger, Hrn. Dr. Genthe, Dr. Gräfenhan von hier, und die Herren Collegen Schumann aus Berlin, Hartmann jun. aus Halle und Lange aus Amstsch.

Der Kreisdirector sprach zuerst einige Worte über die Feier heutigen Tages, gab einen kurzen Bericht über die Angelegenheiten des Kreises, legte die Jahresrechnung vor, sprach dann von der außerordentlichen Vergrößerung des Apothekervereins Norddeutschland, besonders durch den jüngsten Anschluß so vieler Collegen des Königreichs Sachsen, und schilderte dann die großen Verdienste, welche sich der Oberdirector Hr. Hofrath Dr. Brandes durch seine unermüdete Thätigkeit und Sorgfalt um das Wohl des Vereins und der ganzen Pharmacie erworben hat.

Hierauf legte der Kreisdirector mehrere chemische Präparate vor, als: Naphtalin, Benzin, Kampher-, Kork- und Schleimsäure, Cubebaren aether., mehrere Kobalt- und Chlorverbindungen, Silicium, Elemin, Gliadin, Glycyrrhin, Leucin, Althaein, Ranzucker, Harnstoff, Harnbenzoesäure, Schillerstoff, Zinn etc.

Hr. Berg- und Hüttenleve Böttger zeigte eine Stufe von reinem Platin vom Ural, mehr als zwei Loth wiegend, vor, sprach einige Worte über die Fundorte des Platins, so wie die schöne Feldspathkrystalle, von der Form der Grundsäule natürlich vorkommenden Feldspaths, welche sich von Zeit zu Zeit in den Ofenbrüchen des Gestelles der Sangerhäuser



Kupferschmelzöfen finden, und von welchem Vorkommen zuerst der Bergprobierer Heine hieselbst in *Pogg. Annal.* Bd. 34, S. 311 öffentlich Mittheilung gemacht hat. Ferner zeigte derselbe ein Stück Eisensau vor, wie solche sich beim Verschmelzen der Mansfeldischen Kupferschiefer in dem Ofenheerde der Schmelzöfen niederschlagen. Diese Eisensauen sind merkwürdig durch ihren (zum Theil bedeutenden) Gehalt an Molybdän. Das angezeigte Stück hatte ein fast silberweißes, stark glänzendes, theils feinkörniges, theils rein krystallinisches blättriges Aussehen, und die am meisten glänzenden und leichten Partien haben den größten Molybdängehalt, der bis einige 20 Procent steigt. Der Bergprobierer Heine hat diese Eisensauen analysirt, und diese seine Untersuchung im *Journal für pract. Chem.* Bd. IX, 178 mitgetheilt. Auch legte uns Hr. Böttger die höchst interessanten Stoffe: Lithion, Bor, Zirconium, Yttrium, Aluminium, Ceriumoxyd, Silicium, Beryll und Zircon in Krystallen, Iridium, rohes Iridium, Osmium, Palladium, Kobalt, Nickel, Tellur, Molybdän, Titan, Uran und mehrere ihrer Verbindungen vor, so wie auch eine schöne Stufe von vanadinsaurem Bleioxyd, und viele andere seltene Präparate.

Hr. Apotheker Benemann aus Merseburg sprach über die Bereitung des *Acet. plumb.*, indem er den Bleizucker mit der Silberglätte und etwas Wasser auf dem Präparirstein eine Stunde hindurch zusammenreiben und dann die Mischung ruhend läßt, wodurch ein stets gleiches Präparat erhalten werden soll.

Der Kreisdirector Giseke legte eine Berechnung in Procenten, von der Ausbeute der Extracte aus frischen marketischen Kräutern, vor, welche er als Durchschnitt aus den Berechnungen der letzten Jahre genommen hatte, und woraus hervorging, daß die Ausbeute sich nicht jedes Jahr gleich blieb, wenn auch mit gleicher Aufmerksamkeit gearbeitet wurde, desgleichen die Berechnung von der Ausbeute der Extracte aus den Wurmrinden, Hölzern und Kräutern. Er sprach über die Zweckmäßigkeit bei der Bereitung der *Resina Jalapae*, die Wurzeln zuvor einmal mit heissem Wasser auszuziehen, und hatte auf diese Weise aus 10 Pfd. Jalapenwurzel durch zweimaliges Ausziehen mit Weingeist 19 Unzen, und durch einen dritten Abzug noch eine Unze und fünf Drachmen eines schönen hellen Harzes erhalten.

Ueber mehr practische Erfahrungen wurde nun noch ein allgemein interessantes Gespräch gepflogen und dann die Sitzung um 2 Uhr Nachmittags geschlossen. Ein heiteres Mittagessen bei dem unserm hochgeschätzten Oberdirector und allen den Herrenmännern, die sich mit Eifer für das Wohl der Pharmazie interessiren, ein Lebehoch gebracht wurde, beschloß die Versammlung mit dem einstimmigen Wunsche, im nächsten Jahre hier wieder recht zahlreich zusammenzukommen.

Giseke.

### Eintritt neuer Mitglieder.

Hr. Apotheker Salzmann in Löbau ist, nach Anmeldeung durch Hrn. Vicedir. Dr. Meurer und Hrn. Kreisdir. Pischke,

irkliches Mitglied des Vereins in den Lausitzer Kreis aufgenommen worden.

desgl. Hr. Apotheker Schmidt in Vörde, nach Anmeldung an Hr. Kreisdirector Weber, in den Kreis Schwelm.

desgl. Hr. Rathsapotheker Deichmann und Hr. Apotheker Ekin in Hildesheim, Hr. Apotheker Becker in Peine und Apotheker Schwabe in Lamspringe, nach Anmeldung durch Medicinalrath Dr. Bergmann in Hildesheim, dem wir ein Interesse an der Anstalt unsern herzlichen Dank darlegen, in den Kreis Hannover.

Hr. Apotheker Horn in Gronau, bereits früher Mitglied des Vereins, ist in den Kreis Hannover wieder eingetreten.

benso Hr. Apotheker Huhle in Königsbrück, in den Kreis Stadt-Dresden.

---

### **Ehrenmitglieder.**

zu Ehrenmitgliedern des Vereins wurden neuerdings aufgenommen:

Se. Exc. der Hr. Staatsminister Freiherr v. Nostitz und Endorf in Dresden, Hr. Geh. Justizrath Dr. Merbach, Medicinalrath Dr. Seiler und Hr. Medicinalrath Dr. Franke in Dresden, Se. Exc. der Hr. Oberpräs. Graf v. Stolberg-Wernstedt in Magdeburg, Hr. Reg.-Medicinalrath Dr. Andreæ in Magdeburg, Se. Exc. der Hr. Oberpräsid. v. Bodelschwingh in Bielefeld, Hr. Kreisphysikus Dr. Kindt und Hr. Hofrath Dr. v. Oldenburg, Hr. Geh. Medicinalrath Dr. Jüngken in Göttingen, Hr. Dr. Steetz und Hr. Dr. Bulk in Hamburg, Hr. Cand. der Pharmacie in Braunschweig, Hr. Hofrath Dr. Heineke in Bernburg, Hr. Oberlehrer Koppe in Göttingen, Hr. Stadtphysicus Dr. Oppenheimer in Rotterdam, Hr. Medicinalrath und Leibarzt Dr. Hennemann in Schweinfurt, Hr. Hofrath Dr. v. Türkheim in Wien, Hr. Apotheker in Sarreguemin, Hr. Geh. Medicinalrath und Professor Schönlein in Berlin, Hr. Luhme, Besitzer der Handlung pharm. Apparate in Berlin, Hr. Reg.-Medicinalrath Dr. Hausen, Hr. Medicinalrath Dr. Tourtual und Hr. Prof. Haindorff in Münster.

---

### **Bitte um Hülfe!**

Wenn ein Mitglied des Vereins durch Unglücksfälle um das Leben gekommen ist, so wird nach §. 7. der Grundsätze der Verein die Milde und der Wohlthätigkeitssinn sämmtlicher Mitglieder in Anspruch genommen. Wir bitten, hierauf gestützt, holt unsere verehrten Collegen, den grossen Schaden ersetzen zu helfen, welchen die Herren Collegen Lincke in Göttingen und Biedermann in Schweina durch Feuersbrunst erlitten. Wir ersuchen, diese Gaben auf bekanntem Wege der Kasse zu übermachen.

**F. Aschoff. Brandes. Overbeck.**

---

## Erklärung.

Im ersten Hefte des XXXIV. Bandes der *Annalen der Chemie und Pharmacie* ist ein Aufsatz des Hrn. Professors Dr. Liebig enthalten, überschrieben: »Ueber den Zustand der Chemie in Preussen.« Nachdem er über diese seine angreifende Kritik ausgesprochen, rügt er die Pharmaceuten dieses Staates und wendet sich schliesslich zu den pharmaceutischen Vereinen. Dem letzten Umstande wegen fühlen wir uns zu nachfolgender Erklärung veranlasst. Würde Hr. Professor Dr. Liebig, den wir wegen seiner Verdienste um die Chemie so hoch schätzen, uns Mittel und Wege angeben, diese Institute noch zu verbessern, oder Mängel derselben zu entfernen, so würden wir dieses dankbar erkennen. Unsere Vereine sind aus dem reinsten Interesse für unser Fach hervorgegangen, dessen Wichtigkeit wir ganz einsehen, dessen Vervollkommenung eben das Ziel unserer Vereine ist. Es ist kaum über ein Jahr, daß Hr. Professor Dr. Liebig in sehr anerkennender Weise über den Zustand der Pharmacie in Deutschland in Vergleich gegen andere Länder ausgesprochen in der Vorrede zum XXV. Bande der *Annalen der Pharmacie*. Es heisst hier unter anderm: »Ich habe den Zustand der Pharmacie in England, Schottland und Irland aufs genaueste kennen gelernt und bin stolz auf meine deutschen Landsleute geworden, stolz, weil sie so unendlich weit an wissenschaftlicher Bildung alle anderen überragen. Während in den vereinigten Königreichen der Apotheker als ein aus bloßen Recepten ohne Sinn zusammengesetztes und von dem Arzte verachtetes Wesen dasteht, welches in der dortigen wissenschaftlichen Welt mittheilungsfähig, aber nur zumeilen, geduldet wird, steht der deutsche Pharmaceut neben dem Arzte, neben dem wissenschaftlich gebildeten Fabrikanten, neben den übrigen Staatsbürgern, seine Kenntnisse in der Chemie, der Botanik und den übrigen Naturwissenschaften sind gründlich und gediegen, die Sprache der Wissenschaft ist ihm vollkommen geläufig, seine Stellung bei uns ist ihm nicht von oben herab gegeben worden, hat sie sich erworben u. s. w.«

Die Schmähungen, in welche sich jetzt Hr. Professor Dr. Liebig über die Pharmacie in Deutschland und über die pharmaceutischen Vereine ergießt, sind mit den obigen Aussprüchen im geraden Gegensatze, wir weisen diese Schmähungen mit aller Indignation, dieso viele wackere Männer darüber uns gekümmert haben, und die uns jede weitere Antwort in dieser Sache verliessen.

Salzuffen, den 12. August 1840.

E. F. Aschoff. R. Brandes. Overbeck. Wilken  
L. Aschoff. Faber.

2) *Medicinalwesen und Medicinalpolizei.*

## Ueber Haarvertilgungsmittel;

von

L. Rabenhorst,

Apoth. in Luckau und Kreisdirector des nordd. Apothekervereins.

Die Berliner Tintenfabrik, das Magazin aller Panaceen, hat vor nicht langer Zeit unter mancherlei Wundermitteln auch

Arvertilgungsmittel an. Ein hiesiger Einwohner liefs sich Fläschchen von circa zwei Unzen Inhalt, welches er mit Thlr. bezahlte, kommen, schmierte sich die behaarten Stellen damit ein und hoffte auf baldige Befreiung der ihm lästigen Haare. Nach wenigen Minuten erfolgt ein heftiger, anhaltender Schmerz, er will durch Wasser die Substanz entfernen, doch vergebens. Die Oberhaut an der Körperstelle war bereits gelöst und hatte sich mit der Substanz in eine feste Rinde verwandelt. Es gelang, durch Anwendung von Chlorwasserstoffsäure diese Rinde endlich wegzubringen, indess mit ihr auch die Epidermis verschwunden und die Stelle erschien als ein entblößter Brandfleck. Der Patient litt entsetzliche Schmerzen, die Heilung erfolgte sehr langsam und — die Haare an derselben Stelle waren unverletzt. Dieses Mittel ist Schwefelcalcium, welches von Hrn. Dr. Rud. Böttger in einer kleinen Brochüre öffentlich empfohlen worden ist. R. Böttger sagt zwar in seiner Schrift, sobald die Kalkmilch mit Schwefel übersättigt ist, habe sie die Eigenthümlichkeit, nur das Haar und nicht die Haut zu lösen, oder vielmehr das Haar in die Wurzel hinein zu zerstören. Der Erfolg war aber leider ein entgegengesetzter. Ich habe dies Mittel genau nach der Vorschrift von R. Böttger bereitet, aber ein Mittel, welches diesen Zweck sicher und vollständig erreichte, durchzuführen nicht erzielen können, und muß daher mit vollem Rechte zweifeln, daß Hr. Böttger dieses Mittel wirklich geprüft hat. Andererseits ist es unbegreiflich, wie die Berliner Tintenfabrik, so wie manches andere für die Gesundheit nachtheilige Dinge unter den Augen unserer ersten Medicinalpolizeibehörde verkauft und verkaufen darf. Unbegreiflich, wie diese Behörde den Verkauf solcher Mittel ohne Weiteres gestattet, und tathen kann und wohl gar besondere Erlaubniss dazu ertheilt.

### Zahl der Aerzte in Frankreich.

Am 1. Jan. zählte Paris 1310 Doctoren der Medicin und *Officiers de Santé*. Bei 900,000 Seelen kommen 496 Einwohner auf einen Arzt. In der Provinz zählt man im Durchschnitt 100 Köpfe auf einen Arzt.

### Nachweis indischer Medicinalpolizei vor länger als zwei Jahrtausenden, von Dr. Julius.

Es gab eine, noch nicht lang entschwundene Zeit, in der die Logiker der alten Schule es für eine Art von Verbrechen hielten, die Ursprünge und Wurzeln der Wissenschaften und Künste in entfernteren Ländern und Gegenden zu suchen, als jenseit der Alpen und des adritischen Meeres, und etwas weiter zurückgehendes anzunehmen, als Römer und Griechen uns aufbewahrt und überliefert haben. Selbst der von Sir William Jones entdeckte Sandracottes der Griechen identificirte indische Changupta, so wie die, um bei der Heilkunde stehen zu bleiben, seit dem Indus nachgewiesene Kuhpockenimpfung, Rhinoplastik und Acupunctur vermochten diesen auf dem Hergebrach-

ten ruhenden Glauben und die aus demselben fließende Genügsamkeit nicht zu erschüttern. Da wird uns aus dem immer mehr aufschliessenden Hindostan und aus der des durch Carl Ritter's und Lassen's Bemühungen aus dem Lesern nahe tretenden indischen Caucasus eine welche neue Thatsachen für die Herleitung unserer Wissenschaft aus dem Schatze buddhistischer Weisheit liefert, aus denen der Stromanen oder Semanän, welche in Hindostan durch die Jünger der Brachmanen fast gänzlich verdrängt sind.

• Der durch frühere schätzbare Arbeiten über Indien bekannt Hr. J. Prinsep, Schriftführer der asiatischen Gesellschaft in Calcutta, verlas am 7. März und 4. April 1838 in zwei Abhandlungen über eine fast gleichzeitig entdeckte Reihenfolge von Verordnungen des zum Buddhathume beindischen Königs Asoka oder Piyādasi, des Enkels des gedachten Chandragupta, also im dritten Jahrhunderte Anbeginn der christlichen Zeitrechnung. Wir beschäftigen hier mit der zweiten der gedachten, in Prokrit oder Poligbenen vierzehn, auf Felsen zweier weit aus einander liegenden indischer Landschaften, in Girnar (spr. Dschirnar) oder nagara bei Innorgork in Gujerat von Dr. Wilson in und in Dhoeli in Lüttak vom Lieutenant Kitton, eingefundenen Verordnungen, in denen des Antiochus, Königs von Syrien und des Ptolemäus (wahrscheinlich Philadelphus), von Egypten, gedacht wird, bezieht sich auf die Einrichtung eines Systems der Medicinalverwaltung in dem Reiche des herrschers von Indien, welches sich, den Grundsätzen des Buddhismus gemäß, nicht darauf beschränkt hat, für Heilung der Menschen zu sorgen, sondern sich auch auf die Thierwelt erstreckt wie ja noch in unsern Tagen das berühmte von Reisenden häufig beschriebene Thierspital in Surate, zu ähnlichem fortbesteht. Diese Verordnung lautet, wie folgt:

• Allenthalben in den eroberten Landschaften des Herrschers Piyadasi, des Lieblings der Götter, sowohl in den von Gläubigen bewohnten Theilen, als da sind Chola, Pida, patra und Ketalapatra, ja selbst so weit als Tambazanni (das Taprabona der Griechen), allenthalben ist des vom geliebten Herrschers Piyadasi's doppelte Anordnung beider Hülfe eingeführt, sowohl heilende Hülfe für Menschen, als heilende Hülfe für Thiere nebst Arzneien aller Art, welche nützlich für Menschen sind, und zuträglich für Thiere. Wo solche sich nicht findet, an allen den Orten soll sie eingeführt werden und man soll Pflanzungen machen. Wurzeln und Kräuter sollen an allen den Orten, wo sie nicht sind, niedergelegt und gepflanzt werden.

• Auch sollen auf den öffentlichen Landstraßen Brunnen angelegt und Bäume gepflanzt werden zur Bequemlichkeit der Menschen und Thieren. (Zeitschrift für die gesammte Medicin Frische und Oppenheimer).





## Zweite Abtheilung.

### **Physik.**

## Ueber die Anfertigung der Magnete;

von

**Dr. Geiseler,**

Apotheker in Königsberg in der Neumark.

**E**s möchte schwer sein, genau den Kreis zu bezeichnen, innerhalb dessen sich die practische Pharmacie, deren Aufgabe die Herbeischaffung und Zubereitung der Arzneimittel ist, zu bewegen hat. Wollte man denselben weit ausdehnen, so würden selbst die zu chirurgischen Zwecken dienenden Utensilien, die auch Heilmittel sind, von dem Apotheker herbeigeschafft werden müssen; wollte man ihn eng ziehen, so würden vielen Aerzten die Mittel sowohl zur eigenen, als zur Vervollkommenheit der Wissenschaft genommen werden. Wenn nun im Laufe der Zeit sich herausgestellt hat, daß die Thätigkeit der Pharmaceuten weit die Grenzen überschritten hat und noch überschreitet, die durch die pharmaceutischen Gesetzbücher, Pharmakopöen genannt, gezogen sind, wenn dies auch ersichtlich ist aus dem Einflusse, den die Pharmacie seit einer Reihe von Jahren auf viele ihrer Bekenner auf die Vervollkommenheit aller Künste und Gewerbe ausgeübt hat, so dürfte daherhin eine möglichst weite Ausdehnung des pharmaceutischen Wirkungskreises wünschenswerth, in kleinen Städten aber, in denen für viele Bedürfnisse weniger gesorgt ist, als in grossen, insbesondere der Medicin in deren Ausübung wegen, rathsam erscheinen.

Zu den Heilmitteln, die in neuer Zeit wiederum neue Anwendung gefunden haben, gehören auch Electricität und Magnetismus, und jedenfalls ist es dem Arzt, der von diesen Heilmitteln Gebrauch machen will, sehr angenehm, wenn er in den Apotheken in grossen Städten und auf dem Lande Electrisirmaschinen,

galvanische Batterien und Magnete findet. Ueber die Anfertigung der Letzteren Einiges hier mitzutheilen, möchte deshalb nicht ganz unangemessen erscheinen.

Bekanntlich bedarf man zur Bereitung kleiner Magnete eines grössern stärkeren und von der Stärke der Letzteren hängt die zu erlangende Stärke der Ersten ab. Da nun unstreitig die sogenannten Electromagnete die kräftigsten und zugleich wohlfeilsten Magnete darbieten, so scheint mir ihre Anwendung zur Bereitung gewöhnlicher Magnete, wie sie wohl in der medizinischen Praxis gebraucht werden, am meisten zweckmässig, und darum mag denn von der Herstellung eines Electromagnets zuvörderst die Rede sein.

Nach Ampere's durch Wiederholung der berühmten Oerstedt'schen Versuche gebildeter Ansicht ist ein gewöhnliche Magnet eine Stahlstange, deren Axe von electricen Strömen umkreist wird in Ebenen, die senkrecht auf ihr stehen. Dieser Ansicht zufolge kam es auf die Versuche, Stahlnadeln durch den Einfluß electricer Ströme zu magnetisiren, wieder zurück, die bisher mißlungen waren, da man die Stahlnadeln aus Theilen des Schliessungsdrahtes selbst gemacht hatte, die aber jetzt gelangen, als man den Schliessungsdraht in einem, auf der Axe der Stahlnadeln senkrechten Kreise um sie herumführte, ja, man konnte sie sogar zu bleibenden Magneten machen, wenn man sie von dem electricen Strome mehrmals umkreisen liefs. Hieraus geht denn hervor, daß der electriche Strom auch das weiche Eisen magnetisch machen mußte, daß in ihm der Magnetismus nur so lange, oder wenigstens nicht viel länger dauern konnte, als der electriche Strom selbst dauert, indem die Coercitivkraft des weichen Eisens zu klein ist, um eine dauernde Trennung des positiven Magnetismus zu gestatten. Giebt man daher einer weichen Eisenstange die Form eines Hufeisens und umwickelt man dieses spiralförmig mit einem Kupferdrahte, so daß die Windungen sich unter einander nicht berühren, und daß auch das Eisen von dem Kupferdrahte durch

den Seidenüberzug getrennt ist, und läßt man nun die positive Electricität in das eine, die negative Electricität dagegen in das andere Ende der Kupferdrahtspitze eintreten, so erhält man an dem Hufeisen an dem Schenkel, wo die positive Electricität eintritt, einen magnetischen Südpol und an dem Schenkel, wo die negative Electricität eintritt, einen magnetischen Nordpol und mit einem vollständigen kräftigen Magnet, der indessen seinen Magnetismus allerdings nur so lange behält, als die electricischen Ströme umkreisen und der, obgleich seinen Eigenschaften durchaus nicht von einem gewöhnlichen Magnete verschieden, mit dem Namen »Electromagnet« belegt wird.

Zur Herstellung eines solchen Electromagnets verfährt man am Besten auf folgende Weise. Eine cylindrische Stange von weichem Eisen läßt man zu einem Hufeisen biegen, umwickelt dasselbe mit Seidenzeug so, daß an beiden Enden ein Raum von etwa 1 Zoll frei bleibt und windet um den mit Seide bekleideten Theil einen Kupferdraht spiralförmig in der Art, daß die Windungen sich nicht berühren und daß an jedem Ende eine kurze Strecke Kupferdraht von ungefähr 6 bis 8 Zoll ungewunden zurückbleibt. Jedes dieser ungewundenen, also freien Kupferdrahtenden, biegt man an seiner Spitze in einem Häkchen um, deren eins die positive und deren anderes die negative Electricität aufzunehmen bestimmt.

Da nun nach Faraday's Untersuchungen über die Electricität die Volta'sche Batterie sich von der einfachen Kette nur durch größere Intensität, nicht durch eine größere Menge der entwickelten Electricität unterscheidet und es hier nur auf die letzte ankommt, da man aber auch die Erfahrung gemacht hat, daß mehrere zusammengesetzte Kupfer- und Zinkplattenpaare sogar eine stärkere Wirkung hervorbringen, als ein einziges Plattenpaar, indem die Dazwischenkunft mehrerer Schichten des feuchten Leiters die Wirkung der ganzen Menge Electricitäten nicht erlaubt, so stellt man den zur

Erregung des Magnetismus nöthigen electrischen Apparat am einfachsten und zweckmässigsten durch ein Volta'sches Element auf die Weise her, daß man in unten und oben offenen Cylinder von Kupferblech nach aussen mit einem in ein Näpfchen endenden Arm versehen ist, einen eben solchen Cylinder von Zinkblech der einen um 1 Zoll geringeren Durchmesser hat, mit einem in ein Näpfchen endenden Arme aber ebenfalls versehen ist, steckt, beide Cylinder durch Holz- oder Korkstücken in einer  $\frac{1}{2}$  Zoll weiten Entfernung von einander erhält, die beiden Näpfchen mit Quecksilber füllt, den so vorgerichteten Doppelcylinder in eine Krüge voll verdünnter Schwefelsäure, aus der er etwas herragt, einsenkt. Bringt man jetzt beide Haken des Kupferdrahts, welcher das Hufeisen von weichen Eisen spiralförmig umschlungen hält, in die beiden mit Quecksilber gefüllten Näpfchen, so hat man in demselben Augenblick, wo dies geschieht, in dem Hufeisen einen wirklichen Electromagnet, dessen beide Pole durch einen Draht verbunden nach Verhältniß seiner Grösse und Stärke des Kupferdrahts bedeutende Lasten tragen können. Der Magnetismus aber nur so lange anhält, als die Electricitätsentwicklung währt. Während der Dauer derselben nun kann man den in Thätigkeit befindlichen Electromagnet in derselben Art, wie jeden andern Stabmagnet anwenden, um Stahlstäbe und Stahlhufeisen dauerndem Magnetismus zu versehen. Daß man bei den beiden von dem Hufeisen aus weichen Eisen ausgehenden ungewundenen Theilen des Kupferdrahts eine solche Richtung gegeben haben muß, daß sie in die Quecksilber haltenden Näpfchen, in welche die Enden einiger Entfernung von einander befindlichen Metallstücke des Kupfer- und Zinkcylinders auslaufen, gerade eintauchen, wenn die ganze Vorrichtung in Bewegung gesetzt wird, versteht sich von selbst.

Will man nun ein Hufeisen von Stahl, das man bei jedem Schlosser dadurch anfertigen lassen kann, daß man den Stahl, in die gehörige Form gebracht, in

kirschrothen Glühen hat bringen lassen, magnetisirend also zu einem dauernden Magnet machen, so man unter den in vertikaler Richtung befestigten durch ein Volta'sches Element auf die angegebene Thätigkeit gesetzten Electromagnet, ohne daß die desselben durch einen Anker verbunden sind, in horizontaler Richtung das Stahlhufeisen und zwar so, daß es mit den Polen des Electromagnets zuerst da in Berührung kommt, wo seine Biegung beginnt. In dieser Stellung, in der das Stahlhufeisen mit der Hand gegen seinen Bogen festgehalten wird, und also der Nordpol des Electromagnets auf dem einen und der Südpol des Electromagnets auf dem anderen Schenkel stehen, wird es fortgezogen, bis die Enden der Schenkel unter den Polen stehen, dann wird es, durch den Anker geschlossen, von den Polen des Electromagnets abgestreift, diese Operation mit ihm aber 5 bis 6 wiederholt, indem man es immer da, wo seine Biegung in die geraden Schenkel übergeht, zuerst unter den Polen des Electromagnets bringt und es unter denselben bis zu den Enden seiner Schenkel fortbewegt. Das Stahlhufeisen wird nach Vollendung dieser Operation ein vollständiger Magnet sein; da aber da, wo die positive Electricität an den Electromagnet getreten ist, dieser seinen Südpol hat, so wird der Nordpol des neuen Magnet verwandelten Stahlhufeisens an dem Schenkel sein, der mit dem Südpol des Electromagnets in Berührung gewesen ist. Hierbei muß man indessen bedenken, daß bei der einfachen galvanischen Kette die positive Electricität vom Kupfer und die negative Electricität vom Zink ausgeht, da bei einer zusammengesetzten Kette gerade das Gegentheil statt findet. — Will man einen einfachen Stahlstab magnetisiren und in ihm einen sogenannten Longitudinalmagnet herstellen, so wird der Stahlstab horizontal so unter den vertikal stehenden Electromagnet gebracht, daß dieser mit seinen beiden Polen auf der Mitte des Stahlstabes aufsteht, dann zieht man ohne die Richtung des Stabes zu ändern, diesen



8 — 10mal hin und her, wobei denn an dem einen Ende des Stabes immer der Südpol und an dem andern Ende des Stabes immer der Nordpol des Electromagnets seinen Stand erhält, und entfernt den Stab dann wieder, wenn er, wie beim Anfange des Streichens, gerade in der Mitte unter beiden Polen des Electromagnets sich befindet. Das Ende des Stabes, welches während des Streichens dem Nordpol des Electromagnets am nächsten lag, wird zum Südpol, das entgegengesetzte zum Nordpol des nun fertigen Longitudinalmagnets geworden sein.

Wenn es nun so deutlich geworden sein dürfte, wie man einen Electromagnet sich darstellen und vermehren desselben Stahlmagnete bereiten kann, so mag schließlich noch die Angabe der Beschaffenheit des Apparats, dessen ich mich bediene und die Art und Weise, wie ich mir durch ihn einen kräftigen Stahlmagnet bereiten habe, hier angeführt werden. Das einfache Volta'sche Element besteht aus einem Kupfercylinder von 5 Zoll Höhe und  $3\frac{1}{2}$  Zoll Durchmesser, und einem Zinkcylinder, der eben so hoch ist, aber nur  $2\frac{1}{2}$  Zoll Durchmesser hat. Beide Cylinder sind auf die oben angegebene Weise zu einem Doppelcylinder vereinigt. Das Hufeisen von weichem Eisen ist im Ganzen 18 Zoll lang und hat  $\frac{7}{8}$  Zoll Durchmesser. Es ist in 20 Windungen mit Kupferdraht von fast  $\frac{1}{4}$  Zoll Stärke spiralförmig gewunden; von den beiden nicht gewundenen Theilen des Kupferdrahts hat jeder mit Einschluss des Hakens eine Länge von 8 Zoll. Wird dies Hufeisen mittelst eines Volta'schen Elements in einen Electromagnet verwandelt, so trägt dieser, mit einem Anker versehen, 30 bis 40 Pfd. Da nun mehre auf einandergelegte Hufeisenmagnete einen viel stärkern Magnetismus zeigen, als jedes einzelne, so habe ich mir 3 Stahlhufeisen, die genau auf einander passen und durch 3 Schrauben, von denen eine in der Biegung, die beiden andern in den beiden Schenkel sich befinden, fest verbunden werden können, anfertigen lassen. Jedes derselben ist einen Zoll breit,  $\frac{1}{2}$  Zoll hoch und von den beiden Schenkeln hat jeder, von der Mitte

enden Biegung angerechnet, eine Länge von 8 Zoll  
 nur die Schenkel des mittleren sind um fast 1 Zoll  
 ger. Vermittelst des Electromagnets magnetisirte ich  
 erst auf die beschriebene Art das unterste Hufeisen,  
 verband, als dies geschehen war, die beiden Pole  
 selben durch einen Anker, darauf wurde das oberste  
 Eisen auf dieselbe Weise magnetisirt, zum Schliessen  
 selben aber das unterste schon magnetisirte und von  
 Anker jetzt getrennte Hufeisen in der Art gebraucht,  
 die entgegengesetzten Pole gegen einander stießen.  
 lich wurde auch das mittlere Hufeisen magnetisirt,  
 nachdem dies auch geschehen war, wurden die zwei  
 an magnetisirten Hufeisen, nämlich das unterste und  
 ste, von einander getrennt und so wieder auf ein-  
 er gelegt, dass ihre gleichnamigen Pole auf einander  
 en, dieselben aber dann als ein combinirter Huf-  
 nmagnet zum Schliessen des mittleren unter Gegen-  
 anderstossen der ungleichnamigen Pole verwendet.  
 ter wurden alle drei Hufeisen in der Reihenfolge, wie  
 vor dem Magnetisiren auf einander lagen und so,  
 sich die die gleichnamigen Pole enthaltenden Schen-  
 auf einander befinden, welcher Umstand auch bei  
 Magnetisiren der einzelnen Hufeisen berücksich-  
 war, wieder zusammengelegt und durch die Schrau-  
 fest verbunden. Sie stellten einen kräftigen Stahl-  
 eisenmagnet mit dauerndem Magnetismus dar, der  
 h zur Anfertigung kleinerer Magnete sehr gut ge-  
 acht werden konnte.

rsuch über ein Verfahren, um auf dem  
 Wege der Rechnung schnell auszumit-  
 teln, in welchem Grade man eine Flüs-  
 sigkeit von zu grossem spec. Gew. noch  
 verdünnen muss, um ihr ein vorgeschrie-  
 benes spec. Gew. zu ertheilen;

von  
**Georg Krug.**

**K**ürzlich bereitete ich mir bei Gelegenheit der

Darstellung des *Ammonium muriaticum martiatum* eine Auflösung von Eisenchlorid. Da diese nun noch zu concentrirt war, indem sie nach der Vorschrift der preussischen Pharmakopöe ein specifisches Gewicht von durchschnittlich 1,50 haben muß, so hätte ich vielleicht noch geraume Zeit darauf verwenden müssen, um die Lösung durch successive Hinzufügung von Wasser, und eben so oft wiederholtes Prüfen mit dem Aräometer auf den vorgeschriebenen Grad der Dichte zu bringen. Weil nun aber diese Prüfungen öfters geraume Zeit erfordern und ein so zerbrechliches, theures Instrument wie ein Aräometer, um so mehr der Gefahr des Zerbrechens ausgesetzt ist, je öfter man es zur Hand nehmen muß, so kam ich auf den Gedanken, ob man nicht auf dem Wege der Rechnung schneller und bloß auf zwei Aräometerproben zum Ziel gelangen könne. Meine Vermuthung fand sich durch den Erfolg bestätigt und deshalb könnte die Mittheilung des bei dieser Berechnung beobachteten Verfahrens vielleicht für Manche von Interesse sein.

Ich untersuchte mit dem Aräometer die zu concentrirte Eisenchloridflüssigkeit und fand ihr spec. Gewicht = 1,88, während ihr absolutes Gewicht 30 Drachmen betrug. Nun war die eigentliche Frage, wie viel Gewichtstheile destillirtes Wasser, dessen spec. Gewicht bekanntlich = 1 ist, man zu dieser zu concentrirten Lösung noch mischen müsse, damit die durch verdünnte Lauge gerade das vorgeschriebene durchschnittliche spec. Gewicht von 1,50 erhalte.

In jedem Lehrbuch der Physik findet man, daß das spec. Gew. eines Körpers gleich dem Quotienten ist, welchen man erhält, wenn man das absolute Gewicht dieses Körpers durch sein Volum (den Raum, welchen er einnimmt) dividirt.

Diese Thatsache drückt man kurz durch die Formel  $s = \frac{p}{v}$  aus, worin  $s$  das spec. Gewicht,  $p$  das absolute Gewicht und  $v$  das Volum oder den Raum desselben Körpers bedeuten.

Mit Hülfe dieser Formel nun kann man die eben stellte Aufgabe lösen.

Denn es ist klar, daß das spec. Gewicht 1,50 der Wasser verdünnten Eisenlösung gleich dem Quoten sein muß, welchen man erhält, wenn man die Summe der absoluten Gewichte der zu concentrirten Eisenlösung und des hinzuzufügenden Wassers durch das Volum dividirt, welches die Mischung von beiden einnimmt.

Findet nun bei einer Mischung zweier Flüssigkeiten keine Verdichtung statt, so ist das Volum, welches das Gemisch einnimmt, gleich der Summe der Volumne seiner Bestandtheile vor der Mischung.

Das absolute Gewicht der zu concentrirten Eisenlösung ist aber, wie oben erwähnt ward = 38 Drachmen; das aber des hinzuzufügenden Wassers ist uns unbekannt, wir wollen es daher  $x$  nennen. Also würde das absolute Gewicht der Mischung von beiden =  $(38 + x)$  Drachmen sein.

Das Volum, welches die Mischung einnimmt, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Da aber bei dieser Mischung keine Verdichtung eintritt, so kann man das Volum des Gemisches leicht finden, wenn man nur das Volum kennt, welche seine Bestandtheile vor der Mischung eingenommen haben.

Direct sind auch diese uns noch unbekannt, wir nennen sie aber dennoch mit Hülfe der Formel  $s = \frac{P}{v}$  an, wonach  $v = \frac{P}{s}$  ist, worin diese Buchstaben eben die oben bezeichneten Werthe haben. Die zu theil Eisenauflösung, der eine Bestandtheil der Mischung, hat nun ein absolutes Gewicht von 38 Drachmen und ein spec. Gew. von 1,88; folglich ist das Volum, welches sie einnimmt  $= \frac{38}{1,88} = 20,213 \dots$  Raumtheilen. Das absolute Gewicht des hinzuzufügenden Wassers haben wir  $x$  genannt, sein spec. Gewicht ist 1; folglich nehmen  $x$  Gewichtstheile desselben auch 1 Raumtheile ein.

Das Volum der Mischung von beiden muß daher  $= 20,213 \dots + x$  Raumtheilen sein.

Jetzt haben wir nun alle zur Ausrechnung nöthigen Daten beisammen. In diesem Falle ist nun

$$s = 1,50$$

$$p = 38 + x$$

$$v = 20,213 \dots + x$$

Substituiren wir nun diese Werthe in die allgemeine Formel:

$$s = \frac{p}{v},$$

dann entsteht die neue Gleichung:

$$1,50 = \frac{38 + x}{20,213 \dots + x}$$

woraus wir durch Herausschaffung von  $x$  mit der Messung des Verdünnungswassers bekannt gemacht werden, welche, wie man leicht finden kann, 15,361 Drachmen beträgt.

Diese Wassermenge mischte ich nun noch zu der concentrirten Eisenlösung und wirklich zeigte das Aräometer in der Mischung das vorgeschriebene spec. Gewicht von 1,50.

Um nun das, was hier für einen speciellen Fallörtert wurde, im Allgemeinen auf alle ähnlichen Mischungen, bei welchen keine Verdichtung statt findet, anwendbar zu machen, wollen wir versuchen, eine allgemeine Formel dafür zu entwickeln.

Nehmen wir also an, wir hätten  $G$  Gewichtstheile einer Flüssigkeit A, deren spec. Gewicht  $= S$  sei, und wir sollten so viel Gewichtstheile einer zweiten Flüssigkeit B, deren spec. Gewicht  $= s$  sei, mit jener mischen, daß das spec. Gew. der Mischung  $= f$  wäre.

Dann nenne man das noch unbekannte absolute Gewicht der Flüssigkeit B, welches man zu dem angegebenen Zweck mit der Flüssigkeit A vermengen soll,  $x$ . Es muß offenbar das absolute Gewicht der Mischung  $= G + x$  sein.

Ferner muß (da, wie schon früher erwähnt wurde,  $v = \frac{p}{s}$  ist) das Volum, welches  $G$  Gewichtstheile



Flüssigkeit A einnehmen, gleich  $\frac{G}{S}$ , und das, welches Gewichtstheile der Flüssigkeit B einnehmen  $= \frac{x}{s}$  sein.

Hiernach ist nun das Volum, welches die Mischung beider (wobei natürlich vorausgesetzt wird, daß keine Verdichtung dabei statt finde) einnimmt,  $= \frac{G}{S} + \frac{x}{s}$   
 $\frac{Gs + xS}{Ss}$ .

Substituiren wir nun in die Formel  $s = \frac{p}{v}$  für  $s$  den Werth  $f$ , für  $p$  den Werth  $G + x$  und für  $v$  den Werth  $\frac{Gs + xS}{Ss}$ , so erhalten wir die Gleichung  $f = (G + x) : \left( \frac{Gs + xS}{Ss} \right) = \frac{GSs + xSs}{Gs + xS}$ , woraus wir den richtigen Werth von  $x$  finden können. Denn es ist nach:

$$fGs + fxS = GSs + xSs$$

$$fxS - sxs = SGs - fGs$$

$$x(fS - sS) = Gs(S - f)$$

$$x = \frac{Gs(S - f)}{S(f - s)}$$

Vermittelst dieser Formel kann man nun alle hiergehörigen Aufgaben lösen, wenn man nur für die Buchstaben die entsprechenden Zahlenwerthe substituirt.

Um nun ein Beispiel einer solchen Substitution zu geben, wollen wir den im Anfang erörterten speciellen Fall nehmen.

Hierbei ist alsdann:

$$G = 38 \text{ Drachmen,}$$

$$S = 1,88,$$

$$x \text{ noch unbekannt,}$$

$$s = 1,$$

$$f = 1,50.$$

Die allgemeine, zuletzt entwickelte Formel verändert sich daher für diesen Fall folgendermaßen:

$$x = \frac{38(1,88 - 1,50)}{1,88(1,50 - 1)} = \frac{38(0,38)}{1,88(0,50)} = 15,361 \dots \text{ Drachmen.}$$

Wir sehen zugleich hieraus, daß das vorhin auf andere Weise gefundene Resultat ganz genau mit dem durch Substitution in die allgemeine Formel erhaltenen reinstimmt.

## Dritte Abtheilung.

**Chemie.**

## Ueber den Wassergehalt der krystallisirten Citronensäure;

von

*H. Wackenroder.*

§. 1. Bei einer erneuerten Untersuchung über Verhalten der Citronensäure in der Wärme und gegen Reagentien zum Behufe der Herausgabe einer neuen Auflage meiner »chemischen Tabellen zur Analyse der organischen Körper« — wovon die erste Lieferung nichtstens die Presse verlassen wird — bin ich zu Resultaten gelangt, welche nicht durchgängig mit den jetzt herrschenden Ansichten übereinstimmen. Ungeachtet der vortrefflichen Untersuchungen von Berzelius, Brug Robiquet, Dahlström, Lassaigue u. A. über die hinsichtlich ihres Wassergehaltes, sonderbare Anomalie darbietende Citronensäure habe ich dennoch keinen genügenden Grund zur Erklärung der bemerkten Abweichungen auffinden können. Es bleibt daher nur die Mittheilung meiner Versuche und Beobachtungen übrig.

Es ist bekannt, daß Berzelius, nachdem derselbe das Verwittern der krystallisirten Citronensäure in der Wärme als eine Eigenschaft dieser Säure angesehen hatte, auf eine entgegenstehende Erfahrung L. Goulin's (*Dessen Handbuch II, 86*) durch Versuche darstellte, daß die Citronensäure mit zwei verschiedenen Mengen von Wasser krystallisiren könne, und zwar in der Art, daß nur die wasserreichere krystallisirte Säure an warmer und trockner Luft verwittere, und dann weniger Wasser enthalte, als diejenige, welche mit einer geringeren Menge von Wasser krystallisire. (*S. Jahresber. XIII, 223.*) Dieses Verhältniß läßt sich, wenn man nach Liebig die absolute Citronensäure =  $C_{12} H_{10} O_{11}$  stellt

ht also ausdrücken: die verwitternde krystallisirte re ist  $= \bar{C} + 5 \text{ aq.}$ , nach dem Verwittern  $= \bar{C} + 3 \text{ aq.}$ ; nicht verwitternde, unveränderliche, krystallisirte onensäure ist  $= \bar{C} + 4 \text{ aq.}$  Berzelius führt aus- cklich an, dafs die von ihm untersuchte Säure schon  $50^\circ$  verwittert sei. Als aber die verwitternde Säure Wasser von  $100^\circ$  bis zur völligen Sättigung desselben gelöst worden, so sei bei *langsamen Erkalten* der Lö- g eine Citronensäure herauskrystallisirt, welche bei *kein* Wasser verloren habe, und bei einer etwas über erhöhten Temperatur zu einem *farblosen*, kla- Liquidum geschmolzen sei, ohne dabei wesentlich ihrem Wasser zu verlieren. Beim Erkalten sei die hmolzene Säure zu einem glasartigen Körper erstarrt, nach ihrer Auflösung in Wasser als unveränderte onensäure wieder erschienen. Als aber jene Lösung, welcher bei langsamen Erkalten diese unveränder- e Säure (also  $\bar{C} + 4 \text{ aq.}$ ) angeschossen, der *freiwilli- Verdunstung* überlassen worden, so seien wieder stalle von der verwitternden Art der Citronensäure  $\bar{C} + 5 \text{ aq.}$ ) erhalten worden.

2. Wenn also hiernach der Unterschied zwischen en Arten der krystallisirten Citronensäure blofs von schnellern und langsamern Krystallisation derselben ingig gedacht werden mufs, so ist zu vermuthen, die wohlbekannte, wahrscheinlich aus englischen riken herrührende Citronensäure des Handels die ere, verwitternde Art ist, da man doch höchst wahr- inlich gröfsere Mengen von ungelöster Citronensäure durch langsames Verdampfen zur Krystallisation gen konnte. Eine bestimmte Ansicht finde ich jedoch ends hierüber ausgesprochen, und nur in Geiger's dbuch von Liebig ist pag. 871 gelegentlich ange- t, man wisse, dafs im Handel zwei Arten von Ci- ensäure, nämlich mit 4 und mit 5 At. Aq. krystal- vorkommen. Eben so wenig finden sich Nachwei- en darüber, ob und wie sich beide Arten der Citro- äure, aufser ihrem ganz verschiedenen Verhalten

bei einer Temperatur von  $+ 50^{\circ}$  bis  $100^{\circ}$ , sonst namentlich in ihrer Krystallisation und bei Einwirkung höherer Wärmegrade von einander unterscheiden.

Mir ist seit Jahren, namentlich auch bei Apothekenrevisionen, niemals eine äußere Verschiedenheit an der käuflichen Citronensäure aufgefallen, und da auch die aus verschiedenen Zeiten abstammenden Proben derselben in meiner Sammlung sich vollkommen gleich verhalten: so muß ich zweifeln, jemals eine Citronensäure mit verschiedenem Wassergehalte vor mir gehabt zu haben. Die käufliche Citronensäure besteht bekanntlich in großen, stumpfeckigen, halbdurchsichtigen bis durchscheinenden, meistens matten Krystallstücken, an denen sich zuweilen auch einzelne Krystallflächen unterscheiden lassen. Eine blättrige Structur derselben ist es immer wahrzunehmen. Die Spaltungsflächen erscheinen glas- bis perlmutterglänzend. Der Bruch ist eben und glasglänzend. Sie ist bald etwas feucht, bald ganz trocken und dann spröde und verhältnißmäßig sehr hart. Manchmal hängt den Krystallstücken eine ganz weiße, poröse Masse an, welche aber auf dem Bruche glasglänzend ist und sich weder in der Wärme, noch sonst verschiedenes zeigt von der harten Citronensäure, und dennoch als eingetrocknete Mutterlauge sein dürfte.

§. 3. Um nun zu sehen, ob diese käufliche Citronensäure die verwitternde Art sei, oder die beständige, wogen 0,625 Grm. der blättrigen Stücke, nachdem sie zuvor zerbröckelt und theils über Schwefelsäure, theils in der atmosphärischen Luft bei einer Temperatur von 30° nur eine Stunde lang, ohne eine sichtbare Veränderung zu erleiden, getrocknet worden, in eine unten verschlossene Glasröhre gebracht. An die Röhre wurde durch mittelst eines Korks eine enge Glasröhre angefügt, so daß bei Erwärmung der Säure entwickeltes Wasser zu Zeit zu Zeit mit Fließpapier leicht aus der Röhre genommen werden konnte. Der kleine Apparat war nun 4 Stunden lang im Wasserbade einer Wärme von  $60^{\circ}$  bis  $70^{\circ}$  ausgesetzt. Die Säure hatte dann aber

Proc. am Gewicht verloren. Sie erschien etwas zungenesintert, aber noch von völlig weißer Farbe. Erneuerte 5 Stunden hindurch fortgesetzte Erhitzung, die die Temperatur zuletzt bis zu  $95^{\circ}$  gesteigert wurde, trieb den Gewichtsverlust der Säure bis zu 11 Proc. Dieser hätte aber, wenn er 2 At. Aq. gleich kommen sollte, 9,4 Proc. betragen müssen. Daher wurde die Säure aufs neue in einem Kochsalzbade noch 11 Stunden lang einer Wärme von  $102^{\circ}$  bis  $108^{\circ}$  ausgesetzt. Obwohl hatte sie nach diesem 20stündigen Erhitzen 17,2 Proc. an ihrem ursprünglichen Gewichte verloren. Zwar erschien sie zusammengebacken, aber wenig geschmolzen, noch pulvrig, wie eine verwitterte Substanz. Ihre angenommene gelbliche Farbe zeigte den Anfang der Zersetzung der Säure an. Obwohl zu vermuthen war, daß die Säure noch weiter zum Schmelzpunkt erhitzt, auch zersetzt werden würde, so wurde sie dennoch in einem Chlorzinkbade allmählig steigenden Temperatur ausgesetzt. Ehe sie zum vollständigen Schmelzen gelangte, entwickelte eine ziemliche Menge von Gas, welches die zähe Säure in großen Blasen auftrieb. Erst als das Chlorzink eine Temperatur von  $155^{\circ}$  angenommen hatte, war die Säure vollständig geschmolzen, aber es entwickelten sich gleichzeitig Luftblasen aus derselben. Deshalb erschien auch die Säure, obgleich sie keinen Moment länger als zum völligen Schmelzen derselben erforderlich erhitzt worden, nach dem Erkalten nicht allein nicht ganz harte, nicht krystallinische, bernsteingelbe durchsichtige, sondern auch als eine sehr blasige Substanz, welche in der verschlossenen Röhre unverändert blieb. Eine Ablagerung von Wasser in der Glasröhre wurde bei der Steigerung der Hitze nicht wahrgenommen, aber wohl eine Spur flüchtiger Säure. Ihr Gewichtsverlust war jetzt noch um 2,4 Proc. vermehrt worden, aber dieser gehörte offenbar nur Zersetzungsprodukten an.

Vollte man nun den unter  $100^{\circ}$  Erwärmung statt



gehabten Gewichtsverlust von 7,2 Proc. entwickelten Krystallwasser der Säure zuschreiben, so würde derselbe nur  $1\frac{1}{2}$  At. Aq. entsprechen. Man ersieht schon hieraus, daß das ausgetriebene Wasser nur zufällig anhängendes, hygroskopisches Wasser sein konnte. Diese Ansicht bestätigte sich auch dadurch, daß die zuvor bei niedriger Temperatur sorgfältig ausgetrocknete, gepulverte Säure, erst dann eine Spur Feuchtigkeit ausgibt, als sie bis zum Schmelzen erhitzt wurde. Wie begierig aber die Citronensäure Wasser aus der Luft anzieht, namentlich auch aus warmer feuchter Luft, ersieht man leicht beim Aussetzen des Pulvers auf einer Glastafel in die Nachtluft nach einem trocknen Sommertage, beim Anhauchen desselben u. s. w. Die Anziehung des Wassers kann selbst bis zum *gänzlichen* Zerfließen der gepulverten Säure an der Luft fortgehen. Indessen trocknet sie auch an nicht feuchter Luft allmählig wieder ab, wenngleich niemals vollkommen aus. Gerade dieser Umstand ist es, und nicht etwa ein Verwittern, weshalb die käufliche Citronensäure gewöhnlich matt und opalisirt ist, oder es wird beim Aufbewahren in leicht verschlossenen Gefäßen. Die Säure mit anhängendem Wasser schmilzt aber viel leichter, und entläßt alsdann das Wasser nur äußerst langsam wieder selbst bei einer Temperatur, die den Siedpunct der vorher völlig getrockneten Säure weit übersteigt.

§. 4. Setzt man daher die käufliche Citronensäure, die sie vorher noch besonders getrocknet zu haben, in eine Glasröhre der Hitze des kochenden Wassers aus, so schmilzt sie wohl zuweilen schon bei dieser Temperatur ohne mehr als eine Spur Wasser anzugeben. Gewöhnlich aber erfordert sie doch eine etwas höhere Temperatur zum Schmelzen. Sie bildet dann eine wasserklare, *gelblich* Flüssigkeit und bleibt nach dem Erkalten vollkommen durchsichtig, aber *weich*. Erst nach mehreren Stunden fängt sie bei einer Temperatur von  $16^{\circ}$  an zu krystallisiren, und bildet dann eine theils blättrig-krySTALLINISCHE, glasglänzende, theils faserige und concentrirte

hlige, seidenglänzende, krystallinische Masse. Kann Feuchtigkeit anziehen, so erscheint auf ihrer Oberfläche auch wohl eine dünne Schicht Flüssigkeit, offenbar Mutterlauge, aus welcher kleine 6seitige Tafeln gehen. Eine solche an der Luft gelegene Citronensäure kann man nicht allein bis zu  $150^{\circ}$  erhitzen, wo sie zu kochen beginnt, oder bis zu  $160^{\circ}$ , wo sie in volles Kochen kommt, sondern man kann sie auch bei  $170^{\circ}$  eine Weile in lebhaftem Kochen erhalten, ohne daß sie im mindesten zersetzt und färbt. Nach dem Erkalten ist sie durchsichtig und klar, und stets weich und

Erst bei fortgesetztem Kochen verliert sie allmählich das hartnäckig anhängende Wasser gänzlich, wird dann citronengelb und entwickelt nun erst, namentlich bei  $180^{\circ}$  bis  $190^{\circ}$  mit Heftigkeit ein Gas, von welchem Robiquet (*Annal. der Pharm. Bd. 25. p. 138*) gehalten hat, daß es Kohlenoxydgas mit Kohlensäure sei. Dabei wird ein saures Destillat erzeugt, worin sich Citronensäure befindet, so wie auch bisweilen ein ölartiges Sublimat in geringer Menge. Von der Citronensäure oder Baup's Citricinsäure ( $= C_{10}H_8O_6$ ) hat Hr. Crasso neuerdings (*Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. 35. p. 63*) gezeigt, daß sie eigentlich Brenztraubensäure sei, weshalb Hr. Crasso sie auch Itaconsäure (II) zu benennen vorschlägt. Die Itaconsäure wird, nach Crasso's Angabe, durch neue Destillation in eine wasserkrystallisirbare, mit der Itaconsäure isomere Säure verwandelt, welche von ihm Citraconsäure genannt worden ist, und das obenerwähnte Sublimat sein soll. — Hat man die Citronensäure so lange bei einer Temperatur von  $170^{\circ}$  bis  $190^{\circ}$  kochen lassen, bis sie citronengelb bis braungelb geworden ist, so bleibt sie beim Erkalten völlig klar, durchsichtig und zähe. Wenn man aber die Röhre, worin sie sich befindet, einige Tage an der Luft liegen, so zieht sie Wasser an, und auf ihrer Oberfläche entstehen nadelförmige Krystalle, die Aconitsäure (oder Baup's Citridinsäure  $H_2O_3 + H_2O$ ) sein dürften. Das Entstehen dieser

Säure, in der bei  $200^{\circ}$  erhitzten Citronensäure hat zuerst Dahlström (*Berzelius's Jahresbericht Bd. 15. p. 270*) nachgewiesen. Robiquet konnte die Aconitsäure zwar nicht erhalten (*Ann. der Pharm. Bd. 30. p. 229*); man kann sie aber gar nicht verfehlen, wenn man, wie ich eben anführte, die luftfeuchte Citronensäure in einer Glasröhre bis zur braungelben Färbung, oder auch die vorher getrocknete Säure, in einem Chlorzinkbade bis zu  $155^{\circ}$  erhitzt und alsdann mit Schwefeläther übergießt. Sie löst sich darin mit gelber Farbe auf, jedoch bleibt ein kleiner Theil derselben von Syrupconsistenz zurück. Läßt man die gelbe ätherische Lösung in einer weiten, unten verschlossenen Glasröhre langsam verdampfen, so hinterbleibt ein gelber Syrup, welcher nach längerem Stehen an der Luft aufser blättriger Citronensäure auch kleine körnige Krystalle oder Krystallgruppen liefert. Dafs diese Krystalle wirklich Aconitsäure oder die eigentliche Brenzcitronensäure sind, bestätigt auch die Untersuchung des Hrn. Crasso, dessen Annahme von der Schwerlöslichkeit der Citronensäure in Aether jedoch eben so wenig, als die frühere Angabe Robiquet's mit meiner Erfahrung übereinstimmen will. Uebrigens muß ich bemerken, dafs die Abhandlung des Hrn. Crasso erst dann zu meiner Kenntnifs gelangte, als meine Untersuchung bis auf die Elementaranalyse bereits beendigt war. Robiquet behauptet nämlich, dafs die Citronensäure in absolutem Aether auflöslich sei, aber nach einigem Stehen wieder auskrystallisire. Ich habe aber gefunden, dafs rectificirter, möglicherweise aber nicht völlig absoluter Aether sowohl die luftfeuchte und vollständig getrocknete, als auch die farblos oder mit gelber Farbe geschmolzene Citronensäure *sehr reichlich* und leicht, und nur mit Hinterlassung einer sehr geringen Menge wahrscheinlich wasserhaltiger Säure auflöste. Die Lösungen trübten sich durchaus nicht in verschlossenen Gefäfsen, hinterliessen beim Verdampfen einen Syrup, welcher trocknes Lackmuspapier nur wenig röthete. Erst bei längerem Stehen der syrupartigen Säure an der

Gefäfs,  
welche  
Erst be  
Einf p

ist, indem nur Auflösungswasser von ihr angezogen wurde, ging sie in den gewöhnlichen krystallisirten Zustand über.

§. 5. Da also eine geringe Menge hygroskopischen Wassers schon einen merklichen Unterschied in der Schmelzbarkeit der Citronensäure hervorzubringen vermag, so wäre auch möglich, daß der geschmolzene *harte* Zustand der vorher völlig getrockneten Säure und der *weiche* der bis zum Gelbwerden erhitzten luftfeuchten Citronensäure bei der weiter fortgesetzten zerstörenden Destillation etwas abweichende Producte liefern, worauf auch Liebig (a. a. O.) hindeutet, dabei aber Citronensäure mit verschiedenem *Hydratwasser* im Spiele hat. Ein merklicher Unterschied findet übrigens nicht statt bei der Erhitzung der luftfeuchten und völlig trocknen Säure im Platinlöffel. Die erstere schmilzt leicht zu einer farblosen Flüssigkeit und läßt sich eine Weile kochen, ohne sich zu färben. Nach dem Erkalten ist sie klar, durchsichtig, zähe und *weich*. Die trockne Säure aber schmilzt nicht so leicht und färbt sich dann *zugleich* schwach gelblich. Nach dem Erkalten ist sie ziemlich hart und *spröde*, und etwas blasig durch die Entwicklung von Kohlenoxydgas während des Schmelzens. Bei rascher Erhitzung kocht die luftfeuchte Säure mit stärkerem Umherspritzen, als die ganz trockne, und die stechend sauren, weißen Dämpfe der ersteren brennen nach der Anzündung auch nicht so rasch, als die der letzteren.

§. 6. Im Vorhergehenden sind, wie ich glaube, genügende Beweise geliefert worden, daß

1) die käufliche Citronensäure kein Krystallwasser enthält, welches sie bei Erhitzung, selbst bis zum Schmelzen ausgeben kann, also die Säure mit 5 At. Aq. nicht sättigt und daß sie

2) beim Liegen an der Luft, obgleich wenig, doch immer so viel hygroskopisches Wasser anzieht, um bei Erhitzung andere Erscheinungen darzubieten, als bei völliger Abwesenheit dieses Wassers, namentlich bei

einer wohl um  $50^{\circ}$  niedrigeren Temperatur zu schmelzen, so wie auch bei einer um  $20^{\circ}$  höheren Temperatur, als bei welcher die trockne Säure schmilzt und zugleich sich zu zersetzen beginnt, eine Weile hindurch zu kochen, ohne eine Veränderung zu erleiden.

Nun war zunächst zu untersuchen, ob nicht aus dieser Citronensäure die verwitternde Art herzustellen sei, gleich wie Berzelius aus der von ihm untersuchten verwitterten Citronensäure die beständige Säure hervorbringen konnte. Es war aber vorauszusehen, daß unsere Citronensäure eine in der Wärme gesättigte wässrige Lösung geben würde, aus welcher sich beim Erkalten nur schwierig Krystalle absetzen würden. Wirklich entstand auch, als in kochendes Wasser, mehr als das Doppelte an Säure eingetragen und die Flüssigkeit beständig im Kochen gehalten wurde, nur eine farblose syrupdicke Flüssigkeit, in welcher sich auch bei langem Stehen in verschlossenem Gefäße keine Krystalle bildeten. Weil aber bei diesem Verfahren der Siedpunct der Lösung weit über  $100^{\circ}$  steigen mußte, von Berzelius aber besonders dieser Wärmegrad genannt wird, so wurde die Sättigung des Wassers mit Citronensäure nur mit Hülfe der Wärme des Wasserbades vorgenommen. Als von der successive eingetragenen zerbröckelten Säure nichts mehr aufgelöst wurde, erschien die Flüssigkeit ebenfalls dickflüssig, aber es schieden sich aus ihr ebensowenig Krystalle beim Erkalten und längerem Stehen ab. Beide Lösungen lieferten indessen große, wasserklare, glänzende Krystalle, wenn sie in einem offenen Cylinderglase mehrere Tage hindurch bei einer Temperatur von  $16^{\circ}$  bis  $30^{\circ}$  an die Luft oder über Chlorcalcium unter den Recipienten der Luftpumpe hingestellt wurden. Als aber in der abgegossenen Mutterlauge ein Theil der auskrystallirten Säure bei  $100^{\circ}$  wieder aufgelöst und die Lösung in einem verschlossenen Glase hingestellt wurde, entstanden jedoch auch nunmehr Krystalle, welche aber sehr langsam und bei Verdunstung erzeugten, sowohl



der Krystallform, als auch in ihrem Verhalten in der Wärme vollkommen übereinstimmten.

Die bei langsamer Verdunstung entstehenden sehr regelmässig ausgebildeten Krystalle der Citronensäure ähnelten sich mir von ganz ähnlicher Gestalt, als welche Cooke (S. L. Gmelin's Handbuch. 3. Aufl. II, 87.) von der Citronensäure angegeben hat. Ein *gerades rhombisches Prisma* sehe ich als die Grundform derselben an. Die Krystalle sind theils die Grundgestalt mit Abstumpfung der spitzen Ecken bis zur Zuschärfung des Prismas, theils und gewöhnlich aber wegen hinzugetretener Abstumpfung der beiden stumpfen Ecken, mit einer mehr oder weniger vollständigen vierflächigen Zuspitzung, mit welcher letzteren eine Abstumpfung der Seitenkanten verbunden ist, woraus irreguläre 8seitige Prismen entstehen. Bei gestörter Krystallisation, namentlich wenn die Krystalle mit wenig Wasser geschmolzen worden, oder wenn ihre wässrige Lösung auf einer Fläche eintrocknet, bildet die Säure eine krystallinisch-blättrige oder auch strahlige Masse. Die Krystalle selbst sind meistens wasserklar, glasglänzend und von stark lichtbrechender Kraft. An der Luft werden sie abwechselnd feucht und trocken, wodurch sie, gleich der im Handel vorkommenden Säure, allmählig ihren Glanz verlieren und matt werden. Legt man die Krystalle zur Entfernung der Mutterlauge auf Fließpapier und dann über Chlorcalcium unter den Recipienten der Luftpumpe, so bleiben sie, selbst wenn die Temperatur bis auf  $30^{\circ}$  und darüber erhöht wird, stets unverändert klar und durchsichtig. Sie sind nach dem völligen Austrocknen *sehr hart* und spröde, und geben beim Zerreiben ein schneeweißes Pulver. Dieses aber zieht aus der Luft begierig Wasser an und kann in dünnen Lagen sehr bald *völlig* fließen.

Wenn schon hiernach die Identität der langsam gedehnten Krystalle mit der gewöhnlichen käuflichen Citronensäure sehr wahrscheinlich wird, so wird sie auch

außer Zweifel gesetzt durch das vollkommen gleiche Verhalten beider in der Wärme.

Bringt man die über Chlorcalcium unter dem Recipienten der Luftpumpe völlig ausgetrockneten Krystalle in eine Glasröhre und setzt sie der Wärme eben so aus, wie oben bei der käuflichen Citronensäure angegeben worden, so geben sie durchaus kein Wasser aus. Noch bei  $140^{\circ}$  bleiben ihre Ecken und Kanten vollkommen scharf, wenn sie auch da, wo die Glasröhre den Boden des erhitzten Gefäßes berührt, einen Anfang der Schmelzung zeigen. Den Gewichtsverlust, den sie bei dieser Temperatur erleiden, fand ich zu  $\frac{1}{2}$  Proc. Bei  $150^{\circ}$  sah ich sie unvollkommen und bei  $155^{\circ}$  vollständig zerfließen zu einer weingelben, klaren Flüssigkeit, aus welcher feine Gasblasen aufsteigen und ein, erst beim Abkühlen wahrnehmbarer, Lackmuspapier röthender Dampf sich entwickelte. Nach dem Abkühlen in der verschlossenen Röhre blieb die Säure klar, zeigte sich aber hart. Am ursprünglichen Gewicht hatten sie kaum 1 Proc. verloren. Da es nicht möglich ist, das von den zusammenhängenden Krystallen eingeschlossene Wasser ohne Temperaturerhöhung fortzuschaffen, obwohl ich aus der Krystallrinde beim Auspumpen des Recipienten zuweilen eine Flüssigkeit hervordringen sah, so habe ich die zu Pulver zerriebenen Krystalle mehrere Tage lang über Chlorcalcium im luftleeren Raume bei einer Temperatur von  $16^{\circ}$  erhalten. Dieses Pulver verlor bei der Erhitzung im Chlorzinkbade bis zu  $140^{\circ}$  gar nichts an Gewicht, und blieb vollkommen locker. Erst bei  $154^{\circ}$  war es vollständig geschmolzen, jedoch bedeckte ein feiner Schaum die Oberfläche der Flüssigkeit. Die Gewichtsverminderung betrug nicht ganz  $\frac{1}{4}$  Proc., also nicht mehr, als auf Rechnung der mit dem Schmelzen eintretenden Zersetzung der Säure zu setzen ist.

§. 7. Die Evidenz dieser Versuche ist zu schlagend, um nicht anzuerkennen, daß die käufliche Citronensäure nur ein und dieselbe Menge von Wasser be-

te, auch wenn sie aus ihrer wässrigen Auflösung erst Laufe mehrer Tage in Folge verdunstenden Wassers stallisirt. Nun kam es aber darauf an, zu untersuchen, ob sie wirklich die Citronensäure mit 4 At. Aq. da sie die mit 5 At. Aq. nicht sein konnte. Obwohl herrschende Ansicht in dieser Hinsicht keinen Zweifel zuläßt, so erschien doch eine neue Analyse der krystallisirten Citronensäure nunmehr nothwendig.

Ich habe dazu die Krystalle angewendet, welche aus der concentrirten wässrigen Lösung der käuflichen Citronensäure an warmer Luft im Verlauf mehrer Tage abgesetzt oder zum Theil schwebend darin abgesetzt hatten. Nachdem sie über Chlorcalcium getrocknet, dann zerrieben und das Pulver abermals über Chlorcalcium bei höchstens  $16^{\circ}$  getrocknet worden, wurde es mit Kupferoxyd gemengt. Dabei war jedoch, schon eine andauernde geringe Wärme eine partielle Zersetzung der Citronensäure bewirken kann, die Anwendung der Wärme gänzlich zu vermeiden. Daher wurde das frisch geglühte Kupferoxyd noch sehr heiß in verschließbares Glas geschüttet und der völligen Abkühlung überlassen. Dann wurde es portionenweise in die Verbrennungsröhre eingefüllt, das trockne Krystallpulver aufgeschüttet und die innige Mischung mit einem gewundenen Kupferdrahte sehr leicht und vollständig bewirkt. Daß dabei alle Feuchtigkeit vollkommen abgehalten worden, ergab sich aus der gänzlichen Abwesenheit eines Thaues in der Chlorcalciumröhre und dem vordern Theile der Verbrennungsröhre bei der anhaltenden Erhitzung der Letzteren. Die Verbrennung geschah übrigens nach der von Liebig befolgten Methode in dem von ihm beschriebenen Ofen, der jedoch unverändert war, daß auf die gabelförmigen Stützen dünner canalförmiger Streifen von Eisenblech gelegt wurden, eine, wie mich dünkt, zur Erhaltung der Glasröhre sehr zweckmäßige, die Verbrennung aber nicht bewirkende Veränderung. Die Erhitzung geschah so lang, daß anderthalb Stunden Zeit dazu gebraucht wurden.



Das Gas trat ganz regelmäfsig durch das Aetzkali und hörte zuletzt plötzlich auf. Das nach Abbrechen der Spitze der Verbrennungsröhre hindurchgezogene Gas war völlig geschmacklos. Es wurde nur so viel Gas durch den Kaliapparat gezogen, als, dem Augennafse nach, der in den leeren Theilen des Apparats enthaltene Luft gleichkam. Deshalb erschien auch eine Correction der gewonnenen Resultate als unstatthaft. Das in dem vorderen leergelassenen Theile der Chlorcalciumröhre angesammelte Wasser war völlig limpide und geschmacklos, folglich auch ohne alle Reaction auf die Reactionspapiere. Ich führe diese Umstände nur an, um zu zeigen, dafs ich allen Grund hatte, den Versuch für einen in jeder Hinsicht vollkommen gelungenen, und eine Wiederholung desselben für ganz überflüssig zu halten.

Es lieferten nun 0,906 Grm. ganz trockne Citronensäure 1,244 Grm. Kohlensäure und 0,344 Grm. Wasser.

Aus diesem Resultate läfst sich aber folgende Zusammensetzung der Citronensäure ableiten:

|                         |          | berechnet | gefunden |
|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 12 At. Kohlenstoff..... | 91,7220  | 37,943    | 37,96    |
| 16 „ Wasserstoff.....   | 9,9836   | 4,130     | 4,213    |
| 14 „ Sauerstoff.....    | 140,0000 | 57,922    | 57,522   |
|                         | <hr/>    | <hr/>     | <hr/>    |
|                         | 241,7056 | 100,000   | 100,000  |

Die überraschend genaue Uebereinstimmung zwischen dem gefundenen und berechneten Resultate, die kaum zufällig sein möchte, beweist unumstößlich, dafs die analysirte Citronensäure das Hydrat mit 3 At. Aq. ist, welches durch die Formel  $C_{12}H_{10}O_{11} + 3H_2O$  repräsentirt wird.

Gleichwie also die beiden bisher angenommenen Arten der Citronensäure mit 4 und 5 At. Aq. entweder gar nicht existiren, oder doch mindestens aus der gewöhnlichen Säure unter bekannten Bedingungen niemals entstehen, eben so wenig kann die krystallisirte Citronensäure bestehen mit weniger, als 3 At. Aq. Denn nicht allein bei der Temperatur von  $150^{\circ}$ , bei welcher sie

igt zu schmelzen, sondern auch bei lange dauernder Wirkung einer geringern Wärme beginnt ihre Zersetzung in Aconitsäure, Aceton, Kohlenoxyd und Kohlenure. Ob diese Zersetzung nur bedingt werde durch Abcheidung des Hydratwassers, oder ob die Bestandtheile des Wassers dabei thätig sind, scheint, ungeachtet der größern Wahrscheinlichkeit des erstern Falles, einer Prüfung nicht unwerth. Jedenfalls geht die Umwandlung der Citronensäure in Aconitsäure stufenweise vor bei Abwesenheit jeder kleinen Menge von hygroskopischem Wasser schon bei  $150^{\circ}$ , bei Anwesenheit desselben erst in höherer Temperatur. Dieses beweist auch die Untersuchung des Hrn. Crasso, nach dessen gewisser Meinung die Zersetzung der Citronensäure mit der Entwicklung von Aceton und Kohlenoxyd beginnt. Aber nimmt, wie man jetzt sieht, schon mit dem Schmelzen der *krystallisirten* Säure ihren Anfang. Die flüchtige Flüssigkeit, welche Hr. Crasso zu Anfang der ersten Destillation erhielt, und für Krystallwasser hielt, kann man jetzt nur noch für *hygroskopisches* Wasser halten. Ebenso ist die Citronensäure, welche Crasso aus der bis zum Abnehmen der weißen Masse erhitzten rückständigen Säure durch Auflösen und Krystallisiren erhielt und mittelst einer Analyse  $Aq + \overline{C}$  erkannte, nun nicht mehr als die bei  $100^{\circ}$  trocknete Säure anzusehen, sondern überhaupt als die unverändert gebliebene gewöhnliche *krystallisirte* Citronensäure.



über das Guajakholz und die darin vermuthete Benzoessäure;

von

Franz Jahn in Meiningen.

Jedermann, wer das wässrige Guajakholzextract untersucht hat, wird bemerkt haben, daß sich, wenn auch die nicht beim Auskochen des Holzes, aber doch beim ersten Verdampfen des Extracts ein eigenthümlicher



aromatischer, vanillen- oder benzoessäureartiger Geruch in ziemlich beträchtlichem Grade entwickelt. In den Lehrbüchern findet man darüber keine bestimmte Auskunft und Geiger sagt, daß das Guajakholz, bis jetzt noch nicht genau untersucht, einer näheren Untersuchung würdig sei. Nur Berzelius in seinem *Lehrbuch der Chemie*, Bd. 7. H. 4. führt an, daß Landerer im Guajakholze eine eigenthümliche Säure gefunden haben wolle, die bei Bereitung der *Tinct. Guajaci* durch Maceration in der Sonne auf dem Boden der Flasche in kleinen weißen Krystallnadeln sich abgesetzt habe. Er beschreibt sie als geruchlos, bitter und scharf schmeckend, beim Erhitzen schmelzend und sich verflüchtigend, indem dabei der größte Theil zersetzt werde. Sie röthe Lackmus, löse sich nicht in Wasser, Alkohol und Aether, in kochendem Alkohol aber sei sie auflöslich und krystallisire beim Erkalten wieder heraus. Mit Ausnahme von kaustischem Ammoniak, worin sie sich beim Kochen etwas auflöse, sei sie in Alkalien unlöslich, Salpetersäure und salpetrige Säure färbten sie grün, löste aber nichts auf. Dabei habe die Guajakholzinctur die bekannte Eigenschaft verloren, sich mit Salpetersäure grün zu färben. Chlorwasserstoffsäure löst beim Kochen etwas davon auf, und das Ungelöste könne durch Alkali wieder daraus gefällt werden. — Righini wolle im Guajakholze eine eigenthümliche Säure gefunden haben, die er Gujaksäure nennt. Sie werde erhalten, wenn die Tinctur so viel verdunstet werde, daß sich das Harz abscheide. Dann sei die Flüssigkeit, worin das Harz schwimmt, milchig. Die vom Harz getrennte Flüssigkeit wird noch ihm mit Talkerde vermischt und bis auf einen gewissen Grad verdunstet. Man setzt darauf Schwefelsäure zu, wodurch ein Niederschlag entstehe; dieser Niederschlag werde nun mit Alkohol behandelt und die Auflösung verdunstet, wodurch sich die Säure in Nadeln abscheide. Sie soll der Benzoessäure ähnlich, davon aber verschieden sein. — Diese Angaben, fügt Berzelius hinzu, bedürfen der Bestätigung.

Wenn wir nun auch nicht so glücklich gewesen sind, die von Landerer bei Maceration des Guajakzuges mit Weingeist beobachtete Substanz wiederzuholen, so hat doch mein früherer Gehülfe van Moll in Düsseldorf mehrfache Versuche auf Benzoessäure, die nach dem obenerwähnten eigenthümlich aromatischen Geruch darin vermutheten, im vorigen Jahre unternommen, zu welchem Ende er besonders die beim Erkalten der Holzabkochungen sich ergebenden Harzabsätze und Abkochungen selbst mit Kalk, Säure und Alkohol ungefähr in der von Righini angegebenen Weise behandelte. Er erhielt in diesen Fällen nach möglicher Veränderung der anderweitigen Beimischungen Flüssigkeiten, welche durch dieselben Reagentien, welche zur Erkennung der Benzoessäure dienen, afficirt wurden, aber keine Niederschläge, wie sie erzeugt wurden, besaßen doch eine verschiedene Färbung und es ist ihm auch nicht möglich gewesen, wirkliche der Benzoessäure ähnliche Krystalle aus solchen Flüssigkeiten zu erhalten. Im Vergleich sah ich später, daß auf der Löschpapierbedeckung des mit Kalk behandelten und mit Schwefelsäure versetzten Guajakholzauszugs, als man dasselbe bei weiterer Arbeit im Trockenschrank zu concentriren versuchte, eine geringe Menge von kleinen weißen nadelartigen Krystallen angefliegen war (wozu die trocknende Wirkung des Trockenschrankes hülffreich mitgewirkt haben dürfte), und diese Krystalle konnten nach meinem Dafürhalten nichts als Benzoessäure bestehen, aber ich bin durch weitere Versuche, in welchen ich nach und nach noch 1 Pfd. des erwähnten Holzes verwendet habe, belehrt worden, daß es keineswegs, wie ich Anfangs glaubte, leichtes sei, den wirklichen Gehalt an diesem Bestandtheile in dem Guajakholze darzuthun und ich bin daher zur Zeit in Ungewissheit darüber, ob die Benzoe wirklich fertig gebildet in dem Holze enthalten sei, oder ob sie erst aus andern Stoffen, die nebenher darin enthalten sind — in welcher Hinsicht ein eigen-

thümlicher extractiver, theilweise selbst flüchtiger und sich fortwährend beim Verdampfen seiner wässrigen Lösung an der Luft verharzender Stoff ins Auge gefasst zu werden verdient — durch Einwirkung von Wärme und Feuchtigkeit, vielleicht auch der dabei angewendeten Scheidungsmittel, gebildet werde.

Die Versuche, die Benzoessäure von andern sie begleitenden Körpern zu isoliren, sind sehr mannichfaltig von mir unternommen worden, ich will nicht alle, sondern nur diejenigen, welche mir von besonderm Interesse erscheinen, hier wiedergeben, aber ich bemerke im Voraus, daß ich keineswegs ein den Gegenstand erschöpfendes Werk zu liefern glaube, sondern ich gedenke nur damit eine Schilderung der Schwierigkeit zu entwerfen, mit welcher Benzoessäure, wenn sie zugleich mit andern extractiven Körpern in Pflanzenauszügen vorkommt, zu erkennen ist.

Das verwendete Holz war erst eine Quantität des gewöhnlich im Handel befindlichen mit weißeren leichteren Stücken (angeblich Splint) gemengten Holzes, ~~dann~~ aber auch wurde bloß braunes schweres Holz, wie ich dasselbe in besonderer Schönheit aus einer Materialhandlung in Nürnberg in geschnittenem Zustande erhielt, verwendet. Beide haben in den damit vorgenommenen Versuchen keinen bemerkenswerthen Unterschied gezeigt, aber es ist bekannt, daß letzteres ungleich reicher an Harz, als das weißliche Holz, ist.

Wenn man Guajakholz für sich mit Wasser der Destillation unterwirft, so erhält man ein wasserhell ablaufendes Destillat, welches nicht gerade aromatisch, sondern vielmehr unangenehm krautartig riecht und an welchem erst, nachdem es einige Zeit gestanden hat, ein entfernt vanilleartiger Geruch bemerkbar wird. Spreuen von ätherischem Oel wurden zwar durch den erhaltenen Geruch bethätigt, konnten aber sonst nicht benutzt werden, auch wurde Lackmus von diesem Wasser nicht verändert und ebensowenig bemerkt man, daß Alkalien seine Farbe verändern.

Wenn Guajakholz mit Wasser unter Zusatz von verdünnter Schwefelsäure destillirt wird, so erhält man ein wasserhelles Destillat und eine Spur wenigstens an ätherischem Oel ist, als einzelne kleine Flöckchen dem Wasser schwimmend, zu bemerken. Das Wasser besitzt ziemlich stark den eigenthümlichen Guajakholzgeruch, riecht aber ebenfalls unangenehm krautartig; dabei; das zuerst übergegangene röthet Lackmus nicht, wohl aber das später destillirte, aber diese saure Reaction mochte mehr einer geringen Menge, vielleicht durch Fäulnisbildung der Schwefelsäure in Berührung mit Pflanzensubstanz entstandener schwefliger Säure und daraus später wieder erzeugter, Schwefelsäure — wie Barytsalzung nachwies — zuzuschreiben sein, als daß man es annehmen können, die saure Reaction sei allein der Benzoessäure oder einem andern sauren Pflanzenkörper zuzuschreiben. Das mit etwas kohlensaurem Natron versetzte Destillat verändert sich bei diesem Zusatz nicht in der Farbe, und das nach diesem Zusatz verdampfte Wasser hinterläßt zwar eine bräunlichgelb gefärbte Flüssigkeit, aber diese giebt, wenn das überschüssige Natron durch einige Tropfen Essigsäure neutralisirt wird, mit Eisenoxyd- und Kupfersalzen nicht jene charakteristischen Niederschläge, wie wir sie bei folgender Handlungsweise hervortreten sehen, wenn auch die Flüssigkeit in diesem weitverdampften Zustande angenehm aromatisch riecht und die Auflösung des Silberpeters gelblichweiß, in kurzer Zeit als schwarzer Niederschlag zu Boden fallend, dadurch getrübt wird. Wird nun aber Guajakholz mit einem Alkali z. B. Kalkmilch gekocht (in welchem Falle kein Ammoniakgehalt — wenn der Versuch in einer Destillirblase gemacht wird — in dem Destillat zu erkennen ist), die Flüssigkeit vom überschüssigen Kalk und den dadurch unlöslich zurückgehaltenen Theilen durch Absetzenlassen und Filtriren gesondert und die gelöste Flüssigkeit mit Schwefelsäure der Destillation unterworfen, so erhält man schon ein etwas mehr aromatisch riechendes Destil-



lat, an welchem nebenbei zwar auch ein etwas brauer und krautartiger Geruch zu bemerken ist, aber das Destillat erscheint trübe, später wird es wieder klar und es reagirt sowohl das zuerst, wie das später hinzugegebene tropfte Wasser deutlich sauer. Wird ein Theil des Destillates mit Natron gemischt, so daß letzteres im Ueberschuss vorhanden ist, so färbt sich die Flüssigkeit gelblich oder grünlichgelb, welche Färbung durch den weitem Zusatz von diesem Wasser, so daß das Destillat neutralisirt wird, wiederum verschwindet, ohne dass aber eine Trübung in einem oder dem andern Falle entsteht. Beim Verdampfen des in solcher Weise neutralgemachten Wassers trübt sich dasselbe indessen wiederum und färbt sich bei weiterm Verdampfen nur mehr braun. Die bis zu einem kleinen Volumen verdampfte Flüssigkeit reagirt dann wieder etwas alkalisch, wird durch die Neutralisation dieses Alkaliüberschusses mittelst Essigsäure von den trübenden Theilen abfiltrirt (welche aus einer harzigen Substanz bestehen) und mit Reagens geprüft, so zeigt sich, daß sie mit Eisenchlorid röthlichgelbe, mit schwefelsaurem Kupferoxyd eine gelblichblaue und mit salpetersaurem Silberoxyd einen dicken flockigen (nach mehreren Stunden) braun und schwarz sich färbenden Niederschlag giebt, welches sich als ein Anzeichen von Benzoessäure oder einem verwandten Stoffe per sind.

Die Flüssigkeit, welche nach Abdestillation des Wassers aus einem in der geschilderten Weise mit Kalk und Schwefelsäure behandelten Guajakholz nach Absatz des ausgeschiedenen Gypses und des zugleich gefällten Harzes (von welchem aber der Rest wenig zurückhält) übrig bleibt, riecht angenehm holzartig und sieht trübbräunlich aus. Sie zeichnet sich wie das davon abdestillirte Wasser, dadurch aus, dass auf Zufügung von freiem Alkali (Kali, Natron oder Soda) eine grünlichgelbliche Farbe derselben hervorruft, welche bei sich die Flüssigkeit mehr aufklärt, während die Färbung beim Neutralisiren derselben mit einer Säure



Trübwerden der Flüssigkeit wieder verschwindet. wurde, indem man eine Auflösung von kohlen. Natrium zugab, bis deutliche alkalische Reaction eintrat, in einem geringen Volum verdampft, dann filtrirt, erholt bis zum Kochen erhitzt und mit Schwefelübersättigt, aber die heiße, klar abfiltrirte Flüssigkeit setzte selbst nach mehreren Tagen keine Krystalle von Benzoessäure ab, wie man vermuthet hatte, sondern weiter verdampft, schied sich auf ihrer Oberfläche eine schwarzbraune Haut ab, und die von dieser abgetrennte Flüssigkeit bedeckte sich aufs neue mit dieser Haut, je weiter verdampft wurde. Mit ihr, die einer ölhaltigen Haut gleich die Flüssigkeit überzieht, sonderten sich zuletzt kleine Krystalle ab, diese bestanden in kleinen Fäden und man glaubte, sie dem größten Theile für Benzoessäure halten zu dürfen, indem wohl später das schwefels. Natrium herauskrystallisiren konnte. Auch lieferte die Flüssigkeit, wenn man diese mit Wasser auskochte und abfiltrirte, mit den obgeführten Reagentien dieselben auf Benzoessäure zuweisenden Niederschläge, wenn nämlich die etwas sauernde Auflösung mit reinem Alkali neutralisirt wurde, aber diese Reactionen, wenn auch im Ganzen richtig, waren doch immer schwach und die Niederschläge ebensowenig reingefärbt wie vorhin. Bei weiterer Untersuchung fand sich auch, daß noch eine beträchtliche Menge von Schwefelsäure in der Flüssigkeit vorhanden war und als man versuchte, die krystallinische Masse im Platinlöffel zu verflüchtigen, so entwickelte sie zwar einen angenehmen aromatischen dem Guajakholz ähnlichen Geruch, indem sie sich schwärzte; bei weiterer Erhitzung wurde sie aber wieder weiß und ihre Menge verringerte sich nur wenig, worauf dieser Rückstand als schwefels. Natrium auswies, welchem also während des Verdampfens nur eine kleine Menge von Benzoessäure, jenen braunen, unlöslich abscheidenden Harzkörper begleitend, sich auszuscheiden hatte.

Dasselbe Resultat wird erhalten, wenn Guajakholz statt mit Kalkmilch mit einer Auflösung von kohlens. Natron behandelt wird. Setzt man einem in solcher Weise gefertigten Absud bis zur sauren Reaction Schwefelsäure hinzu, so erhält man indessen einen sehr starken Niederschlag von weißgelb sich abscheidendem Harz. Wird nun die Flüssigkeit noch heiß von diesem Harz abfiltrirt und entweder für sich oder unter Sättigung mit kohlens. Natron (um die Benzoessäure nicht zu verflüchtigen) verdunstet, und für letzteren Fall gegen das Ende des Verdampfens wieder mit freier Schwefelsäure begabt, so erhält man ebensowenig rein ausgeschiedene Benzoessäurekrystalle, wohl aber einen sich eben so wie vorhin verhaltenden, durch den auch hier wieder hervortretenden unlöslich werdenden Körper, braun bis schwarz gefärbten Krystallabsatz mit angenehm aromatischem Geruch.

Nahm man zur Sättigung des freien Kalks und zur Trennung der vermuthlich damit verbundenen Benzoessäure (wenn nämlich Guajakholz mit Kalkmilch gekocht worden ist) statt der Schwefelsäure — Salzsäure, von welcher Abänderung man ein besseres Resultat erwartete (da auch ein bloß mit Schwefelsäure übersättigter kalkhaltiger Auszug keine reine Benzoessäurekrystalle, sondern denselben braunen Absatz, aber mit Gypskrystallen durchwachsen, geliefert hatte), so war man auch nicht glücklicher, denn es zeigte sich, daß auch der hierbei erhaltene krystallinische Absatz gegen alles Vermuthen, aber später, als man den verwendeten Aetzkalk auf Schwefelsäure untersucht hatte (wovon sich eine kleine Menge in demselben vorfand) erklärbar — nicht Benzoessäure allein enthielt, sondern größtentheils aus Gypskrystallen bestand.

Man wird sich nun wundern, so mannfaltige Wege eingeschlagen zu sehen, um die Säure in einer oder in andern, im Ganzen ziemlich übereinkommenden Weise rein krystallisirt zu erhalten, allein ich muß hier entgegen, daß allerdings auch andere Mittel, um Tren-

g der gemischten Krystallanschüsse zu bewirken, z. B. die Anwendung von Alkohol und Wasser, t aufer Acht gelassen worden sind und nur der lständigkeit wegen habe ich die obigen Versuche zu- mengestellt. Auch habe ich nachträglich noch zu ähnen, daß mir die Anwendung von gebrannter kerde in der von Righini angegebenen Weise e bessere Resultate als die obigen geliefert hat. Ein ituöser Guajakholzauszug läßt, wenn starker Alko- dazu genommen und sehr weit verdampft wird, und st da nicht vollständig, alles Harz aus seiner Auf- ng sich absondern. Ist nun noch Weingeist in m solchen Auszuge, so bleibt auch mehr oder weni- Harz gelöst; wenn dann nach unvollkommenen Ver- sten des Alkohols und nach Absonderung des theil- se geschiedenen Harzes Talkerde zugefügt und wie- verdunstet wird, während man Schwefelsäure zusetzt, cheidet sich auch wiederum Harz aus, indem der ohol immer mehr aus der Flüssigkeit schwindet. dem in solcher Weise entstandenen Absätze habe aber nichts Krystallinisches erkennen können und asowenig bin ich im Stande gewesen, durch Wie- auflösung desselben in Alkohol und Verdunsten des ungsmittels Krystalle zu erhalten. — Wird eine he Guajakholztinctur aber unter Zusatz von Wasser lampft, wodurch sämtliches Harz daraus gefällt d, so erhält man, wenn die Flüssigkeit heiß abfil- t wird, ein beim Erkalten sich nur wenig gelbtrü- les Filtrat, welches dann beim Zusatz von Talk- sich ebenso wie durch Natron oder Kalk höher färbt, bei der Uebersättigung mit Schwefelsäure wieder mehr entfärbt, aber es entsteht beim Er- en kein auf Bezoensäure deutender Niederschlag und nun weiter verdampfte Flüssigkeit liefert dieselben nen Absätze, hier mit Bittersalzkristallen durch- hsen. Es wird also dadurch dasselbe Resultat wie Kalk und Natron erhalten, und ich habe nur noch erwähnen, daß diese Absätze, selbst wenn einige

Pfunde Holz verwendet werden, immer nur Weniges betragen (3 Pfund lieferten ungefähr  $1\frac{1}{2}$  Quentchen), daß sie aber alle, wenn sie in heißem Wasser gelöst und die freie darin vorhandene Säure mit Natron oder Kali gesättigt wird, die obenerwähnten eigenthümlichen Fällungen mit Eisenchlorid und Kupfersalzen in mehr oder weniger beträchtlichem Grade geben.

Wenn man nun versucht, diese in einer oder der andern Weise erhaltenen Absätze dadurch zu reinigen, daß man dieselben in kochendem Wasser löst oder auskocht, wodurch sich das in der Kälte festgewordene Harz erweicht und die in demselben eingeschlossenen Krystalle an das Wasser abgiebt, so erhält man zwar eine weniger als vorhin gefärbte Flüssigkeit, aber aus der heiß filtrirten und nun erkaltenden Auflösung scheissen keine der Benzoessäure ähnlichen Krystalle an. Die Flüssigkeit trübt sich zwar, aber das dadurch entstehende Sediment besteht wiederum in einer harzigen Substanz, die sich in Alkohol löst und an welcher keine auf Benzoessäure deutende Reaction bemerkt wird. Die übergehende Flüssigkeit sieht blaß braungelb aus, aber wenn sie verdampft wird, um sie zu concentriren, so treten dieselben Erscheinungen ein, wie sie im Vorigen beschrieben sind. Die Flüssigkeit färbt sich nämlich immer mehr braun und eine neue Menge von Harz überzieht dieselbe in Form eines Rahms, mit welchem zugleich Krystalle wie früher sich absondern. Eine wiederholte Auflösung liefert dasselbe Resultat, so daß wegen dieses fortwährenden Verharzens des eigenthümlichen Extractivstoffs nicht möglich ist, die Krystalle rein von andern Beimischungen zu erhalten und die wiederholte Auflösen und Verdampfen, wobei sich immer ein stark aromatischer vanillenartiger Geruch entwickelt, bringt den Nachtheil, daß die Reaction der Flüssigkeit auf Eisenchlorid und Kupfervitriol, was natürlich immer erst die freie Säure der Flüssigkeit mit einem Alkali neutralisirt werden muß, nach und nach verschwindet, indem jedenfalls die geringe Menge

natürliche  
mit einer  
nach ver  
1900 161



Benzoessäure, wie dies schon von mehreren Chemikern in andern Fällen beobachtet worden ist, sich beim Verpuffen des Wassers mit verflüchtigt.

Nimmt man statt des Wassers zur Reinigung Alkohol, so bleiben natürlich die Gyps-, Glaubersalz- und Natriumsulfatkrystalle zurück, aber man bekommt dann, wegen des aufgelösten Harzes, stark braungefärbte Flüssigkeit, welche das Eigenthümliche hat, daß ein Theil des Harzes, wenn man auch Anfangs sogleich Wasser zufügt, um dessen Sonderung zu bewirken, bei dem Verdampfen des Alkohols jedenfalls unter der Wirkung des in der Mischung befindlichen Extractstoffs gelöst bleibt und die Ausrückung der Benzoessäure verhindert, aber auch die extractiven Beimischungen schienen der Absonderung der Benzoessäure aus der Flüssigkeit entgegenzuwirken. Sucht man eine alkoholische Auflösung ohne Zusatz von Wasser durch Verpuffen zu concentriren, um die Ausscheidung von Benzoessäure zu befördern, so sieht man hier weder in dem noch dem andern Grade des Verdampfens Benzoe in Krystallen sich ausscheiden, selbst wenn die Flüssigkeit von Zeit zu Zeit Tagelang bei Seite gesetzt wird. Sehr weit verdampft, nimmt sie dann Syrupconsistenz an, bleibt aber klar und trocknet zuletzt zu einem andern Extracte mit Harzgehalt zu einer in der Wärme erweichenden, in der Kälte aber hart und spröde werdenden Masse aus; das Schlimmste aber auch hier, daß man solche Flüssigkeiten eben wenig lange kochen oder mehrmals auflösen und verdampfen darf, ohne die Substanz, welche die Eigenschaften der Benzoessäure zeigt, aus dem Auflösungsmitel zu verlieren.

Da in andern Fällen unreine Benzoessäure durch Salpetersäure von fremden Beimischungen gereinigt werden kann, ohne daß die Benzoessäure durch die Salpetersäure zerstört werden soll, so versetzte man einen Theil eines solchen krystallinischen Absatzes, nach der Wiedererweichung durch kochendes Wasser mit



Salpetersäure. Die Flüssigkeit färbte sich anfänglich mehr braun und es löste sich in der Säure auch jener in Wasser unlösliche Antheil von Harz, indem er, so weit er zunächst nur mit den Dämpfen der Säure in Berührung kam, blaugrün anlief, welche Färbung aber verschwand und nicht wieder erschien, als die Säure selbst ihn benetzt hatte (woraus seine Identität mit dem gewöhnlichen Guajakharz hervorgeht), nach fortgesetzter Erwärmung verschwand die braune Farbe der Flüssigkeit, indem sich, ausgehend besonders von den Harztheilchen, die sich in der Flüssigkeit lösten, reichlich Salpetergas entwickelte, und diese blieb fast gänzlich klar und nur wenig goldgelb gefärbt zurück. Nach 2 Tagen, während welcher Zeit die saure Flüssigkeit bei Seite gesetzt worden war, hatten sich kleine reine spiefsige Krystalle darin gebildet, sie bestanden aber bei weiterer Prüfung in nichts als Gypskrystallen und in der Flüssigkeit selbst war alle Reaction auf Benzoessäure, auch der angenehm aromatische Geruch derselben verschwunden, und die Benzoessäure war also auch hierbei zerstört worden, eine Eigenschaft, welche Lecann und Serbat übrigens ebenfalls an unreiner Benzoessäure wollen bemerkt haben.

Den bei Behandlung mit kohlensaurem Natron erhaltenen Krystallabsatz unterwarf man einer Reinigung mit Kohle (*Carbo praeparatus*). Die Flüssigkeit verlor, nachdem sie  $\frac{1}{4}$  Stunde gekocht worden war, den eigenthümlichen Geruch zwar wenig nur, und nachdem Filtriren sah sie etwas weniger gefärbt aus, allein beim weitem Verdampfen, um daraus Krystalle zu erhalten, färbte sie sich wiederum braun und es war sichtbar, daß hierdurch die fremden Beimischungen nicht entfernt werden konnten. — Auch wurde noch eine Reinigung mittelst essigs. Bleies versucht, allein mit dem benzoës. Blei fielen zugleich die übrigen extractiven Beimischungen, indem sich eine solche Auflösung völlig entfärbte, nieder. Nach der Behandlung des Bleiniederschlags mit Schwefelwasserstoff erhielt

in zwar eine fast wasserhelle Flüssigkeit, allein sie abte sich wieder während des Verdampfens und bei iterer Concentration mußte man die Bemerkung machen, daß auch hier alle Reaction auf Eisenchlorid und Kupfersalz verschwunden war.

Nach diesen negativen Resultaten, sie isolirt darstellen zu können, bin ich, besonders aus dem folgenden Grunde, geneigt gewesen, dem Glauben, daß überhaupt Benzoessäure in dem Guajakholz enthalten sei, zu entsagen. Wenn nämlich das Harz, welches man erhält, aus einem Guajakholzabsud mit Natron gekocht und die hierbei erhaltene Flüssigkeit mit Schwefelsäure oder Salpetersäure präcipitirt wird — wobei sich, wie erwähnt, eine beträchtliche Menge von Harz ausscheidet — oder auch jenes Harz, welches sich von selbst aus den in obiger Weise gefertigten Auszügen beim Verdampfen ausscheidet, mit Aetzlauge behandelt wird — worin sich beide leicht und in großer Menge mehr oder weniger grünlichbrauner Farbe lösen, erhält man Flüssigkeiten, welche mit Eisensalzen blauschwarze, mit Kupfersalzen lichtgraugrüne, erst nach einiger Zeit besonders hervortretende, mit salpetersaurem Silber sogleich dunkelblauschwarze Niederschläge geben und es konnten also durch Hinzutreten anderer Bestandtheile der erwähnten Auszüge sehr leicht jene den Benzoessäure ähnliche Einwirkung auf die erwähnten Prüfungsmittel hervorgerufen werden sein. Aber der eigenthümlich aromatische vanillinartige Geruch solcher Flüssigkeiten, welcher jenen Auflösungen ganz abgeht, und der Umstand, daß aus einer solchen Flüssigkeit wirklich einen Antheil von einem der Benzoessäure gleichen Körper enthalten sah, rechtfertigen immer noch den Glauben an Gegenwart dieser Säure und wenn dieselbe als solche leicht im Holze auch nicht präexistirt, sondern erst in Folge der angeführten Behandlung gebildet wird, ebenwären die charakteristischen Eigenschaften derselben

jedenfalls auch durch die, in solchen mit Alkalien behandelten Flüssigkeiten befindliche Beimischung des verseiften Harzes modificirt und verdeckt gehalten worden, so wird *ihre Existenz in den erwähnten Flüssigkeiten und deren krystallinischen Absätzen*, wie es mir wenigstens scheint, durch Folgendes außer Zweifel gesetzt und diese meine Ansicht bestätigt:

1) Wenn man die (beim Verdampfen der in obiger Weise durch Behandlung mit Alkalien und Uebersättigung mit Salz- oder Schwefelsäure erhaltene Flüssigkeiten) sich ergebenden Absätze der Sublimation unterwirft (ich habe mich dazu gewöhnlicher Medicingläser bedient, welche ich im Sandbade erhitzte, indem ich für Abkühlung ihres oberen Theils einige Sorge trug, nachdem sie nämlich von wässriger Feuchtigkeit durch längeres Verweilen an einem mäßig warmen Orte befreit worden waren, so erscheint ein deutlicher, wenn auch schwacher Anflug von sublimirter Benzoesäure in spiefsigen, aber federartig anliegenden Krystallen (den ich nicht erhalten konnte, wenn bloßes natürliches oder künstliches Guajakharz in der gleichen Weise behandelt wird). Die an dem obern Theile des Glases angefliegenen erscheinen fast weiß, die tiefer unten anliegenden sind mit einer gelben, noch weiter hinab hinab braunen — wie es scheint, brenzölartigen — Substanz verunreinigt. Die kleine Menge dieser reineren Krystalle, welche sich leicht in etwas erwärmten Alkohol lösen, liefern mit etwas kohls. Natron neutralisirt, mit Eisenchlorid, Kupfer- und Silbersalzen ganz solche Niederschläge, wie sie reine benzoës. Salze hervorbringen; aber die übrigen, bräunlich gefärbten, verhalten sich schon anders, sie gaben bei der Neutralisation mit Alkali, wenn etwas zuviel von letzterem zugefügt wurde, durch die entstehende eigenthümliche gelbe Färbung den Anweis, daß der die Benzoesäure in allen ihren Auflösungen (selbst in dem Destillate des Guajakharzes) begleitende Stoff auch hier wieder vorhanden sei.

offenbar von flüchtiger Natur ist, und lieferten auch bei weitem nicht die reingefärbten Niederschläge den erwähnten Prüfungsmitteln.

2) Wurde nun in einem Gegenversuche eine verdünnte Harzauflösung (Auflösung des erwähnten künstlich erhaltenen Guajakharzes in Aetzkalklauge, soviel darin lösen wollte) mit reinem benzoesaurem Natrium gemischt und diese Mischung mit den erwähnten Reagentien geprüft, so erhielt man Niederschläge, welche bei gewissen Verdünnungsgraden dieser Zumischung hohem Grade denjenigen ähnlich waren, die aus den erwähnten Flüssigkeiten erhalten wurden.

Fassen wir nun nochmals die oben aufgezählten Erscheinungen zusammen, so begegnen wir zunächst keine Spur von flüchtigem Oel, welches, wenn die Benzoesäure nicht schon fertig gebildet im Holze vorhanden ist, jedenfalls in Verbindung mit Harz (als eine Ursache von Balsam oder Balsamharz) Ursache des Geruchs ist, welchen das Guajakholz beim Kochen mit Wasser entwickelt. Es wird nun natürlich schwer sein und eine nochmalige specielle Untersuchung der Bestandtheile dieses Holzes, besonders des darin enthaltenen Extractivstoffs und des Harzes erfordern, um mit Gewissheit darüber aburtheilen zu können, in welcher Weise zerlegend das Alkali auf diese in der Mischung enthaltenen pflanzlichen Stoffe einwirkt, aber es läßt sich keine besondere Schwierigkeiten denken, daß die Benzoesäure, welche so mannichfaltig aus flüchtigen Oelen und Harzen sich bildet, und welche wir besonders erstlich im Guajakholzabsude nach Behandlung derselben mit Alkalien hervortreten sehen, ein Product der Verseifung (Verseifung) dieses Balsamharzes ist.

Bei Betrachtung des eigenthümlichen extractiven Characters, welchen wir die Benzoesäure überall begleiten sehen, und welcher sich sowohl in Wasser, welchem sie unlöslich ist, als auch in solchem, welchem Alkalien beigegeben sind, löslich zeigt, und wie es scheint, ebenfalls sehr nahe mit ist an dem Geruch, den solche Flüssigkeiten

darbieten, welcher sich auch ferner noch besonders dadurch auszeichnet, daß er an der Luft verharzt und dies, wie es scheint, in um so stärkerem Grade, in welchem die Benzoessäure aus ihrer Auflösung verdampft — habe ich mich nicht des Gedankens erwehren können, daß dieser Körper nur eine Art von Extractivstoff mit sauren Eigenschaften sei, welcher die Fähigkeit besitze, die erwähnten Reactionen auf Eisen-, Kupfer- und Silbersalze in Verbindung mit den Alkalien hervorzubringen. Dieser Körper möchte sich dann fortwährend, indem die Benzoessäure ein Product seiner Zerlegung wäre, in Harz verwandeln, neben jener ist aber auch noch der durch Alkalien in der Farbe veränderliche Körper, welchen wir zuletzt noch bei der Sublimation die Benzoessäure begleiten sehen, ein Product seiner Zerlegung.

Schließlich erlaube ich mir noch zu erwähnen, daß ich den krystallinischen Körper, welchen Landerer beobachtet haben will, trotz der von ihm geschiedenen sauren Reaction, (welche aber vielleicht durch an der Luft gesäuerten Alkohol bedingt worden ist) und mancher anderen Controverse für nichts anderes halte, als für Harz, welches sich aus der Tinctur bei langsamen Verdunsten des Alkohols abgesetzt hat. Zur Rechtfertigung dieser Meinung bitte ich nur um Beobachtung des Rückstandes, welcher bleibt, wenn z. B. einige Tropfen Guajakholztinctur, langsam an einem Glase (welches mit der Tinctur gefüllt und eben gebraucht worden ist) hinablaufend, verdunsten.

## Ueber die Producte der Einwirkung der Salpetersäure auf Aloe;

von  
A. Boutin.

**D**ie Einwirkung der Salpetersäure auf die organischen Substanzen ist im Allgemeinen sehr interessant, es entstehen dadurch Producte, die schon längst die



merksamkeit der vorzüglichsten Chemiker auf sich gezogen haben; einige dieser Producte haben die wichtigsten Anwendungen in den Künsten gefunden, andere weniger bekannte sind bis jetzt ohne Nutzen geblieben, wenn auch nicht für die Wissenschaft, doch für die Industrie. Ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich in der Färberei, die wir täglich mit den schönsten Entdeckungen sich bereichern sehen, mich verpflichtet hätte durch die Anwendung eines neuen Farbestoffs, der bis zu dem Tag unberücksichtigt blieb; denn weder Braconnot noch Liebig, der nach ihm mit dieser Substanz sich beschäftigte, scheinen ihn hinlänglich rein erhalten zu haben.

#### *Einwirkung der Salpetersäure.*

Wenn man 1 Theil succotrinische Aloe und 8 Th. Salpetersäure in einem Kolben, der die 8—10fache Menge dieser Materialien fassen kann, einer mäßigen Wärme dem Sandbade aussetzt, so nimmt die Flüssigkeit erst eine schöne smaragdgrüne Farbe an, ohne daß eine merkliche Reaction zu entstehen scheint; so wie aber die Temp. steigt, wird die Flüssigkeit dunkler und trüb, und es entwickeln sich viele rothe Dämpfe. Man nimmt dann die Retorte vom Sandbade, und läßt die Reaction sich selbst fortsetzen, sie wird so lebhaft und entwickelt sich so viel Salpetergas, daß die ganze Masse in den Hals des Kolbens steigt.

Nach beendigter Reaction wird die Flüssigkeit in eine hinreichend geräumige und mit einem Recipienten versehene Retorte gegeben, und ohngefähr die Hälfte oder zwei Drittel überdestillirt. Während der Destillation fällt ein gelbes Pulver nieder. Die Retorte wird entleert, man läßt die ganze Masse erkalten und dünnt mit einer gewissen Quantität Wasser, wodurch sogleich ein neuer dem vorigen ähnlicher gelber schlammiger Niederschlag bildet, den man mit dem ersten auf einem Filter sammelt und mit warmem Wasser auswascht, bis die filtrirende Flüssigkeit eine sehr schöne

purpurrothe Farbe angenommen hat, und eben so der Niederschlag; letzter wird getrocknet und erscheint als ein braunrothes Pulver. Ich werde ihn mit dem Namen *Polychromatinsäure* bezeichnen.

Ehe ich diese Säure näher beschreibe, werde ich kürzlich der andern Producte gedenken, die sich bei der Reaction der Salpetersäure auf die Aloe bilden. Zwei dieser Producte sind bekannt, die Oxalsäure und die Kohlenstickstoffsäure; man erhält aber noch ein drittes, welches man bisher noch nicht angeführt hat, und dessen Entstehung und Eigenschaften zu merkwürdig sind, um nicht zu einem tiefern Studium desselben und seiner Analyse aufzufordern; ich hoffe dieses in einer folgenden Arbeit auszuführen; ich habe diesem neuen Körper den Namen *Cyanil* gegeben, und will nur vorläufig anführen, daß zwischen dem Cyanil und der Cyanwasserstoffsäure in Bezug des Geruchs und der giftigen Eigenschaften eine so grosse Analogie statt findet, daß man erstens mit letzter bis auf einen gewissen Punct für immer halten sollte.

#### *Polychromatinsäure.*

Dieser Körper wurde von Braconnot mit dem Namen *Aloesäure* und von Liebig mit dem Namen *Aloebitter* bezeichnet; er besitzt eine sehr dunkelbraunrothe Farbe, nicht eine schöne gelbe, wie Liebig anführt, er hat einen sehr bittern zusammenziehenden Geschmack, keinen merklichen Geruch, röthet das Lacomuspapier, und zeigt keine krystallinische Bildung, wozu chem. Auflösungsmittel man ihn auch ausgesetzt hat mag. Bei 300 bis 400° C. wird er augenblicklich zersetzt und schmilzt unter leichtem Detonniren. Die Producte dieser Zersetzung sind, wie Liebig angiebt, Kohlenoxydgas, Kohlensäure, Stickstoff, ölbildendes Gas, Hydrocyansäure oder Cyanil und ein sehr geringer löslicher Rückstand. Auf eine glühende Kohle geworfen schmilzt die Polychromatinsäure und giebt nach Cyankohlende Dämpfe aus. In Wasser von gewöhnlicher Tem-

Natur ist sie schwerlöslich, aber die geringe Menge, sich aufgelöst hat, reicht hin, eine große Menge Wasser schön purpurroth zu färben. Von Wasser von 10° C. erfordert die Polychromatinsäure 856 Th. zur Lösung und 70 — 80 Th. Alkohol bei gewöhnlicher Temp. Von Mineralsäuren wird sie in der Wärme aufgelöst, durch Erkalten aber wieder ausgeschieden, wie Liebig anführt, sie ist aber alsdann von der auflösenden Säure imprägnirt und schön gelb. Um sie zu reinigen, reicht ein gutes Auswaschen hin. Am reinsten erhält man sie durch Sättigen mit kohlensaurem Kali oder Natron, mehrmaliges Umkrystallisiren der Salze,ersetzen mit verdünnter Chlorwasserstoffsäure, und Auswaschen des Niederschlags mit warmem Wasser. So gereinigt läßt sie sich auf Platinblech ohne merklichen Rückstand verbrennen; mit den Metalloxyden bildet sie Salze, von denen die auflöslichen recht gut krystallisiren; viele aber sind unlöslich, alle verschiedentlich gekrystallisiert; einige fulminiren bei einer gewissen Temperatur, andere nicht durch Stöße.

Das *polychromatinsaure Kali* krystallisirt in kleinen rhombischen blutrothen Nadeln und hat einen zusammenziehenden schwach bitteren Geschmack; in warmem Wasser ist es löslicher als in kaltem, auf einer glühenden Kohle schmilzt es wie Salpeter. Ist es vollkommen rein, so wird es durch Alkohol nicht in Salpeter und gelbe bittere Materie zersetzt, wie Liebig angiebt; es beweist, daß er die Polychromatinsäure nicht frei von Salpetersäure erhalten hatte. Das *polychromatinsaure Keroxid* krystallisirt in kleinen sehr feinen prismatischen dunkelvioletten Nadeln; in kaltem Wasser ist es unlöslich, in warmem leichtlöslich. Auf Kohlen fulminirt es schwach; es besitzt keinen merklichen Geschmack und wird durch Zersetzen von polychromatinsäurem Kali mit salpetersaurem Silber dargestellt.

Nach einer von Pelouze angestellten Analyse besteht die Polychromatinsäure aus:

|                  |      |
|------------------|------|
| Kohlenstoff..... | 40,0 |
| Wasserstoff..... | 1,1  |
| Stickstoff.....  | 12,2 |
| Sauerstoff.....  | 46,6 |

100.

Dieses würde der Formel  $C_{15}A_2H_2O_{13}$  entsprechen; doch muß diese Analyse noch wiederholt und durch die einiger polychromatinsaurer Salze controlirt werden.

*Anwendung der Polychromatinsäure in der Färberei.*

Die verschiedenen Nuancen, welche ich mit der Polychromatinsäure auf Seide erhalten habe, und die sich eben so gut auf Wolle befestigen lassen, werden gewiß einst von großem Interesse für die Färberei sein, weil sie solider sind, als alle bisher auf diese Stoffe angewandten Farben, besonders Pflanzenfarben. Die Anwendung, welche ich davon in meiner Färberei gemacht habe, sowohl mit der reinen Säure, als in Verbindung derselben mit anderen Farbstoffen, um den Nuancen mehr Festigkeit zu geben, haben mir den Nutzen bewiesen, welchen die Färberei und der Druck von dieser Substanz ziehen können, weil sie leicht darzustellen ist, und unter einem geringen Volum eine große Farbekraft besitzt. Ich habe der Akademie der Wissenschaften Muster vorgelegt, die vor vier Jahren gefärbt waren und zweimal die Reise von Paris nach Petersburg gemacht haben, ohne daß die Wirkung des Meeres die Farbe beeinträchtigt hätte. Im Folgenden will ich das Verfahren und die Beizen zur Fixirung aller dieser Nuancen angeben.

**No. 1.** Die mehr oder weniger dunklern Hölzer werden erhalten durch Beizen der Seide in einer Auflösung von essigsaurem Kupfer bei  $70 - 80^{\circ}C$ . Es wird darauf in ammoniakhaltigem Wasser gewaschen und durch ein Bad von Polychromatinsäure genommen von derselben Temp. als die Beize; die Nuance wird durch verdünnte Essigsäure avivirt.

**No. 2.** Behufs der Corinth-Nuancen wird die Seide



rch eine verdünnte Auflösung von Citronsäure oder einsteinsäure bei 40° C. gebeizt, und darauf in ein hr oder weniger gesättigtes Bad von Polychromatinsäure von 50 — 60° C. getaucht.

No. 3. Rosen-Nuance wird auf dieselbe Weise gemacht wie die vorige, nur setzt man dem sehr schwachen Farbenbade ein wenig Alaun zu.

No. 4. Die mehr oder weniger dunklen violetten Nuancen werden erhalten, wenn man dem Polychromatinsäurebade Ammoniakflüssigkeit und Essigsäure zusetzt, wenn das Bad reichlich violett geworden ist, muß die Seide bei 40 — 50° C. hineinbringen. Für die Seide ist es angemessen, daß das Bad sauer ist, für die Wolle aber das Gegentheil. Ich habe gefunden, daß die Anwendung von fertig gebildetem essigsaurem Ammoniak nicht dieselben Resultate liefert; die Nuancen sind weniger schön.

No. 5. Die beiden grauen Nuancen werden dadurch erhalten, daß man die Seide in einer warmen Auflösung von Zinnchlorür und Manganchlorür beizt, sie dann in Flußwasser nimmt, und darauf durch ein warmes Bad von Polychromatinsäure, dem man etwas Weinstein zugesetzt hat.

No. 6. Die blaue Farbe erhält man, wenn man dem Bade von Polychromatinsäure ein aus Zinnchlorür und Weinstein bereitetes Doppelsalz zusetzt. Das Bad wird violett, dann fügt man eine Auflösung von Zinnchlorür und Weinsteinsäure hinzu, alsdann reichen ein Tropfen Ammoniak hin, daß das Bad blau wird; darauf färbt man die Seide darin, die Farbe ist sehr fest.

No. 7. Die Fantasiefarben werden erhalten, wenn die Polychromatinsäure bei der Siedhitze mit Ueberschuß von kaustischem Kali behandelt, dann etwas Essigsäure zusetzt, die Seide in das so zubereitete Bad einträgt, und sie nachher durch ein angesäuertes Wasser wäscht.

No. 8. Die Avanturin-Nuancen erhält man mit der gleichen Flüssigkeit von der Reaction der Salpetersäure



auf die Aloe, nachdem zuvor die Polychromatinsäure gefällt ist. Diese Nuancen sind sehr solide.

*No. 9.* Gelb erhält man mit Kohlenstickstoffsäure, die auch sehr schöne Farben giebt, und besonders sehr feste auf Wolle.

*No. 10.* Grün wird erhalten, wenn man die durch Kohlenstickstoffsäure gelb gefärbte Seide durch das Bad *No. 6.* nimmt.

Ich übergehe stillschweigend eine große Menge anderer Nuancen, die man mit Polychromatinsäure erhalten kann, wenn man die Beizen verändert.

### *Cyanil.*

Dieser neue Körper entsteht, wie ich schon angeführt habe, bei der Reaction der Salpetersäure auf die Aloe, oder vielmehr auf die Polychromatinsäure. Diese Säure nämlich wird dadurch in Kohlenstickstoffsäure, Cyanil und verschiedene andere Producte verwandelt. Das Cyanil ist eine farblose Flüssigkeit, wenn man es durch Destillation über Chlorcalcium gereinigt hat; es besitzt einen starken cyanähnlichen Geruch, ist flüchtig, sein Siedepunct scheint ziemlich hoch zu sein, sein spec. Gew. größer als das des Wassers, es sinkt darin unter und löst sich nur sehr wenig auf. 1 oder 2 Tropfen Cyanil, die man in ein 8-Unzenglas giebt, das zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist, reichen hin, der übrigen Luft solche giftige Eigenschaften zu ertheilen, daß ein Vogel durch Einathmen derselben sogleich stirbt; bringt man eine sehr feine in Cyanil eben eingetauchte Röhre an das Auge eines Vogels, so erfolgt eben so rasch der Tod. Das Cyanil ist in seiner Zusammensetzung sehr beständig; die geringe Menge, welche ich der Akademie vorlegte, bewahre ich seit zwei Jahren.

Die Kenntniß der Zusammensetzung dieses sonderbaren Körpers wird ohne Zweifel zu interessanten wissenschaftlichen Resultaten führen; sie wird die Beziehungen zwischen den verschiedenen Producten fest-

, die durch die Reaction der Salpetersäure auf einige organische Substanzen entstehen.

Ich habe oben bemerkt, daß das Cyanil durch die indirekte Reaction entsteht, welche die Salpetersäure auf die Polychromatinsäure auszuüben scheint. Diese Ansicht ist um so zuverlässiger, als man durch directe Behandlung dieser Säure mit Salpetersäure, Kohlenstickstoffsäure und Cyanil erhält.

Auch bei der Einwirkung der Salpetersäure auf den Retig bildet sich, wie ich gefunden habe, ebenfalls Cyanil, und wie es sehr glaublich, bei dem Uebergang der Retigotinsäure in Kohlenstickstoffsäure; die Analyse des Cyanils würde dadurch noch interessanter werden. (*Ann. de Pharm. XXVI, 185.*)

---

## **Bemerkung über die ätherischen Oele des Senfs und Rettigs;**

von

*Boutin und Fremy.*

---

**L**äßt man vorsichtig Chlor durch eine tubulirte Röhre strömen, die Senföl enthält, so entstehen seidenartige, sehr cohärente aber verflüchtigungsfähige Kryalle, die in Wasser und Aether unlöslich, in Alkohol in allen Verhältnissen löslich sind. Kali verwandelt sie in eine harzige, in dem Alkali unlösliche Masse. An der Luft werden sie verändert und gefärbt. Nach einem Ueberschuß von Chlor werden sie in eine dichte Flüssigkeit verwandelt und können nicht wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgebracht werden.

Kaustisches Kali in Stücken übt auf das Senföl eine zuerst heftige Reaction aus; wenn man das Gefäß, worin beide Substanzen sich befinden, mäßig erwärmt, so entwickelt sich Wasserstoff, wie bei der Reaction dieses Metalls auf Benzoylwasserstoff, und es entsteht ein in Wasser lösliches Kalisalz. Die Säure dieses Salzes ist unlöslich in Wasser, aber löslich in Alkohol.

Der Rettig enthält dieselben Materien als der schwarze Senf, und er giebt ein ätherisches Oel, wenn man Emulsion von weißem Senf auf den geruchlosen alkoholischen Auszug der Wurzel wirken läßt. In seinem natürlichen Zustande ist der Rettig völlig geruchlos, und das ätherische Oel scheint sich erst zu bilden, wenn man die Wurzel durchschneidet oder zertheilt. (*Journ. de Pharmacie. XXVI, 112.*)

## Pharmaceutisch - chemische Notizen;

von  
*A. Duflos.*

### 1) Gereinigter Weinstein.

**D**er weiße gegenwärtig im Handel vorkommende sogenannte gereinigte Weinstein ist von der Art, daß er kaum unmittelbar zum medicinischen und pharmaceutischen Gebrauche verwendet werden kann. Weinsteinsaurer Kalk, bis zum Betrage von 16 Proc., ist eine nie fehlender, und Kupferoxyd ein nur sehr selten fehlender Begleiter desselben. Der Kalk kann mittelst Oxalsäure nicht erkannt werden, auch dann nicht, wenn man den Weinstein in Aetzammoniak auflöst; bessere Dienste leistet noch phosphorsaures Ammoniak, wenn man etwas davon zu der ammoniakalischen Weinsteinlösung zusetzt, und das Gemisch dann bis zum Sieden erhitzt; es scheidet sich phosphorsaurer Kalk in reichlichen Flocken ab, welche jedoch während des Erkaltens der Flüssigkeit wieder verschwinden. Am untrüglichsten erkennt man bestimmt man den Kalkgehalt, wenn man den Weinstein verkohlt, den Rückstand mit verdünnter Salzsäure auszieht, filtrirt, das Filtrat zuerst mit Ammoniak übersättigt und dann mit oxalsaurem Ammoniak zerfällt. Der Kupfergehalt giebt sich sehr oft schon durch ein bläuliches Ansehen des in Masse gesehenen Weinsteinrückstandes kund, und soll sogar, nach der mündlichen Aussage von Reisenden, absichtlich durch Begießen des Weinsteinrückstandes mit einer verdünnten Auflösung von Kupfervitriol



gebracht werden, um dadurch den Weinstein weiser erscheinen zu lassen, als er wirklich ist. Ueberst man eine nicht unbedeutende Menge solcher Weinkrystalle in einer Porcellanschale mit einer sehr dünnen Lösung von Blutlaugensalz, so erhält die Flüssigkeit eine röthliche Nüance. Prüfungen im Kleinschlagen meistens fehl, sowohl mit Blutlaugensalz, auch mit Schwefelwasserstoff. Verwendet man aber Weinstein ohne vorherige Reinigung zur Bereitung Boraxweinstein, und leitet dann Schwefelwasserstoff in die Lauge, so färbt sie sich alsbald schwarzbraun.

Beseitigung aller dieser Uebelstände bediene ich seit längerer Zeit folgender Reinigungsmethode. Man füllt eine durchschlagartig perforirte Porcellanschale mit etwa 24 Pfd. Weinsteinkrystallen, hängt die Schale in einen passenden Napfen so auf, daß sie ihrem etwas vorragenden Rande auf dem Rande des Napfens ruht, und gießt nun diesen mit einer Mischung aus 12 Th. Wasser und 2 Th. concentrirter käuflicher Salzsäure ganz voll, so daß die Flüssigkeit die Krystalle überdeckt. Man läßt das Ganze 24 Stunden durch in gelinder Wärme (Sommerszeit reicht die Wärme hin) digeriren, nimmt dann die Schale aus dem Napfen heraus, läßt abtropfen, hängt sie in einen andern leeren Napfen, süßt den Inhalt durch wiederholtes Uebergießen mit kaltem Wasser gut aus und läßt sie über weißem Fließpapier auf Hürden ausgebreitet trocknen werden. Die saure Reinigungsflüssigkeit kann zur Reinigung einer neuen Portion Weinsteinkrystalle noch gebraucht werden, nur muß man von Neuem nach Bedarfs 1—2 Pfd. frische Salzsäure zusetzen. Endlich kann sie mit rohem Salmiakgeist oder verdünnter Kalilauge, beim Auslaugen der rohen Pottasche oder bei Bereitung von Aetzlauge entstehenden Kalkniederschlägen gewonnen, ausgefällt, der abgeschiedene wein-saure Kalk gesammelt und zu gelegentlichem Ver-  
brauch aufbewahrt werden. Man kann sie auch mit Mutterlauge von *Kali tartaricum* oder *Tartarus natro-*

*natus*, nachdem sie vorher mit roher Salzsäure neutralisirt worden, vermischen, wodurch saures weinsteinsaures Kali ausgefällt wird, welches man in einen Spitzbeutel sammelt, aussüßt und zur Bereitung der oben genannten Salze verwendet.

## 2) Weinsteinsaures Kali.

Sollen die gereinigten Weinsteinkrystalle zur Darstellung der neutralen weinsteinsäuren Salze, wie des weinsteinsäuren Kalis und des Seignettsalzes, verwendet werden, so ist es natürlich überflüssig, sie vorher zu trocknen, und man kann diese Operation unmittelbar in ähnlicher Weise wie die Reinigung mit Umgehung aller metallenen Gefäße ausführen. Man gießt in den gereinigten Napfen eine Auflösung von 7 Pfd. gereinigten kohlensaurem Kali oder doppelt soviel krystallisiertem kohlensaurem Natron in einer hinreichenden Menge Wassers, setzt den Napfen auf einem Ziegelstein in eine Kapelle oder irgend einen andern warmen Ort, dessen Temperatur nicht höher als 50 — 60° zu sein braucht, rührt die Lösung wohl um und hängt dann in den Napfen den Porcellandurchschlag mit dem durch Salzsäure gereinigten Weinstein, so ein, daß derselbe etwa 1 — 2 Zoll tief in die Flüssigkeit taucht. Die Auflösung geht rasch vor sich, ohne daß irgend ein Uebersteigen zu befürchten wäre, nach 12 bis 24 Stunden, je nach der angewandten Wärme, ist fast alles gelöst, man nimmt den Durchschlag heraus, filtrirt die übrigens sehr klare Lösung durch Fließpapier und gießt in einer Porcellanschale weiter zur Krystallisation zu dampfen. Beim weinsteinsäuren Kali geht die Krystallisation am leichtesten vor sich, wenn die stark concentrirte Salzlauge im warmen Sandbade erkalten gelassen wird. Wenn beim letzteren Salze die Lauge keine klaren Krystalle mehr absetzt, sondern durch die Concentration des noch rückständigen weinsteinsäuren Kalis undurchsichtig trübe erscheint, verdünnt man sie mit der dreifachen Wassermenge, erhitzt bis zum



1, wo sich kohlensaurer Kalk in dicken weissen Flocken heiden wird, filtrirt noch siedend heiss, neutralisirt, n die Lauge sehr alkalisch sein sollte, mit Weinsäurelösung und läßt zur Krystallisation verdunsten.

### 3) Kalibicarbonat.

Mit der im Vorhergehenden beschriebenen Darstellungsweise der neutralen weinsteinsäuren Salze kann Vorthail die von Kalibicarbonat verbunden werden, zwar mit Benutzung der von Wöhler zuerst gemachte Erfahrung, daß verkohlter Weinstein Kohlensäure mit grosser Begierde absorbirt. Man setzt nämlich ganze im Vorhergehenden beschriebene Vorrichtung eine grössere Schüssel mit flach aufsteigenden Wänden, set in diese um den eingesetzten Napfen herum kohligen Rückstand von etwa 12 Pfd. gebranntem nigtem Weinstein oder besser von einer eingetrocknet und dann verkohlten Mischung aus  $4\frac{1}{2}$  Pfd. gereinigtem Pottaschenkali, 6 Pfd. Wasser und  $1\frac{1}{2}$  Pfd. Stärkemehl und überdeckt endlich das Ganze mit einem grösseren tieferen Napfen oder mit einem ähnlich geformten Sturz aus verzinnem Eisenblech. Die Fugen zwischen dem Rande des Sturzes und der Unterlage werden mit etwas Lehm verklebt. Nach etwa 36 Stunden wird der Sturz abgenommen, das kohlige Gemenge, des kohlensaures Kali durch Absorption des entwickelten Kohlensäuregases in zweifachkohlensaures Salz übergegangen ist, in einem grossen Filtrirtrichter ganz oder theilweise, je nach der Menge, mit gleichviel bis etwa  $50^{\circ}$  erhitztem Wasser übergossen und das Filtrat in einem kühlen Orte zum Erkalten hingestellt, wo der grösste Theil des zweifachkohlensauren Kalis herkrystallisirt. Die von den Krystallen abgegossene Mutterlauge wird in einer mit Papier bedeckten Schüssel in einen mässig warmen Ort zur weiteren Verdampfung und Krystallisation hingestellt.

### 4) Chemisch-reines kohlensaures Kali.

Dieses Präparat, dessen Darstellung bekanntlich nicht

ohne Schwierigkeit ist, stelle ich in folgender Weise dar. Eine beliebige Menge krystallisirtes einfach-kohlensaures Kali, wie man es so leicht durch Erkaltenlassen einer klaren heißen Lösung von kohlensaurem Kali von 1,45 bis 1,50 spec. Gew. erhält, wird in der doppelten Menge reinen Wassers gelöst, die Lösung filtrirt und mit einer ebenfalls filtrirten Lösung von unkristallisirter käuflicher Kleesäure neutralisirt. Man läßt die Flüssigkeit 24 Stunden ruhig stehen, filtrirt ab und verdampft endlich zur Krystallisation. Das krystallisirte neutrale kleesaure Kali wird in 4 Theile reinem Wasser gelöst und zu dieser Lösung, auf 1 Theile gelösten Salzes, 8 Th. in der doppelten Menge heißen Wassers gelöste Kleesäure zugefügt. Man läßt die Mischung unter fortwährendem Umrühren erkalten, sammelt das abgeschiedene zweifach-kleesaure Kali in einem Filter, läßt gut abtropfen, gießt das Filter von Neuem mit kaltem destillirten Wasser voll, läßt abtropfen und prüft das zuletzt Abtropfende auf Silberlösung. Sollte noch eine Trübung statt finden, was bei reinlichem Verfahren kaum noch nach dem ersten Aussüßen eintritt, so wiederholt man das Aussüßen mit destillirtem Wasser noch einmal. Man läßt hierauf das Salz trocken werden und verwandelt es endlich in kohlensaures Kali, durch allmähliches Erhitzen in einen glühenden Silber- oder Platintiegel. Durch die minutiöseste Untersuchung habe ich in diesem kohlensauren Kali nichts Fremdartiges entdecken können, auch kommt es bei dem gegenwärtigen so billigen Preise der Kleesäure keinesweges sehr hoch stehen. Die Mutterlauge des neutralen kleesauren Kalis kann durch Zusatz von Kleesäure auf Oxalium verwandelt werden.

##### 5) Chlorsaure Baryt.

Dieses Salz, welches von Fenerwerkliebhabern in Apotheken verlangt wird, wird am zweckmäßigsten, wie ich wenigstens nach vielen vergeblichen weitigen Versuchen überzeugt zu sein glaube, folgendermaßen dargestellt.

lassen bereitet. Man löst  $13\frac{1}{2}$  Th. chlorsaures Natron in der doppelten Menge Wassers auf, fügt dazu eine Auflösung von 19 Th. Weinsteinsäure in gleichviel Wasser und gießt nun das Ganze in ein Glas, worin sich doppeltes Volum alkoholisirten Weingeistes befindet. Man läßt 24 Stunden in gegenseitiger Berührung, filtrirt, neutralisirt das saure Filtrat mit reinem kohlensauren Baryt, welchen man vorher mit Wasser zu einer Milch angerührt hat, läßt den Weingeist verdunsten, wäscht dann von Neuem und dampft zur Krystallisation ab. — Der durch Weingeist bewirkte Niederschlag ist weinsteinsaures Natron, welches von Neuem zur Reinigung von chlorsaurem Natron dienen kann, indem man es in eine heisse Auflösung von 16 Theilen chlorsaurem Kali in der 4fachen Wassermenge einbringt, die Mischung erkalten läßt, filtrirt, den Inhalt des Filters mit etwas Wasser abspült und die Lösung bis auf 40 Theile verdunstet.

#### 6) *Basisch-salpetersaures Wismuthoxyd.*

Bei Befolgung des nachstehenden Verfahrens wird das Präparat in ausgezeichneter Schönheit und Reinheit gewonnen. Man wägt in ein passendes weitmündiges Glas 4 Theile reine Salpetersäure von 1,20, setzt einen durchlöcherten Filtrirtrichter von Porcellan so in das Glas ein, daß dessen Spitze etwa 2 Zoll in die Säure reicht, schüttet hierauf 1 Theil Wismuthmetall in bohrenlosen Stücken in den Trichter und läßt das Ganze an einem warmen Orte, wo die sich bildenden salpetersauren Dämpfe nicht lästig fallen, bis zur vollständigen Auflösung des Wismuthes stehen. Man verdünnt die Auflösung mit soviel Wasser, als sie, ohne zu werden, verträgt und filtrirt durch doppeltes Filterpapier. Man fügt hierauf zu dem Filtrat auf 1 Pfd. gelösten Metalles eine Unze Salpetersäure zu, läßt in einer Porcellanschale langsam verdunsten und durch Abkühlen krystallisiren. Die Krystalle läßt man in einem Filtrirtrichter abtropfen, löst sie von Neuem in 2 — 3



Theilen destillirtem Wasser mit Hülfe einer gelinden Erwärmung auf, filtrirt abermals, gießt die Auflösung unter Umrühren mit einem Glästab in 24 Th. heißes destillirtes Wasser, läßt absetzen, zieht mittelst eines Glashebers die klare Flüssigkeit ab, übergießt von Neuem mit destillirtem Wasser, läßt von Neuem absetzen u. s. w. Nach 3- bis 4maliger Erneuerung des Wassers sammelt man den Niederschlag auf einem Filter, läßt abtropfen, übergießt das Filter noch einige Male mit destillirtem Wasser und läßt es endlich zwischen zweifachem Fliesspapier auf einem Ziegelsteine vollständig austrocknen. Der Niederschlag beträgt nahe soviel, als man Metall angewandt, und ist vollkommen arsenfrei, wenn auch das verwandte Metall arsenhaltig war, indem das Arsen als arsenigsaures Wismuthoxyd beim Filtriren der von freier Salpetersäure freien salpetersauren Wismuthoxydlösung zurückgeblieben ist.

#### 7) Essigsäure Eisenoxydflüssigkeit.

Die unlängst von Bette mitgetheilte Bereitungsweise dieses Präparats läßt zwar rücksichtlich des Gelingens der Operation und der Güte des Mittels nichts zu wünschen übrig, führt aber doch den Uebelstand mit sich, daß sie durch Erforderniß einer an sich nicht officinellen Eisenverbindung die Arbeit etwas complicirt. Ich habe mich aber überzeugt, daß man mit Anwendung des officinellen *Liq. ferri muriat. oxydati* eben seinen Zweck vollkommen erreicht, wenn man nur die Bildung eines basischen Salzes verhindert, denn nur in einem solchen, nicht aber in vorhandenem Alkali, ist die Ursache der zuweiligen Unlöslichkeit des Eisenniederschlages in Essigsäure; sogar das basische saure Eisenoxyd, welches beim Erhitzen einer gelinden Auflösung von essigsaurem Natron und einem Eisenoxydsalze sich abscheidet, wird von concentrirtem Essig nur höchst unvollkommen wieder aufgelöst. Löse 9 Theile gereinigtes kohlensaures Natron in 20fachen Menge kaltem Wasser, gieße dazu natu-

ren mit einem Glasstabe 6 Theile Eisenchloridlösung 1,5 spec. Gew., welche man mit gleichviel Wasser dünnt hat, lasse absetzen, ziehe die klare Flüssigkeit mittel eines Glashebers ab und giesse endlich das Dicke ein genähtes Seihetuch von dichter weißer Leinwand. trübe Flüssigkeit wird so oft zurückgegossen, bis endlich klar abläuft. Man läßt hierauf abtropfen, wäscht den Rückstand einige Male mit destillirtem Wasser aus und läßt ihn endlich auf einem Ziegelsteine ohne Anwendung künstlicher Wärme so weit austrocknen, bis sein Gewicht nur noch etwa 8 Theile beträgt. Das gewonnene feuchte Eisenoxydhydrat wird nun in einem passenden Gefäße mit vier Theilen concentrirtem Salpetersäure übergossen, das Ganze mit einem Glasstabe umgerührt und bis zur vollständigen Auflösung kalt digerirt. — Man erhält eine vollkommen klare, dunkelbraunrothe Flüssigkeit, deren spec. Gew. 1,12 beträgt und welche metallisches Eisen in Auflösung enthält, denn 1 Th. metallisches Eisen giebt genau 6 Th. *Liq. ferri muriat.* *liquida* von 1,5.

*Ammoniakalisches schwarzes Quecksilberoxydul.*  
(*Hydrargyrum oxydulatum nigrum Ph. Bor.*)

Jeder pharmaceutische Practiker wird mir gewiß beistimmen, daß es sehr schwierig ist, nach den besten Vorschriften auch bei Anwendung der größten Vorsicht dieses Präparat stets von zufriedenstellender Reinheit und in belohnender Ausbeute zu gewinnen. Es ist daher sehr erfreulich, im Nachstehenden ein Verfahren mittheilen und zur Prüfung vorlegen zu können, nach welchem der sogenannte *Mercurius solubilis* nicht nur in reichlicher Menge, im Verhältniß zu den angewandten Materialien, sondern auch mit allen erforderlichen Eigenschaften in Bezug auf das äußere Ansehen eine constante Zusammensetzung gewonnen werden kann.

Man vermischt in einem passenden Präcipitirglase 1 Theil geistigen ätzenden Salmiakgeist (*Liq. Ammonii caustici Dzondi*) mit 12 Theilen höchst rectificirtem



Weingeist und setzt zu dieser Mischung unter Umrühren mit einem Glasstabe soviel salpetersaure Quecksilberoxydullösung (*Ph. Bor.*) zu, bis die Flüssigkeit auf Lackmuspapier schwach sauer reagiert. Man sammelt den Niederschlag auf einem Filter, süßt ihn nach Abfluß der geistigen Flüssigkeit einige Male mit destillirtem Wasser aus und trocknet ihn endlich zwischen Fließpapier an einem mäßig warmen Orte. Der trockne Niederschlag beträgt etwas mehr, als man Quecksilberarbeit genommen, ist vollkommen schwarz, giebt in verdünnte kalte Salzsäure nichts ab und gab in 3 Versuchen 88,75, 88,9, 89,5 Proc. Quecksilberoxyd zu erkennen. — Die geistige abfiltrirte saure Flüssigkeit kann mit etwas Aetzkali vollends ausgefällt, dann abfiltrirt und abdestillirt werden, und das geistige Destillat bei der nächsten Bereitung anstatt reinen Weingeistes zur Verdünnung des Aetzammoniaks angewandt werden.

9) *Reines Quecksilberoxydul. (Hydrargyrum oxydulatum purum Ph. Bor.)*

Das im Vorhergehenden bei der Bereitung des genannten anflöslichen Quecksilbers befolgte Princip läßt sich auch auf das reine Quecksilberoxydul, welches so schwierig frei von Oxyd gewonnen werden kann, anzuwenden versucht und ein sehr zufrieden stellendes Resultat erhalten. Man vermischt 1 Theil Aetzkali mit 12 Theilen alkoholisirtem Weingeist, läßt absetzen, gießt dann  $\frac{1}{2}$  in ein passendes Präcipitirglas klar ab, trägt unter fortdauerndem Umrühren mit einem Glasstabe salpetersaure Quecksilberoxydullösung bis zum schwachen Vorwalten der Säure ein und gießt das zurückbehaltene letzte Zwölftel von der alkalischen Lösung zu. Man läßt absetzen, sammelt den Niederschlag in einem Filter, süßt ihn nach Abfluß des Weingeistes mit destillirtem Wasser gut aus und trocknet ihn zwischen Fließpapier in gelinder Wärme. Das trockne Pulver ist schwarz, besitzt aber, mit dem Vorhergehenden verglichen, einen kleinen Stich ins Blau.

braune, ist in concentrirtem Essig vollkommen löslich und giebt an verdünnte reine Salzsäure nichts ab. In beiden Erscheinungen finden nicht mehr vollständig statt, wenn das Präparat eine Zeitlang dem Einflusse des Lichtes bloßgegeben war.

#### 10) Weisses Präcipitat.

Wöhler, Liebig und neuerdings Geiseler haben darauf aufmerksam gemacht, daß die von Noël und Jørgensen untersuchte Verbindung, welche mittelst Aetzkohlensäure erhalten wird, etwas anders sein mußte, als das officinelle Präparat der Preussischen Pharmakopöe, welches man durch Fällung von Alembrothsaltz mittelst kohlensauren Natrons gewinnt. In der That, während das letztere Präparat beim Erhitzen im Glaskölbchen sich so leicht verflüchtigt und aufsublimirt, ohne die mindeste Spur von Schmelzung zu geben, schmilzt das letztere bei dem Versuche zu einem dünnflüssigen Liquidum von schwach gelblicher Farbe, welches sich nur schwierig aufsublimiren läßt, indem das Sublimat immer wieder zurückfließt. Das gut ausgesüßte und anhaltend bei 100° C. getrocknete Präparat verlor beim Erhitzen bis 135° im Wasserbade nichts an Gewicht; im Chlorzinkbade weiter erhitzt, entwickelt es bei 180° Ammoniak und hinterläßt ein weißes Sublimat, bei ungefähr 300° schmolz es zu einem gelblichen Liquidum.

100 Gran von diesem weissen Präcipitat wurden in concentrirtem Essig gelöst, dazu so lange von einer verdünnten essigs. Silberoxydlösung zugesetzt, als noch eine Trübung entstand, der Niederschlag dann gesammelt, sorgfältig ausgesüßt, getrocknet und in einem tarirten Cellantiegel geschmolzen. Der erkaltete Tiegel hatte 5 Gr. an Gewicht zugenommen. Die vom Chlorsilber abfiltrirte Flüssigkeit wurde mit verdünnter reiner Salzsäure vermischt, von neuem filtrirt und dann in einem verschließbaren Glase durch Schwefelwasserstoffgas zersetzt. Nachdem das Schwefelquecksilber sich abgelagert hatte, wurde die klare Flüssigkeit abgegös-

sen, das Schwefelquecksilber in einem gewogenen Filtrum gesammelt, ausgesüßt und in gelinder Wärme getrocknet. Die Menge desselben betrug 80,75 Gran. Die vom Schwefelquecksilber getrennte Lösung wurde mit Sorgfalt concentrirt und endlich der Ammoniakgehalt derselben in üblicher Weise in Ammoniumplatinchlorid verwandelt. Letzteres betrug 51,8 Gran. — Die Ergebnisse dieser Versuche sind demnach:

|                       |                     |                    |                |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| 98,50 Chlorsilber     | = 24,2999 Chlor     | = 6Cl              | 1327,95 24,355 |
| 80,75 Schwefelquecks. | = 69,474 Quecksilb. | = 3Hg              | 3797,46 69,474 |
| 51,80 Amm.-Platinchl. | = 3,929 Amm.        | = 2NH <sub>3</sub> | 214,47 3,929   |
| Verlust oder Wasser   | = 1,598             | = H <sub>2</sub> O | 112,18 1,598   |

5452,36 99,95

Dafs dieses Wasser als solches in der Verbindung enthalten sei, halte ich für nicht wohl wahrscheinlich, ich glaube vielmehr, dafs die Zusammensetzung denselben den stöchiometrischen Verhältnissen  $2\text{Hg Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{N}^3\text{H}_3\text{Cl}_2$  entsprechen dürfte. Jedenfalls ist sie aber von der unschmelzbaren Verbindung verschieden, welche gegen 10 Proc. Quecksilber mehr enthält, und es darf daher der gesetzlichen Vorschrift nicht ferner die mit Anwendung von Aetzammoniak substituiert werden, was bis dahin wohl hin und wieder geschehen, um das beschwerliche anhaltende Aussüßen zu umgehen. Man erhält übrigens dasselbe schmelzbare Präparat, wenn man kohlens. Ammoniak anstatt des kohlens. Natrons zur Fällung anwendet, vorausgesetzt nämlich, dafs man die Salmiaklösung mit der vorgeschriebenen Menge Salmiakauflösung bereitet, denn kohlens. Ammoniak allein giebt kein anderes Resultat als Aetzammoniak und es spielt demnach bei der Bildung des officiellen weifsen Precipitats der Salmiak und die Kohlensäure beide eine wesentliche Rolle, nicht aber das Natron. Die Anwendung des Salmiaks erleichtert übrigens sehr die Auflösung des Sublimats, welche von selbst vor sich geht, wenn man die Salmiakauflösung in ein passendes Gefäß gießt, in dieses einen Filtrirtrichter einsetzt, welchen einige Zoll in die Flüssigkeit taucht und nun den Sublimat in Stücken in den Trichter schüttet.

wenn  
gießt,  
einige Z  
1:  
grüne

## 11) Essig.

Der käufliche Essig ist selten von solcher reinen Beschaffenheit, um unmittelbar zur Darstellung der feincellulösen essigs. Präparate verwandt werden zu können, gewöhnlich enthält er noch vielen unveränderten Zucker, Gummi u. dgl. von dem angewendeten Malzweine oder Rohrzucker herrührend; es dürfte daher manchem Apotheker angenehm sein, ein Verfahren kennen zu lernen, mittelst welchem die Selbstbereitung eines reinen und guten Essigs in jeder grössern oder geringern Quantität, je nach dem Erforderniss des Geschäftes, ohne grosse Anlagen möglich ist. Die üblichen Vorschriften zur Bereitung eines reinen Weingeistessigs bieten kein solches Verfahren dar, da sie ein complicirtes System von 3 bis 4 und mehreren Bildern erfordern, deren Production das Bedürfniss eines reinen pharmaceutischen Geschäftes übersteigt, und deren Aufstellung auch die beschränkte Localität eines pharmaceutischen Laboratoriums meistens entgegenstehen dürfte. Ein die obigen Vortheile einschliessendes Essigbereitungsverfahren ist aber folgendes.

Man stellt in einem Local, welches entweder direct oder indirect zweckmässig erwärmt werden kann, ein (oder nach Bedürfniss mehrere) eichenes Fass 5½ Fuss hoch, oben 3½ unter 3 Fuss weit, auf eine etwa 1 Fuss hohe Unterlage; 15 Zoll vom Boden des Fasses aufwärts befinden sich in der Peripherie eines horizontalen Kreises 20 bis 24 runde Löcher, von ½ bis ¾ Zoll Durchmesser, in gleicher Entfernung von einander, und etwas schräg einwärts gebohrt. Einen Zoll über dem Boden aufwärts ist ein hölzerner Hahn angebracht. Ein Zoll vom obern Rande ist im Innern ein Reif von Eichenholz eingelegt, welcher genau an die Fasswände anschliesst und worauf ein Einlageboden von Eichenholz ruht, der von den Fasswänden etwa ½ Zoll absteht, welcher Zwischenraum mit Werg ausgestopft wird.

Einlageboden sind 4 bis 500 Löcher gebohrt von 1 Linie Durchmesser, jeder etwa 1½ Zoll von einander;



in einem jeden derselben ist der etwa 6 bis 8 Zoll lange obere Theil eines ausgekörnten Kornhalms eingezogen, so daß die Aehre hinausragt und die Löcher nur lose ausgefüllt werden. Sind die Halme sehr dünn, so kann man auch 2 bis 3 auf einmal einziehen. Außerdem werden noch in denselben Einlageboden, in Form eines Dreiecks, 3 grössere Löcher von etwa 2 Zoll Durchmesser gebohrt und in jedes derselben ein 3 bis 4 Zoll langes Stück Glasröhre (etwa von einem abgesprengten Retortenhals) eingepaßt, so daß dieselben sowohl unter als über dem Einlageboden hervorragen. Der Einlageboden selbst muß eine vollkommen wagerechte Lage haben; unterhalb desselben ist eine Oeffnung in das Fafs gebohrt, durch welche ein Thermometer horizontal eingeführt werden kann, um die Temperatur zu beobachten. Der ganze Zwischenraum zwischen dem untern Boden und dem Einlageboden wird mit Hobspänen von Buchenholz angefüllt, das Fafs (Essigbilder) selbst mit einem hölzernen Deckel, in dessen Mitte ein Loch für einen hölzernen Trichter eingebohrt ist, dicht verschlossen, und dessen Ansäuerung nun also ausgeführt.

Von drei Eimern (180 preuss. Quart.) des reinsten und stärksten Essigs, welcher durch Zusatz von concentrirtem Essig soweit verstärkt worden, daß dessen Säuregehalt 14 bis 15 Proc. beträgt, wird  $\frac{1}{4}$  in irdenen Töpfen fast siedend heiß gemacht und durch den hölzernen Trichter in den Bilder gegossen, hierauf in gleicher Weise das 2., 3. und 4. Viertel; der aufgegossene Essig wird wieder abgelassen und die Operation mit dem abgeflossenen so oft wiederholt, bis bei einer äußern Temperatur zwischen 18 und 20° R. die Temperatur in dem Bilder 30° R. zeigt, was gewöhnlich am dritten Abende erreicht ist. Nun wird das Essigbilder bis zum Niveau des Hahnes vom Essig geleert, die Stärke des letztern geprüft und falls sie unterhalb 10 Proc. herabgesunken sein sollte, durch Zusatz von concentrirtem Essig bis auf diesen Punkt gebracht; hierauf Abends 7 Uhr 45 Quart von dem



ig, nachdem er bis auf  $40^{\circ}$  R. erwärmt, in das Faß rückgegeben; dann 15 andere Quart, mit ebensoviel Wasser von  $50^{\circ}$  R. und  $1\frac{1}{2}$  Quart Weingeist von 80 Proc. gemischt, die Mischung ebenfalls aufgegossen und Ganze bis zum andern Morgen früh 6 Uhr in Ruhe gelassen. Um diese Zeit werden aus dem Essigbilder 10 Quart Essigkeit abgelassen und wieder aufgegossen, und also 4 Stunden bis Nachmittags 5 Uhr fortgeföhren. Um diese Zeit wird zu den abgelassenen 10 Quart  $\frac{1}{2}$  Quart Weingeist von 80  $\%$  Tr. zugesetzt, und eben so um 6 Uhr. Nun verbleibt alles wieder in Ruhe bis zum nächsten Tage früh 6 Uhr, wo mit dem Ablassen und Wiederaufgießen von neuem begonnen und bis Abends 5 Uhr fortgeföhren wird; um diese Zeit wird das Maßen des ersten Abends wiederholt, d. h. 15 Quart Essig abgelassen, mit eben so viel warmem Wasser gemischt, und  $1\frac{1}{2}$  Quart Weingeist zugesetzt, und endlich das Ganze in den Bilder gegossen. Den nächsten oder dritten Tag wird wie am ersten verfahren, am vierten endlich Abends 30 Quart fertiger Essig abgenommen, und der Cyklus von neuem begonnen, so daß demnach immer der stärksten Essigs stets als Bestand in dem Bilder verbleibt und aus letzterem durch Aufwand von 10 Quart Wasser und 6 Quart Weingeist von 80  $\%$  Tr. vier Tage gegen 30 Quart Essig von 10 Proc. Gewonnen werden. Erforderlich ist es übrigens zum Fortgange der Operation, daß die Temperatur in den Bilder früh Morgens beim Beginnen einer jeden neuen Periode nie unter  $28^{\circ}$  R. sich befinde, der Gehalt des Essigs nie unter 9 Proc. herabsinke, der Bilder einen stark und angenehm sauren Geruch aushauche und ein lebhaftes Zuströmen von atmosphärischer Luft in denselben statt finde. Das Erstere erkennt man mittelst eines Thermometers, das Zweite durch zeitweilige Prüfung der Sättigungscapacität, das Dritte durch Hineinsetzen in die Oeffnung, welche zum Einsetzen des Thermometers dient, das Vierte endlich, indem man eine brennende Kerze an eine der unteren Oeffnungen hält,

wo dann bei gutem Luftzuge die Flamme in die Öffnung abgelenkt wird.

Der also gewonnene Essig ist farblos und enthält ausser Essigsäure und den etwaigen wenigen salzigen Bestandtheilen des angewandten Wassers nur geringe Spuren unveränderten Weingeists, Aldehyds und Acetals. Diese beiden letzteren Stoffe sind auch die Ursache, dass die farblose Flüssigkeit, welche man durch Neutralisation des Essigs mit irgend einem kohlensauren Alkali erhält, beim Verdunsten sich bräunt. Digerirt man den Essig vorher mit feingepulvertem Braunstein, neutralisirt dann, so erhält man beim Verdunsten ein ziemlich weisses Salz, welches ohne weiteres zur Gewinnung von concentrirtem Essig und Essigäther verwandt werden kann. Bringt man das Salz in feurigem Fluss, löst dann neuem in Wasser auf und filtrirt, so ist das nun durch Verdunsten und Eintrocknen oder Krystallisiren gewonnene Salz vollkommen weis.

## Ueber schwefelsaures Kali-Eisenoxyd;

von  
W. Richter.

Man erhält dieses Doppelsalz, wenn beide Salze mit einander vermischt und zur Krystallisation abgedampft werden.

Folgendes Verfahren fand ich am geeigneten. Man übergießt einen Theil trocknes Eisenoxydhydrat mit einem Theil Wasser, rührt es wohl untereinander und setzt hierauf 2 Theile Vitriolöl hinzu. Die erhaltene Salzmasse löst man in genugsamen kaltem Wasser auf und filtrirt. Das Filtrat wird durch Verpfeifen der überflüssigen Feuchtigkeit bis auf 16 bis 18 Gewichtstheile eingeeengt und nun noch kochend mit einem Theile schwefels. Kali versetzt, welches letztere sich alsbald in der schwefels. Eisenoxydlauge auflöst. Nachdem alles gelöst, wird das Feuer sofort entfernt und das Ganze zum Krystallisiren hingelassen.

Vill man aber dieses Doppelsalz aus dem wohl-  
 en *Colcathar Vitrioli* machen, so verfährt man fol-  
 maßen: Man nimmt erwähnten Colcathar einen  
 und übergießt denselben mit einem Theile Was-  
 führt wohl um und gießt unter Umrühren 2 Theile  
 löf dazu. Nach geschehener Einwirkung bringt  
 as Ganze über Feuer, erhitzt und setzt, wenn  
 Salzmasse gestehen will, kleine Portionen Was-  
 und fährt so lange fort zu erhitzen und Was-  
 zusetzen, bis man sieht, daß die Schwefelsäure  
 senoxyd weiter aufzulösen vermag. Hierauf löst  
 ie Salzmasse in kaltem Wasser, filtrirt und ver-  
 wie schon angegeben.

beiden Fällen werden regelmässige Octaeder er-  
 mit einem schwachen Stich in das Amethystfar-  
 Mit der Zeit belegen sie sich mit einem weissen  
 wie der gewöhnliche Alaun.

gt man aber die schwefels. Eisenoxydlauge auf  
 ichtstheile ein, bevor man das schwefels. Kali  
 igt, so wird eine kleine Menge eines gelbgrün-  
 krystallinischen Niederschlags gebildet, nach  
 ügung der angegebenen Menge an schwefelsäu-  
 ali. Läßt man nun das Ganze bei niederer Tem-  
 und trockner Luft einige Tage stehen, so schießt  
 z in sehr großen schwach amethystfarbenen fast  
 igen Krystallen an, wobei der gelbe krystallini-  
 iederschlag wieder verzehrt wird. Dieselbe Er-  
 ng ging aber auch vor sich, als ich regelmässige  
 er des Eisenoxydalauns über Feuer in einigem  
 auflöste.

zu wissen, ob das Salz in großen Krystallen,  
 lz mit anderem Wassergehalt sei, als der ge-  
 he Eisenoxydalaun; und um zu wissen, ob der gelb-  
 he krystallinische Niederschlag weiter nichts sei,  
 $\text{S} + \text{F} \text{S}_2$ , nach Maus, habe ich folgende zwei  
 en vorgenommen.

Das Salz in großen Krystallen gab folgendes  
 t:



|       |            |                                                                            |       |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1,595 | des Salzes | gaben mit Ammoniak zersetzt an ausgeglühtem Oxyd .....                     | 0,237 |
| 1,595 | »          | » an ausgeglühtem schwefels. Kali.                                         | 0,305 |
| 1,544 | »          | » mit salzs. Baryt zersetzt an ausgeglühtem schwefels. Baryt .....         | 1,390 |
| 1,566 | »          | » nach Austreibung des Krystallisations-Wassers an wasserleerem Salz ..... | 0,894 |

Es betragen nun:

|       |                  |               |      |                 |
|-------|------------------|---------------|------|-----------------|
| 0,237 | Eisenoxyd        | in Hundert... | 14,9 | an Eisenoxyd    |
| 0,305 | schwefels. Kali  | »             | 10,3 | » Kali          |
| 1,390 | schwefels. Baryt | »             | 30,9 | » Schwefelsäure |
| 0,894 | trocknes Salz    | »             | 43,5 | » Wasser        |
|       |                  |               | 00,4 | (als Verlust)   |
|       |                  |               | 100. |                 |

2) Das Salz als der gelbgrünliche krystallinische Niederschlag. Der Niederschlag wurde zuvor, ~~da er~~ zur Untersuchung genommen, unter der Mutterlauge fein zerrieben, hierauf schnell abgewaschen und durch Pressen zwischen Fließpapier von aller anhängenden Feuchtigkeit befreit, er gab folgendes Resultat:

|       |                                                                                                                                      |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1,536 | in vielem salzsäurehaltigen Wasser gelöst und mit Ammoniak zersetzt, gab an ausgeglühtem Eisenoxyd                                   | 1,31  |
| 1,536 | gab nach Abscheidung des Eisenoxydes, Verdampfung und in einer Atmosphäre von kohlens. Ammoniak ausgeglüht, an schwefels. Kali ..... | 0,305 |
| 1,086 | gab mit salzs. Baryt zersetzt an ausgeglühtem schwefels. Baryt .....                                                                 | 1,390 |

Der Wassergehalt liefs sich nicht mit einiger Sicherheit über Feuer bestimmen, indem das Salz bei Schwefelsäure fahren liefs. Es betragen also:

|       |                   |              |      |                 |
|-------|-------------------|--------------|------|-----------------|
| 0,331 | Eisenoxyd         | in Hundert.. | 21,5 | an Eisenoxyd    |
| 0,633 | schwefels. Kali   | »            | 22,2 | » Kali          |
| 1,331 | schwefels. Baryt  | »            | 42,1 | » Schwefelsäure |
|       | als Verlust ..... |              | 14,2 | » Wasser        |
|       |                   |              | 100. |                 |

Aus diesen Untersuchungen folgere ich, daß das Salz in grossen Krystallen auch weiter nichts als gewöhnlicher Eisenoxydalaun, sowie der gelbgrünliche Niederschlag das gelbbraune Salz nach Mau-

erkenntwerth erscheint mir aber der Umstand, daß Eisenoxydalaun die Eigenschaft besitzt, sowohl bei dem Schmelzen in seinem Krystallisationswasser, als bei Auflösung in kochendem Wasser, und bei zu weicher Einengung über seinen Krystallisationspunct hinaus, einen kleinen Theil an  $2 \text{ K } \ddot{\text{S}} + \ddot{\text{F}} \ddot{\text{S}}_2$  abzusetzen, während ein kleiner Theil an  $\ddot{\text{F}} \ddot{\text{S}}_4$  alle weitere Zersetzung verhindert und selbst sich nach einiger Zeit wieder dem  $2 \text{ K } \ddot{\text{S}} + \ddot{\text{F}} \ddot{\text{S}}_2$  zu Eisenoxydalaun verbindet.

## Ueber die Umwandlung des Calomels in Aetzsublimat;

von  
Mialhe.

Der Ausgangspunct meiner Versuche ist folgende von Vogel angeführte Thatsache. Ein Arzt hatte einem Kinde zwölf Pulver verschrieben, deren jedes 5 Gran Ammoniak, 5 Gran Zucker und  $\frac{1}{2}$  Gran Calomel enthielt; das Kind starb, nachdem es mehrere dieser Pulver eingenommen hatte, und der Apotheker wurde eines bei der Anfertigung des Receptes begangenen Fehlers angeklagt. Zum Glück für unsern Collegen war die Angelegenheit von kurzer Dauer, indem Pettenkofer alsbald entdeckte, daß Calomel bei Gegenwart von Wasser sich zum Theil in Aetzsublimat verwandelt. Diese Thatsache ist der Aufmerksamkeit der Aerzte und Physiologen sehr werth, es würde dieses nicht der Fall sein, wenn ein ausgezeichnete Chemiker unserer Schule Recht hätte; welcher behauptet, daß das Quecksilberchlorür nicht von den von den deutschen Chemikern angeführten Versuchen sich nicht in Quecksilberchlorid umwandle; er will nicht versuchen, die Quelle des Irrthums zu entdecken, in welchen unser gelehrter College verfallen ist. Ich will mich beschränken, die Resultate mitzutheilen, die aus meinen Versuchen fließen.

1) Das Quecksilberchlorür verwandelt sich bei Einwirkung von chlorwasserstoffs. Ammoniak oder Chlor-



kalium und Chlornatrium unter reinem Wasser Theil in Quecksilberchlorid und metallisches Quecksilber. Diese Umwandlung findet schon bei der Temperatur des menschlichen Körpers statt, selbst schon bei gewöhnlicher Temperatur, und erfordert nur einige Augenblicke, um vor sich gegangen zu sein. Nimmt z. B. etwas Calomel in den Mund, so empfindet schon nach einigen Minuten einen mercurialischen schmack, als Erfolg der gegenseitigen Einwirkung des Quecksilberchlorürs und der im Speichel enthaltenen Chlorüre.

2) Dieser Umwandlung des Calomels in Sublimat und metallisches Quecksilber durch das Chlorwasser und chlorwasserstoffs. Ammoniak, die in den Flüssigkeiten des Verdauungskanals sich finden, müssen pathologischen Erscheinungen der Quecksilbervergiftung zugeschrieben werden, wenn solche nach dem Einnehmen von Calomel auftreten.

3) Da sich nur eine geringe Menge der in den Flüssigkeiten des Verdauungskanals enthaltenen Calomels zu einer entsprechenden Quantität Aetzsublimat bilden kann, müssen solche Patienten, die eine Calomelkur brauchen, und dabei viel Kochsalz genießen, um so mehr Speichelfluss ausgesetzt sein.

4) Die antisyphilitischen Eigenschaften des Calomels sind wahrscheinlich ganz oder theilweise durch die Zersetzung in Sublimat und Quecksilber. Auch die anthelmintischen Eigenschaften des Calomels sind wahrscheinlich von dieser Zersetzung her, indem sowohl das Sublimat als auch das Quecksilber, die beiden genannten Producte derselben, eine Verdrängung der Ascariden bewirken, welche durch das übrige Verdauungsprodukt aus dem Körper abgeführt werden.

5) Was hier vom Quecksilberchlorür angeführt worden ist, gilt gleicherweise auch vom Quecksilberjodid, welches sich unter denselben Umständen in Quecksilberjodid verwandelt. (*Journ. de Pharmacie* XXIX,



Vierte Abtheilung.

**Mineralwässer.**

Chemische Untersuchung einiger Salz-  
quellen;

von

Dr. N. Gröger in Mühlhausen.

Die Salzquellen vermögen wohl jetzt nur noch ein besonderes wissenschaftliches Interesse zu erregen, da zahlreiche Untersuchungen derselben darthun haben, daß sie fast alle dieselben Bestandtheile, und auch oft in verschiedenen Verhältnissen enthalten und daß sie im Allgemeinen nur durch den Grad der Concentration von einander abweichen. Dennoch verdankt ihnen in neuerer Zeit die Wissenschaft außerordentlich viel, indem gerade sie es sind, welche, in der Verfolgung der materiellen Vorthelle, welche dem Menschen aus ihres Vorkommens zugeführt werden, nur auf die einfachste und naturgemäße Erklärung über die Entstehung der Mineralquellen im Allgemeinen gelehrt haben. Die vervielfältigten Bohrversuche haben nächst dem Bergbau unsere Kenntnisse über den Bau des Innern der Erde vielleicht am meisten bereichert.

Selbst der Bergbau ist, so viel mir bekannt, noch nicht endend bis zu der wahrhaft erstaunenswerthen Tiefe von 1646',5 Par. Fuß, so wie zu Eschingen bei Luxemburg, in das Erdinnere eingedrungen. (*Poggendorfs Annalen Bd. 48, pag. 382.*)

Es schien mir daher, als sei man einer jeden sol- chen Quelle eine Art von Dank schuldig, den man ihr durch eine chemische Untersuchung darbringen müsse, und dabei auf irgend eine Belohnung ihrerseits zu rechnen.

Dies sind die Motive, welche mich veranlaßt haben, die Untersuchung der in einer nicht zu großen

Entfernung von Mühlhausen liegenden Salzquellen zu beginnen.

*Die Salzquelle zu Sooden bei Allendorf an der Werra.*

Die Entstehung dieser Quelle ist vielleicht abhängig gewesen von dem Emporsteigen des mächtigen Basalt-pfeilers, welcher den Kern des nahen Meißners bildet, und welchem Friedr. Hoffmann auch die Hervorhebung des in dieser Gegend am linken Werranfer sich zeigenden ältern Flötzgebildes zuschreibt.

Wann sie zuerst aufgefunden wurde, ist in der Dunkel der Vorzeit gehüllt; einige glauben, daß ihr ihren Besitz der Streit zwischen den Katten und Hermunduren entstanden sei; in einer Urkunde vom Jahr 973 schenkt Kaiser Otto II. seiner Gemahlin mehr Güter so an der Werra gelegen, unter diesen auch ein Tutinsooda, welches hessische Geschichtsforscher für das heutige Sooden halten. Ums Jahr 1300 sind Privaten deren Besitzer, und scheinen es unbedingt bis zum Jahre 1558 geblieben zu sein. Um diese Zeit konnten aber die Pfänner (so nennt man die Besitzer der Salzkotten noch jetzt) die nöthige Menge Salz nicht mehr liefern, weshalb der damalige Landgraf von Hessen, Philipp der Großmüthige, mit ihnen einen Contract abschloß, wonach er für sich noch neue Kotten bauen sollte, sein Salzverkauf aber so beschränkt wurde, daß er nicht eher verkaufen durfte, bis die Pfänner das ihrige abgesetzt hatten. Dennoch entstanden Streitigkeiten, welche damit endeten, daß der Landgraf sämtliche Kotten in Pacht nahm. Gegenwärtig wird die Salzproduction für herrschaftliche Rechnung betrieben.

*Geognostische Beschaffenheit der Umgegend von Sooden*

Die Sooden liegen am linken Ufer der Werra, und sind durch diese von Allendorf getrennt. Nach mehreren barometrischen Höhenmessungen beträgt hier die Höhe des Werraspiegels über dem Meere 447,0 Par. Fuß. Die Berge, welche das linke Werranfer begrenzen,

en sich hier schroff emporsteigend über den Spie-  
der Werra noch um volle 600,0 Par. Fufs, und  
leihen hierdurch der Gegend ein äufserst romanti-  
sches Ansehen.

Sie sind durch das obenerwähnte kleine Kupfer-  
Grauwackenschiefergebirge gebildet, welches hier  
in nordwestlicher Richtung dem Laufe der Werra fol-  
gt auf einer Strecke von fast drei Meilen hervor-  
ragt. Die Berge des rechten Werraufers be-  
stehen aus buntem Sandstein, welcher von Muschelkalk  
bedeckt ist; sie erreichen theilweise, ebenfalls unter  
starkem Ansteigen, die ansehnliche Höhe von 1200  
bis 1700,0 Pariser Fufs, erheben sich also über die  
den Fufs bespülende Werra noch um 1200,0, was  
nicht wenig zur Erhöhung der Reize des hier so  
sehr schönen Werrathales beiträgt.

Die Werra aber scheidet hier überall die ältern  
Gebirgsgebilde des linken Werraufers von den jüngern  
des rechten, und nur der kleine Berg, welcher das  
Fels fürstenstein trägt, besteht, auf dem rechten Werra-  
ufer aus Grauwacke und Grauwackenschiefer, zugleich  
das nordwestlichste Ende der Bergreihe bildend, und  
an diese angepreßt, welche die Werra aus der  
Gegend von Eschwege her begleitet. Der Stofs des  
Felsers konnte, bedingt durch diese Verhältnisse, nicht  
die Grenzen der Gesteine einwirken, und da die  
Schichtung desselben zugleich der Schichtung des Grau-  
wackenschiefers parallel war, so mußte es ihm hier am  
leichtesten werden, die Gesteine zu durchbrechen, und  
so den Berg des Fürstensteins abzusondern.

Die Salzquelle von Sooden kommt aus dem bunten  
Sandstein, welcher hier auf Alpenkalk ruht. In jün-  
ger Zeit hat man nach dem Beispiele anderer Salinen  
hier Bohrversuche unternommen, um den Haupt-  
salzstock aufzufinden, was jedoch bis jetzt noch  
nicht der Fall gewesen zu sein scheint.

#### *Chemische Untersuchung.*

Das hiezu verwandte Wasser war nicht mehr in



seinem natürlichen Zustande, sondern bereits gradirt, welches mir aber erst bekannt wurde, als die Analyse beendet und ich im Begriff war, absichtlich das gradirte Wasser zu untersuchen, um daraus die Veränderungen kennen zu lernen, welche die Soole bei ihrer allmäligen Concentration erleidet.

Von vielleicht bereits vorhandenen früheren Untersuchungen ist mir nur die des Hrn. Professors Wöhler bekannt geworden, deren Einsicht ich meinem hochverehrten Freunde, dem Hrn. Dr. Schreiber in Eschwege verdanke. Hr. Professor Wöhler scheint übrigens ebenfalls eine gradirte Soole zu seiner Analyse verwandt zu haben. Diese giebt die Menge der festen Bestandtheile in 1000 Theilen zu 45,1215, die meinige zu 45,435. Das untersuchte Wasser war vollkommen farb- und geruchlos und hatte bei 4,1° C. ein spec. Gew. von 1,0332.

Lackmuspapier wurde nur wenig geröthet; beim Kochen entwickelten sich nur geringe Mengen von Gas und fiel nur wenig Kalk nieder. Der sonstige Gang der Analyse war der gewöhnliche; speciell wurde das Wasser noch auf Jod, Brom und Flußsäure untersucht, doch nur vom zweiten Körper kleine Mengen aufgefunden.

Folgendes sind die Resultate, welche Hr. Professor Wöhler erhalten hat, neben welche ich die meinigen zu stellen mir erlaubt habe; eine Vergleichung bestätigt noch mehr das oben Gesagte.

1000 Theile Wasser erhalten nach

|                    | Hrn. Pr. Wöhler's Analyse | meiner Analyse |
|--------------------|---------------------------|----------------|
| Chlornatrium.....  | 37,5100                   | 37,537         |
| Chlorcalcium.....  | 2,4220                    | 2,234          |
| Chlormagnesium..   | 1,0320                    | 1,249          |
| Schwefels. Kali... |                           | 0,336          |
| "      Natron      | 3,8415                    | 3,829          |
| Kohlens. Kalk....  | 0,3160                    | 0,250          |
| Wasser .....       | 954,8785                  | 954,841        |
|                    | 1000,0                    | 1000,0         |



Zur Vervollständigung dieser Arbeit habe ich mir noch natürliches Quellwasser verschafft, um Gehalt an festen Bestandtheilen in diesem Zustande kennen zu lernen. 1000 Theile lieferten nach dem Versteinen und längerem Erhitzen, bis alles Verknistern hörte 45,362; es ist also demnach oben untersuchtes natürliches Quellwasser, und nur ein Versehen in der Zeichnung hat jenen Irrthum veranlaßt.

Schon seit langer Zeit besteht in Sooden eine Fabrik von kohlens. Talkerde, welche diesen Körper von züglicher Güte liefert; seit einigen Jahren wird auch schwefelsaures Natron dargestellt; und die Salzquelle zum Baden benutzt. Hierbei ist nur zu bedauern, daß Seitens der Behörden nicht für ein besseres Verkommen und größere Bequemlichkeit für die Badenden gesorgt wird, und daß nicht wenigstens einige Bäder in den benachbarten Hainen angelegt werden.

—•••••—

### Vorschläge zur Darstellung nachgebildeter Mineralwässer, namentlich einiger Thermen; vom Apotheker *Venghaus* in Rahden.

Indem ich es mir erlaube, in Umrissen einige Vorschläge zu begründen und zu entwickeln, auf eine leichte Weise einige Mineralwässer nachzubilden, deren Ruf historisch ist, würde es mich zu weit führen, wollte ich einleitend die Streitfrage näher erörtern, ob eine solche Nachbildung überhaupt möglich sei, was gewichene Autoritäten, unter andern Kastner, Döbereiner, Berzelius, Orfila, Vauquelin, Caven-  
ton u. A. geradezu in Abrede stellen. Daß es dem Arzte, wie dem Leiden, höchst erwünscht sein müsse, an seinem Wohnorte einen Ersatz für natürliche Heilquellen finden zu können, wenn unbesiegbare Hindernisse einer Reise zu denselben entgegenstehen, ist indess allgemein anerkannt, daß die Benutzung bestehender Trinkanstalten künstlicher Mineralwässer, namentlich der Struve-Soltmann's-

schen, höchst segensreiche Erfolge gehabt hat, unwiderlegbar erwiesen. Möge es für uns hinreichen, wenn hochstehende vaterländische Aerzte, die Herren Geh. Medicinalräthe Horn und Koenen, öffentlich sich dahin aussprachen, »dafs sie mit dem Erfolge der methodischen, mit einer geregelten Brunnendiät verbundenen, Anwendung der künstlichen Mineralwässer sehr zufrieden seien, dafs sie Ursache haben, diese zu den wirksamsten Mitteln unsers Arzneischatzes zu rechnen, und dafs die Anwendung der künstlichen Mineralwässer eine Bereicherung der Kunst sei, die wir in ihrer Ausdehnung und Vervollkommnung sehr hochschätzen müssen.«

Sind aber solchergestalt die künstlichen Mineralwässer als Arzneimittel anzusehen, so gehört ihre Darstellung unbezweifelt vor das Forum des Apothekers, und mufs es deshalb Gegenstand unsers Nachdenkens und Studiums sein, eine Darstellungsweise ausfindig zu machen, die geeignet ist, überall, zu jeder Zeit, im Grossen wie im Kleinen Anwendung finden zu können, da die grofsartigen Trinkanstalten, so erfolgreich auch ihre Wirksamkeit ist, doch nicht jedem Leidenden zugänglich sind, dem ihre Benutzung von seinem Arzte empfohlen werden sollte. Zur Begründung meiner Ansicht von der Ausführbarkeit einer leichten Darstellungsmethode zu dem oben angedeutenden Zwecke will ich zuerst auf die schönen Arbeiten Struve's hinweisen, welche eine Nachahmung des Processes der Natur im Kleinen bezweckten, indem derselbe Klingstein, Basalt, Feldspathporphyr, Gneifs, Granit und Thonschiefer mit kohlensaurem Wasser behandelte, und so Präparate erhielt, deren Analyse die qualitativ übereinstimmenden Bestandtheile derjenigen Mineralwässer nachwies, welche aus jenen Gebirgsarten zu Tage kommen. Diese Resultate geben uns wohl eine Vorstellung von der unterirdischen Bildung jener Mineralwässer, die noch deutlicher wird, wenn wir G. Bischof's Nachweisungen berücksichtigen (in dessen Werke *über die vulkanischen Mineralwässer*), welche ergeben, dafs die natronhaltigen Quellen Deutsch-

Es findet sich nur in der Nähe der vulkanischen Bergzüge des-  
 sen vorkommen, was sich aus dem reichen Verzeich-  
 nisse solcher Quellen in der Nähe des Laacher Sees,  
 Siebengebirges, Westerwaldes, Taunus, Habichts-  
 ldes, Meißners, Vogelgebirges, des Rhön, des Fich-  
 gebirges, Erzgebirges, Böhmisches Mittelgebirges, Rie-  
 gebirges, und, als Anhang, der Auvergne, Vivarais und  
 Pyrenäen ergibt. Freiherr von Berzelius zeigt  
 seiner Untersuchung der Quellen von Carlsbad, daß  
 Bestandtheile der warmen, natronhaltigen Quellen  
 in Frankreich und Böhmens in einem ursächlichen Ver-  
 hältnisse zu den, in jenen Gegenden wirksam gewesenen,  
 jetzt ruhenden Vulkanen stehen müßten, deren unver-  
 leugbare Beweise jene Gegenden enthalten, und auf die-  
 ses Verhältniß und den Zusammenhang der Forma-  
 tion der Berge um Ehrenbreitstein mit dem an Mine-  
 quenellen so reichen Taunusgebirge gründet sich nach  
 Leopold von Buch's Gutachten der Versuch, in der  
 Gegend von Ehrenbreitstein warme Quellen zu erbohren.  
 Läßt sich demnach eine Verwandtschaft in Ursprung  
 und Gehalt mancher weit von einander entfernten Mine-  
 quenellen nicht verkennen, so wird es auch aus man-  
 chen Erscheinungen nicht unwahrscheinlich, daß eine  
 unterirdische Verbindung der Werkstätten, worin die  
 warmen jene Quellen bereitet, statt findet, und daß die  
 Temperatur derselben von vulkanischen Einflüssen abhän-  
 ge. Wie nun dieser unterirdische Zusammenhang  
 stattfindet, welche die Ursachen sind, die den einen Quell  
 zu einem andern, in seinen Bestandtheilen diesem nahe  
 verwandten, warm oder heiß zu Tage kommen lassen,  
 ist schwer mit Gewißheit zu ermitteln sein, wohl  
 aber dürfen wir in der statt findenden Verwandtschaft  
 unserer Mineralwässer hinsichtlich ihres Ursprungs und  
 Inhalts ein Mittel aufsuchen, Mineralwässer künstlich  
 nachzubilden, indem wir eins derselben in ein anderes  
 verwandeln, welche Idee schon der verstorbene Klap-  
 roth anregte und welcher Meinung sich auch G. Bischof  
 schloß, indem er zur Nachbildung des Marienbader

Kreuzbrunnens aus dem Roisdorfer Mineralwasser Ableitung gab; z. vergl. dessen *Schrift über die Mineralquellen zu Roisdorf*, pag. 101. seq.

Vorzugsweise sind es nun mehrere natronhaltige warme und kalte Mineralwässer, welche der Nachbildung unterzogen werden können, die eines Theils so häufig in Gebrauch gezogen werden, als sie uns andern Theils so fern liegen, daß der Gebrauch derselben an ihren Quellen Manchem sehr erschwert wird, und diese Entfernung den Preis der versendbaren unverhältnißmäßig erhöht.

Zu diesen letzteren gehört der

*Marienbader Kreuzbrunnen.*

G. Bischof empfiehlt, zu 18000 Gran Roisdorfer Wasser, das sich bekanntlich unbeschadet seiner Wirksamkeit und seines Gehalts gut versenden läßt, 2,7 Gran wasserfreies kohlen-saures Natron, 81 Gran wasserfreies Glaubersalz und 4,5 Gran kohlen-saure Kalkerde zu setzen, um ein dem Kreuzbrunnen sehr ähnliches Wasser herzustellen.

Fügt man zu 10000 Gran Roisdorfer Wasser

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 1,423 Gran | wasserfreies kohlen-saures Natron, |
| 44,848 „   | „ schwefel-saures Natron,          |
| 2,402 „    | kohlen-sauren Kalk,                |
| 0,142 „    | kohlen-saures Eisenoxydul,         |
| 0,344 „    | Kieselerde,                        |

so enthalten

| 10000 Gran dieser Mischung:               | dagegen 10000 Gran Kreuzbrunnen: |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 9,288 Gran wasserfreies kohlen-s. Natron, | eben so viel,                    |
| 49,630 „ „ schwefel-s. Natron,            | eben so viel,                    |
| 19,0100 „ Kochsalz,                       | 17,661 Gran,                     |
| 5,123 „ kohlen-sauren Kalk,               | eben so viel,                    |
| 3,985 „ kohlen-saure Bittererde,          | 3,54 Gran,                       |
| 0,229 „ kohlen-saures Eisenoxydul,        | eben so viel,                    |
| 0,505 „ Kieselerde,                       | eben so viel,                    |

welche Zahlen so zusammenfallen, daß das Resultat beiderdigend erscheinen muß.

Daß in diesem so nachgebildeten Kreuzbrunnen kohlen-saure Lithion, Strontian u. s. w. fehlen, ist



nselben wohl nicht zum Vorwurfe gereichen, und  
gen in dieser Beziehung die Worte des berühmten  
deckers der seltneren Bestandtheile in den böhmischen  
neralwässern, Freiherrn von Berzelius, hier ihren  
tz finden (z. vergl. *Poggendorfs Annalen Bd. IV. S. 276*,  
ans in Bischof's oben citirten Werkchen) »Die Ge-  
wart von Lithion in den böhmischen Mineralwässern  
cht ihre künstliche Nachbildung außerordentlich  
uer, zumal, wenn z. B. kohlsaures Lithion in einer  
chen Menge zugesetzt werden sollte, wie in dem  
euzbrunnen vorhanden ist. Obgleich man keinen  
und zu der Vermuthung hat, daß Lithion darin irgend  
e andere medicinische Wirkung, als die übrigen kohlen-  
ren Salze von Natron, Kalk und Talkerde haben,  
kann man doch mit Sicherheit voraussehen, daß die  
vöhnliche Badekur-Charlatanerie eine besondere Auf-  
merksamkeit hierauf richten wird.« Ganz füglich dürfte  
h der geringe Zusatz von kohlsaurem Eisenoxydul  
erbleiben, und die geringe Differenz im Gehalte bei-  
Mineralwässer von diesem Bestandtheile um so mehr  
berücksichtigt gelassen werden, als es sehr in Frage  
stellt werden muß, ob der Eisengehalt in dem natür-  
en, versandten, und längere Zeit aufbewahrten Kreuz-  
nnen sich stets constant bleibe, wenigstens konnte  
u ve selten in dem versandten Wasser durch Reagen-  
erkennbare Spuren von Eisenoxydul auffinden. Auch  
Zusatz von der, medicinisch gewiß indifferenten,  
selerde dürfte ohne Nachtheil unterbleiben.

Wenn nun auch für manche Fälle eine solche Nach-  
lung des Marienbader Wassers wünschenswerth er-  
einen dürfte, so ist sie doch nicht unumgänglich nö-  
g, da nur erschwerter Bezug oder Kostspieligkeit der  
r von dem Gebrauche des versandten, natürlichen  
euzbrunnens abhalten kann, was auch von den vor-  
lich in Gebrauch gezogenen Heilwässern der Quel-  
in Pyrmont, denen von Selters, Kissingen, Dri-  
g, Wildungen, Eger und allen jenen gelten mag, die  
ch Versendung nicht in ihrer Wirksamkeit verlie-



ren, und kalt getrunken werden. Ganz anders verhält es sich indeß mit den Heilquellen, die so, wie sie waren oder heiß zu Tage kommen, getrunken werden müssen, sollen sie ihre ganze specifische Wirksamkeit auf den leidenden Organismus ausüben, welche häufig gerade durch die höhere Temperatur bedingt wird, so daß von der höheren oder geringeren Temperatur die mehr oder weniger energische Wirksamkeit der Heilwässer abhängt, weshalb es oft von der größten Wichtigkeit ist, daß dieselben eben so warm getrunken werden können, als sie die Natur zu Tage fördert. Es sind aber die warmen Heilwässer deshalb ungeeignet zum Versenden, weil schon während des Erhaltens derselben häufig eine Decomposition ihrer Bestandtheile erfolgt, die hauptsächlich durch Entweichung der Kohlensäure, noch größer werden würde, wollte man dieselben vor dem Genuß durch Erwärmung wieder auf ihre ursprüngliche Quelltemperatur zurückführen.

Vor allen sind es nun wohl die Carlsbader Thermen, die, unter den Heilquellen obenan stehend, schon seit den ältesten Zeiten ihren Gebrauch mit den glücklichsten Erfolgen krönten, und die deshalb den Wunsch, ihre Heilkräfte auch an Leidenden erproben zu können, denen eine Kur an den Quellen selbst versagt bleiben muß, natürlich rege machen.

Wie nun die Carlsbader Mineralquellen sowohl hinsichtlich ihrer Bestandtheile, als auch ihrer Wirkung auf den leidenden Organismus den Marienbader Heilquellen am nächsten stehen, weshalb letztere auch wohl ein kaltes Carlsbad genannt sind, so läßt sich das Carlsbader Wasser auch, gleich dem Kreuzbrunnen, aus dem Roisdorfer Sauerlinge nachbilden.

Der verstorbene Klaproth schon schlug vor, zu Nachbildung des Carlsbader Wassers auf 191 Gran Gabelsalz, 127 Gran kohlensaures Natron und 39 Gran Kochsalz ein Berliner Quart kochendes Wasser, und dazu ein Berliner Quart Selterser Wasser zu gießen. Genau schreibt G. Bischof vor, zu 5000 Gran Roisdorfer Wa-

in dessen freier Kohlensäure 1,5 Gran kohlensaures Kalk aufgelöst worden sind, 5000 Gran kochendes Wasser, in welchem 8,5 wasserfreies kohlensaures Natrium, 22,5 Gran wasserfreies schwefelsaures Natron und 10 Gran Kochsalz gelöst worden, zuzusetzen.

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Die so erhaltenen 10000 Gr.</b> | <b>dagegen 10000 Gr. Carls-</b> |
| <b>enthalten :</b>                 | <b>bader Sprudel :</b>          |

|                            |         |     |       |     |
|----------------------------|---------|-----|-------|-----|
| kohlensaures Natron.....   | 12,4327 | Gr. | 12,62 | Gr. |
| schwefelsaures Natron..... | 25,8911 | „   | 25,87 | „   |
| Kochsalz.....              | 10,5050 | „   | 10,38 | „   |
| kohlensauren Kalk .....    | 2,9106  | „   | 3,09  | „   |
| kohlensaure Talkerde.....  | 1,9927  | „   | 1,78  | „   |
| kohlensaures Eisenoxydul.. | 0,0438  | „   | 0,03  | „   |
| Thieselerde.....           | 0,0807  | „   | 0,75  | „   |

Nach Klaproth's Berechnung enthält das künstliche, aus Selterser Wasser durch Zumischung von kochendem Wasser bereitete, Carlsbader Wasser gerade so viel Kohlensäure, als das natürliche; das Roisdorfer Wasser übertrifft an Kohlensäuregehalt noch das Selterser, es wird also das, nach oben angeführter Zusammensetzung nachgebildete, Mineralwasser nahe so viel Kohlensäure enthalten, wie das natürliche Carlsbader.

Auch hier sind die in Berzelius's neuester Analyse des Carlsbader Sprudels aufgefundenen seltenern Bestandtheile unberücksichtigt geblieben, von denen auf eine vierwöchentliche Kur, wenn täglich 10 Becher getrunken werden,

|                                      |      |     |
|--------------------------------------|------|-----|
| an flusssaurem Kalk .....            | 2,58 | Gr. |
| » kohlsaurem Strontian .....         | 0,77 | »   |
| » phosphorsaurem Kalk .....          | 0,18 | »   |
| » kohlsaurem Mangan .....            | 0,67 | »   |
| » basisch-phosphorsaurer Thonerde .. | 0,26 | »   |

im Ganzen also  $4\frac{1}{2}$  Gr. kommen,

in medicinischer Rücksicht nicht sehr in Betracht ziehen sind.

Hat nun auch das oben angegebene Verfahren darin  
estreitbare Vorzüge, daß es die Kohlensäure in dem  
ducte fester gebunden darreicht, als wenn das Was-  
auf künstliche Weise damit gesättigt wäre, so dürfte

obige Vorschrift doch dann nicht ausreichen, wenn das Heilwasser so warm, als es die Natur darbietet, getrunken werden soll, und ist die feste Haltung der Temperaturgrade bei der Nachbildung der Thermen doch unerlässlich. Rechnen wir nun auf jeden Becher drei Unzen Wasser, so wird es hinreichen, anderthalb Unzen des mit kohlensaurem Kalk versetzten Roisdorfer Wassers in den Becher zu gießen, unterdessen anderthalb Unzen der Salzlösung bis zum Sieden zu erhitzen, und diese in dem Augenblicke dem kohlensauren Wasser zuzusetzen, wo der Becher ausgetrunken werden soll. Auf diese Weise erhält die Flüssigkeit eine Temp. von 47° Réaum., welches bekanntlich die Wärme des Carlsbader Mühlbrunnens ist, der in den neuesten Zeiten von den Quellen Carlsbads gerade am meisten benutzt wird.

Wirken nun die verschiedenen Quellen Carlsbads auf abweichende Weise, so darf man wohl annehmen, daß diese Abweichung in der verschiedenen Temperatur und dem danach sich modificirenden Gehalte an Kohlensäure zu suchen sei, da Berzelius in dem Wasser des Sprudels, des Mühl-, Neu- und Theresienbrunnens dieselben fixen Bestandtheile in denselben quantitativen Verhältnissen fand, so daß man mit Grund annehmen kann, alle Quellen Carlsbads haben ihren Ursprung in einem gemeinschaftlichen Hauptreservoir, zumal es auch schon erwiesen ist, daß der Theresienbrunnen ein Abfluß des Sprudels, der Schloßbrunnen eine Ader davon ist. So dürfte denn auch das oben angegebene Mischungsverhältniß für die übrigen Quellen Carlsbads passen, und nur auf zweckmäßige Weise die Temperatur des zu trinkenden Wassers zu erhöhen sein. Um die Temperatur des Neubrunnens zu erhalten, genügt es, das zur Aufnahme des zu trinkenden Mineralwassers bestimmte Gefäß unmittelbar vor dem Genuß des Bechers in kochendes Wasser zu halten, dann die kochende Salzlösung hineinzugießen, und rasch das kohlensaure Wasser zuzumischen, worauf das Mineralwasser bei obiger Quantität eine Temperatur von 47° Réaum.

die der des Neubrunnens, 48° R., ziemlich nahe  
 mmt. Um die Temperatur des Sprudels, 59° R., zu  
 zeichen, bedürfte es eines Apparats, worin die Mi-  
 schung unter dem Drucke von Kohlensäure bis zu jenem  
 Grade erhitzt, und in dieser Temperatur erhalten wer-  
 könnte; in den meisten Fällen wird man indess wohl  
 den beiden zuerst angeführten Mineralwässern aus-  
 sehen.

Zunächst wichtig sind wohl die Heilquellen von  
 s, und zwar zuerst das

*Krähnchen.*

zur Nachbildung desselben löst man in 5000 Gran Wasser

8,8122 Gran wasserfreies kohlensaures Natron

und 0,771 " schwefelsaures Kali, und

fügt 5000 Gran Selterser Wasser hinzu.

resultirt in 10000 Gran: während 10000 Gran Krähn-  
 chen enthalten:

|                            |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|
| kohlensaures Natron.....   | 12,6444 Gr. | 12,6444 Gr. |
| schwefelsaures Natron..... | 0,1619 "    | 0,1579 "    |
| Salz.....                  | 10,6025 "   | 10,1397 "   |
| schwefelsaures Kali.....   | 0,771 "     | 0,7713 "    |
| kohlensaure Kalkerde.....  | 1,6253 "    | 1,4722 "    |
| kohlensaure Talkerde.....  | 1,0368 "    | 1,0269 "    |
| kohlensaures Eisenoxydul.. | 0,1004 "    | 0,0213 "    |
| Selerde .....              | 0,1882 "    | 0,5389 "    |

An Kohlensäure enthält das Emser Krähnchen in  
 einem Maafstheile 0,51, während das Selterser Wasser  
 8 enthält; es wird also obige Mischung 0,54 ihres  
 Gewichtes an Kohlensäure enthalten, und somit das Em-  
 ser Krähnchen ziemlich genau repräsentiren.

Um einem zu trinkenden Becher von 3 Unzen die  
 natürliche Temperatur des Krähnchens, 24° R., zu ge-  
 ben, hat man in denselben anderthalb Unzen Selterser  
 Wasser und eine Unze der Salzlösung zu gießen, eine  
 halbe Unze der letzteren bis zum Kochen zu erhitzen,  
 und jener Mischung zuzusetzen, wodurch jener Wärme-  
 grad erreicht wird.

*Emser Kesselbrunnen.*

Um denselben nachzubilden, löse man in 5000 Gran

Geilennauer Wasser 5,093 Gran kohlensaure Kalkerde und 1,629 Gran kohlensaure Talkerde, und setze 15 Gran Wasser hinzu, in dem 32,040 Gran kohlensaures Natron, 2,546 Gran Glaubersalz und 9,781 Gran Kochsalz aufgelöst wurden.

So erhält man eine Mischung, von welcher 10000 Gran enthalten: während in 10000 Gr. Emser Kesselbrunnen enthalten sind

|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| kohlensaures Natron.....  | 17,755 Gr. | 18,005 Gr. |
| schwefelsaures Natron.... | 1,302 „    | 1,302 „    |
| Kochsalz.....             | 4,989 „    | 4,987 „    |
| kohlensaure Kalkerde..... | 3,195 „    | 3,193 „    |
| kohlensaure Talkerde..... | 1,598 „    | 1,591 „    |
| kohlensaures Eisenoxydul. | 0,104 „    | 0,054 „    |

und an Kohlensäure 0,25 ihres Volums, was mit dem Gehalte des Kesselbrunnens übereinstimmt.

(Kastner, von dem obige Analyse des Kesselbrunnens entlehnt ist, giebt in derselben in 16 Unzen 1 Gran salzsaure Kalkerde, und 0,25 Gran salzsaure Talkerde an; alle übrigen Chemiker haben diese Basen den verwandten Thermen nicht so berechnet, weil es kein Mißgriff sein dürfte, jene Salze als kohlensauren Kalk- und kohlensaure Talkerde, und zwar deren chemischen Werthe mit 0,45288 Gran kohlensaure Kalkerde, und 0,2224 Gran kohlensaure Talkerde in Rechnung zu bringen. Die Salzsäure derselben ist mit 0,25 Gran zum salzsauren Natron berechnet, und dafür kohlensaures Natron das Aequivalent desselben mit 0,75 Gran abgezogen.)

Um einem Becher Kesselbrunnen von drei Unzen erforderliche Temperatur zu geben, bekanntlich 34° wird eine Unze der Salzlösung bis zum Kochen erhitzt und in den Becher gegeben, welcher bereits sechs Drachmen des kohlensauren Wassers und zehn Drachmen Salzlösung enthält, woraus eine Mischung von 3 resultirt.

In den meisten Fällen wird man schon mit den obgeführten Thermen ausreichen, und mögen obige



nenstellungen genügen, dem Verfahren, auf leichte Mineralwässer nachzubilden, nähere Prüfung zu nehmen, was dann da Anwendung finden könnte, wo Verhältnisse es nicht gestatten, großartige Trinkkuren einzurichten, wo, wie in den jetzt bestehenden Berlin, Warschau, Dresden, Brighton u. s. w. 600, 1000 Gäste bedient werden, wodurch es allein möglich ist, Anlagen herzustellen, die in vielen Hinsichten geeignet sind, den Erfolg der Trinkkur zu befördern. An den Werth obiger Methode können nur ärztliche Erfahrungen den Maassstab anlegen, da nach Hund und »das beste Reagens für ein Mineralwasser der menschliche Körper ist«, weshalb es sich von selbst versteht, daß es nur Aerzten zusteht, über die Zulässigkeit Anwendung und über die Wirksamkeit der auf solche Weise nachgebildeten Heilwässer zu urtheilen, so es wünschenswerth sein würde, daß die etwaigen Mängel der Darstellung derselben von Technikern angetraut würden, die befähigt sind, etwaige Veränderungen der Heilwässer gehörig überwachen zu können.

## Künstliche Mineralwässer.

Eine künstliche Nachbildung des *Marienbader* *brunnens* läßt Hr. Dr. Schlesier in Pritz auf folgende Weise bewirken.

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Wasser.....                | 12 Unzen   |
| Tinct. Ferr. acet. aeth... | 6 Tropfen  |
| Acid. sulph. dilut.....    | 80 Gran    |
| Acid. muriat.....          | 12 Tropfen |
| Natr. carbonic. acid. .... | 40 Gran.   |

Man füllt erst die Flasche mit dem Wasser und dann die *Tinct. Ferr. acet. aeth.*, die Schwefel- und die Salzsäure hinein, zuletzt das Natron, schüttelt, und verschließt hierauf die Flasche fest. Man vermischt die verdünnte Schwefelsäure mit 21 Gran *carb. acid.* und geben ungefähr 18 Gran schwaches Natron. 12 Tropfen Salzsäure sättigen gegen

8 Gran *Natr. carb. acidul.*, und geben ungefähr 6 Gran salzsaures Natron, so daß 11 Gran doppelt-kohlensaures Natron übrig bleiben. Die *Tinct. Ferri acetici aetherea* soll nach Hrn. Dr. Schlesier das einzige Eisenpräparat sein, das der Mischung zugesetzt werden kann, ohne daß Trübung oder Niederschlag erfolgt.

Eine Nachbildung der *Adelheidsquelle* versucht Hr. Dr. S. auf folgende Weise.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Wasser.....             | 12 Unzen           |
| Kali hydrojod.....      | $\frac{3}{4}$ Gran |
| Kali hydrobrom.....     | $\frac{1}{4}$ Gran |
| Natr. carb. acidul..... | 40 Gran            |
| Acid. muriatic. ....    | 46 Gran.           |

Es wird durch diese Mischung ein klares wohl schmeckendes, an Kohlensäure ziemlich reiches Jod- Brom- und natronhaltiges Salzwasser erhalten. (*Medic. Zeitschr. d. Vereins für Heilkunde in Preussen 1839. N. 2*)

Diese Mischungen geben allerdings Annäherungen zu den beiden genannten Mineralwässern, doch nicht in dem Maasse, als es der Kunst möglich ist, und der jetzigen Grade der Wissenschaft entspricht. Wenn es sich um diese Nachbildung handelt, so muß das künstliche Product dem natürlichen so nahe kommen wie es der Zustand der Wissenschaft erlaubt, und der von dem hochverdienten Struve mit so glänzenden Erfolg aufgeschlossene Weg darf nicht verlassen werden. Ein anderes ist es natürlich, wenn der Arzt mit einer die wesentlichen Bestandtheile nur berücksichtigenden Nachbildung sich begnügt oder diese nur haben will.



Fünfte Abtheilung.

---

**Naturgeschichte und Pharmakognosie.**

---

über die in der Keuperformation beim Orte Kutzleben (preuss. Regierungsbezirk Erfurt) vorkommende Kohle;

von

*Carl Frenzel* in Erfurt.

---

**D**as Dorf Kutzleben, gegen 6 Stunden von Erfurt, liegt an dem nördlichen Abhange eines schmalen, nicht tiefen Thales, welches ungefähr eine halbe Stunde von dem Orte gegen Westen anfängt, und nach Osten sich erstreckt. In diesem Thale tritt die Gebirgsformation zu Tage, und wurde hier verfolgt; auf der Höhe ist sie mit aufgeschwemmtem Schuttland bedeckt, so daß Felder gut gedeihen. Sie gehört dem untern Gliede des Keupers an, welcher hier unmittelbar auf dem Muschelkalk lagert, denn dies beweist nicht nur diese Lagerung, sondern auch der diesem Gliede der Keuperformation entthümliche Sandstein mit seinen charakteristischen Pflanzenabdrücken (Schilfsandstein) und die schwachen, ihm wechselnden Lager von mergeligen Kalksteinen und schiefrigen Mergeln. Die hier mit vorkommende Kohle, welche unmittelbar zu Tage als ein weiches, etwas fettig anzufühlender, beim Zerreiben und Hacken werden ein schwärzlich-braunes Pulver gebend. Besteg erscheint, nimmt schon mit wenigen Fuß über Tage an Mächtigkeit zu, wird röcher und gewinnt mehr das Ansehen einer Steinkohle. Solche Kohle findet sich am Ausgehenden an verschiedenen Stellen, und Versuchsversuche ergaben, daß sie nicht nesterweise, sondern wirklich flötzartig vorkommt. Ein Flötz, das am Ausgehenden 2 — 3 Zoll mächtig war, wuchs bei immer größerer Entfernung von demselben, so daß man es bei

60 Fuß Entfernung von dem Ausgehenden in einer Stärke von 6 — 8 Zoll wieder traf, und hier noch fortsetzte, und wenn man es durch einen bei einer noch größern Entfernung aufgestellten Bohrer nicht erreichte, so hatte derselbe es wahrscheinlich an einer Stelle getroffen, wo es im gestörten Zustande war. Ueber diesem Flötze liegt hellgrauer, ziemlich fester und etwas sandiger Mergel, der an der Luft leicht zerfällt, das unmittelbar Hangende bildet eine Lage von dunkler gefärbtem kleinkohlige Parthien enthaltenden Mergel. — Die Kohle wird je weiter vom Ausgehenden immer compacter und reiner, doch ist sie, zumal in der Nähe des Ausgehenden, häufig von Klüften durchsetzt und diese sind mit gelbbraunem Eisenoxyd ausgefüllt. Das Liegende besteht aus demselben Mergel, wie das unmittelbar Hangende. In dem Mergel über der Kohle findet sich schaliger, dichter Rotheisenstein vertheilt, in Stücken von der Größe einer Erbse bis zu einer Faust.

Die nun zu beschreibende Kohle ist die, welche bei 60 Fuß Entfernung vom Ausgehenden in einer Tiefe von ungefähr 58 Fuß angetroffen wurde. Sie ist von schwärzlich-grauer bis schwarzer Farbe, ein Pulver von gleicher Farbe gebend, mit Eisenoxyd etwas durchzogen, an einigen Stellen Schwefelkies eingesprengt enthaltend; Hauptbruch geradschiefrißig, matt, Querbruch schwach glänzend, unvollkommen muschlich, mit dem Messer zerschnitten eine starke glänzende Fläche gebend; sie springt in unbestimmt eckige, meist scharfkantige Bruchstücke, giebt auf Bisquit einen schwarzen, schwach glänzenden Strich, ist spröde, leicht sprengbar, und auch nach längerem Liegen unter Wasser zerfällt sie nicht. Sie brennt im gewöhnlichen Ofen und vor dem Schmiedegebläse. Vor dem Löthrohre brannte sie langsam, ganz ruhig ohne zu schmelzen, unter Hinzufügung einer schwärzlichen fast die frühere Form der Kohle beibehaltenden Masse. Selbst nach dreistündigem Glühen im Platintiegel hinterließ sie noch einen Rückstand, der ein schwärzliches Pulver gab, und da man auf die

weise die der Kohle zugehörigen Erd- und Metalloxyde in Kohle nicht ganz befreit im Rückstande erhalten blieben, so wurden sie mit Hülfe von Kali und Säuren aus der Kohle gezogen. Die zur chemischen Untersuchung angewandte Kohle wurde von Schwefelkies und arsenischerer möglichst befreit. Wasser zog gar nichts aus. Aether zog eine geringe Menge eines auch in Weinsäure löslichen Harzes aus. Eine Lösung von kohlenwasserstoffhaltigem Natron löste nichts, so daß dieser Flüssigkeit zugesetzte Salzsäure nicht die geringste Spur von Arsenikniederschlag. In einer Tubulatretorte getrocknet, blieb sie unverändert, es gingen nur einige Tropfen einer wässrigen Lackmuspapier röthenden Flüssigkeit über, und nach Oeffnen des Tubulus nahm man einen stechenden, empyreumatischen Geruch wahr. Die im Achatmörser feingeriebene Kohle wurde mit der dreifachen Menge Aetzkali im Silbertiegel geglüht, die geglühte Masse mit überschüssiger Chlorwasserstoffsäure digerirt, die saure abfiltrirte Flüssigkeit in einer Porzellan- oder Glaschale zur Trockniß abgedampft, und dieser Rückstand, nachdem er ein wenig mit Salzsäure befeuchtet, mit Wasser behandelt, liefs Kieselerde zurück. In der abfiltrirten Flüssigkeit zeigten Reagentien an:

Eisenoxyd,  
Thonerde,  
Kalkerde.

Um ungefähr das quantitative Verhältniß der angegebenen Bestandtheile kennen zu lernen, denn da die Kohle schon dem äußern Ansehen nach an verschiedenen Stellen mehr oder weniger fremde Beimengungen enthält, so kann die quantitative Analyse nur ein annäherndes Resultat geben, wurden drei verschiedene Kohlenstücke, die möglichst von eingesprengten Beimischungen befreit waren, nachdem sie höchst fein im Achatmörser gepülvert und bei 83° B. getrocknet, einzeln der quantitativen Analyse unterworfen, deren einfachen Gang ich hier nicht anzuführen brauche.



Drei Grammen von jeder der Proben lieferten folgenden Resultat:

Erste Probe: 1,025 Kohle,  
 0,026 Harz,  
 0,421 Kieselerde,  
 0,410 Thonerde,  
 0,920 Eisenoxyd,  
 0,130 Kalkerde,

---

2,932.

Zweite Probe: 1,053 Kohle,  
 0,031 Harz,  
 0,402 Kieselerde,  
 0,399 Thonerde,  
 0,998 Eisenoxyd,  
 0,110 Kalkerde,

---

2,993.

Dritte Probe: 1,028 Kohle,  
 0,032 Harz,  
 0,401 Kieselerde,  
 0,402 Thonerde,  
 0,943 Eisenoxyd,  
 0,170 Kalkerde,

---

2,976.

Als die erste Probe der quantitativen Analyse unterworfen wurde, zeigte die ammoniakalische Flüssigkeit, welche die Kalkerde zum Abscheiden enthielt, einen ganz unbedeutenden Stich ins Blaue, welches auf Kupfer vermuthen liefs, und nachdem die Kalkerde abgeschieden war, zeigten auch andere Reagentien, die Kaliumeisencyanür und Schwefelwasserstoff, die Gegenwart von Kupfer an. Die zweite und dritte Probe enthielten noch ein anderes Stück Kohle verriethen kein Kupfer. Dieselbe ist daher nur zuweilen ein Begleiter derselben. Die chemische Zusammensetzung dieser Kohle ist nach also ganz anders als die der Voigt'schen Lettenkohle, welche nach Dr. Geinitz in 100 Theilen 5,3 Theile Humussäure enthält, und sie vertritt also in diesem Keupergliede die Stelle der Voigt'schen Lettenkohle.

# ber das Vorkommen des kohlensauren Natrons als Ausblühung an Mauern;

von

*Chr. Hansmann*

zu Athens im Oldenburgischen.

Häufig habe ich hier und in anderen Gegenden Marsch an Mauern, besonders von neuen Gebäuden, weisse Ausblühung wahrgenommen, die im gemeinen Leben Salpeter genannt wird. Da ich Gelegenheit, eine reichliche und reine Quantität dieser Ausblühung zu sammeln, deren zarte weisse Prismen oft ein zwei Zoll lang sind, und die durch den laugenhaften Geschmack schon zu erkennen gaben, daß sie weitens nicht reiner Mauersalpeter seien, so untersuchte sie chemisch, und fand, daß sie fast reines kohlenes Natron sind. Ich fühle mich veranlaßt zu dieser Mittheilung, da ich durch dieselbe darauf aufmerksam machen möchte, daß dergleichen Ausblühungen an Mauern, besonders in Marschgegenden, die wie die hiesige Gegend unter ähnlichen Bedingungen in der Nähe Meeresküste sich bildeten, wohl häufig nur in kohlenes bestehen. Dieses kann sich bilden, wenn das Brunnenwasser hier verhältnißmässig reichlich enthaltene schwefelsaure Natron und Chlornatrium durch mit diesem Wasser angemachten Kalkmörtel zertrümmert wird, gleichwie das kohlenes Natron in den Höhlen Ungarns und Egyptens sich erzeugen soll. Der wahre Mauersalpeter kömmt hier allerdings vor, aber nur selten.

## Bergtheer.

Nach Landerer findet sich auf der Insel Zante eine Bergtheerquelle; sie dringt aus Spalten von Thonschiefergebilden als eine schwarze empyreumatische noch nicht erhitzte Masse hervor. Auf Zante wird diese *ναφθα* zum Heizen der Schiffe benutzt.

## Sechste Abtheilung.

**Allgemeiner Anzeiger.****I. Anzeiger der Vereinszeitung.****Notizen aus der Generalcorrespondenz des Directoriums.**

Hr. Vicedirector Müller in Medebach: Ueber die Versicherung für Apotheken. — Hr. Kreisdirector Wachter in Burgdorf: Ueber Angelegenheiten des Kreises Hannover. — Hr. Kreisdirector Giseke in Eisleben: Ueber die Versammlung in Eisleben. — Hr. Vicedirector Dr. Meurer in Jena: Die Generalversammlung in Leipzig betreffend. — Hr. Medicinalassessor Staberoh in Berlin und Hr. Vicedir. Buchner in Erfurt: Die Hagen-Gehlen-Buchholz'sche Stiftung betreffend. — Hr. Kreisdirector Müller in Driburg: Die gehaltene Versammlung und den Verkauf der auscirculirten Bücher betreffend. — Hr. Kreisdirector Dr. Tuchen in Naumburg: Aufnahme neuer Mitglieder. — Hr. Kreisdirector Becker in Hannover: Angelegenheiten des Kreises Hannover. — Hr. Vicedirector Bley in Bernburg: Ueber die Versammlungen in Leipzig und Bernburg.

Dankschreiben für die Ehrenmitgliedschaft des Vereins eingegangen: von Hrn. Regierungs-Medicinalrath Andreae in Medeburg.

Beiträge zum Archiv gingen ein: von Hrn. Kaufmann in Stuttgart, von Hrn. Kreisdirector Rabenhorst in Leipzig und Hrn. Kreisdirector Müller in Driburg.

**Handelsnotizen.**

*Antwerpen, den 31. Juli.* Von Pfeffer fast kein Vorrath. Sumatra kamen  $22\frac{1}{2}$  —  $22\frac{1}{2}$  Cs. Cacao rar.

*Bremen, im Juli 1840.* Von Aloe erscheint wenig und wird demnach vorerst ihren Preis behaupten. Auch die andern halten sich und sind einer Erhöhung fähig, da nach den Berichten aus den Productions-Ländern die diesjährige Ernte wenig verspricht. *Bacca lauri*, *Bals. copaiv. ver.*, *Bals. de Cantharides*, *Cardamom. min.*, frische *Caricae* in Kränzen, *Cort. aurant. Mallaga*, *Cubeben*, schöne *Flores lavenderae*, *Jas. Kali hydrojodin.*, *Magnesia alb. leviss.*, *Salpeter*, *Natrum acidul.*, *Ol. menth. pip. alb.*, *Ol. ricini rec.*, *Ol. laurin. cap.*, *Ol. jecor. asell.*, *Ol. terebinth.*, *Pom. aurant.*, *Rad. liquirit.*, *cacuanh. ver.*, *Succ. liquirit. calabr.*, *Tamarinden* haben billiger zugeben; ferner notiren viel niedriger: neue *Manna granat. aurant.*, *Ol. bergamott.*, *Ol. de Cedro*, ächte und frische *Wurzel naphae genues. tripl.*, *Aqua lauro-cerasi ver.*, raff. *Borax*, *Calomel angl.* in grossen vollen Beuteln, *Gallae turt. nigr.*, *Gummi arab.*

*amon. in gran., Asa foetid. ffst. mand., Benzoe, Galban. in gran. in massa, Myrrhae, Oliban., Mel alb. de Cuba, Ol. cinnammom. flon., Ol. rosar. turt. extraff., Rad. columbo, Rad. Ratanhiae* fast ne Knollen u. s. w.

Von *Cacao* sind die Zufuhren selten, wir besitzen noch *Ei- ges von domingo et guajaq.* in schöner frischer Waare. *Kam- er* ist zwar allenthalben wenig vorrätig, dennoch der Preis r nominell, dürfte aber bei einiger Frage neuen Aufschwung bmen, wenn die Handelsverhältnisse mit China ferner gestört üben. Die in der neuern Zeit noch von Canton nach Europa kommenen Schiffe bringen nur Thee und nichts von Dro- erien.

Nach *Chinin* ist bisweilen Frage und bleibt so wie *China* ia im Preise. *Crocus* wird höher gehalten. Von *Cassia fistul.*, seither fehlte, ist eine Kleinigkeit vorrätig. *Fol. sennae* x. sind nur von einer frühern Parthie in hübscher Waare rhanden; was davon zuletzt in den Handel gekommen, fällt egen sehr gering, bei weit höhern Preisen. Von *Gum. elastic.* der Verbrauch fortwährend im Zunehmen. *Gum. elemi* fehlt. e Preise von *Cassia cinnam., Quecksilber, Hausenblase, russ. lasche, Ol. olivar., Rad. jalap.* sind sehr fest. Echter *tonquin.* schus macht sich immer rarer: wir haben davon noch etwas eniges in ausgesuchter Qualität. *Opium* bleibt billig. Ganz schälte *chines. Rhabarber* fehlt und kommt die halb. *mund.* zu uer; wir empfehlen daher unsere *moscow.* in ausgesuchter alität, besonders, da in Folge der chinesischen Differenz, das sische Gouvernement beabsichtigt, den Preis ferner zu erhö- und zugleich die Bedingung macht, daß der Käufer einen eil alter verlegener Waare mit übernimmt. *Rad. sassaparil.* nmt nur spärlich und wird, was davon erscheint, rasch weg- kauft; wir besitzen eine hübsche *Hondurassorte.* Wegen der en *Olivenölpreise* geht es mit *Sapo venet.* höher. Ganz fri- er *Sem. cynae* in gran. virid. erwarten wir binnen kurzem. Preise von *Schwefel* und *Flores sulphur.* bleiben unverändert. *tar. depur.* stellt sich wiederum höher. *Vanille* ist kaum r aufzutreiben und haben die Franzosen auf die neue Ernte ferungskäufe zu hohen Preisen abgeschlossen.

*Hamburg, den 21. Juli.* *Leberthran* ist nur in zweiter Hand haben, weißer neufundl. gänzlich geräumt, schöner gelber at zu 39 Mk.

— *den 24. Juli.* Bedeutende Umsätze wurden in *Cassia lignea* nacht, feine Qualität 9 $\frac{5}{8}$  fs., mittel 9 fs., geringe 8 $\frac{3}{8}$  — 8 $\frac{5}{8}$  fs. *inten* und *Rosinen* im Preise gewichen, erstere 48 Mk., letz- : 13 Mk. *Mandeln* preishaltend, Valenz. 61 Mk., sicilianische Mk., Portsche 52 Mk., Barb. 44 Mk., Lissabon. 51 Mk. 8 fs.

— Notizen aus der Einfuhrliste vom Juli. *Cacao* 144 S. fee 37,202 S., 198 F. *Candis* 5683 Kilogr., 3 F. *Canel* 2 K., ., 6 Pack. *Cassia* 669 K., 1000 Matten. *Cassia lignea* 24 K. *chel* 33 S., 13 B. *Ingwer* 411 S., 300 Packen, 20 Bd. *Küm-* 71 S., 1 K. *Lakritzen* 60 K. *Macis* 4 F., *Muskatnüsse* 2 F. *ndeln* 34 F., 494 Ser., 1 S., 3 B., 142 Colli, 3 K. *Pfeffer* 2254 S., arthie, 4 Packen. *Piment* 673 S. *Pottasche* 65 F. *Rosinen* F. *Sago* 15 F., 1 S. *Salpeter* 100 S., 25 F. *Wachs* 3 S., acken, 6 F., 1 Colli, 37 K., 31 B. *Weinstein* 19 F. *Zucker*



ostind. 4120 S., Brasil, Lissab. u. Porto 2101 K., 122 F., 194 S., Havanna 24,307 K., 489 F., Amerika, Frankreich, England, Belgien 326 F., 518,176 Kilogr., 103 K.

*Hamburg, den 4. Aug.* Die Umsätze in feineren Oelarten: 25 Both Messina zu 31 Mk. 8 fs., 25 Both Mallaga 30 Mk. 8 fs., Carol. Reis wurden 200 Tonnen zu 13 Mk. 12 fs. — 14 Mk. 8 fs. begeben. Nach geringen ostind. Sorten zu 8 Mk. viel Nachfrage.

*Havanna.* Die Zuckerausfuhr im Monat Mai war äußerst bedeutend, von hier 98,000 und von Mantanzas 44,000 Kisten. Der Kaffeevorrath nimmt ab, farbige Sorten werden selten, die geringeren sind verhältnißmäßig theurer als die besseren, da jene vorzugsweise für Nordamerika begehrt sind.

*London, den 17. Juli.* Die Kaffeepreise haben sich behauptet. Jamaica mittel 113 — 118 sh., ff. ord. 108 sh. 6 d., gut u. f. ord. 94 — 100 sh., ord. 79 — 80 sh., Berbice mittel 115 — 122 sh., ff. ord. 102 sh., Ceylon gut ord. 86 sh. 6 d. — 87 sh. 6 d., guter ord. blasser 88 sh., f. ord. 91 — 92 sh. 6 d., ff. ord. farbige 93 sh. 6 d. — 96 sh. Der Thee im Preise 1 d. höher als in der letzten Auction. Comp. Cong. 2 sh. 1 d. Pfeffer begehrt, oststieliger staub. stieg auf 3½ d. Cassia lignea 79 — 80 sh. Caca begehrt, 175 S. Trinidad, feiner rother 56 sh. 6 d. — 57 sh., guter 55 sh., mittel 52 sh. 6 d. — 53 sh. Roher Salpeter ist viel begehrt, gewöhnlicher nicht unter 26 sh. zu haben.

— den 24. Juli. Cacao von britischen Pflanzungen war weniger begehrt. Die höheren für Salpeter geforderten Preise beschränken die Umsätze aus der Hand. Unter 28 sh. 6 d. ist feiner und unter 26 sh. nichts von trockner Qualität zu haben.

*Mainz, den 24. Juli.* Rüböl 46½ Thlr.

*Neapel, den 4. Juli.* Das Steigen der Oelpreise hält sich. fertiges Gallipoli 28 Duc. pr. Salmea, Gioja 76 Duc. pr. Botte.

— den 14. Juli. Man bezahlt heute die fertigen Gallipoli wegen der wenigen günstigen Nachrichten über die Oelernte in den Provinzen und vieler Nachfrage, mit 38 Duc. 50 Gr., während man für Oele der nächsten Ernte Contracte zu 28 Duc. 60 Gr. abschloß. Das Calabreser Oel, welches hauptsächlich nach Marseille geht, wurde bis 80 Duc. pr. Botte gesteigert, was dem Preise von 29 Duc. 16 Gr. pr. Salm. gleichkommt. Für Mandeln finden sich unter 39 Duc., Lieferung im October, kein Verkäufer.

*Stuttgart, im Juli 1840.* Ueber die aus China kommenden Drogen werden wir noch mehrere Monate, hinsichtlich ihres künftigen Preisstandes, im Ungewissen bleiben, bis die politische Krise sich aufgeklärt haben wird. Inzwischen ist ein Rubepunct eingetreten und von Kampher haben mehrere Zufuhren den Preis gedrückt, so wie auch von ½ mund. Rhabarber einige Partien über Amerika aus Canton eingetroffen sind, für welche man sehr hohe Preise bezahlt hat, während die Qualität im Durchschnitt gemischt, zur Hälfte dunkelbrechend und gestochen, und das Beste davon nicht sehr frisch ist, was davon herrühren mag, daß diese Rhabarber nicht, wie in frühern Zeiten, noch einmal vor der Einschiffung in Canton getrocknet wurde.

Moschus ist beispiellos rar und theuer; unser Vorrath von dem in Beuteln bietet nur noch wenig Auswahl. Die Rauten hautsorte hat sich im quantitativen Ertrage beim Exporte



zelter Beutel nicht immer vortheilhaft erwiesen, wenn auch bestritten die Qualität die beste ist, die je vorkam. Was wir am meisten besitzen, ist der *Moschus ex ves*, in Klümpchen, bei seinen Vorzügen nicht so theuer kommt als derjenige den Beuteln, wie er jetzt zu haben ist.

**Chinin.** Nicht nur haben sich die äusseren Zustände nicht verändert, sondern im Gegentheil sich so gestaltet, daß die Monopolisten *China regia* immer hartnäckiger auf hohe Preise halten, so daß *Chinin* um 20 Procent theurer sein sollte, während dasselbe im Gegentheil, jedoch nur vorübergehend, etwas niedriger verkauft wurde und zwar zu einer Zeit, wo über die Aufhebung des Ausverbotens mit oder ohne Zoll zweifelhafte Nachrichten sich breiteten, und es den französischen Fabrikanten, wie schon ers, in den Sinn kam, unsere Concurrenz sich aus dem Wege schaffen. Zu diesem Ende haben sie Chinarine aufkaufen lassen, Reisende ausgeschickt, die das *Chinin* à 11 Fr. ausboten, während sie es in Paris zu 14 — 15 Fr. verkauften und dabei unumwunden erklären ließen, daß dieses bloß geschehe, um die deutschen Fabrikanten zu tödten und nachher alleinige Herren und Meister den Preis auf den höchsten zu steigern.

**Bals. Cop., Manna** sind bedeutend billiger, ohnerachtet es noch 5 Monate dauert, bis von letzterer die neue kommt, über den Ertrag sich noch nichts sagen läßt.

**Opium**, von dem wir alle Sorten sehr billig besitzen, namentlich auch das schöne trockne in kleinen Broden, das fast überall gegangen ist, hat seinen niedrigsten Stand erreicht. In Egypten hat der Bau desselben aufgehört und im Paschalik von Smyrna wurde auf Befehl der Regierung Korn statt Mohn gepflanzt, weil Producenten bei dem jetzigen Preise nicht bestehen können. Vom ostind. Opium von Patna haben wir Einiges erhalten, in Form runder Kugeln von einigen Pfunden ist.

**Aloe** kommt wenig an: ächtes *Arrowroot* ist gestiegen; *Bals. Capivi* sehr hoch bezahlt, *Crist. tart.* steigend, so wie die monopolisirte *Hausenblase*; *Gi Copal* hat angezogen, desgleichen *Sassafras*. Dagegen ist sehr billig:

*Rad. Altheae*, *Sassaparill* in Bündel, *Castoreum* gewöhnliches, *namom.*, *Gi Arabic.* sehr schön weiß wie elect billiger als bisher, so wie *Asa foetida*, *Ammoniac*, *Galban*, *Schellack*, *Myrrhen*, *Stix*, *Morphium*. *Oleum bergamot.*, *Radix Jalapae*, *Salep*, *Seneca*, *Junckia*; ferner *Sem. Sabadill*, *Veratrin*; auch sind die *Capsules Peruvianenses* au *Beaume de Copahn* bedeutend billiger als bisher.

**Sem. Cynae.** Die Ankunft der gröfseren Zufuhren des neuen ölen grünen aus Rußland wurde durch die anhaltenden Westwinde zurückgehalten.

Echtes *Castor. moscov.* erhielten wir in schönen Beuteln; man begreift kaum, wie man noch in Preiscouranten das *Castoreum moscov.* à 15 — 18 fl. ausgesetzt findet, da dieses doch kein besseres ist, als aus dem Hudsonsbay bereitetes, das wir in gleich grossen Beuteln à 3 fl. 3j geben.

## Miscellen.

## Ueber Platingefäße.

Der Werth von Platingefäßen für chemische Operationen ist bekannt; nur der hohe Preis derselben verhindert ihre weit-  
breitere Anwendung, besonders wenn sie in großen Dimen-  
sionen erfordert würden. Hr. Melly in Paris hat nun versucht,  
das Platin in einer möglichsten Dünne anzuwenden und es auf  
ein anderes Metall zugleich zu unterstützen. Er hat drei verschie-  
dene Verfahrungsarten versucht, das Platin auf einem andern  
Metall zu befestigen.

Das erste Verfahren ist die *Compression*. Ein viereckiges  
dünnes Stück Platin und ein nach allen Richtungen etwas ge-  
wölbtes und dickeres Stück Kupfer, beide besonders auf der Be-  
rührungsfäche aufs sorgfältigste geputzt, werden mit einer  
Zange oder Klaue auf einander gedrückt und mit einer Spirale von  
dickem Kupferblech umwunden, was nothwendig ist, um die Oxida-  
tion der Innenfläche des Kupferblechs zu verhindern. Die ganze  
Masse wird jetzt rasch in einem starken Feuer erhitzt bis zu  
lebhaftem Rothglühen und sofort unter den Piston der Presse  
gebracht und comprimirt, während es noch roth ist. Beide Metalle  
sind nun in ihrer ganzen Fläche auf einander gelöthet, und die  
Doublirung des Platins ist in kurzer Zeit bewirkt, unter dem  
Hammer kann man jetzt die dünnsten Stücke daraus erhalten.  
Es lassen sich so Gefäße vom dünnsten Platin verfertigen, und  
es durch das andere Metall, Silber, Kupfer oder Messing ver-  
stärken. In den Versuchen des Hrn. Melly verhielt sich die Le-  
bensdauer des Platins zu dem des Kupfers wie 1:30 und das Platin  
bei dieser Dicke der Quadratzoll nur 350 Milligrm. Eine  
Platinschale von 40 Quadratzoll Oberfläche, die ohngefähr 15 Unzen  
Wasser faßt und allen chemischen Zwecken entspricht, wie  
nur 30 Franken kosten, während sie aus Platin gearbeitet  
mindestens 200 kosten würde.

Das zweite Verfahren besteht in der *Amalgamirung*. So  
lange Zeit bedient man sich beim Vergolden von Metallen  
Gold-Amalgams, es war natürlich, auch ein Platin-Amalgam  
in dieser Beziehung zu versuchen. Nach verschiedenen ver-  
schiedenen Versuchen zur Darstellung eines solchen Amalgams  
hat es Hrn. Melly auf folgende Weise dasselbe zu erhalten.  
Platinschwamm, bei einer niedern Temp. bereitet, damit er nicht  
agglomerirt, läßt man durch ein Seidensieb gehen und in einen  
eisernen Mörser, dessen Boden etwas erhitzt wird, unter einem  
gut ziehenden Schornstein mit einer gewissen Menge Quecksilber  
eine halbe Stunde lang reiben, 100 Quecksilber auf 5 Platin.  
Ein Theil des Quecksilbers läßt sich von dem fertigen Amalgam  
durch Drücken zwischen Gamsleder auspressen.

Von den verschiedenen Metallen, die man mit diesem Amalgam  
zu verplatinen suchte, nehmen einige, wie Kupfer und Eisen,  
den Ueberzug schlecht an, Silber und Messing aber ziemlich  
leicht. Aber das Platin erscheint auf diese Weise dunkel, por-  
t und hängt nicht fest an, wenn man zu wenig erhitzt hat, wenn  
man zu stark erhitzt, so dringt es in das Metall selbst ein  
und verbindet sich damit, statt dessen Oberfläche zu bedecken.

Die dritte Methode ist der *nasse Weg*. Eine Metall-

n eine Auflösung eines andern Metalls taucht, schlägt bekannt-  
 letzteres nieder, wenn das eingetauchte Metall oxydirbarer  
 als das in der Auflösung befindliche; der Niederschlag aber  
 unregelmässig, bald pulverig, bald krystallinisch, und deckt  
 fallende Metall nicht continuirlich. Nach folgenden Maafs-  
 In gelang es Hrn. Melly, diese Uebelstände zu beseitigen.  
 1) Die Platinauflösung muss neutral oder alkalisch sein; 2) sie  
 sehr verdünnt und 3) warm sein ( $60^{\circ}$  C.); 4) Die Berührung  
 dem wohlpolirtem Metall darf nur kurze Zeit dauern; 5) end-  
 muss das verplattete Metall unmittelbar in reinem Wasser  
 waschen werden. Ohne Beachtung dieser Präcautionen wird  
 Platin als ein wenig haftendes schwarzes Pulver abgeschieden,  
 eses durch Reiben bald abgeht und keine Politur annimmt.  
 Von diesen drei Methoden ist die letzte die wohlfeilste und  
 leichtesten ausführbare. Man kann viele Gefässe damit über-  
 en und seine Instrumente auch selbst repariren, wenn sie  
 dhast geworden sind. Doch ist für den chemischen Gebrauch  
 Methode noch sehr unvollkommen; das Platin haftet nicht  
 genug und widersteht den Säuren nicht hinreichend. Viel-  
 t lässt sich dieses Verfahren noch vervollkommen. Die  
 lgamirung ist auch nicht so kostbar, lässt aber noch viel  
 wünschen. Das erste Verfahren ist theurer und schwieriger  
 aführen, erfüllt aber völlig den Zweck, und verdient den  
 ug.

### Methode der Stärkefabrikation aus Kartoffeln; von Völcker.

Diese 1832 in Oestreich patentirte Methode bezweckt die  
 ungung einer gröfsern Stärkeausbeute dadurch, dafs sie das  
 ebe der Kartoffeln durch Gährung und auf eine chemische  
 e weit vollständiger zerstört als gewöhnlich und daher auch  
 grossen Theil der Stärke gewinnt, welche gewöhnlich in  
 rückständen bleibt. — Die erste Eigenthümlichkeit der Me-  
 ist, dafs dazu als Material eine Kartoffelsubstanz angewendet  
 aus welcher das gewöhnliche Vegetationswasser ganz  
 wenigstens grösstentheils abgeschieden worden ist, als  
 Beispiel die bei der gewöhnlichen Kartoffelstärkefabrika-  
 abfallende Kartoffelfaser, ferner die ganze gereinigte Kar-  
 substanz, welche zum Beispiel gewonnen wird, wenn rohe  
 gesunde (oder auch gefrorne oder auch sonst schadhast  
 rdene) Kartoffeln in Stücke z. B. in dünne Scheiben geschnit-  
 werden und aus diesen der Saft durch kaltes oder besser  
 es Wasser, jedoch nicht über  $50^{\circ}$  R. erhitztes, gehörig aus-  
 gen und ausgelaugt wird. Zum Zwecke der Kartoffelstär-  
 vinnung werden mit Hülfe geeigneter Vorrichtungen zwei  
 operationen angeordnet: A. Die Zersetzung der Kartoffel-  
 nzen zu einer fein zertheilten Masse. B. Die Ausscheidung  
 Stärke aus der letztern durch mechanische Mittel.  
 Die Zersetzung geschieht durch einen Gährungsprocefs, den  
 rfinder Zerrottungsprocefs genannt hat und in welchem  
 m Vegetationswasser befreiten Kartoffelsubstanzen unter Ein-  
 ng von atmosphärischer Luft und Wärme locker unter  
 der geschichtet gehalten werden, bis sie in eine breiartige  
 Masse zerfallen, was unter zweckwässiger Behandlung in



einigen Tagen geschehen ist. Hierauf wird die zerrottete Masse in Wasser zertheilt, die Schalen und unzersetzten Theile getrennt und die Stärke durch Schlämmen und Sammeln gewonnen, worin der Erfinder dieser Methode besondere Vorrichtungen angegeben hat. (*Polytechn. Centralblatt No. 20. 1840.*)

### Bemerkung über den Dünger.

Hr. Payen in Paris zieht aus seinen vielen nützlichen Versuchen über die Bestandtheile der Pflanzen folgende Schlüsse, die auch mit mehreren Arbeiten von Boussignault übereinstimmen.

1) Jede Vegetation enthält und erfordert bei ihrem Wachsen eine beträchtliche Menge stickstoffhaltiger Substanzen.

2) Ausser der ersten Verwandlung der im Boden enthaltenen stickstoffhaltigen Stoffe sondern gewisse kräftige Pflanzen (die erschöpfendsten, wenn sie gute Ernten geben sollen) stickstoffhaltige Bestandtheile in ihrem Gewebe ab, so die Kohlarten, Tabak u. a.

3) Obwohl die atmosphärische Luft zu dieser Ernährung in Bezug ihres Stickstoffgehalts beiträgt, so ist doch die Erschöpfung des Bodens nach derartigen Ernten unwiderleglich, und erfordert Ersatz durch Düngmittel.

4) Die in dem Zellgewebe enthaltenen stickstoffhaltigen Bestandtheile zersetzen sich zuerst nach dem Tode der Pflanze und zerfallen zu gasförmigen und löslichen Producten, während das Skelet oder die Faser noch unverändert ist.

5) Dieselben Erscheinungen gehen auf den Miststätten vor sich, wo die Pflanzenreste mit den thierischen Excrementen imprägnirt sind.

6) Vor allen sind es also die stickstoffhaltigen Bestandtheile, die bei dem gewöhnlichen Dünger zuerst angegriffen, zersetzt, zerstreut und assimilirt werden durch die neue Vegetation.

7) Aus der theoretischen und practischen Demonstration dieser Thatsachen ergiebt sich, wie die Agricultur durch eine richtige Anwendung thierischer, jetzt noch so häufig vernachlässigter Ueberreste, sich verbessern kann und sich wirklich verbessert, und wie solche Reste, deren chemische Beschaffenheit und physikalischer Zustand für die Ernährung der Pflanze besonders günstig sind, wie *getrocknetes Blut*, *getrocknetes Fleisch* todter Thiere, die Abfälle von Wolle, Horn, Seide, Federn u. s. w. jetzt in Paris mit 20 — 50 Franken die 100 Kilogr. bezahlt werden, während der gewöhnliche Dünger 30 Centimen bis 2 Franken höchstens kostet. Der Pflanzendünger hat seinen Werth in Verhältniß des Gehalts an Stickstoff, welchen diese Stoffe enthalten. Die kohlenhaltigen Schaumabfälle der Zuckerraffinerien haben einen trefflichen Werth in Verhältniß der stickstoffhaltigen Substanzen, welche sie einschließen, und der fäulnißhemmenden Kraft der Kohle, welche eine zu schnelle Zersetzung verhindert. Diese Rückstände, welche sonst verworfen wurden, kosten jetzt 10 Franken die 100 Kilogr. und viele Millionen Hectoliter derselben haben seit 1825 die Fruchtbarkeit der Aecker der südlichen Departements kräftig gehoben.

## Pharmaceutisches Institut in Dresden.

Den 1. October dieses Jahrs beginnt in unserm Institute wieder ein neuer Cursus; die Herren Pharmaceuten, welche gesonnen sind, daran Theil zu nehmen, ersuchen wir hiermit, sich baldigst bei uns zu melden, damit wir die bessern Wohnungen für dieselben reserviren können.

Das Vertrauen, welches uns bisher schon so vielfach bewiesen worden ist, verpflichtet uns zu dankbarer Anerkennung und wird uns stets in unserm Streben ermuntern, die Einrichtungen unseres Instituts immer mehr zu vervollkommen.

Dr. O. R. Abendroth. Dr. Fr. Holl.

## Anzeigen.

### Verkauf von Schmetterlingen.

Eine ansehnliche Zahl seit längern Jahren in verschiedenen Gegenden des nördlichen Deutschlands gesammelter Coleopteren, bedeutend vermehrt durch Sendungen vom Rhein und Harz, aus Brasilien, Mexiko und Java, steht zu verkaufen, und das Nähere hierüber in portofreien Briefen bei dem Unterzeichneten zu erfragen.

Diese Sammlung, nach Cuvier geordnet, enthält circa 1300 species in circa 3000 Exemplaren, und zwar übersichtlich:

*Cicindela* 5 Species, *Carabi* 131, *Dyticus* 34, *Gyrinus* 3, *Staphilin* 57, *Ruprestis* 22, (darunter aus Brasilien 3, Mexico 2, und Java 2), *Elater* 49 (aus Brasilien *striatus*, *vittatus*, *noctilucus*, *leucis*, *Lampyrus*), *Telephorus* 30, *Claricornia* und *Palpicornia* 116, *Amellicornia* 128, (viele Exoten aus Brasilien, Mexico und Java) *Synchophora* 200, worunter 34 aus Brasilien, *Cerambyces* 118, darunter 32 aus Brasilien, *Donacia* 25, *Cassida* 26, (2 aus Mexico und 15 aus Brasilien) *Chrysomela* 125, (25 Brasilien, 10 Mexico) *Stenocarinella* 40, darunter 8 aus Brasilien.

Clüsener,  
Apotheker zu Greven bei Münster.

### Apothekenverkauf.

Eine privilegierte Apotheke in einer der größern Residenzstädte der Sächs. Herzogthümer, zu deren Annahme eine baare Anzahlung von circa 20,000 Thlr. C. G. erforderlich ist, soll Familienverhältnisse wegen verkauft werden.

Nähere Nachricht hierüber ertheilt

der Apotheker E. Grefsl er zu Saalfeld  
in Thüringen.



Pfd. mehr als voriges Jahr. *Crystalli Tartari* blieben fortwährend stark begehrt, insbesondere hatten die Fabriken sehr starken Bedarf von England und Rußland zu decken und nur der Höchstbietende konnte Waare erhalten. *Damarum* wird wegen der Leichtigkeit der Bereitung des Firnißs aus demselben immer beliebter, die Zufuhren stehen noch nicht im Verhältniß zum Bedarf, daher der stets gestiegene Preis. *Flor. Chamaem. Roman.* sind nach mehreren Jahren wieder einmal gut gerathen, fallen schön groß und weiß aus und sind billig. *Flor. Chamaem. vulg.* dagegen gab es nicht den sechsten Theil einer gewöhnlichen Erndte. Das Wenige wird zu übertriebenen Preisen nachwegesucht. *Flor. Malvae arbor.* haben wir auch ohne Kaputt. Mit *Flor. Rhoeados* ist es derselbe Fall wie mit *Flor. Chamaem. vulg.* Auch *Flor. Rosar.* und *Sambuci* giebt es wenig. *Flor. Aurantii* sind in ächter und frischer grüner Waare vorhanden. *Flor. Sennae Alex.* und *Tripolit.* sind ansehnlich aufgeschlagen, ist dies ein Monopol-Artikel von Mehemed Ali, der daraus Geld zu lösen versteht und die Preise bedeutend höher gesetzt hat, doch jetzt bessere Qualität lieferte. *Fructus Tamarindus*, waren starke Zufuhren aus Ostindien ein und waren vorthellhaft anzuschaffen. *Grana Tigliae*, welche so lange Zeit fehlten, giebt jetzt in frischer zum Oelpressen sich eignender Waare. *Gum. Mimosae*. Der ächte arabische ist auch ein Monopol von Egypten und es werden die Preise theils höher gehalten, theils bei einer Blockade der levantischen Häfen das Ausbleiben der jetzt schon spärlichen Zufuhren zu fürchten. Es hat den wir messen feine Waare einen ziemlich hohen Preis bedungen. Wir haben auch eine starke Post *Gum. Arabic.* von Ostindien bekommen. Diese Waare unterscheidet sich wesentlich von dem Arabischen und ist in eigenthümlicher Formation, eignet sich jedoch bei größerer Billigkeit zu pharmaceutischen Zwecken vorzüglich. Als Surrogate haben wir auch den *Gummi Embau* und *Gummi Gutt.* vorrätzig. *Hb. Melissa* ist hier gut geliefert worden. *Hb. Mentha, crisp.* und *piper.* zögerten die Lieferanten noch, aber wir die diesjährigen Preise noch nicht fest bestimmt, diese jedoch billig erwarten dürfen. *Hb. Theae* war in England Gegenstand vieler Speculationen und weil bei den Aussichten des Kriegs mit China enorme Parthien in Canton eingeladen wurden, hat der Artikel nicht so schnell steigen können. Wir haben von allen Gattungen schöne Vorräthe. *Pouchong* ist durchgängig in Chinesischen Originalen. *Hydrargyrum* ist unverändert. Das Haus Rothschild hat die Spanische nicht aus seinen Händen. In Idrien wird weiter ausgebeutet als früher und die Wiener Bergwerks-Friedrich-Verschleifs-Direction pflegt den Rothschildschen Preis zu folgen. An billigere Preise ist nicht zu denken. *Resina bonic.* haben wir nur in ganz feiner blendend weißer reiner Waare, die von keinen anderen Sorten übertrifft und zu allen chemischen Zwecken die beste ist. *Laccanum* wurde von sehr großen Zufuhren zwar im Preise herabgesetzt, doch ist auch der Abzug ansehnlich und bei den jetzigen niedrigen Preisen rüthlich, sich zu versorgen. Bei einem Seekriege Englands mit China steigen auch die Schiffpreise noch mehr als jetzt schon geschehen, und vertheuern

andere Ostindische Artikel, insbesondere auch *Kali nitric.*, der Fracht wesentlich ist. Es fallen viele von den gewöhnlichen Handelsfahrzeugen aus, welche als Kriegstransportschiffe dienen müssen. *Manna* würde heuer, wegen der vom vorigen Jahre verbliebenen Vorräthe sehr billig werden, wenn die *Racine* gut ausfiel. Es hängt deren Ausfall immer von der Ernte im August ab; nach den neuesten Berichten aus Ostindien haben Regengüsse statt gefunden und das Product gestiegen; man erwartet höhere Preise; zwar ist es noch nicht zu niedrigen, doch wird gerathen, sich bald noch mit guter jähriger Waare zu versorgen. *Mastiche* kömmt nur von Scios und das Product ist in Händen eines Pächters, daher der fortwährend hohe Preis. *Mochus Tonquin.* fehlte schon allenthalben wegen der von Canton ausgebliebenen Zufuhren. Einer von da vertriebenen Engländer hat jedoch mehrere Kisten zu uns herausgebracht. Wir haben etwas davon. Die Waare ist, doch nicht ganz so fein von Korn als unsere frühere; noch etwas frisch. *Myrrhae* steigen, besonders die blonde, welche wir vorzugsweise liefern, ist schwer zu erhalten. *Nuc. pistatae* sind in frischer Waare zu empfehlen. *Aetherische Oelen* widmen wir ein Hauptaugenmerk, garantiren Frische und Reinheit und streben bei diesem Artikel nie auf Billigkeit zu Nachtheil der Güte. *Ol. Amygdal. amar. und dulc.* empfehlen wir mit Rücksicht auf die gestiegenen Preise d. Mandeln als preiswürdig. *Ol. Anisi* haben wir auch eine ganz weifs rectificirte Waare. *Ol. Aurantior. amar. destill.* ist ein besonders feines Oel. *Ol. Citior., Bergamott. und Cedro* empfangen wir stets aus den besten Händen von Sicilien direct und können wegen starker Nachfrage billig davon abgeben. *Ol. Carvi* ist in reiner Waare billig zu stellen, da die heurige Erndte des *Sem. Carvi* durch ein Insecte fast ganz zerstört worden ist. *Ol. Flor. Aurore.* haben wir in jeder Anforderung genügender Feinheit. *Ussuri. aselli* wird in immer stärkeren Quantitäten consumirt, besonders ist der wirkliche *Bergener Leberthran* gesucht, den wir schön und ächt liefern. *Ol. Menthae pip. Anglic.* ist eine feine eigenthümliche Waare, die unerachtet des hohen Preises viele Freunde hat. Wir haben auch ausgezeichnetes *Englisches* Oel, das doppelt rectificirt sehr fein und flüchtig ist. *Amerikanische* ist spottbillig geworden. *Ol. Olivar. Provin.* ist wie alle Baumöle etwas gestiegen. Dieses Oel leidet sehr bei der Aufbewahrung in Fässern. Wir bezogen daher eine Waare in grossen falsähnlichen Krügen, und es läßt diese ganz ungeschmackfreie Waare nichts zu wünschen übrig. *Ol. Papaver.* ist, weil Mohnsaat knapp geerntet wurde; man nimmt an, daß es in Statt viel *Ol. Nucum jugl.*, welches billig steht und fein ist. *Ol. Riccini* liefern wir in frischer Waare aus Italien. Dieses Oel kommt zwar aus Amerika und Ostindien zu billigen Preisen; doch hat diese Waare gemeinlich vom Transport gelitten und hat die Linie passirt. *Ol. Rosar.* wird sicherlich steigen, wenn in der Levante ein Krieg zum Ausbruch kommt. *Therebinthinae Gallic. und Germanic.* ward sehr reichlich geliefert. Die Preise sanken bedeutend. *Opium* würde wegen Ausfalls der Ausfuhr nach China ziemlich werthlos werden, wenn das ostindische Opium sich für den europäischen

Markt eignete. Da wir jedoch nur das türkische nehmen, die hohe Pforte aber den Anbau durch ein Verbot sehr eingeschränkt hat und das gewonnene rasch von einigen großen Häusern in Stambul und Smirna aufgekauft wird, so sahen wir die Preise nicht niedriger gehen. *Rad. Althaeae* ist häufig und gut geliefert worden, ebenso *Rad. Caric. aren.*, *Calami* und *Grenu.* — Dagegen sind *Rad. Enulae* und *Saponariae* sehr knapp. *Rad. Iridis* machte sich auch knapp und theuer. *Rad. Rhei Sinauae* ist zwar etwas in leidlich guter halbmund. Waare angekommen, doch scheint uns die schöne und billige *Moscou.* mehr Beachtung zu verdienen, so lange erstere 2½ Thlr. und letztere 3½ — 3¾ Thlr. kostet. (4¾ Thlr. fol. 6 ist Druckfehler.) *Rad. Sassa-parill.* gute Waare in allen Sorten selten. *Resina Pini* haben wir in einer schönen Auswahl für die Pharmacie besonders geeigneter Gattungen. *Sapo dom. alb. e Ol. Palm.* verdrängt die Talgseife immer mehr und ist billiger; ebenso machten sich die *Stearinkernen* geltend. *Sämereien* sind als mehrentheils noch nicht geerntet noch in nominellen Preisen. Nur der Ausfall der Kümmelernte ist verschieden. *Sem. Cinue* kam in schöner grüner und reiner Waare und wurde ebenso wie *Sem. Sabadilli* billiger. *Vanilla* die bedeutend und ging sehr rasch ab. Auf unsere Bestellungen erhielten wir kaum ein Viertel. *Chemische* und *pharmaceutische Producte* erhielten sich mit wenigen Ausnahmen auf den früheren Stande. Dieses gilt insbesondere von den Säuren, von denen wir stets große Quanta umsetzen. *Ammon. carbon.* und *maris subl.* wurde von England schön und billig geliefert. *Aqua Flos Aurantiae tripl.* ist bereits in frischer Waare aus dem Süden angekommen. *Brom* dürfte billiger werden. *Calcareo anglic.* zeichnet sich ebenso durch weiße Farbe als Trockenheit und Stärke aus. *Graphites Anglic. pur. praep.* entspricht allen Erfordernissen. *Jod* und *Jodkali* sind bei besonderer Schönheit aus Pelletier's Fabrik und stehen bei uns noch billig, da man einen Aufschlag davon ankündigt. Von *Morphium* und *Veratrium* scheint die Verwendung zuzunehmen und es werden dieselben jetzt sehr rein geliefert. *Natrum carbon. cryd.* und *acid.* stehen niedrig und erfreuen sich ebenso wie die reine *Soda* eines immer wachsenden Absatzes. *Phosphorus* wird immer billiger abgelassen. Die Waare ist ganz weiß und rein. *Vernix Copal* und *Succini* lassen wir in sehr starken Partien anfertigen und erzielen dadurch billige Preise und schöne haltbare Waare. Von Farbwaaren sind *Coccionella*, *Orlean* und *chromsaures Kali* auch *Catechu* als billiger geworden anzuführen. — Die pharmaceutischen Geräthschaften liefern wir in möglichster Vollkommenheit. Die bei uns häufig vorkommenden Bestellungen auf ganze Einrichtungen für neue oder erweiterte Officinen sind Grund, daß wir uns auch hierzu sehr bestens empfohlen halten. Von Pappschachteln aller Gattungen haben wir den Debit der Fabrik des Hrn. H. Fiebig, die dermalen die schönste Waare liefert. Wir unterzeichnen mit größter Hochachtung

Gehe & Comp.

Hierneben die Preis-Liste.



Archiv und Zeitung  
des  
**APOTHEKER-VEREIN**  
in  
Norddeutschland.

---

Herausgegeben  
von  
Rudolph Brandes und Heinrich Wackernagel

---

**Vierter Band**  
im  
*Vereinsjahr der Jussieu's.*

---

Hannover.  
Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung  
**1840.**



**ARCHIV**

der

**PHARMACIE,**

eine Zeitschrift

des

**Apotheker - Vereins in Norddeutschland.**

---

**Zweite Reihe. XXIV. Band.**

**Der ganzen Folge LXXIV. Band.**

---

**Herausgegeben**

**Mitwirkung der HH. Bley, Bolle, Duflos, Du Mênil, Forcke,  
el, Herzog, Jahn, Ingenohl, Jobst, Lipowitz, Planer, Riegel,  
Scheffler, Simon, Vassmer, Wagner**

von

**udolph Brandes und Heinrich Wackenroder.**



---

**Hannover.**

**Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung.**

**1840.**



# Inhaltsanzeige.

## Erstes Heft.

### Erste Abtheilung.

#### Vereinszeitung.

*Vereinsangelegenheiten.* Die von Humboldt'sche Versammlung, die Generalversammlung des Apothekervereins in Norddeutschland, gehalten zu Leipzig am 8. und 9. September 1840 S. 1. — Droguenausstellungen bei der Generalversammlung in Leipzig 13.

### Zweite Abtheilung.

#### Chemie.

##### Erster Abschnitt.

Seite

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| über die Camphene; von E. Soubeiran und H. Capitaine. (Schluß der S. 197 Bd. XXII. 2. R. abgebrochenen Abhandlung)..... | 17 |
| über die Natur der in den Deckblättern der Haselnüsse ( <i>Corylus Avellana</i> ) enthaltenen Säure; von F. Jahn.....   | 28 |
| Untersuchung der <i>Radix Hellebori nigri</i> ; vom Apotheker E. Riegel in St. Wendel.....                              | 30 |
| über ein neues Alkaloid in der Pereirarinde; von J. Pelletier.....                                                      | 38 |

##### Zweiter Abschnitt.

#### Centralbericht.

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| über die Constitution oxalsaurer, salpetersaurer, phosphorsaurer und schwefelsaurer Salze und der Chlorüre..... | 39 |
| Verbindungen des Zuckers mit Basen.....                                                                         | 48 |
| Klebzucker - Bleioxyd.....                                                                                      | 49 |
| Untersuchung von Milchsäure.....                                                                                | 49 |
| Chlor und Ueberchlorsäure.....                                                                                  | 50 |
| Phosphoroxyd.....                                                                                               | 51 |
| über die Verbindungen der Phosphorsäure mit Wasser.....                                                         | 52 |
| über die Darstellung der Unterschweiflichtsäure.....                                                            | 53 |
| Verbrennung des Kohlenstoffs in Roheisen und Stahl.....                                                         | 55 |
| über Silberoxydul.....                                                                                          | 56 |
| Bildung von Kobalt und Mangan.....                                                                              | 57 |
| Verhalten der Baryt- und Strontiansalze vor dem Löthrohr.....                                                   | 57 |
| Analyse des Schießpulvers.....                                                                                  | 58 |
| Agamirung von Zinkplatten zu Faraday'schen Säulen.....                                                          | 58 |
| Untersuchung der Clevner Trauben, besonders in Bezug auf ihre Arome.....                                        | 59 |
| Untersuchung der Datteln.....                                                                                   | 59 |
| Landtheile der <i>Aloe margaritifera</i> .....                                                                  | 60 |
| Naturhistorische Untersuchung der Maikäfer.....                                                                 | 60 |

### Dritte Abtheilung.

#### Mineralwässer.

|                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Heilquellen von Darú-Vár im Pösganer Comitát in Ungarn, untersucht im Jahre 1839; von Daniel Wagner, Doctor der Chemie und Apoth. in Pesth..... | 61 |
| Schwefelquelle zu Mengolsheim.....                                                                                                              | 81 |
| Therme auf Aegina.....                                                                                                                          | 81 |
| über das Mineralwasser von Hammanmar Kutin.....                                                                                                 | 82 |

### Vierte Abtheilung.

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Naturgeschichte und Pharmakognosie.                                                                                              |    |
| über das Vorkommen des Mangans in mineralogischer, bergmännischer und merkantilischer Hinsicht; von C. Scheffler in Ilmenau..... | 82 |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Ueber den Strontianit von Hamm in Westphalen; von Rudolph Brandes..... | 9  |
| Notiz über die Quecksilberbergwerke von Almaden .....                  | 9  |
| Neues Vorkommen selenhaltiger Mineralien.....                          | 9  |
| Ueber die <i>Mikania Guaco</i> ; von J. Fr. Jobst.....                 | 9  |
| Ueber den Ursprung mehrer Drogen; von J. Lindley.....                  | 10 |

### Fünfte Abtheilung.

#### Arzneimittelprüfung.

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bemerkungen zu der Untersuchung des Baumöls mit Chlorkalk; vom Apotheker A. Lipowitz in Lissa..... | 10 |
| Ueber die Prüfung der fetten Oele mittelst Chlorkalk; von Rudolph Brandes.....                     | 11 |
| Prüfung ätherischer Oele auf Verfälschung mit Alkohol.....                                         | 11 |
| Falsche Bernsteinsäure.....                                                                        | 11 |
| Untersuchungsmethode der China.....                                                                | 11 |
| Verfälschung des schwefelsauren Chinins.....                                                       | 11 |

### Sechste Abtheilung.

#### Miscellen.

|                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ueber das Einbringen von Gyps in die Papiermasse S. 115 —                                                                                                                                                                                    |  |
| Drummond's Licht zu gewöhnlichem Gebrauch 116. — Ueber die Entfärbungskraft der aus degelatinirten Knochen bereitete Kohle 117. — Feuersichernder Anstrich 117. — Wagenschmier 117. — Schützung der Kühlröhren von Zinn gegen Oxydation 117. |  |

### Siebente Abtheilung.

#### Allgemeiner Anzeiger.

|                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| I. Anzeiger der Vereinszeitung. Notizen aus der Generalcorrespondenz des Directoriums S. 118. — Kaufgesuch einer Apothekentafel 118. — Dienstgesuche 119. — Verkaufsanzeige 119. |  |
| II. Anzeiger der Verlagshandlung S. 119.                                                                                                                                         |  |

### Zweites Heft.

#### Erste Abtheilung.

##### Vereinszeitung.

Kurzer Lebensabriss des Professors Dr. Franz Wilhelm Schweigger-Seidel; von Dr. L. F. Bley S. 121.

2) *Vereinsangelegenheiten.* Wohlwollende Anerkennung des Vereins. (Forts. von Bd. XXIII. 2. R. S. 127 des Archivs) S. 125. Bericht über die Kreisversammlung zu Blankenburg am 12. Aug. 1840 126. — Bericht über die Versammlung des Kreises Bernburg am 29. Aug. 1840 128. — Kreisversammlung in Driburg am 2. Sept. 1840 131. — Eintritt neuer Mitglieder 132. — Todesanzeige 132.

3) *Gelehrte Gesellschaften.* Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin S. 133. — Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg 133. — Königliche Societät der Wissenschaften in London 133.

4) *Personalnotizen* 134.

#### Zweite Abtheilung.

##### Chemie.

##### Erster Abschnitt.

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ueber einige Concretionen, in vierfüßigen Thieren gefunden; vom Hofrath Dr. Du Ménil..... |  |
| Ueber Haemacyanin, den blauen Blutfarbstoff; von Dr. Franz Simon.....                     |  |

## Inhaltsanzeige.

VII  
Seite

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| ische Untersuchung eines milchartig aussehenden Blutwas- |     |
| rs; von Carl Frenzel in Erfurt.....                      | 141 |
| die Löslichkeit des Harnsteins und des phosphorsauren    |     |
| alks im Zuckerwasser; vom Ap. Vafsmer.....               | 144 |
| den quantitativen Jodgehalt des Leberthrans und die      |     |
| rüfung desselben auf Jod; von H. Wackenroder.....        | 145 |
| ische Untersuchung über die Bitume; von Pelletier und    |     |
| Valter. Erster Theil.....                                | 151 |
| se einiger bitumin. Substanzen; von Boussignault.....    | 160 |
| die Wirkung der Schwefelsäure auf Untersalpetersäure     |     |
| nd die Theorie der Fabrikation der Schwefelsäure; von    |     |
| . de la Provostaye, Prof. am Collège Louis le Grand      | 162 |
| sch-pharm. Notizen; vom Ap. A. Lipowitz zu Lissa ..      | 174 |
| Dr. Böttger's Haarvertilgungsmittel; von C. A. Inge-     |     |
| ohl, Ap. zu Hooksiel.....                                | 176 |
| na.....                                                  | 178 |
| die Darstellung von farblosem wasserklaren Mandelöle;    |     |
| on Rudolph Brandes.....                                  | 181 |

### Zweiter Abschnitt.

entralbericht: Ueber den Mineralkermes S. 182. — Sal-  
ildung und Erzeugung von Salpetersäure und Ammoniak 191.  
halten der Schwefelsäure zur Arseniksäure 197. — Jodsäure  
— Die giftige Substanz in *Lolium temulentum* 198. — Ueber  
ches Gummi, Stärke und Zucker in ihren Verbindungen mit  
yd 200. — Ueber den Krümelzucker 201. — Xyloidin 202.  
ürag zur Charakteristik der Alkaloide 204. — Reaction der  
oxydsalze auf Morphin 205. — Salicin 205. — Ueber Anemo-  
6. — Cubebin 207. — Aetherisches Oel der Lindenblüthen  
lunderblüthen 207. — Aetherisches Petersilienöl 208. — Pfef-  
zöl 209. — Formomethylal 210. — Fette Oele 211. — Ueber  
ersetzung des Amygdalins durch Emulsin 212. — Bereitungs-  
n Cyankalium 213. — Bereitung des Cyankaliums und Kali-  
ats 214. — Notiz über Bereitung von Schwefelcyan-Kalium  
ine dabei erhaltene neue Verbindung 214. — Einfache Be-  
gsart von Schwefelcyan-Kalium 215. — Ueber einige Eisen-  
ate 215. — Eisenjodür 217. — Tinctura Ferri acetici aetherea 217.

### Dritte Abtheilung.

#### Allgemeiner Anzeiger.

*Anzeiger der Vereinszeitung.* Notizen aus der Generalcor-  
ndenz des Directoriums S. 220. — Anzeige 220. — Gehülfen-  
tützungs-Angelegenheit 221. — Handelsnotizen 221. — Her-  
-Anzeige 223. — Dienstgesuche 223. — Apothekenverkäufe 223.  
*Anzeiger der Verlagshandlung* S. 224.

### Drittes Heft.

#### Erste Abtheilung.

##### Vereinszeitung.

*Vereinsangelegenheiten.* Directorialconferenz zu Salzuflen  
Oct. 1840 S. 233. — Directorialconferenz zu Salzuflen am  
1. 1840 234. — Nachricht an die Herren Mitglieder des Krei-  
ernburg 235. — Nachricht an die Herren Mitglieder des Krei-  
raunschweig 235. — Nachricht für die Herren Mitglieder des  
s Sondershausen 235. — Eintritt neuer Mitglieder 236. —  
derung, die Einzahlung der Beiträge zur Generalkasse für 1841



betreffend 236. — Die Antrittszeit der Apothekergehülfen betreffend 236. — Generalrechnung des Apothekervereins in Norddeutsches Land vom Jahre 1839 237. — Bericht über die Kreisversammlung zu Ronneburg 265.

2) *Medicinalwesen.* Einige Erörterungen über den Inhalt des Verhältnisses der Apothekergehülfen, von Dr. Geiseler, Dr. C. Herzog, Apoth. zu Braunschweig 266. — Bemerkung über den Aufsatz des Apothekers Hrn. Dr. Geiseler, über das Verhältniss der Apothekergehülfen; von Otto Planer, Dr. in Arnstadt 270. — Bemerkung in Verfolg der beiden vorhergehenden Aufsätze 273.

## Zweite Abtheilung.

### Chemie.

#### Erster Abschnitt.

Ueber die Zusammensetzung der Galle; von Berzelius...  
Ueber die Mischung und einige Eigenschaften des sauren äpfel-  
sauren Kalks, von H. Wackenroder.....  
Bemerkungen über verschiedene Gegenstände; vom Apotheker  
Bolte in Angermünde .....

#### Zweiter Abschnitt.

Centralbericht: Krystallisirtes Elemiharz S. 301. —  
cedanin 303 — Ueber Salicin 304. — Ueber die Holzsubstanz  
— Darstellung der Aepfelsäure 307. — Dichtigkeit des Destillir-  
Essigsäure 309. — Verbindung von Harnsäure und Schwefel  
309. — Wasserfreie Phosphorsäure 310. — Ueber eine organische  
in käuflicher Salzsäure vorkommende Substanz 311. — Einwirkung  
der Salzsäure auf Zucker 312. — Harnstoff 313. — Ueber die  
Genwart des Gallenfarbstoffs im Blute eines gelbsüchtigen Menschen  
315. — Verbreitung des Gallenfetts 316. — Jodnatrium 317.

## Dritte Abtheilung.

### Arzneimittelprüfung.

Ueber die englische Bleiglätte; vom Apoth. Forcke in Weimar  
nigerode.....  
Arsenhaltiger Phosphor.....  
Beachtung des Moschus.....  
Betrügerei mit Moschus.....  
Catechu.....

## Vierte Abtheilung.

### Literatur und Kritik.

Theorie und Praxis der pharmaceutisch-chem. Arbeiten etc.

## Fünfte Abtheilung.

### Allgemeiner Anzeiger.

1) *Anzeiger der Vereinszeitung.* Notizen aus der Correspondenz des Directoriums S. 326. — Gehülfen-Unterstützung Gelegenheit 326. — Handelsnotizen 327. — Anzeige 328. — Verkauf 328. — Seidene Beutelgaze 328. — Preise der Beutelgaze bei Alb. Jüngst in Dresden, Webergasse No. 145. 329. — Apothekenverkauf 329.

2) *Anzeiger der Verlagshandlung* S. 329.

Register zu Bd. XXI. XXII. XXIII. XXIV. der zweiten Reihe des Archivs. Jahrg. 1840 S. 331.

11. Vereinsjahr der Jussieu's. 1840.

November.

**ARCHIV**  
**DER PHARMACIE,**  
eine Zeitschrift

des

Arznei- und Apotheker-Vereins in Norddeutschland.

zweite Reihe. Vierundzwanzigsten Bandes zweites Heft.

Erste Abtheilung.

**Vereinszeitung,**

redigirt vom Directorio des Vereins.

Lebensabriss des Professors Dr. Franz  
Wilhelm Schweigger-Seidel;

von

Dr. L. F. Bley.

Wenn der Tod einen um Wissenschaft und Menschenwohl verdienten Mann nach einer langen und segensreichen Laufbahn, so beklagen wir schmerzlich den Verlust, sehen aber Freude auf den langen und wohlthätigen Wirkungskreis, aus ihm die Blüthen und Früchte zu einem Kranze der Erinnerung über dem Aschenhügel des Vollendeten sammelnd, aber unser Herz trauert um das Hinscheiden eines Freundes, der in den Jahren der kräftigsten Entwicklung schon den Tod, wie der Wissenschaft entrissen ward, so vereinigt sich mit dem Schmerze das Gefühl der Wehmuth, daß so früh schon ein so vielversprechendes Leben uns entzogen ward, an dessen Dasein noch die Hoffnungen schöner und reicher Wirksamkeit geknüpft hatten, und ein solches Gefühl ist es, welches unsern Geist bemächtigt bei dem Gedenken des frühen Ablebens.

bens Schweigger-Seidel's: denn an ihm verlor die V. einen höchst achtbaren Bürger, der Staat einen rechtschaffen wohlthätigen geschätzten und anspruchslosen Beamten, der Kreis seiner Familie einen liebenden Gatten und Vater, die Freunde einen gemüthvollen geistreichen Freund, die Wissenschaft einen bescheidenen, wahrheitsliebenden gediegenen Forscher und Beförderer. Franz Wilhelm Schweigger-Seidel wurde geboren am 16. Oct. 1795 zu Weissenfels im Reich Sachsen, jetzt der preuss. Provinz Sachsen, wo sein Vater C. A. G. Seidel als Privatgelehrter lebte.

Im Jahre 1797 zog er mit seinen Eltern nach Dessau, sein Vater im Jahre 1800 als Lehrer, später als Inspector der Töchterschule angestellt wurde. Unser Schweigger-Seidel besuchte bis zu seinem 17. Jahre die Hauptschule in Dessau, ging dann nach Leipzig, um in der Apotheke des Hrn. Neumann sich der Pharmacie zu widmen, wo er vier Jahre lang bis zum Jahre 1815 blieb, sodann in mehreren Apotheken, als in Hamburg, Dessau, Chemnitz und München als Gehülfe condidit.

Die Aussicht, beim Mangel an Vermögen als Apotheker sich doch eine sorgenfreie Existenz zu gewinnen, so wie der Hang zum Studium der Naturwissenschaften zu bestimmen, bestimmten ihn, im Herbst 1820 nach Halle zu gehen, sich an dasiger Hochschule der Arzneiwissenschaft zu widmen. Von Natur mit schönen Geistesgaben ausgerüstet, und mit seltenen Fleiß verbindend, erwarb er sich bald umfassende Kenntnisse, nicht bloß in den Zweigen der Medicin, sondern auch der Naturwissenschaft, die ihn mächtig anzog. Bald wurde er mit dem als Physiker hochverdienten Professor Schweigger näher bekannt und nahm, im Herbst 1822, wenige Monate nach dem Tode seines Vaters, aus Achtung gegen die letzte Wunsche eines auf einer wissenschaftlichen Reise in Sicilien sam ermordeten, berühmten Naturforschers, des vormaligen Professors der Botanik zu Königsberg, August Friedr. Schweigger, den Familiennamen desselben, gewissermaßen als Adoptivsohn, mit landesherrlicher Genehmigung an. Am 19. Juni 1823 erwarb er sich durch öffentliche Vertheidigung seiner langdisputation die medicinische und chirurgische Doctorwürde machte im darauf folgenden Winter den Coursus der medicinischen Staatsprüfung in Berlin, erwarb so die Approbation als practischer Arzt und Operateur für die preuss. Provinz. Im Sommer 1825 kehrte er nach Halle zurück, ließ sich als ausübender Arzt nieder, und begann noch in demselben Jahre seine Vorlesungen über die pharmaceutischen und medicinisch-chemischen Disciplinen auf dasiger Universität und wurde am 13. Mai 1826 *pro facultate docendi*. Im September 1826 ernannte ihn die naturforschende Gesellschaft zu Halle zu ordentlichen Mitgliede, im Juli 1826 der Apothekerverein nördlichen Deutschland zum Ehrenmitgliede, im August desselben Jahrs die medicinisch-chirurgische Societät zu Berlin zu correspondirenden Mitgliede. Im November 1828 wurde er ordentliches Mitglied des thüringisch-sächsischen Vereins für die forschung vaterländischen Alterthums und im August 1829 correspondirendes Mitglied der Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde u. a. m. Unterm 28. Dec. 1827 wurde



ernannt und Ostern 1829 Director des von ihm errichteten chemisch-pharmaceutischen Instituts. Im Jahre 1830 verheirathete er sich mit Theodorine, geborne Schubert, welche ihm, nachdem sie ihm eine Tochter geboren, im Herbst 1831 durch die Cholera entrissen ward. Später schloß er eine zweite Ehe mit der jüngern Schwester seiner ersten Gattin, von der ihm drei Kinder, zwei Töchter und ein Sohn, geboren wurden. In dem Jahre 1825 übertrug ihm Professor Schweigger die Mitredaction des Jahrbuchs der Chemie und Physik, einer Zeitschrift des wissenschaftlichen Vereins zur Verbreitung von Naturkenntniß und höherer Kultur, welches er vom Jahre 1829 allein herausgab bis zum Jahre 1834, wo er sich mit dem Professor Erdmann in Leipzig zur gemeinschaftlichen Herausgabe des Journals für praktische Chemie vereinigte, bis diese gemeinschaftliche Redaction durch Rücktritt Schweigger-Seidel's unterbrochen wurde. Geschäfte der Redaction unterzog er sich mit Fleiß und tiefer Sachkenntniß, wobei ihm seine umfassenden literarischen Kenntnisse sehr zu statten kamen. Er hatte den Plan, in Halle eine vierte Apotheke zu etabliren und erfreute sich dabei der Genehmigung des hohen Ministeriums, kaufte bei der Realisirung dieses Plans ein geräumiges Haus mit ansehnlichem Gehöfte, als sich von mehreren Seiten unerwartete Schwierigkeiten in den Weg stellten, welche endlich nach viel Verdrießlichkeiten die Aufgabe jenes Planes zur Folge hatten. Der Kauf des Hauses, welcher bei dem damaligen günstigen Besuche der Universität nicht ohne Aufwand einer ansehnlichen Summe zu bewirken war, wurde hernach noch die Veranlassung vieler Sorgen für den Käufer. Er hoffte späterhin dieselben durch Errichtung des pharmaceutischen Instituts weniger drückend machen, doch war dasselbe bei dem abnehmenden Besuche der Studirenden der Universität Halle überhaupt nie stark betheiliget, obschon eine Zeitlang ein sehr gediegener Practiker, Dr. Los, ihm als Assistent zur Seite stand und Prof. Schweigger-Seidel seinerseits vollkommen die Fähigkeiten eines guten Lehrers besaß. Obgleich ihm für das Institut von Seiten des hohen Ministerii der Geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten eine ansehnliche Unterstützung an Geldmitteln zufließte, so war doch seine Lage bei den übernommenen Verbindlichkeiten und seiner wachsenden Familie keineswegs heilighen, und um die nothwendigen Subsistenzmittel zu erringen, sah der Heimgegangene sich genöthigt, durch literarische Arbeiten sich Nebenverdienst zu verschaffen, zu dem er die Zeit zum Theil durch Benutzung der der Ruhe gehörigen Stunden aufschwenden suchte, was seine schwächliche Körperconstitution nicht lange ohne nachtheiligen Einfluß auf seine Gesundheit ertrug. Bald stellte sich eine hartnäckige Nervenreizbarkeit ein, die ihn in den letzten Jahren oft gänzlich an Arbeiten absetzte und hin und wieder fälschlich beurtheilt ward, woraus seine Lage noch kummervoller wurde, woraus sich denn auch erklärt, daß er die ihm von Seiten einiger gelehrten Freunde übertragene Beihülfe an einem großen literarischen Unternehmen, trotz dem besten Willen und mehrfachen Versuchen, nicht gewähren konnte. Zur Beseitigung seines Krank-

heitszustandes ward ihm die Benutzung der Carlsbader Heilquellen empfohlen, zu der er auch im Sommer 1827 schritt, aber leider ohne den gewünschten Erfolg, vielmehr kam bald nach seiner Rückkehr ein Brustleiden zum Ausbruche, welches am 6. Juni 1838 seinem Leben ein frühes Ziel setzte.

Außer seinen Verdiensten, welche er sich durch gewissenhafte Erfüllung seiner Amtspflichten in frühern wie spätern Verhältnissen erworben, hat er sich solche besonders noch durch die sehr gründliche Redaction seines Jahrbuchs der Chemie und Physik, von welchem er 6 Bände in Verbindung mit Professor Schweigger und 11 Bände allein herausgab, so wie durch die Mitredaction des Journals für practische Chemie in Verbindung mit Professor Erdmann und durch mehrere andere Schriften Ansprüche auf die Anerkennung des chemischen Publicums erworben, und zwar um so mehr, als er auf sein Jahrbuch auch dann noch den gründlichsten Fleiß verwendete, als dasselbe bei der Concurrenz vieler chemischer Zeitschriften in den letzten Jahren aus dem Gesichtspuncte des Erwerbs betrachtet, nichts weniger als gewinnbringend war. Schmerzlich war es ihm, daß seine Krankheit ihn verhinderte, einem gegebenen Versprechen, über die letzten Bände noch ein Register zu liefern, nachzukommen.

Seine ganze Richtung war, obschon er aus der Schule der Praxis hervorgegangen, doch mehr eine theoretische, wie fast alle seine Arbeiten beweisen. Als Literator stand er auf einer seltenen Stufe umfassenden Wissens, aber auch als Practiker waren seine Arbeiten ausgezeichnet, wie er denn den Plan hatte, einige ausführlichere practische Arbeiten, eine große Reihe chemischer Untersuchungen über die Zerstörung von Bitteren durch Salzsoole betreffend, und eine Anleitung zur Prüfung des Mehls verschiedener Getreidearten durch den Druck zu veröffentlichen, was sein früher Tod leider verhindert hat.

Die letzte Arbeit des Verfassers, welche mir bekannt geworden, ist der Anhang zu meiner kleinen Schrift: »Die Zuckerreitung aus Runkelrüben in ihrer Beziehung zur deutschen Landwirthschaft,« erste und zweite Auflage, welche ohne mein Zuthun von dem verstorbenen Freunde abgefaßt und meiner Schrift beigelegt wurde, als ich ihm das Manuscript für sein Journal gesandt hatte, wie er dieses ausdrücklich in der Schrift, erste Aufl. S. 115 mit dem Beifügen erklärt hat, daß ich jedoch in der Hauptsache nach vollkommen mit ihm einverstanden sei, was völlig mit der Wahrheit übereinstimmt. Obschon der Tod, welchen der edle Verfasser besonders gegen das Ende seiner Lebenschrift anstimmte, ein sprechendes Zeugniß ist von seinem damaligen kränklichen Zustande, indem derselbe, sein baldiges Auftreten aus seinem irdischen Wirkungskreise ahnend, dies aussagte, welche Ahnung denn leider nur zu bald in Erfüllung ging, so enthält diese letzte Arbeit doch auch goldene Werthe der Beherzigung: denn, indem er sich gegen die Unwissenheit und von der Zeit, wie er, und mit ihm viele einsichtige ruhig prüfende Männer, voraussagten, jetzt ganz und gar nach Verdienst gewürdigte Anpreisung erklärte, sprach er: »der Sachkundige, jeder Wahrheitsfreund, jeder Rechtliche wird dieser verderblichen Richtung der Zeit entgegentreten, vor alle



t dazu berufen der Pfleger und Lehrer jener Wissenschaft, welche das Licht der Wahrheit fast über alle Gebiete der menschlichen Betriebsamkeit ausgießt, und der die Gewerbe den größten Theil ihrer raschen Fortschritte und die Grundlagen ihres hohen Aufschwungs verdanken, welcher die neueste Zeit so vortheilhaft auszeichnet — der Naturforscher. Er sät den Weizen und pflüget die keimende Saat; sein Beruf ist es aber auch, das Unkraut auszurotten, welches so leicht vernichtend hervorwuchert. Er ist vor andern dazu berufen, für die Wahrheit den Schild zu erheben, und zwar allein um der Wahrheit willen, vor allen den zum Kampfe auffordernd, der die Farbe der Wissenschaft und Wahrheit trägt, um unter dieser Maske die falsche Götter niederer Abkunft zu werben.«

In diesem Sinne der Wissenschaft und der Wahrheit zu wirken, um ihrer selbst willen, in diesem Sinne nach Kräften innerhalb eines Kreises zu wirken, darnach hat der Vollendete nicht selten hart geprüfter Begeisterung jederzeit gestrebt.

Dieses anzuerkennen sei denn jetzt unsere, der Nachlebenden, Pflicht. Wohl dem, der mit innigster Ueberzeugung sich ein solches Zeugniß geben kann. Er gehört unstreitig den edelsten Menschen an, und verdient ein hochachtbares ruhmvolles Andenken aller guten, den wahren Zwecken des Lebens Nachlebenden. So sei denn dankbar bewahrt sein Name und ihm nicht die Erde über seiner Ruhestätte, die er lebend und wirkend hier nicht fand, und seinem Geiste in den Gefilden unergänglichen Lichts der volle Genuß der ewigen Wahrheit, wozu er lebenslang gerungen!

## 2) Vereinsangelegenheiten.

### Wohlwollende Anerkennung des Vereins.

(Fortsetzung von Bd. XXIII. 2. R. S. 127 des Archivs.)

#### XVI.

Nach Empfang Ihrer Eingabe vom 12. Jun. vorigen Jahres, Anerkennung des Apothekervereins in Norddeutschland für hiesige Fürstl. Land betreffend, haben wir dem Vereinsmitgliede, Hrn. Hofapotheker Dufft allhier, zur weitem Mittheilung an Sie eröffnet, daß wir in Anerkennung der wohlthätigen, wissenschaftlichen Wirksamkeit des Vereins nicht nur der weiteren Ausbreitung im hiesigen Fürstenthume keine Schwierigkeiten entgegenstellen werden, sondern auch gern bereit sind, demselben, wo sich die Gelegenheit dazu bietet, förderlich zu sein. Indem wir Ihnen solches, Ihrem durch Hrn. Hofapotheker Dufft uns neuerlich mitgetheilten Wunsche gemäß, durch annoch schriftlich zu erkennen geben, überlassen wir Ihnen, in vorkommenden Fällen etwaige Wünsche und Vorschläge bei uns anzubringen.

Rudolstadt, den 29. Sept. 1840.

Fürstl. Schwarzburg. Regierung.

Hormeyer.

den Hrn. Hof- u. Medicinalrath etc.

Dr. R. Brandes in Salzuflen.

## Bericht über die Kreisversammlung zu Blankenburg am 13. August 1840.

Zu der von dem Hrn. Vicedirector Dr. Herzog auf heute am hiesigen Orte angesetzten Versammlung der Mitglieder des Kreises Braunschweig vom norddeutschen Apothekervereine hatten sich folgende Herren eingefunden: Vicedirector Dr. Herzog, Kreisdirector Völker aus Braunschweig, Giseke aus Eisleben, Hornung aus Aschersleben, Schultz aus Calvörde, Heinemann aus Langelsheim, Büttner aus Salzwedel, Lichtenstein aus Helmstedt, Senff aus Oebisfelde, Bauersachs aus Sömmerda, Corvinus aus Schöppenstedt, Hampe von hier, Riemann, Apotheker aus Hamburg, und der Unterzeichnete; imgleichen der Hr. Pastor Rimrod aus Quenstedt, Böttcher, Hütteneleve aus Eisleben. Nachdem der Vicedirector die Gründe dargelegt, welche ihn veranlaßt, die heutige Versammlung zu veranstalten, würdigte er die Vorwürfe, welche Hr. Professor Liebig der Pharmacie kürzlich gemacht hat, darauf den schönen Zustand unsers Vereins und zeigte an, daß das nächste Jahr dem Andenken des Geh. Rath's Freiherrn v. Hanboldt gewidmet werden würde, von dessen Leben ein kurzer Entwurf von ihm vorgetragen wurde.

Darauf sprach der Apotheker H. Lichtenstein über die Verbindung, welche der Phosphor bildet, wenn er unter Wasser mit Metallen bei der gewöhnlichen Temperatur längere Zeit in Berührung bleibt, woraus sich die Resultate ergaben, daß durch Antimon der Phosphor dunkel, das Antimon schwarz wurde, Arsen ward schwarz; Blei wird am leichtesten angegriffen, schon nach drei Tagen wird der Phosphor schwarz; Eisen wird langsam angegriffen, Kupfer wird schneller angegriffen und fast Phosphor schwarz; Platina wird langsam angegriffen; Quecksilber geht leicht Verbindung mit Phosphor ein; Silber verbindet sich langsam mit Phosphor, so wie auch Wismuth, Zink gleichfalls langsam; Zinn geht keine Verbindung ein.

Der Hr. Vicedirector Dr. Herzog sprach darauf über Arsenik, und dessen Entdeckung in Fällen von Vergiftung, erzählte die Geschichte des Arseniks kurz vor; knüpfte daran die besten Methoden, die Gegenwart des Arseniks zu erkennen, und erwähnte die günstige Wirkung des Eisenoxydhydrats als Gegenmittel bei Arsenikvergiftung. Dann wurden Experimente vorgezeigt, wodurch das Arsenik bei Vergiftungen dargestellt wird, und der Marsh'sche Apparat in mehreren Abänderungen durch die erforderlichen Versuche erläutert, wobei sich der Unterschied zwischen Antimon und Arsenik deutlich zeigt, indem bei jenem Chlornatrium ohne Wirkung ist, wogegen ein Anflug von Arsenik sofort gelöst wird. Werden die Dämpfe des brennenden Arsenikwasserstoffs von einem Tropfen Wasser auf einer Porcellanscheibe aufgenommen, so zeigt salpetersaure Silber-Ammoniaklösung sogleich die gelbe Färbung, wogegen Antimonwasserstoffgas eine geringe weißliche Trübung zeigt. Wird in einer gebogenen Röhre Arsenikwasserstoffgas entzündet, und der obere Schenkel derselben durch eine Weingeistflamme erhitzt, so zeigt sich sogleich ein Arsenikanflug; bei Antimonwasserstoffgas ist der Anflug weißer. Hr. Dr. Herzog hatte

nochen, wenn sie gebrannt waren, auf diese Weise Spuren von Arsenik erhalten. Die Reductionsmethoden von Berzelius und Runge wurden gleichfalls rühmend erwähnt.

Hr. Apotheker Schultz knüpfte daran die Geschichte einer Arsenikvergiftung an seinem Orte, wobei besonders merkwürdig war, daß fast keine Schmerzen vor dem Tode der Vergifteten vorhanden zu sein schienen, obgleich die Todte über eine Unmenge saure verschluckt haben mochte, welche erst mehrere Tage nach dem Verschlucken ihre Wirkung äußerte; derselbe empfahl als Gegenmittel das Tabacksdecoct. Ferner empfahl derselbe eine bedeutende Menge Fuselöl und empfahl den Namen des Hrn. H. G. Freytag in Vollmirstadt.

Schließlich empfahl derselbe dem geehrten Directorium die Fortführung des Lesezirkels in unserm Vereine.

Hr. Vicedirector zeigte ferner einen Apparat, um durch Electrolyse nach der Erfindung von Jacobi in Petersburg Abdrücke von Kupferplatten anzufertigen, und lehrte die Anfertigung von Lichtbildern mittelst des salpetersauren Silbers. Hr. Lichtenstein selbst bereitete Opium mittelst des Einritzens von noch nicht reifen Köpfen des *Papaver ferum*, so wie auch ein solches aus den Stengeln, welches dadurch unterscheidet, daß es fast ohne Geruch ist, und so fest ist; der ausgepresste Saft gab kein Opium, sondern beim Eindicken sogleich in Gährung über, wodurch der Saft völlig verschwand.

Am Schlusse zeigte der Hr. Vicedirector eine Vorrichtung zum Füllen von Flaschen mit gashaltigen Flüssigkeiten, so wie eine Heber, um Flüssigkeiten umzufüllen, ohne daß der Boden aufgerührt wird, und eine Sammlung von Chinasorten, Senfblätter, Galläpfel, Copale, Harnsteine, so wie mehrere Zerfallsproducte der Zimmtsäure und Benzoesäure mittelst Chloroform, Lactucaöl, die Verbindung des Harnzuckers mit Kochsalz und verschiedene andere chemische Präparate vor, bemerkte einmündig die nicht pünktlich erfolgende Absendung der Journale des Lesezirkels, und trug auf die Trennung des Kreises in zwei verschiedene Kreise an, da der Kr. Braunschweig für einen Kr. jetzt zu reich an Mitgliedern sei. Derselbe machte auf die Befolgung Art. 40. der neuen Statuten aufmerksam, welcher bestimmt, daß von jedem Lehrling bei dem Antritte der Lehrjahre 2 Thlr. zu der Casse der Gehülfen-Unterstützung zu zahlen sind. Auch erwähnte derselbe zu der Unterstützung des Collegen Biedermann auf, welcher durch Einschlagen des Blitzes um sein ganzes Vermögen gekommen ist, und erwähnte des Verlustes, welchen der Kreis durch das am 1. Juli erfolgte Ableben des wackern Hrn. Vogel in Gittelde erlitten hat. Am Ende wurde noch die Abrechnung von der Casse unsers Kreises vorgelegt, und die Sammlung mit dem Danke an die Gegenwärtigen und Vorversand des Protocolls geschlossen.

Als Versammlungsort im nächsten Jahre wurde Helmstädt vorgeschlagen, wenn nicht gerade die Naturforscher und Aerzte in Braunschweig zusammenkämen.

A. Lichtenstein, Dr.



## Bericht über die Versammlung des Kreises Bernburg am 29. August 1840.

Zu der Versammlung hatten sich auf Einladung des Vorstandes eingefunden:

Hr. Hofrath Dr. Brandes, Oberdir. des Vereins, Hr. Burch Bunge, Hr. Medicinalrath Dr. Piper, Hr. Dr. Heinecke jun., Hr. Apotheker Walther, Hr. Jannasch aus Bernburg, Hr. Dr. Piedrer jun., Hr. Apoth. Senst aus Nienburg, Hr. Apoth. Zimmermann aus Calbe, Hr. Apoth. Jannasch aus Barb., Hr. Apoth. Baldenius aus Dessau, Hr. Apoth. Hornung aus Aschersleben, Hr. Apoth. Blankenburg aus Sandersleben, Hr. Kreisdirector Giseke aus Eisleben, Hr. Berg- und Hütten-eleve Böttcher aus Hettstedt, Hr. Apoth. Weber aus Alsleben und Hr. Vicedirector Dr. Bley.

Der Vicedirector eröffnete die Versammlung mit einer Rede, worin er den Dank gegen die anwesenden Gäste und den verehrten Oberdirector für ihre Theilnahme aussprach. Derselbe gab eine Uebersicht über die Veränderung im Vicedirectorium Bernburg, die nothwendige Herstellung eines neuen Kreises Dessau von Neujahr 1841 an, dem die Herren Baldenius, Fack, Reichmann, Beissner, Porse, Kahleis, Rehfeld, Stippius, Raebel, Teufslers, Kettler, Kopsel und Leibold angehören würden, ersuchte den Hrn. Baldenius zur Annahme des Kreisdirectorats, und empfahl dringend größere Punctlichkeit in der Circulation der Bücher, worauf er die Kreisrechnung vorlegte und dann fortfuhr:

„Unsere Kreisversammlung ist, da sie die eigentlich vorigen Jahre rückständige ist und das neue Vereinsjahr einmal erst mit der Generalversammlung beginnt, dem Andenken der ausgezeichneten Botaniker und Naturforscher Jussieu geweiht. Ich habe nicht nöthig, Ihnen zur Erinnerung an die Verdienste dieser ausgezeichneten Forscher weitere Mittheilungen zu machen, da unser verehrter Oberdirector seine, in der Generalversammlung zu Pymont zu Jussieu's Andenken gehaltene schöne Rede im Archive veröffentlicht hat, das in Ihren Händen ist. Seit unserer letzten Versammlung hat unser Verein einen besonders schmerzlichen Verlust erlitten in dem Erscheinen seines Protector, des Geh. Staatsministers Freiherrn Stein zum Altenstein, eines hohen Gönners der Wissenschaften und Beförderers alles Edlen und Nützlichen. Der Pharmacie hat kürzlich zwei Verluste erlitten, welche wir in wissenschaftlicher Hinsicht sehr zu bedauern haben. Herren Robiquet und Planché in Paris, beide Ehrenmitglieder unsers Vereins, sind in diesem Frühjahr mit Tode abgegangen. Ihre Verdienste werden ihnen ein gebührendes dankbares Andenken im Kreise der Pharmacie sichern. — Wir haben im vergangenen Herbste ein schönes, frohes und großartiges Fest gefeiert in der Generalversammlung zu Pymont, welches sicherlich zu den fruchtreichsten und angenehmsten Versammlungen des Vereins gehört hat. Das Archiv hat Ihnen Bericht über geliefert. Wir haben die Ueberzeugung immer fest gegründet, daß es mit unserm Vereine etwas Rechtes, Gutes und Schönes sei, was auch andere Stimmen dagegen sagen mögen.“

Pharmacie ist durch den Verein gehoben, sie ist auf dem Endpunkte der wissenschaftlichen Fächer, in welche sie durch Leistungen trefflicher Meister eingeführt worden, mit Ehre vorwärts geschritten, und wenn man ihr jetzt den Vorwurf machen wollte, daß sie aufgehört habe mit ihren Leistungen, dürften die neuesten Arbeiten, welche aus den Laboratorien Apotheker hervorgingen, dagegen sprechen; doch, so scheint mir, hat man mit jenem Ausspruche nur andeuten wollen, Pharmacie sei durch die ungünstigen Verhältnisse, welche so vielen Seiten sich ihr entgegenstemmen, behindert, in Maasse an der Förderung der Naturwissenschaften Antheil nehmen, als es ohne diese Hemmnisse der Fall gewesen sein würde. Wer kann aber läugnen, daß bei glücklicherem, wie mir scheint, wohlverdientem Loose mancher der Unsrigen sich aufordert fühlen würde, mit gröfserer Lust und Liebe den Arbeitszum Nutzen jener Wissenschaften sich zu unterziehen? Wenn aber ungeachtet der angedeuteten Hindernisse die Pharmaceuten sich dennoch nicht haben abhalten lassen, manchen nützlichen Beitrag zur Ausbildung der Chemie, Botanik und Zoologie zu liefern, welche letztere besonders in dem jüngsten Jahre unter den Pharmaceuten, auch unserer Gegend, für den eig der Entomologie Liebhaber und Förderer gefunden hat, wir davon einen der vorzüglichsten Anreger dieser interessanten Wissenschaft hier in unserm Kreise begrüßen, so scheint das gewifs um so ehrenhafter: denn was mit Anstrengung Ueberwindung von Hindernissen erreicht und errungen wird, deut mehr, als was zu thun nur eine Frucht glücklicher Zeit und Umstände ist. Wie aber angedeutet, würde sich mehr Gröfseres haben erreichen lassen, wenn nicht so oft die nöthigen Mittel geschont werden müßten von Seiten derer, welche die geistigen Kräfte haben, für die Ausbildung der Wissenschaften zu arbeiten. Wie sollten auch die Pharmaceuten stehen in ihren wissenschaftlichen Forschungen? Sollten denn nicht Cuvier's Ausspruch beherzigen wollen: »daß Naturwissenschaften groß genug seien, auch den umfassendsten Geist zu füllen, mannichfaltig und anziehend genug, Bewegtesten zu unterhalten, den vom Glück Verlassenen zu trösten und die Bitterkeiten des Lebens zu lindern!« Gewifs, meine werthgeschätzten Collegen! ist dieser Ausspruch Cuvier's wahr und schön! Möge er denn mehr und mehr auch dem Kreise der Pharmaceuten sich bethätigen! Was könnte dazu anregender sein, als wenn wir an die Spitze des Jahres, mit der am 8. und 9. Sept. d. J. zu Leipzig zu haltenden Generalversammlung zu eröffnenden Vereinsjahrs einen Namen gestellt sehen, der mit Recht den verehrtesten aller gebildeten Völker beigezählt wird, den Alexander's von Humboldt. Möge denn die würdige Wahl dieses Gelehrten, der die größten Anstrengungen und Gefahren nicht gescheut hat, in der entlegener südlicher Hemisphäre, auf den höchsten Gipfeln der Anden, so wie an den steppenartigen Küsten des stillen Ozeans, wie um Asiens himmelanstrebenden Erdpfeilern, um mit seinen eigenen Worten zu reden, aus den schwindelnden Tiefen der Natur das Licht der Erkenntniß zu schöpfen, möge seine Wahl den Weg bezeichnen, den die Pharmaceuten



beharrlich, unermüdlich und bescheiden, wie Er, fortan nehmen wollen, um auch ihrerseits das Licht dieser Erkenntniß immer weiter verbreiten zu helfen, damit man forthin nicht mehr sagen könne, sie hätten aufgehört wissenschaftlich zu wirken. Mögen sie also stets sich erinnern, daß ein Scheele, Bergman, Marggraf, Westrumb, Wiegleb, Klaproth, Hagen, Götting, Hermbstädt, Vauquelin, Van Mons, Gren, welchen diese meine Vaterstadt zu den ruhmwürdigsten ihrer Söhne zählt, Bucholz, Trommsdorff, Geiger, Robiquet u. a. m., welche alle schon abtraten von ihrem vielseitigen und gediegenen Wirken, ferner Buchner, Bracconnot, Döbereiner, Göbel, Sertürner, Dingler, Hänle, Dulk, Wackenroder, Herberger, Winckler und andere ehren- und ruhmwürdige Männer mehr, aus ihrer Schule hervorgegangen, viel und Großes geleistet haben, und daß ein Brandes, den wir als ein Muster beharrlichen eifrigen Strebens für die Fortschritte der Wissenschaft, wie für nützliche Wirksamkeit in Bezug auf Menschenwohlfahrt hochachten, an dem Ruder unsers Vereins steht, und sie die Pflicht haben, auf der von den Genannten bezeichneten Bahn rüstig fortzuschreiten zur Förderung der Wissenschaft, zur Ehre der Pharmacie und zum Heile der Menschheit: »Denn die Ehre des Menschen und sein schönster Ruhm bestehen darin, daß er Edles, Nütliches und Würdiges wirke, so lange es Tag ist, ehe denn die Nacht hereinbricht, da Niemand wirken kann!«

Nach der Aufforderung des Vicedirectors zu Mittheilungen wissenschaftlicher Notizen und Erfahrungen demonstrierte Hr. Hornung eine Reihe Pflanzen aus dem Geschlechte *Eriophorum*, *Scleranthus annuus* und *perennis*, *Carex ornithopoda* und *distachya*, welche Hr. Echterling durch Hrn. Hofrath Brandes mitgetheilt hatte, woran sich eine Besprechung über verschiedene Pflanzenformen anschloß.

Bley sprach über die Destillationsproducte des essigsauren Bleies und Darstellung des Acetons.

Derselbe theilte eine Analyse eines Geheimmittels gegen Scrophelkrankheit mit.

Ebenso eine chemische Untersuchung eines Metallringes aus einem Hüfengrabe am Harze.

Ferner eine Notiz über vorkommende Verfälschung der Chenille mit Bleistückchen, welche Hr. Ap. Walther bestätigte.

Derselbe theilte einige Erfahrungen über Conserven von tischer Kräuter mit und sprach über deren Anwendung in der Praxis.

Hr. Kreisdirector Baldenius machte Mittheilung über die Einsammlung und Erkennung der Güte der *Folia Arum*, woran die Herren Brandes und Hornung einige Bemerkungen anknüpften.

Hr. Hofrath Brandes sprach über Darstellung des *ferri acetici* und dessen Anwendung gegen Arsenikvergiftungen.

Hr. Hornung machte einige Versuche über Runge's Methode den Gehalt an Schwefelsäure und Salzsäure im Essig nachzuweisen.

Hr. Baldenius machte im Auftrage der Dessauischen Apotheker den Antrag, die Beiträge zum Vereine für die Jahr

ht weiter zu erhöhen, worauf Hr. Hofrath Brandes die Finanzverhältnisse des Vereins erörterte.

Der Vicedirector stellte eine Reihe seltener, zum Theil neuerparate und Metalle zur Ansicht auf, als:

*Fermentoleum Vitis. vinifer.*, *F. Ericae*, *F. Trifolii*, *Sulphur. Alcohol. Sulphuris crystallisat.*, *Chinin. sulphuricum neutrale*, *Co.*, *Meconin*, *Berberin*, *Theiin*, *Caffein*, *Phloridzin*, *Solanin*, *Anein*, *Petroselin*, *Ol. Thymi crystallisatum*, *Ol. Chenopodii ambrasis*, *Aether formicic.*, *Aether butyricus*, *Acidum tannicam*, *Pa-*, *in*, *Atropin*, *Aconitin*, *Tellus*, *Palladium*, *Uran*, *Iridium u. a. m.*

Hr. Kreisdirector Giseke zeigte *Ol. Secal. cornut.* vor sprach über die Wirksamkeit dieses Stoffes.

Nach einer Reihe interessanter Discussionen über verschiedene Gegenstände der practischen Pharmacie wurde die Versammlung mit einem freundschaftlichen Mahle geschlossen.

Dr. Bley.

### reisversammlung in Driburg am 3. Aug. 1840.

Zufolge Einladung vom 14. v. M. wurde die Versammlung Mitglieder des Kreises Paderborn am heutigen Tage in Driburg gehalten.

Der Kreisdirector Apotheker Müller bewillkommnete die esenden Mitglieder und machte sie auf die Merkwürdigkeit Driburgs aufmerksam. Unter den mehrfachen Verhandlungen, die vorkamen, sowohl in wissenschaftlicher Beziehung, als pecieller des Vereinskreises Paderborn, dürfte Folgendes hervorzuheben sein.

Nachdem der Kreisdirector Müller seine Erfahrungen über Conservation der Blutegel mitgetheilt hatte, wurde von diesem und auch von den Herren Collegen Rotgeri, Giese und immer über die Anlegung eines gemeinschaftlichen Blutegelbhs für den Kreis Paderborn und Umgegend berathen, wobei von Müller in der Nähe von Driburg befindliches Terrain, dessen desfallsigen Erfahrungen, für geeignet gehalten wurde. Man wünschte, daß die Sache sich ausführen lassen könnte.

Bei den verschiedenen Mittheilungen über den ausgebreitete Verbrauch des Kautschuks und über das Auflösungsmittel elben theilte Müller auch sein Verfahren mit, den Kautschuk als Ueberzug auf Metalle oder als Firnifs für Standgefäße Keller zu benutzen.

Nach mehreren Discussionen über verschiedene Arzneimittel wurde zum Verkauf der aus der Circulation zurückgekommenen weiter geschritten, und darüber an die Direction der Bibliothek beauftragt.

Da mehre Mitglieder über Unregelmäßigkeiten in der Circulation der Bücher sich beschwerten, so wurde ausdrücklich ersucht, das desfalls gegebene Reglement, welches auf jedem Circulationszettel steht, von jedem Mitgliede des Kreises genau befolgt werde.

Müller.

## Eintritt neuer Mitglieder.

Hr. Apoth. Molwitz in Meiningen ist, nach Anmeldung durch Hrn. Vicedirector Dr. Bucholz und Hrn. Kreisdirector Jahn, als wirkliches Mitglied des Vereins in den Kreis Meiningen aufgenommen.

Desgl. Hr. Apoth. Gräf und Hr. Apoth. Lindeker in Weissenfels, Hr. Apoth. Beyer in Cölleda, Hr. Apoth. Stutzbach in Hohenmölsen, Hr. Apoth. Beneken in Naumburg und Hr. Apoth. Seims in Osterfeld, nach Anmeldung durch Hrn. Kreisdirector Dr. Tuchen, in den Kreis Naumburg.

Desgl. Hr. Apoth. Jacobi in Warendorff, nach Anmeldung durch Hrn. Kreisdirector Dr. Schmedding, in den Kreis Münster.

Desgl. Hr. Apoth. Graf in Sachsenhagen, nach Anmeldung durch Hrn. Assessor und Kreisdirector Faber, in den Kreis Minden.

Desgl. Hr. Apoth. Zickler in Werdau, nach Anmeldung durch Hrn. Vicedirector Dr. Meurer und Hrn. Kreisdirector Göbel in Plauen, in den Voigtländischen Kreis, und Hr. Apoth. Felgner in Frauenstein, nach Anmeldung durch Hrn. Kreisdirector Ficinus, in den Kreis Altstadt-Dresden.

Hr. Apoth. Brendecke in Gittelde und Hr. Apoth. Seiler in Hessen sind, nach Anmeldung durch Hrn. Vicedirector Herzog, als wirkliche Mitglieder des Vereins in den Kreis Braunschweig aufgenommen worden.

Hr. Apoth. Heimann in Salzdetfurt ist, nach Anmeldung durch Hrn. Kreisdirector Wackenroder in Burgdorf, als wirkliches Mitglied des Vereins in den Kreis Hannover aufgenommen worden.

Desgl. Hr. Apoth. Göllnitz in Sonnenwalde, nach Anmeldung durch Hrn. Kreisdirector Rabenhorst, in den Kreis Luckau.

---

## Todesanzeige.

Am 2. Oct. früh endete ein sehr eifriges Mitglied unseres Vereins, unser geliebter Freund und College, der Apotheker Wider zu Schwedt, seine irdische Laufbahn. Erst 39 Jahr alt wurde er schon den Seinen entrückt, und nicht allein diese vermissen ihn schmerzlich, sondern auch seine Brüder, seine Freunde, seine Mitbürger und die, welche in Armuth leben, wie das die würdigen Geistliche an der Gruft des Seligen so schön abtrefend aussprach, es laut verkündigend, wie dieser gerührt gewirkt.

*Levis tibi sit terra, ossaque molliter cubent* rufen wir aus der wegstreteten Brust über das frühe Grab des unvergeßlichen Freundes.  
Im October 1840.

Angermünde.

C. H. Bolle.

Königsberg.

Dr. Geiseler.

Prenzlau.

F. Holtz.

---



### 3) Gelehrte Gesellschaften.

#### Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin.

**Sitzung am 16. Juni.** Hr. Professor Link legte Abbildungen, welche Samen von *Pinus* in ihren früheren Zuständen als sie darstellen. Sie zeigen deutlich die verschiedenen Hüllen, womit der Kern (*nucleus*) umgeben ist, so daß dieser Same auswegs nackt genannt werden kann. — Hr. Prof. Ehrenberg sprach über das Vorkommen unveränderlicher, aber so scharf prismatischer Farben bei den kleinsten mikroskopischen Objecten, als sie für das bloße Auge bei gewöhnlichem Lichte zu sehen sind, und welche nicht Fehler des Mikroskops, sondern, indem sie überaus angenehme Erscheinungen geben, sich auf drei Gesetze zurückführen lassen. Eine Reihe derselben ist durch dünne Blättchen oder Zwischenräume bedingt, wie bei Glimmer; dahin mag der schönrothe Ring unter der Schale von *Trachalomonas volvocina* und *cylindrica* der Infusorien gehören.

In andern Fällen sind sie durch scharfe Liniirung der Oberfläche bedingt, wie man es bei den sogenannten Irisknöpfen deutlich erzeugt; dahin gehört der baumartige, herrlich schilfartige Stiel der lebenden *Epistylis pavonina*, der schönsten neuen bis 4 Linien großen Baumvorticelle; eben dahin viele der lebhaften Farben der Schmetterlinge und Käfer, so wie die metallisch glänzenden Colibrifedern. In noch andern Fällen lassen sich erkennen, daß sie durch regelmässig dicht geordnete Poren hervorgebracht werden. — Hr. Marchand sprach über die von Erdmann in Leipzig entdeckten Verbindungen, welche durch Chlor und Brom auf Indigblau entstehen, und welche zugleich die Farbenänderungen, welche das chlorichtsaure Peroxyd und Bleioxyd erleiden, woran er noch Bemerkungen über ähnliche Erfahrungen bei dem Quecksilberjodide knüpfte.

#### Academie der Wissenschaften in St. Petersburg.

**Sitzung im Mai.** Der Astronom Hr. v. Struve berichtete über den gegenwärtigen Zustand der Expedition, welche unter seiner Leitung mit der Messung eines *Meridianbogens* beauftragt ist. Es ist nur noch eine kleine Triangelreihe in Finnland zu messen übrig, um das trigonometrische System der Ostseeprovinzen vollständig zu machen. — Die Herren Kupffer und Miersen berichteten über Böthlingte's vorjährige Reise durch Finn- und Lappland und seine dort angestellten geographischen Beobachtungen.

#### Königliche Societät der Wissenschaften in London.

In einer der letzten Sitzungen las Hr. Howard eine Abhandlung, enthaltend Variationstabellen, während eines 9jährigen Aufenthalts, über die mittlere Barometerhöhe, mittlere Temperatur, Wassertiefe, mit Rücksicht auf die herrschenden Winde, Mondstände u. s. w., und folgende Resultate: 1) Das Barometer steht in der Erdferne des Mondes als in der Erdnähe, die mittlere im ersten Fall ist 29",84517 engl., im letztern 29",75542 engl. 2) die mittlere Temp. ist niedriger in der Erdferne als

in der Erdnähe (nämlich resp.  $48^{\circ},7126$  F. und  $49^{\circ},0056$  F.). Die mittlere Jahrestemperatur war  $48^{\circ},7116$ . 3) Der Regen in der auf die Apside folgenden Woche übertrifft den während der Erdnähe, nur zwei Ausnahmen fanden in den 9 Jahren statt, und zwar in dem nassesten und trockensten. 4) In Bezug auf die Winde herrschen N-, NO- und O-Winde, während der Erdferne 38 Tage, während der Erdnähe 21 Tage, und die S-, SW- und W-Winde während der Erdferne 20, während der Erdnähe 38 Tage. Es zeigt sich also, daß in dem Londoner Klima der Mond in seiner Erdnähe die südliche Atmosphäre mit sich bringt, welche die Temp. der Luft erhöht, die Dichtigkeit vermindert und einen stärkern Regenniederschlag verursacht. In der Erdferne des Mondes findet dagegen ein reichlicher Zufluß aus dem Norden, ein höherer Barometerstand, eine niedrigere Temp. und weniger Regen statt.

#### 4) Personalnotizen.

Der hochverdiente Oberbergcommissair Gruner in Hannover ist zum Medicinalrath ernannt worden.

Die Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften in Marburg hat den Hrn. Apotheker Dr. Herzig in Braunschweig zum außerordentlichen Mitgliede ernannt.

Hr. Dr. E. F. Aschoff in Herford, Hr. Dr. Meurer in Dresden, Hr. Dr. Bley in Bernburg und Hr. Apotheker Rabenhorst in Luckau sind von der K. russ. pharm. Gesellschaft in Petersburg zu Ehrenmitgliedern erwählt worden.

Der Apothekerverein in Hamburg hat Hrn. Dr. E. F. Aschoff in Herford, Hrn. Dr. Bley in Bernburg und Hrn. Dr. Geissler in Königsberg in der Neumark als correspondirende Mitglieder aufgenommen.

Am 4. Juli starb zu Hannover der Königl. preuss. Geheirath und Generalstabsarzt Hr. Dr. v. Gräfe von Berlin.

Der um die Wissenschaft, und namentlich um die Kenntniss der Mineralquellen und deren so sehr gelungene künstliche Neubildung, die in den bedeutendsten Städten auf so großartiger Weise ins Werk gesetzt wurde, so hochverdiente Ritter Dr. Struve aus Dresden, starb am 29. Sept. zu Berlin in einem Alter von 59 Jahren. In einem bedeutenden so wohlthätigen und fruchtbringenden Kreise der Wissenschaft wird sein Name unter den bedeutendsten Naturforschern glänzen. Alle, die den hochverdienten Mann persönlich kannten und ihm befreundet waren, werden seinen Verlust tief betrauern. So verehrungswürdig Struve war als Gelehrter, so war er es auch als einfacher und biederer Mann. Sein Andenken wird uns immer werthvoll und theuer sein.

Am 9. Oct. starb der Königl. preuss. wirkl. Geh. Medicinalrath und Präsident des Curatoriums für die Krankenhäuser und Thierarzneischul-Angelegenheiten, Prof. Ritter Dr. Eschscholtz 65 Jahr alt, auf seinem Gute Klautsch in Oberschlesien, wohin er sich zur Wiederherstellung seiner, durch eine chronische Leberleibskrankheit sehr angegriffene Gesundheit zurückgezogen hatte.

Der naturwissenschaftliche Verein des Harzes hat den Medicinalrath Dr. Brandes zum Ehrenmitgliede erwählt.



## Zweite Abtheilung.

### Chemie.

#### Erster Abschnitt.

### Über einige Concretionen, in vierfüßigen Thieren gefunden;

vom

Hofrath Dr. *Du Ménil*.

Die Königl. Veterinairschule zu Hannover besitzt eine ansehnliche Sammlung von Concretionen aus vierfüßigen Thieren, unter welchen viele der Analyse werth sind, aber ihrer ärztlichen Merkwürdigkeit und Kleinheit wegen nicht entbehrt werden können; dennoch dankte ich es mir, durch die Güte des gelehrten Directors Hausmann von mehreren Fragmente etc. zu erlangen, deren Beschreibung und Analyse hoffentlich von Zeit zu Zeit folgen soll.

#### *Analyse eines Hundeblasenconcrements.*

Diese Concretion bestand in einer dreiseitigen Pyramide von je zwei gleichen Seiten, deren höchste 7 Linien und deren niedrigste 6 Linien betrug. Ihre Gestalt, gleich regelmässig, verdankte sie doch wohl nur der Pressendruckung, denn es waren 3 oder 4 dieser Concretionen dicht an einanderliegend an der Urinblase eines und desselben Individuums gefunden.

Ihre Oberfläche war glatt, an einigen Stellen wie zertrümmert, die Bruchstücke höckrig uneben. Ihr Gefüge war hart und krystallinisch, an selbigen ließen sich bei genauerer Ansicht concentrische Lagen — um einen dreiseitig-pyramidalen Kern — unterscheiden. Aeußerlich erschienen sie weiß, inwendig etwas ins Gelbe gehend, hier an einigen Stellen glänzend und schimmernd. Auch an den Kanten durchsichtig. Sie besaßen weder Geschmack noch Geruch; waren schon durch einen

schwachen Schlag mit dem Hammer zersprengbar, den Nägeln verletzbar und leicht zerreiblich, ohne Splitterung; äusserlich nicht abfärbend, ob im Anfühlen weich. Eigengewicht 1,955. Abgewicht im Durchschnitt 25 Gran.

### *Vorläufige Versuche.*

Weil mir von den wenigen Concrementen, die noch in der Blase befanden, nur eins werden konnte, so liess sich auf das Resultat, welches die Behandlung desselben mit Aether, Wasser und Weingeist zuversprach, nicht viel rechnen. Ersterer hatte auch Spuren einer fetten Materie und letzterer salzig standtheile ausgezogen, was ein schwacher Oelfleck zartem Copierpapier und eine duffe Stelle auf Glas Verdampfen dieser Flüssigkeit bewies. Die Lösungen reagierten weder alkalisch noch sauer.

Beim Erhitzen eines Bruchstücks des Concrements im Platinlöffel über Weingeistfeuer entstand nicht sehr unangenehme Geruch animalischer, sondern leidliche, mehr vegetabilischer, stickstoffreicher Substanz. Es liess sich nicht weiss brennen und selbst im Kohlenfeuer war dieses schwierig. Versuche vor der Bunsenrohrflamme mit Natriumoxydcarbonat und Eisensulfat verriethen die Gegenwart der Phosphorsäure.

Salpetersäure löste es ohne Entwicklung von Stickstoffsäure auf, wobei eine gelbe flockige Materie als Skelett des Concrements, zurückblieb. Die Lösung wurde von Ammoniakoxalat stark getrübt. Ammoniumphosphat fällte kein Eisenoxyd in dem Filtrate.

Wegen der geringen Menge des Concrements waren besondere Versuche auf den organischen Bestand desselben unterbleiben, hievon ist jedoch selten etwas verloren, da die Trennung des Schleims vom Eiweissstoff etc. in der gewöhnlich vorkommenden Quantität jener kaum ein annäherndes Ergebniss darbietet.

### *Analyse.*

Sechszehn Gran des zerriebenen bei 100° getrockneten

rements verloren bis zur Weisse geglühet 8,25 Gr., 51,56 Procent.

Obige Menge löste ich in Salpetersäure auf, wobei außer Spuren von Kohle, kein Rückstand zeigte, mischte ich der filtrirten Solution Ammoniak im gleichen Ueberschuß\*) hinzu, wodurch ein voluminöses Präcipitat entstand, filtrirte, wusch jenes gehörig und setzte das Filtrat in den Abrauchofen.

Der Inhalt des Papiers, welcher sich rein abnehmen wurde sofort im Platinschälchen getrocknet und gewogen, er wog 7,35 Gr., also 0,9 weniger, als das reine Concrement.

Um Magniumoxyd in obigem Präcipitate aufzunehmen, nahm ich es in geringster Menge Salpetersäure auf, stämpfte die freie Säure wiederum möglichst mit Ammoniak ab, fällte aus der Flüssigkeit mit Bleioxyd die Phosphorsäure und das im Uebermaß hinzugesetzte Blei mit Hydrothionsäure und dann das Magniumoxyd mittelst Ammoniakoxalat. Nach erneuertem Absetzen wurde das Filtrat durch Ammoniak zwar getrübt, aber unbedeutend. Diese Erscheinung lehrte, neben einer geringen Menge zurückgebliebener Phosphorsäure — wie sie denn bekanntlich auf diesem Wege immer nicht vollständig ausgeschieden werden kann — wirklich Magniumoxyd vorhanden war. Ich setzte nun etwas Natriumoxydphosphat und Ammoniak hinzu, wodurch Ammoniakmagniumoxydphosphat niederfiel. Dieses Präcipitat wurde geglühet und berechnet, es entsprach 0,75 Gr. Ammoniakmagniumoxydphosphat. Es blieb nun noch zu untersuchen übrig, was die Ammoniak behandelte Solution der ersten Auflösung enthielt. Sie war im Abrauchofen, während obige Ana-

---

Die Erfahrung, daß Phosphate, Oxalate etc. durch Ammoniak in starkem Ueberschuß hier fast rein ausgefällt werden, d. h. viel schärfer als mittelst eines geringen Ueberschusses, habe ich bestätigt gefunden, sie jedoch früher längst selbst gemacht.

lyse geschah, zu einer krystallinischen Rinde eingetrocknet, diese hinterliefs erhitzt etc. 0,60 Gr. eines weissen Pulvers, welches sich ohne Aufbrausen in Salpetersäure löste und durch Ammoniak wieder gefällt wurde, also die geringe Menge des Calciumoxydphosphats, die bei der hier eingeschlagenen Methode immer zurückbleibt.

In dem zerlegten Hundebblasenconcrement ist also enthalten:

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Organische Materie und Feuchtigkeit.... | 51,56 |
| Basisches Calciumoxydphosphat.....      | 43,91 |
| Ammoniakmagniumoxydphosphat .....       | 4,53  |
| Spuren fettiger Substanzen.....         | —     |
|                                         | 100.  |

*Kreideartige Masse, wovon das Zellgewebe der Urinblase eines Pferdes durchdrungen war.*

Unter den Merkwürdigkeiten der Concretionen, die ich von obgedachtem Freund erhielt, befand sich ein Stück der Urinblase eines Pferdes, deren Zellgewebe von einer kreideartigen weissen Masse durchdrungen war, so daß es, obgleich fest, doch etwas biegsam erschien.

Salpetersäure auf 8 Gran desselben gegossen, nahm nach einigen Stunden viel davon auf. Die Lösung geschah mit einem kaum merklichen Brausen. Es hinterblieb ein gelberschwammiger Körper, welcher getrocknet zwei Gran wog und sich bis auf Spuren von Asche verbrennen liefs.

Ammoniak in starkem Ueberschufs, fällte aus der Solution Calciumoxydphosphat mit anhängendem Schleim, denn es wurde geglüht schwarz und zuletzt weifs, in welchem Zustande es 4,5 Gran wog.

Die vom Phosphate befreite Flüssigkeit trübte sich mit Ammoniakoxalat und es konnte ein Niederschlag gesammelt werden, der in Carbonat umgeändert 0,5 Gr. betrug.

Obige 4,5 Gr. Niederschlags wurden in Salpetersäure gelöst und nach möglichster Abstumpfung der Solution mittelst Ammoniakoxalats zersezt, in der



ervon erhaltenen Filtrate war kein Magniumoxyd vorhanden.

Die Masse, von welcher das Zellgewebe der Pferdeinblase durchdrungen war, enthielt demnach:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Calciumoxydphosphat.....  | 4,50             |
| Calciumoxydcarbonat ..... | 0,75             |
| Thierische Faser .....    | 2,00             |
| Glutinöse Materie .....   | 1,00 als Verlust |
|                           | <hr/> 8 Gran.    |

## Ueber Haemacyanin, den blauen Blutfarbstoff;

von

Dr. *Franz Simon*.

**L**assaigne, Chevreul und Lecanu haben einen neuen Farbstoff im thierischen Organismus beobachtet; Lassaigne u. Lecanu im Blute Ikterischer, Chevreul in der Galle. Da in allen diesen Fällen Gallenfarbstoff gegen war, und dieser unter gewissen Umständen eine blaue Farbennuance zeigt, so könnte es möglich sein, daß diese, von jenen französischen Chemikern beobachteten Farbstoffe, als durch die Behandlung der thierischen Flüssigkeit erzeugte Producte des Gallenfarbstoffs zu betrachten wären.

Sanson \*) hat auch im gesunden Blute einen blauen Farbstoff beobachtet. Man soll nach Sanson's Vorschrift Blut mit basisch-essigsaurem Bleioxyd fällen, den Niederschlag zur Trockne bringen und darauf mit Alkohol von 0,800 ausziehen, der sich damit blau färbt. In den ersten alkoholischen Extraktionen setzen Fett ab, welches sich beim Erkalten, wodurch ein Theil des blauen Farbstoffs mit niedergerissen wird. Spätere Auszüge bleiben klar und aus ihnen kann man den Farbstoff erhalten, wenn man den trocknen Rückstand mit Wasser, darauf mit Aether und endlich mit Alkohol



bei  $+ 40^{\circ}$  extrahirt. Es bleibt hierauf ein geringer brauner Rückstand, der sich im kochenden Alkohol mit schön himmelblauer Farbe löst. Denselben Stoff erhielt Sanson, als er gepulvertes Ochsenblut erst mit Alkohol von 0,930, darauf wiederholt mit Wasser auskochte. Das Blut, auf diese Weise von Fett, Salzen und gelbem Farbstoff zum Theil befreit, wurde getrocknet, wiederum 3 Mal mit Alkohol von 0,800 ausgekocht, um noch das Fett möglichst zu entfernen, und dann mit siedendem Alkohol von derselben Stärke zu wiederholten Malen extrahirt. Diese letzten spirituösen Tinkturen wurden zur Trockne abgedampft und wie oben behandelt.

Dieser blaue Farbstoff ist im reinen Zustande im kalten Alkohol, Aether und Wasser unlöslich, im kochenden Alkohol etwas löslich, daraus jedoch beim Erkalten sich ausscheidend. Concentrirte Säuren, mit Ausnahme der concentrirten Schwefelsäure, zersetzen ihn nicht. Ammoniak verändert ihn nicht, wird es aber in die alkoholische Lösung gegossen, so bewirkt es eine grüne Färbung, welche durch Säuren wieder in Blau übergeführt wird. Chlor entfärbt die Lösung, die entfärbte saure Flüssigkeit enthält kein Eisen.

Ich habe mehre Versuche gemacht, diesen Farbstoff darzustellen, aber immer ohne Erfolg. So habe ich frisches Ochsenblut mit Bleiessig gefällt; ein andrer Mal den vom Serum befreiten Cruor in Wasser gelöst und mit Bleiessig versetzt. Es ist bekannt, daß die Bleisäure die Lösung der Blutkörperchen kaum trüben. Ich erhielt im ersteren Falle einen Niederschlag, der gewaschen, getrocknet und mit Alkohol behandelt, an diesen nur etwas Fett und andere thierische Materie, aber keinen blauen Farbstoff abtrat; im letzteren Falle erhielt ich nach Zusatz von etwas Ammoniak, einen geringen, wenig gefärbten Niederschlag, der ebenfalls an Alkohol keinen blauen Farbstoff abtrat. Da ich häufig ansehnliche Mengen trocknes Blut erst vom Fette befreite, und dann mit starkem Alkohol extrahirte, so hätte ich müssen den blauen Farbstoff neben dem braunen erhalten.

Das jedoch nicht der Fall war; denn wenn die geringen Mengen Fett mit Aether ausgezogen worden waren, und der braune Blutfarbstoff mit kaltem Alkohol, so ließ nur eine geringe Menge Haematin zurück, die sich im kochenden Alkohol wenig löste, leicht aber mit etwas schwefelsäurehaltigem Alkohol eine blutrothe Lösung gab. Es ist daher wohl möglich, daß der blaue Blutfarbstoff, den Sanson beobachtete, nicht immer in Blute vorkommt.

---

## Chemische Untersuchung eines milchartig aussehenden Blutwassers;

von

*Carl Frenzel* in Erfurt.

---

Bekanntlich beobachteten schon Dobson, Rollo und Marcet bei einem an *Diabetes* leidenden Kranken ein milchartig aussehendes Blutwasser, so wie Traill ein ähnliches bei einem an Leberentzündung Leidenden, wovon das letztere  $4\frac{1}{2}$  Procent eines gelben Oeles enthielt, und ganz neuerlich Dr. Riecke ein solches bei einem Mann, der an leichten entzündlichen Brustbeschwerden litt, welches Serum aber nicht chemisch untersucht wurde. (*Froriep's neue Notizen*, Bd. I. No. 13.).

Hr. Dr. Schroll in Erfurt theilte mir mit, daß bei einem Mann, der gewohnt war, jährlich zur Ader gelassen, dieses aber seit zwei Jahren versäumt, und an Congestionen des Bluts nach den Lungen und Nierenleiden desselben in diesen Organen litt, durch Verlassen ein schwarzrothes Blut erhalten worden sei, auf dem sich einige weißse Oeltropfen, so wie es bei der Ader kam, zeigten und beim längern Stehen annahm ein das gewöhnliche Ansehen habender Blutkuchen. Das Blutwasser aber ein milchartiges Ansehen annahm. Dieses Blutwasser zeigte folgendes Verhalten. Es war geruchlos, verhielt sich gegen Reagenspapiere indifferent und auf ein Filter gebracht ging es unver-

ändert langsam durch; nachdem es eine Nacht über gestanden, hatte sich ein wenig darin vertheilt gewesenes Blutroth abgesetzt, es war noch ganz geruchlos.

Zwei Unzen davon wurden mehrmals mit Schwefeläther geschüttelt, wodurch er ein gelbliches Ansehen erhielt und wurde Lackmuspapier von dieser ätherischen Lösung nicht verändert. Nach dem Verdunsten des Aethers blieb ein gelbliches, schmieriges Fett zurück, durchzogen mit weissen Stellen, dessen Menge 4,96 Grm. ausmachte. Dasselbe wurde auf ein Filter gebracht, es ging ein fettes gelbes Oel durch, und nachdem es mit dem Filter zwischen öfter erneutem Fließpapier gepreßt worden, blieben 3,25 Grm. eines weissen, festen, geruchlosen Fettes zurück, das auf Wasser schwamm und in einem fast farblosen Liquidum durch Erhitzen schmolz; mit Wasser gerieben vertheilte es sich darin und gab demselben ein milchartiges Ansehen, und durch Zusatz von Salzsäure blieb das Ganze unverändert; kalter Alkohol löste höchst wenig, kochender etwas mehr auf; Terpentinöl löste ebenfalls sehr wenig; beim Erhitzen löste es sich in fetten Oelen; in Holzspiritus war es unlöslich; mit Natronlauge erwärmt verseifte es sich nicht; von concentrirter Schwefelsäure wurde es geschwärzt, ohne daß sich schweflichte Säure entwickelte. Mit Salpetersäure gekocht entwickelte sich Stickstoffoxyd und es schwamm nach dem Erkalten eine gelblich fettige Masse oben auf, welche mit Wasser so lange ausgewaschen wurde, bis dasselbe nicht mehr sauer reagirte; sie war in Alkohol schwerlöslich, in Aether leichtlöslich und diese Lösungen reagirten sauer; durch Zusatz von ätzenden Alkalien zu der alkoholischen Lösung wurde die Farbe derselben dunkler, und selbiger überflüssiges Ammoniak hinzugesetzt, dann ganz gelinde verdunstet, blieb eine bräunliche klebrige Masse zurück, die in Wasser unlöslich, in Weingeist aber löslich und hier gegen Reagentien folgendermassen sich verhielt:

schwefelsaures Eisen: bernsteinfarbiger flockiger Niederschlag;



schwefels. Kupfer: hellgrüner flockiger Niederschlag;  
essigsaures Blei: weißlicher flockiger Niederschlag;  
salpetersaures Silber: weißer flockiger Niederschlag;  
Quecksilberchlorid: gelbbräunlicher Niederschlag;  
Goldchlorid: unverändert;  
Chlorbarium: weißer Niederschlag.

In der salpetersauren Flüssigkeit konnte keine Spur  
n Cholesterinsäure entdeckt werden.

Beim Verbrennen dieses Fettes blieb eine geringe  
enge weiße Asche zurück, die sich gegen Lackmus-  
papier indifferent verhielt.

Die Eigenschaften dieses Fettes zeigen, daß es eigen-  
ümlicher von den bekannten Fetten verschiedener  
natur ist, und dem Hirn und Gallenfett in seinen Eigen-  
schaften zunächst steht.

Das erhaltene gelbe Oel war in kaltem und heißem  
alkohol schwerlöslich, diese Lösungen reagierten nicht  
sauer; mit Natronlauge behandelt verseifte es sich. Um  
nicht weitläufig zu werden, theile ich hier gleich die  
Resultate der Analyse des vom Fette befreiten Blutwas-  
sers mit; es enthielt außer den eben näher beschriebenen

3,25 Grm. eigenthümlichen Fett

und

1,71 Grm. eines verseifbaren fetten Oeles,

noch:

|            |   |                                           |
|------------|---|-------------------------------------------|
| 0,45 Grm.  | { | Chlorkalium,                              |
|            |   | Chlornatrium,                             |
|            |   | milchsaures Alkali,                       |
|            |   | thierischen in Spiritus und Wasser lösli- |
|            |   | chen Extractivstoff,                      |
| 0,12 Grm.  |   | phosphorsaures Natron,                    |
| 0,034 Grm. |   | verändertes Eiweiß,                       |
| 3,85 Grm.  |   | Eiweiß.                                   |

Dieses Blutwasser zeichnet sich also durch seinen  
hohen Fettgehalt und Mangel an freiem Natron vor  
dem gewöhnlich vorkommenden aus.



# Ueber die Löslichkeit des Harnsteins und des phosphorsauren Kalks im Zucker-

wasser;

vom

Apotheker *Vasmer.*

In der chemischen Welt ist bekanntlich der Zucker kein so indifferenter Körper, als wofür er meistens im bürgerlichen Leben gehalten wird.

Die große faulnißwidrige Kraft des Zuckers ist bekannt, da er Fleisch und Früchte so gut als Kochsalz vor dem Verderben schützt. Duval und Orfila haben den Zucker als ein sehr wirksames Gegenmittel gegen Kupfervergiftungen empfohlen: er zersetzt die Kupfer- und mehrere Metallsalze; auf Quecksilber, Silber und Goldverbindungen wirkt er desoxydirend und Eisen- und Zinkoxyd gehen Verbindungen damit ein.

Die Kalk-, Strontian- und Talkerde werden durch Zusatz von Zucker im Wasser reichlich, die Thonerde aber nur wenig gelöst.

Ich versuchte daher, ob vielleicht der Harnstein und der phosphorsaure Kalk auch durch Zucker im Wasser löslich gemacht würden und fand, daß von beiden durch Digeriren mit Zuckerwasser etwas aufgelöst worden war, denn durch Zusatz von Salzsäure schied sich Harnsäure in schuppigen Krystallen ab und durch neutrales kleeaures Kali wurde Kalk angezeigt, daß aber der Kalk nicht im Zucker enthalten war, davon hatte ich mich zuvor überzeugt.

Wenn nun dieses für die chemische Analyse auch durchaus nicht von Nutzen ist, so könnte es doch für die medicinische Praxis vielleicht nicht ganz gleichgültig sein, denn ich habe gefunden, daß der Zucker sehr vom Harnsteine auflöst, als der Borax und wenn, wie behauptet wird, seit dem Gebrauch des Kaffees die Stein- und Griesbeschwerden sich vermindert haben, so ist es eben so wahrscheinlich, daß dieses durch die Zucker-



nsumption bewirkt sei, als dafs man es dem Genufs  
s Kaffees zu verdanken habe.

Auch ist es merkwürdig, dafs bei der Harnruhr  
(*diabetes mellitus*) sich keine Harnsäure und harnsaure  
verbindungen im Urin finden, während dagegen viel  
Zucker in dem Urin solcher Kranken enthalten ist.

Der Zucker könnte daher bei Stein- und Griesbe-  
werden vielleicht nützlicher sein, als der Borax, der  
kanntlich in neuerer Zeit sowohl innerlich, als in  
Injectionen meistens erfolglos angewendet worden ist  
und der auch vermöge seiner stark eingreifenden Kraft  
die Schleimhaut nicht anhaltend gebraucht werden  
kann \*).

Aus der Eigenschaft des Zuckers, den phosphorsau-  
ren Kalk aufzulösen, möchte ich folgern, dafs die alte  
Behauptung »viel Zucker gegessen, sei den Zähnen schädlich«  
nicht so ganz unbegründet ist.



## Ueber den quantitativen Jodgehalt des Le- berthrans und die Prüfung desselben auf Jod;

von

*H. Wackenroder.*

Bei der Generalversammlung des norddeutschen  
Apothekervereins zu Pyrmont im vorigen Jahre habe  
ich, wie sich die zahlreichen Theilnehmer an jener  
Versammlung noch erinnern dürften, eine Mittheilung  
gemacht über die Menge von Jod, welche in dem ächten  
Leberthran enthalten ist. Die quantitative Bestimmung  
des Jods in diesem so wichtig gewordenen Arzneimittel

---

\*) Es ist hierbei nicht anzunehmen, dafs der Zucker ein Mit-  
tel sei, ganze Harnsteine mit Leichtigkeit aufzulösen, dieses  
geschieht weder durch Borax noch durch Kali, auch wird  
der Chemie es nie gelingen, im thierischen Organismus  
dieses zu vermögen, nur läfst sich annehmen, dafs die  
Ablagerung und Anhäufung zu festen Massen in der Harn-  
blase verhindert werde.

wurde insbesondere veranlaßt durch eine Behauptung L. Gmelin's (in den *Annal. der Pharm.* Bd. 29. H. 2.), welche jedoch nach der Zeit (ebendas. Bd. 31. Heft 3.) widerrufen worden ist. Jetzt zweifelt niemand mehr daran, daß mehre Sorten von Leberthran coursiren, von denen einige, namentlich die weissen, kein Jod enthalten. Eben dieser Umstand macht es aber wünschenswerth, eine leicht ausführbare Methode zu haben, nicht allein die Gegenwart, sondern auch die Menge des Jods im Leberthran erfahren zu können. Ich glaube daher, daß die Mittheilung unserer Versuche, die zum Theil erst vor einiger Zeit zur Controle der früher in Pyrmont erwähnten in Gemeinschaft mit Hrn. Leonhardt und Korn von mir angestellt worden sind, einiges Interesse gewähren möchten.

Die Verseifung des Fettes und die Einäscherung der Seife u. s. w., wie sie zuerst zur vollkommenen Bestätigung der Entdeckung des Hrn. Hopfer del'Orne von Hrn. Hansmann in dem Laboratorium unseres pharmaceutisch-chemischen Instituts auf meine Veranlassung vorgenommen worden sind (vergl. *Annal. d. Pharm.* Bd. 22. p. 170, auch die Versuche von Bley u. Brandes in *Bd. LXIII. 2. R. S. 156 d. Arch.*), gewähren bei nicht allzu-großem Aufwande von Zeit und Mühe, die, wie mich dünkt, nöthige Präcision und Sicherheit einer guten analytischen Methode. Bei unsern ersten, von Hrn. Hansmann angestellten Prüfungen wurde aus mehreren Gründen, namentlich auch aus dem Grunde, gegen jede mögliche Einmischung von Jod gesichert zu sein, Aetznatron angewendet zur Verseifung des Fettes. Der entgegengesetzten Meinung L. Gmelin's kann ich in Bezug auf das bei uns im Handel vorkommende kohlensaure Natron keineswegs beipflichten. Inzwischen haben wir unsere späteren Versuche mittelst caustischen Kalis aus *sal tart.* übrigens aber ohne wesentliche Abänderung angestellt.

Man braucht nur 1 — 2 Lth. des Thranes in einer Porcellanschale zu erwärmen mit so viel reinem ätzendem Kali oder Natron, bis sich eine Seife gebildet hat. *Da*


et diese so lange, bis sie möglichst trocken und glänzend geworden ist, oder auch etwas schwärzlich eint. Sie wird nun successive eingetragen in einen erhitzten Platintiegel, dessen Stelle aber auch ein irdener Tiegel vertreten könnte. Ein starkes Zusammen der erhitzten Seife habe ich geglaubt vermeiden zu müssen, obwohl mehrere Male, wo es statt keine Abweichung in den Resultaten bemerkbar.

Nach bewirkter Verkohlung der Seife läßt man Rückstand noch eine Weile im geöffneten Tiegel nach glühen, weil sehr leicht etwas Empyreuma in Kohle zurückbleibt und den Versuch stört. Die Masse zieht man mit hinreichendem Wasser aus, dampft wasserklare Flüssigkeit bis zum kleinen Volumen dann unter Zusatz von etwas kohlensaurem Ammonium bis fast zur Trockenheit ab. Das rückständige wird also einfach oder auch zum Theil andert-kohlensaures Alkali sein, aus welchem die beige-kleine Menge von Jodkalium oder Jodnatrium mittelst der drei- bis vierfachen Menge Alkohols  $\frac{1}{4}$  in der Kälte leicht ausgezogen werden kann, leichtesten, wenn man das Salz in einem verstopften Glase mit dem Spiritus schüttelt und nachher klar läßt. Das kohlensaure Natron erleichtert das Ausziehen, weil es nicht zerfließt. Der Weingeist hinterläßt beim Verdampfen in einer Porcellanschale das Jodkalium oder Jodnatrium, gewöhnlich mit etwas Chlorwasser oder auch kohlensaurem Alkali gemischt, das man in der bekannten Weise auf Jod prüft.

Das ausgezogene Jodmetall beträgt immer um so weniger, je weniger die angewandte Menge des Leberthrans war. In mehreren Versuchen habe ich mehrere Male nur die Hälfte dieses Salzurückstandes von 18,0 Grm. Leberthran erhalten, um darin das Jod so entschieden nachzuweisen, als nur verlangt werden kann. Ich bediene mich dazu einer Reductionsröhre, welche sich in meiner Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse, p. 369



beschrieben findet. Die Röhre ist ungefähr 4 Z



und von der Dicke einer  
nenfeder. Etwa einen Z  
offnen Ende entfernt ist  
zur Stärke einer Strickna  
Ausziehen verengt, un  
schräg abgebrochen. In d  
bringt man das trockne  
welchem man Jodkalium  
natrium vermuthet, und g  
dann ein paar Tropfen  
trirte Schwefelsäure hin

die Säure in dem engen Theile der Röhre bleibt, so hat man Zeit, die Röhre mit einem Kleister aus *Weizenstärkmehl*, welcher seiner Farbe wegen vorzuziehen ist, so zu verschließen, die entwickelt werdenden Gase nur einen Ausweg, den Kleister hindurch finden können. Erwärmen nun den untern Theil der Röhre ganz wenig, z. B. der Hand, so tritt etwas Luft durch die Schwefelsäure und diese fließt nun, so wie die Spannung der eingeschlossenen Luft nachläßt, herab. Es ist klar, daß die kleinste Menge von producirtem Jod mit dem Jodkleister am vordern Ende der Röhre in Berührung kommen muß, wenn man den untern Theil der Röhre schwach erhitzt. Diese Erhitzung ist aber nicht nöthig, und stellt man die Röhre nur in schräger Lage 24 Stunden lang hin, so wird der untere Theil der Röhre noch intensiv blau gefärbt, wenn auch nur ordentlich wenig Jod in dem eingebrachten Salze vorhanden war. Auch bleibt die blaue Farbe mehrere Tage unverändert. — Uebrigens kann man auch aus jodhaltigen Alkalien auf dieselbe Weise jede kleine Menge Jod reduciren. Man braucht nur, wie ich gefunden habe, das jodsaure Salz mit concentrirter Salzsäure nebst 10 Tropfen Quecksilber, oder mit concentrirter Salzsäure nebst etwas gepulvertem Eisenhammerschlag, in der Reductionsröhre zu erhitzen. Das Amylum

leicht blau, wenn auch die Dämpfe des Jods an kaum mehr wahrnehmbar sind.

Ist die Röhre einige Zoll länger, als angegeben worden, so condensirt sich das Jodgas zu früh und gelangt nicht leicht zu dem Amylum. In diesem Falle braucht man nur ein Körnchen kohlen-saures Kali oder auch Potasium mit in die Röhre einzutragen. Die daraus entwickelten Gasarten führen dann das Jodgas mit zum Wasser hinauf und beschleunigen so die Reaction. Mengt man das zu prüfende Salz vor dem Eintragen in die Röhre mit etwas Braunstein, so erfolgt die Reduction des Jods freilich schneller, aber sie wird, wenn zugleich Chlormetall vorhanden ist, wie z. B. in dem Salze der Einäscherung der Leberthranseife, geschwächt oder gar aufgehoben durch das gleichzeitig entwickelte Chlor. Das Amylum färbt sich nun violett oder vorwiegend blau und das Resultat wird unsicher.

So oft auch der hellbraune Leberthran in unserm Laboratorium auf die angeführte Weise untersucht worden ist, selbst von den noch minder geübten Anfängern der Kunst, so oft ist darin auch das Jod nachgewiesen worden. Weiße Sorten des Thrans haben wir bis jetzt noch nicht geprüft, diese aber *nichtjodhaltig* gefunden. Ich theilte mir vor kurzem einer meiner frühern Hörer, Hr. Apotheker Haenert zu Buttstedt, mit, dass er von einem Leipziger Handlungshause auch einen Leberthran erhalten habe, der sich stark jodhaltig zeigte und daher auch von den Aerzten seines Wohnortes dem hellbraunen Thran vorgezogen werde.

Wie leicht die Entdeckung des Jods im Leberthran ist, so schwierig ist doch die quantitative Bestimmung des Jods darin, so lange die Verseifung des Fettes die Verkohlung der Seife das einzige Mittel ist, um das Jod aus seiner Verbindung mit dem Fette zu setzen. Große Quantitäten des Fettes machen den Versuch beschwerlich, und kleinere enthalten so wenig Jod, dass unbedeutende und unvermeidliche Gewichts-differenzen einen großen Einfluss auf die Bestimmung des Jods



ausüben. Ich habe daher immer nur 30,0 Grm. des Thranes angewendet, will aber übrigens, ungeachtet alle mögliche Vorsicht angewendet wurde, die erlangten Zahlenwerthe nicht für absolut genau ansehen.

Das Verfahren war das oben bei der qualitativen Analyse angegebene. Es wurde sorgfältig jede Einmischung von Chlorkalium oder Chlornatrium vermieden, und daher ganz reines aus *sal tartari* bereitetes Aetzkali zur Verseifung angewendet. Der weingeistige Auszug aus dem von der Verkohlung der Seife erhaltenen Salz wurde bis zur Verflüchtigung des Weingeistes abgedampft, wieder mit Wasser vermischt und nun mit salpetersaurem Silberoxyd versetzt. Ein kleiner Zusatz von Salpetersäure nahm die geringe Menge von entstandenem kohlensauren Silberoxyd hinweg und überschüssiges Ammoniak das Chlorsilber und Bromsilber, welche ebenfalls aus dem Chlor und Brom des Fettes entstanden sein konnten. Der schwach gelbliche oder weiße Niederschlag von Jodsilber wurde auf einem vorher ausgelaugten Filter gesammelt, vollkommen ausgewaschen und stark ausgetrocknet. Einem Irrthum im Wägen zu begegnen, war das Filtrum in ein gleichschweres Gegenfiltrum gesteckt worden. Auf diese Weise erhielt ich aus 30,0 Grm. hellbraunen Leberthran 0,018 Grm. Jodsilber, und aus einer gleichen Menge eines andern Thranes 0,009 Grm., was für den ersten Fall 0,324 Pr. und für den zweiten Fall 0,162 Pr. Jod in 100 Theilen des Leberthranes ausmacht.

Zur Führung des Beweises, daß die Gewichtszunahme des Filters auch von Jodsilber herrühre, wurde das Filtrum verkohlt und dann mit kohlensaurem und etw. ätzendem Kali in einer Glasröhre geschmolzen. Der Rückstand wurde mit Wasser ausgelaugt, die Lösung filtrirt und mit gekochtem Amylum und Salpetersäure vermischt, wo alsdann eine starke violette Färbung gewöhnlich entstand.

Die von dem Jodsilber abfiltrirte ammoniakalische Flüssigkeit gab beim Ansäuern mit Salpetersäure eine

gen, im getrockneten Zustande 0,014 Grammen  
ren Niederschlag. Auch dieser wurde nach Ein-  
ung des Filtrums mit Kali geschmolzen, der Rück-  
im Wasser aufgelöst und die filtrirte Flüssigkeit  
ufung auf Brom mit Chlor und Aether behandelt  
bekannter Art. Der Aether nahm aber keine gelbe  
an, und demnach muß ich annehmen, daß wenig-  
in dem von uns untersuchten Thran kein Brom  
ten war.

Ich wurde noch zur Sicherheit das Salz untersucht,  
s mit Spiritus zur Aufnahme des Jodkaliums war  
elt worden. Es wurde in Wasser aufgelöst und  
lösung in zwei Theile getheilt. Der eine diente  
ufung auf Jod, der andere auf Brom. Aber un-  
et aller Mühe konnte keine Spur von beiden darin  
t werden.

## Chemische Untersuchung über die Bitume;

von

*Pelletier und Walter.*

### Erster Theil.

#### *Naphta.*

Bei der Fortsetzung unserer Versuche über die  
chen Körper und namentlich die Oele, die durch  
ung organischer Körper in hoher Temperatur  
en, fühlten wir insbesondere das Bedürfnis, die  
nen so verschiedenen Producte mit analogen con-  
en Materien zu vergleichen, die wir besonders  
natürlichen Bitumen, Naphta, Bernstein und As-  
t finden hofften. Vorzüglich schien uns die Naphta  
er Körper, der als Ausgangspunct und Verglei-  
noment bei der Untersuchung der leichten äthe-  
Oele, der flüssigen Kohlenwasserstoffe, die bei  
setzung der organischen Materien durch Wärme  
n, mit Vortheil benutzt werden könnte. Aber

die natürliche Naphta, selbst in ihren leichtesten Varietäten, ist nicht die reine Naphta der Chemiker, die von Saussure untersuchte Naphta, und diese ist nur einer ihrer Bestandtheile. Von der Naphta der Mineralogie dürften wir nur einen ihrer Bestandtheile ziemlich kennen; wir haben daher eine genauere Untersuchung derselben für angemessen gehalten. Wir reden demnach hier nur von der eigentlichen Naphta und nicht vom Petroleum und andern mehr oder weniger flüssigen Bitumen, deren eine Varietät Gegenstand einer sehr interessanten Arbeit Boussignault's ausmachte.

Zu unsern Versuchen haben wir von einem ehrenwerthen Hause Naphta erhalten, auf deren Reinheit wir rechnen konnten; sie hatte alle Charactere dieser Substanz, Kalium blieb darin unverändert, nach mehrwöchentlichen Arbeiten aber mußten wir uns überzeugen, daß sie mit künstlichen Brenzölen vermenget war. Wir würden dieses Umstandes nicht gedenken, hätten wir nicht eine wichtige Folge daraus gezogen. Wir fanden in dieser Naphta nämlich Naphtalin, ein Product, welches nur bei sehr hohen Temperaturen entsteht: enthielt die Naphta nun natürlich diesen Körper, so könnten die Geologen daraus schliessen, daß die Naphta in bedeutenden Tiefen oder bei einer sehr hohen Temp. sich gebildet habe, während die Abwesenheit des Naphtalins und die Gegenwart des Paraffins\*), das wir in der natürlichen Naphta fanden, und welches sich bei der Temp. zersetzt, bei welcher das Naphtalin sich bildet, beweisen, daß die Naphta bei einer wenig über Kirschrothglühhitze gehenden Temp. sich gebildet haben muß. Die nachfolgenden Versuche haben wir an einer Naphta angestellt, deren Ursprung authentisch wir hatten sie durch Hrn. Dr. Majon von Amiano er-

\*) Auf Reichenbach's frühere Versuche und dessen Angaben über das Petrol verweisend bemerken wir hier auch, daß auch bereits von Christison und Gregory, so wie von v. Kobell und Buchner jun. in mehreren Petroleum-Paraffin aufgefunden ist.

en; sie hatte folgende Charactere: sie war sehr  
ig, bernsteingelb, von starkem aber angenehmen  
ch, 0,84 spec. Gew., entzündete sich bei Annähe-  
eines brennenden Körpers, kochte bei 130°, machte  
er durchscheinend, was an der Luft nicht ganz sich  
or. Die Analyse ergab ihre Zusammensetzung zu:

Kohlenstoff.....86,77

Wasserstoff.....13,17.

*Chemische Untersuchung.*

Da wir durch Auflösungsmittel, Alkohol, Aether,  
u. s. w. für die Ausmittlung der Bestandtheile der  
ta keine bemerkenswerthen Resultate erhielten, so  
en wir uns sogleich zu denen der Destillation wen-  
Schon bei 125° C. treten einzelne Dampfblasen auf  
gehen einige Oeltropfen über; bei 130° ist sie in  
m Kochen, die Temp. bleibt aber nicht lange sta-  
r, sondern steigt rasch. Als der Rückstand 270°  
e, wurde das Destillat abgenommen, es erschien  
ich, etwas ölig und betrug  $\frac{2}{3}$  der ganzen Masse.  
Destillation wurde bis zu 300° fortgesetzt, das zweite  
act war gelber und ölicher als das erste, doch noch  
flüssig; über 300° aber destillirte jetzt ein öliges  
act, welches zu einer Gallerte erstarrte, darauf eine  
e Materie von butterartiger Consistenz, und eine  
lisch glänzende Kohle blieb zurück.

Die butterartige Materie wurde durch wiederholte  
lationen, wobei jedesmal die ersten Portionen, die  
ch etwas Oel enthielten, abgesondert wurden, und fer-  
urch Auflösen in kochendem Alkohol und Behandeln  
Thierkohle gereinigt; sie zeigte hierauf folgende  
ctere. Sie ist weiß, fest, in Aether und ätherischen  
leichtlöslich, in kaltem Alkohol fast unlöslich, in  
m löslicher, beim Erkalten in Flocken sich aus-  
nd; Säuren und Alkalien wirken nicht merklich  
f. Kurz, sie verhielt sich als Paraffin, und zeigte  
er Analyse dieselbe Zusammensetzung.

Wir bemerken, daß das Paraffin schon von Lau-  
in dem Schieferöl gefunden wurde, aber es war

noch nicht erwiesen, ob das Paraffin natürlich in dem Bitumen dieser Schiefer existirte oder sich erst bildete bei der Temp., bei welcher man das Gestein behufs der Darstellung des Schieferöls destillirt. Die Gegenwart des Paraffins in der natürlichen Naphta scheint zu beweisen, daß es in dem Bitumen der Schiefer präexistirt; es ist selbst wahrscheinlich, daß bei der Destillation der Schiefer vielmehr ein Theil Paraffin zerstört als gebildet wird, denn treibt man Paraffin in Dampfform durch eine rothglühende Porcellanröhre, so wird es zersetzt und unter den Zersetzungsproducten findet man Naphthalin. Das erste Destillat der rohen Naphta war, wie oben angeführt, bei 130 bis 270° erhalten, und somit ohne Zweifel ein Gemenge mehrerer Producte, unter welchen auch die Naphta Saussure's sich finden mußte. Die, obwohl sie nach diesem Chemiker bei 85° siedet, durch die damit verbundenen Körper zurückgehalten werden konnte. Durch zahlreiche Rectificationen, wozu jedesmal nur das erste Drittel jeder vorhergegangenen Operation genommen wurde, gelang es uns, die Naphta zu isoliren.

Die so erhaltene *reine Naphta* betrug nur den zwanzigsten Theil der rohen Naphta (von Amiano), doch war der Siedepunct nicht absolut fix, sondern oscillirte zwischen 83 und 85°. Durch die bloße Destillation scheint man nicht dahin zu gelangen, derartige ölige Producte die aus Gemengen von so ähnlichen Substanzen bestehen, völlig zu trennen. Wie dem auch sei, die erhaltene Naphta war vollkommen flüssig und durchsichtig, und verflüchtigte sich an der Luft vollständig. Ehe wir sie der Analyse unterwarfen, wurde sie noch über wasserleere Phosphorsäure destillirt, die keine andere Wirkung darauf äußert, als sie von Feuchtigkeit zu befreien.

Die Zusammensetzung dieser Naphta ergab sich in zwei Versuchen zu:

|                 |      |      |
|-----------------|------|------|
| Kohlenstoff.... | 86,2 | 86,1 |
| Wasserstoff.... | 13,7 | 13,8 |



Die Dichtigkeit des Dampfs fanden wir = 3,3.

Wir haben nun die öligen Producte untersucht, die bei höheren Siedepuncten gewannen, und die unzähligen Rectificationen unterworfen wurden, ohne daß wir von festen Siedepuncten erhielten. Es traten allerdings Stadien ein, wo der Siedepunct einige Zeit beständig blieb, und die Temp. nur langsam sich erhob, welche Punkte wir als Centra der Siedung betrachten können, die uns bei der Theilung der Producte leiteten, und wir haben sie auch benutzt, um diese verschiedenen Producte zu erhalten, die analysirt wurden, deren Dampfdichtigkeit wir bestimmten. Diese Producte waren keinem andern chemischen Agens zuvor ausgesetzt, als nur der Dest. über Phosphorsäure, um von aller Feuchtigkeit zu befreien. Es wurden folgende Resultate erhalten:

| Naphta, deren Siedepunct: | Zusammensetzung: | Dichtigkeit des Dampfs: |
|---------------------------|------------------|-------------------------|
| 100 — 115°                | 86,5 C. 13,5 H.  | 3,7                     |
| 115 — 120                 | 85,8     13,4    | 3,8                     |
| 120 — 130                 | 87,6     13,3    | 3,9                     |
| 140 — 145                 | 86,7     13,4    | 4,1                     |

Der Siedepunct der Naphtaöle war bei 145° nicht bleibend, wir erhielten noch solche bei höheren Temperaturen, einige Analysen auch dieser Producte gaben aber 86 — 87 C. und 13 — 14 H.

Die nahe Uebereinstimmung der Zusammensetzung der verschiedenen Producte unter sich wie mit der reinen Naphta führte wohl zu der Frage, ob in der natürlichen Naphta in der That mehrere verschiedene Oele enthalten sein, oder ob sie, identisch in ihrer Substanz, (vielleicht mit Ausnahme des Paraffins) nur einen Typus bildend, durch Wärme modificirt werde, wenn auch nicht in ihrer Zusammensetzung, doch in der Anordnung ihrer Moleküle; nach den folgenden Versuchen ist diese Ansicht nicht anzunehmen.

Bei unserer Arbeit über die brenzlichen Oele der Steine war es uns gelungen, durch Behandlung mittelst

Schwefelsäure daraus wohl bestimmte Materien zu erhalten; wir haben dieses Verfahren auch bei der Untersuchung der Naphta angewendet. Die Kohlenwasserstoffe werden im Allgemeinen von den Säuren, namentlich in der Kälte, wenig angegriffen, bisweilen vereinigen sie sich damit, selten aber erleiden sie eine wesentliche Veränderung, namentlich die Naphta und ihre Glieder; wenn aber auch die durch Schwefelsäure aus der Naphta erhaltenen Körper Producte der Reaction wären, so würden sie doch nicht minder ihren Rang unter den bestimmten Verbindungen einnehmen, mit deren Studium seien sie natürlich oder künstlich erhalten, der Chemiker sich beschäftigen muß.

Bei der Vermischung von Naphta und Schwefelsäure in der Kälte bemerkt man eine schwache Temperaturerhöhung des Gemenges; die Säure färbt sich roth, die Naphta verliert ihre bernsteingelbe Farbe, wird roth und wird sie nun abgegossen, destillirt und aufs Neue mit Schwefelsäure behandelt, tritt keine Temperaturerhöhung mehr ein, die Säure färbt sich noch roth, aber weniger intensiv, und die Naphta bleibt farblos. Nach vier- bis fünfmaliger Behandlung mit Schwefelsäure und eben so vielen nachherigen Destillationen wird die Säure durch die Naphta nicht mehr gefärbt. Bei der Destillation der so erhaltenen Naphta erhält man nun sehr leicht Producte, deren Siedepuncte, wenn auch nicht absolut fix, doch in sehr engen Gränzen eingeschlossen sind und auf eine schneidendere Weise, die Siedecentra hervortreten lassen, besonders bei 90, 115 und 190°; jenseits dieses Punctes erhält man noch ölige Producte, in welchen aber stets schon Paraffin enthalten ist. Folgende Tafel enthält die Analyse dieser Producte; sie waren durch Destillation über wasserleere Phosphorsäure von aller Feuchtigkeit befreit.

| Naphta, deren Siedepunct: | Zusammensetzung: | Dichtigkeit des Dampfs: |
|---------------------------|------------------|-------------------------|
| 90°                       | 86,5 C. 13,8 H.  | 3,42                    |
| 115                       | 85,7 14,6        | 4,0                     |
| 165 — 170                 | 86,5 13,4        | 4,9                     |
| 190                       | 86,7 13,2        | 5,3                     |
| 190 — 220                 | 87,2 13,5        | 6,0                     |

Wir könnten diese Tafel noch erweitern durch die Analysen noch nachfolgender Producte, wir würden aber nun mit Paraffin gemengte Producte haben, wie bereits geführt. Wir werden also die Oele von ungefähr 90, und 190° Siedepunct, welche drei wohl unterschiedene Producte bilden, näher betrachten, den Namen *Naphta* den wir für die erste dieser Substanzen behalten, die andern beiden mit *Naphten* (Naphtène) und *htol* bezeichnen.

### *Naphta.*

Zwischen der durch directe Destillation erhaltenen 85° siedenden und der durch Behandeln mit Schwefelsäure erhaltenen bei 90° siedenden haben wir keinen scheinlichen Unterschied bemerken können. Doch möchten wir die mittelst Schwefelsäure erhaltene als die beste betrachten, wenn sie auch erst bei 90° siedet; der That wird auch die durch die bloße Destillation erhaltene, bei 85° siedende Naphta durch Schwefelsäure scheinlich rosenfarbig und ausgewaschen, und über wasser-Phosphorsäure destillirt, kocht sie nun erst bei 90°. Es scheint sonach, daß die mit Schwefelsäure behandelte Naphta noch einen sehr leichten, sehr flüchtigen Kohlenwasserstoff enthält, der durch Schwefelsäure absorbirt wird, vielleicht einer von den von Day im Leuchtgase gefundenen; anderntheils ist es sehr glaubhaft, daß die bei 90° kochende Naphta et-Naphten enthält, welches derselben unmittelbar folgt, wir glauben daher, daß man der Wahrheit sehr nahe gekommen, wenn man für den Siedepunct der reinen Naphta 90° annimmt. Die procentische Zusammensetzung und Dichtigkeit des Dampfs bleiben unverändert.



Als die rationellste Formel für das Aequivalent der Naphta nehmen wir an :

|                       |   |               |      |
|-----------------------|---|---------------|------|
| Kohlenstoff....14 At. | = | 1071,28       | 86,8 |
| Wasserstoff....26     | = | 162,50        | 13,2 |
|                       |   | <hr/> 1233,78 | 100. |

Die Atomendichtigkeit der Naphta nach dieser Formel würde 13,5928; bekanntlich besteht aber im Allgemeinen das Atom der flüssigen Kohlenwasserstoffe aus 4 Vol. Dampf, wir werden also für die Dichtigkeit des Naphtadampfs haben  $\frac{13,5928}{4} = 3,39$ , was mit der durch den Versuch gefundenen Dichtigkeit übereinstimmt.

Die Naphta wird von chemischen Agentien wenig angegriffen. Schwefelsäure und Salpetersäure üben in der Kälte keine Wirkung darauf aus; in der Hitze aber wird sie von concentr. Schwefelsäure verkohlt und zuweilen mit Entflammung; mit wasserleerer Schwefelsäure aber entzündet sie sich selbst in der Kälte. Erst durch vielfach wiederholte Destillationen wird sie durch Salpetersäure verändert, das wesentliche Product ist eine weißse flockige, in Wasser schwerlösliche, in Alkohol und Alkalien leichtlösliche Substanz, die mit der von Laurent bei Behandlung des Schieferöls mit Salpetersäure erhaltenen Ampelinsäure übereinstimmen möchte.

Die Wirkung des Chlors, Jods und Broms auf die Naphta verdient Aufmerksamkeit; sie ist sehr analog der, welcher dieselben Körper auf die Retennaphta, eine Substanz, die bei der Zersetzung der Harze entsteht, ausüben.

Leitet man einige Zeit Chlor durch Naphta bei geringer Erwärmung, so erhält man eine gelbliche, ölige, schwer entzündliche Verbindung, die schwerer ist als Wasser. Mit Hülfe eines Dochts verbrannt, verbreitet sie einen Rettiggeruch, ähnlich wie Chlorannaphta und Chlorbenzoyl. Diese Verbindung lässt sich nicht destilliren, weil sie durch Wärme zersetzt wird von den meisten chemischen Agentien, Säuren und Alkalien u. s. w. wird sie indess nicht angegriffen.

Es sich in der Naphta leichter in der Wärme als in Kälte, beim Erkalten krystallisirt der Ueberschuß aus und die Naphta scheint nicht verändert zu sein. Nimmt man aber Chlornaphta, oder vielmehr das Product der Action des Chlors auf Naphta, und behandelt dieses mit Jodkalium, so erhält man ein Product, in welchem Chlor durch Jod zersetzt ist, ohne Veränderung der physischen Eigenschaften der neuen Verbindung. Brom verhält sich wie Jod.

### Naphten (Naphtène).

Dieser Körper unterscheidet sich von der Naphta durch eine etwas grössere Dichtigkeit, er ist ölig, weniger flüchtig an der Luft, siedet, wie bereits angegeben, bei  $115^{\circ}$  C. und die Dichtigkeit seines Dampfs ist = Nach der oben angeführten Analyse kann man dafür Formel aufstellen:

|                       |   |         |      |
|-----------------------|---|---------|------|
| Kohlenstoff....16 At. | = | 1224,32 | 85,9 |
| Wasserstoff....32 »   | = | 200,00  | 14,1 |
|                       |   | <hr/>   |      |
|                       |   | 1424,32 | 100. |

Die berechnete Dichtigkeit des Dampfs ist dann  $\frac{1828}{1} = 3,92$ , was mit dem Versuch nahe überein-  
kommt.

Dieser Kohlenwasserstoff ist besonders interessant, weil er die Lücke ausfüllt, die in der grossen Reihe der Kohlenwasserstoffe noch vorhanden, die mit dem Methylen beginnt und mit dem Ceten endigt; nämlich:

- $C_2 H_4$  Methylen,
- $C_4 H_8$  ölbildendes Gas,
- $C_8 H_{16}$  Oelgas,
- $C_{16} H_{32}$  Naphten,
- $C_{32} H_{64}$  Ceten.

Die chemischen Eigenschaften des Naphtens sind fast dieselben wie die der Naphta.

### Naphtol.

Die Zusammensetzung dieses Körpers kann durch folgende Formel dargestellt werden:



|                       |               |            |
|-----------------------|---------------|------------|
| Kohlenstoff....24 At. | 1836,48       | 86,9       |
| Wasserstoff ...44 „   | 275,00        | 13,1       |
|                       | <hr/> 2111,48 | <hr/> 100. |

Die berechnete Dampfdichtigkeit ist  $\frac{22,464}{4} = 5,6$ , was nahe mit dem Versuch (5,3) übereinstimmt. In seinen chemischen Eigenschaften unterscheidet sich das Naphtol wenig vom Naphten, nur giebt es durch Behandeln mit Salpetersäure auch eine harzige Materie, die einen dem Anisöl ähnlichen Geruch besitzt.

### *Resultate.*

Aus dem Vorstehenden ergibt sich:

1) Dafs die natürliche Naphta keine einfache Substanz ist, sondern aus einer festen und mehreren öligen Materien besteht.

2) Dafs die feste Materie Paraffin ist, welches in der Naphta präexistirt.

3) Dafs die öligen Substanzen Kohlenwasserstoffe sind.

4) Dafs man unter diesen Kohlenwasserstoffen drei bestimmt characterisirte unterscheiden kann: die Naphta, das Naphten und das Naphtol.

5) Dafs das Naphten und Naphtol mit Chlor, Brom und Jod Verbindungen liefern, welche eine weitere Untersuchung verdienen.

6) Dafs die natürliche Naphta nach ihrer Zusammensetzung und nach ihren Producten als das Resultat der Wirkung einer ziemlich hohen Temperatur an Pflanzenstoffe angesehen werden mufs, dafs aber die Temperatur, unter welcher sie entstand, die der Kirschbrothglühhitze bestimmt nicht überstieg. (*S. Journ. de Pharm. XXVI, 549.*)

## Analyse einiger bituminösen Substanzen von *Boussignault.*

*Zähes Bitumen von Bechelbronn (Rhein).*

**W**ird dieses Bitumen im Oelbade von 230°C. destillirt.

erhält man ein gelbes Oel, welches alle Eigenschaften Petrolens besitzt. Dieses Oel gab durch die Analyse mit Kupferoxyd folgende Resultate:

- I. 0,290 = 0,929 Kohlens. und 0,322 Wasser  
II. 0,289 = 0,922   "       "   0,326   "  
III. 0,318 = 1,014   "       "   0,366   ".

|                 | I.          | II.         | III.         |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| Kohlenstoff.... | 88,6        | 88,2        | 88,2         |
| Wasserstoff.... | 12,3        | 12,5        | 12,7         |
|                 | <hr/> 100,9 | <hr/> 100,7 | <hr/> 100,9. |

*Feines Bitumen von Bechelbronn.*

Dieses findet sich schwimmend auf der Oberfläche einer Wiese in der Nähe der Fabrik, es besitzt einen petroleatischen Geruch, eine braune Farbe und eine geringe Consistenz, als das, welches durch Behandeln des Rohmaterials erhalten wird. Das analysirte Bitumen war sehr rein, es liefs bei der Verbrennung keinen Rückstand. Bei der Analyse dieses Bitumens, die durch einen Strom Sauerstoff beendet wurde, wurden folgende Resultate erhalten:

- 0,2665 gaben 0,851 Kohlensäure und 0,268 Wasser.  
0,216 gaben 2,1 C. C. Stickstoffgas bei 19°,6 C. und 760 B.

Hiernach ist die Zusammensetzung:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kohlenstoff.... | 88,3         |
| Wasserstoff...  | 11,1         |
| Stickstoff..... | 1,1          |
|                 | <hr/> 100,5. |

Da dieses Bitum wahrscheinlich auch etwas Sauerstoff enthält, so muß der Ueberschuß der Analyse noch etwas mehr betragen.

*Flüssiges Bitum, Petrol aus der Gegend von Hatten (Niederrhein).*

Dieses scheint kein bedeutendes bituminöses Lager zu haben. Es ist sehr flüssig, dunkelbraun, sein Geruch erinnert, dem Petrolen ähnlich. Es verbrennt ohne Rückstand. Die Analyse wurde durch einen Strom Sauerstoff beendet.

## 162 Boussignault: Analyse bituminöser Substanzen.

- I. 0,246 gaben 0,789 Kohlens. und 0,280 Wasser.  
 II. 0,145 gaben 0,5 C. C. Stickstoffgas bei 19° C. u. 0,757 R.

Die Zusammensetzung ist hiernach:

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kohlenstoff..... | 88,70   |
| Wasserstoff..... | 12,60   |
| Stickstoff.....  | 0,40    |
|                  | <hr/>   |
|                  | 101,70. |

### *Festes Asphalt von Coxitambo bei Cuença in Peru*

Die Analyse dieser Substanz wurde durch einen lange unterhaltenen Strom von Sauerstoffgas beendet; das Asphalt war auf ein Platinblech in das Innere der Verbrennungsröhre gebracht, wodurch man genau das Gewicht der Asche des analysirten Bitums bestimmen konnte

|                  |         |
|------------------|---------|
| I. Substanz..... | 0,1815  |
| Asche.....       | 0,0020  |
|                  | <hr/>   |
| Asphalt ..       | 0,1795. |

Diese gaben Kohlens. 0,575 u. Wasser 0,158.

|                   |         |
|-------------------|---------|
| II. Substanz..... | 0,2005  |
| Asche.....        | 0,0022  |
|                   | <hr/>   |
| Asphalt ..        | 0,1983. |

Diese gaben Kohlens. 0,636 u. Wasser 0,174.

|                  | I.    | II.   |
|------------------|-------|-------|
| Kohlenstoff..... | 88,63 | 88,70 |
| Wasserstoff..... | 9,69  | 9,68  |
| Sauerstoff.....  | 1,68  | 1,62  |
|                  | <hr/> | <hr/> |
|                  | 100   | 100.  |

Bei meinen früheren Analysen dieses Asphalts der damals üblichen Methode erhielt ich nie mehr als 76 % Kohlenstoff. (*Annal. de Chim. et de Phys.* LXIII, 12)

## Ueber die Wirkung der Schwefelsäure auf Untersalpetersäure und die Theorie der Fabrikation der Schwefelsäure;


von

*F. de la Provostaye,*  
 Professor am Collège Louis le Grand.

Die Schwierigkeit einer richtigen Theorie der  
 die Fabrikation der Schwefelsäure scheint in dem

im der dabei stattfindenden intermediären Producte liegen. Das krystallisirbare Product, welches sich den Bleikammern bildet, wurde vielfach untersucht und doch blieb seine wahre Natur noch zweifelhaft. Im gemeinen sah man es für eine Verbindung von Schwefelsäure, Salpetrirsäure und Wasser an, während Dumas nach zahlreichen Analogien darin eine Verbindung von Schweflichtsäure und Untersalpetersäure annimmt. Bekannt ist, daß die trockne Schweflichtsäure nicht die trocknen rothen Dämpfe wirkt, da aber der Gasstand ein Hinderniß der Verbindung sein konnte, so war es wichtig, diese Körper im flüssigen Zustande zu suchen. Ich gebrauche dazu folgende Einrichtung.

Quecksilber und Schwefelsäure wurden in eine kleine Vorrichtung gegeben, deren Hals mit einer Chlorcalciumröhre in Verbindung stand, die über ein Meter lang war und deren entgegengesetztes Ende zweimal umgebogen war.



Die erste Biegung *c* tauchte in eine kaltmachende Mischung, damit darin sich die Schweflichtsäure vertheilte; die zweite Biegung *e* war zur Einführung der gasförmigen Untersalpetersäure bestimmt; sie war am Ende gezogen und endete sich in einem kleinen Trichter. Die Untersalpetersäure war durch Destillation von wohl trocknetem salpetersauren Blei dargestellt, und wurde falls in einer U-förmig gebogenen, in eine, in eine kaltmachende Mischung tauchende Röhre aufgenommen. Die Vorrichtung so weit eingerichtet, so nimmt man die Retorte *m*

weg und läßt durch den Trichter *f* ein der flüssigen Schweflichtsäure in *c* gleiches Volum Untersalpetersäure in *e* eingiessen, schmilzt dann an der Lampe die Röhre bei *b* und *f* zu und mengt nun erst beide Flüssigkeiten; sie werden grün und trüben sich, aber die gesuchte Verbindung entsteht nicht sogleich, sondern erst mit der Zeit. Nach und nach erscheint ein gelblich - weißer Bodensatz, der sich unter einiger Temperaturerhöhung während 25 bis 26 Stunden vermehrt, so daß ohngefähr  $\frac{2}{10}$  der Masse fest werden. Ueber dem Bodensatze bleibt eine grünliche Flüssigkeit, deren Menge gering ist, wenn die Untersalpetersäure nicht im Ueberschuss vorhanden war. Bei dem Oeffnen der Röhre empfindet man oft heftige Stöße und es können selbst gefährliche Explosionen entstehen, es ist deshalb zu rathen, die Röhre erst nach drei Tagen zu öffnen und nachdem man sie in eine kaltmachende Mischung gestellt hat.

Die Verbindung geht nicht ohne eine vorherige Zersetzung der beiden reagirenden Körper vor sich, wie die Bildung der oben erwähnten grünlichen Flüssigkeit zu beweisen scheint. Da diese aber sehr schwer zu sammeln ist, so muß man das feste Product untersuchen, was deshalb schwierig ist, weil es so sehr Feuchtigkeit anzieht. Ich werde daher alle mit Erfolg angewendeten Vorsichtsmafsregeln anzeigen. Um eine reine, homogene und stets identische Materie zu haben, muß man damit anfangen, sie zu schmelzen. Man öffnet die Röhre durch Abbrechen der Spitze, wobei sogleich eine Explosion, aber sehr schwach, eintritt, wenn man die oben angeführte Vorsicht gebraucht hat. Das Ende verschließt man dann mit dem Löthrohr und bringt den Apparat in ein Oelbad. Bei  $120^{\circ}$  ohngefähr öffnet sie sich von neuem; es entweichen dann einige rothe Dämpfe, die nur zwischengelagert waren, denn die Materie selbst erleidet keine Veränderung. Man erhitzt dann langsam weiter bis zu  $217^{\circ}$ , wobei die Materie anfängt zu schmelzen, bei  $230^{\circ}$  ist sie völlig geschmolzen. Erhitzt man stärker, so fängt sie an zu destilliren, und zwar in der



he des Siedepunctes des Quecksilbers. Sie destillirt verändert und verdichtet sich wieder kurz über der sitzten Stelle. Beim Destilliren erscheint die Substanz h, fast wie die flüssige Untersalpetersäure; bei 220 230° ist sie eine gelbe ölähnliche Flüssigkeit; nach Erstarren erscheint sie opak und schön gelb, bis nach Erkalten seidenglänzende schön weisse Zusammenhängungen bildet. Unter dem Mikroskop erkennt man die Krystalle als gerade vierseitige rectangulaire Formen mit zwei gegenüberstehenden abgestumpften Endflächen.

Behufs der Analyse dieses Körpers muß man ihn in eine andere Röhre überführen. Dieses ist schwierig, wenn man alle Feuchtigkeit vermeiden will, doch geht es auf folgende Weise. Man schmilzt über der Lampe einen kleinen Theil der Materie und läßt sie bis zu ausgezogenen Theil der Röhre fließen. Man kann Materie ohne Gefahr in einer Röhre schmelzen und flüchtigen, wenn sie wasserleer ist; es ist aber nicht der Fall, wenn man Wasser hinzufügt. Man bricht die Spitze der Röhre ab und verbindet sie mit einer zuvor gewogenen ganz trocknen Röhre; nach Erhitzen fließt dann die Flüssigkeit von einer Röhre in die andere, worauf man die beiden Röhren wieder zuschmelzt, was so schnell geschieht, daß keine Feuchtigkeit absorbirt werden kann. Durch eine neue Wägung erhält man das Gewicht der in die eine Röhre übergebenen Substanz. Ich verfuhr stets auf diese Weise, und ein bestimmtes Gewicht der Substanz angewendet werden mußte.

Die Bestimmung des Schwefels geschah leicht auf folgende Weise. Eine Röhre mit einem bestimmten Gewicht der Substanz wurde in einen Ueberschuß von Wasser verdünntem Ammoniak getaucht und dann die Spitze der Röhre abgebrochen; es entsteht eine heftige Reaction, man bedeckt das Glas und es entweicht Salpetergas. Der Ammoniaküberschuß wird durch Selen entfernt. Wenn die Flüssigkeit neutral ist, fällt

man sie mit Chlorbaryum und berechnet aus dem Niederschlage die Menge des Schwefels. Auf diese Weise gaben

|                        |            |                     |
|------------------------|------------|---------------------|
| 1) 1,881 Grm. Substanz | 3,683 Grm. |                     |
| schwefelsauren Baryt = |            | 27,00 Procent S.    |
| 2) 0,402 Grm. Substanz | 0,798 Grm. |                     |
| schwefelsauren Baryt = |            | 27,36 „ „           |
|                        |            | <hr/> Mittel 27,18. |

Der Stickstoff wurde auf zwei Weisen bestimmt durch Zersetzen der Verbindung mit Kupfer und mit Quecksilber.

Auf den Boden einer langen Röhre von grünem Glase wurde eine hinreichende Menge kohlen-saures Bleioxyd gebracht, hierauf eine 7—8 Centimet. lange Lage von frisch reducirtem Kupfer, darauf eine kleine, ein bestimmtes Gewicht der Materie enthaltende Röhre, und welche, wie man sie öffnete, mit Kupferspänen gefüllt und nun mit ihrem offenen Ende voraus in die Verbrennungsröhre geführt wurde, dann brachte man 1—2 Centim. lang Kupferoxyd und 20—22 Centim. lang Kupfer hinein, verschloß die Röhre mit einem durchbohrten Kork, welcher die Chlorcalciumröhre aufnahm, die mit einer gekrümmten Röhre verbunden war, die unter eine mit Quecksilber gefüllte Glocke ging. Jetzt wurde nun das kohlen-saure Bleioxyd erhitzt und nur so lange, bis das Gas durch Kali völlig absorbirt wurde. Der vordere Theil des Kupfers wurde dann sehr stark erhitzt, darauf der letzte, wobei die Substanz so viel als möglich vor der Wirkung des Feuers geschützt wurde, bis die ganze Röhre roth glühete. Jetzt näherte man der Substanz von ferne einige kleine Kohlen und sofort entwickelte sich das Gas mit Heftigkeit. Gegen Ende der Operation wurde noch einmal starkes Feuer gegeben und dann wieder Kohlensäure dadurch aus dem kohlen-sauren Bleioxyde entwickelt, bis das Volum der Luft in einer Probierröhre, die eine starke Auflösung von Kali enthielt, nicht merklich verändert wurde. Auf zwei Versuchen, die kein genaues Resultat gaben, gab

dritte vollkommen. 0,624 Grm. Subst. gaben 63,73 C. C. Stickstoffgas, bei 16° C. und 0,746<sup>m</sup> B. = 58 C. C. trock- Gas bei 0° C. und 0,76<sup>m</sup>. B., die Dichtigkeit des Stickstoffs 0,975 genommen erhält man 11,79 % Stickstoff.

Das Wasser wurde in einem besondern Versuche bestimmt, da sich fand, daß im vorhergehenden die Röhre gut genug ausgetrocknet war. 0,734 Grm. Substanz auf dieselbe Weise zersetzt gaben 0,01 Grm. Wasser, eine so geringe Menge, die nicht in Betracht zu ziehen ist.

Wir haben also


|                 |       |
|-----------------|-------|
| Schwefel.....   | 27,18 |
| Stickstoff..... | 11,79 |
| Sauerstoff..... | 61,03 |
|                 | <hr/> |
|                 | 100.  |

Diese Zahlen correspondiren genau mit der Formel:

$2\text{Az}_2\text{O}_4 + \text{SO}_2\text{O}$ ; diese giebt:

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Schwefel 2 At.....   | 27,18 |
| Stickstoff 2 „ ..... | 11,96 |
| Sauerstoff 9 „ ..... | 60,86 |
|                      | <hr/> |
|                      | 100.  |

Die Bestimmung des Stickstoffs wurde noch auf eine andere Weise versucht. Eine bestimmte Menge der Substanz wurde auf den Boden einer zuvor gewogenen Röhre



gebracht, die darauf umgebogen, ausgezogen, zugeschmol- und gewogen wurde. Die Spitze der Röhre wurde dann abgebrochen, und reines und kaltes Quecksilber in den Theil *a b* gebracht, worauf das Ende der Röhre über eine kleine Klocke mit Quecksilber geführt wurde.



Beide Körper, die in der Kälte keine Wirkung auf einander haben, reagiren lebhaft in der Wärme; es entwickelt sich ein Gemenge von Schweflichtsäure und Salpetergas, schon bei einer nicht sehr hohen Temp.; in der Röhre bleibt schwefels. Quecksilberoxyd zurück. Die Analyse des Gasgemenges liefs sich nach mehreren vergeblichen Versuchen am besten mit Kalium bewirken.

0,501 Grm. Substanz, auf oben bemerkte Weise behandelt, gaben 125,43 C. C. Gas, bei 21° C. und 0,764<sup>m</sup> B.; 4 C. C. ohngefähr waren in der kleinen Retorte geblieben, deren Capacität 5 C. C. war. Diese Gasmenge auf 0° C. und 0,76<sup>m</sup> B. zurückgeführt, beträgt 121 C. C. worin aber 4 C. C. Stickstoff enthalten sind, aus der Luft der kleinen Retorte herrührend, es bleiben folglich 117 C. C. Eine gewisse Quantität des Gases wurde mit Kalium in einer graduirten Röhre behandelt, 168 Theile gaben 72 und 162,4 gaben 66,4 Rückstand, oder 47,3 C. C. Stickstoff auf 117 C. C. Gas, folglich 12,02 Procent Stickstoff. Es gaben nach diesem selben Versuch mit hin 0,501 Grm. Substanz 95,66 C. C. Salpetergas und folglich 21,34 C. C. Schweflichtsäure, nach der obigen Formel hätte man 23,3 C. C. haben müssen, eine möglichste Uebereinstimmung bei einem solchen Versuche.

Die hier untersuchte Substanz färbt die Haut dunkelroth, nach und nach gelb, und hinterlässt endlich einen schwärzlichen Fleck. An der Luft zieht sie Feuchtigkeit an, wird darauf zersetzt und entwickelt Unsalpetersäure. In viel Wasser gebracht entwickelt sich reichlich Salpetergas, die entstandene Auflösung von Schwefelsäure hält aber noch immer einen Theil davon zurück.

Die Hydrate der Basen zersetzen ebenfalls diese Substanz; trockner Baryt hat in der Kälte keine Wirkung darauf, in höherer Temperatur wird er aber plötzlich glühend; es entwickelt sich Salpetergas und schwefels. Baryt bleibt zurück.

Ammoniakgas wird davon absorbirt, es bildet sich eine weisse Kruste, die die fernere Absorption hindert.


und die eine Art Sulfamid zu sein scheint; man bemerkt keine Spur von Zersetzung. Läßt man trocknes Ammoniakgas durch die geschmolzene Materie strömen, so entwickelt sich viel Stickstoff und es bleibt saures schwefels. Ammoniak zurück.

Salpetersäure, Oxalsäure und Essigsäure zersetzen diesen Körper; Chlorwasserstoffsäure bildet damit ein Königswasser; Schwefelsäure wirkt in der Kälte nicht darauf, was man benutzte zur Bestimmung des spec. Gew. im festen Zustande, es fand sich dieses 2,14. Bei der Wärme wird er von der Schwefelsäure unzerlegt aufgelöst; die Auflösung hat eine grünlichgelbe Farbe und destillirt unzersetzt über. In der Kälte bleibt er flüssig und farblos, wenn die Schwefelsäure in großem Ueberschuß angewendet war, gegentheils wird die Masse fest, halb durchscheinend und auch fast farblos. Beim Festwerden der Auflösung bilden sich darin leicht zertrümmerte Krystalle..

An der Luft zieht der Körper in allen Puncten seiner Oberfläche Feuchtigkeit an, die Stickstoffverbindung wird dabei zersetzt und es bleibt Schwefelsäure, die Zersetzung geht aber sehr langsam vor sich.

Mit Indigo giebt die hinreichend concentrirte Auflösung eine sehr schöne Farbe; die grüne Farbe wird durch Erhitzen roth und durchläuft alle möglichen Nuancen zum Purpurs.


Nach Festsetzung der Zusammensetzung und der Eigenschaften dieser Substanz läßt sich die Reaction, nach welcher sie entsteht, leicht bezeichnen; sie läßt sich durch folgende Formel ausdrücken:




Es ist also Salpetrigsäure, die beim Oeffnen der Röhre solcher Heftigkeit in den Gaszustand zurücktritt, daß das Gefäß platzt, wenn man die nöthigen Vorsichtsregeln versäumt hat.

Was die rationelle Formel betrifft, so kann es keine andere sein, als:





Der Körper  $\text{SO}_2, \text{Az}_2 \text{O}_4$ , welcher nicht für sich und nicht ohne  $\text{SO}_2, \text{O}$  existiren kann, erinnert an eine ähnliche von Heinrich Rose als schwefelsaures Schwefelchlorid beschriebene Verbindung,  $\text{S Cl}_4, 5 \text{SO}_2$ . Die Analogie beider Verbindungen wird sich deutlicher ausstellen, wenn wir letztere  $\text{S}_2 \text{Cl}_2 \text{O}_5$  schreiben dann beide neben einander setzen:



Hiernach läßt sich vermuthen, daß unter dem Einfluß der wasserleeren Schwefelsäure die trockne Schweflichtsäure und trockne Untersalpetersäure ohne Zersetzung sich verbinden können. Dieses wird durch folgenden Versuch bestätigt.

In einer doppelt gekrümmten Röhre, gleich oben bei Darstellung der Substanz, liefs man wasserleere Schwefelsäure verdichten und bereitete dann Schweflichtsäure und Untersalpetersäure, flüssige, aber sehr trocken. Zuerst wurde die trockne Schweflichtsäure auf der einen Seite in die Krümmung *c* gegeben, darauf die Untersalpetersäure in *f*, die Enden *v* und *w* an der Lampe zugeschmolzen und die Flüssigkeiten gemischt; die Verbindung erfolgte auf der Stelle *e*, die erhaltene Materie schmolz bei  $215^\circ \text{C}$ . und besaß die Eigenschaften des Körpers, welcher aus der Verbindung der trocknen Schweflichtsäure und Untersalpetersäure entsteht.

Ferner, man erhält Krystalle, wenn man auf die trockne Schwefelsäure Salpetergas und Sauerstoff in Verhältnissen zusetzt, die zur Bildung von Salpetrichsäure, oder ein Gemenge von Salpetrichsäure und Salpetergas u. s. w. bringt. Alle diese Methoden kommen darauf zurück, daß die vorhandene Menge der Schwefelsäure und der Salpetrichsäure die Bildung der weissen Krystalle bestimmen. Man kann nun einwerfen, wie in einem auf diese Weise erhaltenen Körper Schweflichtsäure vorhanden sein, und


die Salpetrichsäure die Schwefelsäure desoxydiren könne? Es findet nun aber eine völlige Identität zwischen diesen Krystallen und denen, wovon es sich hier insbesondere handelt, statt; die ersten lösen sich unzersetzt in Schwefelsäure auf und färben sie in der Wärme genau wie die wasserleere Verbindung. Die Krystallisation beider ist völlig gleich. Dieser Isomorphismus zeigt deutlich an, daß die neue Substanz als wasserleere Schwefelsäure betrachtet werden muß, in welcher ein Aequivalent Sauerstoff durch ein Aequivalent Untersalpetersäure ersetzt ist.

Nach dieser Hypothese läßt sich die Eigenschaft der Schwefelsäure, diese Substanz in allen Verhältnissen aufzulösen und damit innerhalb sehr ausgedehnter Grenzen Krystalle zu geben, recht gut erklären, was nach der entgegengesetzten Hypothese schwierig sein würde.\*) Es ist mir unbekannt, ob die von einigen Chemikern angenommene Existenz des Halbhydrats der Schwefelsäure durch genaue Versuche erwiesen ist. Wäre das nicht, so könnte man wohl annehmen, daß die wasserleere Schwefelsäure in mehreren Verhältnissen sich in der Schwefelsäure mit einem Atom Wasser auflösen könnte und damit mehrere krystallisirbare Verbindungen lieferte.

Es ist jetzt leicht, die verschiedenen Resultate ausgezeichneten Chemiker über diesen Gegenstand sich zu erklären. Sie haben verschiedene Substanzen untersucht, die sie der Krystallisation wegen für identisch hielten. Dieser Character muß unter diesen Umständen durch genaueren, den Schmelzpunkt, bestimmt werden. Die vorstehenden Versuche scheinen auf den Vorgang in den Bleikammern und die Theorie der Schwefelsäure ein neues Licht zu werfen.

1) *Neues Verfahren.* Man bringt in die Kammern

\*) Zu bemerken ist, daß die Formel der von Henry untersuchten Krystalle auch ausgedrückt werden kann:



oder, wenn man 6 At. Wasser annimmt,  $\text{SO}_2 \text{Az}_2 \text{O}_4, \text{SO}_2 \text{O} + 3 (\text{SO}_2, 2 \text{H}_2 \text{O}).$

Schweflichtsäure, Salpetersäure und Wasserdämpfe. Um den Vorgang nach dieser neuen Methode zu erkennen, führte man einen Strom Schweflichtsäure in ein Flacon mit Salpetersäure. Dieses wurde durch eine Röhre mit einem zweiten Flacon, das Schwefelsäure enthielt, und einem mit Wasser angefeuchteten und einem trocknen Ballon in Verbindung gebracht. Das erste Flacon enthielt bald nur *reine Schwefelsäure*. Rothe Dämpfe gingen aus dem ersten in das zweite, Schweflichtsäure verbreitete sich auch darin, denn es bildeten sich weisse feste Krystalle. Alle Schwefelsäure des zweiten Flacons verwandelte sich in eine feste krystallisirte fast farblose oder vielmehr grünlich-gelbe Masse. Die Reactionen sind im Grunde derselben Art als beim alten Verfahren.

2) *Altes Verfahren*. In eine Kammer, deren Boden mit Schwefelsäure bedeckt ist, und worin fortdauernd Wasserdampf strömt, führt man Schweflichtsäure, Salpetergas und Luft, oder mit andern Worten Schweflichtsäure und Untersalpetersäure im *statu nascenti*. Nach der allgemeinen Annahme verbinden sich diese beiden Körper, was sie im trocknen Zustande nicht vermögen, unter Einfluss des Wassers zu Schwefelsäure und Salpetersäure, die gebildeten Krystalle oder diese Verbindung wird aber durch den geringsten Ueberschuss von Wasser wieder zersetzt.

Hierbei erscheint wenigstens sonderbar, dass das Wasser zwei absolut entgegengesetzte Resultate hervorbringen soll; jetzt aber können wir behaupten, dass das nicht so ist: das Wasser, wo es auf die wasserharte Verbindung wirkt, fängt sogleich an, dieselbe zu zersetzen, was nicht der Fall sein könnte, wenn es die verbundenen Elemente zu erhalten strebte.

Wir wollen die Sache genauer untersuchen.

Schwefelsäure bildet sich, wenn bei Gegenwart von Wasser Schweflichtsäure und Sauerstoff, oder vielmehr Schweflichtsäure und Untersalpetersäure in Berührung gebracht werden: indessen ist die Reaction keineswegs schnell, dieselben Körper aber wirken mit einer grossen



nelligkeit auf einander, wenn wasserleere Schwefel-  
re oder Schwefelsäurehydrat zugegen ist, um im er-  
Fall die Verbindung  $\text{SO}_2 \text{ O}$ ,  $\text{SO}_2 \text{ Az}_2 \text{ O}_4$ , und im  
iten  $\text{SO}_2 \text{ O}$ ,  $\text{SO}_2 \text{ Az}_2 \text{ O}_4$  und Schwefelsäurehydrat zu  
en.

Es ist sonach erwiesen: 1) dafs die Krystalle bei  
enwart von Schwefelsäure entstehen und nicht an-  
; 2) dafs freies Wasser sie immer zerstört. Wenn  
hes in den gewöhnlichen Collegienversuchen zu ihrer  
tehung unumgänglich nothwendig erscheint, so ist  
es eine indirecte Wirkung, und indem es Bildung  
Schwefelsäure veranlafst. Man würde bei diesem  
uch in der That die Krystalle schneller und in grö-  
er Menge erhalten, wenn man zur Befeuchtung der  
de des Ballons Schwefelsäure anwendete.

Bei dem neuen Verfahren tritt die Salpetersäure einen  
l ihres Sauerstoffs an die Schweflichtsäure ab, wo-  
h diese zu Schwefelsäure wird. Von diesem Au-  
lick an, wo sie zum Zustande der Untersalpeter-  
zurückgeführt ist, wirkt sie wie die Untersalpe-  
ure, die bei dem alten Verfahren durch das Sal-  
gas und den Sauerstoff der Luft entsteht; nämlich  
selsweise tritt sie der Schweflichtsäure Sauerstoff  
nd entlehnt solchen wieder aus der Luft; dieser  
ch aber erfordert die Zwischenkunft von Schwefel-  
und Wasser. Das Wasser hat zwei verschiedene  
n: es wirkt direct, um auf eine innige Weise die  
eflichtsäure und Untersalpetersäure in Contact zu  
en, und begünstigt dergestalt die Oxydation des  
1 durch den Sauerstoff des letzten. Dieses ist aber  
sein wichtigster Dienst, weil diese Reaction lang-  
ist: es wirkt weit wirksamer anderer Art in Ge-  
art von Schwefelsäure. Diese bestimmt eine rasche  
ng der weissen Krystalle und auch eines dicken  
schweren gelblichen Dampfs, der viel davon ent-  
das Wasser zersetzt diese unmittelbar und verwan-  
ie in Schwefelsäurehydrat und Salpetrichsäure oder  
tergas. Die Reaction dieses beginnt von neuem und

setzt sich ins Unendliche fort. Dieses ist, wenn ich mich nicht irre, die wahre Theorie der Fabrikation der Schwefelsäure.

Das Resultat dieser Arbeit ist in wenig Worten:  
 1) Die Bildung einer neuen Verbindung, die durch Reaction der Schweflichtsäure auf Untersalpetersäure entsteht. 2) Die Erklärung der so verschiedenen Resultate, welche mehre Chemiker bei der Untersuchung der Krystalle der Bleikammern erhielten. 3) Eine vollständigere und genauere Theorie der complicirten Erscheinungen bei der Fabrikation der Schwefelsäure. (S. *Annales de Chim. et de Phys.* LXXIII, 362).

## Chemisch - pharmaceutische Notizen;

vom

Apotheker *A. Lipowitz* zu Lissa.

### *Cuprum nitrium.*

**Z**ur Bereitung desselben kann mit Vorthail der bei den Kupferschmieden als Kupferhammerschlag abgehende vorher von Staub und Schmutz gereinigte, sogenannte Glühspan benutzt werden. Der Glühspan ist wenigstens vier Fünftel billiger zu haben, als reines Kupfer, und da derselbe zum grofsen Theile schon oxydirt ist, bedarf man bedeutend weniger Salpetersäure und wird von Stickoxydgase nicht molestirt. Salpetersaures Eisenoxyd ist in dem krystallisirten Salze nicht vorhanden, wenigstens durch Sättigung einer Auflösung desselben mit Ammoniak nicht zu bemerken; das Eisenoxyd wird, wenn der Glühspan Eisen enthielt, als leichtlösliches salpetersaures Eisenoxyd in der zuletzt unkristallisirten Mutterlauge verbleiben. Andere geringe Beimengungen schaden dem zum technischen Gebrauch bestimmten Producte nicht.

### *Mangansuperoxyd.*

Dasselbe wird in neuerer Zeit von Thierärzten öfter innerlich angewendet, findet sich aber häufig in Apotheken



als ganz unreines Mineral vor, meistens Kieselerde, Eisenoxydhydrat, Manganoxydhydrat, Barytwasser u. s. w. enthaltend, dabei steinig und sehr ohne krystallinisches Gefüge. Ein solches Manganperoxyd löst sich nur theilweise, meistens gar in Salzsäure und entspricht dem Zwecke zum in-Gebrauch und der Darstellung von Sauerstoff kei-ns, ist höchstens zum technischen Gebrauch bei lasur u. dergl. anwendbar. Da aber der Pyrolusit es-tes Mangansuperoxyd gleichfalls in guten Dro-andlungen zu erhalten ist, durch seine geringere -erkennbar, in Salzsäure fast vollkommen löslich, Glühen sowohl als auch mit Schwefelsäure behan-reines Sauerstoffgas liefernd, so wäre diesem durch -krystallinisches Wesen sich auszeichnenden Fossil, es gleich etwas höher im Preise ist, der Vorzug -ben. Besonders ist der Pyrolusit fein gepülvert -hwefelsäure behandelt, zur leichten, billigsten und -len Darstellung von einigen Quarten Gas über der -lampe aus kleinen Glaskolben, zu empfehlen.

Der Unterschied eines schlechten und guten Sauer-giebt sich bei den Versuchen zur Darstellung von -mond'schem Lichte am besten durch die gröfsere -eringere Intensität desselben kund, wobei aus dem -nlich käuflichen, besonders gepülverten Braunstein -l die geringste Menge, als auch die schlechteste -ät Sauerstoffgas gewonnen wird.

#### *Bittermandelwasser.*

Der Apotheker Baldenius sagt im *Archiv d. Pharm.* Bd. XVIII. S. 89., dafs für Wässer, welche schwer -ge oder doch stearoptenhaltige Oele enthalten, eine -ation über freiem Feuer vortheilhafter sei, als -ampfdestillation. Durch vielfache und seit meh- -hren gemachte Erfahrungen belehrt, dafs durch -destillation alle Oele schneller und in gröfserer -ität erhalten werden, später auch dem Zersetzungs- -s des Entfärbens und Verdickens nicht so leicht

unterliegen, glaube ich, derselben auch zur Darstellung der Wässer den Vorzug einräumen zu müssen. Die Temperatur der Dämpfe steigt bei einer Feuerdestillation nie über den Siedepunct des Wassers, während ich bei der Dampfdestillation oft durch die entstehende Spannung im Dampfkessel die Temperatur über 100° C. steigen sah. Wäre nun auch eine Dampfdestillation in Bezug auf höhere Temperatur nicht vorzuziehen, so muß man bei gleichen Hitzgraden ihr gewiß jederzeit den Vorzug lassen.

Bei der Zersetzung der *Residua* und *Abluta* von der Amygdalinbereitung durch Mandelemulsion hatte ich mit den drei ersten Quart Wasser durch Dampfdestillation die ganze Menge Bittermandelöl erhalten und wiederholtes Zurückgießen des Wassers brachte bei fortgesetzter Destillation fast keine Spuren von Oel mehr hervor.

Dafs übrigens die Bereitung des concentrirten Bittermandelwassers aus Amygdalin und Mandelemulsion, wie schon mehrseitig berichtet, die geeignetste ist, — ein stets an Blausäure gleichhaltiges und daher sehr anzuwendendes Präparat zu erhalten, habe ich durch den genauen übereinstimmenden Blausäuregehalt in zwei verschiedenen Proben von Bittermandelwasser aus gleich grossen Mengen Amygdalin dargestellt ansehen, welche eine gleiche quantitative Menge Cyansilber lieferten.

## Ueber Dr. Böttger's Haarvertilgungsmittel:

von

**C. A. Ingenohl,**  
Apotheker zu Hooksiel.

Im 23. Bande 2. R. S. 252 dieses *Archivs* führt Hr. Apotheker Rabenhorst in Luckau an, dafs ein dortiger Einwohner aus der Berliner Tintenfabrik ein Mittel erhalten habe, welches das Haar vertilgen sollte; dieses habe seinem Zweck durchaus nicht entsprochen, sondern vielmehr einen brennenden Schmerz erregt, und dabei

die Haut nicht unbedeutend verletzt. Hr. Rabenhorst bemerkt, dieses von der Tintenfabrik angepriesene Mittel sei Schwefelcalcium, welches kürzlich von Dr. Böttger's Haarvertilgungsmittel empfohlen wurde; ferner, daß dasselbe genau nach Böttger's Vorschrift bereitet, doch nie ein Mittel erhalten habe, wodurch man im Stande gewesen wäre, das Haar vollständig und leicht zu entfernen zu können.

Ich finde mich veranlaßt, hierauf zu erwiedern, daß das Calciumsulphydrat (nicht Schwefelcalcium, wie Hr. Rabenhorst bemerkt) nach Dr. Böttger's Vorschrift zu wiederholten Malen dargestellt habe, und stets ein Mittel erhielt, welches im hohen Grade die Eigenschaft besitzt, schon nach wenigen Minuten das Haar, nachdem man das feuchte Schwefelsalz darauf gelegt hat, in eine breiartige Masse zu verwandeln, welche man leicht mit einem stumpfen Messer entfernen kann. Wird das breiförmige Calciumsulphydrat auf das Barthaar gelegt, so ist es zwar richtig, daß das Präparat, namentlich oberhalb des Mundes, einen nicht unbedeutenden Schmerz erregt (worauf Dr. Böttger auch schon in den *Annal. der Pharm. u. Chem. Bd. XXXIII. p. 344* aufmerksam gemacht hat), dennoch aber ist man im Stande, das Barthaar *vollständig* dadurch zu vertilgen. Es ist dieses Haarvertilgungsmittel ein so ausgezeichnetes, daß es unlingt den Gerbern empfohlen werden kann, da dasselbe, auf die todte Haut gebracht, selbst wenn es stundenlang auf einwirkt, dieselbe nicht angreift.

Ich habe die Bereitung dieses schwefelwasserstoffreichen Schwefelcalciums einigen Gerbern meines Wohnortes mitgetheilt, die alle solches jetzt selbst verfertigen, anwenden und in jeder Hinsicht genügende Resultate erhalten, indem dasselbe das Haar selbst bis in die Wurzeln zerstört.

Hr. Rabenhorst hat also Unrecht, wenn er bezweifelt, daß Dr. Böttger dieses Mittel geprüft hat, und es hat damit seine vollkommene Richtigkeit, und möchte es sehr in Frage stellen, ob das von der



Tintenfabrik ausposaunte Mittel wirklich Calciumhydrat ist. Hr. Rabenhorst bemerkte zwar, es sei Schwefelcalcium, doch wurde meines Wissens so nie von Dr. Böttger als Haarvertilgungsmittel empfohlen, vielleicht also ein Schreibfehler!

Dafs es unbegreiflich ist, wie der genannten Firma der Verkauf so vieler Arcana erlaubt wird, darin ist Jeder dem Hrn. Rabenhorst beipflichtet.

## *Rhusma.*

**D**as *Rhusma* ist bekanntlich ein Mittel, dessen einige Völker des Orients, so wie einige Religionssecten den Gebrauch der Rasirmesser untersagt ist, zur Entfernung des Barthaars bedienen. R. Böttger hat eine nähere Untersuchung dieses Mittels unternommen. Es ist ein breiartiges grau aussehendes Gemenge, welches durch Zusammenreiben von 1 Gew. Th. Arsenment mit 2 — 3 Gew. Th. gewöhnlichem frischem Kalkhydrat gewonnen wird. Es entsteht hierdurch ein Gemenge von unauflöslichem arseniksaurem Kalk und löslichem Calcium-Sulfarsenit ( $2 \text{CaS} + \text{As}_2\text{S}_3$ ), noch mehr oder weniger unzersetztes Kalkhydrat hängt. Welcher von diesen drei Stoffen der wirksamste im *Rhusma* ist, hatte man noch nicht versucht zu ermitteln. Durch directe Versuche fand B., dafs nicht arseniksaure Kalk, wohl aber das Calcium-Sulfarsenit in einem hohen Grade nach einer kurzen Einwirkung das Haar verwandelt, ähnlich der Aetzkalilauge, in eine aufgequollene gallertartige weiche Masse. Wenn auch das *Rhusma* bei nicht zu oft wiederholter Anwendung die Epidermis nicht merklich angreift, so will man doch bemerkt haben, dafs diejenigen, welche dieses Mittel *anhaltend* statt des Rasirmessers gebrauchen, tenartige Ausschläge bekommen; überhaupt wäre es ein Mittel, welches so giftige Bestandtheile enthält.

\*) Annal. der Pharm. XXIX, 79.

bannen. In der Vermuthung, daß die weniger heftig wirkenden Schwefelsalze eine *ähnliche* Einwirkung en möchten als das Calcium-Sulfarsenit, versuchte Böttger mehre derselben und fand in der That, daß Calciumsulfhydrat ( $\text{Ca S, SH}_2$ ), ohne im mindesten die Epidermis anzugreifen, in sehr kurzer Zeit, oft schon nach einer Minute, das Haar zerstören kann und das Rhusma sonach an Wirksamkeit übertreffen dürfte. Die Darstellung ist folgende. In eine dickflüssige Kalkmilch setzt man unter stetem Umrühren Schwefelwasserstoffgas, bis die Masse eine dunkelblaugraue Farbe angenommen hat; diese Farbe ist etwas unwesentliches, sie rührt von den im Kalke befindlichen fremden metallischen Beimengungen her, giebt aber ein Zeichen der Sättigung des Kalks mit Schwefelwasserstoff. Um dem Präparate den penetranten Geruch nach Schwefelwasserstoff zu benehmen, setzt man demselben einige Tropfen wohlriechender ätherischer Oele zu. Wird das Haar mit dieser breiartigen Masse einen Messerrücken dick belegt, so ist es nach 1—2 Minuten so erweicht, daß man es mit einem etwas zugeschärften Stück harten Holzes oder mit dem gewöhnlichen stumpfen Taschenmesser vollkommen wegnehmen kann. Diese Einwirkung des Calciumsulfhydrats kann auch in technischer Beziehung für Gerber und Kürschner von Wichtigkeit sein.

In einem spätern Aufsatze \*) über diesen Gegenstand berichtet Hr. Dr. Böttger, daß, wenn er auch angegeben hat, daß das Calcium-Sulfhydrat vorzugsweise nur die Hornsubstanz angreife, die Epidermis dagegen kaum merklich afficire, dieses sich doch nur auf die minder empfindlichen Stellen der Haut beziehe, denn wenn das Mittel auf die Haut *oberhalb des Mundes*, die weitere Porenöffnung als die des Arms, z. B. messerrückendick aufgetragen wird, so empfindet man daselbst nach einigen Minuten heftiges Brennen, während es auf dem Arme Vierstunden liegen bleiben kann, ohne unangenehm zu



afficiren. Trägt man demnach das breiartige Calcium-Sulfhydrat auf das Barthaar, so ist nicht zu vermuthen, dass der flüssige Theil des Mittels tief in die Poren eindringt und demnach Röthung der Haut und auch nur unbedeutender Schmerz entsteht. Wenn die Haut nach auch nach öfterm Gebrauch dieses Mittels dafür weniger empfindlich werden möchte, wie dieses Siller in Petersburg auch anführt (*Nord. Centralblatt für Pharm. Jahrg. 1839. S. 134*), so glaubt Dr. Böttger doch selbst, dass es als *Barthaar* vertreibendes Mittel keinen rechten Eingang finden möchte, dagegen aber den Gerbern zur fast augenblicklichen Entfernung der Haare der Thierfelle nicht genug empfohlen werden könne, da das Mittel, auf die todte Haut angewandt, nicht im mindesten corrosiv wirkt, selbst wenn man es Stunden lang darauf einwirken lässt. Verschiedene Gerber haben Versuche in dieser Beziehung angestellt, die so günstig ausgefallen sind, dass gewiss kein rationeller Gerber für die Folge zu einem andern Haarvertilgungsmittel eine Zuflucht nehmen wird, als zu diesem. Ein mit dem neuen Mittel enthaartes Kalbfell, welches gleich dem eigentlichen Gerbeprozesse unterworfen wurde, zeigt sich nach beendetem Gerbeprozesse in vielfacher Beziehung sehr ausgezeichnet. Das Brüchlichwerden des Kutschenüberzügen, Pferdegeschirren, Fußbekleidungen u. s. w. dienenden Leders dürfte nicht bloß dem Gebrauch einer schlechten Wiche, sondern hauptsächlich dem sogenannten *Kälken* und *Schwitzen*, dessen man sich zur Entfernung der Fellhaare bediente, zugeschrieben werden. Ein durch Calcium-Sulfhydrat enthaartes gegerbtes Fell ist von einer durch den Gewerbeverein in Berlin ernannten Commission für tadellos befunden worden. Das Calcium-Sulfhydrat dürfte an solchen Orten, wo das Leuchtgas aus *Steinkohlen* herabgelassen wird, und wo man das Gas durch Kalkmilch rein zu billigen Preisen zu beziehen sein.

Das in London empfohlene und bereits im Handel vorkommende *Atkinsons Depilatorium* hat Dr. Böttger

nisch untersucht. Es ist ein feines gelbliches Pul-  
und besteht aus einem Theile *Auripigment*, sechs  
ilen *Aetzkalk*, etwas *Mehl* und einem gelblichen Farb-  
. Wegen seines Arsenikgehalts verdient dieses Mit-  
nicht nur nicht empfohlen, sondern verboten zu  
den \*).

---

## Über die Darstellung von farblosem wasser- klarem Mandelöle;

von  
*Rudolph Brandes.*

Vor einiger Zeit wurde mir von einer Droguerie-  
lung ein Muster angeblich aus Paris erhaltenes Man-  
vorgelegt, welches sich durch seine farblose was-  
are Beschaffenheit sehr auszeichnete. Dieses ver-  
ste mich zu versuchen, ein Mandelöl von dersel-  
schönen Beschaffenheit darzustellen.

Als Entfärbungsmittel wählte ich Thierkohle.

Kaltgepresstes Mandelöl wurde durch Thierkohle  
rt. Es lief vollkommen hell ab, hatte in Ansehen  
ntend gewonnen, und nur noch einen kaum wahr-  
baren Stich ins Gelbliche.

In der Erwartung, daß Mandeln, die vor dem Aus-  
en enthülset waren, ein völlig farbloses Oel liefer-  
wurde aus solchen Mandeln das Oel kalt ausgepresst,  
ein Theil desselben durch Kohle filtrirt. Dieses  
war aber genau von derselben Beschaffenheit, wie  
aus nicht enthülseten Mandeln bereitete und durch  
e filtrirte.

Obgleich diese Oele dem französischen sehr nahe

---

Das von Hrn. Dr. Böttger vorgeschlagene Calcium-Sulf-  
hydrat, nach dessen Angabe bereitet, habe ich auf frisches  
nicht enthaartes Schaffell angewendet; nachdem das Fell  
eine Viertelstunde lang mit dem Präparat bestrichen ge-  
legen hatte, liefs sich das Haar mit der grössten Leichtig-  
keit davon abschaben.

Br.

kamen, so stellte sich doch noch ein geringer Unterschied in der Beschaffenheit des erstern zum Vortheil des letztern heraus.

Es wurde jetzt kaltgepresstes Mandelöl mit  $\frac{1}{2}$  seines Gewichts Thierkohle einige Stunden in Digestion gestellt, und darauf filtrirt. Das jetzt erhaltene Oel war von dem reinsten Wasser an Farblosigkeit und Durchsichtigkeit nicht zu unterscheiden, und übertraf in dieser Beschaffenheit das französische noch bedeutend. Man stellte denselben Versuch mit dem aus enthülseten Mandeln dargestellten Oele an, es gab ein Product, welches vor dem aus unenthülseten Mandeln nichts voraus hatte, und auch wohl nichts voraus haben konnte, weil diese in der in Rede stehenden Beschaffenheit nichts mehr zu wünschen übrig liefs.

Das ausgezeichnete Resultat dieser Versuche bewog mich, den entfärbenden Einfluß der Thierkohle auch auf andere fette Oele zu versuchen. Ungereinigtes und gereinigtes Rüßöl, Leinöl, Baumöl und Leberthran wurden auf dieselbe Weise behandelt, wie beim Mandelöl angegeben ist. Nur das Baumöl hatte eine etwasmätlere Farbe angenommen, alle übrigen Oele waren unverändert geblieben, und wurden auch selbst durch Kochen mit der Kohle nicht entfärbt.

## *Zweiter Abschnitt.*

### **Centralbericht.**

#### **Ueber den Mineralkermes.**

**U**eber die Natur des Kermes herrschen bekanntlich zwei Ansichten. Nach der einen ist seine Zusammensetzung vom gewöhnlichen Schwefelantimon wesentlich nicht verschieden, nach der andern enthält er daneben noch Antimonoxyd. Die Versuche von Gay-Lussac, Robiquet, Buchner jun., Henry, Geiger, Duflos, Brandes, Biermann, Pagenstecher und Liebig sind für diese letzte Ansicht, wobei einige den Antimon

ydgehalt für veränderlich annehmen, andere aber in dem-  
 ben Verhältnisse zum Schwefelantimon, wie im natür-  
 en Rothspießglanzerze (1 At. Antimonoxyd auf 2 At.  
 wefelantimon). Die Ansicht, daß der Kermes die  
 sammensetzung des gewöhnlichen Schwefelantimons  
 e, ist von Berzelius aufgestellt, und von H. Rose  
 h seinen Versuchen angenommen. Die Controverse  
 der Zusammensetzung dieser Antimonverbindung hat  
 Rose veranlaßt, diesen Gegenstand einer neuen  
 führlichen Prüfung zu unterwerfen\*), die wir hier  
 er mittheilen werden.

*Kermes durch Kochen von Schwefelantimon in einer  
 Auflösung von kohlensaurem Alkali erhalten.*

Das Antimon hat in seinen Verbindungen die meiste  
 logie mit dem Arsenik. Der größte Unterschied be-  
 t darin, daß die Oxyde des Arseniks weit auflös-  
 er in Wasser sind, als die des Antimons, und das  
 wefelarsenik leichter noch Schwefelsalze bildet, als  
 Schwefelantimon. Bei der Auflösung des Schwefel-  
 niks in kohlensaurem Alkali findet theilweise Zer-  
 ung beider statt; unter Entweichung von Kohlensäure  
 teht eine Schwefelverbindung des Alkalimetalls und  
 nichtsaures Alkali. Das alkalische Schwefelmetall  
 et mit einer gewissen Menge Schwefelarsenik ein  
 ches Schwefelsalz, dieses nimmt in der Wärme noch  
 is Schwefelarsenik auf, der sich beim Erkalten ab-  
 , hat man aber keinen Ueberschuß von Arsenik  
 wandt, so bleibt die Auflösung beim Erkalten klar.  
 d die Auflösung durch eine Säure zersetzt, so  
 ler Schwefelwasserstoff des zersetzten alkalischen  
 wefelmetalls gerade hinreichend, um mit der Arse-  
 tsäure Schwefelwasserstoff zu bilden, es scheidet  
 daher auch die ganze Menge des angewandten Schwe-  
 seniks als solcher wieder aus, ohne daß Schwefel-  
 erstoff frei wird.

Das Schwefelantimon bietet bei Behandlung mit koh-  
 urem Alkali mit gewissen Modificationen dieselben  
 einungen. Es entsteht alkalisches Schwefelmetall,  
 hes mit einem Theile Schwefelantimon zu einem  
 wefelsalze sich verbindet, und das der Arsenichtsäure  
 rechende Antimonoxyd,  $\text{Sb}_2 \text{O}_3$ . Das alkalische  
 wefelmetall löst aber geringere Mengen von Schwe-  
 timon, als vom Schwefelarsenik, und beim Kochen



weit mehr, als es beim Erkalten aufgelöst hatte. Weiter ist das Antimonoxyd in Alkalien, besonders in kohlensauren, viel schwerlöslicher, und gegen Basen noch weit indifferenter, als die Arsenichtsäure.

Aus diesem Verhalten ergiebt sich nun unzweideutig in welchen Fällen man durch Kochen von Schwefelantimon in einer Auflösung von kohlensanrem Alkali oxydfreien und oxydhaltigen Kermes erhält. Bei wenig Schwefelantimon und vielem kohlens. Alkali bekommt man wenig, aber völlig oxydfreien Kermes, weil das gebildete Antimonoxyd vollständig in der großen Menge des unzersetzten kohlens. Alkalis aufgelöst bleibt. Bei dem umgekehrten Verhältniß aber ist die Menge des kohlens. Alkali oft nicht hinreichend, alles Antimonoxyd in der Kälte aufgelöst zu halten, und ein Theil desselben scheidet sich daher mit dem beim Erkalten niederfallenden Kermes aus. Dieser Kermes kann natürlich auch durch Auswaschen mit Wasser nicht oxydfrei dargestellt werden, da das Antimonoxyd nur in der alkalischen Auflösung, nicht im Wasser löslich ist. Dieses Antimonoxyd ist dem Kermes nur mechanisch beigemengt; Schwefelantimon und Antimonoxyd verbinden sich erst bei höherer Temperatur, beim Schmelzen, nicht auf nassem Wege.

Dafs das Oxyd mit dem Schwefelantimon nur gemengt ist, zeigt aufs einfachste und sicherste das Mikroskop; man sieht damit zwischen den feinen körnigen Massen des Schwefelantimons sechseckige prismatische, zugespitzte und nadelförmige Krystalle von Antimonoxyd.

Die größte Menge kohlensaures Alkali, um den Kermes noch oxydhaltig zu bekommen, sind gleiche Theile wasserhaltiges krystallis. kohlens. Natron und gewöhnliches reines fein geschlämmtes Schwefelantimon. Als H. Rose 2 Loth von jedem nahm, wurde ohngefähr 1 Grm. Kermes erhalten, der wenig Antimonoxyd enthielt, die größte Menge des Schwefelantimons blieb in dessen beim Kochen ungelöst. Soll der Kermes oxydfrei sein, so muß die Menge des kohlens. Alkali erhöht werden; man muß aber auch dann den Kermes nicht zu lange mit der überstehenden Flüssigkeit in Berührung lassen, weil sonst auch Krystalle von Antimonoxyd sich ausscheiden und mit dem Kermes sich mengen.

Das mit dem Kermes gemengte Antimonoxyd ist mit einer geringen Menge Alkali verbunden.



Handelt es sich von oxydfreiem Kermes, so ist die Reinigung mit kohlensaurem Kali der mit kohlensaurem Natron vorzuziehen, weil in erstem das Antimonoxyd leichter auflöslich ist, als in letztem.

Die Analyse eines gut ausgesüßten Kermes durch Erhitzen des Schwefelantimons mit kohlensaurem Kali geleitet, gab nicht nur gegen 3 Procent Kali, sondern auch 2,5 % Schwefel mehr, als das Antimon erforderte. Dieser Ueberschuß des Schwefels ist offenbar mit Kalium, als Schwefelkalium verbunden. Die 10 % Antimon nehmen die übrigen 25,8 % Schwefel auf. Dieser Kermes enthält also kein Antimonoxyd, aber eine kleine Menge Schwefelkalium, das ihm durch Auswaschen entzogen werden kann, worauf schon Berzelius hier aufmerksam gemacht hat\*).

Das Schwefelkalium scheint hier mit so viel Schwefel verbunden zu sein, daß es  $\text{KS}_3$  bildet, indessen dies ist nicht der Fall, sondern KS ist mit  $\text{Sb}_2\text{S}_5$  zu einem Schwefelsalze verbunden, welches einen Gemengtheil des Kermes ausmacht. Hat man Natron angewendet, so ist dieses Schwefelsalz  $\text{NS} + \text{Sb}_2\text{S}_5$ .

Durch Behandeln eines Kermes dieser Art mit Wasserdampf entwickelte sich etwas Wasser schon bei der ersten Einwirkung der Hitze, welches nicht als hygroskopische Feuchtigkeit anzusehen ist, aber auch nicht durch Reduction des Antimonoxydes, das man im Kermes annehmen können, hervorgehen konnte, da es sich schon bei der ersten Einwirkung einer schwachen Hitze entwickelte; es ist das Krystallwasser der Verbindung  $\text{NS} + \text{Sb}_2\text{S}_5$ . Dieses Schwefelsalz wird durch Wasserdampf bei erhöhter Temp. auf keine andere Weise verändert, als daß es sein Krystallwasser verliert. Daraus kommt es, daß der nach Behandlung mit Wasserdampf gebliebene Kermes mit verdünnter Chlorwasserstoffsäure einen schwachen Geruch nach Schwefelwasserstoff ausstößt und nachher aus der entstandenen Auflösung Schwefelwasserstoff etwas rothes Schwefelantimon

Die Methode durch Kochen mit Weinstein und Wasser einen Kermes auf Oxydgehalt zu untersuchen, ist in sofern etwas unsicher sein, als aus reinem geschmolzenen und fein gepulverten Schwefelantimon und jeder Verbindung, welche dasselbe enthält, durch Erhitzen mit Weinsteinauflösung eine Spur Antimon-

Loggend. Annal. VIII, 420.

oxyd aufgelöst wird und in der abfiltrirten Flüssigkeit durch Schwefelwasserstoff eine rothe Färbung entsteht. War indessen in der Antimonverbindung wirklich Antimonoxyd enthalten, und behandelt man sie im noch feuchten Zustande mit Weinstein und Schwefelwasserstoff, so entsteht dann ein reichlicher Niederschlag von Schwefelantimon; wird dagegen die Verbindung trocken genommen, so löst Weinstein nicht viel mehr Antimon davon auf, wie aus reinem Schwefelantimon.

Die Flüssigkeit, welche nach Absetzen des Kermes mit einer Auflösung von kohlensaurem Alkali bereitet, erhalten wird, enthält alles gebildete Antimonoxyd aufgelöst, aber aufer diesem noch alkalisches Schwefelmetall und so viel Schwefelantimon, als dasselbe in der Kälte aufgelöst halten kann. Wird diese Flüssigkeit durch eine Säure zersetzt, so wird das alkalische Schwefelmetall zerlegt und das Schwefelantimon gefällt, welches in der Kälte von dem alkalischen Schwefelmetall in Auflösung gehalten war, zugleich fällt damit das Schwefelantimon nieder, welches durch gegenseitige Zersetzung des aus dem alkalischen Schwefelmetall sich entbindenden Schwefelwasserstoffs und dem Antimonoxysde entsteht. Die überwiegende Menge dieses Oxydes, besonders, wenn bei der Kermesbereitung ein Ueberschufs von Alkali angewendet worden ist, macht, daß, sich hier kein freies Schwefelwasserstoffgas entwickelt, und das sich entwickelnde Kohlensäuregas nicht danach riecht. Das so gefällte Schwefelantimon hat zwar eine hell orangefarbene Farbe, ist indessen aber  $Sb_2S_3$ ; bei der Reduction durch Wasserstoff giebt es metallisches Antimon und Schwefelwasserstoffgas, aber keinen Schwefel; wie zu erwarten kann man auch durch das Mikroskop kein Antimonoxyd darin erkennen. Wegen der überwiegenden Menge jener Flüssigkeit enthaltenen Antimonoxysdes schlägt es durch eine zugesetzte Säure aus dem alkalischen Schwefelmetall sich entbindende Schwefelwasserstoff nicht als aufgelöste Antimonoxyd nieder, nach Abfiltriren des gefällten Schwefelantimons wird daher in der davon getrennten Flüssigkeit noch eine geringe Menge Schwefelantimon gefällt, wenn man Schwefelwasserstoff leitet. Dieses letzte Schwefelantimon ist aber nicht das dem Oxyde entsprechende Schwefelantimon, sondern giebt durch Wasserstoffgas, aufer Schwefelwasserstoff, noch Schwefel, doch ist es unentschieden, ob dieser Schwefel blofs eingemengt ist, von Zersetzen des Schwefelwasserstoffs mittelst atmosphärischer Luft herrührend, oder ob

der Flüssigkeit durch Oxydation von Antimonoxyd timonichtsäure gebildet ist.

*Kermes durch Schmelzen von Schwefelantimon mit kohlensaurem Alkali erhalten.*

Dieser Kermes wurde nach der Preuss. Pharmakopöe von 1813 durch Zusammenschmelzen von 1 wasserfreien kohlens. Natron mit 2 Schwefelantimon, Auskochen u. s. w. bereitet. Die Ausbeute ist weit gröfser, nach der vorigen Methode, und das Product hat eine mehr roth-braune Farbe, letzteres eine mehr gelb-braune.

Dieser Kermes enthält eine bedeutende Menge Antimonoxyd, wovon man sich durch Behandeln mit Wein u. s. w. leicht überzeugen kann. Dieser Gehalt an Antimonoxyd aber ist variabel und steht in keinem bestimmten Verhältnifs zum Schwefelantimon, so dafs der Kermes für eine gemengte Substanz anzusehen ist, was auch die mikroskopische Untersuchung bestätigt. Es scheint, dafs der Antimonoxydgehalt um so geringer je schneller die Flüssigkeit nach dem Erkalten von dem niedergefallenen Kermes abfiltrirt wird. Dieser Kermes ist also auch keine chemische Verbindung von Schwefelantimon mit Antimonoxyd und in so fern ein unechtes Präparat.

Beim Schmelzen von Schwefelantimon mit kohlens. Alkali bildet sich, wie beim Kochen beider Substanzen in Wasser, Antimonoxyd und alkalisches Schwefelmetall, welches mit Schwefelantimon sich verbindet. Beim Auskochen der geschmolzenen Masse in Wasser löst sich die Verbindung auf, so wie durch das unzersetzte kohlensaure Alkali auch Antimonoxyd aufgelöst wird, und es bleibt eine ziemliche Menge metallisches Antimon zurück. Die Menge des kohlensauren Alkali ist nicht ausreichend, das Antimonoxyd beim Erkalten aufgelöst zu erhalten, und es scheidet sich dieses mit dem Schwefelantimon ab, welches die Auflösung des alkalischen Schwefelmetalls nicht aufgelöst zu erhalten vermag. Das metallische Antimon, welches beim Auskochen der geschmolzenen Masse erhalten wird, rührt nicht davon her, dafs bei der erhöhten Temp. ein Theil des Antimonoxydes in die Gegenwart von Alkali in Metall und Antimonosäure zerfällt, sondern dafs sich ein Theil des Schwefelantimons,  $\text{Sb}_2 \text{S}_3$ , in Metall und in die höchste Schwefelungsstufe des Antimons,  $\text{Sb}_2 \text{S}_5$ , zerlegt, durch die prävalirende Verwandtschaft des entstandenen alkalischen Schwefelmetalls, um mit dieser höchsten Schwefelungs-

stufe ein Schwefelsalz zu bilden. Die Erzeugung einer geringen Menge eines solchen Schwefelsalzes findet schon beim Kochen von Schwefelantimon mit einer Auflösung von kohlensaurem Alkali statt, wie schon oben bei dem auf diese Weise dargestellten Kermes angeführt wurde.

Wird die von dem durch Schmelzen u. s. w. bereiteten Kermes möglichst vor Luftzutritt geschützte und abfiltrirte Lauge verdampft, so schießen daraus tetraedrische Krystalle an, die Verbindung des Schwefelnatriums mit Antimonsulfurid  $Sb_2S_3$ ; beim längeren Stehen scheidet sich nach und nach kohlensaures Natron aus. Ausser diesem ist in der Auflösung noch eine Verbindung von Schwefelnatrium mit Antimonsulfür,  $Sb_2S_3$ , enthalten, dessen Auflösung bekanntlich durch Auflösungen von Alkalien braunroth gefällt wird, was bei dem Schlippe'schen Salze nicht der Fall ist. Diese Verbindung scheint Kohl\*), noch mit Schlippe'schem Salze gemengt, krystallisirt dargestellt zu haben.

Der durch Schmelzen u. s. w. dargestellte Kermes enthält natürlich eine geringere Menge Schwefel, als der durch Kochen bereitete, und ein Theil dieses Schwefels ist mit Natrium oder Kalium, und dieses alkalische Schwefelmetall dann mit der höchsten Schwefelungstufe des Antimons,  $Sb_2S_5$ , verbunden. Uebrigens hat auch Wittstock schon die Erzeugung des Schlippe'schen Salzes bei Bereitung des nach der Preuss. Pharmacopoe dargestellten Kermes beobachtet, und auch Duflos gibt an, daß sich das Schwefelsalz von Schwefelantimon,  $Sb_2S_3$ , mit alkalischen Schwefelmetallen bei erhöhter Temp. unter Abscheidung von Natron in ein Schwefelsalz von höchstem Schwefelantimon,  $Sb_2S_5$ , umwandelt.

### III. Kermes durch Kochen von Schwefelantimon in der Auflösung von Kalihydrat.

Eine Auflösung von Kalihydrat wirkt schneller auf Schwefelantimon, als kohlensaures Alkali; es bildet sich dabei leichter Schwefelkalium und Antimonoxyd und letztes ist auch leichter löslich in einer Auflösung von Kalihydrat, als in kohlensaurem Alkali. Wird geschmolzenes und darauf fein gepulvertes Schwefelantimon in

\*) Diese Zeitschr. 2. R. XVII, 257.

\*\*) Die Bildung des Schlippe'schen Salzes bei der angegebenen Kermesbereitung kann ich nach eigenen frühern Erfahrungen ebenfalls bestätigen; ich habe noch einen Theil des vor vier Jahren hierbei erhaltenen Salzes stehen.



Der Kalihydratlösung gekocht, so scheidet sich durch kalten kein Kermes daraus ab, bei wenigem Kalihydrat aber bildet sich ein starker gallertartiger dunkelbrauner Niederschlag, der im Aeußern wenig dem auf andere Weise bereiteten Kermes gleicht, sondern mehr schwach gefälltem Eisenoxyde. Dieser Kermes läßt sich schwer auswaschen, beim Trocknen verringert sich sein Volumen bedeutend und er bildet dann eine harte, glasige, dunkelbraune, spröde Masse. Durch das Mikroskop kann man keine Krystalle von Antimonoxyd darin entdecken. Durch Kochen mit Weinsteinauflösung entwickelt er zwar einen schwachen Geruch nach Schwefelwasserstoff, es wird ihm aber kein Antimonoxyd dadurch entzogen, die abfiltrirte Flüssigkeit giebt durch Schwefelwasserstoff nur eine röthliche Färbung, keinen Niederschlag. Mit verdünnter Chlorwasserstoffsäure entwickelt er anfangs viel Schwefelwasserstoffgas. Durch Sauerstoff wird er nicht so vollständig, wie anders bereiteter Kermes oder reines Schwefelantimon reducirt; es bildet sich eine Kugel von metallischem Antimon, neben von einer geschmolzenen Masse, auf welche Sauerstoffgas keine sichtliche Wirkung hat, und es scheidet sich kein Schwefel. Im wasserleeren Zustande hält dieser Kermes:

|               |       |
|---------------|-------|
| Schwefel..... | 30,93 |
| Antimon.....  | 63,28 |
| Kalium.....   | 5,79  |

100.

Auch in diesem Kermes muß man das Alkali als ein Schwefelkalium verbunden mit dem höchsten Schwefelantimon,  $\text{Sb}_2\text{S}_5$ , annehmen. Die Menge dieses Schwefelzuges ist nicht gering und steht in dem untersuchten Kermes in einem bestimmten Verhältniß zum Schwefelantimon,  $\text{Sb}_2\text{S}_3$ . Die Analyse nämlich entspricht der Formel  $(\text{KS}, \text{Sb}_2\text{S}_5) + 2(\text{Sb}_2\text{S}_3)$ , wonach:

|               |       |
|---------------|-------|
| Schwefel..... | 31,18 |
| Antimon.....  | 62,79 |
| Kalium.....   | 6,33  |

100.

Dafs die höchste Schwefelungsstufe des Antimons in dem Kermes, die mit dem Schwefelkalium verbunden ist, nicht durch Abscheidung von metallischem Antimon entsteht, ergibt sich daraus, dafs das auf nassem Wege dargestellte Schwefelantimon,  $\text{Sb}_2\text{S}_3$ , in einer Auflösung in Kalihydrat vollständig ohne Rückstand auflöslich ist. Es hat daher wohl eine Oxydation des Antimons



im Schwefelantimon durch den Zutritt der Luft dieses Resultat hervorgebracht.

Das bei der eben angeführten Analyse gefundene einfache Verhältniß zwischen dem Schwefelantimon,  $\text{Sb}_2\text{S}_3$ , und dem Schwefelsalze kann indess wohl nicht als Beweis für eine feste chemische Verbindung gelten, denn durch langes Auswaschen mit heißem Wasser entzieht man demselben mehr und mehr von dem Schwefelsalze und wird es dadurch immer mehr dem Kermes ähnlich, welcher durch Kochen von Schwefelantimon mit einer Auflösung von kohlensaurem Alkali erhalten wird.

Wollte man die geringe Menge des Schwefelsalzes, die in dem Kermes, welcher durch Kochen von Schwefelantimon mit einer Auflösung von kohlensaurem Alkali gebildet wird, für einen wesentlichen Bestandtheil halten, so würde man, nach den Analysen, die Rose über diesen Kermes ausstellte, 1 Atom des Schwefelsalzes mit nicht weniger als 9 At. Schwefelantimon,  $\text{Sb}_2\text{S}_3$ , darin annehmen müssen,  $(\text{KS} + \text{Sb}_2\text{S}_3) + 9 (\text{Sb}_2\text{S}_3)$ ; in 100 giebt diese Formel:

|               |       |
|---------------|-------|
| Schwefel..... | 27,17 |
| Kalium.....   | 2,13  |
| Antimon.....  | 70,10 |

100.

Eine solche Formel ist aber sehr unwahrscheinlich und es ist gewiß anzunehmen, daß das Schwefelsalz in keinem der Kermesarten zu dem Schwefelantimon in einem bestimmten Verhältnisse steht, und daß das Schwefelsalz im Kermes nicht für einen wesentlichen Bestandtheil gehalten werden kann, wenn es sich auch durch Auswaschen nicht völlig daraus entfernen läßt\*).

\*) Durch diese vortreffliche Arbeit hat Hr. Professor H. Rose die Kenntniß eines interessanten Gegenstandes der Chemie bereichert. Es ist dadurch erwiesen, daß durch Kochen und Schmelzen von Schwefelantimon mit kohlensaurem Alkali ein Kermes erhalten wird, namentlich, wenn ein Ueberschuß des Alkali angewendet wurde, der kein Antimonoxyd enthält; unter besondern Umständen dagegen eine gewisse Beimengung des Schwefelsalzes,  $\text{KS} + \text{Sb}_2\text{S}_3$ , bis 5 % betragen kann. So wie der Kermes aber gewöhnlich bereitet wird, und wie er das officinelle Präparat ist, enthält er mehr oder weniger Antimonoxyd, wenn auch nicht in chemischer Verbindung, sondern eingemengt; der durch Kochen mit einer Auflösung von kohlensaurem Natrium oder Kali bereitete enthält weniger Antimonoxyd, als der durch Schmelzen mit den kohlensauren Alkalien

## Salpeterbildung und Erzeugung von Salpetersäure und Ammoniak.

**D**as Dunkel, was die Theorie der Salpeterbildung sich mit sich führt, bewog Fr. Kuhlmann in Lille, diesen Gegenstand einer Reihe von Versuchen zu unterwerfen.

Es ergab sich, daß vergrabene, von der Luft völlig abgeschlossene thierische Materien zur Bildung von Salpetersäure keine Veranlassung gaben, daß aber dieselben Materien bei Abwesenheit von Kalk oder Kreide, durch eine langsame Zersetzung an der Luft, die Bildung einer gewissen Quantität salpetersauren Ammoniaks bekamen. Bei der Untersuchung verschiedener Laugen zur Bereitung von Salpeter ergab sich darin salpetersaures Ammoniak nicht nur, sondern sie reagierten alkalisch und entwickelten schon durch Erwärmen auch Ammoniak. Das Ammoniak kann also, eben so gut wie Kalk, Kreide, Kalk oder Magnesia, in der Entwicklung der Salpeterbildung eine Rolle spielen, obgleich der Einfluss dieses Agens bis jetzt noch nicht dargethan, und von der Gegenwart des salpetersauren Ammoniaks noch keine Erwähnung geschehen war. Im *II. Bande von Dumas's Chemie* findet sich eine stillschweigende Bestätigung dieser Ansicht.

Nach den allgemein angenommenen Ansichten verbindet sich der Stickstoff der Luft oder der thierischen Materien mit dem Sauerstoff der Luft, unter dem Einflusse der kohlensauren Salze des Kalks, der Magnesia

gestellt. Dieser gewöhnliche Kermes ist bis jetzt noch das officinelle Präparat und auf ihn beziehen sich die therapeutischen Beobachtungen über dieses Heilmittel. Es bleibt daher immer noch in Frage, welcher Kermes soll für die medicinische Verwendung bleiben, der mit keinem oder sehr geringem Gehalte an Antimonoxyd, oder wie er meistens erhalten wird, mit einem grössern Gehalte an Antimonoxyd? Die Entscheidung möchte wohl für das bisherige officinelle Präparat sein. Vergl. auch *Liebig in den Annalen der Pharmacie XXXI, 57*. Da dieses aber nach den gewöhnlichen Bereitungen einen unbestimmten Gehalt von Antimonoxyd enthält, so dürften Kohl's Vorschläge in dieser Sache durch Fällen von Brechweinstein mit Schwefelwasserstoff und kohlensaurem Natron (vergl. *dieses Archiv 2. R. Bd. XVII, 277, Annalen der Pharm. XXIX, 272*) wohl zu beherzigen sein.

Br.

oder des Kalis. Die kräftigen Eigenschaften des kohlen-sauren Kali, wenn dieses vorhanden ist, können erwarten lassen, daß es die Vereinigung der Elemente der Salpetersäure, sie mögen aus der Luft oder zum Theil von den thierischen Materien herrühren, bewirken könne, aber nicht die kohlen-sauren Erden, die indess ebenfalls, wenn sie eine gewisse Porosität darbieten, bei Gegenwart faulender thierischer Materien theilweise in salpetersaure Salze verwandelt werden. Daß aber der alleinige Einfluß der Porosität dieser Körper die Bildung der Salpetersäure bewirken könne, ist zu bezweifeln; vergeblich versuchte man unter Einfluß poröser Körper von der kräftigsten Wirkung Sauerstoff und Stickstoff direct zu verbinden. Bei der Zersetzung thierischer Materien tritt der frei werdende Stickstoff, bei gleichfalls frei werdendem Wasserstoff, vorzugsweise mit diesem zu Ammoniak zusammen; für die Bildung der Salpetersäure, für die Absorption eines freien Gases sind die Umstände weit weniger günstig. Dieses ändert sich aber, wenn man bei Bildung der salpetersauren Salze das Ammoniak selbst interveniren läßt, als durch seine basische, säurefordernde Reaction die Verbindung der Bestandtheile der Salpetersäure bedingend, in folgender Art. Das salpetersaure Ammoniak zersetzt die kohlen-sauren Erden selbst bei der Temperatur, in der die Salpeterbildung gewöhnlich vor sich geht, in salpeters. Erden und kohlen-s. Ammoniak, welches letztere dann, wie vorher, die Bildung neuer Quantitäten Salpetersäure bedingt.

Setzt man einer Auflösung von salpetersaurem Kalk nur wenig kohlen-saures Ammoniak zu, so fällt kohlen-s. Kalk nieder; daraus erklärt sich, wie die Salpeterlaugen, trotz ihres Gehalts an salpeters. Kalk durch kohlen-s. Ammoniak schwach alkalisch sein können. Sind die Auflösungen beider Salze concentrirt, so findet gegenseitige Zersetzung statt, erwärmt man sie aber, so wird der größte Theil des kohlen-s. Kalks wieder aufgelöst und es entwickelt sich reichlich kohlen-s. Ammoniak, selbst schon bei 25 bis 30° C. Es findet also bei einer mäßigen Temp. eine umgekehrte Reaction statt wie in der Kälte; es ist aber bekannt, daß eine erhöhte Temperatur die Salpeterbildung beträchtlich erleichtert.

Das Ammoniak ist sonach für die Salpeterbildung nicht nur hinsichtlich seines Sättigungsvermögens der Salpetersäure in Betracht zu ziehen, sondern auch



ein unerläßliches Zwischenmittel, um die Säure auf die Salzen der kohlen-sauren Erden zu übertragen, wo es so-wohl eine analoge Rolle spielt, wie das Stickstoffgas, das bei der Bildung der Schwefelsäure den Sauerstoff der Luft auf die Schwefelsäure überträgt.

Es fragt sich nun, wird bei der Salpeterbildung der Stickstoff ausschliesslich von der Luft hergenommen, oder kommt der Stickstoff der thierischen Materien zur Bildung der Salpetersäure bei.

Da bei der Zersetzung thierischer Materien der im Entstehungsmoment frei werdende Stickstoff sich mit dem Wasserstoff zu Ammoniak verbindet, so müßten, wenn dieses eine andere Rolle spielen sollte, als die angezeigte intermediaire, um Salpetersäure zu bilden, zur Erklärung der sehr raschen Salpeterbildung in gewissen Lokalitäten große Massen thierischer Materien vorhanden sein, während nach der obigen Theorie, wo das Ammoniak nur als Ueberträger dient, man sich leicht von der Bildung kleiner Quantitäten Ammoniak Rechenschaft geben kann; eine geringe Menge thierischer Materien reicht hin, um es zu erzeugen, zudem bildet sich Ammoniak bei einer großen Zahl anderer Prozesse, bei der langsamen Zersetzung des Wassers durch Eisen bei Luftzutritt, bei Zersetzung organischer selbst stickstofffreier Substanzen unter Gegenwart von lufthaltigem Wasser. Die Rolle, welche das Ammoniak bei der Salpeterbildung spielt, festgestellt ist, so ist die Art und Weise, wie sich der Stickstoff mit dem Sauerstoff der Luft verbindet, leicht zu begreifen. Die Salpeterbildung geht ohne Feuchtigkeit nicht vor sich, das Wasser absorbiert eine Menge Luft, die absorbirte Luft ist bekanntlich reicher an Sauerstoff als die atmosphärische, sie kann etwa 35 % Sauerstoff enthalten. Unter so günstigen Umständen verbindet sich das Ammoniak mit dem im Wasser gelösten Sauerstoff und Stickstoff, um Salpetersäure zu bilden, und da die Gegenwart von Luft und Wasser constant ist, so kann die Bildung der Salpetersäure unendlich sich verlängern, wobei das Wasser als Vehikel dient, um den Stickstoff und den Sauerstoff der Luft auf Ammoniak zu übertragen, und das Ammoniak als Ueberträger der Salpetersäure auf die unlöslichen kohlen-sauren Salze. Es ist zu hoffen, daß diese anziehende Theorie bald noch weitere Bestätigung finden werde.

Kuhlmann stellte ferner eine Reihe von Versuchen an, über die künstliche Bildung von Salpetersäure. Wir heben daraus Folgendes hervor.

Läfst man mit atmosph. Luft gemengtes Ammoniakgas durch eine Glasröhre strömen, die Platinschwamm enthält, so geräth das Platin bei ohngefähr  $300^{\circ}$  in's Glühen und es bilden sich Salpetersäure und Untersalpetersäure. Ohne Platinschwamm giebt das Luftgemenge nur etwas Untersalpetersäure und Stickoxydgas. Gemenge von Sauerstoffgas und Stickgas in verschiedenen Verhältnissen geben unter diesen Umständen weder Salpetersäure noch Untersalpetersäure, weder mit Platinschwamm noch mit Platinschwarz. Läfst man trockenes oder feuchtes Stickgas durch eine Porcellanröhre strömen, die Mangansuperoxyd enthält und bis zur Zersetzung des Oxydes erhitzt ist, so verbindet es sich mit dem frei werdenden Sauerstoff. Dämpfe von salzsaurem Ammoniak und Salmiak geben, mit atmosph. Luft gemengt, über erhitzten Platinschwamm geben ebenfalls Salpetersäure, die Einwirkung ist aber schwächer als mit ätzendem Ammoniak; Cyangas giebt unter diesen Umständen mit atmosph. Luft Kohlensäure und Untersalpetersäure.

Aus diesen Versuchen tritt besonders hervor, dass Platinschwarz hier nicht die Wirkung hat, wie Platinschwamm, und dass nur Salpetersäure erhalten wird, wenn der Stickstoff in einer Verbindung sich befindet, als durch Zersetzung des Ammoniaks oder des Cyans.

Nach diesen Thatsachen lässt sich kaum die Bildung der Salpetersäure auf Kosten der Bestandtheile des Ammoniaks bezweifeln; unter Einfluss der Luft, des Sauerstoffs und poröser Körper absorbirt es Sauerstoff, um in Salpetersäure und Wasser überzugehen. Auch nun auch Platinschwamm und Platinschwarz die Zersetzung des Ammoniaks nicht bewirken bei der Temperatur, welcher die Salpeterbildung vor sich geht, und die Umstände, unter welchen diese statt findet, in Betrachtung, die Natur der porösen Körper dabei weniger geeignet sind, so ist doch zu erwägen, dass, wenn der Stickstoff Körper auch weniger wirksam zu sein scheint als Platinschwamm, doch wenigstens der Sauerstoff des Ammoniaks in einem Zustande der Verdichtung oder Auflösung dargeboten wird, welcher die Bildung der Salpetersäure zu begünstigen scheint, und dass namentlich die Zeit ein wichtiges Element in dieser Frage ist. Ohnerachtet darf man die Umwandlung von Ammoniak in Salpetersäure und Wasser auf Kosten des Sauerstoffs der Luft noch nicht unbedingt annehmen, um die Salpeterbildung zu erklären, da dies das Vorhandensein



ner grossen Menge thierischer Materie voraussetzt, während man an Orten, wo die Salpeterbildung lebhaft vor sich geht, oft kaum Spuren davon findet. Die Theorie von der Umwandlung des Ammoniaks in Salpetersäure würde zulässiger sein, wenn die Bildung des Ammoniaks nicht auf die Zersetzung stickstoffhaltiger Materialien beschränkt wäre.

Aus den Versuchen, welche Kuhlmann über künstliche Bildung von Ammoniak anstellte, ergiebt sich, dass die das Wasser zersetzende Metalle in Reaction mit verdünnter Salpetersäure eine gewisse Quantität Ammoniak liefern; die Metalle oxydiren sich hierbei nicht allein auf Kosten des Sauerstoffs der Salpetersäure, sondern auch des Wassers, dessen Wasserstoff dann durch Verbindung mit dem Stickstoff der Säure Ammoniak bildet.

Bei der Ammoniakbildung im Roste und bei Darstellung des *Aethiops martialis* muss man annehmen, dass der Stickstoff, welcher mit dem im Entstehungsmoment auftretenden Wasserstoffe Ammoniak bildet, von der Luft geliefert wird; in allen Fällen muss aber das Wasser, durch seine Eigenschaft etwas Stickstoff aufzulösen, Ueberträger dienen. Die Verhältnisse, wo der Stickstoff der Luft zur Ammoniakbildung verwendet wird, scheinen selten zu sein, man kennt bis jetzt nur das beim Roste und dem *Aethiops martialis*.

Wenn Wasserstoff und Stickstoff im Entstehungsmoment auftreten, wie bei Zersetzung thierischer Materialien, so erklärt sich die Ammoniakbildung leichter.

Freier Stickstoff und Wasserstoff verbinden sich durch Einwirkung von Platinschwamm oder Platinwarz nicht zu Ammoniak; es entsteht eben so wenig durch Mengen von Wasserstoff und Stickstoff mit Salzsäure oder Schwefelsäure, oder wenn man über erhitztem pyrophorisches Eisen Wasserdampf und Stickstoff köchen lässt.

Dagegen bildet sich Ammoniak aus Wasserstoff und Stickstoff im Entstehungsmoment frei werdenden Stickstoff. So kann man Salpetersäuredampf und Stickoxydgas, mit Wasserstoff gemengt, über erhitzten Platinschwamm leiten. Nimmt man statt der Salpetersäure Untersalpetersäure oder Stickoxydgas, so findet die Einwirkung schon bei der Kälte statt, das Platin kömmt zum Glühen unter starker Lichtausstrahlung, wobei die Bildung von Ammoniak unter oft heftigen Explosionen vor sich geht.

Platinschwarz wirkt in allen diesen Fällen nicht so heftig wie Platinschwamm.

Leitet man Stickoxydgas und Doppelt-Kohlenwasserstoffgas oder Alkoholdampf über erhitzten Platinschwamm, so bilden sich cyanwasserstoffsäures und kohlensaures Ammoniak und Wasser. Salpeterdampf gibt Stickoxydgas aus, wenn er über Platinschwamm strömt, der zu ohngefähr 400° C. erhitzt ist, bei höherer Temp. aber cyanwasserstoffsäures Ammoniak, Wasser, vierfach Kohlenwasserstoffgas und Kohlenoxyd unter Absatz von Kohle.

Läßt man Schwefelsäure auf mit Alkohol befeuchtetes salpetersaures Kali wirken, so entwickelt sich Untersalpetersäure und Ammoniak, was sich in dem Producte durch Aetzkali nachweisen läßt; eben so, wenn man Salpetersäure oder Untersalpetersäure mit Terpeninöl zusammenbringt.

Es ergiebt sich hieraus, daß überall Ammoniak entsteht, wo Kohlenstoff oder Kohlenwasserstoff mit fre werdendem Stickstoff in Berührung kömmt.

Wenn beim Rosten der Stickstoff der Luft mit dem frei werdenden Wasserstoff zu Ammoniak sich verbindet, so läßt sich mit demselben Recht annehmen, daß bei Zersetzung organischer Materien das Ammoniak auf Kosten des vom Wasser absorbirten Stickstoffs und des frei werdenden Wasserstoffs oder Kohlenwasserstoffs in Ueberschuß sich entwickle. Diese Ansicht erlaubt, die Gegenwart von Ammoniak leichter zu erklären in den Fällen, wo die Präexistenz thierischer oder stickstoffhaltiger organischer Materien nicht wohl anzunehmen ist. Aus dem Ammoniak entstände weiter unter dem oxydirenden Einfluß der Luft bei Gegenwart von Feuchtigkeit und porösen Körpern Salpetersäure oder vielmehr salpetersaures Ammoniak, dessen Vorhandensein in den salpeterbildenden Materien die Bildung des salpetersauren Kalks erklärt, oder welches in einigen Fällen, bei Gegenwart von kohlensaurem Kali, leichter noch salpetersaures Kali liefert.

Wenn die in Vorstehendem aufgeführten Thatsachen der Ansicht der Oxydation des Ammoniaks zur Stütze dienen, so sprechen andererseits auch andere Erfahrungen für die Absorption der Elemente der Luft unter einem alkalischen Einfluß, wie Cavendish's Versuche mit alkalischen Auflösungen unter Beihülfe der Electricität. Da aber in keinem Falle die Reactionen, wodurch die Salpetersäure erzeugt wurde, unter solchen

er Salpeterbildung gleichen Umständen vor sich gingen, so sind erst die Resultate anderer Versuche zu erwarten, die die eine oder die andere Ansicht bestätigen werden. Jedenfalls aber dürfte bewiesen sein, daß das Ammoniak bei der Salpeterbildung eine wichtige Rolle spielt, und selbst eine nothwendige da, wo nur unlösliche phosphorsaure Salze vorhanden sind. Das Ammoniak trägt zur Bildung der Salpetersäure bei, man mag nun annehmen, daß diese Säure durch Verbindung des von Wasser absorbirten Sauerstoffs und Stickstoffs entstehe, oder durch directe Oxydation des Stickstoffs thierischer Massen, wie dieses die ältere Theorie verlangt, oder daß sie sich endlich durch Oxydation des Ammoniaks selbst in Gegenwart von Luft bildet.

Uebrigens ergeben die obigen Versuche die Möglichkeit, Salpetersäure und folglich salpetersaure Salze nach Willkühr darzustellen, ohne zu dem langsamen Vorgange der Salpeterbildung seine Zuflucht zu nehmen. Wenn auch jetzt die Umwandlung des Ammoniaks in Salpetersäure mittelst Platinschwamm und atmosph. Luft einen hinreichenden Vortheil darbietet, so können doch Umstände eintreten, wo dieses auch in ökonomischer Hinsicht anwendbar sein kann. Endlich dürften diese Versuche auch die Aufmerksamkeit auf den Platinschwamm lenken, als kräftiges Agens für zahlreiche Reactionen gasförmiger Materien.

---

## Erhalten der Schwefelsäure zur Arseniksäure ;

---

**D**ie Arseniksäure wird nach Wöhler \*) durch Schweflichtsäure zu Arsenichtsäure reducirt, u. wenn man die Auflösung von Arseniksäure durch Schweflichtsäure digerirt, so setzt sich die Arsenichtsäure in kurzer Zeit in großen durchsichtigen Octaedern ab. Diese leichte Reducirbarkeit der Arseniksäure ist besonders anwendbar, wo man Arsenik durch Schwefelwasserstoff aus Auflösungen von Arseniksäure fällen will, die durch Schwefelwasserstoffgas nur langsam zersetzt wird. So bei der Analyse von Arsenikmetallen, die unter langer Erhitzung in Salpetersäure oder in Königswasser aufgelöst werden müssen. Man mischt zu der Auflösung, die nicht viel

---

\*) Annal. der Pharm. XXX, 225.



überschüssige Salpetersäure enthalten darf, eine Auflösung von Schweflichtsäure, kocht einige Zeit, um das überschüssige Gas auszutreiben, und leitet dann Schwefelwasserstoff hindurch. So auch bei Prüfung von organischen Stoffen auf einen Arsenikgehalt, bei Arsenikvergiftungen, wenn z. B. Speisen, oder die Contents des Magens und dieser selbst in Kalilauge aufgelöst, diese Auflösung mit Salpetersäure oder Chlor behandelt, und dabei die Arsenichtsäure in Arseniksäure umgewandelt wird. Aus einer so behandelten Flüssigkeit mit Schweflichtsäure gekocht, wird bei nachherigem Einleiten des Schwefelwasserstoffgases das Arsenik rasch und sicher gefällt.

### Jodsäure.

Ob die krystallisirte Jodsäure Wasser enthalte oder nicht, schien noch zweifelhaft zu sein. Rammelsberg hat deshalb darüber Versuche angestellt \*). Die Jodsäure wurde nach Gay-Lussac durch Zersetzen von jodsaurem Baryt mit Ueberschufs von Schwefelsäure dargestellt, die erhaltenen Krystalle wurden auf porösen Thon von der anhängenden Schwefelsäure befreit, und zur Entfernung anhängender Feuchtigkeit kurze Zeit unter eine Klocke über concentr. Schwefelsäure gestellt. Die Krystalle wurden in Wasser gelöst und salpetersaures Silberoxyd hinzugefügt. Die Menge des erhaltenen jodsauren Silberoxyds zeigte, daß die *krystallisirte Jodsäure wasserfrei* ist. Obgleich die Jodsäure und namentlich die letzten Portionen aus einer viel Schwefelsäure enthaltenden Flüssigkeit erhalten war, so hielten die Krystalle doch nur 2 — 3 % Schwefelsäure eingeschlossen, so daß, wie auch schon Serullas fand, die Jodsäure mit Schwefelsäure sich nicht verbindet, wie dieses von Davy angenommen wurde.

### Die giftige Substanz in *Lolium temulentum*.

Nach vielen Versuchen, die Bley angestellt hat, den giftigen Bestandtheil im *Lolium temulentum* zu isoliren (*Buchn. Repert. XLVIII, 169*), ist ihm dieses auf folgende Weise gelungen. Das wässrige Extract von

\*) Poggend. Annal. XLVI, 159.

Pfd. Taumellochsamen wurde mit absol. Alkohol aus-  
 zogen, die Auflösung verdunstet, der Rückstand wie-  
 der mit absol. Alkohol behandelt, und die Auflösung so-  
 ge mit Aether versetzt, als noch ein Niederschlag er-  
 zeugte. Dieser bildete ein schmutzig-weißes krystalli-  
 sches Pulver und wog 10 Gran. Diese Substanz ist  
 heissem Wasser löslich, in kaltem weniger; in Alko-  
 hol von 80  $\frac{0}{100}$  löst sie sich beim Erwärmen, nicht aber  
 kalt, die heisßbereitete Lösung scheidet indessen beim  
 Kalten nichts ab; in Aether ist sie unlöslich; beim Er-  
 hitzen schmilzt sie und verbrennt mit empyreumatischem  
 Rauch. In der wässrigen Auflösung bringen salpeters.  
 Silberoxyd, essigs. Blei, Leimlösung, kohlenst. Kali und  
 kohlalkali Trübung oder Niederschlag hervor; in Gold-  
 lösung wird dadurch metall. Gold ausgeschieden;  
 Quecksilbersublimat, Chloreisen, Platinauflösung, Jod,  
 Salpetersäure, Aetzammoniak und Kupferammoniak bewir-  
 ken keine Reaction; Lackmus wird durch die Substanz  
 schwach geröthet. Sie scheint sich also den Säuren an-  
 schliessen.

Bley nennt diese Substanz, die noch einer ausführ-  
 lichen Untersuchung bedarf, *Loliin*; daß derselben die  
 wichtigsten Eigenschaften des Taumellochs zukommen, schließt  
 er aus der Wirkung, indem  $\frac{1}{10}$  Gran derselben ein-  
 genommen, Kratzen im Halse, dumpfes Gefühl im Kopfe  
 und Mattigkeit im ganzen Körper, was aber nur kurze  
 Zeit anhielt, bewirkte. (*Buchn. Repert. LXII, 181*).

Eine neue Analyse des Samens von *Lolium temulen-*  
*te* hat Muratori in der *Gazzett. eclett. di Chim. Aug.*  
 7. bekannt gemacht. Er fand in 100 Th. des Samens:

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Eigenthümliche Säure.  | 1,00  |
| Grünes Oel.....        | 1,75  |
| Zuckerartige Substanz. | 1,50  |
| Gummi.....             | 2,50  |
| Gluten.....            | 1,90  |
| Amylum.....            | 56,00 |
| Faser.....             | 13,00 |
| Phosphors. Kalk.....   | 1,00  |
| Schwefels. Kalk.....   | 1,50  |
| Kieselerde.....        | 0,50  |

---

98,75.

Muratori schreibt die giftigen Eigenschaften des  
 Taumellochs der erwähnten eigenthümlichen Säure zu,  
 eine nähere Characterisirung wir vermissen; doch  
 schreibt auch Bley dem von ihm dargestellten *Lolium*  
 dieselben Eigenschaften zu.

Uebrigens ergeben Muratori's Versuche mit den



Samenkörnern an lebenden Thieren, daß deren giftige Eigenschaft keiner flüchtigen Substanz, sondern der eigenthümlichen Säure zuzuschreiben sind; durch Neutralisirung mit einer Base soll diese Säure keinen giftigen Einfluß mehr ausüben.

Recht sehr ist zu wünschen, daß Bley eine neue ausführliche Untersuchung des Gegenstandes vornehme.

## Ueber arabisches Gummi, Stärke und Zucker in ihren Verbindungen mit Bleioxyd.

Die Versuche von Berzelius über das Gummi im freien und im mit Bleioxyd verbundenen Zustande bestimmten Liebig dafür die Formel  $C_{12}H_{12}O_9$  aufzustellen. Seit einiger Zeit hat man angefangen, diese Formel in  $C_{12}H_{18}O_9$  zu verwandeln, die auch für den Zucker und die Stärke in der bei  $170 - 180^\circ C.$  getrockneten Verbindung gilt.

Mulder\*) hat nun gefunden, daß das arabische, das Senegal- und Java-Gummi, so wie das Gummi in dem Bleigummate dieselbe Zusammensetzung haben nicht nur, sondern daß diese ist:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 12 At. Kohlenstoff..... | 44,92 |
| 20 „ Wasserstoff.....   | 6,11  |
| 10 „ Sauerstoff.....    | 48,97 |

100.

Hierdurch wird das von Berzelius erhaltene Resultat völlig bestätigt. Das Gummi verliert kein Wasser durch die Verbindung mit Bleioxyd, aber durch Erhöhung der Temp. Bei  $130^\circ$  aber unterscheidet sich das Bleigummat noch durch 1 At. Wasser mehr nach Peligot's Versuchen. Bei dem Studium des Bleigummats untersucht man aber das Verhalten des freien Gummis zuerst. Arab. Gummi, welches bei  $130^\circ C.$  vollkommen weiß war, wurde bei  $135^\circ C.$  gelblich, bei  $140^\circ$  war es schon gelb, bei  $160^\circ$  stiefs es bereits Geruch nach verbranntem Zucker aus, und bei  $170 - 180^\circ$ , bis zu welcher Temperatur die Amylate, Saccharate und Gummate des Bleioxydes erhitzt werden müssen, um wasserfrei zu erhalten, riecht das arab. Gummi deutlich nach verbranntem Zucker und wird braun; ein so veränderter Körper ist kein arab. Gummi mehr. Das Blei-

\*) Journ. f. pract. Chemie XVI, 246.

ydgummat derselben Temp. ausgesetzt, erleidet die nlichen Veränderungen, die Existenz eines Bleigum-  
 $\text{C}_{12} \text{H}_{18} \text{O}_9 + 2 \text{Pb O}$  muß sonach sehr zweifel-  
 t sein, und giebt es wirklich einen so zusammenge-  
 zten Körper, so enthält er kein Gummi mehr.

Der Zucker beginnt bei  $165^\circ$  gelb zu werden, bei  
 $167^\circ$ , bei welcher Peligot das Saccharat trocknete, wird  
 völlig zersetzt. Bei  $160^\circ$  schmilzt der Zucker, giebt  
 $167^\circ$  Säure, welche Lackmus röthet, und wird braun.  
 bleibt also zu beweisen, daß der bei  $170^\circ$  mit Blei-  
 d erhitzte Zucker noch Zucker sei. Der bis  $167^\circ$   
 itzte freie Zucker ist es nicht mehr. Eben so müs-  
 auch fernere Versuche entscheiden, ob im Bleioxyd-  
 ylate bei  $180^\circ$  noch Stärke als solche enthalten ist.

## Ueber den Krümelzucker.

Aus Brunner's Versuchen über die Zusammen-  
 ung des Stärkezuckers leitete Berzelius die For-  
 $\text{C}_{12} \text{H}_{24} \text{O}_{12}$  für den wasserfreien Krümelzucker  
 Diese fanden auch Erdmann und Lehmann bei  
 er Untersuchung des Harnzuckers; sie zeigten, daß  
 krystallisirte Verbindung von Harnzucker und Koch-  
 $\text{C}_{24} \text{H}_{52} \text{O}_{26} + \text{Na Cl}_2$  sei, aber bei  $100^\circ \text{C. 2 At.}$   
 $8 \frac{1}{2} \%$  Wasser verliere,<sup>1</sup> wodurch sie in  $\text{C}_{24} \text{H}_{48} \text{O}_{24}$   
 $\text{Na Cl}_2$  übergeht. Nach Peligot aber soll die kryst.  
 bindung bei  $160^\circ 6 \frac{1}{2} \%$  Wasser verlieren und in die-  
 Verbindung der Zucker  $\text{C}_{24} \text{H}_{48} \text{O}_{23}$  sein, oder nach  
 er Betrachtungsweise  $\text{C}_{24} \text{H}_{42} \text{O}_{21} + 2 \text{H}_2 \text{O}$ ; die  
 bindung  $\text{C}_{24} \text{H}_{52} \text{O}_{26}$  müßte sonach 3 At. ( $6,1 \frac{1}{2} \%$ )  
 sser verlieren. Erdmann fand bei seinen Versu-  
 den Zersetzungspunct dieser Verbindung aber ziem-  
 niedrig und hat deshalb über diesen Gegenstand  
 e Versuche unternommen \*). Die Verbindung wurde  
 in einem Probirglase im Chlorzinkbade erhitzt, das Pro-  
 las war mit einem Kork verschlossen, durch welchen  
 Ende einer mit Chlorcalcium gefüllten Röhre ging,  
 mit der Luftpumpe in Verbindung stand, um ab-  
 hselnd die Luft auszupumpen und trockne Luft wie-  
 einströmen zu lassen. Bei diesen Versuchen wur-  
 folgende Resultate erhalten.

Krystallisirtes *Harnzucker-Kochsalz* wurde bei  $130^\circ \text{C.}$

Journ. für pract. Chem. XVI, 247.

getrocknet, bis keine Gewichtsabnahme mehr erfolgte, diese betrug  $4,48 \frac{0}{0}$ , bei  $144^{\circ}$  zeigte sich ein schwacher brenzlicher Geruch, bei  $150^{\circ}$  deutlicher Caramelgeruch, bei  $160^{\circ}$  völlige Zersetzung, starker Caramelgeruch und bräunlichgelbe Farbe, der Verlust betrug jetzt nahe  $6 \frac{0}{0}$ , natürlich konnte derselbe nicht bloß in Wasser bestehen haben.

*Stärkezucker-Kochsalz* verlor bei  $100^{\circ}$  C. nahe  $4 \frac{0}{0}$ . Die Verbindung hielt kleine Kochsalzkrystalle beigemengt, bei  $120^{\circ}$  entstand keine weitere Gewichtsabnahme, bei  $130^{\circ}$  merklicher Caramelgeruch, bei  $150^{\circ}$  gelbliche Färbung und deutlicher Caramelgeruch, bei  $160^{\circ}$  gelbe Farbe, Zusammensintern, und der Gewichtsverlust betrug im Ganzen nahe  $6 \frac{0}{0}$ .

*Traubenzucker-Kochsalz*, man überzeugte sich durch die Analyse von dessen Identität mit den beiden vorhergehenden Verbindungen, verhielt sich analog. Bei  $112^{\circ}$  C. betrug der Gewichtsverlust  $4,11 \frac{0}{0}$ , bei  $125^{\circ}$  nahm dieser nicht mehr zu, bei  $150^{\circ}$  trat deutliche Zersetzung ein.

Aus diesen Versuchen schließt *Erdmann* mit Recht, daß man die bisher angenommene Formel für den unkrySTALLISIRbaren Zucker noch nicht zu verlassen braucht, indem in den vorstehenden bis  $160^{\circ}$  C. erhitzten Verbindungen der Zucker nicht mehr unverändert enthalten sei, ähnlich wie dieses aus *Mulder's* Versuchen über die Bleioxydverbindungen mit Stärkmehl u. s. w. sich ergibt.

## Xyloidin.

Unter dem Namen *Xyloidin* hat *Braconnot* eine Substanz beschrieben, die durch Einwirkung von Salpetersäure auf Stärkmehl oder Faser entsteht, aber erst sehr unvollkommen bekannt ist, und deren Darstellung auch von Mehren vergeblich versucht wurde. *Pelouze* hat deshalb diesen Gegenstand einer nähern Untersuchung unterworfen \*).

Wird Stärkmehl mit concentr. Salpetersäure im 1,5 spec. Gew. gemischt, so löst sich dasselbe völlig auf, es entwickelt sich kein Gas, Wasser schlägt aus der Auflösung das Xyloidin völlig nieder, und die abfiltrirte

\*) *Compt. rendu* VII, 713.



flüssigkeit hinterläßt durch Verdunsten einen kaum merklichen Rückstand.

Läßt man die Auflösung der Stärke in Salpetersäure in einem verschlossenen Gefäße einige Zeit stehen, nimmt sie nach und nach verschiedene Farben einer Mischung von Salpetersäure und Salpetergas an, Wässert man dann aus der Auflösung weit weniger Xyloidin aus, und hat die Auflösung einige Tage, zuweilen fast nur einige Stunden gestanden, so wird sie durch Wasser nicht mehr getrübt, und das Xyloidin ist zerstört und gänzlich in eine neue Säure verwandelt, die durch Verdunsten der Flüssigkeit als eine weiße, unkrystallisirbare zerfließliche Masse erhält, deren Gewicht größer ist als das des zum Versuch genommenen Stärkmehls; weder Kohlensäure noch Oxalsäure wird bei dieser Reaction erzeugt.

Das Xyloidin, das erste Product der Einwirkung von Salpetersäure auf Stärkmehl, ist eine Verbindung beider, in welcher das gewöhnliche Stärkmehl, das 1 At. Wasser enthält, welches durch 1 At. Salpetersäure ersetzt wird. Stärkmehl wird gänzlich in diese Substanz verwandelt; hieraus erklärt sich die bedeutende Gewichtszunahme, die man erhält, wenn das Xyloidin unmittelbar beim Auflösen des Stärkmehls in Salpetersäure durch Wasser gefällt wird.

Läßt man die Auflösung des Stärkmehls in Salpetersäure kochen, so wird erstens in wenig Minuten zerstört und in eine zerfließliche Säure verwandelt, die in bedeutender Menge durch Verdampfen im Wasserbade erhalten werden kann. Diese Säure enthält Stickstoff und hat einige Aehnlichkeit mit der Hyaluronsäure (Zuckersäure), aber ihre Zusammensetzung davon verschieden. Durch mäßiges Erhitzen wird sie in eine andere Säure von schwarzer Farbe verwandelt, die in Wasser löslich ist, und durch Behandeln mit Salpetersäure wieder in die weiße Säure verwandelt wird, woraus sie entstand.

Concentrirte Salpetersäure greift dieselbe schwach an; in der Kälte wird sie dadurch langsam in Oxalsäure verwandelt, ohne daß Kohlensäure dabei auftritt. Durch eine allmälige Oxydation, bestimmt durch eine bestimmte Menge von Salpetersäure, wird das Stärkmehl allmählich in Xyloidin, zerfließliche Säure und Oxalsäure zerlegt, ohne daß Kohlenstoff abgeschieden wird.

Die merkwürdigen Reactionen gehen von selbst in der offenen oder in verschlossenen Gefäßen vor sich.

Das *Xyloidin* erscheint also als ein Salz, in welchem das Stärkmehl als Base gegen die Salpetersäure auftritt. Es ist sehr verbrennlich, bei 236° F. fängt es Feuer und brennt lebhaft fort, einen unbedeutenden Rückstand hinterlassend. Diese Eigenschaft veranlafste Pelouze zu einem Versuch, welcher verschiedener Anwendung, namentlich in der Artillerie fähig sein dürfte. Läßt man 2 — 3 Minuten lang Papier in Salpetersäure von 1,5 spec. Gew. eintauchen, so daß es von der Säure durchdrungen ist, und wäscht es dann mit vielem Wasser aus, so erhält man eine Art von Pergament, das der Feuchtigkeit widersteht und sehr entzündlich ist; eben so verhält sich Leinwand und baumwollen Zeug.

## Beitrag zur Charakteristik der Alkaloide.

Von Kemp sind einige Versuche angestellt worden \*) mit Chinin, Cinchonin, Brucin, Strychnin, Morphin, Narcotin, Codein, Veratrin, Solanin, Coniin, Emetin, Oxyacanthin gegen Indigbittersäure, aus welchen sich ergibt, daß sich Chinin, Brucin und Strychnin mittelst Indigbittersäure leicht unterscheiden lassen, sowohl unter sich, als von den übrigen Alkaloiden durch die Unauflöslichkeit des Chininniederschlags in Salpetersäure, aus dem Verhalten des Brucin- und Strychninniederschlags zu Salpeter- und Essigsäure. Der Chininniederschlag unterscheidet sich durch seine Krystallisirbarkeit aus der heißen alkoholischen Solution beim Erkalten, während das Chinin fein pulvrig oder krystallinisch gefällt wird. Das Oxyacanthin unterscheidet sich durch die braune Färbung des Niederschlags mit Salpetersäure. Strychnin unterscheidet sich deutlich von Brucin durch eine größere Auflöslichkeit und Neigung zu krystallisiren, ganz ausgezeichnet ist beim bittersauren Brucin die blutrothe Färbung mit Salpetersäure. Der Oxyacanthinniederschlag wird von dieser Säure braun. Ueber die Empfindlichkeit der Indigbittersäure wird bemerkt, daß 1 Gran schwefelsaures Chinin in 12,800 Gran Wasser gelöst, mit wenig Tropfen einer wässrigen Auflösung des Reagens einen sehr beträchtlichen Niederschlag gebe. 1 Gran Brucin in 3000 Th. und 1 Th. schwefels. Strychnin in 6000 Th. Wasser gelöst, wird durch dieses Reagens bestimmt nachgewiesen.

\*) Buchn. Repert. f. d. Pharm. XXI. 2. R. 164.



## Reaction der Eisenoxydsalze auf Morphin.


**J.** Fuchs hat diese Reaction geprüft \*) und gefunden, daß das Morphin und dessen Salze nicht mit allen Eisenoxydsalzen blaue Farbenerscheinungen geben, daß übrigens vorzüglich das salpetersaure Eisenoxyd als Reagens auf Morphin und dessen Salze vor andern Eisenoxydsalzen den Vorzug verdiene.

## Salicin.

**B**ei der Einwirkung der Schwefelsäure und des sauren chroms. Kalis auf Salicin bildet sich nach Piria nicht Ameisensäure, sondern auch ein flüchtiges Oel, welches dieselbe Zusammensetzung hat, wie die wasserhaltige Benzoesäure. Diese Isomerie geht noch weiter. Der Verbindung des Oels mit dem Kupferoxyde hat dieselbe Zusammensetzung wie die wasserfreie Benzoesäure im benzoës. Kupferoxyde.

Der ölige Körper aus dem Salicin verliert durch Einwirkung von Chlor und Brom 2 At. Wasserstoff, die durch 2 At. Chlor oder Brom ersetzt werden.

Diese Resultate sind so analog den von Wöhler und Liebig über das Bittermandelöl erhaltenen, daß man sie auch auf dieselbe Weise darzustellen sich vermag.



Diese Ansicht wird wesentlich bestätigt dadurch, daß Salicylhydrür mit Baryt zu einem Körper sich verbindet, der ein Salicylbarium oder Baryumsalicylür darstellt, wenn er bei 160° C. in einem Luftstrome getrocknet wurde,  $\text{C}_{14} \text{H}_{10} \text{O}_4 + \text{Ba}$ . Durch dieses Trocknen verliert die Verbindung nämlich 2 At. Wasser, vor dem Trocknen ist sie  $\text{C}_{14} \text{H}_{12} \text{O}_4 + \text{Ba O} + \text{H}_2 \text{O}$ . Mit dem Baryt bildet das Salicylhydrür ein in großen goldgelben Blättchen krystallisirendes Salz. Auch das Chlorsalicyl bindet sich in der Kälte mit Kali zu einem krystallisbaren Salze, aus welchem Säuren das Chlorsalicyl unverändert fallen.

Dumas stellt über die Beobachtungen Piria's folgende Ansicht auf. Das Benzoyl läßt sich als ein oxydirter Kohlenwasserstoff betrachten,  $C_{14}H_{10} + O_1$ , und wird bekanntlich als ein Radikal angesehen. Mit 4 At. Sauerstoff bildet derselbe Kohlenwasserstoff ein zweites Radikal das Salicyl,  $C_{14}H_{10} + O_4$ . Benzoyl und Salicyl können sonach als Oxyde eines Radikals angesehen werden.

## Ueber Anemonin.

Das Anemonin wurde bekanntlich von Hagen entdeckt und später von Schwarz untersucht \*). Löwig und Weidmann haben dasselbe kürzlich analysirt \*\*). Sie bestimmen seine Zusammensetzung zu:

|                       |         |         |
|-----------------------|---------|---------|
| 7 At. Kohlenstoff.... | 535,045 | 55,05   |
| 6 » Wasserstoff...    | 37,483  | 3,85    |
| 4 » Sauerstoff.....   | 400,000 | 41,16   |
|                       |         | 972,483 |
|                       |         | 100.    |

In Alkalien löst sich das Anemonin besonders in der Wärme auf, und wird in eine eigenthümliche Säure durch umgewandelt, *Anemoninsäure*, die aber nicht mit der Anemoninsäure von Schwarz zu verwechseln ist. Wird Anemonin mit concentr. Barytlösung gekocht, so bilden sich, so lange noch ein Ueberschuss von Baryt vorhanden ist, rothe Flocken, basisches Salz, welches durch mehr einwirkendes Anemonin verschwindet, indem eine gelbe Auflösung von anemonins. Baryt entsteht. Die Auflösung wird mit Kohlensäure behandelt, bis kein Niederschlag mehr entsteht, wodurch alles noch vorhandene basische Salz in neutrales verwandelt wird; man zersetzt darauf die Auflösung durch einfach-essig. Bleioxyd, und den Niederschlag von anemoninsaurem Bleioxyd durch Schwefelwasserstoff, nach Entfernung des Schwefelbleis hinterläßt die Auflösung durch Verdampfen im Wasserbade die Anemoninsäure. Diese ist amorph durchscheinend, hygroskopisch, schmeckt sauer, giebt ein gelbes Pulver, schmilzt bei  $100^{\circ}C$ . zu einer ölig. Masse, ist in Wasser leichtlöslich, in Weingeist schwer, in Aether unlöslich. Das Bleisalz enthält 56,24% Bleioxyd. Die Säure im Bleisalze besteht aus:

|                      |         |       |
|----------------------|---------|-------|
| 7 At. Kohlenstoff... | 535,045 | 49,34 |
| 8 » Wasserstoff...   | 49,918  | 4,60  |
| 5 » Sauerstoff.....  | 500,000 | 46,06 |

1084,963    100.

\*) Magaz. f. Pharm. X, 193. XIX, 168.

\*\*) Poggend. Annal. XLXI, 45.

Die freie Säure enthält 1 At. Hydratwasser und besteht folglich aus:

|                       |         |          |
|-----------------------|---------|----------|
| 7 At. Kohlenstoff ... | 535,045 | 44,71    |
| 10 » Wasserstoff...   | 62,397  | 5,11     |
| 6 » Sauerstoff.....   | 600,000 | 60,18    |
|                       |         | 1197,442 |
|                       |         | 100.     |

Ein anderes Product als diese Säure entsteht bei Einwirkung des Anemonins auf Alkalien nicht. Durch Kochen mit concentr. Salzsäure wird das Anemonin ebenfalls in Anemoninsäure verändert. Durch Salpetersäure wird es in der Kälte nicht merklich verändert, beim Erhitzen wird es in Oxalsäure verwandelt und dabei bildet sich vielleicht auch Anemoninsäure. Durch Schwefelsäure wird es in der Kälte nicht verändert, beim Erhitzen aber wird die Auflösung braun; von verdünnter Schwefelsäure wird es nach längerem Kochen mit röthlich-gelber Farbe aufgelöst, die Auflösung giebt nach Mischen mit kohlensaurem Baryt und Verdampfen eine dunkelgelbe Masse, die keinen Baryt enthält, und weder Anemonin noch Anemoninsäure ist.

## Cubebin

In reinem Zustande stellt Steer das Cubebin dar\*) durch Behandlung der vom ätherischen Oele befreiten Cubeben mit Alkohol, Abziehen des Alkohols bis auf  $\frac{1}{8}$ , Filtriren, Abdestilliren des letzten Alkohols, Aussetzen an die Luft auf einem Colatorio, Auflösen des krystallisirten Stoffes im 3 — 4fachen Gewichte kochenden Alkohols von 0,900 spec. Gew., heißes Decantiren, nachdem das Harz sich abgesondert hat, Wiederauflösen in starkem kochenden Alkohol, Digeriren mit Thierkohle und neues Krystallisiren.

## Ätherisches Oel der Lindenblüthen und Hollunderblüthen.

Der Grund, warum man bei der Destillation der Lindenblüthen kein oder nur wenig ätherisches Oel erhält, liegt nach F. L. Winckler darin, daß dasselbe in Wasser sehr löslich ist, wovon man leicht sich über-

\*) Buchn. Repert. f. d. Pharm. XXI. 2. R. 119.

zeugen kann, wenn man concentr. Lindenblüthenwasser mit Chlorcalcium sättigt und dann mit Aether behandelt. Nach freiwilligem Verdunsten des abgesonderten Aethers bleibt das Oel zurück. 25 Pfd. frischer Lindenblüthen geben auf diese Weise 80 Gran.

Das *Lindenblüthenöl* ist farblos, dünnflüssig, ziemlich flüchtig, und deshalb für sich leicht zu destilliren, oxydirt sich weniger leicht als viele andere ätherische Oele, löst Jod mit dunkelbraunrother Färbung, aber ohne Erwärmung auf.

Auch aus Hollunderblüthen läßt sich auf dieselbe Weise eine ziemlich beträchtliche Menge ätherisches Oel abscheiden.

Das *Hollunderblumenöl* besitzt den Geruch der Bienen in so hohem Grade, daß die kleinste Menge des Oels große Räume damit erfüllt, ähnlich dem Moschus. Beim Gefrierpunct des Wassers erstarrt es zu einer krystallinischen dem Rosenöl ähnlichen Masse. Es destillirt schwer, und kann, wie das Bittermandelöl, einer hohen Temp. ausgesetzt werden, ohne Zersetzung zu erleiden: an der Luft verdickt es sich nach und nach zu einer rothbraunen Masse, die wie veraltete Hollunderblüthen riecht.

Diese interessanten Beobachtungen dürften bei Analysen von solchen Pflanzen wohl berücksichtigt werden, die stark riechen, ohne daß man bisher ätherisches Oel daraus ausscheiden konnte. (*Pharm. Centralbl.* 1837. No. 41.)

## Aetherisches Petersilienöl.

Dieses Oel ist von Löwig und Weidmann einer neuen Untersuchung unterworfen worden \*). Durch Destillation mit Wasser zerfällt das rohe Oel in ein flüsiges, welches überdestillirt, und in ein festes, welches in der Retorte zurückbleibt.

Das *flüssige Oel* wird durch mehrmalige Destillationen farblos, ist leichter als Wasser, siedet bei 160 bis 170° C. und hat einen ausgezeichneten Geruch nach Petersilie. Salzsäures Gas wird unter Wärmeerzeugung und Färbung des Oels davon aufgenommen. Die Analysen des Oels führen zu der Formel:

6 At. Kohlenstoff . . . 88,46

8 „ Wasserstoff . . . 11,54

100.

\*) Poggend. Annal. XLVI, 53.



Es ist also mit dem Terpentinöl oder Citronenöl isomerisch oder polymerisch.

Das feste Oel, der von der Dest. des rohen Oels in der Retorte zurückbleibende Theil, ist braun, von harzigem Ansehen, geruch- und geschmacklos und läßt sich nicht farblos darstellen. Das Verhalten des gewöhnlichen Petersilienöls zum Wasser zeigt jedoch, daß es in reinen Zustande farblos ist. Ohne Zersetzung läßt sich der feste Theil nicht verflüchtigen. Die damit angestellten Analysen führten zu der Formel:

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 12 At. Kohlenstoff... | 69,66 |
| 16 » Wasserstoff...   | 17,58 |
| 3 » Sauerstoff....    | 52,76 |

100.

Der Petersilienkampher hat nach Blanchet und Coll die Formel  $C_{12}H_{14}O_4$ . Es scheint hiernach der Petersilienkampher durch Oxydation des festen Theils des Oels zu entstehen. Treten nämlich zu  $C_{12}H_{16}O_3$  noch  $O_2$  hinzu, so können daraus resultiren  $C_{12}H_{14}O_4$  und  $H_2O$ .

## Pfeffermünzöl.

Das krystallisirte Pfeffermünzöl, Stearopten, hat L. Walter aus Krakau einer neuen Analyse unterworfen \*). Es wurde zur Entfernung der Feuchtigkeit zwischen Josephpapier gepreßt und über Chlorcalcium-cken destillirt. Es schmilzt dann bei  $34^{\circ}C$ . und kocht bei  $213,5^{\circ}$ . Die Analyse ergab folgendes Resultat für Zusammensetzung:

|                        |         |       | Versuch |
|------------------------|---------|-------|---------|
| 20 At. Kohlenstoff.... | 1530,40 | 77,27 | 77,10   |
| 40 » Wasserstoff....   | 250,00  | 12,62 | 12,58   |
| 2 » Sauerstoff.....    | 200,00  | 10,11 | 10,32   |
|                        | 1980,40 | 100   | 100.    |

Die Dichtigkeit des Dampfs im Versuch war 5,62, die Formel giebt 5,455.

Vermuthend hiernach, daß das feste Pfeffermünzöl sich mit Kampher anschließen würde, suchte W. ein, dem Pfeffermünzen nach Dumas und Peligot analoges Menthylöl zu erhalten und erhielt dasselbe, indem er dem schmelzenden Pfeffermünzöl kleine Mengen wasserfreier Phosphorsäure zusetzte, lange noch eine Temperaturerhöhung statt fand, und



das Destillat dann nochmals über wasserfreie Phosphorsäure rectificirte. Die so erhaltene Flüssigkeit nennt W. *Menthen*, sie kocht bei  $163^{\circ}$ . Ihre Zusammensetzung ist:

|                        |         |       | Versuch |
|------------------------|---------|-------|---------|
| 20 At. Kohlenstoff.... | 1530,40 | 87,18 | 87,53   |
| 36 » Wasserstoff....   | 225,00  | 12,82 | 12,55   |
|                        | 1755,40 | 100   | 100,38  |

Die Dichtigkeit des Menthendampfs nach dem Versuch war 4,932. Die Formel ergiebt 4,535.

## Formomethylal.

Durch Einwirkung von Schwefelsäure, Mangasuperoxyd und Wasser auf Holzgeist erhielt Kane eine ätherartige Flüssigkeit\*), die der Dichtigkeit ihres Dampfs wegen zu den interessantesten Substanzen der Chemie gehört, eben wie wegen ihrer Zusammensetzung. Dumas hat eine neue Analyse davon angestellt\*\*) und sie *Formomethylal* genannt.

Die Resultate der Analyse führen zu folgender Zusammensetzung:

|                       |        |      |
|-----------------------|--------|------|
| 4 At. Kohlenstoff.... | 306,08 | 45,9 |
| 10 » Wasserstoff....  | 62,50  | 9,2  |
| 3 » Sauerstoff.....   | 300,00 | 45,0 |
|                       | 668,58 | 100. |

Die Formel muß doppelt genommen werden,  $C_8 H_{10} O_6 = C_2 H_2 O_3 + 3 C_2 H_4 + 3 H_2 O$  oder  $C_2 H_2 O_3 + 3 C_2 H_6 O$ , d. h. ein dreifach-basisch ameisenartiges Methylen, in welchem jedes Atom Methylen von einem Atom Wasser begleitet ist, wie dieses bei allen Verbindungen von Kohlenwasserstoff mit Sauerstoffsäuren der Fall ist. Die Condensation dieses Körpers ist sonderbar; man hat:

$$\begin{array}{r} C_8 = 6,7456 \\ H_{10} = 1,3760 \\ O_6 = 6,6156 \\ \hline 14,7372 \\ \hline 6 = 2,456. \end{array}$$

Die Versuche ergeben die Dichtigkeit des Dampfes zu 2,53 und 2,50.

Durch Kali wird das Formomethylal in ameisensaures Kali und Holzgeist zerlegt. Durch Chlor liefert es ein

\*) Annal. d. Pharm. XIX, 175.

\*\*) Dasselbst XXVII, 135.

hartiges Product, das von Wasser unter Bildung von Weinsäure zersetzt wird.

## Fette Oele.

Ueber das Verhalten des Phosphors, Chlors, Jods, Arsens und Antimons zu fetten Oelen hat Reinsch Versuche angestellt\*). Es ergiebt sich daraus, daß der Phosphor durch Erhitzen mit Fetten keine ähnliche Verbindungen bildet, wie der Schwefel, daß er fast unverändert überdestillirt, ohne daß sich Phosphorwasserstoffgas bildet, und daß aus der heißen Auflösung der Phosphor beim Erkalten in krystallisirtem Zustande sich auscheidet.

Wenn man auf eine Mischung zur Chlorentwicklung, Unzen Kochsalz,  $1\frac{1}{2}$  Unz. Braunstein,  $1\frac{3}{4}$  Unz. Schwefelsäure und eben so viel Wasser, eine geringe Menge, 1 Gran, Oel gießt, so wird dieses durch das Chlor dick und nach verdickt und mehr oder weniger fest. Mandelöl und Ricinusöl werden dadurch in eine feste wachsartige, Leinöl und Mohnöl in eine zähe terpentinartige, Erdstalg und Schweineschmalz in eine schmierige Masse verwandelt, unter Bildung von Chlorwasserstoffgas.

Die wachsartige Substanz, welche sich aus dem Mandelöl bildet, ist in kaltem Alkohol von  $75\frac{0}{100}$  fast unlöslich, in kochendem Alkohol aber löst sie sich auf, und scheidet sich beim Erkalten wieder aus; in Aether, fetten und ätherischen Oelen ist sie löslich, Kali und Ammoniak nehmen unter theilweiser Lösung Salzsäure daraus auf.

Jod übt eine weit geringere Einwirkung auf die fetten Oele aus, als Chlor, die Erscheinungen sind sonst dieselben. Die Oele werden braun und verdicken sich unter Bildung von Jodwasserstoffsäure. Aus den Versuchen, welche R. über das Verhalten des metallischen Arsens zu den fetten Oelen anstellte, ergiebt sich, daß das Arsen für sich nicht in den fetten Oelen löslich ist, es also gegen diese anders verhält, wie Schwefel und Phosphor. Beim Kochen mit den Oelen wird aber etwas Arsen zu Arsenichsäure oxydirt und diese wird von dem Oel aufgelöst. Beim Kochen des Arsens mit den fetten Oelen bildet sich kein Arsenwasserstoffgas, und wenn man angegeben findet, daß Arsen mit fetten Oelen durch Kochen eine pflasterähnliche Masse bilde, so hat

\*) Erdmann's Journ. f. pract. Chem. XIV, 267.

man wahrscheinlich eine mechanische Mengung von Arsen mit einem durch das Kochen verdickten und zähe gewordenen Oele unrichtig für eine solche angesehen.

Wird *reines Antimon* auf gleiche Weise mit fetten Oelen behandelt, so nehmen diese nichts davon auf, auch findet keine Oxydation des Antimons statt. Enthält das Antimon aber Blei, so wird dieses oxydirt und von dem Oel Bleioxyd aufgenommen, welche Oxydation durch den galvanischen Gegensatz beider Metalle begünstigt zu werden scheint.

## Ueber die Zersetzung des Amygdalins durch Emulsin.

Mit der Untersuchung des Emulsins haben sich A. Thomson und Fr. Richardson beschäftigt\*). Das Emulsin wurde auf folgende Weise dargestellt. Süsse Mandeln wurden mit etwas Wasser in einem Mörser zu einer milchigen Flüssigkeit zerrieben, und diese dann mit ihrem vierfachen Volum Aether stark geschüttelt, um ein inniges Gemenge zu erhalten. Auf dem Boden des Glases lagerte sich eine klare Flüssigkeit ab, welche nach drei Wochen mittelst eines Hebers abgelassen und filtrirt wurde. Aus der einen Hälfte der klaren Auflösung wurde das Emulsin durch viel Alkohol in weissen Flocken gefällt, aus der andern Hälfte durch Erhitzen bis zum Siedepuncte als flockiges Coagulum. Das durch Alkohol gefällte Emulsin wurde mit Alkohol ausgewaschen, über Schwefelsäure im luftleeren Raume getrocknet, und stellte so ein weisses geruch- und geschmackloses Pulver dar; es ist löslich in Wasser, unlöslich in Alkohol und Aether. Zwei Analysen desselben ergaben folgende Zusammensetzung:

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| Kohlenstoff..... | 49,025 | 48,555 |
| Stickstoff.....  | 15,910 | 18,742 |
| Wasserstoff..... | 7,788  | 7,677  |
| Sauerstoff.....  | 24,277 | 25,026 |
|                  | 100    | 100.   |

Besonders characteristisch ist das Verhalten des Emulsins gegen Baryt. Wird es damit gekocht, so verbindet sich fortwährend Ammoniak, leitet man darnach einen Strom von Kohlensäure durch die Auflösung, so

\*) Annal. der Pharm. XXIX, 180.

irt und verdampft das Ganze zur Trockne, so erhält man ein bitterschmeckendes Barytsalz. Dieses Verhalten führt zu dem Schluss, daß das Emulsin ein Amid ist und daß das durch Einwirkung des Baryts entstandene Salz eine eigenthümliche Säure enthält, die Th. und R. mit dem Namen Emulsinsäure bezeichnen.

---

## Bereitungsart von Cyankalium.

---

Eine vom verstorbenen Brandé in Hannover beglaubte Methode zur Darstellung des Cyankaliums hat Viggers geprüft und sehr zweckmässig gefunden \*). Er verfährt folgenderweise: 2 Th. Blutlaugensalz werden in einem Kolben mit  $2\frac{1}{2}$  Th. Wasser und darauf mit einem gekalteten Gemisch von  $1\frac{1}{2}$  Th. englischer Schwefelsäure und  $1\frac{1}{2}$  Th. Wasser vermischt. Der Kolben wird mit einem Welther'schen Sicherheitsrohr, oder in Ermangelung desselben mit einer zweischenkligen Glasröhre verbunden, im letztern Falle aber muß man, um das Zurücksteigen zu vermeiden, eine bis in die Masse des Kolbens reichende Glasröhre durch den Kork anbringen, man löst weiter 1 Th. möglichst kohlensäurefreies Kalidrat in 3 — 4 Th. Weingeist von 90 %, und leitet in diese Auflösung die durch Erhitzen des Kolbens entwickelnde Blausäure, die vom Kali völlig absorbiert wird, wobei sich die Auflösung stark erhitzt, daher man den Recipienten gleich vom Anfang an abkühlt, um Zersetzung zu vermeiden. Die Entwicklung der Blausäure wird möglichst langsam betrieben und so lange fortgesetzt, bis man bei verstärktem Feuer und dem bei sich einstellenden stossenden Kochen merkt, es viel mehr Wasserdampf, als Blausäure übergeht. Die Blausäure ist zwar dann noch nicht völlig ausgegeben, was vielleicht erst nach dem Verdunsten bis zur Trockne der Fall sein möchte, aber das von da mit übergehende Wasser würde den Alkohol zu sehr verdünnen und machen, daß eine grössere Menge Cyankalium in Auflösung zurückgehalten würde. Sobald die Blausäure in die Kalilösung strömt, fällt Cyankalium nieder, wodurch die Auflösung endlich zu einem dicken Brei wird, den man auf ein Filter bringt und tropfeln läßt, noch ein paar Mal mit Alkohol befeuch-

---

\*) Annal. der Pharm. XXIX, 65.



## 214 *Cyankalium u. Kalicarbonat. Schwefelcyan-Kalium.*

tet, zwischen Löschpapier auspresst und möglichst schnell auf einer erwärmten Eisenplatte austrocknet.

Von 2 Unz. kryst. Blutlaugensalz wurden 6 Drachm. Cyankalium als weißes krystallinisches Pulver erhalten. Jene Menge Blutlaugensalz enthält nahe 10 Drachmen Cyankalium; der Verlust rührt theils davon her, daß nicht alle Blausäure ausgetrieben worden war, theils, daß etwas Cyankalium in der abgetropften Alkohollösigkeit gelöst bleibt; 100 Alkohol von 94  $\frac{0}{0}$  lösen etwa 1 Cyankalium auf.

Die leichte Ausführung, die geringe Menge Alkohol und die Reinheit des Products sprechen so sehr zum Vortheil dieser Methode, daß man sie gewiß der bekannten Darstellung durch Glühen des Blutlaugensalzes u. s. w. vorziehen wird.

---

### Bereitung des Cyankaliums und Kalicarbonats.

---

Bei der Darstellung des Cyankaliums nach Wigger's Methode macht Herberger darauf aufmerksam\*), daß die Lösung des Kali in Alkohol frisch sein muß, daß man nur starken Alkohol anwenden dürfe von etwa 92  $\frac{0}{0}$  und endlich, daß man die Blausäure recht wasserarm in die Lösung strömen lasse.

Wöhler's Methode der Darstellung des Kalicarbonats durch Mengung des einfach kohlens. Kali mit Kohle, z. B. die Anwendung des gebrannten rohen Weirsteins, empfiehlt derselbe gleichfalls, jedoch mit dem Bemerkens, daß beim Abdampfen ein Theil des Bicarbonats in Sesquicarbonat sich verwandelt.

---

### Notiz über Bereitung von Schwefelcyan-Kalium und eine dabei erhaltene neue Verbindung.

---

Nach Reufs\*\*) ist vortheilhafter, bei der Darstellung dieses Präparats das Gemenge aus 1 Th. Schwefelblumen und 2 Th. getrockn. eisenblaus. Kali nicht bis

---

\*) Buchn. Repert. f. d. Pharm. 2. R. XXI, 122.

\*\*) Daselbst 2. R. XIX, 343.



in dunklen Rothglühhitze zu erhitzen, da bei Anwendung einer so hohen Temperatur leicht Zersetzung eintreten möchte. Bei nicht zu grossen Mengen kann man sich eines Kolbens aus grünem Glase bedienen, der inwendig sehr geräumig sein muss, weil die Masse steigt. Sie wird so lange im Flusse erhalten, bis sie wie Schwefelkalium ruhig fliesst und zu schäumen aufhört. Die flüssige Masse wird auf eine kalte Platte ausgegossen, abgestossen, dann mit kochendem Wasser oder auch gleich mit kochendem Weingeist ausgezogen. Wird die Masse mit kochendem Wasser ausgezogen und nicht so weit verdunstet, so findet man in der filtrirten Flüssigkeit keine Krystalle von Schwefelcyankalium, aber blauschwarzkohlähnliche Krystalle, die R. mit Chr. Gmelin als Mellonkalium hält, welche Meinung Buchner jun. und Wiggers's neuesten Erfahrungen gemäß bestätigt.

---

### Einfache Bereitungsart von Schwefelcyan-Kalium.

---

Folgende leichte Bereitungsart von Schwefelcyan-Kalium giebt Wiggers\*) an. Ein Gemenge von Cyan-Kalium mit so viel Schwefel, als zur Verwandlung des enthaltenen Cyans in Schwefelcyan erforderlich ist, wird mit Wasser übergossen; man erhält nach Erhitzen eine Auflösung, die beim Verdunsten reines Schwefelcyankalium liefert. Ein grösserer Zusatz von Schwefel bewirkt Zersetzung und Bildung von Schwefelkalium, in welchem Fall die Lösung nicht farblos, sondern gelblich erscheint.

---

### Ueber einige Eisenpräparate.

---

Zur Darstellung des krystallisirten wasserhaltigen Eisenchlorides schlägt Fr. Mohr\*\*) reinen Blutstein vor, welcher mit Salzsäure zu digeriren und zuletzt zu kochen, die concentrirten Tincturen bei gelinder Wärme zur Trockensconsistenz abzdampfen und in einer offenen Schale mit einer Glasglocke bedeckt im Keller zum Kry-

---

Annalen der Pharm. XXIX, 319.  
Wiggers selbst XXIX, 173.

stallisiren hinzustellen. Diese Darstellung ist leicht und fast kostenfrei, man vermeidet die Oxydation durch Salpetersäure und der Blutstein liefert ein reines Präparat. Aus gleichen Gründen wurde schon vor zwanzig Jahren von Brandes ein dem Blutstein ähnliches Mineral, ein natürliches Eisenoxydhydrat, der Lepidocrokit vorgeschlagen.

Das auf oben bemerkte Weise erhaltene krystallisirte Eisenchlorid eignet sich zur Darstellung der übrigen Eisenoxydpräparate sehr gut. Zur Darstellung des sublimirten Eisenchlorides wird das Salz zuerst zum Schmelzen erhitzt, wo das Wasser entweicht und bei allmähig verstärkter Hitze sublimirt. Man befördert die Verdichtung des Sublimats durch Ueberstülpen eines kalten hessischen Tiegels, wenn man ein gerades Glas angewendet hat. Bei dieser Methode hat man den Vortheil, daß eine geringere Menge basisches Salz zurückbleibt, als wenn die saure Auflösung unmittelbar zur Trockne eingedampft wird. Ein Theil des Salzes wird jedoch immer zersetzt.

Der *Liquor Ferri muriatici oxydati* der Preuss. Pharmakopöe ist ein sehr unbestimmtes Präparat. Das vorgeschriebene rothe Eisenoxyd enthält gewöhnlich etwas Schwefelsäure; das Präparat enthält viel freie Säure und doch selten die ganze Menge des angewandten Eisenoxydes. Es wird aber in der bestimmtesten Zusammensetzung erhalten, wenn man 2 Th. kryst. wasserhaltiges Eisenchlorid in 1 Th. dest. Wasser auflöst.

Zur Darstellung des *eisenhaltigen Salmiaks* löst man den Salmiak in der geringsten Menge Wasser auf, setzt dann  $\frac{1}{12}$  seines Gewichts des Eisenchlorids hinzu und dampft das Ganze unter Umrühren bei gelinder Wärme zur Trockne ein. Man erhält dann ein Präparat von stets gleicher Farbe und Mischung, während der durch Krystallisation bereitete Eisensalmiak bekanntlich stets eine unbestimmte Menge Eisenchlorid enthält.

Die Zusammensetzung des wasserhaltigen krystallisirten Eisenchlorides ist:

|           |       |        | Versuch |
|-----------|-------|--------|---------|
| Eisen.... | 2 At. | 20,224 | 20,224  |
| Chlor.... | 6 "   | 39,508 | 39,508  |
| Wasser..  | 12 "  | 40,268 | 40,268  |
|           |       | 100    | 100.    |

Es hat also die Formel  $\text{Fe}_2 \text{Cl}_6 + 12 \text{ aq.}$

Das in dem wasserhaltigen Chloride enthaltene Salz hat sonach dieselbe Zusammensetzung, wie das in der

blimirten; es ist mithin ganz überflüssig zu einem pharmaceutischen Zwecke, wobei zugleich Wasser hinzunimmt, das mühsam darzustellende sublimirte Chlorid anzuwenden. 3 Th. des sublimirten sind übrigens gleich 1 Th. des wasserhaltigen krystallisirten Salzes.

## Eisenjodür.

Das Eisenjodür oder einfach Jodeisen ist ein Präparat, was auf noch so verschiedenen Weisen dargestellt werden kann, nicht hält, sondern baldigst zersetzt wird. Es ist dieser Zeitschrift schon mehrmals davon die Rede gewesen \*). Durch den *Syrupus Ferri jodati* ist ein haltbares Präparat verschafft worden. Der Vollständigkeit halber geben wir hier noch einige frühere Beobachtungen von Dr. Apotheker Kerner in Besigheim im Württembergischen nach \*\*). Er schlägt vor, das Präparat jedesmal *empore* zu bereiten. Wenn 3 Gran des Präparats verwendet würden, 2 Gran Jod und 1 Gran Eisenfeile mit etwas Wasser in ein Gläschen zu bringen, dieses dann über der Lampe zu erhitzen, und die Auflösung von dem überschüssigen Eisen abzugießen. In Pillenform das Präparat zu verordnen, ist nicht passend, da es so leicht Feuchtigkeit anzieht. Sollte es in Pillen gegeben werden, so muß man die Auflösung schnell auf dem Wasserbade abkühlen lassen.

Folgende Methode aber führte Kerner zu einem gewünschten Resultate. 1 Th. Jod und 4 Th. Wasser kochen mit  $\frac{1}{2}$  Th. Eisen, das nach und nach zugesetzt wird, erwärmt, filtrirt, auf das Filter noch 2 Th. Wasser gegossen und die Auflösung dann mit 3 Th. Milchzucker auf dem Wasserbade bis zur Pillenconsistenz dampft, hierauf in dünne Platten gedrückt und mit 2 Th. Milchzucker verrieben, so daß auf 1 Th. Arbeit genommenes Jod 5 Th. Zucker kommen, und das Präparat in wohl zu verschließenden Gläsern aufbewahrt.

## Tinctura Ferri acetici aetherea.

Die *Tinctura Ferri acetici aetherea* gehört gewiß zu den besten. Vergl. Wackenroder, Bd. XIX, S. 302. 2. R. und Oberdörffer, Bd. XXII, S. 296. 2. R. dieser Zeitschr. *Annalen der Pharmacie* XXIX, 186.



zu den wirksamsten Eisenpräparaten, und würde sich gewinnen, wenn sie von einem stets gleichen Eisengehalte anzufertigen und von dem, dem Patienten so unangenehmen Ueberschuß an Säure zu befreien würde. Die Schwierigkeit der Bereitung eines in conc. Essig löslichen Eisenoxydes ist bekannt. C. E. Janssen hat viele Versuche angestellt, ein Verfahren zu ermitteln, wonach ein in dieser Säure völlig lösliches Oxyd gewonnen wird \*). Aus seinen vielfachen Versuchen hervor, daß, um ein stets lösliches Eisenoxydhydrat zu erhalten, man vermeiden muß, die Anwendung von Wärme, die Bildung des basischen Eisenchlorids und aus kohlensaurem Alkali und Eisenoxydhydrat bestehenden Doppelsalzes. Die Bildung des ersten wird bestigt durch successiven und nicht genügenden Zusatz eines Fällungsmittels zur Eisenchloridlösung, des letzteren ein umgekehrtes Verfahren (Eintröpfeln der Eisenlösung in die Lösung des Fällungsmittels), oder einen Ueberschuß des Fällungsmittels, wenn nicht doppelt-kohlensaure Alkalien angewendet werden, in welchem Falle das Eisen nicht schadet. Die Anwendung verdünnter Lösungen bringt noch den Uebelstand mit sich, einen so feinstheiligen Niederschlag zu bilden, daß dessen vollständiges Auswaschen schwierig ist, und das sorgfältige Aussüßen ist nöthig, damit die Verunreinigung des Niederschlages mit dem Fällungsmittel möglichst ausgeschlossen ausfalle, um das Verderben der Tinctur zu verhindern. Durch Fällen concentrirter Lösungen nach stoichiometrischen Verhältnissen kann die Einmischung des Fällungsmittels zwar vermindert, doch nicht völlig vermieden werden. Der Niederschlag löst sich aber leicht.

Ein solcher Niederschlag aus einer Eisenchloridlösung, die 100 Gran Eisen enthält, löst sich in 100 Gran concentr. Essig von 1,045 völlig auf, die 47,2 Gran Essigsäure enthalten. Da im neutralen essigsäureisen Oxyde mit 100 Gran Eisen 284,4 Gran Essigsäure verbunden sind, so enthält obige Lösung ein Salz, welches als fünffach-basisch-essigsäureisen Oxyd betrachtet werden kann  $= 5 \text{ Fe}_2 \text{O}_3 + \text{FeCl}_3$ . Dieser *Liq. Ferri acetici* ist fast undurchsichtig gelbrothbraun und schmeckt durchaus nicht sauer.

Zur Darstellung der *Tinct. Ferri acetici aetherea* nun Janssen folgende Vorschrift.

Man löse 4 Unzen Eisen in 16 Unzen Salzsäure

\*) Annal. der Pharm. XXIX, 193.

und leite in die verdünnte Lösung Chlor, bis sie nur Eisenchlorid enthält, worauf sie bis auf 38 Unzen oder 1,320 spec. Gewicht verdampft wird. Zu dieser Auflösung gießt man *auf einmal* eine abgekühlte Lösung von 22 Unzen doppelt-kohlens. Natron (durch Kochen in 35 Unzen Wasser gelöst), schüttelt rasch um, läßt die Gemenge, welches unter starker Kohlensäureentwicklung zu einer bröckelnden Masse gesteht, eine Viertelstunde ruhig stehen, und dann mit kaltem Wasser übergießen. Sollte die Masse sich in Wasser auflösen, was aber nicht der Fall ist, wenn man genau verfährt, so muß man noch etwas doppelt-kohlens. Kali, in kaltem Wasser gelöst, zusetzen, bis sich der Niederschlag abscheidet. Der Niederschlag wird ausgewaschen, bis das Abwaschwasser keinen Chlorgehalt mehr anzeigt, und dann gepresst, bis er 38 Unzen wiegt, worauf man ihn in 9 Unz. concentr. Essig von 1,045 spec. Gew. auflöst. Die Auflösung wird dann zu einem Gewicht von 60 Unz. verdünnt und zeigt nun ein spec. Gewicht von 1,090.

Von der so bereiteten Auflösung werden 9 Th. mit 1 Th. Alkohol und 1 Th. Essigäther vermischt, woraus eine Tinctur von 1,040 spec. Gew. resultirt, die in jeder Unze eine 24 Gran metallischem Eisen entsprechende Menge Eisensalz enthält.

Wollte man nach Vorschrift der Preuss. Pharmacop. das Oxyd pressen, bis es nicht mehr näßt und in Essig so viel davon lösen, als sich lösen will, so würde man von obigem Oxyde eine Tinctur von 1,100 spec. Gew. erhalten, die in der Unze ein 50 Gr. Eisen entsprechendes Quantum Oxyd enthält. Die Preuss. Pharmacopöe giebt nur ein spec. Gew. von 1,020 — 1,030 an. Um eine Tinctur von 1,025 zu erhalten, muß die Lösung des essigs. Eisenoxyds bis zu 73 Unzen verdünnt werden, dann enthält jede Unze eine 20 Gr. Eisen entsprechende Menge Oxyd. Da aber die Dosenbestimmung bei einem Gehalte von 24 Gran Eisen leichter ist, der wahre Eisengehalt bisher schwankend sein mußte, und die nach dieser Vorschrift bereitete Tinctur von 1,025 doch eine von der gewöhnlichen abweichende Menge Eisen enthält, so hat Janssen vorgezogen, bei Bestimmung des Eisengehaltes das spec. Gew. um so viel zu erhöhen.

Nach Liebig erhält man durch Fällen einer concentrirten Lösung von salpetersaurem Eisenoxyd (durch Auflösen von Metall in Salpetersäure von 1,35 spec. Gew.) ein Eisenoxydhydrat, was nach Trocknen und Auswaschen leicht in concentr. Essigsäure sich auflöst, und zur Darstellung der Eisentinctur vorzüglich sich eignet.



## Dritte Abtheilung.

# Allgemeiner Anzeiger.

## I. Anzeiger der Vereinszeitung.

### Notizen aus der Generalcorrespondenz des Directoriums.

Hr. Kreisdirector Wackenroder in Burgdorf: Anmeldung neuer Mitglieder; den Kreis Hildesheim betreffend. — Hr. Vicedirector Dr. Herzog in Braunschweig: Die Generalversammlung in Leipzig und die nächste in Braunschweig betreffend. — Hr. Vicedirector Dr. Bley in Bernburg und Hr. Kreisdirector Rabenhorst in Luckau: Die Versicherung der Apotheken gegen Feuersgefahr betreffend. — Hr. Postmeister Pothmann in Lemgo: Die Portovergünstigung betreffend. — Hr. Kreisdirector Rammstedt in Sondershausen: Die Niederlegung seines Amtes als Kreisdirector. — Hr. Apotheker Lohmeyer in Neisse: Antrag über den Anschluß der Apotheker in Schlesien. — Hr. Assessor Dr. Aschoff in Bielefeld: Die Directorialconferenzen betreffend. — Hr. Vicedirector Bolle in Angermünde: Anmeldung neuer Mitglieder. — Hr. Apotheker Steindorff in Greifenberg dankt für die Glückwünsche zu seinem Jubiläum. — Hr. Vicedirector Dr. Fiedler in Cassel: Benachrichtigung, daß Hr. Apotheker Gumpert in Eschwege für Hrn. Apoth. Fraß das Kreisdirectorium übernehmen wolle. — Hr. Vicedirector Buchholz in Gotha und Dreykorn in Bürgel: Ueber Angelegenheiten ihrer Kreise. — Hr. Hofapotheker Desenais in Potsdam: Ueber den Kreis Berlin.

Dankschreiben für die Ehrenmitgliedschaft des Vereins gingen ein: von Hrn. v. Falkenstein, Königl. Sächs. Regierungsdirector in Leipzig; von Hrn. Dr. Cerutti in Leipzig.

Dankschreiben für Unterstützung gingen ein: von Hrn. Adiger Todt in Mödlich für die dem Hrn. Polnow in Lauenburg ertheilte Unterstützung nebst Anzeige von dem Tode desselben.

Beiträge zum Archiv gingen ein: von den Herren Kreisdirectoren Rohde in Leipzig, Baldenius in Dessau, Häbler in Altenburg, Jonas in Eilenburg; von den Herren Apothekern Geiseler in Königsberg, Cerutti in Camburg, Springmühl in Meissen, Klaucke in Bautzen; von den Herren Vicedirectoren Dr. Bley in Bernburg, Bolle in Angermünde, von Hr. Hofapoth. Dufft in Rudolstadt, von Hrn. Credener in Trier, von Hrn. Dr. Duflos in Breslau, Apotheker Ingenobles in Hocksiel.

## Anzeige.

Wir haben bereits unterm 1. Mai d. J. unsere Absicht mitgetheilt, nach vielfach an uns ergangenen und eigenen Ver-

hen, ein Bildniß unsers hochverdienten Brandes, im Namen des Vereins lithographiren zu lassen, nachdem Brandes, der unsere früheren derartigen Anträge stets ablehnte, den so vielfach ausgesprochenen Wünschen nachgegeben hat, unter der Bestimmung, daß der aus dem Verkauf des Bildnisses sich ergebende Ertrag theils dem Gehülfen-Unterstützungs-Institute, theils dem Capitalfond unsers Vereins zufallen möge.

Wir zeigen nunmehr an, daß die beabsichtigte Lithographie in der Meisterhand Hanfstängl's ausgeführt worden ist, und bitten auch alle Mitglieder des Vereins, die mit der Verpflichtung der Dankbarkeit gegen den hochverdienten Oberdirector unsers Vereins zugleich für die genannten schönen Zwecke wirken wollen, die früher mit dem Archive versandten von ihnen bezogenen Pränumerationslisten ihrem Kreisdirector einzusenden. Die Herren Kreisdirectoren ersuchen wir, diese Verzeichnisse nebst den eingezahlten Geldern (das Exemplar kostet 1 Thlr.)

Dr. E. F. Aschoff in Herford oder an den Rechnungsführer des Vereins, Hrn. Lieutenant Hölzermann in Salzuflen, einzusenden, durch deren Vermittlung sie die bestellten Exemplare erhalten werden.

Erfreulich wird es uns sein, wenn die Mitglieder auch weiter für die Verbreitung dieses Vereinsdenkmals sich bemühen wollen; wir können voraussetzen, daß auch vielen Aerzten und Gehülfen die Theilnahme daran angenehm sein werde.

Für die zahlreichen übrigen Freunde und Verehrer unsers Brandes, die wir ersuchen, für diese Angelegenheit sich zu interessiren, bemerken wir, daß das Bildniß durch jede Kunst- und Buchhandlung von der Hahn'schen Hofbuchhandlung in Hannover zu beziehen ist.

Dr. E. F. Aschoff. Overbeck. Wilken. Dr. Witting.  
Dr. L. Aschoff. Faber.

---

### Gehülfen - Unterstützungs - Angelegenheit.

Unser verehrter Hr. College Müller in Medebach hat beauftragt zum Besten des Gehülfen-Unterstützungs-Instituts, der Buchholz-Gehlen-Trommsd. Stiftung, die Herausgabe eines botanisch-prosodischen Wörterbuchs unternommen. Die erste Lieferung dieses Werks ist jetzt erschienen; Inhalt und Zweck desselben machen es uns zur Pflicht, darauf aufmerksam zu machen, und wünschend und hoffend, daß die menschenfreundliche Absicht Hrn. Collegens Müller reichlich erfüllt werden möge.

Der Vorstand der Buchholz-Gehlen-Trommsdorff'schen Stiftung.

---

### Handelsnotizen.

*Amsterdam, den 5. Oct.* Pfeffer 24 Cs., *Amboina* Nelken 78 Cs., *skatnüsse* 190 Cs., *Mandeln* 47½ fl., *Ingwer* 14 fl., *Piment* 21 fl.

*Bergen, Anfangs Oct.* Brauner Leberthran ist zu 11½ Spec. jetzt gekauft.

*Bremen, den 22. Oct.* Aloes bleibt fortwährend rar und ist

daher aufs Neue gestiegen. Wir geben noch schöne glänzende Waare zum bekannten Preise, so lange der Vorrath reicht. *Ammon. carb. et muriat.* ist sehr schön am Lager. *Amygdalae* sind in diesem Jahre wenig geerntet und daher die Preise neuerdings höher gegangen. *Bals. copaiv. et de Peru* etwas im Preise gewichen. *Cacao* ist selten und deshalb fest. *Campher* durch bedeutende Zufuhren gewichen, scheint jedoch jetzt wieder allmählig höher gehen zu wollen. *Cantharides* sind eben in diesjähriger Waare eingetroffen und äußerst schön! *Caryophalli* und *Cassia* angenehmer, mit Aussichten fernerer Steigerung. *Cathreum* schöne Auswahl. *China et Chinin* ohne besondere Frage, jedoch preishaltend. *Cort. cascarill.* schöne kräftige Waare, eben eingetroffen. *Crocus* hat kaum  $\frac{1}{3}$  der vorigjährigen Ernte geliefert und daher der Preis 3 Thlr. gestiegen. Von *Vegetabilien* haben besonders *Flor. rosar. rubr.* und hochgelbe *Flor. verbas.* sehr schön. *Fol. sennae* hübsche Tripolitaner am Lager, nachdem die wirklich Alexandriner vieles zu wünschen übrig lassen. *Gummata* sämmtlich in schöner Qualität vorhanden, mit Ausnahme von *Elemi*, welches ganz fehlt. *Quecksilber* völlig preishaltend. *Nitrum* in Folge kriegerischer Aussichten ca. 1 Thlr. gestiegen. *Manna* nach den neuesten Berichten gut gerathen, und daher billige Preise zu erwarten. *Moschus* ist in durchsächter Waare noch eine Kleinigkeit vorhanden. *Oleum. olivar.* sehr rar, dagegen Bayonner *Terpentinöl* auf 10 Thlr. gewichen. *Leberthran* in schöner blanker Qualität preiswürdig; wir geben die Tonne à 24 Thlr. *Opium* bleibt gedrückt. Von *Wurzeln* bleibt *Rhei et Jalapae* stets gesucht und von ersterer ist nur die Necowitische als die preiswertheste zu empfehlen. *Sapo sennae* in Folge der hohen Oelpreise auch etwas angenehmer. *Sem. qum.* Levant, ist in äußerst schöner grüner grobkörniger Waare vorräthig. *Licopodium* preishaltend. *Succ. liquirit.* Stempel *Banana* in hübscher Qualität am Lager. *Tartar. depurat.* fortwährend gesucht. *Thereb. comun. au soleil* etwas niedriger. *Vanille* etwas zugeführt, und dadurch dem seitherigen Mangel abgeholfen; jedoch unter 30 — 40 Thlr. noch nichts Gutes zu liefern.

**Calcutta, Aug.** Die Ausfuhr der vorigen Indig-Ernte betrug bis Ende Juli im Ganzen 117,037 Factorei Maunds und 3900 Maunds noch übrig. Wegen der späten Ernte bleibt das diesjährige Resultat gegen das vorige sehr zurück. Die besten Ernten werden liefern: Purneah, Decca, Furreedpoore und Thiruet. Im Gangesdelta wird die frühere Schätzung nicht erreicht. Die Districte von Behar, Baugulpore und Monghyr werden kaum die Hälfte der vorigen Ernte liefern, eben so erwartet man ein bedeutendes Deficit in Jessore, Kishnagur und Burdwan.

**Gallizien.** Die Runkelrübenzucker-Fabrication nimmt fort dauernd zu; es werden jährlich mehrere Fabriken errichtet; der 30 sind in vollem Betriebe. Im ganzen Lande werden jetzt 2 bis 60,000 Ctr. Feinzucker gewonnen.

**Hamburg, den 16. Oct.** Nach *Reis* ist viele Nachfrage.

— den 22. Oct. *Cassia lignea* fortwährend in Begehr. 9 $\frac{1}{2}$  — 10 $\frac{1}{2}$  Thlr.

**Havanna, Aug.** Man hofft auf eine gute Zuckerernte. In den span. Inseln (Cuba und Portorico) steigt der Ertrag, während der vom britt. Westindien abnimmt.



Java, dessen Production. Nach den Angaben des niederl. Colonialministers war die Production Java's 1839 an:

Kaffe....975,000 Ctr.

Zucker...872,000 »

Indigo...676,000 »

Thee..... 68,000 »

Zimmt... 23,000 »

Leipzig, den 15. Oct. Rüböl ist auf 13 Thlr. gestiegen. Leinöl 12 Thlr. Mohnöl 17½ Thlr. Baumöl unverst. 20 Thlr.

— den 22. Oct. Die hohen Rüböl-Preise in Berlin und Stettin haben uns zwar die Hauptfuhrn aus Anhalt entzogen, doch haben sich viele Verkäufer aus der Umgegend, so daß der Preis auf 13 Thlr. unverändert sich erhielt. Leinöl 11½ Thlr. Baumöl unverst. auf 20 Thlr. gestiegen. Rohspiritus ¼ — 1 Thlr. höher.

London, den 9. Oct. In Auction erlangen Trinidad-Cacao 6 d. und mittel 50 sh. bis 55 sh. 6 d. Blauholz ist begehrt. Salpeter bleibt begehrt, 28 sh. — 29 sh. 6 d.

— den 16. Oct. Heute wurden 4000 S. Calcutta-Salpeter in Auction offerirt und fast sämmtlich verkauft, mittel und feine Sorten zu vollen Preisen, ord. Sorten 6 d. wohlfeiler. Die gegebenen Preise von Blauholz haben sich völlig behauptet. Für die übrigen wurden ebenfalls volle Preise erlangt.

Stettin, den 16. Oct. Brauner Berger Leberthran 21 — 21½ Thlr.

## Herbarien - Anzeige.

Bei dem Unterzeichneten sind nach dem natürlichen System geordnete und mit aller Sorgfalt eingelegte Herbaria von wildwachsenden und cultivirten Arzneipflanzen mit ihren Verwechslungen zu haben. Ein solches Herbarium besteht in vier Centurien, auf Verlangen werden jedoch mehr als vier Centurien, je nach vollständige forst- und landwirthschaftliche Herbarien, geliefert.

Jede Centurie kostet 2 Thlr. 18 Ggr. Cour.

J. Vofs,

Universitätsgärtner in Göttingen.

## Dienstgesuche.

Für einen empfehlungswürdigen jungen Pharmaceuten, der sich am Neujahr eintreten kann, sucht Unterzeichneter eine Anwartsstelle.

Fr. Mues, Apotheker in Eslohe, Reg.-Bez. Arnberg.

## Apothekenverkaufe.

Eine Apotheke in einer sächs. Residenzstadt für 36,000 Thlr., einige andere Apotheken in den sächsischen Herzogthümern für 10,000 Thlr., 5000 Thlr., 4500 Thlr., und im Preussischen für 10,000 Thlr., 13,000 Thlr. und 6500 Thlr., und außerdem noch eine Anzahl größerer und kleinerer Apotheken in verschiedenen anderen Gegenden und Ländern, sollen verkauft werden.

Nähere Nachricht hierüber ertheilt

der Apoth. E. Grefslor zu Saalfeld in Thüringen.

## II. Anzeiger der Verlagshandlung.

(Inserate werden mit 1½ Ggr. pro Zeile mit Petitschrift, oder für den Raum derselben, berechnet.)

Auf Veranlassung des Apothekervereins in Norddeutschland ist so eben erschienen und durch jede Kunst- und Buchhandlung von uns zu beziehen:

### **Das wohlgetroffene Bildniss des Herrn Hof- und Medicinalraths Ritters Rudolph Brandes.**

Der Verein hat dasselbe seinem Stifter und Begründer gewidmet, und von der Meisterhand Hanfstängl's lithographiren lassen. Der Ertrag ist für die Wohlthätigkeits-Anstalten des Vereins bestimmt. Preis 1 Thlr.

Hahn'sche Hofbuchhandlung in Hannover.

Hannover, im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung ist eben erschienen:

### **Lehrbuch der Stereometrie und sphärischen Trigonometrie für Gymnasien und höhere Lehranstalten,**

von

**J. C. S. Ludowieg,**

Artill.: Capitain a. D., Oberlehrer der Mathem. u. Physik am Gymn. zu Cottbus.  
Auch unter dem Titel: **Lehrbuch der Elementar-Geometrie und Trigonometrie. Zweiter Theil.** Mit 6 Kupfertafeln. gr. 8. 1840. Preis 2½ Thlr.

Dieser vielfach gewünschte zweite Theil der Elementar-Geometrie ergänzt nunmehr die Lehrbücher des Hrn. Verfassers zu einem vollständigen Cursus der reinen Mathematik. Da dieselben in vielen höhern Lehranstalten benutzt werden, so sind der 1ste Theil und das Lehrbuch der Arithmetik und Algebra bereits in mehreren Auflagen erschienen. Die Herausgabe der Stereometrie wird eine um so willkommener Erscheinung sein, als dadurch jetzt der Unterricht nach derselben Methode in allen denjenigen Zweigen der Wissenschaft gleichmäßig durchgeführt werden kann, welche vorzugsweise den Militair- und polytechnischen Schulen betrieben werden und für die Gymnasien vorgeschrieben sind.

Die Klarheit und Gründlichkeit im Vortrage des Hrn. Verfassers sind hinlänglich bekannt, und seine Lehrbücher bereits durch die günstigen Recensionen und ihren vielseitigen practischen Gebrauch empfohlen. Es bemerken daher nur noch, daß die Einrichtung im obigen Lehrbuche der Stereometrie ganz dieselbe ist, als die im Lehrbuche der ebenen Geometrie, welche so vielen Beifall gefunden hat. Bei der Vollständigkeit und Deutlichkeit des Buches ist es auch ebenfalls zum Selbstunterrichte sehr zweckdienlich.

Die übrigen Lehrbücher des Hrn. Verfassers, welche in demselben Verlage herausgegeben wurden, sind folgende:



- Indowieg, J. C. S., Erster Cursus der reinen Mathematik.** (Zum Gebrauche beim ersten mathematischen Unterrichte.) Mit 70 eingedruckten Figuren. gr. 8.  $1\frac{1}{4}$  Thlr.
- **Lehrbuch der Elementar-Geometrie und Trigonometrie.** Erster Theil: Die ebene Geometrie und Trigonometrie. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 6 Kupfertafeln. gr. 8. 2 Thlr.
- **Lehrbuch der Arithmetik und der Anfangsgründe der Algebra,** für Gymnasien und höhere Lehranstalten. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. gr. 8.  $1\frac{1}{2}$  Thlr.

Hannover. Im Verlage der Pah'n'schen Hofbuchhandlung ist so eben wieder neu erschienen:

**Hülfsbuch beim Unterricht im Kopfrechnen. Erster Theil,** oder: Theoretisch = practische Anleitung zum Kopfrechnen. Zum Selbstunterricht für Jedermann, insbesondere für Lehrer, von Friedr. Krancke, Lehrer am Königl. Schullehrer-Seminar, der Handelsschule u. s. w. Zweite verbesserte und für alle Länder Deutschlands bearbeitete Aufl. gr. 8. 1840.  $1\frac{1}{4}$  Thlr. (Der zweite Theil, oder Exempelbuch zum Kopfrechnen, in zwei Ausgaben, für Preußen und Hannover, kostet  $1\frac{1}{2}$  Thlr.)

Dieses Werk ist sowohl zur Selbstbelehrung als wie vorzüglich zu einem systematischen Unterricht in Seminarien, Real-, Bürger- und Handelsschulen und ähnlichen Instituten bestimmt, und sein ausgezeichnetes Werth bereits rühmlichst anerkannt. Der verdienstvolle Verfasser, dessen treffliche Lehr-Methode längst allgemein bewährt und dessen Schriften in zahlreichen Unterrichts-Anstalten des In- und Auslandes benutzt werden, hat in dieser neuen Auflage nicht nur allenthalben nach noch größerer Deutlichkeit gestrebt, sondern auch mannichche Erweiterungen vorgenommen; wie denn namentlich die kaufmännischen Rechnungen ausführlicher und practischer abgehandelt sind. Der größte Theil der Exempel ist nach den jetzt geltenden Münz-, Maß- und Gewichtsverhältnissen umgearbeitet, und ist dabei auf alle Staaten Deutschlands gleichmäßig Rücksicht genommen.

Der zweite Theil steht mit dem ersten Theile in genauester Verbindung. Er enthält eine practische Methodik des Kopfrechnen-Unterrichts und eine sehr reichhaltige Sammlung mit höchster Sorgfalt geordneter Exempel.

Die übrigen Lehrbücher des Hrn. Verfassers bilden mit dem obigen einen vollständigen Cursus des ganzen Unterrichts im Rechnen:

Krancke, Fr., theoret. practisch. Lehrbuch der bürgerl. u. kaufmänn. Arithmetik in ihrem ganzen Umfange. Mit Berücksichtigung der Münz-, Maß- und Gewichts-Verhältnisse aller deutschen Staaten. Zunächst z. Selbstunterricht, bes. f. Lehrer. Zweite gänzl. umgearb. u. sehr vermehrte Ausgabe, in 3 Theilen. gr. 8. Erster Theil  $1\frac{1}{2}$  Thlr. Zweiter Theil  $2\frac{1}{2}$  Thlr. (Der dritte Theil erscheint im f. J.)

— ausführl. Anleitung zu einem zweckmäß. Unterricht im Rechnen, vorzögl. zum Element.-Unterricht. Ein Hülfsbuch f. Lehrer. gr. 8.  $\frac{2}{3}$  Thlr.

sollte, daß sie dadurch zu eigenem selbstständigen Fortschreiten in Theorie und Praxis befähigt würden.

Zugleich ist die vorwaltende Tendenz dieses Werkes (der außerordentliche Erfolg, dessen es sich schon jetzt, kaum einige Monate seit der Erscheinung desselben vorfindet, erfreut, beweist, wie der Hr. Verfasser das Bedürfnis kannte und traf), den Studirenden die Repetition in der Classe zu erleichtern, ohne deshalb der wissenschaftlichen Betrachter Eintracht zu thun.

Dieses Ziel verfolgend, vermied er absichtlich, den Leser mit einer erdrückenden Last von Einzelheiten zu belasten; statt dessen bemühte er sich, viel generelle Sätze, allgemeine Uebersichten und Regeln zu geben, ähnliche Körper, ähnliche Erscheinungen und Thatsachen möglichst zusammenzufassen, theils um Unterschiede zwischen ähnlichen Erfahrungen zu mehr hervorzuheben, theils um so den Anfänger von selbst allgemeine Sätze und Regeln hinzuleiten.

Nur unter diesen Umständen war es möglich, in dem geringen Raume Vieles zu geben und die Entdeckungen der neueren und neuesten Zeit den bekannten beizufügen.

### C. Oltrogge's deutsches Lesebuch wieder vollständig

Hannover, im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung, eben die Presse verlassen:

## Deutsches Lesebuch für Schule

Dritter Cursus für das reifere Jugendalter.

Von

**Carl Oltrogge.**

Zweite vermehrte Auflage. gr. 8. 1840. 1 Bogen.

Der erste Cursus 4te Auflage, kostet  $\frac{2}{3}$  Rthlr.; der zweite Cursus, 3te Auflage,  $\frac{2}{3}$  Rthlr.; das Lesebuch für Elementar- und niedere Classen ebenfalls  $\frac{2}{3}$  Rthlr.

Der Preis für alle 4 Abtheilungen, 120 $\frac{3}{4}$  Bogen in gr. 8. Druckpapier, beträgt also nur 3 Rthlr.

Dieses reichhaltige deutsche Lesebuch hat wegen der sorgfältigen und umsichtigen Auswahl aller seiner stufenweise fortgeschrittenen Abtheilungen einen so raschen und vielfachen Eingang in die Gymnasien, höheren Bürger-, Real- und Töchter Schulen und in die Instituten des In- und Auslandes gefunden, daß binnen weniger Jahre wiederholte Auflagen der beiden ersten Cursus erforderlich waren und jetzt auch der dritte Cursus wieder neu erschienen ist. Es ist kürzlich durch die neue Abtheilung für Elementar- und niedere Classen mehr dergestalt vervollständigt und abgeschlossen, daß das Werk nicht nur in allen Schul-Classen und für jedes Jugend-Alter benutzt werden kann, sondern auch als ein wahres Familienbuch für alle Stände empfohlen werden kann, da dasselbe eine Auswahl von mehreren hundert Aufsätzen, Auszügen und Gedichten aus den besten deutschen Classikern und Dichtern enthält, der dritte Cursus ganz besonders für Erwachsene geeignet und die Ausstattung des Werks vollständig als der Preis ungemein billig ist.

*Bischoff's merkwürdige Criminal - Rechtsfälle,  
jetzt vollständig.*

---

Hannover. Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung sind so  
erschienen:

**Merkwürdige Criminal: Rechtsfälle**

Richter, Gerichtsärzte, Vertheidiger und Psychologen  
herausgegeben von

**Dr. Bischoff,**

erzogl. Sächs. Justizrath, des Großherz. Hess. Ludwigsbogens Ritter  
erster Classe.

er Band. Nebst alphabet. geordnetem Sachregister über  
sämtliche vier Bände. gr. 8. 1840. 2 Thlr. (Preis des ganzen  
8 9 Thlr.)

Herr Verfasser, als ausgezeichnete Criminalist bereits rühmlichst  
hat jetzt dieses Werk beendigt, welches sich über alle Ver-  
hältnisse erstreckt, die das deutsche gemeine Recht kennt,  
in seiner Vollständigkeit und Reichhaltigkeit nicht nur zunächst für  
Richter, Vertheidiger, Gerichtsärzte und  
sondern auch Psychologen und dem  
reiferen Publikum eine belehrende und höchst anziehende Lec-  
ture bieten muß. Das Ganze umfaßt die bedeutende Zahl von sechzig  
merkwürdigsten Criminal-Rechtsfälle, welche, abge-  
nommen ihrem großen wissenschaftlich-practischen In-  
halt, jedem denkenden und gefühlvollen Leser ein neues  
Feld zum Studium der menschlichen Natur, der  
Leidenschaften, Verbrechen und Verirrungen  
darbieten.

---

In allen Buchhandlungen ist gleich ganz vollständig  
zu haben:

französisch - deutsches und deutsch - französisches  
**Wörterbuch von J. F. Schaffer.**

Heft. 248 Bogen gr. Lex. - Octav. Hannover, in der Hahn'schen  
Buchhandlung. 8½ Thlr., cart. 9½ Thlr.

---

Das kürzlich vollendete umfassende Wörterbuch,  
nicht nur für das ganze Studium der franz. Sprache  
tauglich, sondern auch für das practische Geschäftsleben  
unverzichtbar ist und sich durch seine erschöpfende Reich-  
haltigkeit auch an technischen Erklärungen, durch sorg-  
fältigen und schönen Druck und durch seine verhält-  
nißmäßig außerordentliche Wohlfeilheit bereits viel-  
fach Verbreitung und Anerkennung zu erfreuen hatte,  
wird deshalb allen Lehrern und Lernenden der franz. Sprache,  
Beamten, Militärs, Künstlern, Handel- und Gewerbe-  
leuten jedes Fachs um so mehr empfohlen werden.

**Dr. Volger's Handbücher der Geographie und Geschichte**

Durch alle Buchhandlungen sind jederzeit gleich ganz vollständig zu beziehen :

**Dr. W. F. Volger's Handbuch d. Geographie.**

2 Theile. Vierte stark verm. Auflage. 84 $\frac{1}{2}$  Bog. in gr. 8. 3 $\frac{1}{2}$  Thlr.

**Dessen Handbuch der allgem. Weltgeschichte.**

2 Bde. mit Tabellen u. 9 illum. Karten. 122 Bog. in gr. 8. 6 Thlr.

Das Handbuch der Geographie hat durch seine ganz planmäßige Anlage und immer vollkommeneren Ausführung schon längst einen so allgemeinen Beifall und Eingang gefunden, daß dasselbe, besonders in der letzten vierten Auflage, welcher ein sorgfältiges alphab. Register von 23,000 Namen zugleich die Brauchbarkeit eines Zeitungs-Lexikons zum Nachschlagen verleiht, keiner weiteren Empfehlung bedarf. Nicht minder gelungen ist das, vielfach als Seitenstück dazu gewürdigt und kürzlich ganz vollendete Handbuch der allgem. Weltgeschichte, welches sich durch gleiche Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit und übersichtliche Auszeichnung und durch neun illum. Karten über die wichtigsten Geschichts-Epochen, durch zahlreiche genealogische und chronologische Tabellen, sowie durch ein umfassendes General-Register, eigentliche Vorzüge besitzt, so daß nunmehr die obigen beiden Bde. zugleich für Lehrer schätzbare Commentare zu den weit verbreiteten neueren geogr. und geschichtl. Lehrbüchern des Hrn. Verf. bilden, die wichtigsten Hülfsmittel zum Studium zweier der wichtigsten und angesehensten Zweige der Wissenschaften darbieten.

**Der Braut Tagebuch von Henriette Hanke sch. Arndt**

In unserm Verlage ist so eben erschienen :

**Der Braut Tagebuch.**

Von

**Henriette Hanke,**

geb. Arndt.

gr. 8. 1840. geh. Preis 2 $\frac{1}{2}$  Thlr.

Wie geschätzt und vielgelesen die eben so anziehenden als tüchtigen Schriften der Frau Henriette Hanke und wie vielfach sie zu Fest- und Weihnachtsgeschenken für Damen und für Familien-Bibliotheken gesucht sind, wird dadurch bestätigt, daß theilweise schon neue Auflagen davon erforderlich wurden. Es sind daher aus unserm Verlage jederzeit noch zu beziehen :

**Der Schmuck.** In Briefen. Seitenstück zu den Perlen. 2 Theile. 4 Rthlr. **Die Perlen.** 2 Theile. Zweite Auflage. 2 $\frac{3}{4}$  Rthlr. **Die Schwiegermutter.** 2 Theile. Zweite Auflage. 2 $\frac{1}{2}$  Rthlr. **Die Schwester.** 2 Theile. 3 $\frac{1}{4}$  Rthlr. **Die Schwesterninnen.** 2 Theile. 2 $\frac{5}{6}$  Rthlr. **Die Wittwen.** 2 Theile. 3 $\frac{1}{2}$  Rthlr. **Der Blumenkranz.** 2 Theile. 3 $\frac{1}{6}$  Rthlr.

Hahn'sche Hofbuchhandlung in Hannover



in allen Buchhandlungen ist zu haben:

## **Parson Cultur der Georginen**

(blien.) Nach dem Englischen mit Zuziehung des Herrn  
sgärtner Fischer in Weimar und mehrerer anderer Geor-  
genfreunde bearbeitet von H. Gauß. Mit zwei beigefügten  
Iesen des Herrn A. v. Humboldt und A. de Jussieu. 8.  
 $\frac{1}{2}$  Thlr. oder 54 kr.

Die zahlreichen Freunde der Georginen werden schon aus dem vor-  
en Titel erkennen, wie alles geschehen ist, um den Werth der deut-  
Übersetzung zu erhöhen und durch sie diese interessante Schrift, die  
bei geringerem Gehalt schon in England so vielen Beifall fand,  
ei uns in Deutschland einzubürgern, da es durch sie jedem Garten-  
möglich wird, sich mit geringer Mühe und Kosten die vorzüglich-  
arietäten zu verschaffen, sie gut durchzuwintern u. s. w.

n unserm Verlage ist so eben erschienen und an alle Buchhandlun-  
rsendet:

**und, Dr. W., Wörterbuch der lateinischen  
sprache, nach historisch-genetischen Principien,  
t steter Berücksichtigung der Grammatik, Syn-  
nymik und Alterthumskunde bearbeitet. Nebst  
reren Beilagen linguistischen und archäologischen Inhalts.  
erter Band A. bis Z. gr. Lexikonformat. 1840. 4 Thlr.**

in im Jahre 1836 versuchter Nachdruck dieses Wörterbuches  
ste den Hrn. Dr. Freund, statt der damals schon druckfer-  
zweiten Abtheilung des zweiten Bandes vorerst den vierten  
zugeben. — Die sehr schwierige Zusammenstellung des Materials  
sen Band hat eine Verzögerung zur nothwendigen Folge gehabt,  
n aber die rasche Lieferung der nun noch rückständigen  $1\frac{1}{2}$  Bände  
t um so sicherer versprechen läßt, da der Hr. Verf. zur möglich-  
eschleunigung des Drucks dieser Fortsetzung, seinen Aufenthalt in  
genommen hat, und einzig dem Werke seine Kräfte widmet.

Die Vorzüge und der wissenschaftliche Werth des Freund'schen  
erbuchs, wovon der erste Band und die erste Abtheilung des zweiten  
i, A. bis E. umfassend,  $4\frac{1}{2}$  Thlr. kosten, sind von den competen-  
Beurtheilern vielfach anerkannt, daher das Erscheinen obiger Fort-  
den Besizern jener frühern Bände, wie dem philologischen Publi-  
verhaupt sehr willkommen sein dürfte.

ipzig, den 1. Nov. 1840.

Hahn'sche Verlagsbuchhandlung.

in allen Buchhandlungen ist zu haben:

## **Das Buch der Rosen.**

populäre Monographie für Dichter, Botaniker und  
Gärtner

von

**Ferd. Freiherrn v. Biedensfeld.**

gr. 12. Elegant geh. 2 Thlr. oder 3 fl. 36 kr.

reich ist die Literatur der Franzosen, Engländer und Deutschen an  
und großen Werken von dieser Königin aller Blumen. Es fehlt

weber an gründlichen Schriften für Gelehrte, noch an einzelnen Monographien für botanische Studien, noch an Prachtwerken mit hübschen Abbildungen, deren Preis zuweilen in die Hunderte geht, noch an populären Büchern und Abhandlungen über Cultur, einzelne Species und Varietäten neuer Rosengattungen etc. — Aber dennoch besitzen wir noch kein populäres Buch, welches, Allen verständlich, der Wissenschaft ihr volles Recht wiederfahren läßt und zu wissenschaftl. Studien spornet und leitet, die Praxis der Cultur im Auge behält, die Liebhaber einfach und leicht zur Vermehrung ihrer Sammlungen führt und sie der Gefahr überdies unter anderm Namen theuer etwas Neues zu bezahlen, was sie schon besaßen; welches Vorschriften enthält, aus Rosen so viele angenehme und nützliche Dinge zu bereiten und zugleich in einen Einblick der Geographie, Geschichte, Symbolik und Poesie der Rosenhaltung und erheiternde Belehrung bietet. — Der rühmlichst bekannte Hr. Verfasser hat es versucht, ein solches Buch zu schreiben, es in geringem äußern Umfang über 1500 Varietäten auszudehnen, was bei vieljährigen eigenen Beobachtungen und Studien aus den grössten neuesten Werken Frankreichs und Englands, aus den Mittheilungen berühmter Gärtner und Naturfreunde reiche Quellen flossen.

Wie sehr ihm dieser Versuch gelungen ist, davon zeugen die einstimmig rühmlichen Beurtheilungen, die schon jetzt, wo er in die Presse verlaßen, aus allen kritischen Blättern wiederhallen.

Hannover. Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung eben erschienen:

Ueber die

## Reproduktionskraft der Gewächse insbesondere der Holzpflanzen.

Ein Beitrag zur Pflanzenphysiologie mit Anwendung auf  
Forst- und Landwirthschaft und auf Gartenbau.

Von

**J. A. Wächter,**  
Forstrath.

gr. 8. 1840. geh. Preis 1 Thlr.

*Classisches National-Werk.*

In meinem Verlage erscheint und jede Buchhandlung nimmt Subscription darauf an:

## Flora von Deutschland,

herausgegeben von

**Dr. D. F. S. von Schlechtendal,**

Professor der Botanik an der Universität Halle-Wittenberg.

8° in Lieferungen, jede mit 10 fein colorirten Kupfertafeln und dazu gehörigen Text. Der Subscriptionspreis nur — 8 Ggr. Die erste Lieferung, hört bestimmt mit Ende dieses Jahres auf. Die erste liegt in allen Buchhandlungen zur Ansicht vor. Zwölf Lieferungen bilden einen Band.

Jena.

Verlagshandlung von Fr. Mauke

12. Vereinsjahr der Jussieu's. 1840.

December.

**ARCHIV**  
**DER PHARMACIE,**  
eine Zeitschrift

des

Arznei-Hecker-Vereins in Norddeutschland.

zweite Reihe. Vierundzwanzigsten Bandes drittes Heft.

Erste Abtheilung.

**Vereinszeitung,**  
herausgegeben vom Directorio des Vereins.

**1) Vereinsangelegenheiten.**

Generalconferenz zu Salzuflen am 13. Oct. 1840.

Es wurde ein Schreiben vorgelegt Hochfürstl. Schwarz-  
dolstädtischer Regierung, die wohlwollende Anerkennung  
eines in den Fürstl. Landen betreffend.

Nach Mittheilung der Verhandlungen der Generalversamm-  
lung in Leipzig wurde beschlossen, dem Hrn. Vicedirector Dr.  
Rohde, so wie dem Hrn. Kreisdirector Rohde und den Her-  
ren Bärwinkel, Täschner und Neuber für ihre  
Bemühungen um dieselbe hiermit, im Namen des Ver-  
eins anerkennendsten Dank abzustatten, und eben so den  
Handlungshäusern Brückner, Lampe u. Comp.  
in Leipzig und Gehe u. Comp. in Dresden, die durch die aus-  
gezeichnetsten Droguenausstellungen das Interesse der Versamm-  
lung sehr erhöht hatten.

Ueber den Antrag mehrerer Vereinsmitglieder wird auf die  
Beachtung des §. 40. der Statuten, wonach bei der An-  
nahme eines Lehrlings 2 Thlr. an die Gehülfen-Unterstützungs-  
entrichten sind, aufmerksam gemacht.



4) Es wurde ein Vortrag von Hrn. Hofapotheker Hübner in Altenburg vorgelegt über den unbefugten Verkauf von Arzneimitteln durch Droguisten und Chirurgen. Dieser Vortrag soll demnächst im Archiv bekannt gemacht werden.

Aschoff. Brandes. Overbeck.

---

### Directorialconferenz zu Salzuflen am 3. Nov. 1840.

1) Die bei der Generalversammlung in Leipzig zum Abschluss gebrachte Generalrechnung des Vereins von 1839 soll nunmehr im Archiv durch den Druck bekannt gemacht werden.

2) Die geeigneten Anträge für die Fortbewilligung der Portovergünstigung für die literarischen Sendungen des Vereins im Bereich Königl. Preuss., Königl. Sächs. und Fürstl. Thurn- und Taxisscher Posten wurden berathen und sollen darnach ausgeführt werden.

3) Da Hr. Commissionsrath Rammstedt in Sondershausen wünschte, nach dem Verkauf seiner Apotheke, das bisher von ihm geführte Amt eines Kreisdirectors des dortigen Vereinskreises niederzulegen, da anderweitige Geschäfte ihm die ganze Besorgung dieser Angelegenheit nicht mehr gestatten, so hat das Directorium, wenn auch ungern, diesem Wunsche willfahren müssen, sich aber innig verpflichtet gefühlt, dem Hrn. Collegen Rammstedt für seine 15jährige sorgfältige Anteführung den herzlichsten Dank darzubringen, und ihm mit dem Dankschreiben das Ehrendiplom des Vereins zu übermachen.

4) Hr. Hofapotheker Beneken in Sondershausen ist an die Stelle des Hrn. Rammstedt zum Kreisdirector des dortigen Vereinskreises erwählt worden.

5) Der bisherige Kreis Braunschweig ist in Folge seiner Vergrößerung in zwei Kreise getheilt worden, in den Kreis Braunschweig und in den Kreis Blankenburg. Hr. Apotheker Seiler in Hessen ist zum Kreisdirector des letzten Kreises erwählt worden.

6) Wegen Vergrößerung des Kreises Bernburg ist aus demselben noch ein zweiter Kreis gebildet worden, der Kreis Dessau. Hr. Apotheker Baldenius in Dessau ist zum Kreisdirector dieses neuen Kreises erwählt worden.

7) Mehre verehrte Collegen haben in Bezug der Zeit des Gehülfenwechsels den Antrag gemacht, dass in den Gegenden, wo dafür die Zeit zu Ostern und Michaelis festgesetzt ist, welche auf den 1. April und 1. Oct. allgemein angenommen werden möchte, wie dieses bereits in mehreren andern Gegenden der Fall ist. Das Directorium ist von der Nützlichkeit dieses Vorschlags überzeugt, und bringt denselben hiermit zur allgemeinen Kenntniss, mit dem Wunsche, dass derselbe von allen Collegen angenommen und beachtet werden möchte.

8) Der Hr. Prediger Todt in Mödlich zeigt an, dass er ein valide altersschwache Gehülfe Pollnow in Lenzten gefunden sei, und stattet zugleich seinen Dank ab für die langjährige Unterstützung, die demselben von dem Unterstützungscomitee geworden sei. Dankbar hatte der Verstorbene immer die Unterstützung gedacht, die so sehr seine traurige Lage gemildert



ank, den Segen des Gestorbenen bringen wir allen hier-  
r, die unsere wohlthätige Stiftung förderten.

A. Brandes. E. F. Aschoff. Overbeck.  
Dr. L. Aschoff.

---

### richt an die Herren Mitglieder des Kreises Bernburg.

Folge der Vergrößerung dieses Kreises war schon frü-  
e Theilung desselben in zwei Kreise beantragt worden.  
st nunmehr durch Hrn. Vicedirector Dr. Bley bewerk-  
, der Kreis Bernburg vom Jahr 1841 an in die Kreise  
rg und Dessau eingetheilt worden und Hr. Apotheker  
nius ist für den Kreis Dessau zum Kreisdirector erwählt.  
Die Mitglieder dieses neuen Kreises sind: Hr. Apoth.  
nius, Hr. Medicinalassessor Funcke, Hr. Apoth. Reich-  
und Hr. Apoth. Reifsnier in Dessau, Hr. Apoth. Porse in  
, Hr. Apoth. Kahleis in Radegard, Hr. Apoth. Rehfeld  
nitz, Hr. Apoth. Stippius in Zörbig, Hr. Apoth. Röbel  
. Apoth. Teufslers in Zerbst, Hr. Apoth. Leidold, Hr.  
Kopsel und Hr. Apoth. Kettler in Köthen.  
ersuchen diese verehrten Herren Collegen, in allen Ver-  
elegenheiten an Hrn. Kreisdirector Baldenius in Dessau  
wenden.

---

### richt an die Herren Mitglieder des Kreises Braunschweig.

in Folge der Vergrößerung des Kreises Braunschweig  
eilung desselben in zwei Kreise im Interesse der Mit-  
gefunden wurde, und diese durch Hrn. Vicedirector Dr.  
g nunmehr bewerkstelligt worden ist, so zeigen wir  
an, daß der bisherige Kreis Braunschweig von 1841 an  
Kreise Braunschweig und Blankenburg getheilt, und für  
Kreis Hr. Apoth. Seiler in Hessen zum Kreisdirector  
worden ist. Die Mitglieder dieses Kreises sind: Hr.  
eiler in Hessen, Hr. Dr. Lichtenstein in Helmstädt,  
th. Hampe in Blankenburg, Hr. Apoth. Ballenstädt  
gerode, Hr. Apoth. Märtens in Zorge, Hr. Apoth. Cor-  
in Schöppenstedt, Hr. Apoth. Müller in Schöningen,  
th. Krukenberg in Königslutter, Hr. Apoth. Dan-  
n in Fallersleben, Hr. Apoth. Böwing in Vorsfelde,  
th. Senf in Oebisfelde, Hr. Apoth. Schultz in Calvörde.  
ersuchen die verehrten Herren Collegen, in allen Ver-  
legenheiten an Hrn. Kreisdirector Seiler in Hessen  
wenden.

---

### richt für die Herren Mitglieder des Kreises Sondershausen.

er hochverehrter Hr. College Rammstedt, welcher 15  
ang das Amt eines Kreisdirectors des Vereins für den

Kreis Sondershausen verwaltete, hat nach dem Verkauf seiner Apotheke dieses Amt niedergelegt. Das Directorium fühlt sich verpflichtet, dem Hrn. Collegen Rammstedt für die große Sorgfalt und Thätigkeit, womit er dieses Amt verwaltete, im Namen des Vereins hiermit den aufrichtigsten Dank abzustatten.

Hr. Hofapotheker Beneken in Sondershausen ist darauf zum Kreisdirector wieder erwählt worden, und wir zeigen dieses den verehrten Mitgliedern dieses Kreises hiermit an, mit der Bitte, in allen Vereinsangelegenheiten an Hrn. Kreisdirector Beneken sich zu wenden, dessen Amtsführung mit dem nächsten Jahre beginnt.

### Eintritt neuer Mitglieder.

Hr. Apoth. Lohmann in Rendsburg in Holstein ist als wirkliches Mitglied dem Vereine zugetreten.

Hr. Apoth. Stafs in Bärwalde ist, nach Anmeldung durch Hrn. Kreisdirector Dr. Geiseler, als wirkliches Mitglied des Vereins in den Kreis Königsberg (Neumark) aufgenommen worden.

Desgl. Hr. Apoth. Hayder in Alt-Landsberg und Hr. Apoth. Roth in Wernichen, nach Anmeldung durch Hrn. Vicedirector Bolle, in den Kreis Angermünde.

### Aufforderung, die Einzahlung der Beiträge zur Generalkasse für 1841 betreffend.

Die Herren Mitglieder des Vereins werden ersucht, den Jahresbeitrag zur Generalkasse für 1841 ihren resp. Kreisd. baldigst einzusenden. Nach §. 38. der Statuten muß dieses vor dem 15. in jedes Jahrs geschehen. Der Beitrag beträgt bekanntlich 1 Tl. 16 Ggr. In dem Bereich derjenigen Postanstalten, wo der Verein besonderer Portovergünstigungen gegen eine Aversionabgabe sich erfreut, zahlt jedes Mitglied außerdem noch 12 Ggr. als Beitrag zur Aufbringung dieser Summe, also im Ganzen 1 Tl. 4 Ggr. Die Ordnung des Rechnungswesens, wie des ganzen Vereinshaushalts nöthigt mich, um die rechtzeitige Einsendung dieser Beiträge dringend zu bitten.

Die Direction der Generalkasse  
Dr. E. F. Aschoff.

### Die Antrittszeit der Apothekergehülfen betreffend.

Da es noch nicht überall gebräuchlich ist, daß die Gehülfen bei der Uebnahme einer Stelle, mit dem 1. April oder 1. Juli in das Geschäft eintreten, so bin ich von vielen Seiten aufgefordert, dieses in unserer Vereinszeitung zur Sprache zu bringen. Ich ersuche daher sämtliche verehrte Mitglieder des deutschen Apothekervereins, so wie alle die übrigen Herr Apotheker, welche dieses lesen, für die Einhaltung der erwähnten Termine möglichst Sorge zu tragen, da in Ermangelung einer allgemeinen Observanz, besonders wegen des beweglichen Geschäftsfestes, häufig unangenehme Collisionen entstehen. Dies kann aber nur in Nothfällen gebräuchlichen Antrittsterminen, nämlich der 1. Januar und 1. Juli, bedürfen wohl kaum einer Erwähnung.

Dr. C. Herzog.

**General-Rechnung**

des

**Apothekervereins in Norddeutschland**

vom Jahre 1839.

**Einnahme.**

Aus den Kreisen, welche unter der unmittelbaren  
Leitung des Directoriums stehen.

| <i>A. Kreis Minden.</i>                       |    | Beiträge. |   |
|-----------------------------------------------|----|-----------|---|
|                                               |    | ₰         | ℥ |
| Von den Herren:                               |    |           |   |
| C. Wilken, Director, Ap. in Minden . . . . .  | 5  | 12        |   |
| Faber, Assessor, Ap. das. . . . .             | 5  | 12        |   |
| Westenberg, Ap. das. . . . .                  | 5  | 12        |   |
| Lampe, Ap. in Lübbecke . . . . .              | 5  | 12        |   |
| Meyer, Ap. in Levern . . . . .                | 5  | 12        |   |
| Venghaus, Ap. in Rahden . . . . .             | 5  | 12        |   |
| Höcker, Medicinal-Assessor in Bückeburg. . .  | 5  | 4         |   |
| Summa . .                                     | 39 | 4         |   |
| <i>B. Kreis Herford.</i>                      |    |           |   |
| Von den Herren:                               |    |           |   |
| Dr. E. F. Aschoff, Dir., Ap. in Herford . . . | 5  | 12        |   |
| Höpcker, Ap. das. . . . .                     | 5  | 12        |   |
| Röttcher, Ap. in Wiedenbrück . . . . .        | 5  | 12        |   |
| Schaeffer, Ap. in Halle b. B. . . . .         | 5  | 12        |   |
| Neuper, Ap. in Enger . . . . .                | 5  | 12        |   |
| Lickfeld, Ap. das. . . . .                    | 5  | 12        |   |
| Groneweg, Ap. in Gütersloh. . . . .           | 5  | 12        |   |
| Witter, Ap. in Werther. . . . .               | 5  | 12        |   |
| Delius, Ap. in Versmold . . . . .             | 5  | 12        |   |
| Steif, Ap. in Rehda . . . . .                 | 5  | 12        |   |
| Biermann, Ap. in Bünde. . . . .               | 5  | 12        |   |
| L. Aschoff, Assessor, Ap. in Bielefeld. . . . | 5  | 12        |   |
| Lickfeld, Ap. in Schildesche. . . . .         | 5  | 12        |   |
| Summa . .                                     | 71 | 12        |   |
| <i>C. Kreis Paderborn.</i>                    |    |           |   |
| Von den Herren:                               |    |           |   |
| E. Müller, Kreisdirector, Ap. in Driburg . .  | 5  | 12        |   |
| Rotgeri, Ap. in Rittberg. . . . .             | 5  | 12        |   |
| Beckers, Ap. in Delbrück . . . . .            | 5  | 12        |   |
| Cramer, Ap. in Paderborn . . . . .            | 5  | 12        |   |
| Latus . .                                     | 22 | —         |   |

| Nr | Ferner :                                    | B.                       |
|----|---------------------------------------------|--------------------------|
|    |                                             | <i>Transport</i> . . . 2 |
| 5  | Giese, Ap. in Paderborn . . . . .           |                          |
| 6  | Hoening, Ap. das. . . . .                   |                          |
| 7  | Jehn, Ap. in Gesecke . . . . .              |                          |
| 8  | Eskens, Ap. in Nieheim . . . . .            |                          |
| 9  | Uffeln, Ap. in Warburg . . . . .            |                          |
| 10 | Quicken, Ap. in Bueren . . . . .            |                          |
| 11 | Friedhoff, Ap. in Fürstenberg . . . . .     |                          |
| 12 | Dr. Witting, Director, in Höxter . . . . .  |                          |
|    |                                             | <hr/> <i>Summa</i> . . . |
|    | <i>D. Kreis Brandenburg.</i>                |                          |
|    | Von den Herren :                            |                          |
| 1  | Deseniss, Hofap. in Potsdam . . . . .       |                          |
| 2  | Schneider, Hofap. das. . . . .              |                          |
| 3  | Rengel, Hofap. das. . . . .                 |                          |
| 4  | Schorlemmer, Hofap. das. . . . .            |                          |
| 5  | Legeler, Ap. in Rathenow . . . . .          |                          |
| 6  | Bumcke, Ap. in Brandenburg . . . . .        |                          |
|    | Geiseler, Kreisdir., s. Kreis Burg.         |                          |
|    |                                             | <hr/> <i>Summa</i> . . . |
|    | <i>E. Kreis Burg.</i>                       |                          |
|    | Von den Herren :                            |                          |
| 1  | Reich, Kreisdir., Ap. in Burg b. Magdeburg. |                          |
| 2  | Geiseler, Ap. in Brandenburg . . . . .      |                          |
| 3  | Leddihn, Ap. in Burg . . . . .              |                          |
| 4  | Neumann, Ap. in Ziesar . . . . .            |                          |
| 5  | Schröder, Ap. in Neuhaldensleben . . . . .  |                          |
| 6  | Köcher, Ap. in Jerichow . . . . .           |                          |
| 7  | Schnabel, Ap. in Genthin . . . . .          |                          |
| 8  | Völker, Ap. in Brandenburg . . . . .        |                          |
| 9  | Schulz, Ap. in Gommern . . . . .            |                          |
| 10 | Severin, Ap. in Möckern . . . . .           |                          |
| 11 | Jachmann, Ap. in Erxleben . . . . .         |                          |
| 12 | Voigt, Ap. in Wollmirstädt. . . . .         |                          |
| 13 | Hornemann, Ap. in Loburg . . . . .          |                          |
|    |                                             | <hr/> <i>Summa</i> . . . |
|    | <i>F. Kreis Eilenburg.</i>                  |                          |
|    | Von den Herren :                            |                          |
| 1  | Jonas, Kreisd., Ap. in Eilenburg . . . . .  |                          |
| 2  | Pfotenhauer, Ap. in Delitzsch . . . . .     |                          |
| 3  | Freyberg, Ap. das. . . . .                  |                          |
| 4  | Schulze, Ap. das. . . . .                   |                          |
| 5  | Haberkorn, Ap. in Landsberg . . . . .       |                          |
|    |                                             | <hr/> <i>Latus</i> . . . |



## Ferner :

## Beiträge.

₤    ₧

|                                           |                  |    |    |
|-------------------------------------------|------------------|----|----|
|                                           | <i>Transport</i> | 27 | 12 |
| Kühne, Ap. in Brehna . . . . .            | 5                | 12 |    |
| Atenstädt, Ap. in Bitterfeld . . . . .    | 5                | 12 |    |
| Licht, Ap. in Gräfenhainchen . . . . .    | 5                | 12 |    |
| Krause, Ap. in Oranienbaum . . . . .      | 5                | 12 |    |
| Richter, Ap. in Wittenberg . . . . .      | 5                | 12 |    |
| Lange, Ap. in Dömitzsch . . . . .         | 5                | 12 |    |
| Knibbe, Ap. in Torgau . . . . .           | 5                | 12 |    |
| Holst, Ap. in Taucha in Sachsen . . . . . | 5                | 4  |    |
| Lichtenberg, Ap. in Anneburg . . . . .    | 5                | 12 |    |
| Weller, Ap. in Elsterwerda . . . . .      | 5                | 12 |    |
| Koecher, Ap. in Düben . . . . .           | 5                | 12 |    |
| Lindler, Ap. in Belgern . . . . .         | 5                | 12 |    |
| Krause, Ap. in Schilda . . . . .          | 5                | 12 |    |
|                                           | <i>Summa</i>     | 98 | 16 |
| Für verkaufte Journale . . . . .          | 2                | —  |    |

## G. Kreis Lissa.

Von den Herren:

|                                                |              |    |   |
|------------------------------------------------|--------------|----|---|
| Lipowitz, Kreisdirekt., Ap. in Lissa . . . . . | 5            | 12 |   |
| Stiller, Ap. das. . . . .                      | 5            | 12 |   |
| Akermann, Ap. in Krostoschin . . . . .         | 5            | 12 |   |
| Krüger, Ap. in Stenschowa . . . . .            | 5            | 12 |   |
| Beckmann, Ap. in Justroschin . . . . .         | 5            | 12 |   |
| Richter, Ap. in Tinne . . . . .                | 5            | 12 |   |
| Nöhrig, Ap. in Zirke . . . . .                 | 5            | 12 |   |
| Ohlert, Ap. in Miloikowo . . . . .             | 5            | 12 |   |
| Wocke, Ap. in Rawitsch . . . . .               | 5            | 12 |   |
| Musenbergr, Ap. in Ostrowo . . . . .           | 5            | 12 |   |
|                                                | <i>Summa</i> | 55 | — |

## H. Kreis Mansfeld.

Von den Herren:

|                                                 |              |    |    |
|-------------------------------------------------|--------------|----|----|
| Giseke, Kreisdirekt., Ap. in Eisleben . . . . . | 5            | 12 |    |
| Hahn, Ap. in Merseburg . . . . .                | 5            | 12 |    |
| Marche, Ap. das. . . . .                        | 5            | 12 |    |
| Benemann, Ap. das. . . . .                      | 5            | 12 |    |
| Struve, Ap. in Schraplau . . . . .              | 5            | 12 |    |
| Haesler, Ap. in Eisleben . . . . .              | 5            | 12 |    |
| Müller, Ap. in Mansfeld . . . . .               | 5            | 12 |    |
| Bente, Ap. in Hettstädt . . . . .               | 5            | 12 |    |
| Krüger, Ap. in Aschersleben . . . . .           | 5            | 12 |    |
| Hornung, Ap. das. . . . .                       | 5            | 12 |    |
| Wachsmuth, Ap. in Ermsleben . . . . .           | 5            | 12 |    |
| Blankenburg, Ap. in Sandersleben . . . . .      | 5            | 12 |    |
| Weber, Ap. in Alsleben . . . . .                | 5            | 12 |    |
|                                                 | <i>Latus</i> | 71 | 12 |

|    |    |
|----|----|
| 5  | 12 |
| 5  | 12 |
| 71 | 12 |

| Nr | Ferner :                                    | Beiträ |
|----|---------------------------------------------|--------|
|    |                                             | 4      |
|    | <i>Transport</i> . . .                      | 71     |
| 14 | Drechsler, Ap. in Sangerhausen . . . . .    | 5      |
| 15 | Kypke, Ap. in Querfurt . . . . .            | 5      |
| 16 | Hecker, Ap. in Nebra . . . . .              | 5      |
| 17 | Kühne, Ap. in Schaafstädt . . . . .         | 5      |
| 18 | Fischer, Ap. in Lauchstädt. . . . .         | 5      |
|    | <i>Summa</i> . . .                          | 99     |
|    | <i>I. Kreis Stendal.</i>                    |        |
|    | Von den Herren :                            |        |
| 1  | L. Treu, Kreisd., Ap. in Stendal. . . . .   | 5      |
| 2  | Jahn, Ap. das. . . . .                      | 5      |
| 3  | Thiele, Ap. in Arneburg . . . . .           | 5      |
| 4  | Bracht, Ap. in Osterburg . . . . .          | 5      |
| 5  | Riemann, Ap. in Gardelegen. . . . .         | 5      |
| 6  | Lohse, Ap. das. . . . .                     | 5      |
| 7  | Büttner, Ap. in Salzwedel . . . . .         | 5      |
| 8  | Voigt, Ap. das. . . . .                     | 5      |
| 9  | Woltersdorf, Ap. in Arendsee. . . . .       | 5      |
| 10 | Piccard, Ap. in Kloetze . . . . .           | 5      |
| 11 | Fieth, Ap. in Disdorf . . . . .             | 5      |
| 12 | Mandenbergl, Ap. in Seehausen . . . . .     | 5      |
|    | <i>Summa</i> . . .                          | 60     |
|    | <i>K. Kreis Hannover.</i>                   |        |
|    | Von den Herren :                            |        |
| 1  | Wackenroder, Kreisd., Ap. in Burgdorf . . . | 5      |
| 2  | Stein, Ap. in Grohnde . . . . .             | 5      |
| 3  | Jaencke, Ap. in Eldagsen. . . . .           | 5      |
| 4  | Gruner, Oberbergcommissair in Hannover. .   | 5      |
| 5  | Wendland, Feldapoth. das. . . . .           | 5      |
| 6  | Friesland, Ap. das. . . . .                 | 5      |
| 7  | Grünhagen, Ap. in Salzhemmendorf . . .      | 5      |
| 8  | Goesche, Ap. in Bokenem . . . . .           | 5      |
| 9  | Demong, Ap. in Sarstädt. . . . .            | 5      |
| 10 | Stieren, Ap. in Salzdelfurth . . . . .      | 5      |
| 11 | Retschy, Ap. in Ilten . . . . .             | 5      |
| 12 | Stümbke, Ap. in Grofs-Burgwedel. . . . .    | 5      |
|    | <i>Summa</i> . . .                          | 60     |
|    | <i>L. Kreis Eimbeck.</i>                    |        |
|    | Von den Herren :                            |        |
| 1  | Bolstorff, Kreisd., Ap. in Eimbeck. . . . . | 5      |
| 2  | Helmkamp, Ap. in Grund . . . . .            | 5      |
| 3  | Weppen, Ap. in Markoldendorf. . . . .       | 5      |
| 4  | Sievers, Ap. in Salzgitter . . . . .        | 5      |
|    | <i>Latut</i> . . .                          | 20     |



| <i>Ferner:</i>                                   | <i>Beiträge.</i> |          |
|--------------------------------------------------|------------------|----------|
|                                                  | <i>₰</i>         | <i>ℳ</i> |
| <i>Transport . .</i>                             | 20               | 16       |
| Fabian, Ap. in Adelepsen . . . . .               | 5                | 4        |
| Gottschalk, Ap. in Zellerfeld . . . . .          | 5                | 4        |
| Lachwitz, Ap. in Herzberg . . . . .              | 5                | 4        |
| Lüders, Ap. in Alfeld . . . . .                  | 5                | 4        |
| Stahl, Ap. das. . . . .                          | 5                | 4        |
| Meier, Ap. in Moringen . . . . .                 | 5                | 4        |
| Dreves, Ap. in Uslar . . . . .                   | 5                | 4        |
| <i>Summa . .</i>                                 | 56               | 20       |
| <i>M. Kreis Lüneburg.</i>                        |                  |          |
| <i>Von den Herren:</i>                           |                  |          |
| Dr. DuMénil, Hofr., Dir. d. V., Ap. in Wunstorf. | 5                | 4        |
| Gebler, Ap. in Walsrode . . . . .                | 5                | 4        |
| Schaper, Ap. in Soltau . . . . .                 | 5                | 4        |
| Mühlenfeld, Ap. in Hoya . . . . .                | 5                | 4        |
| Sandhagen, Ap. in Lüchow . . . . .               | 5                | 4        |
| Oldenburg, Ap. in Nienburg . . . . .             | 5                | 4        |
| Baumgard, Ap. in Rodewald . . . . .              | 5                | 4        |
| Behre, Ap. in Stolzenau . . . . .                | 5                | 4        |
| Dempwolf, Ap. in Danneberg . . . . .             | 5                | 4        |
| Bode, Ap. in Uelzen . . . . .                    | 5                | 4        |
| Karberg, Ap. in Wittingen . . . . .              | 5                | 4        |
| Braunwald, Ap. in Domitz . . . . .               | 5                | 4        |
| <i>Summa . .</i>                                 | 62               | —        |
| <i>N. Kreis Osnabrück.</i>                       |                  |          |
| <i>Von den Herren:</i>                           |                  |          |
| Upmann, Kreisdir., Administr. in Neuenkirchen    | 5                | 4        |
| Becker, Ap. in Essen . . . . .                   | 5                | 4        |
| Claar, Ap. in Schüttorf . . . . .                | 5                | 4        |
| Drees, Ap. in Bentheim . . . . .                 | 5                | 4        |
| Firnhaber, Ap. in Nordhorn . . . . .             | 5                | 4        |
| Kemper, Ap. in Osnabrück . . . . .               | 5                | 4        |
| Meyer, Ap. das. . . . .                          | 5                | 4        |
| König, Ap. in Steinfurt . . . . .                | 5                | 4        |
| Krebs, Ap. in Melle . . . . .                    | 5                | 4        |
| Kerkhoff, Ap. in Meppen . . . . .                | 5                | 4        |
| Mühe, Ap. in Eitorf . . . . .                    | 5                | 4        |
| Müller, Ap. in Lingen . . . . .                  | 5                | 4        |
| Nettelhorst, Ap. in Iburg . . . . .              | 5                | 4        |
| Rump, Ap. in Fürstenau . . . . .                 | 5                | 4        |
| Sickmann, Ap. in Bramsche . . . . .              | 5                | 4        |
| Schluiter, Ap. in Westercappeln . . . . .        | 5                | 12       |
| Stein, Ap. in Riemsloh . . . . .                 | 5                | 4        |
| Trautmann, Ap. in Sögel . . . . .                | 5                | 4        |
| Weber, Ap. in Neuhaus . . . . .                  | 5                | 4        |
| <i>Summa . .</i>                                 | 98               | 12       |

| Nr              | O. Kreis Ostfriesland.                             | Beiträge |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------|
| Von den Herren: |                                                    |          |
| 1               | v. Senden, Kreisdir., Ap. in Emden . . . . .       | 5        |
| 2               | Helmts, Ap. das. . . . .                           | 5        |
| 3               | Plagge, Ap. in Aurich . . . . .                    | 5        |
| 4               | Schuirmann, Ap. das. . . . .                       | 5        |
| 5               | Springmann, Ap. in Leer . . . . .                  | 5        |
| 6               | Schmidt, Ap. das. . . . .                          | 5        |
| 7               | Hoyer, Ap. das. . . . .                            | 5        |
| 8               | Boerner, Ap. das. . . . .                          | 5        |
| 9               | Mein, Ap. in Neustadt-Goedens . . . . .            | 5        |
| 10              | Dirksen, Ap. in Gretsiehl . . . . .                | 5        |
| 11              | Kittel, Ap. in Dornum . . . . .                    | 5        |
| 12              | Leiner, Ap. in Deteren . . . . .                   | 5        |
| 13              | Kümmel, Ap. in Weener . . . . .                    | 5        |
| 14              | Antoni, Ap. das. . . . .                           | 5        |
| 15              | Krimping, Ap. in Esens . . . . .                   | 5        |
| 16              | Heydeck, Ap. in Oldersum . . . . .                 | 5        |
| Summa . .       |                                                    | 81       |
| P. Kreis Stade. |                                                    |          |
| Von den Herren: |                                                    |          |
| 1               | Kerstens, Kreisdir., Ap. in Stade . . . . .        | 5        |
| 2               | Versmann, Wittwe, Ap. das. . . . .                 | 5        |
| 3               | Hartung, Ap. in Horneburg . . . . .                | 5        |
| 4               | Remien, Ap. in Drochtersen . . . . .               | 5        |
| 5               | Mühlenhoff, Ap. in Oberndorf . . . . .             | 5        |
| 6               | Ruge, Ap. in Neuhaus . . . . .                     | 5        |
| 7               | Wuth, Ap. in Otterndorf . . . . .                  | 5        |
| 8               | Voss, Ap. in Ritzebüttel . . . . .                 | 5        |
| 9               | Hasselbach, Ap. in Dornum . . . . .                | 5        |
| 10              | Meyer, Ap. in Bederkesa . . . . .                  | 5        |
| 11              | Büttner, Ap. in Bremerhafen . . . . .              | 5        |
| 12              | Wonneberg, Ap. in Hagen . . . . .                  | 5        |
| 13              | Heyn, Ap. in Scharnbeck . . . . .                  | 5        |
| 14              | v. Pöllnitz, Ap. in Thedinghausen . . . . .        | 5        |
| 15              | Dr. Müller, Ap. in Ottersberg . . . . .            | 5        |
| 16              | Wattenberg, Ap. in Rotenburg . . . . .             | 5        |
| 17              | Dreves, Ap. in Zeven . . . . .                     | 5        |
| 18              | Gerds, Ap. in Freiburg . . . . .                   | 5        |
| Summa . .       |                                                    | 96       |
| Q. Kreis Lippe. |                                                    |          |
| Von den Herren: |                                                    |          |
| 1               | Overbeck, Director d. V., Ap. in Lemgo . .         | 5        |
| 2               | Dr. Brandes, Med.-R., Oberdir. d. V., in Salzuflen | 5        |
| 3               | Reinhold, Ap. in Barntrup . . . . .                | 5        |
| Latus . . .     |                                                    | 16       |

| Ferner:                                                 | Beiträge. |    |
|---------------------------------------------------------|-----------|----|
|                                                         | ₰         | ℳ  |
| <i>Transport . .</i>                                    | 16        | 4  |
| Koch, Ap. in Blomberg . . . . .                         | 5         | 4  |
| Wachsmuth, Ap. in Schwalenberg . . . . .                | 5         | 4  |
| Melm, Ap. in Oerlinghausen. . . . .                     | 5         | 4  |
| Hoyer, Ap. in Rinteln . . . . .                         | 5         | 4  |
| Arkularius, Ap. in Horn . . . . .                       | 5         | 4  |
| Uhder, Ap. in Detmold . . . . .                         | 5         | 4  |
| Beissenhirtz, Ap. in Lage . . . . .                     | 5         | 4  |
| Krüger, Medicinalrath in Pyrmont. . . . .               | 5         | 12 |
| Becker, Ap. in Varenholz . . . . .                      | 5         | 4  |
| <i>Summa . .</i>                                        | 63        | —  |
| <i>R. Kreis Jena.</i>                                   |           |    |
| Von den Herren:                                         |           |    |
| Dreykorn, Kreisd., Ap. in Neustadt a. d. Orla . . . . . | 5         | 4  |
| Hecker, Ap. in Berga . . . . .                          | 5         | 4  |
| Weibezahl, Hofap. in Eisenberg . . . . .                | 5         | 4  |
| Kober, Ap. in Triptis . . . . .                         | 5         | 4  |
| Pazschke, Ap. in Auma . . . . .                         | 5         | 4  |
| Koenig, Ap. in Cahla . . . . .                          | 5         | 4  |
| Schumann, Ap. in Poesneck . . . . .                     | 5         | 4  |
| Knauer, Hofap. in Weimar . . . . .                      | 5         | 4  |
| Loewel, Ap. in Rode . . . . .                           | 5         | 4  |
| Schröder, Ap. in Gera . . . . .                         | 5         | 4  |
| Herbrich, Ap. Ebersdorf . . . . .                       | 5         | 4  |
| Wolle, Ap. in Lobenstein . . . . .                      | 5         | 4  |
| Osann, Hofapoth. in Jena . . . . .                      | 5         | 4  |
| Cerutti, Ap. in Camburg . . . . .                       | 5         | 4  |
| Dachner, Ap. in Weida . . . . .                         | 5         | 4  |
| Geist, Ap. in Münchenbernsdorf . . . . .                | 5         | 4  |
| Fritsche, Ap. in Poesneck . . . . .                     | 5         | 4  |
| Prätorius, Ap. in Neustadt . . . . .                    | 5         | 4  |
| Berner, Ap. in Schleitz . . . . .                       | 5         | 4  |
| Schröter, Ap. in Cahla . . . . .                        | 5         | 4  |
| <i>Summa . .</i>                                        | 103       | 8  |
| <i>S. Kreis Saalfeld.</i>                               |           |    |
| Von den Herren:                                         |           |    |
| Grefslor, Kreisd., Ap. in Saalfeld . . . . .            | 5         | 4  |
| Knabe, Ap. das. . . . .                                 | 5         | 4  |
| Sandarack, Ap. das. . . . .                             | 5         | 4  |
| Dufft, Hofapoth. in Rudolstadt . . . . .                | 5         | 4  |
| Köppen, Ap. das. . . . .                                | 5         | 4  |
| Gallner, Ap. in Kranichfeld . . . . .                   | 5         | 4  |
| Bischoff, Ap. in Stadtilm . . . . .                     | 5         | 4  |
| Jahn, Ap. in Königssee . . . . .                        | 5         | 4  |
| <i>Latus . .</i>                                        | 41        | 8  |

| Nr                         | Ferner:                                               | Beiträge |    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----|
|                            |                                                       | fl       | kr |
|                            | Transport . . . . .                                   | 41       | 9  |
| 9                          | Meurer, Ap. das. in Königssee . . . . .               | 5        | 4  |
| 10                         | Sattler, Ap. in Blankenburg . . . . .                 | 5        | 4  |
| 11                         | Brand, Ap. in Gräfenenthal . . . . .                  | 5        | 4  |
| 12                         | Baeumler, Ap. in Schleitz . . . . .                   | 5        | 4  |
| 13                         | Springmühl, Ap. in Hildburghausen . . . . .           | 5        | 4  |
| 14                         | Lützelberger, Ap. in Hildburghausen . . . . .         | 5        | 4  |
|                            | Summa . . . . .                                       | 72       | 6  |
|                            | Für 1 Exempl. des Archivs de 1839 (extra) . . . . .   | 2        | 4  |
| I. Vicedirectorium Erfurt. |                                                       |          |    |
| 1) Kreis Erfurt.           |                                                       |          |    |
| Von den Herren:            |                                                       |          |    |
| 1                          | F. Bucholz, Vicedir., Ap. in Erfurt . . . . .         | 5        | 12 |
| 2                          | Frenzel, Ap. das. . . . .                             | 5        | 12 |
| 3                          | Trommsdorff, Ap. das. . . . .                         | 5        | 12 |
| 4                          | Lucas, Ap. das. . . . .                               | 5        | 12 |
| 5                          | Koch, Ap. das. . . . .                                | 5        | 12 |
| 6                          | Stumme, Prov. das. . . . .                            | 5        | 12 |
| 7                          | Bauersachs, Ap. in Sömmerda . . . . .                 | 5        | 12 |
| 8                          | Oswald, Hofapoth. in Arnstadt . . . . .               | 5        | 4  |
| 9                          | Bohlen, Ap. in Gebesee . . . . .                      | 5        | 12 |
| 10                         | Schenke, Ap. in Weisensee . . . . .                   | 5        | 12 |
| 11                         | Scheffler, Ap. in Ilmenau . . . . .                   | 5        | 4  |
| 12                         | May, Ap. in Langensalze . . . . .                     | 5        | 12 |
| 13                         | Klauer, Ap. in Mühlhausen . . . . .                   | 5        | 12 |
| 14                         | Motschmann, Ap. in Schleusingen . . . . .             | 5        | 12 |
| 15                         | Dr. Gräger, Ap. in Mühlhausen . . . . .               | 5        | 12 |
| 16                         | Wigand, Ap. in Tennstädt . . . . .                    | 5        | 12 |
| 17                         | Hager, Ap. in Gräfentonna . . . . .                   | 5        | 4  |
| 18                         | Trommsdorff, Ap. in Langensalze . . . . .             | 5        | 12 |
|                            | Summa . . . . .                                       | 95       | -  |
| 2) Kreis Sondershausen.    |                                                       |          |    |
| Von den Herren:            |                                                       |          |    |
| 1                          | Rammstedt, Comm.-R., Kr.-D., Ap. in Sondersh. . . . . | 5        | 12 |
| 2                          | Poppe, Ap. in Artern . . . . .                        | 5        | 12 |
| 3                          | Dr. Heinrich, Ap. in Allstädt . . . . .               | 5        | 12 |
| 4                          | Karst, Ap. in Keula . . . . .                         | 5        | 4  |
| 5                          | Haendels, Ap. in Sachsa . . . . .                     | 5        | 12 |
| 6                          | Bergemann, Ap. in Nordhausen . . . . .                | 5        | 12 |
| 7                          | Forke, Ap. in Wernigerode . . . . .                   | 5        | 12 |
| 8                          | Hiering, Ap. in Frankenhausen . . . . .               | 5        | 4  |
| 9                          | Schäfermeier, Ap. in Kelbra . . . . .                 | 5        | 4  |
| 10                         | Köhn, Ap. in Göldehausen . . . . .                    | 5        | 4  |
| 11                         | v. Möhren, Ap. in Duderstadt . . . . .                | 5        | 4  |
|                            | Latus . . . . .                                       | 55       | 2  |



| Ferner:                                   |                                              | Beiträge. |      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------|
|                                           |                                              | fl.       | sch. |
|                                           | <i>Transport . .</i>                         | 58        | 20   |
| 2                                         | Beez, Ap. in Groß-Ehrich . . . . .           | 5         | 4    |
| 3                                         | Haener, Ap. in Buttstädt . . . . .           | 5         | 4    |
|                                           | <i>Summa . .</i>                             | 69        | 4    |
| <b>II. Vicedirectorium in den Marken.</b> |                                              |           |      |
| <b>1) Kreis Angermünde.</b>               |                                              |           |      |
| Von den Herren:                           |                                              |           |      |
|                                           | Bolle, Vicedir., Ap. in Angermünde . . . . . | 5         | 12   |
|                                           | Krafft, Ap. in Boitzenburg . . . . .         | 5         | 12   |
|                                           | Koepfel, Ap. in Oderberg . . . . .           | 5         | 12   |
|                                           | Couvreux, Ap. in Biesenthal . . . . .        | 5         | 12   |
|                                           | Holzt, Ap. in Prenzlau . . . . .             | 5         | 12   |
|                                           | Stutz, Ap. das. . . . .                      | 5         | 12   |
|                                           | Wittrin, Ap. das. . . . .                    | 5         | 12   |
|                                           | Steindorf, Ap. in Greifenberg . . . . .      | 5         | 12   |
|                                           | Glupe, Ap. in Neustadt E. W. . . . .         | 5         | 12   |
|                                           | Sallbach, Ap. das. . . . .                   | 5         | 12   |
|                                           | Fiebelkorn, Ap. in Templin . . . . .         | 5         | 12   |
|                                           | Wider, Ap. in Schwedt . . . . .              | 5         | 12   |
|                                           | Liegner, Ap. in Liebenwalde . . . . .        | 5         | 12   |
|                                           | Kuhnert, Ap. in Granzow . . . . .            | 5         | 12   |
|                                           | <i>Summa . .</i>                             | 77        | —    |
| <b>2) Kreis Königsberg (Neumark.)</b>     |                                              |           |      |
| Von den Herren:                           |                                              |           |      |
|                                           | Dr. Geiseler, Kreisdir., in Königsberg . . . | 5         | 12   |
|                                           | Kohlstock, Ap. in Berlinchen . . . . .       | 5         | 12   |
|                                           | Hoffmann, Ap. in Neudam . . . . .            | 5         | 12   |
|                                           | Teutscher, Ap. in Mohrin . . . . .           | 5         | 12   |
|                                           | Hoffacker, Ap. in Buckow . . . . .           | 5         | 12   |
|                                           | Ulrich, Ap. in Schönfließ . . . . .          | 5         | 12   |
|                                           | Arlt, Ap. in Cüstrin . . . . .               | 5         | 12   |
|                                           | Mengenthin, Ap. das. . . . .                 | 5         | 12   |
|                                           | Kolbe, Ap. in Bärwalde . . . . .             | 5         | 12   |
|                                           | Jensen, Ap. in Writzen a. O. . . . .         | 5         | 12   |
|                                           | Crusius, Ap. in Freienwalde . . . . .        | 5         | 12   |
|                                           | Schieberlein, Ap. in Neu-Barnim . . . . .    | 5         | 12   |
|                                           | Gerlach, Ap. das. . . . .                    | 5         | 12   |
|                                           | Hoppe, Ap. in Strausberg . . . . .           | 5         | 12   |
|                                           | Poekel, Ap. in Selnow . . . . .              | 5         | 12   |
|                                           | Huguenel, Ap. in Frankfurt a. O. . . . .     | 5         | 12   |
|                                           | <i>Summa . .</i>                             | 88        | —    |

| Nr | 3) Kreis Arnswalde.                         | Beiträge |    |
|----|---------------------------------------------|----------|----|
|    |                                             | fl       | kr |
|    | Von den Herren:                             |          |    |
| 1  | Muth, Kreisdir., Ap. in Arnswalde . . . . . | 5        | 12 |
| 2  | Courvoisier, Ap. in Drisen . . . . .        | 5        | 12 |
| 3  | Lasch, Ap. das. . . . .                     | 5        | 12 |
| 4  | Röstel, Ap. in Landsberg a. W. . . . .      | 5        | 12 |
| 5  | Ackermann, Ap. das. . . . .                 | 5        | 12 |
| 6  | Selle, Ap. in Birnbaum . . . . .            | 5        | 12 |
| 7  | Paulke, Ap. in Obersitzkow . . . . .        | 5        | 12 |
| 8  | Veigel, Ap. in Sontra. . . . .              | 5        | 12 |
| 9  | Otto, Ap. in Wromcke . . . . .              | 5        | 12 |
| 10 | Lincke, Ap. in Neustadt . . . . .           | 5        | 12 |
| 11 | Goltz, Ap. in Friedeberg . . . . .          | 5        | 12 |
| 12 | Stengmann, Ap. in Rentz. . . . .            | 5        | 12 |
| 13 | Cavalier, Ap. in Reppen . . . . .           | 5        | 12 |
| 14 | Kayserling, Ap. in Callies . . . . .        | 5        | 12 |
| 15 | Marquardt, Ap. in Woldenberg . . . . .      | 5        | 12 |
|    | Summa . .                                   | 82       | 0  |
|    | 4) Kreis Pritzwalk.                         |          |    |
|    | Von den Herren:                             |          |    |
| 1  | Jung, Kreisdir., Ap. in Pritzwalk . . . . . | 5        | 12 |
| 2  | Kermer, Ap. in Wusterhausen . . . . .       | 5        | 12 |
| 3  | Schultze, Ap. in Perleberg. . . . .         | 5        | 12 |
| 4  | Mund, Ap. in Wittstock . . . . .            | 5        | 12 |
| 5  | Heller, Ap. in Lenzen . . . . .             | 5        | 12 |
| 6  | Meyer, Ap. in Putlitz . . . . .             | 5        | 12 |
| 7  | Krenkel, Ap. in Havelberg . . . . .         | 5        | 12 |
| 8  | Baevenroth, Ap. das. . . . .                | 5        | 12 |
| 9  | König, Ap. in Neustadt a. D. . . . .        | 5        | 12 |
| 10 | Schoenduwe, Ap. in Wittenberge . . . . .    | 5        | 12 |
| 11 | Oldendorf, Ap. in Kyritz . . . . .          | 5        | 12 |
| 12 | Kay, Ap. in Wilsnack . . . . .              | 5        | 12 |
|    | Summa . .                                   | 66       | -  |
|    | 5) Kreis Ruppın.                            |          |    |
|    | Von den Herren:                             |          |    |
| 1  | Menzel, Kreisdir., Ap. in Neu-Ruppın . . .  | 5        | 12 |
| 2  | Loof, Ap. das. . . . .                      | 5        | 12 |
| 3  | Merkenthin, Ap. in Alt-Ruppın . . . . .     | 5        | 12 |
| 4  | Viering, Ap. in Gransee . . . . .           | 5        | 12 |
| 5  | Hübner, Ap. in Nauen . . . . .              | 5        | 12 |
| 6  | Wildhagen, Ap. in Rathenow . . . . .        | 5        | 12 |
| 7  | Steindorf, Ap. in Oranienburg. . . . .      | 5        | 12 |
| 8  | Günther, Ap. in Lindow . . . . .            | 5        | 12 |
| 9  | Mans, Ap. in Werder . . . . .               | 5        | 12 |
| 10 | Schernickov, Ap. in Friesack . . . . .      | 5        | 12 |
|    | Summa . .                                   | 55       | -  |

| <i>Ferner :</i> |                                              | Beiträge. |    |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------|----|
|                 |                                              | ₰         | ℳ  |
|                 | <i>Transport . .</i>                         | 55        | —  |
| 1               | Klamroth, Ap. in Cotbus . . . . .            | 5         | 12 |
| 2               | Bückling, Ap. in Zedenick . . . . .          | 5         | 12 |
|                 | <i>Summa . .</i>                             | 66        | —  |
|                 | <b>6) Kreis Sonnenburg.</b>                  |           |    |
|                 | Von den Herren :                             |           |    |
| 1               | Strauch, Kreisdir., Ap. in Sonnenburg . . .  | 5         | 12 |
| 2               | Runge, Ap. in Drossen . . . . .              | 5         | 12 |
| 3               | Brix, Ap. in Bentschen . . . . .             | 5         | 12 |
| 4               | Rückmann, Ap. in Goeritz . . . . .           | 3         | 20 |
| 5               | Behlendorf, Ap. in Kriescht . . . . .        | 5         | 12 |
| 6               | Eichberg, Ap. in Karge . . . . .             | 5         | 12 |
| 7               | Jacob, Ap. in Müncheberg . . . . .           | 5         | 12 |
| 8               | Berend, Ap. in Züllichau . . . . .           | 5         | 12 |
| 9               | Haase, Ap. in Schwiebus . . . . .            | 5         | 12 |
| 0               | Weinedel, Ap. in Frankfurt a. O. . . . .     | 5         | 12 |
|                 | <i>Summa . .</i>                             | 53        | 8  |
|                 | <b>III. Vicedirectorium Cöln.</b>            |           |    |
|                 | <b>1) Kreis Cöln.</b>                        |           |    |
|                 | Von den Herren :                             |           |    |
| 1               | Sehlmeyer, Vicedir., Hofap. in Cöln . . . .  | 5         | 4  |
| 2               | Vahrenkamp, Ap. das. . . . .                 | 5         | 4  |
| 3               | Heis, Ap. das. . . . .                       | 5         | 12 |
| 4               | Vohl, Ap. das. . . . .                       | 5         | 4  |
| 5               | Noethlich, Ap. das. . . . .                  | 5         | 4  |
| 6               | Franck, Ap. das. . . . .                     | 5         | 4  |
| 7               | Kirchheim, Ap. das. . . . .                  | 5         | 4  |
| 8               | Wurringen, Ap. das. . . . .                  | 5         | 4  |
| 9               | Hüber, Ap. in Deutz . . . . .                | 5         | 4  |
| 0               | Keller, Ap. in Mühlheim a. R. . . . .        | 5         | 4  |
| 1               | Claudi, Ap. das. . . . .                     | 5         | 12 |
| 2               | Martini, Ap. in Brühl . . . . .              | 5         | 4  |
| 3               | Schwabe, Ap. in Kerpen . . . . .             | 5         | 4  |
| 4               | Wrede, Ap. in Bonn . . . . .                 | 5         | 4  |
| 5               | Heckethier, Ap. in Rheinbach . . . . .       | 5         | 12 |
| 6               | Dr. Scherpig, Ap. in Commern . . . . .       | 5         | 12 |
|                 | <i>Summa . .</i>                             | 84        | —  |
|                 | <b>2) Kreis Aachen.</b>                      |           |    |
|                 | Von den Herren :                             |           |    |
| 1               | Dr. Voget, Kreisdir., Ap. in Heinsberg . . . | 5         | 12 |
| 2               | Nickhorn, Ap. in Hünschoven . . . . .        | 5         | 12 |
| 3               | Käufer, Ap. in Herzogenbusch . . . . .       | 5         | 12 |
| 4               | Dr. Müller, Ap. in Aachen . . . . .          | 5         | 12 |
|                 | <i>Latus . .</i>                             | 22        | —  |

| Nr | Ferner :                                                                                                        | Beitrag   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                 | fl        |
|    | <i>Transport . . .</i>                                                                                          | <i>22</i> |
| 5  | Dr. Monheim, Ap. in Aachen . . . . .                                                                            | 5         |
| 6  | Schall, Ap. in Blumenthal . . . . .                                                                             | 5         |
| 7  | Welter, Ap. in Stollberg . . . . .                                                                              | 5         |
| 8  | Dahlen, Ap. in Eschweiler . . . . .                                                                             | 5         |
| 9  | Bock, Ap. in Linnig . . . . .                                                                                   | 5         |
| 10 | Schwarz, Ap. in Erkelenz . . . . .                                                                              | 5         |
| 11 | Nickhorn, Ap. in Dann . . . . .                                                                                 | 5         |
|    | <i>Summa . .</i>                                                                                                | <i>60</i> |
|    | <b>3) Kreis Gummersbach.</b>                                                                                    |           |
|    | Von den Herren :                                                                                                |           |
| 1  | Marder, Kreisdirekt., Ap. in Gummersbach . .                                                                    | 5         |
| 2  | Schmits, Ap. in Nümbrecht . . . . .                                                                             | 5         |
| 3  | Zapp, Ap. in Waldbroel . . . . .                                                                                | 5         |
| 4  | Schulz, Ap. in Eitorf . . . . .                                                                                 | 5         |
| 5  | vom Hof, Ap. in Siegburg . . . . .                                                                              | 5         |
| 6  | Junkersdorf, Ap. das. . . . .                                                                                   | 5         |
| 7  | Wirtz, Ap. in Muth . . . . .                                                                                    | 5         |
| 8  | Stolz, Ap. in Lindlar . . . . .                                                                                 | 5         |
| 9  | Tröster, Ap. in Runderath . . . . .                                                                             | 5         |
| 10 | Schmitt, Ap. in Bensberg . . . . .                                                                              | 5         |
| 11 | Wetschky, Ap. in Wipperfürth . . . . .                                                                          | 5         |
| 12 | Cobet, Ap. in Rönsahl . . . . .                                                                                 | 5         |
|    | <i>Summa . .</i>                                                                                                | <i>61</i> |
|    | <b>IV. Vicedirectorium am Niederrhein.</b>                                                                      |           |
|    | <b>1) Kreis Essen a. Ruhr.</b>                                                                                  |           |
|    | Von den Herren :                                                                                                |           |
| 1  | Klönne, Vicedir., Ap. in Mühlheim a. Ruhr.                                                                      | 1         |
| 2  | Flashoff, Ap. in Essen . . . . .                                                                                | 1         |
| 3  | Korte, Ap. das. . . . .                                                                                         | 1         |
| 4  | Hager, Ap. in Bochum . . . . .                                                                                  | 1         |
| 5  | Brinckmann, Ap. das. . . . .                                                                                    | 1         |
| 6  | Hofius, Ap. in Werden . . . . .                                                                                 | 1         |
| 7  | Overham, Ap. das. . . . .                                                                                       | 1         |
| 8  | Mecheln, Ap. in Ketwig . . . . .                                                                                | 1         |
| 9  | Nierstrafs, Droguist in Duisburg . . . . .                                                                      | 1         |
| 10 | Herschbach, Ap. das. . . . .                                                                                    | 1         |
| 11 | Tietz, Ap. das. . . . .                                                                                         | 1         |
| 12 | Grevel, Ap. in Sterkrade . . . . .                                                                              | 1         |
| 13 | Gutsche, Prov. in Ruhrort . . . . .                                                                             | 1         |
|    | <i>Summa . .</i>                                                                                                | <i>13</i> |
|    | <i>Anmerkung. Im Kreise Essen war der Lesezirkel für das Jahr 1839 suspendirt, daher der geringere Beitrag.</i> |           |

| 2) Kreis Schwelm.                                                                                                    |    | Beiträge. |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---|
|                                                                                                                      |    | ⌘         | ℥ |
| Von den Herren:                                                                                                      |    |           |   |
| Weber, Kreisdir., Ap. in Schwelm . . . . .                                                                           | 5  | 4         |   |
| Richter, Ap. in Rade . . . . .                                                                                       | 5  | 4         |   |
| Vofs, Ap. in Lennep . . . . .                                                                                        | 5  | 4         |   |
| Schwarz, Ap. in Sporksiel . . . . .                                                                                  | 5  | 4         |   |
| Riedel, Ap. in Cronenberg . . . . .                                                                                  | 5  | 4         |   |
| Bongard, Ap. in Hückeswagen . . . . .                                                                                | 5  | 4         |   |
| Schilbach, Ap. in Burg . . . . .                                                                                     | 5  | 4         |   |
| Leverkus, Ap. in Wermelskirchen . . . . .                                                                            | 5  | 4         |   |
| Schrader, Ap. in Barmen . . . . .                                                                                    | 5  | 4         |   |
| Summa . .                                                                                                            | 46 | 12        |   |
| Für verkaufte Journale . . . . .                                                                                     | 5  | —         |   |
| 3) Kreis Xanten.                                                                                                     |    |           |   |
| Von den Herren:                                                                                                      |    |           |   |
| Schmithals, Kreisdir., Ap. in Xanten . . . .                                                                         | 3  | 12        |   |
| Möselagen, Ap. in Goch . . . . .                                                                                     | 3  | 12        |   |
| van Lipp, Ap. in Cleve . . . . .                                                                                     | 3  | 12        |   |
| van Gelder, Ap. das . . . . .                                                                                        | 3  | 12        |   |
| Röhr, Ap. in Rees . . . . .                                                                                          | 3  | 12        |   |
| Danner, Ap. in Wesel . . . . .                                                                                       | 3  | 12        |   |
| Röhr, Ap. in Rheinsberg . . . . .                                                                                    | 3  | 12        |   |
| Kütze, Ap. in Crefeld . . . . .                                                                                      | 3  | 12        |   |
| Gattung, Ap. in Viersen . . . . .                                                                                    | 3  | 12        |   |
| Feldmann, Ap. in Neufs . . . . .                                                                                     | 3  | 12        |   |
| Hartkop, Ap. in Opladen . . . . .                                                                                    | 3  | 12        |   |
| van Baerle, Ap. in Rheydt . . . . .                                                                                  | 3  | 12        |   |
| van Gimborn, Ap. in Emmerich . . . . .                                                                               | 3  | 12        |   |
| Otto, Ap. in Cranenberg . . . . .                                                                                    | 3  | 12        |   |
| Fritsch, Ap. in Udem . . . . .                                                                                       | 3  | 12        |   |
| Karth, Ap. in Rheinberg . . . . .                                                                                    | 3  | 12        |   |
| Summa . .                                                                                                            | 56 | —         |   |
| <i>Anmerkung.</i> In dem Kreise Xanten war der Lesezirkel für das Jahr 1839 suspendirt, daher der geringere Beitrag. |    |           |   |
| V. Vicedirectorium Arnsberg.                                                                                         |    |           |   |
| 1) Kreis Medebach.                                                                                                   |    |           |   |
| Von den Herren:                                                                                                      |    |           |   |
| Müller, Vicedir., Ap. in Medebach . . . . .                                                                          | 5  | 12        |   |
| Goedeke, Ap. in Mengerlinghausen . . . . .                                                                           | 5  | 12        |   |
| Lang, Ap. in Gladenbach . . . . .                                                                                    | 5  | 4         |   |
| Reinige, Ap. in Sachsenberg . . . . .                                                                                | 5  | 4         |   |
| Röseler, Ap. in Winterberg . . . . .                                                                                 | 5  | 12        |   |
| Waldschmidt, Ap. in Sachsenhausen . . . . .                                                                          | 5  | 4         |   |
| Latus . .                                                                                                            | 32 | —         |   |
| d. Pharm. II. Reihe. XXIV. Bds. 3. Hft.                                                                              |    |           |   |
| 17                                                                                                                   |    |           |   |



| Nr | Ferner :                                     | Beiträge     |
|----|----------------------------------------------|--------------|
| fl | s                                            |              |
|    | <b>Transport . .</b>                         | <b>32 -</b>  |
| 7  | Hillenkamp, Ap. in Brilon . . . . .          | 5 12         |
| 8  | Großmann, Ap. in Battenberg . . . . .        | 5 4          |
| 9  | Heinzerling, Ap. in Voehle . . . . .         | 5 4          |
| 10 | Kunkel, Ap. in Corbach . . . . .             | 5 4          |
| 11 | Kümmel, Ap. das. . . . .                     | 5 12         |
| 12 | Blafs, Ap. in Feldberg . . . . .             | 5 4          |
| 13 | Stübing, Ap. in Rohden . . . . .             | 5 4          |
| 14 | Niemann, Ap. in Bigge . . . . .              | 5 12         |
| 15 | Schue, Ap. in Biedenkopf . . . . .           | 5 4          |
| 16 | Kindervatter, Ap. in Wetter . . . . .        | 5 4          |
| 17 | Hencke, Ap. in Arolsen . . . . .             | 5 4          |
| 18 | Wangemann, Ap. in Rauschenberg . . . . .     | 5 4          |
| 19 | Menkel, Ap. in Hain . . . . .                | 5 4          |
| 20 | Köchling, Ap. in Rossenthal . . . . .        | 5 4          |
| 21 | Bettenhausen, Ap. in Naumburg . . . . .      | 5 4          |
| 22 | Brill, Ap. in Haina . . . . .                | 5 4          |
| 23 | Bottrich, Ap. in Schmallenberg . . . . .     | 5 12         |
|    | <b>Summa . .</b>                             | <b>121 4</b> |
|    | <b>2) Kreis Siegen.</b>                      |              |
|    | Von den Herren :                             |              |
| 1  | Musset, Kreisdir., Ap. in Siegen . . . . .   | 5 12         |
| 2  | Wrede, Ap. in Freudenberg . . . . .          | 5 12         |
| 3  | Wüsthoff, Ap. in Olpe . . . . .              | 5 12         |
| 4  | Hollmann, Ap. in Plettenberg . . . . .       | 5 12         |
| 5  | Bilgen, Ap. in Lasphe . . . . .              | 5 12         |
| 6  | Neuhoff, Ap. in Hilchenbach . . . . .        | 5 12         |
| 7  | Westhoff, Ap. das. . . . .                   | 5 12         |
|    | <b>Summa . .</b>                             | <b>35 12</b> |
|    | <b>3) Kreis Arnsberg.</b>                    |              |
|    | Von den Herren :                             |              |
| 1  | Müller, Kreisdir., Ap. in Arnsberg . . . . . | 5 12         |
| 2  | Wrede, Ap. in Meschede . . . . .             | 5 12         |
| 3  | Briskens, Ap. in Arnsberg . . . . .          | 5 12         |
| 4  | Mues, Ap. in Esloh . . . . .                 | 5 12         |
| 5  | Speck, Ap. in Ruthen . . . . .               | 5 12         |
| 6  | Pröbsting, Ap. in Lippstadt . . . . .        | 5 12         |
| 7  | Gerhardi, Ap. in Halver . . . . .            | 5 12         |
| 8  | Neuhaus, Ap. in Iserlohn . . . . .           | 5 12         |
| 9  | Hengstenberg, Ap. das. . . . .               | 5 12         |
| 10 | Hencke, Ap. in Unna . . . . .                | 5 12         |
| 11 | Rocholl, Ap. in Soest . . . . .              | 5 12         |
| 12 | Pfeiffer, Ap. in Neheim . . . . .            | 5 12         |
| 13 | Schulz, Ap. in Berleburg . . . . .           | 5 12         |
|    | <b>Summa . .</b>                             | <b>71 12</b> |

# **VI. Vicedirectorium Bromberg.** **1) Kreis Bromberg.**

Beiträge.




Von den Herren:

|                                            |     |    |
|--------------------------------------------|-----|----|
| Weifs, Vicedir., Ap. in Bromberg . . . . . | 5   | 12 |
| Kupfender, Ap. das. . . . .                | 5   | 12 |
| Brandt, Ap. in Wittkowo . . . . .          | 5   | 12 |
| Brunner, Ap. in Gnesen . . . . .           | 5   | 12 |
| Kugler, Ap. das. . . . .                   | 5   | 12 |
| Dahme, Ap. in Wongrowiec . . . . .         | 5   | 12 |
| Hoyer, Ap. in Inowraklaw . . . . .         | 5   | 12 |
| Lange, Ap. das. . . . .                    | 5   | 12 |
| Just, Ap. in Czarnikow . . . . .           | 5   | 12 |
| Just, Ap. in Fihlene . . . . .             | 5   | 12 |
| Klamroth, Ap. in Strzelno . . . . .        | 5   | 12 |
| Krafft, Ap. in Margonin . . . . .          | 5   | 12 |
| Orland, Ap. in Koronowo . . . . .          | 5   | 12 |
| Pagels, Ap. in Schubin . . . . .           | 5   | 12 |
| Romann, Ap. in Gniewkowo . . . . .         | 5   | 12 |
| Rehefeld, Ap. in Trzenslo . . . . .        | 5   | 12 |
| Schulz, Ap. in Znin . . . . .              | 5   | 12 |
| Steffenhagen, Ap. in Mogilno . . . . .     | 5   | 12 |
| Tietze, Ap. in Schönlanke . . . . .        | 5   | 12 |
| Summa . .                                  | 104 | 12 |

## **2) Kreis Conitz.**

Von den Herren:

|                                            |     |    |
|--------------------------------------------|-----|----|
| Schulz, Kreisdir., Ap. in Conitz . . . . . | 5   | 12 |
| Lazarowitz, Ap. in Schwetz . . . . .       | 5   | 12 |
| Krüger, Ap. in Tuchel . . . . .            | 5   | 12 |
| Kastner, Ap. in Zempelburg . . . . .       | 5   | 12 |
| Voelzke, Ap. in Vandsburg . . . . .        | 5   | 12 |
| Rufs, Ap. in Baldenburg . . . . .          | 5   | 12 |
| Junge, Ap. in Schlockau . . . . .          | 5   | 12 |
| Wittke, Ap. in Preufs. Friedland . . . . . | 5   | 12 |
| Hager, Ap. in Märkisch Friedland . . . . . | 5   | 12 |
| Hellgrewe, Ap. in Lessen . . . . .         | 5   | 12 |
| Fischer, Ap. in Rehden . . . . .           | 5   | 12 |
| Bugisch, Ap. in Mewe . . . . .             | 5   | 12 |
| Sturm, Ap. in Cammin . . . . .             | 5   | 12 |
| Lentz, Ap. in Kawalowo . . . . .           | 5   | 12 |
| Schulz, Ap. in Thorn . . . . .             | 5   | 12 |
| Schermer, Ap. in Deutsch Eilau . . . . .   | 5   | 12 |
| Zimmermann, Ap. in Landeck . . . . .       | 5   | 12 |
| Bornemann, Ap. in Conitz . . . . .         | 5   | 12 |
| Heubener, Ap. in Neuenburg . . . . .       | 5   | 12 |
| Summa . .                                  | 104 | 12 |

| Nr | VII. Vicedirectorium im Churfürstenthum<br>Hessen.      |    | Beiträge |    |
|----|---------------------------------------------------------|----|----------|----|
|    | 1) Kreis Cassel.                                        |    | fl       | kr |
|    | Von den Herren:                                         |    |          |    |
| 1  | Dr. Fiedler, Ob.-Med.-Ass., Viced., Ap. in Cassel       | 5  | 4        |    |
| 2  | Dr. Wild, Ob.-Med.-Ass. das. . . . .                    | 5  | 4        |    |
| 3  | Rüde, Hofapoth. das. . . . .                            | 5  | 4        |    |
| 4  | Dr. Schwarzkopf, Ap. das. . . . .                       | 5  | 4        |    |
| 5  | Fraas, Ap. in Hofgeismar . . . . .                      | 5  | 4        |    |
| 6  | Pfeffer, Ap. in Grebenstein . . . . .                   | 5  | 4        |    |
| 7  | Müller, Hofapoth. in Wildungen. . . . .                 | 5  | 4        |    |
| 8  | Goellner, Ap. das. . . . .                              | 5  | 4        |    |
| 9  | Wagener, Ap. in Grosalmerode . . . . .                  | 5  | 4        |    |
| 10 | Elich, Ap. in Gudensberg . . . . .                      | 5  | 4        |    |
|    | Summa . .                                               | 51 | 16       |    |
|    | 2) Kreis Treysa.                                        |    |          |    |
|    | Von den Herren:                                         |    |          |    |
| 1  | Dr. Wiegand, Kreisdir., Ap. in Treysa . . .             | 5  | 4        |    |
| 2  | Hefs, Ap. in Marburg . . . . .                          | 5  | 4        |    |
| 3  | Ruppersberg, Ap. das. . . . .                           | 5  | 4        |    |
| 4  | Rippenhausen, Ap. das. . . . .                          | 5  | 4        |    |
| 5  | Jacobi, Ap. in Kirchheim . . . . .                      | 5  | 4        |    |
| 6  | Schmitt, Ap. in Jesberg . . . . .                       | 5  | 4        |    |
| 7  | Apelius, Ap. in Homburg . . . . .                       | 5  | 4        |    |
| 8  | Krüger, Ap. das. . . . .                                | 5  | 4        |    |
| 9  | Homburg, Ap. in Borken . . . . .                        | 5  | 4        |    |
| 10 | Hörle, Ap. in Neukirchen . . . . .                      | 5  | 4        |    |
|    | Summa . .                                               | 51 | 16       |    |
|    | 3) Kreis Witzenhausen.                                  |    |          |    |
|    | Von den Herren:                                         |    |          |    |
| 1  | Frank, Kreisdir., Ap. in Witzenhausen . . .             | 5  | 4        |    |
| 2  | Frank, Ap. in Sontra. . . . .                           | 5  | 4        |    |
| 3  | Schaumburg, Ap. in Rothenburg . . . . .                 | 5  | 4        |    |
| 4  | Gumpert, Ap. in Eschwege . . . . .                      | 5  | 4        |    |
| 5  | Braun, Ap. das. . . . .                                 | 5  | 4        |    |
| 6  | Schwabe, Ap. in Heiligenstadt . . . . .                 | 5  | 4        |    |
|    | Summa . .                                               | 31 | -        |    |
|    | VIII. Vicedirectorium im Großherzogthum<br>Mecklenburg. |    |          |    |
|    | 1) Kreis Stavenhagen.                                   |    |          |    |
|    | Von den Herren:                                         |    |          |    |
| 1  | Dr. Grischow, Vicedir., Ap. in Stavenhagen              | 5  | 4        |    |
| 2  | Timm, Ap. in Malchin . . . . .                          | 5  | 4        |    |
| 3  | Bachmann, Ap. in Neu-Brandenburg . . . .                | 5  | 4        |    |
| 4  | Siemerling, Ap. das. . . . .                            | 5  | 4        |    |
| 5  | Mayer, Ap. in Friedland . . . . .                       | 5  | 4        |    |
|    | Latus . .                                               | 25 | 2        |    |

| <i>Ferner:</i>                         | Beiträge. |    |
|----------------------------------------|-----------|----|
|                                        | ₤         | ℥  |
| <i>Transport</i> . .                   | 25        | 20 |
| Gremlin, Ap. in Neu-Strelitz . . . . . | 5         | 4  |
| Reinhardt, Ap. das. . . . .            | 5         | 4  |
| Gremler, Ap. in Woldegk . . . . .      | 5         | 4  |
| Behrends, Ap. in Strelitz . . . . .    | 5         | 4  |
| Keller, Ap. in Prenzlín . . . . .      | 5         | 4  |
| Praetorius, Ap. in Güstrow . . . . .   | 5         | 4  |
| Scheibel, Ap. in Teterow . . . . .     | 5         | 4  |
| Plümeke, Ap. in Feldberg . . . . .     | 5         | 4  |
| Lübke, Ap. in Stargard . . . . .       | 5         | 4  |
| Weifs, Ap. in Wessenberg . . . . .     | 5         | 4  |
| <i>Summa</i> . .                       | 77        | 12 |

## IX. Vicedirectorium Oldenburg.

## 1) Kreis Oldenburg.

Von den Herren:

|                                            |   |   |
|--------------------------------------------|---|---|
| Dugend, Vicedir., Hofapoth. in Oldenburg . | 5 | 4 |
| Detmers, Ap. das. . . . .                  | 5 | 4 |
| Kelp, Ap. das. . . . .                     | 5 | 4 |
| Trapp, Ap. in Rastede . . . . .            | 5 | 4 |
| Struwe, Ap. in Westerstede . . . . .       | 5 | 4 |
| Siegismund, Ap. in Jever . . . . .         | 5 | 4 |
| Sprenger, Ap. das. . . . .                 | 5 | 4 |
| Ingenohl, Ap. in Hocksíel . . . . .        | 5 | 4 |
| Brandes, Ap. in Fíddenwarden . . . . .     | 5 | 4 |
| Böckeler, Ap. in Varel . . . . .           | 5 | 4 |
| Hansmann, Ap. in Atens . . . . .           | 5 | 4 |
| Hargesheimer, Ap. in Dedesdorf . . . . .   | 5 | 4 |
| Krieger, Ap. in Rotenkirchen . . . . .     | 5 | 4 |
| Gieseler, Ap. in Ovelgönne . . . . .       | 5 | 4 |
| Volkhausen, Ap. in Elsfleth . . . . .      | 5 | 4 |
| Oldenburg, Ap. in Delmenhorst . . . . .    | 5 | 4 |
| Schmidt, Ap. in Wildehausen . . . . .      | 5 | 4 |
| Dr. Mysing, Ap. in Vechte . . . . .        | 5 | 4 |
| Aulicke, Ap. in Dincklage . . . . .        | 5 | 4 |
| Meyer, Ap. in Neuenkircken . . . . .       | 5 | 4 |

*Summa* . . 103 8

Zufälliger Ueberschufs . . . . . — 2½

## X. Vicedirectorium Braunschweig.

## 1) Kreis Braunschweig.

Von den Herren:

|                                             |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|
| Dr. Herzog, Vicedir., Ap. in Braunschweig . | 5  | 4  |
| Voelker, Kreisdir., Ap. das. . . . .        | 5  | 4  |
| Grote, Ap. das. . . . .                     | 5  | 4  |
| <i>Latus</i> . .                            | 15 | 12 |

|    |
|----|
| 4  |
| 4  |
| 4  |
| 12 |
| 13 |



| Nr                                   | Ferner :                                      | Beiträge |    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----|
|                                      |                                               | fl       | kr |
|                                      | <i>Transport . .</i>                          | 15       | 12 |
| 4                                    | Posthoff, Prov. in Braunschweig . . . . .     | 5        | 4  |
| 5                                    | Dünnhaupt, Ap. in Wolfenbüttel . . . . .      | 5        | 4  |
| 6                                    | Müller, Ap. in Schöningen . . . . .           | 5        | 4  |
| 7                                    | Dr. Lichtenstein, Ap. in Helmstädt . . . . .  | 5        | 4  |
| 8                                    | Kruckenbergr, Ap. in Königsutter . . . . .    | 5        | 4  |
| 9                                    | Corvinus, Ap. in Schöppenstädt . . . . .      | 5        | 4  |
| 10                                   | Hampe, Ap. in Blankenburg . . . . .           | 5        | 4  |
| 11                                   | Meyer, Ap. in Peina . . . . .                 | 5        | 4  |
| 12                                   | Senf, Ap. in Oebisfelde . . . . .             | 5        | 12 |
| 13                                   | Dannemann, Ap. in Fallersleben . . . . .      | 5        | 4  |
| 14                                   | Schulz, Ap. in Calvörde . . . . .             | 5        | 4  |
| 15                                   | Haupt, Ap. in Seesen . . . . .                | 5        | 4  |
| 16                                   | Heinemann, Ap. in Langelsheim . . . . .       | 5        | 4  |
| 17                                   | Sandorfy, Ap. in Harzburg . . . . .           | 5        | 4  |
| 18                                   | Kübel, Ap. in Eschershausen . . . . .         | 5        | 4  |
| 19                                   | Liebermann, Ap. in Grünenplan . . . . .       | 5        | 4  |
| 20                                   | Dülffer, Ap. in Holzminden . . . . .          | 5        | 4  |
| 21                                   | Kellner, Ap. in Stadtoldendorf . . . . .      | 5        | 4  |
| 22                                   | Vogel, Ap. in Gittelde . . . . .              | 5        | 4  |
| 23                                   | Kambly, Ap. in Lichtenberg . . . . .          | 5        | 4  |
| 24                                   | Böwing, Ap. in Vorsfelde . . . . .            | 5        | 4  |
| 25                                   | Seelhorst, Ap. in Meinersen . . . . .         | 5        | 4  |
| 26                                   | Motz, Ap. in Hoheneggelsen . . . . .          | 5        | 4  |
| 27                                   | Alberti, Ap. in Polle . . . . .               | 5        | 4  |
| 28                                   | Leube, Ap. in Gandersheim . . . . .           | 5        | 4  |
| 29                                   | Ballenstädt, Ap. in Elbingerode . . . . .     | 5        | 4  |
| 30                                   | Märtens, Ap. in Zorge . . . . .               | 5        | 4  |
|                                      | <i>Summa . .</i>                              | 155      | 6  |
| <b>XI. Vicedirectorium Bernburg.</b> |                                               |          |    |
| <b>1) Kreis Bernburg.</b>            |                                               |          |    |
| Von den Herren:                      |                                               |          |    |
| 1                                    | Dr. Bley, Vicedir., Ap. in Bernburg . . . . . | 5        | 12 |
| 2                                    | Weber, Ap. das. . . . .                       | 5        | 12 |
| 3                                    | Walther, Ap. das. . . . .                     | 5        | 12 |
| 4                                    | Jannasch, Ap. das. . . . .                    | 5        | 12 |
| 5                                    | Kettler, Ap. in Cöthen . . . . .              | 5        | 12 |
| 6                                    | Kopsel, Ap. das. . . . .                      | 5        | 12 |
| 7                                    | Henning, Ap. in Coswig . . . . .              | 5        | 12 |
| 8                                    | Geifs, Ap. in Acken . . . . .                 | 5        | 12 |
| 9                                    | Zimmermann, Ap. in Kalbe . . . . .            | 5        | 12 |
| 10                                   | Tuchen, Ap. in Stafsfurth . . . . .           | 5        | 12 |
| 11                                   | Schild, Ap. in Güsten . . . . .               | 5        | 12 |
| 12                                   | Brodkorb, Ap. in Cömmern . . . . .            | 5        | 12 |
| 13                                   | Giese, Ap. in Gröbzig . . . . .               | 5        | 12 |
|                                      | <i>Latue . .</i>                              | 71       | 6  |



| <i>Ferner :</i>                            | Beiträge. |    |
|--------------------------------------------|-----------|----|
|                                            | ₰         | ℳ  |
| <i>Transport . .</i>                       | 71        | 12 |
| Senst, Ap. in Nienburg . . . . .           | 5         | 12 |
| Urban, Ap. in Ballenstädt . . . . .        | 5         | 12 |
| Hildesheimer, Ap. in Güntersberge . . . .  | 5         | 12 |
| Simon, Ap. in Gernrode . . . . .           | 5         | 12 |
| Ravenstein, Ap. das. . . . .               | 5         | 12 |
| Stippius, Ap. in Zörbig . . . . .          | 5         | 12 |
| Diedrichs, Ap. in Leizkau . . . . .        | 5         | 12 |
| Zierenberg, Droguist in Magdeburg . . . .  | 5         | 12 |
| <i>Summa . .</i>                           | 115       | 12 |
| Für verkaufte Journale . . . . .           | 10        | —  |
| <i>2) Kreis Luckau.</i>                    |           |    |
| Von den Herren:                            |           |    |
| Rabenhorst, Kreisdir., Ap. in Luckau . . . | 5         | 12 |
| Blase, Ap. in Gassen . . . . .             | 5         | 12 |
| Luckwald, Ap. in Finsterwalde . . . . .    | 5         | 12 |
| Franke, Ap. in Bobersberg . . . . .        | 5         | 12 |
| Wessenberg, Ap. in Ruhland . . . . .       | 5         | 12 |
| Hantke, Ap. in Pförten . . . . .           | 5         | 12 |
| Hellwig, Ap. in Baruth . . . . .           | 5         | 12 |
| Nicolai, Ap. in Triebel . . . . .          | 5         | 12 |
| Steinert, Ap. in Schlieben . . . . .       | 5         | 12 |
| Baldenius, Ap. in Dessau . . . . .         | 5         | 12 |
| Meyer, Ap. in Guben . . . . .              | 5         | 12 |
| Hammer, Ap. in Spremberg . . . . .         | 5         | 12 |
| Michaelis, Ap. in Elsterwerda . . . . .    | 5         | 12 |
| Dorn, Ap. in Halbau . . . . .              | 5         | 12 |
| Foerster, Ap. das. . . . .                 | 5         | 12 |
| Lidorff, Ap. in Belzig . . . . .           | 5         | 12 |
| Wedel, Ap. in Lübenau . . . . .            | 5         | 12 |
| Schumann, Ap. in Golsen . . . . .          | 5         | 12 |
| Kieffs, Ap. in Senftenberg . . . . .       | 5         | 12 |
| Sasse, Ap. in Lübben . . . . .             | 5         | 12 |
| Müller, Ap. in Kirchhagen . . . . .        | 5         | 12 |
| Porse, Ap. in Rosslau . . . . .            | 5         | 12 |
| Bertrand, Ap. in Kotbus . . . . .          | 5         | 12 |
| Krüger, Ap. in Dahme . . . . .             | 5         | 12 |
| Curtius, Ap. in Sorau . . . . .            | 5         | 12 |
| Cupitz, Ap. das. . . . .                   | 5         | 12 |
| Köchler, Ap. in Forste . . . . .           | 5         | 12 |
| <i>Summa . .</i>                           | 148       | 12 |
| Für verkaufte Journale . . . . .           | 3         | 2  |

| Nr | XII. Vicedirectorium Gotha.<br>1) Kreis Gotha. | Beitr. |
|----|------------------------------------------------|--------|
|    | Von den Herren :                               |        |
| 1  | Dr. W. Bucholz, Vicedir., Hofap. in Gotha .    | 5      |
| 2  | Sieber, Droguist das. . . . .                  | 5      |
| 3  | Dr. Zichner, Hofapoth. das. . . . .            | 5      |
| 4  | Bartenstein, Ap. in Hildburghausen . . . .     | 5      |
| 5  | Baumann, Ap. in Meiningen . . . . .            | 5      |
| 6  | Jahn, Ap. das. . . . .                         | 5      |
| 7  | Boree, Hofapoth. in Eisenach . . . . .         | 5      |
| 8  | Biedermann, Ap. in Schweina. . . . .           | 5      |
| 9  | Brückner, Ap. in Salzungen . . . . .           | 5      |
| 10 | Grau, Ap. das. . . . .                         | 5      |
| 11 | Cloßmann, Ap. in Geisa . . . . .               | 5      |
| 12 | Eyring, Hofapoth. in Coburg . . . . .          | 5      |
| 13 | Löhlein, Hofapoth. das. . . . .                | 5      |
| 14 | Heiser, Ap. in Vacha . . . . .                 | 5      |
| 15 | Grahner, Ap. in Behrungen . . . . .            | 5      |
| 16 | Koch, Ap. in Ruhla . . . . .                   | 5      |
| 17 | Köllner, Ap. in Zella . . . . .                | 5      |
| 18 | Krüger, Ap. in Ohrdruff . . . . .              | 5      |
| 19 | Krüger, Ap. in Waltershausen . . . . .         | 5      |
| 20 | Ludwig, Ap. in Sonnenfeld . . . . .            | 5      |
| 21 | Moritz, Ap. in Wasungen . . . . .              | 5      |
| 22 | Motz, Ap. in Tambach . . . . .                 | 5      |
| 23 | Müller, Ap. in Lengersfeld . . . . .           | 5      |
| 24 | Münzel, Ap. in Themar . . . . .                | 5      |
| 25 | Neddermann, Ap. in Schwarza . . . . .          | 5      |
| 26 | Saalmüller, Ap. in Römhild . . . . .           | 5      |
| 27 | Simon, Ap. in Dermbach. . . . .                | 5      |
| 28 | Söldner, Ap. in Schmalkalden . . . . .         | 5      |
| 29 | Stickel, Ap. in Kaltennordheim. . . . .        | 5      |
| 30 | Tömlisch, Ap. in Großenbehrungen . . . . .     | 5      |
|    | Summa . .                                      | 150    |
|    | Für verkaufte Journale . . . . .               | 1      |

**Wiederholung**

der Einnahme aus allen Kreisen des Vereins.

| I. Aus den Kreisen, welche unter der unmittelbaren Leitung des Directoriums stehen. |                                | Beiträge.   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                                     |                                | ₰           | ℔         |
| A. Kreis Minden . . . . .                                                           |                                | 38          | 4         |
| B. » Herford . . . . .                                                              |                                | 71          | 12        |
| C. » Paderborn . . . . .                                                            |                                | 66          | —         |
| D. » Brandenburg . . . . .                                                          |                                | 33          | —         |
| E. » Burg . . . . .                                                                 |                                | 71          | 12        |
| F. » Eilenburg . . . . .                                                            |                                | 98          | 16        |
|                                                                                     | Für verkaufte Journale . . . . | 2           | —         |
| G. » Lissa . . . . .                                                                |                                | 55          | —         |
| H. » Mansfeld . . . . .                                                             |                                | 99          | —         |
| I. » Stendal . . . . .                                                              |                                | 66          | —         |
| K. » Hannover . . . . .                                                             |                                | 62          | —         |
| L. » Eimbeck . . . . .                                                              |                                | 56          | 20        |
| M. » Lüneburg . . . . .                                                             |                                | 62          | —         |
| N. » Osnabrück . . . . .                                                            |                                | 98          | 12        |
| O. » Ostfriesland . . . . .                                                         |                                | 82          | 16        |
| P. » Stade . . . . .                                                                |                                | 93          | —         |
| Q. » Lippe . . . . .                                                                |                                | 63          | —         |
| R. » Jena . . . . .                                                                 |                                | 103         | 8         |
| S. » Saalfeld . . . . .                                                             |                                | 72          | 8         |
|                                                                                     | Für 1 Exemplar des Archivs .   | 2           | 4         |
| <b>II. Vicedirectorium Erfurt.</b>                                                  |                                |             |           |
| 1) Kreis Erfurt . . . . .                                                           |                                | 98          | —         |
| 2) » Sondershausen . . . . .                                                        |                                | 69          | 4         |
| <b>III. Vicedirectorium in den Marken im Königreich Preussen.</b>                   |                                |             |           |
| 1) Kreis Angermünde . . . . .                                                       |                                | 77          | —         |
| 2) » Königsberg in der Neumark . . . . .                                            |                                | 88          | —         |
| 3) » Arnswalde . . . . .                                                            |                                | 82          | 12        |
| 4) » Pritzwalk . . . . .                                                            |                                | 66          | —         |
| 5) » Ruppin . . . . .                                                               |                                | 66          | —         |
| 6) » Sonnenburg . . . . .                                                           |                                | 53          | 8         |
| <b>IV. Vicedirectorium Cöln.</b>                                                    |                                |             |           |
| 1) Kreis Cöln . . . . .                                                             |                                | 84          | —         |
| 2) » Aachen . . . . .                                                               |                                | 60          | 12        |
| 3) » Gummersbach . . . . .                                                          |                                | 62          | 8         |
| <b>V. Vicedirectorium am Niederrhein.</b>                                           |                                |             |           |
| 1) Kreis Essen an der Ruhr . . . . .                                                |                                | 45          | 12        |
| 2) » Schwelm . . . . .                                                              |                                | 46          | 12        |
|                                                                                     | Für verkaufte Journale . . . . | 5           | —         |
| 3) » Xanten . . . . .                                                               |                                | 56          | —         |
| <b>Latus . . . . .</b>                                                              |                                | <b>2227</b> | <b>12</b> |

Nr der Beläge.

**Ausgabe.**

|    |                                                                                                                 | fl.  | gr. | sch. | pf.  | h. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|----|
| 1  | An die Hahn'sche Hofbuchhandlung<br>in Hannover de 1839 . . . . .                                               | 1536 | 4   | —    |      |    |
| 2  | An dieselbe . . . . .                                                                                           | 27   | 12  | —    |      |    |
| 3  | An dieselbe . . . . .                                                                                           | 213  | 17  | —    |      |    |
| 4  | An die Meyer'sche Hofbuchhandlung<br>in Lemgo . . . . .                                                         | 39   | 20  | —    |      |    |
|    | An die Herren:                                                                                                  |      |     |      |      |    |
| 5  | Director C. Wilken in Minden . .                                                                                | 2    | 5   | 8    |      |    |
| 6  | Dir. Dr. E. F. Aschoff in Herford .                                                                             | 33   | 7   | 6    |      |    |
| 7  | Kreisdir. Müller in Driburg . . .                                                                               | 26   | 12  | —    |      |    |
| 8  | Kreisid. Geiseler in Brandenburg .                                                                              | 21   | 6   | —    |      |    |
| 9  | Kreisid. Reich in Burg . . . . .                                                                                | 34   | 6   | 8    |      |    |
| 10 | Kreisid. Jonas in Eilenburg . . . .                                                                             | 44   | 4   | 10   |      |    |
| 11 | Kreisid. Lipowitz in Lissa . . . .                                                                              | 27   | 10  | —    |      |    |
| 12 | Kreisid. Giseke in Eisleben . . . .                                                                             | 42   | —   | —    |      |    |
| 13 | Kreisid. Treu in Stendal . . . . .                                                                              | 24   | 8   | 6    |      |    |
| 14 | Kreisid. Wackenroder in Burgdorf .                                                                              | 2    | 3   | 4    |      |    |
| 15 | Kreisid. Bolstorff in Eimbeck . . .                                                                             | 3    | —   | 3    |      |    |
| 16 | Dir. Du Ménil in Wunstorf . . . .                                                                               | 3    | 22  | 4    |      |    |
| 17 | Kreisid. Upmann in Neuenkirchen .                                                                               | 5    | 1   | 3    |      |    |
| 18 | Kreisid. v. Senden in Emden . . . .                                                                             | 4    | 8   | —    |      |    |
| 19 | Kreisid. Kerstens in Stade . . . . .                                                                            | 5    | 1   | 8    |      |    |
| 20 | Dir. Overbeck in Lemgo . . . . .                                                                                | 2    | 20  | —    |      |    |
| 21 | Kreisid. Dreykorn in Neustadt . . .                                                                             | 44   | 8   | 3    |      |    |
| 22 | Kreisid. Grefslor in Saalfeld . . . .                                                                           | 36   | 18  | 9    |      |    |
| 23 | Hof- u. Med.-R. Dr. Brandes, Ob.-D.<br>d. V. in Salzuflen, Auslagen . . . .                                     | 175  | 22  | —    |      |    |
| 24 | Rechnungsführer d. V., Auslage an<br>Franco, Porto, Schreibmaterial etc.<br>denselben, an Gehalt pro 1839 . . . | 47   | 14  | 9    |      |    |
| 25 | Löwe in Detmold . . . . .                                                                                       | 50   | —   | —    |      |    |
| 26 | Löwe in Detmold . . . . .                                                                                       | 8    | —   | —    |      |    |
| 27 | Arnz u. Comp. in Düsseldorf . . . .                                                                             | 17   | 6   | —    |      |    |
| 28 | An die Vereinskassalkasse an Zin-<br>sen für geleistete Vorschüsse . . .                                        | 32   | —   | —    |      |    |
|    | <b>I. Vicedirectorinm Erfurt.</b>                                                                               |      |     |      |      |    |
| 29 | An Hrn. Viced. Bucholz in Erfurt:                                                                               |      |     |      |      |    |
|    | a) für Porto und Büchereinband . .                                                                              | 10   | 4   | —    |      |    |
|    | b) für Bücher . . . . .                                                                                         | 33   | 20  | —    |      |    |
|    | An Hrn. Kreisid. Rammstädt in Son-<br>dershausen:                                                               |      |     |      |      |    |
|    | a) für Porto und Büchereinband . .                                                                              | 5    | 12  | —    |      |    |
|    | b) für Insertionsgebühren . . . . .                                                                             | —    | 11  | —    |      |    |
|    | c) für Bücher . . . . .                                                                                         | 24   | 4   | —    |      |    |
|    | <b>Latus . .</b>                                                                                                | —    | —   | —    | 74   | 3  |
|    |                                                                                                                 |      |     |      | 1585 | 3  |

Ferner :

|                                                               | ₰   | ℳ  | ₪ | ₰    | ℳ  | ₪ |
|---------------------------------------------------------------|-----|----|---|------|----|---|
| <i>Transport . .</i>                                          | —   | —  | — | 2585 | 3  | 9 |
| <b>II. Vicedirectorium in den Marken im Königr. Preussen.</b> |     |    |   |      |    |   |
| An Hrn. Viced. Bolle in Angermünde:                           |     |    |   |      |    |   |
| a) für Porto und Büchereinband .                              | 20  | 6  | 8 |      |    |   |
| b) für Bücher . . . . .                                       | 107 | 14 | 4 |      |    |   |
| An Hrn. Kreisd. Dr. Geiseler in Königsberg (Neumark) :        |     |    |   |      |    |   |
| a) für Porto . . . . .                                        | 4   | 7  | 2 |      |    |   |
| An Hrn. Kreisd. Muth in Arnswalde:                            |     |    |   |      |    |   |
| a) für Porto . . . . .                                        | 3   | 12 | 6 |      |    |   |
| An Hrn. Kreisd. Jung in Pritzwalk:                            |     |    |   |      |    |   |
| a) für Porto und Büchereinband .                              | 4   | —  | — |      |    |   |
| An Hrn. Kreisd. Menzel in Ruppin:                             |     |    |   |      |    |   |
| a) für Porto und Büchereinband .                              | 3   | 1  | — |      |    |   |
| b) für Bücher . . . . .                                       | 25  | 20 | — |      |    |   |
| An Hrn. Kreisd. Strauch in Sonnenb.                           |     |    |   |      |    |   |
| a) für Porto . . . . .                                        | 2   | 8  | — |      |    |   |
| <b>III. Vicedirect. am Niederrhein.</b>                       |     |    |   | 170  | 21 | 8 |
| An Hrn. Viced. Klönne in Mühlheim:                            |     |    |   |      |    |   |
| a) für Porto etc. . . . .                                     | 6   | 9  | 6 |      |    |   |
| An Hrn. Kreisd. Weber in Schwelm:                             |     |    |   |      |    |   |
| a) für Porto und Büchereinband .                              | 3   | 1  | — |      |    |   |
| b) für Bücher . . . . .                                       | 14  | —  | — |      |    |   |
| An Hrn. Kreisd. Schmithals in Xanten:                         |     |    |   |      |    |   |
| a) für Porto und Büchereinband .                              | 3   | 9  | 6 |      |    |   |
| <b>IV. Vicedirectorium Cöln.</b>                              |     |    |   | 26   | 20 | — |
| An Hrn. Viced. Sehlmeier in Cöln:                             |     |    |   |      |    |   |
| a) für Porto und Büchereinband .                              | 9   | 5  | 2 |      |    |   |
| b) für Bücher . . . . .                                       | 52  | 11 | 3 |      |    |   |
| An Hrn. Kreisd. Dr. Voget in Heinsb.                          |     |    |   |      |    |   |
| a) für Porto und Büchereinband .                              | 1   | 14 | 4 |      |    |   |
| <b>V. Vicedirectorium Arnsberg.</b>                           |     |    |   | 63   | 6  | 9 |
| An Hrn. Viced. Müller in Medebach:                            |     |    |   |      |    |   |
| a) für Porto und Büchereinband .                              | 10  | 8  | — |      |    |   |
| b) für Bücher . . . . .                                       | 46  | 18 | — |      |    |   |
| An Hrn. Kreisd. Posthoff in Siegen:                           |     |    |   |      |    |   |
| a) für Porto und Büchereinband .                              | 2   | 5  | — |      |    |   |
| b) für Bücher . . . . .                                       | 24  | 12 | — |      |    |   |
| An Hrn. Kreisd. Müller in Arnsberg:                           |     |    |   |      |    |   |
| a) für Porto und Büchereinband .                              | 4   | 12 | — |      |    |   |
| b) für Bücher . . . . .                                       | 21  | —  | — |      |    |   |
|                                                               | —   | —  | — | 109  | 7  | — |
|                                                               |     |    |   | 2955 | 11 | 2 |

|      |    |   |
|------|----|---|
| 109  | 7  | — |
| 2955 | 11 | 2 |



|    |                                               | Transport . . | 122 | — | — |
|----|-----------------------------------------------|---------------|-----|---|---|
| 6  | An Hrn. J. F. Zickner in Dardesheim . . . . . | 25            | —   | — | — |
| 7  | » C. G. Karbe in Königsberg . . . . .         | 25            | —   | — | — |
| 8  | » E. G. Crowecke in Nemitz . . . . .          | 25            | —   | — | — |
| 9  | » J. F. Lohmann in Goslar . . . . .           | 20            | —   | — | — |
| 10 | » C. A. Schiffer in Essen . . . . .           | 15            | —   | — | — |
| 11 | » A. F. Hartmann in Stralsund . . . . .       | 20            | —   | — | — |
| 12 | » F. W. Koch in Höxter . . . . .              | 15            | —   | — | — |
| 13 | » C. W. Stahl in Cassel . . . . .             | 10            | —   | — | — |
| 14 | » C. H. Peithmann in Volkmarsen . . . . .     | 15            | —   | — | — |
| 15 | » G. W. Renner in Warstade . . . . .          | 20            | —   | — | — |
| 16 | » J. H. Hilberts in Soest . . . . .           | 25            | —   | — | — |
|    | Ausgabe für Franco und Porto . . . . .        | 13            | —   | — | — |
|    |                                               | Summa . .     | 350 | — | — |

### Abschluss

der Rechnung über das Vereinskapi tal vom Jahre 1839.

|         |                                                                                                                       |                                                                      |      |    |   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----|---|
|         |                                                                                                                       | Am Schluss des Jahrs 1838 betrug das <i>Corpus bonorum</i> . . . . . | 2725 | —  | — |
|         |                                                                                                                       | <i>Einnahme.</i>                                                     |      |    |   |
| Tit. I. | An Bestande aus der Rechnung des Jahrs 1838                                                                           | 294                                                                  | 21   | 4  | — |
| » II.   | An zurückbezahlten Capitalien . . . . .                                                                               | 350                                                                  | —    | —  | — |
| » III.  | An Zinsen, a) von d. zurückgezahlt. Capitalien                                                                        | 5                                                                    | —    | —  | — |
|         | b) von stehenden Capitalien . . . . .                                                                                 | 111                                                                  | —    | —  | — |
| » IV.   | An eingegangenen Beiträgen. Von den Herren:                                                                           |                                                                      |      |    |   |
|         | 1) Apoth. A. Wiegand in St. Inghoff . . . . .                                                                         | 10                                                                   | —    | —  | — |
|         | 2) Poeckel in Seelow . . . . .                                                                                        | 5                                                                    | —    | —  | — |
|         | 3) Müller in Lingen . . . . .                                                                                         | 11                                                                   | 8    | —  | — |
|         | 4) Reg.-Medicinalrath Dr. Busch in Münster                                                                            | 11                                                                   | 8    | —  | — |
|         | 5) Durch Hrn. Ap. Ed. Siller in St. Petersburg von mehreren dortigen Apothekern.                                      | 100                                                                  | —    | —  | — |
|         | 6) Dr. Hahn in Hannover . . . . .                                                                                     | 11                                                                   | 8    | —  | — |
|         | 7) Medicinalrath Dr. Krause das. . . . .                                                                              | 3                                                                    | —    | —  | — |
|         | 8) H. F. Kaufmann in Berlin . . . . .                                                                                 | 15                                                                   | —    | —  | — |
|         | 9) F. Brendecke, Cand. pharm. in Braunsch.                                                                            | 1                                                                    | —    | —  | — |
|         | 10) Laut Verzeichniss der im Jahre 1839 dem Vereine beigetretenen Mitglieder, zusammen von 141 Mitgliedern, à 2 Thlr. | 282                                                                  | —    | —  | — |
|         | 11) Laut Verzeichniss der ausserord. Beiträge zur Vereinskasse vom Jahre 1839 . . . . .                               | 11                                                                   | 8    | —  | — |
|         |                                                                                                                       | Summa der Einnahme . .                                               | 1225 | 5  | 4 |
|         |                                                                                                                       | <i>Ausgabe.</i>                                                      |      |    |   |
| Tit. I. | An Vorschuss aus der Rechnung des Jahrs 1838                                                                          | —                                                                    | —    | —  | — |
| » II.   | An ausgeliehenen Capitalien . . . . .                                                                                 | 766                                                                  | 16   | —  | — |
|         |                                                                                                                       | Bleibt Cassenbestand . .                                             | 459  | 13 | 4 |

Die Verwaltung des Vereinskapi tals.

R. Brandes. E. F. Aschoff. Overbeck.  
Hölzermann, Rechnungsführer

## Bericht über die Kreisversammlung zu Ronneburg.

Die Mitglieder des Kreises Altenburg versammelten sich zu einer allgemeinen Berathung am 6. Juni im Bade zu Ronneburg. Der Gegenstand der Besprechung betraf hauptsächlich die traurige Lage, in welcher wir bei gänzlichem Mangel einer gerechten Apothekerordnung bessere Zeiten bisher leider vergeblich gegenseufzten, und die Mittel, die sich vielleicht zur Verbesserung unserer Lage ergreifen ließen.

1) Da wir, in Folge einer von uns an hohe Landesregierung abgegebenen Petition, betreffs einer zweckmäßigen Apothekerordnung im Jahr 1836 auf das Erscheinen einer neuen Sächs. Apothekerordnung verwiesen worden sind, die Zeit des Erscheinens einer Sächs. Apothekerordnung aber zu fern liegt, wenn sie wirklich erschienen wäre, unserer Zeit und unseren Verhältnissen nicht passend sein dürfte, um uns gegründete Hoffnung zu gewähren, so haben wir aus unserer Mitte eine Deputation, bestehend aus

Hrn. Hofapoth. Schröter in Kahla,  
 „ „ Weibezahl in Eisenburg,  
 „ Apoth. Loewel in Roda,  
 „ „ Bauman in Altenburg,

beauftragt, die für unser Herzogthum eine geeignete Apothekerordnung, die preussische, meiningische und hannoversche Apothekerordnungen als Grundlage annehmend, ausarbeiten soll, sie dann hoher Landesregierung mit der unterthänigen Bitte übergeben, daß, wenn die von uns bearbeitete nicht Berücksichtigung finden könne, uns die preussische Apothekerordnung, in deren Pharmakopöe wir arbeiten, überwiesen werden möge.

2) Hierauf gingen wir zu dem, unsern Erwerb schmälern den rechtmäßigen Verfahren, Seiten der Droguisten, über, und beschloßen, allen denen Droguisten, von denen wir wissen, daß entweder mit unerlaubten Medicamenten und Drogen handeln, oder ihre Reisenden, außer zu den Apothekern und Essisten und Fabrikanten, auch (wie das leider jetzt oft der Fall ist) zu Privatleuten, Handwerkern, selbstdispensirenden Ärzten und Chirurgen, ja wohl gar auch zu Hebammen schicken, vorhergegangener Insinuation unsre Aufträge gänzlich zu entziehen und letztere solchen, die sich rechtmäßig nähren, künftighin zuwenden. Soll diese Mafsregel jedoch durchgreifenden Erfolg haben, so versteht es sich von selbst, daß sie auch in Verbindung mit allen andern gemeinsinnig und collegialisch denkenden Apothekern gehandhabt werden muß. Ob dies aber zu Stande kommen wird und kann, wagen wir nicht zu behaupten, haben aber viele Beispiele gefunden, welche sich dazu bereit erklärten.

Man wird uns nicht hämischen Neid und Mißgunst hier zum Vorwand legen, denn welcher Apotheker kennt nicht den großen Schaden, welcher uns durch das gewissenlose, allen Gesetzen verachtende Treiben, genannt »Droguisten-Unfug,« erwächst, wenn wir nicht uns, daß wir dagegen auftreten wollen, um nur das Gerechtigkeit zu erhalten, was uns geraubt worden, und unser rechtmäßiges Eigenthum war.

Was die zur Ausführung zu treffenden Mafsregeln anbelangt, so habe ich mich aller vorgreiflichen Meinung, und gebe diese

Angelegenheit, welche das reifliche Nachdenken vieler erfahrener Männer in Anspruch zu nehmen scheint, ganz zur gütigen Beurtheilung dem Directorio anheim \*).

3) Ferner haben wir, um dem, von den Hausirern und Obitenkrämern, resp. Königseern, veranlassten Unfug zu steuern, beschlossen, die hiesige hohe Landesregierung zu bitten, sie uns verstatte, öffentlich Geldpreise auszustellen an solche in uns vorerwähnte Individuen nachzuweisen im Stande sind, so daß wir sie zur Rechenschaft und Bestrafung ziehen können. Ob sich gleich dagegen einwenden läßt, daß dies Verfahren unsere Kunst zu den zünftigen Handwerken herabzieht, so schien uns dasselbe dennoch vom Standpunkte des Geschäftslebens zu betrachten, weniger tadelnswerth. Hübler.

## 2) Medicinalwesen.

Einige Erörterungen über den Aufsatz: »Das Verhältniß der Apothekergehülfen, v. Dr. Geiseler,

von

Dr. C. Herzog,  
Apotheker zu Braunschweig.

Eine Haupttendenz unserer Vereinszeitung ist, die pharmaceutischen Angelegenheiten sowohl im Allgemeinen als in Besondern offen und freimüthig zu beleuchten, und es ist gewiß nicht in Abrede zu stellen, daß schon viel Gutes hierdurch gestiftet und manche wesentliche Mängel beseitigt sind; zumal die Männer an der Spitze und in der Mitte unseres Vereins haben deren edle Absicht es ist, uns, wo es Noth thut, zu vertreten und deren uneigennütziges Streben dahin gerichtet ist, die Pharmacie so viel als möglich zu vervollkommen.

Einer von diesen ehrenwerthen Männern ist der Verfasser des oben erwähnten Aufsatzes, unser würdiger College, Dr. Geiseler, der auch durch seine wissenschaftlichen Forschungen sich die gerechtesten Ansprüche auf unsere Anerkennung erworben hat. — Wenn ich nun in Folgendem mir einige Betrachtungen über diesen Aufsatz erlaube, welche mit den Ansichten des Verfassers in einzelnen Puncten nicht übereinstimmen.

\*) Das Directorium des Vereins hat schon vor zehn Jahren auf den Unfug aufmerksam gemacht, den manche Droguisten im Debit der Arzneimittel treiben. Schon damals schien es wünschenswerth, dagegen ernstlich zu kämpfen. Das Uebel hat leider nicht nachgelassen. Wir kommen auf diesen frühern Vorschlag zurück, daß man sich von solchen Droguisten keine Aufträge mehr zu geben, und sie namentlich bekannt zu machen. Sehr achtungswerthe Handlungshäuser selbst haben uns die Größe des Unfuges geschildert, welchen in dieser Beziehung manche Droguisten treiben. Br.



ist es weder mein Wille, denselben zu kränken, noch Andern meine Ansichten aufzudrängen.

Der Zweck des Aufsatzes ist, das Verhältniß der Apothekergehülfen zu den Principalen genau zu bezeichnen, die Rechte und Pflichten der Apothekergehülfen festzustellen, um dadurch aus einer unrichtigen Auffassung derselben entstehenden Mißbräuchen abzuheffen. Der Verfasser dürfte jedoch seine sehr werthvolle Absicht vielleicht mehr gefördert haben, wenn er den Stand der Apothekergehülfen nicht von einem so idealen Gesichtspunkte aus aufgefaßt, die mit den Verhältnissen eines Gehülfen nothwendig verbundenen Annehmlichkeiten und Vortheile nicht als besondere Rechte von großem Werthe dargestellt, manche nicht ganz zutreffende Vergleiche weggelassen und sich überhaupt einer größeren Kürze befleißigt hätte.

Diese meine Ansicht werde ich in Folgendem kurz und im Allgemeinen zu rechtfertigen suchen, ohne auf eine kritische Urtheilung und Widerlegung aller einzelnen in dem Aufsatz enthaltenen, nach meinem Erachten nicht ganz richtigen Behauptungen und Vergleiche einzugehen. Zuvor erlaube ich mir noch die Bemerkung, daß der Verfasser bei einer so ausführlichen Beleuchtung des Verhältnisses der Apothekergehülfen einer so gründlichen Forschung nach den Quellen, aus denen Fehler der Gehülfen entspringen, billiger Weise die Lehrlinge nicht so flüchtig hätte übergehen dürfen, weil der Grund der meisten Fehler gerade darin zu suchen ist, daß die Principale die moralische und sehr oft die ganze geistige Bildung der Lehrlinge vernachlässigen, und die auf diese Weise herangebildeten Gehülfen dann schwerlich im Stande sein werden, durch ein gutes Beispiel auf die jugendlichen Gemüther der Lehrlinge wirken zu können. Durch eine genaue Aufsicht der Principale auf die Lehrlinge würde daher bald eine an moralischer, intellectueller und socialer Bildung ausgezeichnete Generation von Gehülfen entstehen, und dürfte dieses meiner Ansicht nach das sicherste Mittel sein, durch welches den von dem Verfasser angegebenen Fehlern am gründlichsten abgeholfen würde.

Den Apothekergehülfen bezeichnet Dr. Geiseler sehr richtig als den Mitarbeiter des Apothekenbesizers, der für die Verwaltung der Geschäfte, mit welchen ihn der Principal beauftragt, belohnt wird, und das Verhältniß desselben zu dem Principale ein abhängiges. Wenn aber der Verfasser ferner als Entlohnung, welche dem Gehülfen außer der Besoldung für ihre Leistungen gewährt wird, anführt, daß denselben Beköstigung und sogar an dem eigenen Tische des Principals zugestanden, demselben ein bequemes Rubelager gestattet, die Morgen- und Abendstunden oder statt dessen häufigere Ausgehete zu den gewählten Beschäftigungen überlassen, und den Gehülfen Gelegenheit zu ihrer Ausbildung in den Officinen gegeben würde, gehören diese Emolumente theils nicht in die Kategorie einer Remuneration, theils dürften sie nicht so hoch zu veranlagt sein, als dies der Verfasser thut.

Der Gehalt der Gehülfen ist in der Regel nicht hinreichend, davon Beköstigung und eine besondere Wohnung zu bestreiten will daher der Principal diese dem Gehülfen nicht in natura verabreichen, so muß er ihm eine angemessene Geldentschä-

digung dafür geben, und dieses wird in den meisten Fällen kostspieliger sein, als die Naturallieferung, da der Tisch des Principals selten mehr als gute Hausmannskost gewährt, und die Wohnung des Apothekers gewöhnlich so groß ist, daß die Einräumung einer Schlafstelle keine bedeutende Unbequemlichkeiten verursacht. Daß die Gehülfen mit an dem Tische des Principals essen, ist aber eben sowohl ein Vorthail für letzteren, namentlich wenn derselbe Vergnügen an geselliger Unterhaltung findet; denn der von dem Verfasser angeführte, jedoch sehr problematische Vorthail, welcher aus der Einrichtung eines besondern Gehülftentisches für den Apotheker etwa entstehen möchte, würde schwerlich durch die daraus erwachsenden größern Kosten und Unbequemlichkeiten in der Haushaltung aufgewogen werden.

Daß den Gehülfen Zeit zu eigenen Beschäftigungen und Erholung überlassen wird, erheischt theils die menschliche Natur, theils der eigene Vorthail des Principals; denn Körper und Geist bedürfen nach einer Anstrengung Erholung, um zu neuen Anstrengungen fähig zu sein, und kann dieses eben so wenig als ein Emolument in Betracht kommen, als der Umstand, daß die Gehülfen in den Officinen Gelegenheit zur Vervollkommenung und Ausbildung erhalten, da die Verrichtung der ihnen aufgetragenen Arbeiten eine Vervollkommenung in denselben zur Folge haben muß, und die Ausbildung derselben durch passende selbstgewählte Beschäftigungen eine vortheilhafte Rückwirkung auf das Geschäft des Principals hat. —

Der Standpunct, von welchem der Verfasser das Verhältniß der Gehülfen betrachtet, mußte denselben zu einer Ueberschätzung dieser Vorthaile führen; daß dieser Standpunct aber nicht richtig gewählt sein dürfte, werde ich jetzt zu zeigen suchen.

Der Apothekergehülfe, sagt Dr. Geiseler, conditionirt nicht deshalb, um einem Apotheker seine Kräfte zu verkaufen und seinen Unterhalt zu erwerben, sondern um sich zur einstigen selbstständigen Ausübung seiner Kunst fähig zu machen. Sehr wünschenswerth sowohl für die Gehülfen, als die Principals würde es sein, wenn diese Behauptung wahr wäre, allein leider ist dem nicht so. Dieses wird einleuchten, wenn man erwägt, auf welche Weise die Menschen zu der Wahl eines bestimmten Fachs geführt werden. Der Knabe wählt sich seinen künftigen Beruf oft, weil er glaubt, daß er zu einzelnen, mit demselben verbundenen Beschäftigungen Neigung in sich verspüre, und öfter aber, weil er nur die mit dem zu erwählenden Stande verbundenen Annehmlichkeiten vor Augen hat, die Schattenseiten desselben aber übersieht; denn eine wirkliche Neigung zu dem gewählten Berufe, namentlich, wenn derselbe in der Ausübung einer Wissenschaft besteht, kann natürlich in dem Knaben, welcher noch keinen Begriff von der Wissenschaft hat, nicht vorhanden sein. Die Eltern geben den Neigungen ihrer Kinder gern nach und berücksichtigen hauptsächlich, namentlich, wenn sie selbst ein bedeutendes Vermögen besitzen, ob die Kinder durch den gewählten Beruf sich bald ihr Brod erwerben und selbst für ihren Unterhalt sorgen können, und in dieser Beziehung erscheint ihnen der Stand eines Apothekers, der nach vollendeter Lehrzeit doch wenigstens einen nothdürftigen Unterhalt gewährt, sehr vortheilhaft. Haben die Eltern aber ein großes Vermögen,



betrachten sie häufig, den gewöhnlichen Vorurtheilen folgend, die Apotheke als eine reichhaltige Goldgrube und billigen gern die Wahl eines Berufs, von dem sie eine hohe Verzinsung des Anlagecapitals voraussetzen. Der geringste Theil unserer Gehülfen besteht aus Söhnen von Apothekern, welche theils schon früh mit den Beschäftigungen derselben vertraut geworden und eine Neigung zu denselben, theils, weil sie in der künftig zu übernehmenden Apotheke eine Sinecure sehen, sich diesem Stande widmen.

Aus dieser Darstellung ergibt sich, daß der bei weitem größte Theil der Apothekergehülfen zwar nicht conditionirt, daß dem Apotheker seine Kräfte zu verkaufen, aber doch in der Absicht, um neben einer größern Ausbildung in der Wissenschaft sich die Mittel zu einem angemessenen Auskommen zu verschaffen. Aber selbst, wenn die Gehülfen hinlängliche Mittel besitzen, um sich während der Conditionirzeit zu unterhalten, hat der Principal kein Recht, die Früchte ihres Fleißes ohne Entschädigung zu genießen; denn die Gelegenheit, welche derselbe dem Gehülfen zu seiner Ausbildung giebt, ist sein eigenes Interesse, und der Principal gewährt dem Gehülfen nicht die zu seiner selbstständigen Stellung erforderlichen Mittel.

Ferner sind auch nach den in den meisten Staaten bestehenden Einrichtungen die Apotheken keine Staatsanstalten, welche der Staat nach einer mit den Concurrenten vorgenommenen Prüfung an die am meisten befähigten Personen verleiht, sondern der Staat verleiht entweder einer Privatperson ein erbliches Privilegium zu der Anlage einer Apotheke, oder er ertheilt eine persönliche Concession; in beiden Fällen ist aber zur Erwerbung einer Apotheke, da der Apotheker zur Ausübung seines Geschäfts eines nicht unbedeutenden Grundstücks oder wenigstens Capitals bedarf, Vermögen oder Credit erforderlich.

Erst dann, wenn die Apotheke eine Anstellung und der Principal Beamter geworden, wenn den befähigten Gehülfen die Mittel zur Erwerbung einer Apotheke gesichert sind, kann der Gehülfe durch ein Gesetz zu einer unentgeltlichen Ausübung der ihm aufgetragenen Verrichtungen verpflichtet werden, und dann erst paßt der Vergleich der Stellung eines Gehülfen mit der eines Auscultators oder Referendars, denen der Staat das für ihre Ausbildung verwandte Capital je nach ihren Fähigkeiten hoch oder gering verzinsset.

Der Gehülfe, welcher für seine Bemühungen Entschädigung erhält, wird aber dadurch noch nicht Handwerksgehilfe, denn die Wissenschaft ist immer sehr von einer bloß mechanischen Thätigkeit verschieden, braucht sich aber eines Vergleichs mit dem gebildeten Handlungscommis nicht zu schämen; denn es scheint schwer zu entscheiden sein, ob die Kenntnisse, welche einem Buchhalter in einer großen Handlung gefordert werden, leichter zu erlangen sind, als die, welche ein Apothekergehülfe zu seinem Fache nöthig hat.

Schließlich bemerke ich nur noch, daß eine so detaillirte Erzählung der am häufigsten vorkommenden Fehler der Gehülfen, wie sie in dem vorliegenden Aufsatz enthalten, wegen der genauen Erörterung der Verpflichtungen derselben überflüssig erscheint, und dürfte eine allgemeine Hinweisung auf

diese genügt haben, zumal da es eine bekannte Wahrheit ist, daß die Menschen, obgleich sie die Fehler an Andern erkennen können, zu dem Bewußtsein ihrer eigenen Mängel selten gelangen; um eine Besserung zu bewirken, daher in den meisten Fällen eine specielle, freundliche Zurechtweisung erforderlich sein würde.

Wenn die Gehülfen einerseits beherzigen, wie sie durch eine genaue Erfüllung der ihnen obliegenden Pflichten und namentlich durch Bescheidenheit sich ihr Leben sowohl hinsichtlich der Zufriedenheit mit sich selbst, als auch hinsichtlich des Verhältnisses zu den Principalen ungleich angenehmer machen können, als durch ein nachlässiges und arrogantes Betragen; die Principale aber erwägen, daß Befehlen leichter als Gehorchen und daß die aus einer freundlichen Behandlung der Gehülfen entstehende Zuneigung der letzteren gegen den Principal vortheilhafter für das Geschäft ist, als die aus einer entgegengesetzten Behandlungsweise entspringende Gleichgültigkeit oder gar Abneigung: so wird den gegenseitigen Klagen bald abgeholfen werden.

Nochmals wiederhole ich, daß es weder Absicht ist, durch diese Darstellung den Herrn Dr. Geiseler zu kränken, noch daß ich die ehrenwerthe Tendenz des Aufsatzes verkenne; vielmehr habe ich mir diese Erörterung nur erlaubt, weil ich für meine Pflicht hielt, das Verhältniß der Apothekergehülfen von dem, meiner Ansicht nach richtigen, Gesichtspunkte darzustellen.

## Bemerkungen über den Aufsatz des Apothekers Hrn. Dr. Geiseler: »die Verhältnisse der Apothekergehülfen«;

von  
*Otto Planer,*  
derzeit in Arnstadt.

Ueber die Pflichten, die der Apothekergehülfe gegen sein Principal hat, ist schon so viel geschrieben und gedruckt worden, daß man glauben sollte, dieser Gegenstand müsse längst ausgebeutet sein, doch von dieser Ueberzeugung scheint der Hr. Dr. Geiseler nicht durchdrungen zu sein, denn in dem *Archiv der Pharmacie 2. Reihe 23. Bds. 2. Heft* sucht der Hr. Dr. Geiseler in einer weitläufigen Abhandlung darzuthun, wie wenig gründlich und öffentlich noch bis jetzt dieser Gegenstand abgehandelt worden ist.

Wenn ich auch recht wohl annehmen kann, daß so manche, ja vielleicht sogar sehr viele Gehülfen jenen Aufsatz weder sehr flüchtig oder auch wohl gar nicht gelesen haben, mithin das Verletzende und Entwürdigende desselben fast gar nicht kennen lernten, so glaube ich doch hinreichende Veranlassung zu finden, etwas entgegen zu müssen.

In seiner Einleitung sagt zwar der Hr. Dr. Geiseler »manche Wahrheiten, die jedoch bei jedem Gehülfen, selbst bei denjenigen, die eben erst aus der Lehre getreten, als bekannt

ausgesetzt werden können, mithin einer öffentlichen Erwähnung wohl schwerlich bedurften.

Damit sich jedoch nicht das alte Sprichwort, *was ist der Rede kurzer Sinn?* bei mir bewährt, werde ich nicht gerade zu sehr ins Specielle jenes Aufsatzes eingehen, sondern ich vielmehr begnügen, nur das Allerwesentlichste zu berühren, was bei einem jeden Gehülfen nur unangenehme Empfindungen hervorgerufen haben muß.

Der Hr. Dr. Geiseler will es z. B. als eine ganz besondere Vergünstigung angesehen wissen, wenn dem Gehülfen von Seiten des Principals ein bequemes Ruhelager gestattet wird, und dann in freundlichen Räumen, wenn es die Localität erlaubt.

Was mag wohl der Verfasser jenes Aufsatzes unter freundlichen Räumen verstehen?

Er kann doch unmöglich den Gehülfen solche Räume anweisen wollen, die ganz des Lichtes entbehren, und wo vielleicht binnen Jahr und Tag kein Sonnenstrahl Zutritt erlangen kann?

Ja fast täglich hat man Gelegenheit wahrzunehmen, wie dem Handwerksgesellen von ihren Meistern bequeme und freundliche Räume zu Ruhelagern angewiesen werden, sollten da nicht auch Apothekergehülfen, die doch jedenfalls eine höhere Ranges einnehmen, eben solche oder vielmehr noch bessere verlangen können? Es ist mithin keine Vergünstigung, sondern eine höfliche Rücksicht anzusehen, die der Principal nicht seinen Gehülfen, sondern auch selbst der Humanität schuldig, wenn derselbe in seiner Stellung nicht ganz zum gewöhnlichen Dienstboten herabsinken soll.

Auch selbst darin sucht der Hr. Dr. Geiseler eine Vergünstigung, wenn der Principal seinen Tisch mit den Gehülfen theilt, und mithin der traulichen Unterhaltung im Kreise seiner Familie seine ganze Lebenszeit hindurch entbehrt, die namentlich solche recht zu würdigen verständen, welche aus dem Geschäftsstande in den Privatstand übergetreten wären.

Der Hr. Dr. Geiseler scheint ganz vergessen zu haben, ein solcher mit dem wirklichen Apothekenbesitzer gar nicht verglichen werden darf, denn der Letztere, der genöthigt ist, seinen Platz zu halten, hat mithin Verpflichtungen, die der Erstere nicht hat.

Kann man überhaupt bloß Mittags bei Tische trauliche Gespräche mit Frau und Kindern führen? Würde sich nicht vielmehr die übrige Zeit und vorzüglich der Abend eben so gut eignen?

Wenn ich annehme, daß der Hr. Dr. Geiseler ebenfalls die übrige Zeit zur traulichen Unterhaltung so passend finden würde, als wie so viele Apothekenbesitzer, mit welchen ich in dem jenen Aufsatzes gesprochen, so bemeistern sich meiner nicht, warum der Hr. Dr. Geiseler die Gehülfen von dem Hause des Principals entfernt wissen will, die ich jedoch öffentlich auszusprechen nicht wage.

Der Gehülfe wird es vielleicht in vielen Fällen dankbar anerkennen, wenn er mit zur Familientafel des Principals hinzugezogen wird, doch deswegen ist es noch keine Vergünstigung,



zumal im entgegengesetzten Falle ein zweiter und besond. Tisch gedeckt werden müßte, der dem Principal nicht alle Unbequemlichkeit, sondern auch eine Mehrausgabe verursachen würde.

Ferner glaubt der Hr. Dr. Geiseler die Apothekergehälter mit Auscultatoren, Referendarien, Aerzten, Schulambulanzen etc. in Hinsicht pecuniärer Stellung vergleichen zu müssen; nach meiner Ueberzeugung hat sich da der Hr. Dr. Geiseler ganz bedeutend geirrt, denn eine solche Vergleichung ist durchaus nicht zulässig und anwendbar, wie es aus Folgendem hervorgehen wird. Fast alle diese bekommen früher oder später eine ihren Fähigkeiten entsprechende Stellung mit reichendem Gehalt verbunden, um anständig und sorgenlos leben zu können.

Der Jurist kann z. B., sobald er das dritte oder Staatsexamen zurückgelegt, zu den höhern und höchsten Stellen in preussischen Staate gelangen, die denselben vollkommen entschädigen für die dem Staate als Auscultator, Referendar oder Advokat unentgeltlich geleisteten Dienste; ähnlich verhält sich's mit den Uebrigen und selbst der Arzt, wenn er sich sonst zum theoretischen und practischen Arzt herangebildet, wird ohne große Schwierigkeiten sein sicheres und gutes Auskommen finden.

Ganz anders verhält es sich mit dem Apothekergehülfe selbst, wenn er sich die größtmögliche wissenschaftliche Ausbildung angeeignet, sein Staatsexamen mit der besten Cassa bestanden, wird sich demohnerachtet der Staat auf keine Weise veranlaßt sehen, ihn zu entschädigen, noch viel weniger als einen Apothekenbesitzer, und demohnerachtet soll der Apothekergehülfe vielleicht zehn Jahr und noch länger, der Meiste nach dem Hr. Dr. Geiseler nach, dem Apothekenbesitzer unentgeltlich seine Kräfte, vielleicht auch Gesundheit opfern, um später einmal die Vergünstigung zu haben, vorausgesetzt, wenn er genug besitzt, eine Apotheke zu außerordentlich hohem Preise zu kaufen, ohne Vermögen würde ihm jedoch keine andere übrig bleiben, wenn er nicht ewig conditionirender Pharmazeut bleiben will, entweder einen Kram zu etabliren, wie man so viele Beispiele hat, oder auch wohl gar ein Bureau zu etabliren, wo angeblich gute Recepte zu guter künstlicher Medicamenten etc. ausgegeben werden, mit vielleicht noch einem Rechnungsscomptoir verbunden.

Das sind so ohngefähr die herrlichen und glänzenden Aussichten, die fast ein jeder unbemittelte conditionirende Pharmazeut hat, und in jedes Pharmaceuten Brust, der nur mit einiger Ueber sein bevorstehendes Schicksal nachgedacht, mehr oder weniger empfunden werden. Selbst Eltern lassen sich jetzt von diesen ungünstigen Aussichten abschrecken, ihre Kinder in den Apothekerstand zu widmen.

Der Hr. Dr. Geiseler muß bei seinem gemachten Vorschlag, den Gehülfen keinen Gehalt mehr auszuzahlen, auch daran gedacht haben, daß, und zwar der grössere Theil der Gehülfen, ein eigenes Vermögen nicht besitze. Auf welchem Wege sollen sich dieselben die nöthigen Geldmittel zum Leben verschaffen, zumal der Hr. Dr. Geiseler selbst die Vertheilung von Nahrungsstoffen für eine Vergünstigung erachtet.



Habe ich Unrecht, denn irren ist ja menschlich, und haben wirklich die Gehulfen als eine Vergünstigung anzusehen, wenn sie derartige Emolumente von Seiten der Herren Apothekenbesitzer verabreicht bekommen, so ist es eine große Ungerechtigkeit und Undankbarkeit, daß die Gehulfen solche Vergünstigungen nicht anerkennen und würdigen werden, wie es der Verfasser jenes Aufsatzes voraussetzt.

Es würde mir gar nicht schwer fallen, dem Hrn. Dr. Geiseler ohne große Schwierigkeiten nachzuweisen, daß alle seine namentlich aufgeführten Vergünstigungen durchaus keine sind, mal wenn man von dem Grundsatz ausgeht, daß der Apothekenbesitzer nicht ohne Gehulfen sein darf und kann und eine solche Auswahl möchte in der jetzigen Zeit wohl schwerlich immer Gebote stehen, doch es würde mich zu unnötigen Auseinandersetzungen führen, die dem pharmaceutischen Publicum auch keinen wesentlichen Nutzen bringen können.

Aus diesem Grunde glaube ich auch weiter nichts Ausführliches auf die Anschuldigungen entgegnen zu müssen, die der Hr. Dr. Geiseler unter den Namen Ungehorsam, Unzufriedenheit, Egoismus, Trägheit und Mangel an Ordnungsliebe und Achtung zum Ausgehen den Gehulfen gemacht hat.

Es mag wohl der eine oder der andere mit der einen oder der andern erwähnten Untugend zuweilen angetroffen werden können, es giebt ja auch Principale, die nicht so sind, wie sie sein sollten und könnten, so gehören doch derartige Gehulfen nicht zu den seltenen Erscheinungen in der pharmaceutischen Welt, zumal in der jetzigen Zeitperiode ein jeder Gehülfe sich eine wissenschaftliche Bildung anzueignen suchen wird.

Indem ich im Vorstehenden meine Ueberzeugung über den Inhalt des Aufsatzes des Hrn. Dr. Geiseler durch den Druck der Öffentlichkeit übergebe, glaube ich noch bemerken zu müssen, daß ich von der Absicht weit entfernt bin, den Hrn. Dr. Geiseler auf irgend eine Weise persönlich unangenehm zu berühren, zumal mir recht wohl bekannt ist, wie viele Verdienste sich der Hr. Dr. Geiseler schon um die Pharmacie erworben und sich erwerben wird, und die wohl von jedem Apotheker, er mag nun Besitzer oder Gehülfe sein, anerkannt werden.

---

### Bemerkung in Verfolg der beiden vorstehenden Aufsätze.

Wenn ich nicht irre, so ist der Aufsatz des Hrn. Dr. Geiseler in Folge des Wunsches einiger bei der General-Versammlung in Pyrmont gegenwärtigen Collegen entstanden, die eine Beleuchtung des jetzigen Verhältnisses der Gehulfen zu ihrem Principale wünschten, und zwar in Folge mehrfacher Unannehmlichkeiten, selbst Widerwärtigkeiten, die sie in dieser Beziehung erfahren hatten. Gewiß giebt es eine große Reihe trefflicher und wackerer Gehulfen (wie sollte es auch anders sein!), die freiest ja auch unsere braven Collegen werden; ich selbst habe darüber die erfreulichsten Erfahrungen gesammelt und wackere tüchtige Männer in meinem Geschäft gehabt, die nicht nur meine Mitarbeiter, die meine Freunde waren. Auf der andern Seite

aber liegt es auch in der Natur der Sache, daß das Gegenüber vorkommt; ich kenne in dieser Beziehung die Leiden eines ehrenwerthen mir befreundeten Collegen, der mehrere Jahre in tereinander Gehülften in seinem Geschäfte hatte, deren Betrug ihren Pflichten nicht im mindesten entsprach, die ihm Verbrüder aller Art in seinem Hause verursachten. Wenn Erfahrungen dieser Art nicht so isolirt sind, auch bei Apothekern in kleinen Orten häufiger vorkommen als in grossen, so muß das natürliche Besprechung unter Collegen veranlassen können.

Hr. Dr. Geiseler hatte bei seinem Aufsätze die würdigen Absichten, er glaubte durch die Stellung, die er den Gehülften wünschenswerth hielt, sie um so mehr zu heben. Daß die Stellung aber nicht die richtige sein kann, davon bin ich überzeugt; sie ist es nicht für den Gehülften, sie ist es nicht für den Apotheker, sie ist nicht practisch. Hierüber, so wie über einige andere Punkte, worüber auch Hr. Dr. Herzog, so wie Hr. Planer sich erklärt haben, habe ich mich gegen Hr. Dr. Geiseler schon früher brieflich auch ausgesprochen. Wenn dem aber auch sei, so bedarf es wohl kaum der Versicherung, daß Hr. Dr. Geiseler nur von den reinsten Beweggründen bei seiner Darstellung geleitet wurde und so sehr in das Interesse der oben bemerkten Collegen sich hineindachte, daß er in deren Sinne handeln zu müssen vermeinte. Für einen, der Hr. Dr. Geiseler persönlich kennt, bedarf es keiner weiteren Bemerkung, für die übrigen möge das Vorstehende genügen, bis Hr. Dr. Geiseler selbst des Weiteren darüber hier sich ausgesprochen haben. Von Seiten der Gehülften und Apotheker selbst sind demselben in den vorhergehenden Aufsätzen Entgegnungen gemacht, mit denen wir selbst, wie bereits führt, im Wesentlichen übereinstimmen. Dagegen erkennen wir auch das Gute und Wahre in Geiseler's Aufsätze an, wir wünschen, daß die gerügten Fehler auf solche Gehülften zu dieser Darstellung Veranlassung gaben, von heilbringenden Folgen sein mögen, damit die Zahl jener braven und weisen Männer, denen wir als Mitarbeiter in unsern Geschäften Hochachtung und Freundschaft für ihre Pflichttreue entgegenkommen, um so mehr sich vergrößere, als die Zahl jener gegengesetzt Handelnden sich vermindert. Schliesslich bitten wir, daß fernere Entgegnungen in dieser Angelegenheit nicht mehr aufgenommen werden können, und nach einer von Hr. Dr. Geiseler noch zu erwartenden Erklärung die Sache als abgeschlossen betrachtet wird.

Brandes



## Zweite Abtheilung.

### Chemie.

#### Erster Abschnitt.

### Über die Zusammensetzung der Galle;

von  
*Berzelius.*

Eine neue wichtige Arbeit über die Galle hat Berzelius in dem neuesten Bande seines Lehrbuches bekannt gemacht. Er hat diese angestellt in der Absicht, durch seine Versuche über die Natur der Galle, worüber so manche Widersprüche herrschen, zu richtigen Resultaten zu gelangen. Wir wollen den Faden dieser Arbeit und ihre Ergebnisse verfolgen.

**Analyse durch Schwefelsäure.** Ochsen-galle läßt man bei 100 bis 110° C. so eintrocknen, daß sie gepulvert werden kann und darauf mit wasserfreiem Aether schütteln, welcher alles Fett aufnimmt, welches nicht mit Kali zu Seife verbunden ist; darauf wird das Pulver mit absolutem Alkohol behandelt, welcher eine Vertheilung des bittern Bestandtheils und des Farbstoffs mit wasserfreiem Alkali auszieht; das wasserfreie Alkali auszieht; das wasserfreie Alkali ungelöst wird darauf mit Alkohol von 0,85 behandelt, und der ungelöste Rückstand abgeseiht.

Die Lösung in absolutem Alkohol wird nun so lange mit Chlorbaryum versetzt, als noch ein dunkelgrüner Niederschlag dadurch entsteht, der eine Verbindung des Farbstoffs der Galle mit Baryt ist. Diesen Farbstoff nennt Berzelius *Biliverdin*.

Die vom Biliverdin abfiltrirte Flüssigkeit wird hierauf mit Barytwasser versetzt, so lange die Lösung danach getrübt wird. Dieser Niederschlag enthält einen rothgelben Farbstoff, *Bilifulvin*, gemengt mit



Biliverdin, einem extractähnlichen und einem eigenthümlichen azotisirten Stoff.

Der Ueberschuss von Baryt wird aus der Flüssigkeit durch Kohlensäuregas gefällt, dann zur völligen Trockne verdunstet, und mit absolutem Alkohol und noch beigemengtem Kochsalz und Chlorbaryum gereinigt, und die filtrirte Auflösung mit verdünnter Schwefelsäure vermischt, um alle noch darin befindliche alkalischen Basen abzuscheiden, und nun, mit noch feuchtem kohlensaurem Bleioxyd vermischt, aus einer Retorte destillirt, bis der Alkohol grösstentheils entfernt ist, worauf die Schwefelsäure und zum Theil auch die fetten Säuren mit dem Bleioxyde sich verbunden haben. Aus dem rückständigen, von dem Bleiniederschlage abfiltrirten Flüssigkeit wird ein Rückhalt von Blei durch Schwefelwasserstoff entfernt, die darauf verdunstet, nach dem Rückstand bei 100—110°C. getrocknet wird, wodurch eine weisse Masse erhält, die schnell gepulvert und zweimal mit kleinen Portionen von absolutem Aether behandelt wird, der die jetzt freigemachten fetten Säuren aufnimmt, worauf das Pulver im Vacuo über Schwefelsäure von anhängenden Aether befreiet wird, und nun den bleuelectronegativen Bestandtheil der Galle darstellt.

*Gallenstoff der früheren Analyse.* Es scheint nach den Eigenschaften dieses Stoffs, als sei derselbe eine eigenthümliche schwache Säure, die in der Galle mit Aether gesättigt wäre, und mache dieses Salz einen charakteristischen Bestandtheil der Galle aus. Doch ist das Verhältniß nicht so einfach, als es auf den ersten Anblick zu sein scheint. Man behandelt die wässrige Auflösung dieses Stoffs mit Bleioxyd, so lange als sich noch eine pflasterähnliche Masse bildet, raucht die abfiltrirte Lösung zur Trockne ab und löst den Rückstand in absolutem Alkohol, aus welcher Lösung man durch Schwefelwasserstoff eine Spur von Blei abscheidet, wenn noch darin übergegangen sein sollte, worauf man im Vacuum über Schwefelsäure verdunstet; den erhaltenen Körper nennt Berzelius *Bilin*.



*Eigenschaften des Bilins.*

Das Bilin ist eine klare, gelbliche oder farblose, eiche geruchlose Masse, von einem bittern Geschmack, der zugleich etwas unbestimmt süßliches hat. In Wasser und Alkohol ist es leichtlöslich und unlöslich in Aether. Es ist der Gallenzucker Gmelin's, krystallisiert aber nicht; das Krystallinische in Gmelin's Versuchen rührt von eingemengtem essigsauren Natron her. Es verändert sich außerordentlich leicht, schon durch bloße Verdunsten, in einen sauren Körper. Seine wässrige Auflösung wird durch Säuren, Tannin, Chlorwasser, Alkalien, Erd- und Metallsalze nicht gefällt: wird aber mit vielem Alkalihydrat oder kohlensaurem Alkali gemischt, so scheidet sich eine in der alkalischen Flüssigkeit unlösliche halbflüssige Verbindung von Alkali und Bilin ab, die in absolutem Alkohol löslich ist. Das Bilin hat also zu den Basen im Allgemeinen Verwandtschaft, durch die Löslichkeit der Verbindungen in Wasser bleiben aber die Reactionen aus.

Die Metamorphose des Bilins wird besonders durch Säuren sehr beschleunigt, namentlich durch Mineralsäuren. Digerirt man Bilin mit verdünnter Salzsäure, so fällt ein ölartiger Körper nieder, der eine Verbindung von Bilin mit einem sauren Körper ist, demselben, der auch in der oben erwähnten pflasterähnlichen Verbindung mit Bleioxyd enthalten ist. Bei fortgesetztem Digeriren erhält man endlich einen harzähnlichen Stoff, und die davon abgegossene saure Flüssigkeit hinterläßt nach Verdunsten eine gelbliche Salzmasse, aus welcher Alkohol von 0,84 Salmiak auszieht, mit Hinterlassung eines weissen krystallisirten Körpers, der *Taurin* ist. Die Flüssigkeit enthält also zwei Produkte der Metamorphose des Bilins, Taurin und das Ammoniak des angedachten Salmiaks.

Der von der Auflösung getrennte harzähnliche Körper besteht aus drei anderen. Durch Behandeln mit kaltem Alkohol von 0,84 bleibt eine harzartige Substanz zurück, die Berzelius *Dyslysin* (von  $\delta\eta\varsigma$ , schwer und

λυσις, Lösung) nennt und in der entstandenen Auflösung finden sich zwei verschiedene Säuren, *Fellinsäure* und *Cholinsäure*.

Das Dyslysin löst sich in kochendem, auch absolutem Alkohol sehr schwierig; beim Erkalten scheidet sich ein Theil des Aufgelösten als ein weißer erdiger Niederschlag ab, der in kohlensauren Alkalien unlöslich ist. Die beiden Säuren wollen wir im Folgenden näher betrachten.

#### *Fellinsäure und Cholinsäure.*

Wird die von dem Dyslysin abfiltrirte Lösung mit etwas Ammoniak und darauf mit Chlorbarium versetzt, so verbindet sich der Baryt mit der Fellinsäure zu einem in Alkohol löslichen, die Cholinsäure aber damit zu einem unlöslichen als Niederschlag erscheinenden Salz: die Scheidung beider Säuren auf diese Weise ist nicht vollständig; Lösung und Niederschlag enthalten Einmengungen der anderen Säure. Zur Darstellung dieser Säuren verfährt man folgendermaßen. Die oben bemerkte Lösung in Alkohol wird mit kaustischem Ammoniak und wenig Wasser vermischt und dann verdunstet, wo sich das cholinsaure Ammoniak in Form eines Kuchens absetzt und das fellinsaure Ammoniak in Lösung bleibt; einen Rückhalt von Fellinsäure in dem Kuchen zieht man durch wiederholtes Behandeln mit kohlensaurem Ammoniak aus.

Die Lösung des fellinsauren Ammoniaks wird in Trockne verdunstet und der Rückstand in Wasser eingeweicht, ohne Umrühren, weil sonst das nun zurückbleibende aufgequollene saure cholinsaure Ammoniak mit durch's Filter gehen würde. Die filtrirte Lösung wird dann durch Salzsäure gefällt, wo sich die Fellinsäure als schneeweißser flockiger Niederschlag abscheidet, oft aber als gelber Körper, wenn er noch Biliole oder Fett enthält.

Im trocknen Zustande ist die Fellinsäure weiß, erdig, geruchlos; sie hat einen bitteren Geschmack, schmilzt über 100° C. erhitzt zu einer klaren Masse, die viel

Vasser ausgiebt und nach dem Erkalten hart und farblos ist. In Wasser ist sie etwas löslich, auch in Aether, Alkohol, auch verdünntem, ist sie leichtlöslich. Mit Alkalien bildet sie im Wasser und Alkohol lösliche, in Aether aber unlösliche Salze, die durch einen Ueberschuß von Alkali vollständig als eine pflasterartige Masse aus der Auflösung gefällt werden. Die fellinsauren Salze schmecken bitter wie die Galle selbst, ohne süßlich.

Die *Cholinsäure* wird durch Zersetzung der oben geführten Ammoniakverbindung erhalten; sie bildet eine leichte Flocken, nach dem Trocknen eine spröde, leicht zu pülvernde Masse. Sie ist leicht schmelzbar, in Alkohol leichtlöslich, auch in Aether etwas löslich. Kohlensaures Alkali bildet damit aufgequollene Verbindungen, die aufgeweichtem Leim im Ansehen ähnlich sind. Auf die geschmolzene Säure zeigt kaustisches Kalium eine zerstörende Wirkung, setzt man selbiges aber zu einer Auflösung der Säure in Alkohol, so bekommt man eine in Wasser und Alkohol lösliche Verbindung.

#### *Bilifellinsäure.*

Oben bei der Abscheidung des Bilins wurde eine pflasterähnliche Bleiverbindung erhalten, die noch näher untersucht werden muß. Man zersetzt sie durch Digestion mit kohlensaurem Alkali, wodurch eine gelbe, bitter-schmeckende und wie Galle riechende Auflösung erhalten wird; die concentrirte Lösung wird durch Schwefelsäure gefällt, der Niederschlag ist in Wasser löslich, und aber durch Säuren daraus abgeschieden. Der Niederschlag muß aus diesem Grunde auch mit Wasser gewaschen werden, dem man eine Portion Schwefelsäure zugesetzt hat. Man erhält einen pflasterähnlichen Niederschlag, der wesentlich mit Thenard's Picromel oder Demargay's *Acidi cholique* übereinstimmt, den man schnell mit wenig Wasser abspült und dann in reinen Aether bringt, dieser färbt sich gelb, und es bildet sich ein dickes Liquidum; man wiederholt die Behandlung dieses mit Aether so oft, bis dieser nichts mehr



aufnimmt; durch Abdestilliren der ätherischen Lösung erhält man ein dickes rothbraunes Magma, welches mit kohlensaurem Ammoniak behandelt fellinsaures und cholinsaures Ammoniak giebt.

Die bei der Behandlung mit Aether zurückgebliebene syrupsartige Flüssigkeit löst sich in Wasser leicht. Sie wird mit Bleioxyd behandelt, mit dem sie auf's Neue eine pflasterähnliche Verbindung bildet, und Bilin der Flüssigkeit zurückläßt. Wird dieser Niederschlag nun wieder der eben beschriebenen Behandlung mit Schwefelsäure u. s. w. unterworfen, so giebt er an sich wieder *Fellinsäure* und *Cholinsäure* ab, und hinterläßt einen in Wasser löslichen Körper, welcher auf's Neue in die pflasterähnliche Verbindung mit Bleioxyd übergeht. Bilin, welches aufgelöst bleibt, zerlegt werden kann, und dieses geht so lange fort, bis alles in Bilin und in *Fellinsäure* und *Cholinsäure* verwandelt worden ist.

Die Erklärung dieses Verhaltens scheint zu liegen in dem Umstande, daß das Bilin und die *Fellinsäure*, vielleicht auch die *Cholinsäure*, in zwei Verhältnissen chemisch sich mit einander verbinden, von denen die mit den Säuren die meisten gesättigte Verbindung entsteht, wenn das Bilin mit einer Basis im Ueberschusse behandelt wird, womit in dieser relativen Proportion eine unlösliche Verbindung sich bildet. Ein Theil von Bilin wird ausgeschieden und in der Flüssigkeit gelöst, nebst einer geringen Portion von basischem Bleisalz, welches beim Abdestilliren nach dem Eintrocknen abscheidet. Wird die unlösliche Verbindung des Bilins mit den beiden Säuren mit einer Basis abgeschieden und mit Aether behandelt, so giebt dieser einen Theil, wahrscheinlich die Hälfte beider Verbindungen, auf, und stellt die an Bilin reiche Verbindung her, aus welcher der Aether von beiden Säuren nichts mehr abzuscheiden vermag.

Diese beiden Verbindungen von Bilin mit *Fellinsäure* und *Cholinsäure*, wenn letztere nicht bloß eingekochte Säuren, gehören wahrscheinlich zu derselben Art von condensirten Säuren, wie die Indig- und die Oenylschwefelsäure.



Bilinverbindungen weichen nur in so fern davon ab, ein Theil Bilin durch Uebersättigung abgeschieden werden kann. Die mit den Säuren völlig gesättigte Bilinverbindung bezeichnet Berzelius mit dem Namen *Bilifellinsäure*.

Ob und über die Art, wie diese Säuren in der Galle enthalten sind, können wir erst in der Folge näher urtheilen.

I. *Analyse durch Bleisalze.* Frische Galle versetzt man mit wenig verdünnter Essigsäure oder mit ihrem doppelten Volum Alkohol, um den Schleim abzuschcheiden und dann mit neutralem essigsaurem Bleioxyde, wodurch man einen Niederschlag erhält, der hauptsächlich aus Bilin, verbunden mit Bleioxyd, und aus wenig öligem und margarinsaurem Bleioxyde besteht. Die abfiltrirte gelbliche Flüssigkeit wird hierauf mit Bleiessig versetzt, wodurch ein gelblicher pflasterähnlicher Niederschlag entsteht, wie vorher beschrieben, der alle Säuren der Galle mit Bleioxyd im Ueberschuss verbunden enthält, und in der Flüssigkeit bleibt Bilin aufgelöst. Wird der Niederschlag mit kohlensaurem Natron zersetzt, so fällt man kohlens. Bleioxyd und bilifellinsaures Natron, aus Schwefelsäure die Bilifellinsäure fällt. Wird das Filtrat mit Aether behandelt, so werden die beiden harzähnlichen Säuren zugleich mit einer Einmischung von fettsäuren ausgezogen und man erhält einen bitteren Rückstand von Bilifellinsäure mit Ueberschuss von Bilin.

Hieraus lässt sich schließen, dass die Galle Fellinsäure und Cholinsäure enthält, und dass die Metamorphose des Bilins schon in der Galle in dem Körper angedeutet hat, aber nach den Umständen in ungleichen Schritten. Man hat also keinen Grund zu vermuthen, dass Bilin in der Galle stehe zu der vorhandenen Bilifellinsäure und Cholinsäure in einem nothwendigen und bestimmten chemischen Verhältnisse.

. *Wirkung von Säuren auf Galle.* Alle Säuren fällen den Schleim aus der Galle, ist dieser abgeschieden, so kann man jede beliebige Menge Schwefelsäure oder Salz-

säure zu frischer Galle hinzusetzen, ohne daß ein Niederschlag entsteht.

Das Alkoholextract der Galle wird von Schwefelsäure, die mit 4 — 5 Th. Wasser verdünnt ist, völlig aufgelöst, wird die Lösung aber digerirt, so setzt sich ein grünliches dickes Liquidum ab, und nach Erkalten findet man oben schwimmend eine zähe Masse von Gallenfett, bestehend aus fetten Säuren, Fett und Cholesterin. Die syrupsartige Flüssigkeit am Boden ist Bilifellinsäure zugleich mit einer chemischen Verbindung von Bilin mit Schwefelsäure. Die Bildung dieses Körpers gründet sich darauf, daß das Bilin durch den Einfluß der Säure und Wärme in der Galle verändert wird, wobei Bilifellinsäure mit dem Minimum von Bilin gebildet wird, die in der sauren Flüssigkeit schwerlöslich ist und daher ausgefällt wird. Dieses ist Demargay's *Acide cholique*, Choleinsäure. Wird nun die Digestion weiter fortgesetzt, so zersetzt sich das Bilin, welches mit der Schwefelsäure verbunden ist, darauf, was mit den harzartigen Säuren verbunden ist, und am Ende bleiben nur diese übrig, außerdem sind Gallengrün und fette Säuren eingemischt. Niemals kann man bei verschiedenen Operationen ein gleiches Product erhalten.

Zur Bereitung des Bilins kann man sich des Niederschlages bedienen, welcher aus der Galle durch Digestion mit verdünnter Schwefelsäure erhalten wird, was er mit Aether und darauf mit geschlammtem Bleioxyd auf die früher erwähnte Weise behandelt wird. Das Gallengrün und die fetten Säuren werden theils vom Aether weggenommen, theils bleiben sie in dem basischen bilifellinsauren Bleioxyde zurück.

Die Eigenschaften der Choleinsäure nach Demargay fallen mit denen der Bilifellinsäure zusammen, bis auf einige Abweichungen, die zeigen, daß Demargay es mit einer Bilifellinsäure zu thun hatte, die einen Ueberschuß von den harzartigen Säuren enthielt, weil die Bilifellinsäure nicht durch Essigsäure gefällt, und

ichtigkeit von essigsaurem Kali und -Natron aufgelöst  
rd, was schon Thenard fand.

Das nach beendigter Metamorphose des Bilins der  
lle durch Einwirkung von Säuren übrigbleibende harz-  
liche Gemisch von Fellinsäure, Cholinsäure und Dys-  
in hielt Demarçay auch für eine einzige Säure, die  
Choloidinsäure nannte.

*V. Veränderung der Galle durch Kochen mit Alkali.*

Wenn nach Demarçay das Alkoholextract der Galle  
altend mit kaustischem Kali gekocht wird, bis sich  
n Ammoniak mehr daraus entwickelt, so soll der  
ze Bilingehalt in Cholsäure verwandelt werden, die  
dann mit dem Kali verbindet. Aber es erhellt  
Demarçay's Versuchen selbst, daß er theils Bili-  
insäure, theils Fellinsäure mit Cholsäure vermischt  
alten hatte, und es scheint nicht, daß bereits gebildete  
insäure und Cholinsäure in Cholsäure sich verwandeln.

Berzelius ließ eine Auflösung des Alkoholextracts  
ge Stunden mit einer Lösung von kohlensaurem  
i kochen, und das Gemisch von Zeit zu Zeit mit  
sser verdünnen, wenn es anfang Bilinkali abzusetzen,  
es dann so weit einengen, bis dieses sich daraus ab-  
ed, worauf die farblose alkalische Flüssigkeit abge-  
en, das Bilinkali in Wasser gelöst und mit Essigsäure  
lt wurde, worauf ein weißer leichter krystallini-  
r Niederschlag entstand, der getrocknet eine glän-  
e aus feinen Krystallen zusammengewebte Masse  
tellte, ganz so, wie Gmelin die Cholsäure beschreibt.

*Veränderung der Galle bei langer Aufbewahrung.*  
Galle hat in Folge ihres Gehaltes an Schleim eine  
se Neigung zu faulen, nach Abscheidung des Schleims  
nicht.

Die lange aufbewahrte eingedickte Ochsen-  
galle in den  
heken erleidet eine langsam fortschreitende Meta-  
phose. Berzelius untersuchte eine solche einge-  
te Galle nach ungefähr achtmonatlicher Aufbewah-  
. Diese wurde eingetrocknet, dann durch Aether  
Fettgehalt befreit, hierauf in Alkohol gelöst, wie



bereits früher angegeben, diese Lösung durch Chlorbarium und Barytwasser von den färbenden Stoffen trennt, worauf das Alkoholextract in Wasser gelöst und mit Essigsäure gefällt wurde. Es entsteht ein pflasterartlicher Niederschlag. Dieser wird in wenig Ammoniak aufgelöst und damit zur Honigdicke verdunstet. Die Masse löst sich in wenig Wasser, wird aber durch Kochen getrübt, und setzt nach anhaltendem Kochen einen weissen nicht zusammenbackenden Niederschlag ab, welcher in Ammoniak aufgelöst und mit Chlorbarium versetzt wird, wodurch ein weisser Niederschlag entsteht, welcher auch in der Wärme nicht zusammenbackt, den man mit kohlensaurem Natron zersetzt, wodurch kohlensaures Baryt abgeschieden wird und man eine Auflösung erhält aus welcher Salzsäure einen weissen Körper fällt, welchen Berzelius *Cholansäure* nennt.

Die oben bemerkte Lösung des Ammoniaksalzes, der durch Kochen die Cholansäure gefällt worden ist, giebt durch Salzsäure einen Niederschlag, dieser besteht aus Bilifellinsäure mit dem Maximum an Bilin, aus Säuren und aus einer eigenthümlichen Säure, die Berzelius mit dem Namen *Fellansäure* bezeichnet. Der oben bemerkte Niederschlag wird zur Scheidung der Körper zuerst mit Aether behandelt, welcher etwas Cholansäure auszieht und Fellinsäure, Oelsäure und Gallinsäure, die Fellansäure setzt sich zuerst darauf krystallinisch ab, dann mit Wasser, welches die Bilifellinsäure auflöst und die Fellansäure zurückläßt.

#### *Eigenschaften der Cholansäure.*

Diese Säure ist im trocknen Zustande weisslich abfärbend, geruch- und geschmacklos, schmilzt bei 100° C. und erstarrt beim Erkalten zu einer klaren durchscheinenden Masse, brennt wie ein Harz, ist in Wasser schwerlöslich, auch von Alkohol wird sie in der Kälte schwierig aufgelöst, in der Wärme leicht, und setzt sich beim Erkalten in krystallinischen Theilen freiwilligen Verdunsten als eine durchscheinende



ige Substanz ab. In Aether löst sie sich wenig, und zt sich daraus beim Verdunsten in freier Luft in er-  
ger Gestalt ab, wird aber das Glas bedeckt, bei lang-  
ner Verdunstung in Krystallen. Sie ist eine schwa-  
e Säure, entwickelt aber aus kohlensauren Alkalien  
hlensäure. Ihre Alkalisalze sind bitter, farblos gum-  
ähnlich und in Wasser und Alkohol leichtlöslich.  
rch Kochen mit kaustischem Kali wird sie nicht ver-  
lert, wohl aber durch Kochen mit Salzsäure; man  
ält dann einen Körper, der sich in Kali nicht auf-  
t, von kochendem Alkohol aber aufgenommen wird,  
che Lösung beim Erkalten sich nicht trübt und nach  
willigem Verdunsten einen weissen erdigen Körper  
terläßt, ähnlich dem, welcher nach freiwilligem Ver-  
sten einer Lösung von Dyslysin zurückbleibt.

#### *Eigenschaften der Fellansäure.*

Frisch gefällt bildet sie weisse, nicht zusammenhaf-  
de Flocken, die in der Wärme zu einem farblosen  
nidum schmelzen, welches beim Erkalten hart und  
durchscheinend wird. Wird der Niederschlag ge-  
eknet, so bildet er eine weisse erdige Masse; sie ist  
uch- und geschmacklos, leicht schmelzbar, in Wasser  
werlöslich, in Alkohol leichtlöslich, bei langsamem  
dunsten daraus krystallisirend; in Aether ist sie we-  
löslich, wird aber bei langsamem Verdunsten der  
ung daraus in Gruppen weicher Nadeln erhalten.  
e Salze mit Alkalien sind durchscheinend, gummi-  
lich und springen beim Trocknen, schmecken bitter,  
ngs etwas süßlich.

Es ergiebt sich aus dem Vorstehenden, daß die Galle  
inspissirten, nicht völlig eingetrockneten Zustande  
in fortschreitender Veränderung begriffen ist, durch  
che das Bilin fortdauernd vermindert wird, wodurch  
eben abgehandelten Producte, Cholansäure und Fel-  
säure entstehen. Da übrigens das Bilin schon in der  
tenblase anfängt verändert zu werden, so ist es mög-  
, daß diese Säuren auch schon in der frischen Galle

enthalten sein können; Berzelius konnte sie aber bis jetzt noch nicht darin auffinden.

Als weiteres Resultat ergibt sich, daß die frische Galle wesentlich eine Verbindung ist von Fellin, Bilifellinsäure, Cholinsäure, fetten Säuren und Gallergin mit Alkali. Durch diese werden Geschmack, Geruch und chemische Charactere bedingt. Außerdem enthält sie auch andere Bestandtheile in kleinen Mengen\*).

*Bemerkungen über einzelne der Bestandtheile.*

Das *Bilin* wurde außer Verbindung mit Gallensäure zuerst durch L. Gmelin dargestellt; er beschreibt es als körnig krystallisirt, mehr süßlich als bitter schmeckend und nannte es deshalb *Gallenzucker*. Es ist schon angegeben, daß diese Krystallisation von dem essigsauren Natron herrührt, mit dem es bei der Darstellung vermischt erhalten wurde. Das reine Bilin zeigt keine Spur von Krystallisation und Gmelin fand, daß sein Gallenzucker mit Säuren, Metallsalzen und Chlor keine Reactionen hervorbrachte; dies ist auch mit reinem Bilin der Fall. Von den Reactionen, die Gmelin von einer längeren Einwirkung von Schwefelsäure, verdünnter Salpetersäure und Salzsäure anführt, sieht man, daß bald Bilifellinsäure, bald harzartige Säuren hervorbrachte

---

\*) In Bezug auf das pharmaceutische Präparat *Fel Tenuissat.* wird die Abdampfung nach der Preufs. Pharmacopöe zweckmäßig bis zur Extractdicke fortgesetzt, und von vielen Apothekern noch weiter. Auch beobachtet man es und da das Verfahren, die frische Gallenflüssigkeit vor dem Eindampfen erst aufzukochen und zu coliren. Da der Gehalt an thierischem Schleim die wesentliche Ursache des Verderbens der Galle ist, und je weiter sie abgemildert wird, auch um so mehr die Ursachen ihrer freiwilligen Metamorphosen wegfallen, so ist es ohnstreitig am besten für dieses Präparat, die frische Gallenflüssigkeit mit einem gleichen Volum Alkohol zu vermischen, dann zu coliren und hierauf im Wasserbade zur festen Pillenconsistenz des Rückstandes zu verdunsten, oder selbst bis zur völligen Trockne.

lor wirkt allerdings kaum merklich auf Bilin ein; set man lange Chlor durch eine Lösung von Bilin 60° C., so verliert die Flüssigkeit ihre Farbe und unzerstörte Bilin wird durch die gebildete Salzsäure ändert. Es werden Bilifellinsäure und am Ende Fellinsäure und Cholinsäure gebildet, die nun farblos sind, er bei Behandlung mit kaustischem Ammoniak in der Wärme eine rothgelbe Farbe annehmen. Aus der zur Trockne verdunsteten Masse bekommt man Taurin, welches beim Auflösen des harzigen Rückstandes in Alkohol gelöst bleibt.

*Fellinsäure*, *Cholinsäure* und *Dyslysin* machen das, was man eigentlich *Gallenharz* nennen könnte. Was Senard als *Resine de la bile* beschrieb, ist ein Gemisch von Bilifellinsäure und Cholinsäure mit fetten Säuren und mit dem grünen Farbstoff; was er unter dem Namen *Picromel* beschrieb, ist ein Gemisch von Bilifellinsäure, Cholinsäure und von fetten Säuren. Was Gmelin als *Gallenharz* beschrieben hat, war ein Zersetzungsproduct von Bilin, und bestand aus Fellinsäure, Cholinre und Dyslysin. Was er *Gliadin* nannte, könnte Dyslysin gewesen sein. Gmelin fällte die Galle, nach Abcheidung des Niederschlages durch Bleizucker, mit Essig. Dieser Niederschlag enthält, wie wir bereits gesehen haben, bilifellinsaures Bleioxyd und basisch-phosphors. Blei und Chlorbilin. Der Niederschlag wurde mit Essigsäure und Wasser verbreitet und durch Schwefelwasserstoff zersetzt und die vom Schwefelblei abfiltrirte Lösung verdunstet, wobei der darin übergegangene Theil von Salzsäure allmählig das Bilin veränderte, aus dieser sauren Flüssigkeit setzte sich *Gallenharz* ab und am Ende wurde daraus *Taurin* erhalten. Diese Metamorphose wird vermieden durch das von Berzelius angegebene Verfahren, den Bleiniederschlag mit kohlensaurem Alkali zu zersetzen und die Bilifellinsäure mit einer stärkeren Säure zu fällen.

Die *Cholsäure* wurde von Gmelin erhalten und ist ebenfalls ein Zersetzungsproduct des Bilins. Demar-

gay hat gelehrt, sie in jeder beliebigen Menge durch Metamorphose des Bilins beim Kochen mit kaustischem Alkali zu bereiten. \*)

*Biliverdin*, Gallengrün. Dieses wird dargestellt, wenn man eine alkoholische Lösung von ungetrockneter Galle mit einer Lösung von Chlorbaryum in kleinen Portionen vermischt. Der Niederschlag wird erst mit Alkohol dann mit Wasser gewaschen und noch feucht durch verdünnte Salzsäure aus dem Biliverdinbaryt die Baryterde ausgezogen, worauf das Biliverdin zurückbleibt, das man zur Entfernung eines Rückhalts von Fett mit Aether behandelt. Das Ungelöste wird mit kaltem absolutem Alkohol geschüttelt, der das Biliverdin auflöst, einen Theil desselben mit einer noch nicht näher bestimmten thierischen Substanz zurücklassend. Die Auflösung hinterläßt durch freiwilliges Verdunsten das Biliverdin als einen fast schwarzbraunen erdigen Körper, durch Verdunsten in der Wärme als einen glänzenden durchscheinenden dunkelgrünen Ueberzug.

Das Biliverdin ist grünbraun, pulverförmig, geruch- und geschmacklos, wird beim Glühen zerstört ohne zu schmelzen, und ohne Entwicklung ammoniakalischer Producte, hinterläßt aber viel poröse Kohle. Es ist löslich in Wasser, in kaust. und kohlens. Alkalien mit grüner Farbe, und wird daraus durch Säuren in dunkelgrüne Flocken gefällt. Seine Auflösung in kohlens. Ammoniak verliert beim Eintrocknen das Ammoniak, und es wird darauf in Wasser unlöslich. Durch Doppeltausch kann es mit andern Basen verbunden werden. In Alkohol ist es wenig löslich und wird daraus durch Wasser gefällt. Von Aether wird es aufgelöst, meist mit rother Farbe, obwohl nur wenig aufgenommen wird, auch die concentr. Alkohollösung ist beim Durchseihen fast roth. Es verbindet sich auch mit Fett, welches dadurch grün wird. Von Schwefelsäure und Salzsäure wird es mit grüner, von concentr. Essigsäure mit rother

\*) S. d. Zeitschr. 2. R. Bd. XVI, 36.



be gelöst. Durch Salpetersäure wird es allmählig zersetzt und die Lösung gelb. Die in Alkohol unlösliche Modification, welche das Bilin mit einem Thierstoffe verbunden enthält, läßt diese dabei farblos und flockig zurück.

Diese Eigenschaften des Biliverdins stimmen in Allem mit denen des Chlorophylls überein, so daß Berzelius damit als identisch betrachtet und es auch aus verschiedenen Gallen in allen drei Modificationen erhalten.

Das jetzt Angeführte gilt natürlich nur für das Biliverdin aus der Ochsen-galle, vielleicht auch aus der Galle anderer grasfressender Thiere. In der Galle fleischfressender Thiere besitzt es ganz andere Eigenschaften, ist darin mit noch einem andern Farbstoffe verbunden, von dem man es bis jetzt noch nicht trennen konnte.

**Bilifulvin.** Diese aus der eingedickten Ochsen-galle erhaltene rothgelbe, krystallisirte Substanz erfordert noch genaueres Studium. Nach Ausfällen einer Alkohol-lösung der Galle mit Chlorbarium giebt Barytwasser einen neuen Niederschlag mit der Gallenlösung, der erst grün ist, dann grün wird, und endlich braungelb, und nach Auswaschen erst mit Alkohol, dann mit Wasser, in Barytbaryt zurückläßt. Die abfiltrirte Lösung giebt mit Bleizucker einen dunkelgraugrünen Niederschlag und wird rothgelb. Nun wird sie mit Bleiessig versetzt, wodurch man einen rothgelben Niederschlag erhält, auf welchem ein hellgelblicher leichter sich sammeln, der aber nicht leicht mechanisch sich abscheiden

Werden diese Niederschläge in Wasser verrieben und dann durch Schwefelwasserstoff zersetzt, so erhält man eine gelbe Lösung, welche nach Verdunsten ein rothbraunes Extract giebt, welches man in Alkohol löst; diese Lösung liefert durch freiwilliges Verdunsten kleine rothgelbe Krystalle, welche das Bilifulvin darstellen. Der Niederschlag, welcher durch Bleizucker erzeugt wird, enthält neben Biliverdin auch Margar-



# Ueber die Mischung und einige Eigenschaften des sauren äpfelsauren Kalks;

von

*H. Wackenroder.*

**D**er zuvorkommenden Güte des Hrn. Dr. Bley in Bernburg verdanke ich eine gute Quantität des sauren äpfelsauren Kalks, welcher bei der Bereitung der Aepfelsäure aus dem Vogelbeersafte nach der Methode von Trommsdorff war erhalten worden. Nach dieser Methode wird bekanntlich der Vogelbeersaft mit Bleizucker vermischt und der Niederschlag mit verdünnter Schwefelsäure zerlegt. Aus der Flüssigkeit wird mittelst Schwefelwasserstoffs der letzte Rest von Blei fortgeschafft, und die Flüssigkeit dann mit thierischer Kohle entfärbt. Beim Verdampfen derselben erhält man gewöhnlich grofse Krystalle, welche nichts anderes sind als reiner saurer äpfelsaurer Kalk. Das Salz bildet dichte, weifse Salzrinden. Ausser einer geringfügigen und sehr schwierig nachzuweisenden Spur von Kali habe ich keinen Kalk in dem Salze gefunden. Citronensäure oder Weinsäure habe ich ebenfalls nicht darin entdecken können und deshalb dieses Salz auch zur Darstellung einer reinen Aepfelsäure benutzt nach einer neuen, mir recht zweckmäfsig scheinenden Methode, die ich später mittheilen will.

Um vollständigere Krystalle des Kalksalzes zu erhalten, wurde dasselbe in warmem Wasser aufgelöst und die etwas trübe Flüssigkeit filtrirt. Bei langsamem Verdampfen und allmähligem Abkühlen entstanden sehr schöne, grofse, weifse, meistens concentrisch-strahlige Krystalldrusen von starkem Glas- bis Perlmutterglanz. Die ziemlich harten, mit einander verwachsenen Krystalle sind längsgestreift und auf dem Bruch blättrig. Ihre frei stehenden Enden zeigen sich als *gerade rhombische Prismen*, die an den spitzen Ecken bis zur Zuspitzung abgestumpft sind, ganz ähnlich den Coelestinen.

krystallen. Mehre Krystalle erschienen als sechsseitige Prismen, entstanden durch Abstumpfung zweier Seitenanten des rhombischen Prisma, welches als die *Grundform* dieses Salzes betrachtet werden kann.

Die Reinheit und vollständige Krystallisation des Salzes forderte zu einer Analyse desselben auf, zumal da die verschiedenen Verbindungen des Kalks mit Aepfelsäure noch einige Ungewissheit herrscht. Man nimmt zwar meistens an, daß nur zwei Salze dieser Art existiren, ein neutrales und ein saures Salz; indessen ist wohl nicht daran zu zweifeln, daß auch ein *übersaurer* äpfelsaurer Kalk bestehe, und wahrscheinlich auch ein *basisches* Salz, namentlich der voluminöse schleimige Niederschlag, welcher nach dem Vermischen von Aepfelsäure mit Chlorcalcium und Ammoniak auf Zusatz von Aether-Weingeist entsteht. Zuletzt haben Richardson und Herzdorf (s. *Annal. der Pharm. Bd. 26. H. 2. p. 135*) den neutralen und sauren äpfelsauren Kalk analysirt. Sie versetzten, um das neutrale Salz zu gewinnen, verdünnte Aepfelsäure in der Kälte mit überschüssigem kohlensauren Kalk, wobei aber die Auflösung ihre stark saure Reaction nicht verlor. Beim Erhitzen der Flüssigkeit krystallisierte sich aber ein krystallinisches Salz, welches in Wasser und in überschüssiger Aepfelsäure kaum auflöslich befunden wurde. Die Zusammensetzung desselben gaben sie zu  $2 \text{Ca O} + \overline{\text{M}} + 2 \text{aq.}$ , in welcher Formel  $\overline{\text{M}}$   $\text{C}_8 \text{H}_8 \text{O}_8$  gesetzt worden ist. Durch Verdampfen des Aepfelsäure genau neutralisirten Kalkwassers unter dem Recipienten der Luftpumpe erhielten sie glänzende strahlige Krystalle, während die rückständige Flüssigkeit eine saure Reaction angenommen hatte. Die Mischung dieses bei gewöhnlicher Temperatur getrockneten Salzes ergab sich ihnen zu  $2 \text{Ca O} + \overline{\text{M}} + 4 \text{aq.}$  Als Auflösung desselben in Wasser bis zum Sieden erst wurde, so fiel das erstere Salz mit 2 aq. nieder, welches durch Erhitzen bis zu  $150^\circ$  verliert der leichtlösliche neutrale äpfelsaure Kalk 2 aq. und wird unlöslich in Wasser. Bei  $200^\circ$  wird das Salz alles Krystallisa-

tionswassers beraubt. Von dem sauren äpfelsauren Kalk, welchen sie analysirten, wird blofs angeführt, daß er wohlkrystallisirt und rein gewesen sei. Bei gewöhnlicher Temperatur war das Salz  $\text{Ca O} + \bar{\text{M}} + 9 \text{ aq.}$ , bei  $100^\circ$  getrocknet ergab sich die Mischung zu  $\text{Ca O} + \bar{\text{M}} + 5 \text{ aq.}$  und bei  $185^\circ$  getrocknet zu  $\text{Ca O} + \bar{\text{M}} + \text{aq.}$

Unser Salz, dessen Entstehung und physikalischen Eigenschaften oben angeführt worden, wurde analysirt durch bloße Zerstörung der Aepfelsäure im Feuer und quantitative Bestimmung des Kalks. Nachdem dasselbe an trockner atmosphärischer Luft längere Zeit gelegen hatte, wurde 1,0 Grm. desselben in einer Platinschale erhitzt. Das Salz schmolz vollständig, blähte sich stark auf, entwickelte scharfe, stechend sauer riechende, in Thränen reizende Dämpfe, und verkohlte alsdann, wobei nur ein schwaches Verbrennen mit Flamme statt fand. Der Rückstand wurde so lange mäßig erhitzt, bis er eine graue Farbe angenommen hatte, um nun als kohlensaurer Kalk in Rechnung gebracht werden zu können. Seine Menge entsprach 13,5 Proc. reinem Kalk.

Bei einem zweiten Versuche, welchen Hr. Kolbe, Mitglied unsers pharmaceutischen Instituts, anstellte, wurden nur 12,4 Proc. Kalk gefunden. Die Differenz von 1,1 Proc. rührte aber davon her, daß man den kohlensauren Kalk länger erhitzte, als im ersten Versuche geschah. Es bestätigte sich hierbei abermals die Erfahrung von der leichten Zersetzbarkeit des kohlensauren Kalks, wenn derselbe mit Kohle erhitzt wird. Aus diesem Grunde wird, wie ich in den *Annal. der Pharm.* B. 24. gezeigt habe, das *sal tartari* auch stets mit Kalk und zwar nicht unbeträchtlich verunreinigt. Im Interesse solcher Analysen, wie die des äpfelsauren Kalks und der so häufig vorkommenden des oxalsauren Kalks haben wir einige vergleichende Versuche angestellt, welche hier eine Erwähnung finden mögen. Wird nämlich reiner weinsaurer Kalk so lange an der Luft erhitzt, bis er weiß oder nur hellgrau erscheint, so nimmt aufgegossenes Wasser eine starke alkalische Reaction an, und



es entsteht Kalkwasser. Bleibt der Rückstand aber *grau*, so theilt er dem Wasser keine alkalische Reaction mit, obgleich er meistens angefeuchtetes Kurkumäpapier bräunt. Der Gewichtsverlust im letztern Falle, herbeigeführt durch Austreibung einer kleinen Menge von Kohlensäure, ist jedoch sehr gering und in der Regel, z. B. beim Verbrennen der Filtra mit oxalsaurem Kalk, proportional der Gewichtsvermehrung durch den kleinen Rückhalt von Kohle. Will man den Kalk durch heftiges Glühen in ätzenden Kalk verwandeln, so muß man ihn nach dem Glühen mit etwas Wasser benetzen und nochmals heftig glühen. Man erreicht aber nicht leicht, daß der Kalk ohne alle Gasentwicklung in verdünnter Oxalsäure sich auflöst. Noch schwieriger ist es, den Kalkrückstand durch Erhitzen mit kohlensaurem Ammoniak vollkommen in kohlensauren Kalk zu verwandeln. Das Erhitzen des Kalkrückstandes mit festem kohlensaurem Ammoniak fruchtet wenig, und selbst, wenn man etwas Wasser hinzufügt, dieses langsam verdampft und nun wieder schwach erhitzt, bleibt der Rückstand noch alkalisch. Am genauesten ist es immer, wenn man zur Bestimmung des Kalks nach dem bis zur hellgrauen Farbe geglühten Rückstande nicht gelten lassen will, den Rückstand in verdünnter Salpetersäure aufzulösen, die geringe Menge von Kohle durch ein Filtrum zu trennen, und nun den Kalk in der Wärme mit ätzendem kohlensaurem Ammoniak zu fällen. Den Niederlag wäscht man mit ammoniakalischem Wasser aus, deknet und erhitzt ihn dann schwach. In der Flüssigkeit bleibt nur eine mit Oxalsäure kaum zu erkennende Spur von Kalk zurück. Als der Rückstand vom Glühen 1,0 Grm. des äpfelsauren Kalks auf diese Weise behandelt worden, ergab sich ein Kalkgehalt von 13,10 p. c., also um 0,4 Proc. geringer, als nach der ersten Bestimmung.

Die zuletzt erhaltene Menge des Kalks entspricht vollkommen genau der Formel  $\text{Ca O, Aq} + \overline{\text{M}} + 8 \text{ aq.}$  für das Kalksalz, also derselben, welche Richardson

und Merzdorf berechneten, und welche auch aus einer der früheren Analysen Braconnot's (s. *Gmelin's Handb. II. p. 106*) abzuleiten ist. Dieser einbasische oder saure äpfelsaure Kalk löst sich nur in heißem Wasser ziemlich leicht auf. Dagegen ist er in Alkohol von 96  $\frac{9}{10}$  selbst in der Siedhitze so gut wie ganz unlöslich. Auch wässriger Weingeist, etwa von 70  $\frac{9}{10}$ , löst ihn beim Kochen nur theilweise auf, und läßt ein pulvriges, in Wasser nur wenig lösliches Salz von neutralem äpfelsauren Kalk zurück. Erkalte die starke saure weingeistige Auflösung, so krystallisiren kleine, aber vollständige, sechseckige, zweiflächig zugeschärfte, glasglänzende, durchsichtige Prismen aus, welche nichts anders sein können, als der obige saure äpfelsaure Kalk. Die Krystalle verschwinden aber wieder, so wie der Weingeist an der Luft verdunstet und die Auflösung wässriger wird. Nach allmäliger Verdampfung des Wassers hinterbleibt ein in feinen Nadeln krystallisirtes Salz mit einem flüssig bleibenden syropartigen Rückstande. Jenes Salz zeigt sich nicht minder kalkhaltig, als der unkrystallisirte Rückstand, und beide können als *übersaure* Kalksalze angesehen werden. Offenbar ist, was man auch bei Pflanzenanalysen zu bemerken Gelegenheit hat, das krystallisirte saure Kalksalz fähig, einen Theil seiner Säure in Verbindung mit Kalk an *wässrigen* Weingeist abzutreten. Das *übersaure* Kalksalz giebt dagegen an Alkohol von 96  $\frac{9}{10}$  fast reine Aepfelsäure ab. Beim Erhitzen kocht es heftig, giebt erstickend saure Dämpfe aus, und hinterläßt sehr wenig kohlensauren Kalk.

## Bemerkungen über verschiedene Gegenstände;

vom

Apotheker *Bolle* in Angermünde.

### *Bereitung der Calcaria sulphurato-stibiata.*

**B**efolgt man bei Bereitung dieses Präparats die Vorschrift der *Pharm. borussica*, so gelingt es selten, je

ichtigen Punct des Glühens der Mischung, auf den Alles kömmt, zu treffen. Die Decke von Austerschaalen, unter der sich die Mischung befindet, ist ein Hinderniß, unter eine Probe herauszunehmen, und je öfter man dies thun wollte, je öfter käme man in Gefahr, von den Austerschaalen der Mischung unter die Decke zu bringen. Wiederum aber: will man diese Gefahr umgehen, so arbeitet man aufs Gerathewohl und man erhält ein unbrauchbares Präparat, das zwar beim Uebergießen mit Salzsäure genug Goldschwefel zeigt, das aber in einer filtrirten Abkochung, beim Zusatz von Salzsäure, sich nicht ausgeschiedenem Goldschwefel kaum gelb färbt.

Sicher kömmt man zu einem erwünschten Ziele, wenn man auf folgende Art verfährt:

Man wähle eine, auch im Boden gleichförmige dünne gewöhnliche Arzneiflasche aus, fülle sie bis zu Dreiviertel mit dem Gemenge aus Austerschaalen, Spiessglanzmehl und Schwefel, verschliesse die Flasche möglichst gut mit einem Kreidestöpsel und füttere sie in einen Schmelztiegel mit trockenem Sande bis an das Halsgewölbe ein. Vorgerichtet, bringt man den Tiegel mit seinem Inhalte in den Windofen und feuert vorsichtig. Wenn der Tiegel unten zum Glühen kömmt, erhebt sich ein Schwefelflämmchen um dem Kreidestöpsel des Glases. Man verstärkt das Feuer, bis das Flämmchen erlischt, entfernt ersteres dann schnell, schließt die Züge des Ofens und läßt erkalten. Noch etwas warm bringt man den Inhalt der Flasche, die *Calcaria sulphurato-stibiata*, in gut verkorkte verpichte Flaschen. Sie hat die vorgeschriebene Farbe und röthet sich je länger je mehr.

solches Präparat, das mehre Monate alt war, wurde untersucht:

50 Gran desselben wurden in einem Kolben zu vier Theilen, mit je 1000 Gran destillirten Wassers, eine vierstunde lang gekocht. Unterdessen hatte sich der ursprüngliche Inhalt des Kolbens, obgleich nach jedesmaligem Umrühren Zeit gelassen wurde zum Absetzen, auf das Filter geschlämmt. Dasselbe wurde nun so lange mit

kochendem Wasser übergossen, bis eine Probe der ablaufenden Flüssigkeit, bei Zusatz von Salzsäure, nur gelblich gefärbt wurde. Es waren in Allem 30 Unzen Wasser aufgewendet worden. Die klare Flüssigkeit wurde so lange mit reiner Salzsäure versetzt als noch ein Niederschlag von Goldschwefel entstand. Dieser gesammelt, ausgewaschen und getrocknet, wog  $8\frac{1}{2}$  Gran.

Es wurde also der grösste Theil der Summe des angewendeten Spießsglanzes und Schwefels als Goldschwefel erhalten. Nach der Rechnung hätte dieser 136. betragen müssen.

### *Ferrum sulphuratum.*

Abschnitte von recht dünnem, nicht verrostetem Eisenblech (gebrauchte und mit Säure gereinigte Spießfedern), werden in einem bedeckten Schmelztiegel zur Weissglühhitze gebracht und ihnen bei dieser Temperatur, in schneller Folge, Schwefel in Stücken zugesetzt. Bei einem gewissen Punkte, wenn Schwefel genug hinzukam, scheint es, als wenn die Masse plötzlich, in dem Aufschlagen einer Lohe begleitet, in Fluss kömmt, aber auch eben so plötzlich erstarrt sie wieder zu einem purpurroth glühenden Kuchen. Hierbei bedeckt man den Tiegel und glüht noch etwas tüchtig, läßt erkalten und zerschlägt den Tiegel. Das darin enthaltene Schwefeleisen ist von metallischem Glanze, dem Schwefel sehr ähnlich, oft bunt angelaufen und entwickelt sich bei niedriger Temperatur lebhaft einen Schwefelwasserstoff, der zu  $\frac{3}{4}$  von Kalilauge absorbirt wird. Verlangt man eine andauernde, langsame Entwicklung des Gases, wie solche oft nöthig, so muß man grössere Stücke des Schwefeleisens mit Schwefelsäure in Berührung bringen.

### *Destillation von Acidum hydrocyanicum.*


Bei einem Präparat von der Wichtigkeit des genannten ist gewiss auch der kleinste Beitrag zu dessen sicherer Bereitung ein Gewinn. Das Spritzen der M-



ung bei der Destillation dieser Säure war Ursache, die *Pharm. borussica* das Verschließen der Oeffnung Destillatirgefäßes mit Gaze vorschrieb. Dies Spritzen wird ganz verhindert, wenn man Platindräthe in die zu destillirende Gemenge bringt, und sind abgenutzte Leinwandstücke, wie solche zur Zeit leicht zu erlangen sind, nachdem man sie von ihrer oxydablen Fassung befreit, ganz geeignet zu dem Zwecke.

### Das Filtriren.

Es ist nicht zu bezweifeln, daß das mehr oder weniger schnelle Filtriren einer Flüssigkeit zum Theil von der Höhe der in dem Filter stehenden Flüssigkeitssäule bedingt wird. Ist letztere von gleichbleibender Höhe, so wird, *caeteris paribus*, die Filtration auch gleichförmig fortgehen. Bei der größten Aufsicht wird ein gleichbleibendes Niveau in dem Filter nicht zu erhalten sein. Man wird dem aber sehr nahe kommen, wenn man eine Vorrichtung anwendet, wie sie von Berzelius zum Auswaschen gegeben wurde. Diese Auswaschen sind aber theils wegen ihrer engen Röhren, theils wegen ihrer künstlichen Zusammensetzung, theils, weil sie nur auf das Durchlassen einer an sich klaren Flüssigkeit berechnet sind, nicht practisch, ihr Princip ist auch für Filtrationen brauchbar. Man ziehe ein Glasrohr in eine Spitze aus, deren Oeffnung man nach Belieben erweitern kann. Ein zweites Glasrohr wird U-förmig gebogen. Beide Röhren werden in Einen Kork mit zwei passenden Löchern durchbohrten Kork gebracht, mit diesem eine, mit der zu filtrirenden Flüssigkeit versehene Flasche verschlossen. Stürzt man nun die Flasche um, daß die ausgezogene Spitze etwas tiefer als die Biegung des gebogenen Glasrohrs in die Flüssigkeit taucht, so wird in gewissen Perioden das Filtrum sich von selbst füllen und keiner weiteren Aufbedürfen, als daß man von Zeit zu Zeit die Flasche füllt.



Die nebenstehende Zeichnung wird den Apparat ohne weitere Erklärung verständlichen. Durch das heberförmig gebogene Rohr *a* tritt die Luft in die Flasche, durch das zugespitzte Rohr *b* die Flüssigkeit in das Filtrum. Um die Flasche auf das Filtrum umgestürzt zu befestigen, bediene ich mich eines zu einem entsprechenden Loche versehenen Tischchens, dessen Höhe durch Unterlagen und Auflagen (letztere Bretter verschiedener Dicke und gleichfalls zu einem Loche versehen) nach Bedürfnis abgeändert wird. Einiger Gebrauch des Apparats giebt bald die nöthige Fertigkeit in Anwendung desselben und hier will ich noch so viel bemerken, als

das gebogene Rohr das Zufließen der Flüssigkeit bedingt, daher so in dem Kork befestigt sein muß, daß man ohne Weiteres auf- und abschieben kann: dennoch, wo möglich, keine Flüssigkeit nebenbei durchlassen. Ich füge noch hinzu, daß man das gebogene Rohr, während des Umkehrens der Flasche, mit einem Körtchen verschließen hat, und daß es darum wie wegen des letzten Aufsteigens der Luft nicht zu dünn sein darf.

*Die Hülfe der Rechnung zur Erlangung eines gegen specifischen Gewichts einer Flüssigkeit.*

Die Arbeit des Hrn. Georg Krug, welche in einer der gegenwärtigen ähnlichen Ueberschrift in Septemberhefte dieses Archivs erschienen ist, giebt mich Veranlassung zu bemerken, daß ein Freund und ich schon im Jahre 1835 und zwar im *Berl. Jahrb. der Phil.* XXXV. Bd. II. Abth., unter der Chiffre S. & E. denselben Gegenstand besprachen. Wir berücksichtigten aber nicht allein den Fall, in welchem eine Flüssigkeit

it durch Zusatz von Wasser spec. leichter, sondern  
 ch den, wo solche, durch Verdunstung des Wassers,  
 ec. schwerer gemacht werden soll, so wie auch die  
 lle, wo durch Vermischung mit einer andern zwar  
 emisch-gleichartigen, in ihren spec. Gewichten aber  
 schiedenen Flüssigkeit eine solche von einem gege-  
 en spec. Gewichte erlangt werden soll. Die schul-  
 rechte Entwicklung der für alle diese Fälle gegebenen  
 gemeinen Formeln gehört meinem der Mathematik  
 adigen Freunde, mir aber die Idee zu solchen und  
 en Anwendung für die Praxis, der ich sie so über-  
 , daß man des Verstehens einer mathematischen For-  
 l überhoben war und nur der gewöhnlichen Rech-  
 ng mit Zahlen bedurfte. Seitdem habe ich mich der  
 hnung immer bedient, wo von der Erlangung eines  
 timmten spec. Gew. die Rede war, und viel an Zeit,  
 he und Kosten erspart. Hrn. Krug's Arbeit aber  
 bt ein Zeugniß, daß wohl das Bedürfnis gefühlt, bei  
 phen pharmaceutischen Arbeiten einen Wegweiser zu  
 en, daß aber unsere dahin gehende Abhandlung im  
 l. *Jahrb. der Pharmacie* wenig bekannt wurde. Es sei  
 daher vergönnt, dieselbe hier noch einmal im Aus-  
 e mitzutheilen, indem ich bloß für diejenigen schreibe,  
 che eine algebraische Formel zu handhaben wissen.

Wenn  $P$  das absolute Gewicht einer Flüssigkeit und  
 $p$  deren spec. Gew.,  $\pi$  aber dasjenige spec. Gew. bedeu-  
 auf welches sie durch Verdünnen mit destillirtem  
 sser (spec. Gew. = 1) gebracht werden soll, so wird  
 Rechnung durch folgenden allgemeinen Ausdruck,  
 bei  $x$  die Menge des hinzuzufügenden Wassers ver-  
 , geleitet:

$$\frac{P (p - \pi)}{p (\pi - 1)} = x.$$

Soll eine Flüssigkeit durch Verdunstung von Was-  
 auf ein höheres spec. Gew. gebracht werden, das  
 n enthaltene Wasser also subtrahirt werden, so wird  
 die Formel nur durch Umkehrung der Factoren des  
 lers verändern können; sie wird also sich stellen:



$$\frac{P (\pi - p)}{p (\pi - 1)} = x.$$

Ist der Fall gegeben, daß eine Flüssigkeit durch Vermischen mit einer gleichartigen, aber spec. leichter Flüssigkeit (beide können spec. leichter oder auch schwerer als Wasser sein) spec. leichter gemacht werden soll, so kann nach folgender Formel berechnet werden, wie viel der leichtern Flüssigkeit zu der zu schwereren mischt werden muß, um diese letztere auf ein bestimmtes spec. Gew. zu bringen. In dieser Formel bedeutet wieder:  $P$  das absolute Gewicht der spec. leichtermachenden Flüssigkeit,  $p$  deren spec. Gew.,  $\pi$  das spec. Gew., was erlangt werden soll, und  $p$  dasjenige spec. Gew. jener Flüssigkeit, von der man in Frage stellt, welcher Menge ( $x$ ) man hinzuzumischen habe.

$$\frac{Pp (p - \pi)}{p (\pi - p)} = x.$$

Umgekehrt wird gefragt: Wie viel Flüssigkeit von einem höhern bekannten spec. Gew. ist nöthig, um eine andere spec. leichtere Flüssigkeit von bekannten absoluten und spec. Gewichten auf ein verlangtes höheres spec. Gew. zu bringen? Zur Beantwortung dieser Frage wird die Rechnung durch nachstehende Formel ausgedrückt, in welcher die Zeichen die vorhin angegebene Bedeutung haben:

$$\frac{Pp (\pi - p)}{p (p - \pi)} = x.$$

Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß die Berechnung nie jene Verdichtung, welche allemal beim Vermischen von Flüssigkeiten von differentem spec. Gew. statt findet, berücksichtigen kann, indessen wird doch der Vermischung der berechneten Mengen hervorgehende spec. Gew. sich allemal in den Grenzen befinden, die die *Pharm. boruss.* durch Angabe des Maximums und Minimums des spec. Gew. gesteckt, mindestens so, daß man nicht Flüssigkeiten von gar zu großem und gar zu geringem spec. Gew. zu respectiven Mengen zu mischen hat. Wenn aber Hr. Kunz bei Anwendung



hnung zu einem Experimente, letzteres genau mit  
erer zusammentreffend fand, so ist zu bemerken, daß  
Experiment gerade mit einer so zähen, dem Areo-  
er so anhaftenden Flüssigkeit gemacht wurde, daß  
Instrument dazu, zu einem halbwege genauen Ver-  
e gar nicht zu brauchen ist.

Der Mathematiker wird an vorliegender Darstel-  
sweise Manches aussetzen haben und Manches für  
flüssig halten, indem namentlich Eine der aufgestell-  
formeln allen Fällen angepaßt werden kann; der  
auch dieser Formeln in der Pharmacie aber schien  
le die vorliegende Darstellungsweise zu erheischen.

## Zweiter Abschnitt.

### Centralbericht.

#### Krystallisirtes Elemiharz.

Bei einer früheren Analyse des kryst. Elemiharzes  
t H. Rose 83,25 C, 11,34 H, 5,41 O; Hefs fand  
en 85,36 C, 11,51 H, 3,13 O, woraus er die Formel  
66 O ableitet. Die Schwierigkeit der vollständigen  
rennung sehr kohlenstoffreicher Körper mit bloßem  
roxyde veranlaßte H. Rose, die Analysen dieses  
s zu wiederholen mit chromsaurem Bleioxyd wie  
upferoxyd und Sauerstoff. Eine große Zahl von  
sen führten zu dem Schluss, daß das Resultat der  
sen von Hefs das richtige sei, nur erhielt Rose  
etwas Wasserstoff mehr, so daß 2 At. Wasser-  
mehr in die Formel aufgenommen werden könnten.  
zusammensetzung nach diesen beiden Formeln würde

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 40 At. C.....85,66 | 40 At. C.....85,36 |
| 66 „ H.....11,53   | 68 „ H.....11,85   |
| 1 „ O..... 2,81    | 1 „ O..... 2,79    |
| 100.               | 100.               |

emiharz, welches aus seinen Auflösungen in Al-  
krystallinisch sich abscheidet, kann unter gewissen  
nden aus dem Weingeist Wasser oder dessen Be-  
teile aufnehmen, welches Wasser es bei langem

Erhitzen in der Temperatur des kochenden Wassers nicht verliert. Dieses Hydrat ist völlig amorph und glasartig, und kann auch in sehr feinen Körnchen dem krystallisirten beigemengt sein, die erst durch wiederholtes Auflösen des Harzes in kochendem Alkohol und Krystallisation der heißen Auflösung verschwinden. Das krystallisirte Elemiharz läßt sich auf verschiedenen Weisen in das Hydrat verwandeln. Eine Auflösung des kryst. Harzes in so viel Alkohol, daß beim Erhitzen nichts sich abscheidet, läßt man z. B. über Schwefelsäure unter der Luftpumpe auf einem warmen Sandbade so rasch wie möglich durch anhaltendes Auspumpen verdampfen. Die abgedampfte Masse, unter dem Mikroskop beobachtet, zeigt sich dann theils aus Krystallen, theils aus glasartigen Massen bestehend, in stets sehr verschiedenen Verhältnissen; was sich zuerst an die Wände des Gefäßes absetzt, ist größtentheils glasartig, was zuletzt beim Abdampfen am Boden ausscheidet, ist krystallinisch. Man kann diese Harze aber nicht voneinander trennen. Auch das Harz bindet verschiedene Mengen von Wasser. Analysen des Hydrats, mit dem krystallisirten Harze gemengt, gaben z. B. folgende Resultate:

|                  |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|
| Kohlenstoff..... | 40,61 | 76,93 | 83,29 |
| Wasserstoff..... | 11,76 | 11,73 | 11,51 |
| Sauerstoff.....  | 47,63 | 11,43 | 5,20  |
|                  | 100   | 100   | 100.  |

Im ersten Falle berechnen sich über 50 % Wasser. Im letztem nur ein paar Proc., ungeachtet seiner fast vollkommenen glasartigen Structur. Durch Behandeln mit Alkohol geht übrigens das Hydrat leicht in das kryst. Harz über, welches das eigentlich reine Harz und von unveränderlicher Zusammensetzung ist. Das krystallisirte Harz hält, wie schon oben bemerkt, beim Trennen aus dem Alkohol Wasser zurück und verwandelt sich dadurch zum Theil in Hydrat; es scheint dazu eine bestimmte Temperatur zu gehören. Elemiharz, aus einer heißen alkoholischen Auflösung durch Erhitzen abgeschieden und in einer Temperatur getrocknet, die nicht die des kochenden Wassers erreichte, war zum Theil in glasartige Krusten verwandelt. Die Analyse davon ergab:

|                  |       |
|------------------|-------|
| Kohlenstoff..... | 67,84 |
| Wasserstoff..... | 11,50 |
| Sauerstoff.....  | 20,66 |
|                  | 100.  |

Hierin berechnen sich ohngefähr 20 % Wasser. Die-  
s Verhalten der Hydratbildung des kryst. Elemiharzes  
rdient um so mehr Berücksichtigung, als die in der  
atur vorkommenden Harze bekanntlich oft aus zwei  
er mehrten Modificationen bestehen, die in einander  
ergehen. (*Poggend. Annal. XXXVIII, 61.*)

## Peucedanin.

Das von Schlatter in der Wurzel von *Peucedanum officinale* entdeckte Peucedanin läßt sich aus der Wurzel leicht darstellen, wenn man dieselbe mit Alkohol digerirt, diesen zum größten Theil abdestillirt und die Flüssigkeit dann ruhig stehen läßt, wo das Peucedanin auskrystallisirt, indem zugleich eine harzähnliche gummöse Substanz sich ausscheidet, von welcher man die Krystalle durch Umkrystallisiren aus Alkohol, oder noch besser aus Aether, worin das Harz unlöslich ist, reinigt. Aus der Auflösung in Aether erhält man die Krystalle recht vollkommen durchsichtig und von blafsgelblicher Farbe. Erdmann hat eine Untersuchung dieses Körpers vorgenommen \*). Wird das Peucedanin im Wasserbade geschmolzen und dann dem Erkalten überlassen, wird es nur langsam wieder fest. Aus dem flüssigen Zustande geht es zunächst in den eines zähen Syrups über. Die eigentliche Gerinnung beginnt bisweilen erst nach einigen Stunden und geht dann von einzelnen Punkten aus, endlich erstarrt das Ganze zu einer undurchsichtigen wachsähnlichen Masse. Das krystallisirte Peucedanin verliert beim Schmelzen nichts von seinem Gewicht. Seine Zusammensetzung ist:

|                        |       | Versuch |
|------------------------|-------|---------|
| 4 At. Kohlenstoff..... | 70,98 | 70,279  |
| 4 » Wasserstoff.....   | 5,79  | 5,878   |
| 1 » Sauerstoff.....    | 23,22 | 23,848  |
|                        | 100   | 100.    |

In Kalilauge löst sich das Peucedanin leicht auf und wird daraus durch Säuren unverändert wieder abge-  
schieden.

Beim Auflösen einer Portion aus weingeistiger Auf-  
lösung krystallisirten Peucedanins in Aether erhielt Erd-  
mann einmal einen weißen pulverigen Körper, als in  
Aether unlöslichen Rückstand. Bei späteren Bereitungen

\*) Journ. f. pract. Chem. XVI, 42.



des Peucedanins konnte Erdmann diesen Körper nicht wieder erhalten; er scheint in einer bemerkenswerthen Beziehung zum Peucedanin zu stehen. Seine Zusammensetzung nämlich entspricht der Formel  $C_{12}H_{14}O_6 = 63,6$  Proc. Kohlenstoff und 5,19 Wasserstoff, welche sich von der des Peucedanins, diese verdoppelt, nur durch ein Atom Sauerstoff unterscheidet, das sie mehr enthält.

## Ueber Salicin.

Eine ausführliche Arbeit über das Salicin hat Herberger im *Jahrbuch f. pract. Pharmacie* I, 157 bekannt gemacht. Er zieht aus seinen Versuchen über das Vorkommen dieses Körpers den Schluss, daßs in einer Menge Weiden und Pappelnarten Salicin enthalten sei, daß es aber nicht zweifelhaft sei, daßs es in manchen Arten fehle. Aus den kaltbereiteten, bis zur dünnen Sympliconsistenz verdunsteten Auszügen der Rinde und Blätter gewisser Pappelarten, namentlich *Populus nigra*, setzt sich eine weißliche kaum krystallinische Substanz ab, die vom Salicin und Populin bestimmt darin unterschieden ist, daßs sie mit concentr. Schwefelsäurehydrat nicht geröthet, sondern grün gefärbt wird.

Die jüngern Zweige der Weiden und Pappeln liefern eine an Salicin reichhaltigere Rinde und enthalten es auch in einem weniger verlarvten Zustande als ältere. Die letzte Einsammelungszeit der Rinde ist im Spätherbst nach abgefallenem Laube, oder im Frühling, vor der Entwicklung der Blätter. Die Blätter selbst eignen sich weniger zur Darstellung des Salicins, als die Rinde, weil sie dasselbe nur in geringer Menge und durch viele andere Stoffe eingehüllt enthalten.

Unter den mannichfachen Abänderungen der Darstellungsmethode des Salicins dürfte die von Merck besonders empfehlungswerth sein. Hiernach wird die Weidenrinde mit Wasser ausgekocht, die Abkochung bis auf den dritten Theil verdampft, dann mit Bleioxyd gefällt, filtrirt, der Ueberschuß an Bleioxyd durch Schwefelsäure entfernt, das dadurch nicht Fällbare durch Schwefelwasserstoff ausgeschieden, die klare Auflösung dann in gelinder Wärme zur Krystallisation verdunstet und das erhaltene Salicin durch Umkrystallisiren gereinigt. Aus 16 Unzen *Cort. Salic. Helic.* erhielt Herberger nach 4 Drachm. 11 Gr. Salicin.



Herberger giebt auch noch folgende Methode an, die er besonders für analytische Zwecke empfiehlt. Die Rätter oder Rinden von *Salix*- und *Populus*-Arten werden mit Wasser ausgekocht, mit Eiweiss geklärt, nach heiss durch Bleiessig gefällt, filtrirt, und hierauf erst man Kohlensäure durchströmen, bis alles dadurch lösliche Bleioxyd entfernt ist. Die decantirten Flüssigkeiten lässt man nun bis zur dünnern Syrupsdicke abdampfen, und 12 — 24 Stunden ruhig stehen; ist Populin zugegen, so lagert es sich in büscheligen Strahlen als feinnadelartige Gallerte ab. Diesen Niederlag sammelt man auf einem Colatorium, und reinigt es durch wiederholtes Auflösen in kochendem Wasser, bis das Populin ganz weiss erscheint. Die vom Populin getrennten Flüssigkeiten werden wieder bis zur Syrupsdicke abgedampft, und der Ruhe überlassen, wodurch das Salicin auskrystallisirt, welches dann wie das Populin gereinigt wird. Bei sorgfältigem Verfahren ist keine Verunreinigung mit Blei zu befürchten. Dieses wird bis in die letzten Laugen zurückgedrängt, die man einengt und mit Schwefelsäure das Blei daraustritt. Doch ist der Salicingehalt dieser letzten Laugen so gering, dass es sich der Mühe nicht lohnt. Sollte man durch Unaufmerksamkeit ein bleihaltiges Salz erhalten haben, so muss man dasselbe auflösen und nach Schwefelwasserstoff oder Schwefelbaryum reinigen.

Dieses Verfahren giebt eine grosse Ausbeute an Salicin und Populin, wenn letztes in den angewandten Rinden vorhanden war; für die Fabrikation im Grossen dürfte jedoch das Merck'sche Verfahren Vorzüge haben, besonders wegen der nicht immer leicht ausführbaren Behandlung mit Kohlensäure.

Ueber den Gehalt an Salicin in verschiedenen Weidenarten und nach den verschiedenen Methoden ist folgende Zusammenstellung interessant. Aus 1 Pfd. *Salix alba*, Rinde der jungen Zweige, nach Peschier, erhielt man über 120 Gran Salicin, Herberger nach dem Verfahren von Braconnot 240, von Le Roux 160, von Schumacher 215, von Nees v. Esenbeck 234, von Merck 251, von Erdmann 220, Tyssen u. Fischer nach seiner eigenen Methode 250 Gran.

Aus 1 Pfd. *S. monandra*, Rinde, erhielt Peschier 120, aus 1 Pfd. *S. pentandra* Erdmann 300, aus 1 Pfd. *S. caprea* Wiedemann 209 Gran, aus 1 Pfd. *S. Helix* Nees v. Esenbeck 120 Gran Salicin.

Aus 1 Pfd. *Populus alba*, Rinde, bekam Herberger

160, aus den lufttrocknen Blättern 32 Gran Salicin. Ferner fand er nach seiner Methode in 1 Pfd. lufttrockner Blätter von *P. tremula* 85, in der Rinde 190, in 1 Pfd. lufttrockner Blätter von *P. nigra* 20, in der Rinde 31, in 1 Pfd. lufttrockner Blätter von *P. dilatata* Ait. 28, in der Rinde 37 Gran Salicin.

Ohnerachtet der zahlreichen Versuche über die Darstellung des Salicins sind die Zahlenresultate über den Gehalt der Weiden- und Pappelrinden an diesem Körper, doch noch wenig zuverlässig; Herberger's Versuche über mehre dieser Rinden, nach einer und derselben Methode geprüft, sind daher schätzbare Beiträge für diesen Gegenstand. Diejenigen Weidenarten, die sich durch Salicinreichthum auszeichnen, sind: *S. Helix* L. *S. pentandra* L. und *S. praecox* L. Von den Pappelarten müssen in dieser Beziehung genannt werden *P. tremula* L. und *P. alba* L.

## Ueber die Holzsubstanz.

Nach den Analysen von mehreren Holzarten hat man die Zusammensetzung des Holzes überall gleich angenommen, 53% Kohlenstoff und 47% Wasser. Nach Payen aber ist diese Homogeneität nicht vorhanden. Mehr Substanzen, die man glaubte mit der Holzfaser vergleichen zu können, Baumwolle, Hollundermark, das Mark der *Aeschymone paludosa* und das Gewebe einiger Samenkörner besitzen genau dieselbe Zusammensetzung wie das Amidon, 44% Kohlenstoff und 56% Wasser. Das wirkliche Holz aber gab in Payen's neuen Versuchen eine Zusammensetzung zu erkennen, die von der oben erwähnten abweicht, nämlich 54 Kohlenstoff, 32 Wasserstoff und 39,8 Sauerstoff, wonach also das Holz mehr Wasserstoff enthält, als dass es mit dem Sauerstoff Wasser bilden könnte, und zu einer andern Klasse wie das Amidon und der Zucker, denen man es bisher zugesellte, gehört. Bei weiteren Versuchen ist es Payen auch gelungen, das Holz in zwei Bestandtheile zu trennen. Er fand nämlich, dass in dem Holze das Primitivgewebe, welches die Zellen bildet, eine andere Substanz ist als die, welche diese Zellen ausfüllt, und die die eigentliche Holzsubstanz darstellt, die in Salpetersäure löslich ist und dadurch von der Zellensubstanz, die Payen

\*) Compt. rendu VIII, 871.

Cellulos nennt, getrennt werden kann. Das Cellulos hat genau die Zusammensetzung des Fliedermarks, 44 Kohlenstoff und 56 Wasser, während die Holzsubstanz aus Kohlenstoff, 6,2 Wasserstoff und 39,8 Sauerstoff steht.

Da das Cellulos in concentr. Schwefelsäure bei geringer Wärme sich völlig auflöst, so versuchte Payen, dasselbe ein ähnliches Drehungsvermögen habe für polarisirte Licht, als das Dextrin, mit dessen Zusammensetzung die seine übereinstimmt. Dieses Drehungsvermögen war nun dem des Dextrins ganz analog. Wir haben also in dem Cellulos, dem Amidon und Dextrin drei Substanzen von sehr verschiedenen Eigenschaften, denen man denselben Körper erblicken kann, nur in verschiedenem Zustande der Anordnung seiner Atome.

Aus diesen Versuchen läßt sich folgern, daß das Cellulargewebe dieselbe Zusammensetzung hat, wie das Weizenmehl, und daß es dasselbe ist in den Samen der Getreide, in den Gurken, dem Mark und in dem härtesten Holze, und daß in dem Holze selbst diese Zellen mit einer eigenthümlichen Substanz angefüllt sind, welche die eigentliche Holzsubstanz ist. Es ist aber wichtig, zuvor zu untersuchen, ob die Zellsubstanz der Blätter auch mit der des Marks übereinstimmt, da die Blätter oft eine Veränderlichkeit zu zeigen scheint, wodurch sie von dem Zellgewebe des Marks sich unterscheidet.

## Darstellung der Apfelsäure.

Das Verfahren von Liebig zur Darstellung reiner Apfelsäure ist nachstehendes. Der frische Saft der Äpfel wird aufgeköcht, die dadurch ausgeschiedene kieselige Substanz abfiltrirt, das Filtrat mit basischem weinsteins. Natron so weit gesättigt, daß noch eine saure Reaction bleibt, dann mit essigs., besser mit salpeters. Säure gefällt, und von dem Niederschlage, der nach kurzer Zeit krystallinisch zusammengeht, die leichtere mit kohlens. Salze Verbindung des rothen Farbstoffs mit dem Bleioxyd durch Abschlänmen ziemlich vollständig getrennt. Das kohlens. Bleioxyd, das noch weinsteins. und citrons. Bleioxyd enthält, wird getrocknet und 10 Th. desselben mit 2,64 Schwefelsäure von 1,843 spec. Gew. und 16 Th. Wasser in der Siedhitze zersetzt. Der heißen Flüssigkeit



sigkeit wird nach vollendeter Zersetzung so lange eine Auflösung von Schwefelbaryum zugesetzt, bis kein Schwefelwasserstoff mehr dadurch entwickelt wird, und hierauf von dem Niederschlage von schwefels. Bleioxyd, schwefels. Baryt und Schwefelblei abfiltrirt, dann vollständig mit kohlen. Baryt gesättigt, der gefällte citron- und weinsteins. Baryt durch ein Filter entfernt, und in Auflösung, die jetzt reinen apfelsauren Baryt enthält, durch verdünnte Schwefelsäure zersetzt, von dem gebildeten schwefels. Baryt abfiltrirt, im Wasserbade bis zur Syrupsdicke verdunstet, und dann in gelinder Wärme, bis die ganze Masse trocken und krystallinisch ist.

Eine zweite Methode besteht, nach Liebig, darin, das mit dem Saft gefällte, noch unreine apfels. Bleioxyd mit Schwefelsäure zu zersetzen, die Hälfte der Auflösung der Apfelsäure mit Ammoniak zu neutralisiren, alsdann die andere Hälfte der Säure zuzusetzen, so daß saures apfels. Ammoniak entsteht, welches durch wiederholtes Umkrystallisiren gereinigt und dann durch essigs. Bleioxyd zersetzt wird. Den Niederschlag von reinem apfels. Bleioxyd zerlegt man durch Hydrochloresäure.

Das erste Verfahren gründet sich auf die Trennung der Weinsäure und Citronsäure durch Baryt und Entfärbung der Apfelsäure durch Schwefelblei. Das zweite Verfahren beruht auf der Darstellung eines völlig reinen sauren apfels. Ammoniaks, welches sich durch mehrmaliges Umkrystallisiren erhalten läßt, was aber so oft wiederholt werden muß, bis die Auflösung des Salzes mit Ammoniak sich übersättigen läßt, ohne gefärbt zu erscheinen.

Winckler giebt im *Jahrb. für pract. Pharm.* 18 eine Abänderung der zuerst angeführten Methode an, die dieselbe vereinfacht. Der Saft der Beeren wird abgekocht, das Coagulum getrennt und das blaßroth gefärbte Filtrat mit Ammoniak gesättigt, so daß noch eine schwach saure Reaction bleibt, es nimmt hierdurch eine blauröthe Farbe an und erscheint etwas trübe. Zu 2 Theilen des Saftes setzt man jetzt 1 Th. essigs. Bleioxyd, wodurch ein Niederschlag von weins. und citrons. Bleioxyd aus der Verbindung des Farbstoffs mit Bleioxyd gefällt wird, filtrirt und setzt der Flüssigkeit nun so lange salpeters. Bleioxyd zu, bis sie nur noch schwach dadurch getrübt wird. Der graulich-weiße, oft noch schon ganz weiße Niederschlag, unreines apfels. Bleioxyd, wird auf einem Filter gesammelt, getrocknet.



– 8 Th. Wasser verbreitet und durch Hydrothionsäure rsetzt, vom Schwefelblei abfiltrirt, aufgeköcht, mit Ammoniak neutralisirt, mit Thierkohle, die durch Salzsäure gereinigt, digerirt, und so eine farblose Auflösung in reinem apfels. Ammoniak erhalten, welche durch Salpeters. Bleioxyd zersetzt wird, wodurch man ein rein weißes apfelsaures Bleioxyd erhält, welches in – 4 Th. Wasser suspendirt und durch Hydrothionsäure rsetzt wird. Nach Entfernung der freien Hydrothionsäure durch Erhitzen der Flüssigkeit, concentrirt man im Wasserbade und endlich in gelinder Wärme und hält die Säure in kleinen, harten, glasglänzenden vierseitigen Prismen, die zu einer gleichförmigen krystallinischen Masse sich vereinigen.

432 Unzen fast reifer Vogelbeeren gaben 296 Unzen, daraus wurden 19 Unzen reines apfelsaures Bleioxyd und aus diesem 49 Drachmen krystallisirtes Apfelsäurehydrat erhalten. Zur Abscheidung des Farbstoffes wurden 4 Unzen kryst. essigs. Bleioxyd und zur zweimaligen Abscheidung der Apfelsäure 38 Unzen salpeters. Bleioxyd verwendet.

### Dichtigkeit des Dampfs der Essigsäure.

Dumas hat über die Dichtigkeit des Dampfs der Essigsäure eine neue Bestimmung gemacht, da es wahrscheinlich nur wenig Materien giebt, welche 3 Vol. Dampf bilden und dieses außergewöhnliche Verhältniß bei der Essigsäure vorkommt. Aus den genauesten Versuchen ergab sich die Dichtigkeit der Essigsäure u. 2,74. Es bleibt also erwiesen, daß jedes Atom Essigsäurehydrat  $C_4 H_8 O_4$  nur 3 Vol. Dampf liefert, während das Atom der wasserhaltigen Säuren im Dampfstande sich im Allgemeinen in 4 Vol. theilt. (*Annal. Pharm. XXVII, 138.*)

### Verbindung von Harnsäure und Schwefelsäure.

Eine Verbindung von Harnsäure mit Schwefelsäure hat J. Fritzsche entdeckt. Zur Darstellung von Harnsäure hatte er Schlangenexcremente in erhitzter concentrirter Schwefelsäure aufgelöst, nach Erkalten der

Auflösung hatten sich aus derselben Krystalle abgeschieden, welche als eine Verbindung beider Säuren sich erwiesen und die man direct durch reine Harnsäure und Schwefelsäure darstellen kann.

Die Krystalle der neuen Verbindung sind farblos, sehr hygroskopisch, und werden schon durch kleine Mengen Wasser zersetzt, bei 70° C. schmelzen sie, ohne Veränderung zu erleiden, bei 150° aber fängt die Schwefelsäure an, zersetzend auf die Harnsäure zu wirken. Die Zusammensetzung dieser Verbindung ist:

|                       | Versuch | Rechnung |
|-----------------------|---------|----------|
| 1 At. Harnsäure . . . | 28,65   | 30,18    |
| 1 » Schwefelsäure .   | 57,09   | 57,02    |
| 8 » Wasser . . . . .  | 14,27   | 12,80    |
|                       | 100     | 100.     |

In Bezug auf die Darstellung von Harnsäure bemerkt F. noch, daß die Behandlung der Schlangenexcremente mit Schwefelsäure dazu am besten sich eigne, indem man aus der schwefelsauren Auflösung, selbst wenn sie durch organische Körper stark gebräunt ist, blendend weisse Harnsäure erhält, wenn man ihr allmählig Wasser zusetzt, und erst nach dem Abfiltriren der zersetzten Flüssigkeit mit gröfseren Mengen Wasser auswäscht. Das so erhaltene Harnsäure läfst sich besser auswaschen, wenn man die braune schwefelsaure Auflösung sogleich in eine grofse Menge Wasser giefst, weil sich dann zugleich mit der Harnsäure ein Theil der färbenden organischen Materie niederschlägt und man ein voluminöseres und schwieriger auszuwaschendes Präparat erhält. (*Bullet. scient. de Pétersb. IV, 99. Erdmann's Jour. XIV, 243.*)

## Wasserfreie Phosphorsäure.

Die wasserfreie Phosphorsäure würde man öfters anwenden, wenn man sie mit Leichtigkeit in gröfserer Menge sich verschaffen könnte. Nach Marchand geschieht aber dieses auf folgende Weise.

In eine grofse Porcellanschale stellt man ein kleines Stativ und darauf ein Porcellanschälchen, worauf man einige Stücke trocknen Phosphor legt, und setzt über auf die Schale eine grofse tubulirte Glasglocke von 10 bis 12 Quart Inhalt. Den Tubulus der Glocke verschließt man mit einem Kork, durch welchen zwei Glasröhren gehen, von denen die eine weit ist nahe bis zu

das Schälchen herabreicht, und durch einen Kork verschlossen werden kann, die andere dünnere aber eng und knieförmig gebogen ist.

Die dünne Röhre verbindet man mit einem Apparat, aus welchem man trocknes Sauerstoffgas entwickelt, am besten mit einer Retorte, in welcher chlorsaures Kali erhitzt wird. Bequemer läßt man das Gas aus dem Gasometer strömen und trocknet es durch Chlorcalcium und Schwefelsäure in einem Liebig'schen Kaliapparate ganz vollständig. Man entwickelt anfangs Sauerstoff, um die atmosph. Luft zu entfernen und entzündet dann den Phosphor mit einem durch die weite Glasröhre gesteckten heißen Eisenstab. Ist aller Phosphor verbrannt, so wirft man durch dasselbe weite Rohr neuen Phosphor nach, welcher immer auf das kleine Schälchen fallen muß. Wenn so kann man die Retorte leicht wechseln, wenn das chlorsaure Kali zersetzt ist. Wird die Glocke zu heiß, so hält man einige Zeit ein, bis alles sich hinreichend abgekühlt hat, weil sie sonst unvermeidlich ringt. Man kann so in kurzer Zeit eine bedeutende Menge Säure in fast reinem Zustande erhalten, aus  $\frac{1}{4}$  Pfd. Phosphor über  $\frac{1}{2}$  Pfd. Mit einem Löffel kehrt man die flüchtige Säure schnell von der Glocke und der Schale zusammen und bewahrt sie in wohlverschlossenen Gläsern auf. (*Journ. f. pract. Chem. XVI, 373.*)

---

### Ueber eine organische in käuflicher Salzsäure vorkommende Substanz.

---

Es ist schon von Neumann gezeigt, daß die gelbe Farbe der käuflichen Salzsäure öfter von einer organischen Substanz als von Eisen herrührt. Reinsch hat darüber kürzlich eine bemerkenswerthe Beobachtung mitgetheilt \*). Er fand, daß in einer Salzsäure von schön gelber Farbe Schwefelwasserstoff einen reichlichen ammoniösen flockigen gelben Niederschlag hervorbrachte, obwohl er in der Farbe dem Schwefeleisen glich, welches bei der Untersuchung sich nicht als solches ergab, sondern vielmehr als eine Verbindung einer organischen Substanz mit Schwefel. R. machte viele vergebliche Versuche, diese Substanz in größerer Menge zu erzeugen. Verschiedene Substanzen, Sägespäne, Harz,



Sumachblätter, Kork u. s. w. liefs er wochenlang mit Salzsäure digeriren; diese wurde zwar nach und nach gelb gefärbt, Schwefelwasserstoff brachte aber immer nur geringe Niederschläge darin hervor, am meisten in der mit Harz in Berührung gewesenen Säure. Diese Substanz bildet sich also, wie es scheint, zwar überall durch Einwirkung der Salzsäure auf organische Substanzen, aber sehr langsam, und möchte vorzüglich durch Einwirkung der Salzsäure auf den in der Luft schwebenden Staub entstehen, weshalb R. vorschlägt, sie mit dem Namen *Koniortin* (*κονιορτός*) zu belegen.

## Einwirkung der Salzsäure auf Zucker.

Durch Schwefelsäure erleidet der Zucker bekanntlich nach dem Concentrationsgrade derselben verschiedene Veränderungen. Mit concentr. Säure verbindet er sich nach Peligot zu einer eigenthümlichen Säure, der Zuckerschwefelsäure; durch verdünnte Schwefelsäure und andere verdünnte Säuren verwandelt er sich nach Malaguti erst in Traubenzucker, dann in Humussäure und Ulmin, und bei Luftzutritt entsteht dabei auch Ameisensäure. Auch die Salzsäure, concentr. und verdünnt, ändert den Zucker durch Kochen um. Es entsteht eine braunrothe Flüssigkeit, in welcher sich ein reichlicher schwarzer Absatz bildet. Dieser ist in kochendem Wasser wenig löslich, auch von kaust. Kali wird er wenig und von Ammoniak zwar mehr, aber doch nicht vollständig gelöst. Diese Substanz hat W. Stein analysirt und folgende Zusammensetzung gefunden:

|                  |    |     |       |
|------------------|----|-----|-------|
| Kohlenstoff..... | 24 | At. | 64,44 |
| Wasserstoff..... | 18 | „   | 4,46  |
| Sauerstoff.....  | 9  | „   | 31,20 |

100.

Dieses Product hat also eine andere Zusammensetzung als die Humussäure. Durch den vereinten Einfluß der Wärme und der Salzsäure wird aus dem wasserfreien Zucker nur H und O im Verhältniß der Wasserbildung abgeschieden, so daß ein Doppelatom Zucker die Hälfte seines Sauerstoffs und Wasserstoffs abgibt.

\*) Annal. der Pharm. XXX, 84.



## Harnstoff.

Ueber die Auffindung des Harnstoffs im thierischen Körper ausserhalb des Harns verdanken wir Marchand wichtige Beiträge. Die Ausscheidung dieses Stoffs aus Flüssigkeiten, welche viel Eiweiss enthalten, hat ihre bedeutenden Schwierigkeiten. Dennoch ist für die Physiologie die Entscheidung der Frage, ob die Bildung des Harnstoffs erst in dem uropoetischen Systeme statt finde, oder ob dieselbe schon in dem Blute selbst vor sich gehe, von der grössten Wichtigkeit. Nach March. früheren Versuchen lässt sich annehmen, dass, wenn der Mensch 1 Pfd. Blut besäße, darin 2 Loth Harnstoff enthalten seyn müssten, um diesen Stoff darin nachweisbar darzustellen; setzt man dem Blute absichtlich  $\frac{1}{400}$  Harnstoff zu, kann dieser nur mit der grössten Schwierigkeit nachgewiesen werden. Nun hat Peligot bemerkt, dass eine ungemein geringe Quantität von Harnstoff hinreicht, einer grossen Menge Kochsalz die bekannte Umwandlung aus der Würfel- in die Octaederform zu erleichtern. Man hat eine Zeit lang das auf diese Weise modificirte Salz für eine chemische Verbindung desselben mit Harnstoff gehalten. Die Minima von Harnstoff, welche die Umänderung der Krystallform des Kochsalzes wie des Salmiaks bewirken, beweisen, dass dem nicht so sei, vielmehr dürfte diese Thatsache hinreichen, das Kochsalz wie den Salmiak den dimorphen Substanzen anzuzählen. Aber diese umwandelnde Kraft des Harnstoffs möchte vielleicht ein geeignetes Reagens abgeben, um Harnstoff in Flüssigkeiten zu entdecken, worin man bisher mit den bisherigen Mitteln nicht mehr auffinden konnte.

In der That zeigte sich dieses bestätigt. Marchand liess 20 Pfd. Serum aus dem Venenblute einiger Kühe durchsichtig durch Alkohol coaguliren, was besser als durch Wärme, weil durch diese das Eiweiss zu einem festen, den Harnstoff hartnäckig einhüllenden Körper gerinnt, durch Alkohol aber das Eiweiss in feinen Flocken gefällt wird. Die von dem ausgeschiedenen Eiweiss abfiltrirten Flüssigkeiten wurden verdunstet, der Rückstand in Wasser gelöst, die Auflösung filtrirt, verdunstet und das Extract mit absolutem Alkohol abgekocht. Die so erhaltene Auflösung wurde abgeraucht, der Rückstand in Wasser gelöst und mit einer Koch-

salzlösung vermischt; nach einiger Zeit fanden sich darin octaedrische Krystalle.

Die Versuche der Nierenexstirpation haben von einem grossen Theil der Chemiker und Physiologen der Hypothese zugewendet, der Harnstoff werde in den Nieren nur ausgeschieden, nicht gebildet; doch haben sich auch bedeutende Stimmen dagegen erhoben, daß der Harnstoff im Blute gebildet werde aus schon gebildeten Thiersubstanz und nicht aus unbrauchbarem Nahrungsstoffe entstehe; dafür möchte noch weiter sprechen, daß man ihn in mehreren anderen Flüssigkeiten angetroffen hat, daß Lassaigne in dem Harn eines Verrückten der achtzehn Tage lang gefastet hatte, noch Harnstoff fand, und daß nach Marchand's Erfahrungen der Harn nach der Mahlzeit nicht mehr Harnstoff enthält, als am Morgens früh kurz nach dem Aufstehen. M. stellte nun nach Joh. Müller's Vorschlag, Thiere hungern zu lassen, ihnen darauf die Nieren zu exstirpiren und Harnstoff im Blute aufzusuchen, mit einem grossen gesunden Hunde folgende Versuche an. Der Hund bekam Milch zur Nahrung, nach den ersten 5 Tagen enthielt sein Harn 2,6 % Harnstoff, nach abermals 5 T. 3 %, worauf der Gehalt nicht wesentlich mehr veränderte. Hierauf wurde das Thier mit völlig reinem Candiszucker ernährt, statt dasselbe hungern zu lassen, mit einer stofffreien Substanz. Das Thier bekam täglich 10 Loth Zucker. Nach 6 Tagen enthielt der Harn 2,4 % Harnstoff, wiederum nach 5 Tagen 2,4 %; es wurde schwach und mager und enthielt der Harn nach abermals 5 Tagen nur noch 1,8 %, worauf die Menge sich nicht weiter veränderte. Das Thier bekam jetzt Milch und Bohnen, und gelangte allmählig wieder zu seinem früheren Gesundheitszustande. Es gingen aber mehrere Tage, ehe der Harnstoff sich vermehrte, erst nach 11 Tagen betrug er 3,2 — 3,5 %. Das Thier hatte sich vollkommen erholt. Es bekam hierauf wieder sein nahrungloses Futter, Wasser und Zucker. Nach 5 Tagen enthielt der Harn nur noch 2 % Harnstoff. Jetzt wurden dem Thiere die Nieren unterbunden. Die Paralyse trat bald ein, nach 6 Tagen aber Erbrechen einer sauren schleimigen Masse. 4 Tage darauf wurde die Jugularis geöffnet und das Blut aufgefangen; nachdem das Thier ohngefähr 3 Pfd. verloren hatte, verschied es. Aus dem Blute wurden 4,88 Grm. salpeters. Harnstoff erhalten.

Diese Versuche machen nun wohl höchst wahr-

ch, daß der Harnstoff sich schon fertig gebildet im gesunden Blute findet, und daß derselbe aus der schon gebildeten lebenden thierischen Substanz erzeugt werde, nicht aber aus stickstoffhaltigen nicht assimilirten Theilen der Nahrungsmittel.

Man könnte den Einwurf machen, daß der Stickstoff, welchen die Thiere absorbiren, die Bildung des Harnstoffs erkläre. Diese Annahme erscheint indessen sehr gezwungen, und über die Absorption des Stickstoffs ist man noch nicht entschieden; doch kann natürlich der Versuch hierüber uns Aufklärung geben. (*Journ. pract. Chem. XIV, 490.*)

### Ueber die Gegenwart des Gallenfarbstoffs im Blute eines gelbsüchtigen Pferdes.

Mehre Chemiker haben im Blute der Gelbsüchtigen eine färbende Materie gefunden, die diesem, wie gewissen Geweben des Körpers, das eigenthümliche Ansehen, was mit der Gelbsucht verbunden ist, ertheilt, welche dieselbe Natur besitzt, wie die der Galle. Bei Thieren hat Lassaigne dasselbe zuerst bei einem Pferde beobachtet. Kürzlich hatte L. Gelegenheit, diese Beobachtung bei einem Pferde in der Thierarznei-Anstalt zu Alfort zu machen, das gelbsüchtig litt. Dem Pferde wurde durch Venäsection Blut entzogen, welches nach 24 Stunden über dem geschiedenen Blutkuchen ein kelsafrangelbes Serum zeigte und Leinwand intensiv färbte; es reagirte alkalisch, wie das Serum von gesundem Pferdeblut, coagulirte in der Wärme fast wie es, auch durch Schwefel-, Salpeter- und Salzsäure, Salpetersäure aber theilte der geronnenen Masse eine schön blaue, dann blaßgrüne und endlich gelbe Farbe während bei gesundem Serum die durch Salpetersäure geronnene Masse weiß bleibt. Schon dieses Verhalten Salpetersäure spricht für die Analogie dieses Farbstoffs Serums mit dem der Galle. L. ließ nun einen Theil Serums mit 10 Th. Alkohol schütteln, und von dem geronnenen Eiweiß die gelb gefärbte Flüssigkeit abfiltriren und verdunsten. Es blieb eine braune nicht bitter schmeckende geruchlose Materie zurück, die durch Salpetersäure grün, blau, violett, roth und endlich gelb wurde, genau wie die färbende Materie der Galle. Schon vorher fand L. in dem Fettzellgewebe eines an einer



schweren Krankheit gestorbenen Hammels eine färbende Materie, die sich eben so verhielt. (*Journ. de Chim. med.* 2. Ser. IV, 497.)

## Verbreitung des Gallenfetts.

Das Gallenfett findet sich nicht allein in den Gallensteinen und der Galle, man hat es in mehreren krankhaften Flüssigkeiten des menschlichen Körpers, im Marteschwamm und anderen krankhaften Producten, so wie auch im gesunden Blute gefunden. Boudet, Lecas und Marchand haben in dem Blute die Gegenwart von Cholesterin nachgewiesen. Die Analysen dieses Körpers von Saussure, Chevreul und Couerbe stimmen mit einander überein. Marchand hat mit dem aus verschiedenen Substanzen erhaltenen Gallenfett neue Analysen unternommen\*), besonders, um dadurch den besten Beweis der Identität des Gallenfetts von verschiedenem Ursprunge darzuthun. Die Analysen ergaben die Zusammensetzung des Gallenfetts: 1) aus Gallensteinen, 2) aus Ochsen-galle, 3) aus einer Hydrocele, 4) aus Menschengehirn, 5) aus einer hydrocephalischen Flüssigkeit:

|                 | 1.    | 2.    | 3.    | 4.    | 5.    |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kohlenstoff...  | 85,36 | 84,86 | 84,98 | 84,79 | 84,90 |
| Wasserstoff...  | 11,99 | 12,05 | 12,10 | 12,35 | 12,60 |
| Sauerstoff..... | 2,65  | 3,09  | 2,92  | 2,86  | 3,10  |
|                 | 100   | 100   | 100   | 100   | 100.  |

Diese Analysen stimmen mit den der oben angeführten Chemiker überein und führen, wie diese, zu der Formel  $C_{37}H_{63}O$ .

## Jodnatrium.

Wenn man eine Auflösung von Jod in Aetznatronlauge eindampft und das anscheinend neutrale Salz getrocknet, so entweicht, nach Beobachtung von R. Prest aus Uerdingen (*Annalen d. Pharm.* XXVI, 94.) bei einer Temp., bei welcher das jodsaure Natron zerlegt wird, Jod in dichten violetten Dämpfen. Die wässrige Lösung des so erhaltenen Salzes krystallisirt leichter und

\*) *Journ. f. pract. Chem.* XVI, 37.



er, als die des Jodkaliums. Aus der wässrigen Auflösung der Krystalle wird durch Sauerstoff- und Wasserstoffsäuren *alles* Jod als graues metallglänzendes Pulver abgeschieden, ohne alle Gasentwicklung weder von zerlegtem Wasser, noch von zerlegter angewandter Säure. Dieses Verhalten findet nach Liebig (a. a. O. XXVII, 3) darin seine Erklärung, daß jodsaures Natron mit der ohne Alkaliüberschuss geglühet, im letzteren Fall unter Abscheidung von Jod, in Sauerstoff und eine zuerst von Magnus beobachtete Verbindung zerfällt; sie ist sich als basisch unterjodigs. Natron betrachten,  $\text{J}_2 + 2 \text{Na O}$ , wird erst bei Weißglühhitze zersetzt und zerlegt sich mit Wasser in Jodnatrium und jods. Natron.

Die Krystalle, welche Preufs aus der geschmolzenen Masse erhielt, bestehen aus einer Doppelverbindung von jods. Natron mit Jodnatrium. Beim Zusatz einer Säure oxydirt sich das Natrium des Jodnatriums auf Kosten des Sauerstoffs der Jodsäure des jodsauren Natrons, und das Jod des letztern, so wie das des Jodnatriums scheiden sich aus. Bei Darstellung des Jodnatriums muß diese Erfahrung berücksichtigt werden. Am besten ist es, die geglühete Masse, welche man von der Auflösung des Jods in Natronlauge erhalten hat, wieder in Wasser aufzulösen und so lange Schwefelwasserstoffsäure durchzuleiten, als noch eine Fällung von Schwefel bemerkbar ist, und dann die filtrirte Lösung des Jodnatriums zur Krystallisation zu bringen.

---

### Dritte Abtheilung.

---

## Arzneimittelprüfung.

---

### Ueber die englische Bleiglätte;

vom

Apotheker *Forcke* in Wernigerode.

---

**W**ie bekannt, ist die meiste im Handel vorkommende Bleiglätte mit Kupfer verunreinigt, und sind die mit bereiteten Präparate, Bleiessig etc., auch nicht davon. Die englische Glätte, welche in England aus reinem Blei bereitet wird, ist frei von Kupfer, und der mit bereitere Bleiessig ist nicht kupferhaltig. Seit

mehren Jahren bediene ich mich auch derselben zur Bereitung des Bleipflasters, wozu sie vorzüglich gut ist, weil sie sich leicht auflöst, und ein weißeres Pflaster liefert wie andere Glätte.

Da der Preis der englischen Glätte bedeutend höher als der anderer ist, so ist beim Einkauf zu befürchten, daß man letztere für erste bekommt; die engl. Glätte ist von breitblättrigem schuppigen Gefüge, und in der Auflösung ist weder durch Aetzammoniak, noch durch blaus. Kali Kupfer zu entdecken.

Die im Handel vorkommende präparirte Glätte ist keine engl. Glätte.

Hamburg und Bremen sind für die hiesige Gegend wohl die ersten Beziehungsorte für diesen Artikel

## Arsenhaltiger Phosphor.

**B**ei Bereitung von reiner Phosphorsäure aus Phosphor wurde durch die erhaltene Säure Schwefelwasserstoffgas geleitet; nach einiger Zeit entstand in der Flüssigkeit ein röthlichbrauner Niederschlag, der, nachdem er sich abgesetzt hatte, auf einem Filter gesammelt wurde; er mochte auf die Unze Phosphor ungefähr  $\frac{1}{4}$  Gran betragen. Nach der Marsh'schen Methode geprüft, wurde ein deutlicher Anflug von Arsen daraus erhalten.

Bei der behaupteten Gegenwart von Arsenik in den Knochen fragt es sich, ob nicht auch diese mitunter, und nicht allein eine unreine Schwefelsäure, die Ursache einer Spur Arsenik im Phosphor und der daraus bereiteten Phosphorsäure sein mag. Br.

## Beachtung des Moschus.

**D**ie kriegerischen Bewegungen in ganz Asien, der Quelle so vieler wichtigen Arzneimitteln, müssen immer mehr und mehr auch bei uns in dem Handel

ehr in diesen Arzneimitteln fühlbar werden. Namentlich trifft dieses gegenwärtig den Moschus, ein Arzneimittel, dessen Entbehrlichkeit im Arzneischatze man vor allem wünschen, aber keineswegs erwarten darf. Es bleibt nichts übrig, als dieser Drogue die möglichste Aufmerksamkeit zuzuwenden. In dieser Hinsicht will ich anführen, daß mir ein Moschusbeutel mit einem grossen Stück anhängender Bauchhaut vorgekommen ist, der sich durch eingeschobene Bleistücke, wenngleich nicht vortheilhaft, auszeichnete. Der ganze Beutel wog 1 Drachm., nach der Entleerung 4 Drachm. Der  $3\frac{1}{2}$  Drachm. betragende Inhalt bestand nun in etwas mehr als  $1\frac{1}{2}$  Drachm. wiegenden Bleistücken und in nicht vollem 2 Drachm. Moschusmasse. Dieser Beutel kostet  $22\frac{1}{2}$  Thlr. Folglich kam 1 Gran dieses Moschus auf etwa 1 Thlr. zu stehen, wenn man die häutigen und fettigen Theile noch berücksichtigt, die sich in der Moschusmasse befanden. Die  $\frac{1}{4}$  —  $\frac{1}{2}$  Zoll langen Bleistücke waren offenbar in den noch frischen Beutel eingeschoben, und die Oeffnung desselben war dann mit einer harzigen Masse, von welcher auch etwas in den Beutel eindrungen war, verstopft worden. Die Bleistücke waren stark mit Bleiweiss beschlagen. Man kann nicht sagen, welchen Einfluß das Blei auf den Moschus während des Trocknens und Aufbewahrens ausübte; daß er aber statt hatte, ist wahrscheinlich genug. Auch kann man der Vermuthung Raum geben, daß das Trocknen im Beutel, wenn ein grosses Stück fetter Bauchhaut anhängt, andere Erfolge für den Moschus haben könne, als wenn der Beutel, wie es gewöhnlich der Fall ist, schon dieser zuvor befreit worden ist. Im Allgemeinen würde ich die letztern Beutel schon aus dem Grunde vermeiden beim Einkauf, um durch das verhältnißmässig grosse Gewicht derselben, wenn sich Bleistücke darin finden, auf diese Verfälschung leicht geführt zu werden.

H. Wr.

---



## Betrügerei mit Moschus.

In Folge vorstehender Bemerkung über die Beachtung des Moschus mache ich auf den von Hrn. Apotheker Libeau in Wadensloh bei der Kreisversammlung in Münster eingereichten Moschusbeutel aufmerksam (siehe dieses Archiv 2. R. Bd. XXIII, 243), welcher in der That auch beweist, wie der Apotheker beim Einkauf des Moschus sich zu hüten hat. Der Betrug bestand in diesem Falle darin, daß in einem größern entleerten Moschusbeutel ein kleinerer steckte, dessen Häute so genau mit dem erstern zusammenpaßten, daß bei der Ausführung dieses Betruges die Haut des äußeren wahrscheinlich zuvor in Wasser erweicht worden war, so daß sie bei Eindrücken den innern Beutel in allen seinen Unebenheiten schließend umkleidete. Wie am oben a. O. bemerkt, überstieg auch in diesem Falle der Einkaufspreis des Moschus weit den von der Taxe dafür ausgeworfenen Verkaufspreis.

Br.

## Catechu.

Die schöne dauerhafte braune Farbe, wozu seit einiger Zeit in der Färberei das Catechu benutzt wird durch Auflösen desselben in kochendem Wasser mit einem Zusatz von schwefels. Manganoxydul dargestellt; die baumwollenen Garne werden erst in Bleichbeizt, hierauf durch Kalkwasser gezogen, dann in einer Flotte von zweifach-chromsaurem Kali und zuletzt in der Catechulösung umgezogen. Der rasche Aufschwung dieser Farbe machte, daß das schöne braune Catechu bald fehlte, welchen man dem gelben würfelförmigen vorzog, wegen der schönern und reichhaltigern Farbe. Nun hat sich, wie Reinsch bemerkt, herausgestellt, daß der braune Catechu aus dem gelben bereitet werden kann und es ist möglich, daß das braune Pigment erst

\*) Journ. für pract. Chem. XVI, 509.



dem gelben entwickelt wird, da die Catechusäure durch Einwirkung von Luft und Wärme in Japonsäure übergeht. Die Bereitung des braunen Catechu aus dem gelben ist einfach; man schmilzt den gelben Catechu bei schwachem Feuer und setzt auf 100 Pfd. 1 Pfd. doppelt-chromsaures Kali hinzu, welches dabei vielleicht etwas Sauerstoff an den Catechu abgiebt. Die ausgegossene und erstarrte Masse ist schwarzbraun, von flachmuschlichem Geruch und von weniger süßlichem Nachgeschmack wie der gelbe. Wenn man den gelben Catechu übrigens für sich schmilzt, so erhält man eine braune Masse, die von der mit chroms. Kali bereiteten nicht zu unterscheiden ist, weshalb der Zusatz dieses Salzes überflüssig sein möchte.

Das aus der Levante bezogene braune Catechu unterscheidet sich von dem gelben wahrscheinlich nur durch eine verschiedene Bereitungsart. Das beste Kennzeichen für die Güte des Catechu wird immer die Auflöslichkeit in Weingeist bleiben, wo nicht über  $\frac{1}{12}$  seines Gewichts unlöslicher Rückstand bleiben muß. Zu medicinischem Gebrauch wird übrigens der ausgesuchte gelbe Catechu den Vorzug verdienen, da nicht der Farbstoff, sondern die Gerbsäure die Wirkung des Catechu bestimmt.

---

#### Vierte Abtheilung.

---

### Literatur und Kritik.

---

Theorie und Praxis der pharmaceutisch-chemischen Arbeiten, oder Anleitung zur zweckmäßigen Bereitung der wichtigsten und neuesten chemisch-pharmaceutischen Präparate. Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet von C. H. Quarizius. Erster Band. 384 Seiten. Leipzig, 1841. Friedr. Fleischer.

Das oben genannte Buch soll, nach des Verf. Angabe, ein Werk werden, woraus weniger geübte Apotheker, angehende Jünger der Pharmacie, junge Aerzte, endlich Droguisten, die dem jeden derselben gegenwärtig und künftighin nöthige Concipiens des pharmaceutischen Wirkens sollen schöpfen kön-

möglich. S. 187 eifert der Hr. Verf. gewaltig über die Aufnahme des Dzondi'schen geistigen Salmiakgeistes unter die officinellen Präparate, weil dadurch die ohnedies zahllosen Heilmittel in Apotheken unnützer Weise noch um eins vermehrt werden. Wie paßt dieses zu dem Vorworte, worin die Aufführungen der nicht im Entferntesten dem Heilmittelapparat angehörigen chemischer Verbindungen damit argumentirt wird, daß die Chemie mit Riesenschritten fortschreitet, so manche Präparate, die jetzt in der Medicin noch keine Anwendung finden von denkenden Aerzten doch binnen Kurzem in Gebrauch kommen werden müssen. Wahrscheinlich hat aber der Verf. bei Bereitung des Dzondi'schen Salmiakgeistes nach der unwürdigen Vorschrift, die er zu diesem Behufe den wenig geübten Apothekern zur Nachfolge (oder besser Nichtnachfolge) und den Droguisten zur Abschreckung vorlegt, Unglück gehabt. S. 190 heißt es, daß der Salmiak eine völlig neutrale Verbindung darstellt. Nach S. 191 soll das Ammoniak eine geringe Neigung haben, sich mit der Kohlensäure zu verbinden, daß das flüssige Aetzammoniak mehrere Monate lang mit einer Kohlensäure reichen Atmosphäre in Berührung bleiben kann ohne etwas davon aufzunehmen. Der Hr. Verf. beliebt, Rose's analytische Chemie I. S. 542 zu vergleichen, und wird dadurch veranlaßt finden, die entgegengesetzten Resultate der desfallsigen Versuche baldigst zu publiciren. S. 193 wird dem officinellen anderthalbkohlensaurem Ammoniak angegeben, daß es in gut verschlossenen Gefäßen aufbewahrt werden muß, gegenfalls es Ammoniak verliert und in neutrales kohlensaures Salz verwandelt wird. Dem Hrn. Verf. sind also die beiden doppelkohlensaure und neutral gleichbedeutend. S. 195 es vom kohlensauren Ammoniak ferner, daß es durch Alaun, essigsauren und salzsauren Kalk, saure Quecksilberverbindungen, salzsauren Baryt, essigsaures Blei, schwefelsaures Eisen- und Zinkoxyd und alle diese ähnliche Stoffe (nach Logik) zersetzt werden, wovon die entstandenen Niederschläge in einem Ueberschuß von kohlensaurem Ammoniak unlöslich sind. Wenn in einer mit Salzsäure bereiteten Lösung des kohlensauren Ammoniaks durch salzsaure Baryt ein unlöslicher Niederschlag hervorgebracht wird, so ist das schwefelsaure Salz verunreinigt!!! S. 198 wird angegeben, daß der officinelle *Liq. Ammon. sulphurati* eine Verbindung von Ammoniak mit Schwefel sei. S. 202 heißt es, daß die Ammoniakflüssigkeit durch schwefelsaure, salpetersaure und saure Salze zerlegt werde; daher die jungen Aerzte, welche das Buch ja auch geschrieben sein soll, sich hüten, den Minder'schen Geist mit Glaubersalz, Salpeter, Selen dergl. zu verordnen, denn Hr. Quarizius hat gefunden, daß hier eine Zersetzung statt findet. S. 205 giebt Hr. Q. die *Solutio Fowleri* an, daß nach vorheriger Ansäuerung mit Salzsäure das Arsenik daraus als ein gelber flockiger Niederschlag gefällt werde, zu solchen Schnitzern, welche weder Apotheker, noch ein angehender Lehrling der Pharmacie begehen wird, konnte Hr. Q. nur dadurch kommen, daß er Satz, womit §. 403. der chemischen Heilmittel und Drogen beginnt, gern zu dem seinigen machen wollte, ohne zu bedenken,

sehen. S. 207 nennt der Verf. das Oxamid eine hypothetische Verbindung; was mag er wohl unter einer reellen verstehen? S. 215 wird eine merkwürdige Theorie des Bildungsprocesses des Cyansilbers gegeben; noch merkwürdiger ist aber die S. 221 gegebene Vorschrift zur Bereitung von Liebig's knallsaurem Silberoxyd und Quecksilberoxydul. S. 227 belehrt der Verf. sein publicum, daß der unvergeßliche Scheele, welcher ein Opfer seiner Versuche mit der Blausäure geworden sei, das Cyan *primum tingens coerulei berlinensis* genannt habe. Woher der Verf. diese beiden Neuigkeiten entnommen, wird eben so wenig irgend eine andere Quelle angegeben. Das erstere wird weiter von Scheele selbst in seiner Abhandlung über die färbende Materie im Berlinerblau, wie er eben die Blausäure nannte, noch von v. Crell, seinem Biographen, angegeben; das zweite ist wieder ein verunstalteter Satz aus §. 22. meines mehrerwähnten Buches. Merkwürdig ist die S. 225 mitgetheilte Vorschrift zur Bereitung einer immer gleichförmigen (*ipsissima verba*) Blausäure, welcher zufolge man vom Cyanquecksilber so viel in Wasser auflösen, bis dieses nichts mehr aufnimmt, und die Lösung dann durch Schwefelwasserstoff ausfällen soll. S. 230 wird angegeben, daß Mitscherlich eine Bittermandelölschwefelsäure entdeckt habe, deren Zersetzung unbekannt ist, deren Vorhandensein daher der Bestätigung bedarf. Es heißt ferner, daß, nach Löwig, Bittermandelöl sowohl als Benzoin, beim Erhitzen mit Kalihydrat benzoesaures Kali geben, daß folglich beide in dem ähnlichen Zusammenhange stehen, wie Traubensäure und Weinsteinensäure; endlich, daß das Bittermandelöl sich, nach Liebig und Wöhler, als eine Verbindung von Kohlen- und Wasserstoff mit einem Doppelmischungsgewicht Wasserstoff vertheile. S. 259 wird die Jodbaryumlösung *Liquor Barytae jodicae* genannt, und eine Aetiologie des so einfachen Vorganges bei seiner Bildung gegeben, welche gewiß geeigneter ist, dem anhenden Zögling der Pharmacie ein mitleidensvolles Lächeln entlocken, als ihn zu belehren. S. 309 giebt Pyrophosphorsäure mit salpetersaurem Silber einen gelben basischen Niederschlag, S. 312 ist aber das pyrophosphorsaure Silberoxyd weiß. Doch genug dieser merkwürdigen Citate, welche sich leicht hundertfachen ließen; sie werden hinreichen zu zeigen, welche Belehrung aus einem Buche zu schöpfen ist, welches ohne Selbsterfahrung und Sachkenntniß aus zehn anderen zusammengetragen ist.

Duflos.





## Allgemeiner Anzeiger.

### I. Anzeiger der Vereinszeitung.

#### Notizen aus der Generalcorrespondenz des Directoriums.

Se. Exc. Hr. Geh. Staats-Min. Eichhorn und Hr. Präsident und Director v. Ladenberg in Berlin: Wohlwollen für den Verein. — Die Direction der pharm. Gesellschaft der Pfalz: Uebersendung Abdrücke der am Tage der Brandes'schen Versammlung gehaltenen Festrede. — Hr. Generalconsul Castilho de Bares: Uebersendung von Ehrendiplomen der pharm. Gesellschaft in Lissabon für mehrere Beamte des Vereins nebst Schreiben der Gesellschaft. — Hr. Vicedirector Sehlmeier in Cöln: Wegen der Kreise Trier und Bonn. — Hr. Kreisdirector Grefslers in Saalfeld: Anmeldung neuer Mitglieder; über Archivsendung. — Hr. Vicedirector Buchholz in Erfurt: Ueber Angelegenheiten der Buchholz-Gehlen-Trommsdorff'schen Stiftung; Anmeldung neuer Mitglieder. — Hr. Vicedirector Dr. Bley in Bernburg, Hr. Klönne in Mühlheim, Hr. Dr. Geiseler in Königsberg: Ueber den jetzigen Zustand der Pharmacie. Hr. Vicedirector Dugend in Oldenburg: Wünscht die Geschäfte des Vicedirectoriums zu erledigen. — Hr. Vicedirector Müller in Medebach: Ueber sein botanisches Wörterbuch. — Hr. Vicedirector Dr. Meuser in Dresden: Ueber die Bewilligung der Portovergünstigung im Königreich Sachsen pro 1841 u. s. w. — Hr. Dr. Herberger in Kaiserslautern: Angelegenheiten des dortigen Vereins. — Hr. Vicedirector Dr. Fiedler in Cassel: Anmeldung neuer Mitglieder. — Hr. Vicedirector Bolle in Angermünde: Ueber den Anschluß mehrerer Apotheker in Pommern an den Verein. — Hr. Apotheker Hoffmann in Landau: Beiträge für Abdruck. — Hr. Postmeister Pothmann in Lemgo: Ueber die Bewilligung der Portovergünstigung pro 1841 im Thurn- und Taxischen Postbezirke.

Dankschreiben für die Ehrenmitgliedschaft des Vereins entgegen: von Hrn. Präsidenten und Director v. Ladenberg in Berlin; von Hrn. Professor Hermann in Moskau; von Hrn. Generalstabsarzt Dr. Büttner in Berlin.

Beiträge für die Gehülfen-Unterstützungskasse gingen ein von Hrn. Gehe und Hrn. Dr. Abendroth in Dresden.

Beiträge fürs Archiv gingen ein: von Hrn. Vicedirector Dr. Bley in Bernburg, von Hrn. Dr. Elsner in Berlin, von Hr. Provisor Kummel in Corbach, von Hrn. Vicedirector Dr. Herber in Dresden, von Hrn. Dr. Geiseler in Königsberg in der Neumark.

#### Gehülfen-Unterstützungs-Angelegenheit.

Diejenigen Herren Collegen, welche das von mir zum Besten der Unterstützungs-kasse herausgegebene botanische Wörterbuch



wovon bereits das erste Heft erschienen, zu haben wünschen, wollen sich gütigst an ihre Herren Kreisdirectoren wenden, welche die Güte haben werden, mir die Bestellungen einzusenden.

Medebach, im Nov. 1840.

Müller.

## Handelsnotizen.

**Bremen, den 5. Dec.** Bei der vorgerückten Jahreszeit ist es im Drogueriehandel ziemlich still, und dürfen wir nun wohl keine Zufuhren mehr erwarten; obwohl dieses für einige Artikel sehr wünschenswerth ist, welche schon jetzt selten sind, und später fast ganz mangeln dürften. Besonders ist dies der Fall mit *Baumöl*, wovon kein ganzes Gebinde mehr in Loco aufzutreiben ist. Die neue Ernte ist zwar nicht ganz schlecht ausgefallen, doch wird wohl nichts mehr vor dem Winter eintreffen. Ein Gleiches ist mit *Mandeln* der Fall, wovon man sich jetzt auf kleine *barbarische* beschränken muß. Von *Aloe* trafen nur sehr spärliche Zufuhren ein. *Gewürze, Thee, Kampher* und sonstige chinesische Waaren müssen, da aller Handel mit China aufgehört hat, theurer werden. Die Engländer haben die Blockade ernstlich begonnen. Von *Tamarinden* trafen reichliche Zufuhren ein, die den Preis herabstimmen werden. *Ol. Cajaput. und Ricini* sind in schöner Waare vorrätbig. *Manna* geht im Preise herab, doch kommt auch viele geringe und feuchte Waare in Handel vor. *Cacao* bleibt sehr gesucht, und eine eingetroffene schöne *Guajaquil*-Sorte wird schnell vergriffen sein. *Ol. cerebinth* ist im Preise gewichen und die Vorräthe davon ziemlich stark. Mit *Rhabarber* bleibt es noch sehr hoch, und fehlt an Auswahl. *Rad. Senegae* mangelt, *Jalapa* hält sich fest im Preise. *Serpentaria* ist billiger zu haben. Von *Succus liquirit.*, wohl Calabr. als Bayonner, ist gute Auswahl.

**Havanna, den 15. Oct.** Die Gesammtausfuhr von *Zucker* belief sich auf 50,181 Kisten, gegen 13,298 im Sept. 1839. Die Preise gingen höher.

**London, den 1. Nov.** *Olivenöl* gewinnt Festigkeit, da allem Anschein nach die Zufuhren für die nächsten 12 Monate nur gering sein werden.

— **den 6. Nov.** Heute wurden 703 S. 109 F. *Cacao*, Westind., auf Auction zu stetigen Preisen verkauft, Trinidad gering, mittel Guayana und rother 53 sh. — 55 sh. 6 d. pr. Cs. In *Salpeter* sind beschränktere Geschäfte gemacht, und eher niedrigere Preise erzielt worden, gewöhnl. 26 sh. 6 d., mittel 27 sh. — 27 sh. 6 d., feiner 28 — 29 sh.

**Messina, den 17. Oct.** *Mandeln* sind seither höher gegangen, einen Rückzug der Preise ist nicht wohl zu denken. Die Olivenfrucht hat durch Mehlthau stark gelitten; man fürchtet, es wird nicht mehr *Oel*, als zum Bedarf unserer Insel erforderlich gewonnen werden wird.

**Neapel, den 29. Oct.** Bei der schlechten Aussicht der Ernte steigen die Oelpreise. In Calabrien, Lecce und Bari reicht die Ernte nur für den eigenen Bedarf des Landes hin.

— **den 19. Nov.** Die *Oele* gehen fortdauernd in die Höhe; in Gallipoli werden 31 Duc. 90 Gr. verlangt.

**Triest**, Anfangs November. *Rosinen* haben bei der Einsammlung und Trocknung durch starke Regengüsse so gelitten, daß über die Hälfte naß eingebracht wurde. *Elemé-Rosinen* 1 Roisderé, Cismé und Urla  $8\frac{1}{4}$  —  $9\frac{1}{4}$  fl., Beglerge 6 fl., schwarz Smyrnaer  $4\frac{1}{2}$  — 5 fl., Sultanina 18 — 20 fl. *Feigen* sind gerathen, besonders Smyrnaer, 13 — 22 fl. der Ctr., Calan oder Kranzfeigen 6 —  $6\frac{1}{2}$  fl., Dekantiner und Puglieser  $5\frac{1}{2}$  — 6 fl. *Mandeln* sind in Puglien, Spanien und Sicilien mißrathen. 50 — 53 fl., bittre sind im Verhältniß zu den süßen billig — 40 fl., ganz kleine wie auch Pfirsichkerne 30 — 33 fl. Vorräthe von *Olivendöl* sind gering, reines Puglieser 26 — 28 fl., feine Tafelöle 30 — 34 fl., Genueser 40 — 43 fl.

— den 10. Nov. *Lorberen* und *Lorberblätter* werden so billig gegeben werden können, als voriges Jahr, erstrockner reiner Waare zu 6 fl., letzte in gepressten Ballen 4 fl. *Pomeranzenschalen* werden rar und theuer sein, die Frucht nicht gut gerathen ist. *Roher Weinstein* ist gesucht, rar, 30 fl.; für weißen bezahlt man schon 22 — 24 fl.

---

### Anzeige.

Einem jungen Manne von guter Erziehung und Verstande, welcher Lust hat, sich der Pharmacie zu widmen, sichere Gelegenheit zur Ausbildung nach

Dr. Bley in Bernburg

---

### Verkaufsanzeige.

Sämmtliche narkotischen Extracte, nach der Neuesten Pharmakopöe bereitet, sind von vorzüglicher Güte und sehr billig zu haben

beim Apoth. Ravenstein in Gernrode a. S.

Die sehr gute Beschaffenheit dieser Extracte bestätigt Dr.

---

### Seidene Beutelgaze.

In mehreren Seiden-Fabriken der französischen Provinzen wird vorzugsweise für die Mühlen eine Gaze verfertigt, welche auch theilweise schon durch die Drogenwaarenhändler in die pharmaceutische Praxis Eingang gefunden hat. Aus eigener jähriger Erfahrung kann ich die hieraus gefertigten Seidenallen Collegen bestens empfehlen. Albert Jüngst, Webergasse Nro. 145. hält ein Lager dieser Beutelgaze in zwei Breiten, die erste 37 Par. Zoll, die zweite 31 Par. Zoll. Von jeder Breite finden sich 14 verschiedene Stärken, wovon die Preise von 17 Gr. bis 3 Rthlr. 8 Gr. differiren.

Dr. Meurer

Die Trefflichkeit dieser Gaze kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.

Br.

## Preise der Beutelgaze bei Alb. Jüngst in Dresden, Webergasse Nr. 145.

Pr. Cour. oder Sorten nach Cours, zahlbar bei Abnahme der Waare.

| Gaze. |                   |           |   | 37 franz. Zoll breit. |     | 31 franz. Zoll breit. |    |
|-------|-------------------|-----------|---|-----------------------|-----|-----------------------|----|
| 100.  | die Dresdner Elle | . . . . . | — | 18½                   | 19½ | 17                    | 18 |
| 0.    | „                 | „         | — | 21                    | —   | 19½                   | „  |
| 1.    | „                 | „         | — | 23                    | —   | 21                    | „  |
| 2.    | „                 | „         | 1 | 1                     | —   | 23                    | „  |
| 3.    | „                 | „         | 1 | 4                     | 1   | 1                     | „  |
| 4.    | „                 | „         | 1 | 7                     | 1   | 4                     | „  |
| 5.    | „                 | „         | 1 | 11                    | 1   | 7                     | „  |
| 6.    | „                 | „         | 1 | 16                    | 1   | 11                    | „  |
| 7.    | „                 | „         | 1 | 21                    | 1   | 16                    | „  |
| 8.    | „                 | „         | 2 | 2                     | 1   | 21                    | „  |
| 9.    | „                 | „         | 2 | 9                     | 2   | 2                     | „  |
| 10.   | „                 | „         | 2 | 16                    | 2   | 9                     | „  |
| 11.   | „                 | „         | 3 | —                     | 2   | 16                    | „  |
| 12.   | „                 | „         | 3 | 8                     | 3   | —                     | „  |

## Apothekenverkauf.

Die einzige gut eingerichtete Apotheke einer im Königreich Sachsen in wohlhabender Umgegend belegenen Stadt, zu deren Veräußerung eine baare Bezahlung von 3000 Rthlr. erforderlich soll baldigst verkauft werden.

Der Apotheker C. Grefler zu Saalfeld in Thüringen.

## II. Anzeiger der Verlagshandlung.

Inserate werden mit 1½ Ggr. pro Zeile mit Petitschrift, oder für den Raum derselben, berechnet.)

Zu haben in allen Buchhandlungen:

### Conversations-Lexikon

Künstler und Handwerker, Fabrikanten und  
Maschinisten.

Ausgegeben von einem engern Ausschuss der Mitarbeiter am  
Schauplätze der Künste und Handwerke.

Drittes Heft. Preis gegen feste Bestellung ¼ Rthlr. oder 54 Kr.

Raum sind die beiden ersten Hefte dieses gemeinnützigen und umfassenden Werkes im Publikum, als sich schon die berufensten Kritiker günstig darüber aussprechen. — So z. B. sagt Hr. Dr. A. v. Binger im österr. Organ für Handel und Gewerbe: „Wenn man berücksichtigt, auf den 8 enggedruckten Bogen des ersten Heftes mit 91 deutlich gezeichneten Figuren zwar 51 Gegenstände erwähnt, aber nur 20 davon besprochen und die übrigen auf spätere Bogen verwiesen sind, so ergibt sich schon daraus, daß in diesem weit umfassenden Werke nicht etwa von bloßer Worterklärung die Rede ist. — Nach der Art, wie in



diesem ersten, zu großen Hoffnungen berechtigenden Hefte diese 20 Bände bearbeitet sind, dürfen wir nicht anstehen, dasselbe der besondern Beachtung unserer Leser zu empfehlen". Die Zeitschr. für Landwirthschaft und Gew. 1840. VII., VIII. sagt: "Der für die Literatur in allen ihren Theilen so rastlos thätige Verleger scheint sich besonders die rühmliche Aufgabe gestellt zu haben, den Gewerbetreibenden ganz vorzügliche Mittel zur Fortbildung in die Hände zu geben. Dafür sprechen die 108 Bände des Schauplazes der Künste und Handwerke, durch die er sich ein so strittenes Verdienst um diese Classe erworben hat. — Das Concise Lexikon für Künstler und Handwerker wird dieses Verdienst noch um Bedeutendes erhöhen, wenn dieses Werk so gründlich und umfassend geführt wird, als es nach dem vor uns liegenden ersten Hefte erwartet worden ist. Gründlichkeit und Deutlichkeit — die Hauptanforderungen an ein Werk für Ungelehrte — herrschen in allen Artikeln. Möge das Unternehmen, welches sich auch durch Papier und Druck empfiehlt, Käufer finden."

#### Inhalt des dritten Heftes:

Blauanlaufen. Blauer Bitriol. Blaufärben. Blaufarbenholz. Blaulüpe. Blauofen. Blechfabrikation. Blei. Bleiblech. Bleikunst. Bleigießerei. Bleiglasur. Bleiröhren. Bleistifte. Bleiwerk, = Walzwerk, = Weiß, = Zucker. Bleuel (oder Korbstange). Blumen, künstliche. Blutlaugensalz. Bobbinet. Bohrer und Bohrmaschinen. Borax. Borten. Boffiren. Böttcherarbeiten. Bouillons. Brauerei. Brannntweinbrennerei. Brannntweinwage. Braunsfärberei. Braunsstein. Brauerei. Brechen. Brechmaschine. Breitzainen. Bremsen. Brenner. Brennmaterialien. Brennöl und dessen Brennstahl. Brobbäckerei.

### Im Verlage der Unterzeichneten ist so eben erschienen Handwörterbuch der reinen und angewandten Chemie.

In Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben von

Dr. Justus Liebig und Dr. J. C. Poggendorff  
Professoren an den Universitäten in Gießen und Berlin.

In 5 Bänden, jeder von 5 Lieferungen à 10 Bogen.  
Preis für jede Lieferung 16 Ggr.

#### 1. Bandes 4. Lieferung.

Dieses mit so lebhaftem Beifall aufgenommene Werk, dessen Fortgang durch Reisen und unaufschiebbare Arbeiten des Professors Liebig unterbrochen war, wird jetzt wieder in völlig geregeltem Fortgang nehmen.

Herr Prof. Dr. Wöhler in Göttingen ist der Redakteur der 4. Lieferung an beigetreten; er sowohl als die Professoren Buff in Gießen und Otto in Braunschweig, wie auch an den thätigsten Antheil als Mitarbeiter nehmen, so wie der Herr Dr. Rammelsberg in Berlin als Mitarbeiter.

Wir bitten, dem der 4. Lieferung angehängten Verzeichnisse des Handwörterbuchs der Chemie eine erneute Beachtung zu schenken.

Braunschweig, den 15. Sept. 1840.

Friedrich Vieweg & Sohn



# Register über Bd. XXI. XXII. XXIII. XXIV. der zweiten Reihe des Archivs.

Jahrgang 1840.

## A.

A. — Felsäure in den Decklättern  
 der unreifen Haselnüsse  
 XXI. 254.  
 deren Darstellung XXIII. 36.  
 XXIV. 28.  
 über, Theorie der A.-Bil-  
 dung XXI. 23. 82. 145.  
 herbildung, Theorie nach  
 L. Rose XXII. 188.  
 un XXIV. 47.  
 ornin XXIII. 173.  
 aloide XXI. 106. XXIV. 204.  
 ohol XXIV. 50.  
 um roseum, Porrum XXI 341.  
 e, Producte der Einwirkung  
 der Salpetersäure auf A.  
 XXIII. 294.  
 e margaritifera XXIV. 60.  
 ebitter XXIII. 296.  
 esäure XXIII. 296.  
 ranthus Blitum, hybridus,  
 ridis XXI. 340.  
 eisensäure XXI. 319.  
 monin XXIV. 206.  
 moninsäure XXIV. 206.  
 moniacum, Mutterpflanze  
 XXIV. 105.  
 moniak, chelidonsaures  
 XXIII. 204.  
 oxalsaur i XXIV. 41.  
 phosphors. dreibasisch. u.  
 agnesia XXIV. 45.  
 phosphors. dreibasisch. u.  
 atron u. Wasser XXIV. 44.  
 phosphors. dreibas. Eisen-  
 ydul-A. XXIV. 46.  
 moniak, phosphors. drei-  
 s. Manganoxydul-A.  
 XXIV. 46. 191.

Ammonium, Kupferchlorid-A.  
 XXIV. 48.  
 — Salicylammon. XXIII. 187.  
 Amygdalin XXI. 253. XXII.  
 208. XXIII. 212. XXIV. 212.  
 — Zusammensetzung XXII. 13.  
 Amygdalinsäure, Zusammen-  
 setzung XXII. 13.  
 Amygdalus persica communis  
 XXI. 346.  
 Amylum XXI. 104.  
 Andropogon Ivarancusa  
 XXI. 109.  
 Anstrich, feuersichernder  
 XXIV. 117.  
 Antimon XXI. 221. XXIV.  
 182. 211.  
 — siehe Kermes und Gold-  
 schwefel.  
 — Quinta Essentia Antimonii  
 XXI. 181.  
 — Stibium oxydat. alb.  
 XXIII. 89.  
 — Brechweinstein XXIII. 89.  
 — Regul. Antimonii XXIII. 89.  
 — Tinct. Antim. Thedenii  
 XXI. 168.  
 Antimonoxyd, Bereitung  
 XXI. 156. 167.  
 — weinsteinsaures XXI. 304.  
 Apothekertaxe und Pharma-  
 kopöe XXI. 257.  
 Aqua Cerasorum XXI. 256.  
 Argentan, mit Silber zu plat-  
 tieren XXIII. 237.  
 Armeriae Flores XXI. 110.  
 Arsenichtsäure, Beobachtung  
 über die gegenseitige Ein-  
 22\*

- wirkung der A.- u. der Eisenoxyde XXIII. 69.  
 Arsenik XXI. 145. 146. XXIV. 211.  
 Arseniksäure XXIV. 197.  
 Arsenikvergiftung, Bemerkungen üb. d. Charactere der A.-Vergift. XXIII. 60; Auffindung des Ars. nach Orfila 62; Wirksamkeit des Eisenoxydhydrats gegen Arsenikvergift. 68.  
*Arum esculentum* XXI. 224.  
 — *maculatum*, Wärme des Spadix XXI. 18.  
 — *italicum* XXI. 338.  
*Asa foetida*, Mutterpflanze XXIV. 105.  
 Asparagin XXII. 208.  
*Asparagus amarus, acutifolius* XXI. 341.  
 Asphalt XXIV. 162.  
*Asphodelus luteus, ramosus* XXI. 341.  
*Astragalus gummif.* XXIV. 102.  
 — *strobilif.* XXIV. 103.

## B.

- Balsam XXI. 103.  
 Bananen, Stärkmehlgehalt XXI. 224.  
 Bananenfeige XXI. 224.  
 Barium, Salicylbarium XXIII. 187.  
 Baryt, bichlorisatinsaurer XXII. 272.  
 — *chelidonsaurer* XXIII. 204.  
 — *chlorsaurer* XXIII. 306.  
 — *chlorisatins.* XXII. 269.  
 — *knallsaurer* XXI. 84.  
 — Scheidung von Strontian XXI. 95.  
 Barytsalze, Verhalten vor dem Löthrohre XXIV. 57.  
 Barytsaccharat XXIV. 48.  
 Bastardpflanzen, Unfruchtbarkeit XXI. 22.  
 Batata, Gehalt an Stärkmehl XXI. 223.  
 Baumöl, Ausdehnung XXIII. 220.  
 Benzamid XXII. 24.  
 Benzin XXII. 21.

- Benzoessäure XXI. 105.  
 XXI. 254. XXII. 15. XXIII. 155. 273.  
 — Darstellung XXIII. 214.  
 — über die Zersetzung durch Chlor und Brom XXIII. 15.  
 Benzoeschwefelsäure XXII. 2.  
 Benzoin XXII. 2.  
 Benzon XXII. 2.  
 Benzoyl XXII. 26. XXIII. 155. XXIV. 206.  
 Benzoylwasserstoff XXII. 15.  
 Berg- und Hüttenbetrieb XXIII. 120.  
 Berg- und Hüttenwesen XXI. 348. XXII. 246. XXIII. 256.  
 Bergamottöl XXIV. 15.  
 Bergamottölkampher XXIV. 15.  
 Bergtheer XXIII. 241.  
 Bernstein XXII. 246.  
 — über die wahrscheinliche vorweltliche Bildung des XXII. 250. 251.  
 Bernsteinsäure im Retort. u. Braunkohlen und im Olean *empyreumaticum* *e ligno fossilis* XXII. 250.  
 — falsche XXIV. 24.  
 Bibenzamid XXII. 2.  
 Bibromisatin\* XXII. 25.  
 Bibromisatinsäure XXII. 25.  
 Bichlorisatin XXII. 153. 254.  
 Bilifellinsäure XXIV. 23.  
 Bilifulvin XXIV. 23.  
 Bilin XXIV. 23.  
 Biliverdin XXIV. 23.  
 Biographie des Prof. Fr. W. Schweigger-Siedel XXIV. 23.  
 Bittererde, arseniksäure basische XXIV. 2.  
 — chelidonsäure XXIII. 204.  
 — oxalsäure XXIV. 2.  
 — phosphors. dreibasische XXIV. 2.  
 — phosphors. dreibasische mit Ammoniak XXIV. 2.  
 — salpetersäure XXIV. 2.  
 — *schwefelsäure, Prüfung* schwefelsaures Kali oder Strontion XXIII. 2.  
 — schwefelsäure, basische XXIV. 2.



Bittermandelöl XXII. 15.  
 Bittermandelwasser XXI. 75.  
 XXIV. 175.  
 Bittersalz XXIII. 88.  
 Bitterstoff aus Pfirsichkernen  
 XXI. 253.  
 Bismut XXIV. 151. 160.  
 Bismut, zähes von Bechel-  
 bronnen XXIV. 160, flüssiges  
 aus der Gegend von Hatten  
 64, festes Asphalt von Coxim-  
 ambo in Peru 162.  
 Bismutconcrement eines Hun-  
 des XXIV. 135.  
 Bismutsäure XXII. 204. XXIV. 296.  
 Bismut XXI. 221. 343.  
 Bismutschwefelsaures, Benutzung  
 XXIII. 123.  
 Bismutglätte, engl. XXIV. 317.  
 Bismutoxyd XXIV. 200.  
 Auffindung durch Schwe-  
 felsäure XXIII. 88.  
 Bismutchlorisatins. XXII. 261.  
 Bismutessigs. dreifach-basisches  
 XXI. 96.  
 Bismutessigs. neutrales XXI. 96.  
 Bismutpectins. XXI. 86.  
 Bismutphloridzinbleioxyd  
 XXIII. 195. 200.  
 Bismutsalicinbleioxyd  
 XXIII. 190.  
 Stärkezucker-Bl. XXIV. 48.  
 wasserhaltiges XXI. 96.  
 Bismutweinsteins. XXI. 309.  
 Bismut XXIV. 313. 315.  
 Analysen XXI. 269.  
 von den einzelnen Bestand-  
 theilen desselben XXI. 45.  
 Bismutegel XXII. 245.  
 Bismutegelzucht in Moritzburg  
 bei Dresden XXII. 226.  
 Bismutfarbstoff XXIV. 139.  
 Bismutwasser XXIV. 141.  
 Bismut, Zersetzung durch Ho-  
 nig XXI. 72.  
 Bismutessigsäure XXIII. 236.  
 Bismutessigsäure XXI. 72. 306.  
 Bismutessigsäure, Darstellung einer  
 reinen B. XXI. 313.  
 Bismutchemik, pharmaceutische  
 XXI. 253.  
 Bismutwein XXIII. 172.  
 Bismutkohle XXII. 202.

Braunkohlen XXII. 285.  
 Braunit XXIV. 87.  
 Brechweinstein XXI. 304.  
 Brennmaterial, Goodwin's  
 künstliches XXIII. 126.  
 Brom im Brunnenwasser zu  
 Athens XXII. 211.  
 Brombenzoesäure XXIII. 17.  
 Bromindatmit XXII. 280.  
 Bromindopten XXII. 280.  
 Bromisatin XXII. 280.  
 Bromisatinsäure XXII. 282.  
 Bromosamid XXIII. 190.  
 Bromsalicyl XXIII. 186.  
 XXIV. 205.  
 Brucin XXIV. 204.  
 Buchbinderlack XXII. 244.  
 Bunias Erucago XXI. 340.

## C.

Cajaputöl, Zusammensetzung  
 XXII. 169.  
 Calamus aromaticus XXI. 109.  
 Calcaria sulphurato, stibiata  
 XXIV. 294.  
 Calcium, Chlorcalcium  
 XXIV. 48.  
 Calcium - Sulfarsenit  
 XXIV. 179.  
 Calciumsulfhydrat XXIV. 177.  
 Calomel, Umwandlung in Aetz-  
 sublimat XXIII. 319.  
 Camphene XXII. 171. XXIV. 17.  
 Capsella Bursa pastoris XXI. 340.  
 Catechu XXIV. 320.  
 Celtis australis XXI. 345.  
 Cerae Emulsio XXII. 104.  
 Chelidonin XXIII. 205., schwe-  
 fels., phosphors., salpeters.,  
 salzs., essigs. 206.  
 Chelidonium majus, Bestand-  
 theile XXIII. 202.  
 Chelidonsäure XXIII. 203.  
 Chelidonxanthin XXIII. 206.  
 China, Untersuchungsmethode  
 XXIV. 114.  
 Chinae Syrup. XXII. 112.  
 Chinasäure XXI. 106.  
 Chinin XXIII. 210. XXIV. 204.  
 — schwefelsaures, Verfä-  
 schung XXIV. 115.  
 Chelerythrin XXIII. 204.



- schwefels., phosphors., salzs.,  
chelidons., essigs. 205.
- Chlor XXI. 146. XXIV. 211.
- Chlorverbindungen in  
Pflanzen XXI. 98.
- Theorie über die Oxyd-  
Chlorüre od. hypochloricht-  
sauren Salze XXI. 20.
- Unterchlorsäure. Wir-  
kung auf Alkohol XXIV. 50.
- über die Constitution der  
Chlorüre XXIV. 39.
- Chlorbenzoesäure XXIII. 16.
- Chlorhelenin - Chlorhydrat  
XXIII. 25.
- Chlorindatmit XXII. 156.
- Chlorindopten XXII. 151.
- Chlorindoptensäure XXII. 157.
- Chlorisatin XXII. 153. 253.
- Chlorisatinsäure XXII. 256.
- Chlorosamid XXIII. 189.
- Chlorsaliretin XXIII. 193.
- Chlorsalicyl XXIII. 186.  
XXIV. 208.
- Chlorwasser, Prüfung auf Salz-  
säure XXIII. 68.
- Chlorhelenin XXIII. 25.
- Chlorzimmersäure XXIII. 17.
- Cholansäure XXIV. 284.
- Choleinsäure XXIV. 282.
- Cholinsäure XXIV. 278.
- Choloidinsäure XXIV. 282.
- Chromoxyd, oxalsaur. Chrom-  
oxydkali XXIV. 42.
- Chrysen XXI. 226.
- Chrysoberill XXI. 22.
- Cichorium Intybus* XXI. 341.
- Citren XXII. 184.
- Citrilen XXII. 187.
- Citronensaft XXI. 255.
- Citronensäure XXI. 106.
- über den Wassergehalt der  
krystallisirten XXIII. 266.
- Citronöl XXII. 182. XXIV. 17.
- Citronölkampher XXII. 183.
- Citronyl XXII. 187.
- Codein XXIV. 204.
- Concretionen in vierfüßigen  
Thieren gefunden XXIV. 135.
- Coniin XXIV. 204.
- physiologisch-toxikologi-  
sche Untersuchungen  
XXIII. 38.

- Conserven, pulverförmige  
XXII. 111.
- Copaivabalsam, über verschie-  
dene Bindungsmittel des C.  
in Pillenmassen XXII. 104.
- Copaiven XXIV. 24.
- Copaivilen XXIV. 24.
- Copaivkampher XXIV. 18.
- Copaivaöl XXIV. 15.
- Copalfirnis XXIII. 122.
- Cornus sanguinea* XXI. 345.
- Corylus Avellana* XXIV. 28.
- — *tubulosa* XXI. 345.
- Crithmum maritimum* XXI. 340.
- Cuba, Vegetation der Insel C.  
XXI. 328.
- Cubeben XXIV. 24.
- Cubebenkampher XXIV. 24.
- Cubebenöl XXIV. 24.
- Cubebin XXIV. 24.
- Cucumis Melo, sativus* XII. 345.
- Cucurbita Citrullus, Pepo*  
XII. 345.
- Cucurbita polymorpha* XII. 345.
- Cudbear XII. 165.
- Cuprum nitricum* XXIV. 124.
- Cyan XXII. 204. XXIII. 2.
- Cyanil XXIII. 204.
- Cyankalium XXIV. 24.
- Cyanüre XXIV. 24.
- Cynara Scolymus, Carduus*  
XXI. 345.

## D.

- Dadyl XXII. 12.
- Daguerrotyp XXI. 78. II  
217. XXII. 12.
- Datteln XXIV. 12.
- Daucus sylvestris* XXI. 345.
- Dextrin XXIV. 24.
- Dienstgesuche XXI. 24.  
XXII. 246. XXIII. 12.  
XXIV. 12.
- Digital. purp. Conserv.*  
rulent. XXII. 12.
- Dinte für Stahlfedern  
XXII. 24.
- Diplotaxis muralis, Sagittaria*  
XXI. 345.
- Dünger XXIII. 24.
- Dyslysin XXIV. 24.



## E.

einbalsamiren **XXIII. 98.**  
 Eisen **XXI. 220. 348. XXIII. 236.**  
 — über Verbrennung des E. **XXII. 305.**  
 — über Pelouze's grüne Verbindung des Cyans mit E. **XXIII. 33.**  
 — Roheisen, Kohlenstoffgehalt **XXIV. 55.**  
 Eisenblausäure **XXIV. 48.**  
 Eisenchlorid **XXIV. 215.**  
 Eisenchlorür **XXIV. 47.**  
 Eisencyanür **XXIV. 48.**  
 Eisenjodür **XXII. 276. XXIV. 217.**  
 Eisenkitte **XXIII. 124.**  
 Eisenoxyde, Beobachtung über die gegenseitige Einwirkung der Arsenichsäure u. der E. **XXIII. 69.**  
 Eisenoxyd, essigs. **XXII. 308.**  
 Verhalten gegen kohlen-saures Natron **XXI. 92.**  
 Scheidung von Thonerde **93.**  
 Eisenoxyd-Kali, schwefelsaur. **XXIII. 316.**  
 — weinsteins. **XXI. 304.**  
 Eisenoxyd, oxalsaures Eisen-oxyd-Kali **XXIV. 42.** oxals. Eisenoxyd-Natron **42.**  
 Eisenoxydhydrat, Wirkung auf das Kupferoxydhydrat **XXI. 91.**  
 Eisenoxydsalze, Reaction auf Morphin **XXIV. 205.**  
 Eisenoxydul, Darstellung **XXI. 90.**  
 Eisenoxydul-Oxyd **XXI. 322.**  
 Eisenoxydul, schwefelsaures **XXI. 321.**  
 Eisenpräparate **XXIV. 215.**  
 Eisenweinstein, über das chemische Verhalten und die chemische Constitution **XXI. 65.**  
 — weifs **XXI. 146.**  
 — des Blutes **XXI. 45.**  
 — gegen Kupfervergiftung **XXIII. 57.**  
 Electrochemie **XXI. 19.**  
 Emailirung eiserner Gefäße **XXIII. 124.**

Emetin **XXIV. 204.**  
 Emplastr. *Lytharg. simpl.* **XXI. 214.**  
 Emulsin **XXIII. 210. XXIV. 212.**  
*Erica vulg.* **XXI. 302.**  
 Essig **XXIII. 313.**  
 — zur Theorie der Essigbildung **XXIII. 215.**  
 Essigäther, vortheilhafte Darstellung **XXIII. 218.** Reinigung **219.**  
 Essigsäurebildung **XXII. 201.**  
*Evonymus europaeus, verrucosus* **XXI. 345.**  
 Extracte, über die zweckmässigste Darstellung **XXII. 74.**  
**85.** Bemerkung über die Bereitung der narkotischen **89. 90.**  
*Extr. Absinthii* **XXII. 80. 87.**  
 — *Aconiti* **XXII. 82.**  
 — *Agarici* **XXII. 82.**  
 — *Aloes* **XXII. 75.**  
 — *Angelicae* **XXII. 83.**  
 — *Angusturae* **XXII. 81.**  
 — *Belladonnae* **XXII. 82. 97.**  
 — *Caincae* **XXII. 82.**  
 — *Calami* **XXII. 84.**  
 — *Cantharidum* **XXII. 84.**  
 — *Cardui bened.* **XXII. 80.**  
 — *Caryophyllat.* **XXII. 80.**  
 — *Cascarillae* **XXII. 81.**  
 — *Catechu* **XXII. 80.**  
 — *Centaurii min.* **XXII. 80.**  
 — *Chamomillae* **XXII. 80. 87.**  
 — *Chelidonii maj.* **XXII. 82.**  
 — *Chinae* **XXII. 81. 82.**  
 — *Chinae frig. parat.* **XXII. 75. 87.**  
 — *Cichorii* **XXII. 80.**  
 — *Cicutae* **XXII. 82.**  
 — *Colocynthis* **XXII. 82.**  
 — *Columbo* **XXII. 84.**  
 — *Conii* **XXII. 82. 97.**  
 — *Cort. Aurant.* **XXII. 83.**  
 — *Cort. rad. Granator.* **XXII. 82.**  
 — *Cort. Salicis* **XXII. 81.**  
 — *Croci* **XXII. 80. 82.**  
 — *Cubebae* **XXII. 84.**  
 — *Cynarae* **XXII. 80.**  
 — *Digitalis* **XXII. 82.**  
 — *Dulcamarae* **XXII. 80.**  
 — *Enulae* **XXII. 84.**



|                                |       |         |
|--------------------------------|-------|---------|
| <i>Extr. Filicis maris</i>     | XXII. | 84.     |
| — <i>Flor. Calendulae</i>      | XXII. | 80.     |
| — <i>Fuliginis splend.</i>     | XXII. | 81.     |
| — <i>Fumariae</i>              | XXII. | 80.     |
| — <i>Gallarum</i>              | XXII. | 80.     |
| — <i>Gentianae</i>             | XXII. | 78.     |
| — <i>Graminis</i>              | XXII. | 80.     |
| — <i>Gratiolae</i>             | XXII. | 82. 84. |
| — <i>Hellebori nigr.</i>       | XXII. | 84.     |
| — <i>Hippocast.</i>            | XXII. | 81.     |
| — <i>Hyoscyami</i>             | XXII. | 82. 97. |
| — <i>Juglandis</i>             | XXII. | 82.     |
| — <i>Lactucae</i>              | XXII. | 82.     |
| — <i>Levistici</i>             | XXII. | 84.     |
| — <i>Ligni campech.</i>        | XXII. | 81.     |
| — <i>Ligni Guajaci</i>         | XXII. | 82.     |
| — <i>Lupuli</i>                | XXII. | 82.     |
| — <i>Marrubii</i>              | XXII. | 80.     |
| — <i>Millefolii</i>            | XXII. | 80.     |
| — <i>Nicotianae</i>            | XXII. | 82.     |
| — <i>Nucum Vomicularum</i>     | XXII. | 84.     |
| — <i>Opii aquos.</i>           | XXII. | 75.     |
| — <i>Pimpinellae</i>           | XXII. | 84.     |
| — <i>Pulsatillae</i>           | XXII. | 82. 97. |
| — <i>Quercus</i>               | XXII. | 81.     |
| — <i>Rad. Arnicae</i>          | XXII. | 83.     |
| — <i>rad. Artemisiae vulg.</i> | XXII. | 84.     |
| — <i>rad. liquirit.</i>        | XXII. | 77.     |
| — <i>Ratanhiae</i>             | XXII. | 78. 81. |
| — <i>Rhei</i>                  | XXII. | 77.     |
| — <i>Roris marini</i>          | XXII. | 84.     |
| — <i>Rad. Rubiae</i>           | XXII. | 81.     |
| — <i>Rad. Sarsaparillae</i>    | XXII. | 81.     |
| — <i>Sabinae</i>               | XXII. | 80.     |
| — <i>Saponariae</i>            | XXII. | 78.     |
| — <i>Scillae</i>               | XXII. | 82.     |
| — <i>Seminis Cinae</i>         | XXII. | 84.     |
| — <i>Sennae</i>                | XXII. | 78.     |
| — <i>Senegae</i>               | XXII. | 84.     |
| — <i>Stramonii</i>             | XXII. | 82.     |
| — <i>Taraxaci</i>              | XXII. | 80.     |
| — <i>Trifolii fibrin.</i>      | XXII. | 80. 87. |
| — <i>Valerianae</i>            | XXII. | 82.     |
| — <i>Valerianae frig. par.</i> | XXII. | 76.     |
| — <i>Vitis Pampinorum</i>      | XXII. | 82.     |
| — <i>Zedoariae</i>             | XXII. | 84.     |

## F.

*Faeces*, Untersuchung der F.  
eines durch Muttermilch ge-

nährten Kindes von 6 Tagen  
XXII. 40.

Fäulniss, über die Erscheinun-  
gen der F. und ihre Ursa-  
chen XXII. 197.

Faser, Producte bei Behand-  
lung mit Aetzkali XXI. 22.

Fellinsäure XXIV. 25.

Ferment XXII. 26.

*Fermentoleum Ericae vulg.*  
XXI. 302.

*Ferrum oxydat.* XXIII. 5.

— *jodet. saccharat.* XXII. 304.

— *sulphuratum* XXIV. 28.

Fleisch, über die Conservatio-  
XXIII. 121.

Fliegenschwamm XXIII. 104.

Formomethylal XXIV. 214.

Fuselöl XXII. 29.

## G.

Gährung, über die Erschei-  
ngen der G. und ihre Ursa-  
chen XXII. 18.

*Galbanum*, Mutterpflanze  
XXIV. 105.

Galle, über die *Zusammenset-*  
zung der Galle, von Ber-  
zelius XXIV. 2.

Gallenfarbstoff XXIV. 15.

Gallenfett XXIV. 21.

Gallenharz XXIV. 8.

Gallenstoff XXIV. 17.

Gallenzucker XXIV. 7.

Gallussäure XXI. 14.

Gelehrte Gesellschaften u.  
Lehranstalten.

Akademie der *Wissenschaften*  
in Berlin XII. 15.  
XXII. 11. 128. XXIII. 14.

Akademie der *Wissenschaften*  
in Paris XII. 16.

Akademie der *Medicin* in  
Paris XXI. 16.

Akademie der *Wissenschaften*  
in St. Petersburg  
XXII. 130. XXIV. 20.

Asiatische Gesellschaft in  
London XXII. 18.

Britisches Museum XXII. 15.

Der naturwissenschaftliche  
Verein im Neustädter Markt



Großherzogthum Weimar **XXIII. 148.**  
 Der botanische Garten in Kiew **XXIII. 149.**  
 Die Gartenbaugesellschaft in Wien **XXII. 130.**  
 Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin **XXI. 21. XXII. 128. XXIII. 148. XXIV. 133.**  
 Gesellsch. für medicinische Chemie in Paris **XXI. 145.**  
 Gesellschaft der Wiener Aerzte **XXII. 129.**  
 Institut, pharmaceutisches in Jena **XXI. 115. 244. XXIII. 237. in Dresden 237. 349.**  
 Königl. Societät der Wissenschaften in London **XXIV. 133.**  
 Medicinisch-botanische Gesellschaft in London **XXII. 131.**  
 Pharmaceutisch. Gesellschaft in Paris **XXI. 146.**  
 Physikalischer Verein in Frankfurt **XXII. 130.**  
 Verein für Erdkunde in Berlin **XXII. 129.**  
 raniin **XXII. 29.**  
 rbstoff, Darstellung **XXI. 320.**  
 rste, zur Darstellung der Milchsäure **XXIV. 50.**  
 wicht, altes und Decimalgewicht in Frankreich **XXI. 145.**  
 specifisches, Versuch über in Verfahren, um auf dem Wege der Rechnung schnell auszumitteln, in welchem Grade man eine Flüssigkeit von noch zu großem sp. Gew. verdünnen muß, um ihr ein vorgeschriebenes spec. Gew. zu ertheilen **XXIII. 261.**  
 stöpsel, Herausbringen fest sitzender eingeriebener **XXII. 244.**  
 adin **XXIV. 287.**  
 buli tartari martiati **XXI. 65.**

Gold **XXI. 348.**  
 — ursprüngliche Lagerstätte im Ural **XXI. 22.**  
 — Beobachtung einer besondern Krystallisation des Figuier'schen Goldsalzes **XXII. 70.**  
 Goldfirnifs **XXII. 243.**  
 Goldgewinnung in Rußland **XXII. 246.**  
 Goldschwefel **XXII. 40. 68.**  
*Granati, Syrup. cortic. rad. Gr.* **XXII. 113.**  
 Guajakholz **XXI. 254. XXIII. 279.**  
 Guajaksäure **XXIII. 280.**  
 Gummi **XXI. 102. XXIV. 50. 200.**  
 Gummiharze **XXI. 102, salinische 103.**  
 Gurkenlake **XXIII. 101.**  
 Gypsin Papiermasse **XXIV. 115.**

## H.

Haarvertilgungsmittel **XXIII. 252. XXIV. 176. 178.**  
 Haemacyanin **XXIV. 139.**  
 Handelsnotizen **XXI. 111. 238. 347. XXII. 114. 241. 353. XXIII. 118. 232. 342. XXIV. 221. 327.**  
 Aloe **XXI. 239. XXIII. 233. 342. XXIV. 221.**  
*Asa foetid.* **XXI. 239.**  
*Balsam. Cop.* **XXI. 238. XXIV. 222.**  
*Bals. de Peru* **XXIV. 222.**  
 Baumöl **XXI. 348. XXII. 114. 242. 354. XXIII. 119. XXIV. 222. 327.**  
 Benzoe **XXI. 239.**  
 Berberitzen **XXIII. 119.**  
 Biebergeil **XXIII. 345.**  
 Blauholz **XXII. 241. 354. XXIII. 119. XXIV. 223.**  
 Blutegel **XXIII. 120.**  
 Borax **XXI. 238.**  
 Branntwein **XXII. 242.**  
 Cacao **XXI. 244. XXII. 115. 241. XXIII. 119. 233. XXIV. 222. 327.**  
 Campher **XXI. 112. 240. 242. XXIII. 232. 342.**  
 Cantharides **XXIV. 222.**



*Cardam. Malab.* XXI. 239.  
*Cascarill.* XXIV. 222.  
*Cassia* XXI. 348.  
— *lignea* XXII. 115. 241. 354.  
*Champagner* XXI. 243.  
*China* XXI. 242. XXIII. 345.  
XXIV. 222.  
*Chinin* XXIII. 345.  
*Cochénille* XXII. 354.  
XXIII. 119.  
*Cocosöl* XXII. 115. 242.  
*Copal* XXI. 239.  
*Crocus* XXIV. 222.  
*Cubeben* XXI. 239.  
*Elemi* XXIV. 222.  
*Feigen* XXII. 115. 241. 354.  
XXIV. 328.  
*Fenchel* XXII. 115. 354.  
*Fol. sennae* XXI. 242. XXIII.  
233. XXIV. 222.  
*Gelbholz* XXII. 354.  
XXIII. 119.  
*Gold, Ausbeute im Ural und*  
*Altai* XXI. 113.  
*Grana Paradisi* XXI. 239.  
*Gummi Arabic.* XXI. 239. 242.  
— *elastic.* XXII. 353.  
— *Gutti* XXI. 239.  
*Javanische Producte, Ernte*  
XXI. 113.  
*Indig.* XXI. 244. 348.  
XXIV. 222.  
*Indigo* XXI. 113. XXII. 115.  
241. 354. XXIII. 119. 233.  
*Ingwer* XXII. 115. 241. 354.  
XXIII. 119. XXIV. 221.  
*Kaffee* XXI. 113. 242. 348.  
XXII. 114. 241. 353. 354.  
XXIII. 118. XXIV. 223.  
*Kampher* XXII. 353.  
XXIV. 222.  
*Kork* XXIII. 119.  
*Krapp* XXII. 241. XXIII. 119.  
*Kreutzbeeren* XXI. 239.  
*Kümmel* XXII. 115. 241. 354.  
XXIII. 119.  
*Kupfererz* XXII. 242.  
*Lakritzen* XXII. 24. 115. 354.  
*Leberthran* XXII. 353. XXIII.  
118. 233. 342. XXIV. 221.  
*Leinöl* XXI. 348. XXII. 115.  
241. XXIV. 223.  
*Lignum Sassafras* XXI. 239.  
*Lorbeeren* XXIV. 328.

*Lorbeerblätter* XXIV. 328.  
*Macis* XXI. 243. 349. XXII.  
115. 241. 354. XXIII. 119.  
*Manna* XXI. 242. XXIV. 222.  
*Mandeln* XXI. 343. XII.  
241. 354. XXIII. 119. 233.  
342. XXIV. 221. 32.  
*Mastix* XXI. 240.  
*Mohnöl* XXI. 348. XXII. 115.  
354. XXIV. 221.  
*Moschus* XXI. 112. 239. 240.  
242. XXIII. 344. XXIV. 222.  
*Muscatnüsse* XXI. 243. XXII.  
24. 114. 354. XXIV. 221.  
*Myrrhe* XXI. 239.  
*Nelken* XXI. 243. 347. XII.  
114. 241. 354. XXIII. 119.  
XXIV. 221.  
*Nelkenpfeffer* XXI. 243. 347.  
*Oele, ätherische* XXII. 354.  
*Ol. Cassiae* XII. 239.  
— *Croton. tiglit* XII. 239.  
— *Menth. crisp.* XII. 239.  
— *Menth. pip.* XII. 239.  
— *Olivarum* XXI. 239.  
— *Ricini* XXI. 239.  
— *Rosarum* XXI. 239.  
*Olibanum* XXI. 239.  
*Olivenöl* XXI. 239.  
*Opium* XXI. 242. XXII. 239.  
XXIII. 345. XXIV. 221.  
*Orlean* XXI. 239.  
*Palmöl* XXII. 114. 239.  
*Pfeffer* XXI. 243. 244. 345.  
XXII. 114. 241. 354. XXIII.  
119. 342. XXIV. 221.  
*Piment* XXII. 114. 239.  
XXIV. 221.  
*Pomeranzen* XXII. 240. 241.  
XXIII. 119.  
*Pottasche* XXII. 115. 239.  
354. XXIII. 119.  
*Quecksilber* XII. 239.  
XXIV. 221.  
*Rad. Chinae* XII. 239.  
— *Colombo* XXI. 239.  
— *Curcumae* XXI. 239.  
— *Ipecacuanhae* XXI. 239. 345.  
— *Ratanhiae* XXI. 239.  
— *Rhei* XXI. 239. 345.  
*Reis* XXI. 243. 347. XII.  
114. 241. 242. 354. 355.  
XXIII. 119. 231.



Rhabarber XXI. [112.](#) XXII. [353.](#) XXIII. [232.](#) [342.](#)  
 Rosinen XXIV. [328.](#)  
 Rübol XXI. [244.](#) [348.](#) XXII. [115.](#) [241.](#) [354.](#) XXIII. [119.](#)  
 Rum XXII. [242.](#) [354.](#) XXIII. [119.](#)  
 Runkelrübenzucker XXIV. [222.](#)  
 Sago XXII. [115.](#) [241.](#) XXIII. [119.](#)  
 Salpeter XXI. [243.](#) XXII. [115.](#) [241.](#) [354.](#) XXIV. [222.](#) [327.](#)  
 Sang. Dracon. XXI. [239.](#)  
 Scammonium XXI. [239.](#)  
 Schellack XXI. [239.](#) XXII. [241.](#) [353.](#) XXIII. [119.](#)  
 Schwefel XXI. [113.](#) [241.](#) XXII. [242.](#) [354.](#) XXIII. [120.](#)  
 Sem. Cinae XXIV. [222.](#)  
 Spiritus XXI. [348.](#)  
 Sprit XXII. [354.](#)  
 Stocklack XXI. [239.](#)  
 Succ. Liquirit. XXIV. [222.](#)  
 Taback XXII. [242.](#)  
 Talg XXII. [115.](#) [242.](#)  
 Tartar. depurat. XXI. [241.](#) [242.](#)  
 Terpentin XXII. [242.](#)  
 Thee XXI. [243.](#) [244.](#) XXII. [242.](#) [353.](#) XXIII. [119.](#) XXIV. [223.](#)  
 Theer XXII. [242.](#)  
 Thran XXI. [347.](#) XXII. [114.](#) [355.](#)  
 Traganth XXI. [239.](#)  
 Vanille XXIV. [222.](#)  
 Wacholderbranntwein XXII. [242.](#)  
 Wachs XXII. [354.](#)  
 Wein XXII. [242.](#)  
 Weinstein XXII. [115.](#) [241.](#) XXIV. [222.](#) [328.](#)  
 Zimmt XXI. [113.](#) [348.](#) XXII. [115.](#) [241.](#) XXIII. [119.](#) XXIV. [223.](#)  
 Zink XXII. [242.](#)  
 Zinn XXII. [115.](#)  
 Zucker XXI. [113.](#) [242.](#) [244.](#) [348.](#) XXII. [114.](#) [242.](#) [353.](#) [354.](#) XXIII. [118.](#) [232.](#) [344.](#) XXIV. [222.](#) [327.](#)  
 en XXI. [145.](#)

Harn, Untersuchungen auf  
 Harnstoff XXII. [35.](#)  
 Harnsäure XXI. [19.](#)  
 Harnsteine XXIV. [144.](#)  
 — über das Verfahren, die Zusammensetzung der H. zu erkennen, v. Chevallier; H. aus Harnsäure XXI. [279.](#); aus harnsaurem Ammoniak, aus phosphorsaurem Kalk [281.](#); aus phosphors. Kalk u. phosphors. Ammoniak-Magnesia [282.](#); aus phosphors. Ammoniak - Magnesia [283.](#); aus oxals. Kalk [284.](#); kiesel-erdehaltige H., aus kohlens. Kalk [285.](#); aus Blasenoxyd [286.](#); aus Xanthoxyd [287.](#)  
 Harnstoff XXII. [35.](#) [204.](#) XXIV. [313.](#)  
 Harnzucker XXIV. [201.](#)  
 Harze XXI. [103.](#)  
 Haselnüsse, über die Natur der in den Deckblättern der H. enthaltenen Säure XXIV. [28.](#)  
 Hausmannit XXIV. [87.](#)  
 Heftpflaster, Bereitung XXI. [255.](#)  
 Helenen XXIII. [28.](#)  
 Helenin XIII. [18.](#)  
 Heleninschwefelsäure XXIII. [23.](#)  
 Helianthus annuus XXI. [346.](#)  
 Hellebor. nigr., Untersuchung der Wurzel XXIV. [30.](#)  
 Himbeeren XXIII. [103.](#)  
 Himbeerwasser XXII. [307.](#)  
 Hollunderblüthenöl XXIV. [207.](#)  
 Holz, Verwesung des H. XXII. [201.](#)  
 Honig XXI. [146.](#) XXII. [208.](#)  
 — Verhalten zum Borax XXI. [72.](#)  
 — über die Reinigung XXIII. [226.](#)  
 Hopfen, Bestandtheile der Sprossen XXIII. [220.](#)  
 Humulus Lupulus XXI. [341.](#)  
 Humusbildung XXII. [201.](#)  
 Hydrobenzamid XXII. [24.](#)

## I. J.

Jalapae resina XXII. [109.](#)



- Imid XXII. 24.  
 Indig XXI. 21.  
 Indigbittersäure XXIV. 204.  
 Indigo XXII. 208.  
 — Untersuchungen XXII. 138. 253.  
 Indigoausfuhr XXII. 246.  
 Indigoblau, Zusammensetzung; Producte, welche durch die Einwirkung von Chlor und Brom auf **I** entstehen; Verhalten dieser Producte gegen die fixen Alkalien XXII. 138.  
 Ingwer, Stärkmehlgehalt XXI. 224.  
 Jod XXI. 146. XXIV. 211. XXII. 99. 103.  
 — in Steinkohlen XXI. 218.  
 — im Brunnenwasser zu Athens XXII. 211.  
 — Jodverbindungen in Pflanzen XXI. 98.  
 Jodantimon, Explosion bei der Bereitung XXI. 319.  
 Jodeisen XXII. 296.  
 Jodkalium XXIII. 89.  
 Jodsäure XXIV. 198.  
 Jodsilber, Verhalten gegen Wärme XXI. 219.  
 Juglans regia XXI. 346.  
 Juniperilen XXIV. 23.  
 Juniperus macrocarpa XXI. 341.

## K.

- Kadmium XXI. 221.  
 Käse, Vergiftung XXIII. 57.  
 Kali XXI. 179.  
 — bibromisatinsaures XXII. 283.  
 — -Bicarbonat, Darstellung XXIII. 305.  
 — bichlorisatinsaures XXII. 265. 269.  
 — bromisatinsaur. XXII. 282.  
 — chelidonsaur. XXIII. 204.  
 — chlorindoptens. XXII. 157.  
 — chlorisatinsaur. XXII. 256.  
 — chlorsaures XXI. 95.  
 — chromsaures XXIV. 47.  
 — Eisenoxyd-Kali, blausaur. XXI. 93.  
 — Eisenoxyd-K., schwefels. XXIII. 316.

- Kali, knallsaures XXI. 81.  
 — kohlen., Darstellung des chemisch reinen XXIII. 305.  
 — oxalsaures Chromoxyd-K. XXIV. 42.  
 — oxalsaures Eisenoxyd-K. XXIV. 42.  
 — oxalsaures Kupferoxyd-K. XXIV. 41.  
 — oxalsaur., neutrales, zwe- u. vierfach-oxals. XXIV. 41.  
 — polychromatinsaures XXIII. 26.  
 — schwefelsaures neutrales XXII. 72.  
 — schwefelsaures saures XXII. 72. XXIV. 46.  
 — schwefelsaures XXIII. 2.  
 — schwefelsaures, Verunreinigung mit Zinkvitriol XXIII. 2.  
 Kali sulphuratum XXIII. 93.  
 — tartaric. XXIII. 93.  
 Kali, weinsteinsaures-borsaur XXI. 304.  
 — weinsteinsaur. XXIII. 304.  
 Kalisalze, in Pflanzen 99. 108.  
 Kalium. *Kali carbon. et tartar.* XXIII. 93.  
 — Cyankalium XXIV. 211.  
 — Doppeltjodquecksilber-Jodkalium XXII. 101. 102.  
 — Cooper's Jodkaliumlösung XXII. 103.  
 — Jodkalium-Quecksilberdid, über Darstellung XXIII. 6.  
 — Salicylkalium XXIII. 8.  
 — Schwefelcyankalium XXIV. 214. 215.  
 — Schwefelkali XXII. 10.  
 — Schwefelkalium, Zusammensetzung XXI. 21.  
 — Kalk, äpfelsaurer, XXIV. 20.  
 — Bestimmung der Menge bei Analysen XXIV. 20.  
 — chelidonsaur. XXIII. 204.  
 — oxalsaurer XXIV. 46.  
 — oxalsaurer, Bildung in thierischen Oeconomy XXI. 20.





- Vorlesungen, von J. F. Schouw XXI. 230.
- Repertorium der Naturwissenschaften oder Abriss der Physik, Chemie, Botanik, Zoologie und Mineralogie für Studierende der Medicin. Von Dr. W. Bernhard 231.
- Die Heilquellen Europas mit vorzüglicher Berücksichtigung ihrer chemischen Zusammensetzung, nach ihrem physikalischen und medicinischen Verhalten, dargestellt von Dr. J. Fr. Simon 231.
- Allgemeine und specielle Heilquellenlehre etc., von Dr. G. W. Schwartze 232.
- Grundriss der Mineralogie mit Einschluss der Geognosie u. Petrefactenkunde. Für höhere Lehranstalten und zum Privatgebrauch. Von E. Fr. Glocker 232.
- Dr. Dav. Dietrich. *Synopsis plantarum seu enumeratio systematica plantarum plerumque adhuc cognitarum cum differentiis specificis et synonym. selectis ad modum Persoonii elaborata, Tom. I. sect. prima* 233.
- Preussens Pflanzengattungen nach Familien geordnet, von Dr. E. H. F. Meyer 234.
- Flora lusatica*, von L. Rabenhorst 235.
- Die preuss. Pharmakopöe, übersetzt u. erläutert von Dr. Fr. Ph. Dulk 227.
- Pharmacopoea universalis* 227.
- Die Pflanzenchemie. Handbuch für Aerzte und Apotheker etc., von Dr. A. Weinlig 228.
- Die chemischen Heilmittel und Gifte, od. practische Anleitung zur Erkennung und Prüfung ihrer Eigenschaften, v. A. Duflos 228.
- Der angehende Chemiker od. Einleitung in die technische Chemie mit Angabe der interessantesten Experimente. Von Dr. Fr. Döbereiner 229.
- Lehrbuch der Physik zum Gebrauch bei Vorlesungen und beim Unterricht, von W. Eisenlohr 229.
- Populäre Experimentalphysik zum Gebrauch gemeinschaftlicher Vorträge u. zum Selbstunterricht für denkende Freunde der Naturwissenschaft u. gebildeten Gewerbetreib. aller Klassen, von Dr. Th. Friedleben 230.
- Lehrbuch der Experimentalphysik und Meteorologie Von Pouillet. Nach dem dritten Originalausg. dem Franz. übers. u. mit Zusätzen und Erläuterungen versehen von Dr. C. E. Schnuse 230.
- Genera plantarum florae germanicae iconibus et descriptionibus illustrata*. Auct. Th. Fr. Lud. Nees et Esenbeck, post ejusdem continuavit F. C. L. Spenner 235.
- Reise in den Steppen des südlichen Russlands, entnommen von Dr. F. Göbel XXIII. 81.
- Ueber die wahrscheinliche Zusammensetzung chemischen Grundstoffe von Hugo Reinsch 81.
- Die chemischen Heilmittel und Gifte oder practische Anleitung zur Erkennung und Prüfung ihrer Eigenschaften, mit steter Berücksichtigung der Pharmakopöe. Von A. Duflos 86.
- Ueber arsenikhaltige Seeräucher nach dem Report of the Westminster medical society to London, nebst einem Vorwort von Dr. Th. Groß 90.



- Histoire des embaumements et de la préparation des pièces d'anatomie normale, d'anatomie pathologique et d'histoire naturelle. Par J. N. Gannal 98.
- Theorie u. Praxis der pharmaceutisch-chemisch. Arbeiten, od. Anleitung zur zweckmäßigen Bereitung der wichtigsten u. neuesten chem.-pharmaceutischen Präparate. Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet von C. H. Quarius XXIV. 321.
- linn XXIV. 198.
- olium temulentum XXIV. 198.
- pez Rad. XXI. 110.
- rbeeröl, Analyse XXII. 160.

## M.

- idia saliva, Beschreibung XXI. 329, Vortheile, welche zur Anpflanzung auffordern 33, Verfahren beim Anbau und der Ernte 334, Angabe des Ertrags 335.
- Anbau XXII. 117.
- gist. Bismuthi, Prüfung auf leioxyd XXIII. 89.
- nete, über die Anfertigung XXIII. 255.
- nium, Chlormagnium XXIV. 47.
- äfer, chemische Untersuchung XXIV. 60.
- va nicaensis, sylvestris XXI. 341.
- nga XXI. 224.
- lelöl, Darstellung von farbem wasserklaren vermittelst Thierkohle XXIV. 181.
- elsäure XXII. 26.
- an, Scheidung von Kott XXIV. 57.
- anchlorür XXIV. 47.
- anerze XXIV. 82.
- anit XXIV. 87.
- anoxydul, oxalsäures XXIV. 40.
- nsuperoxyd XXIV. 174.

- Mannaeiche XXIV. 103.
- Mastix XXII. 109.
- Meconium, Untersuchung des M. von Kindern XXII. 39.
- Meconsäure XXI. 106.

### Medicinalwesen u. Medicinalpolizei.

- Amtliche Verfügung, den Betrag der extrapostmäßigen Vergütung an die zu Apotheken-Visitationen gezogenen Apotheker betreffend XXI. 259.
- Die Taxation der Recepte betreffend 260.
- Pensions- u. Unterstützungsanstalt für Wittwen und Waisen von Medicinalpersonen in Waimar 261.
- Ueber tief eingerissene die ausübende Pharmacie beeinträchtigende Mißbräuche 261.
- Notiz über gesetzwidriges Dispensiren von Arzneimitteln 264.
- Beitrag zur Aufdeckung der Geheimmittel 266.
- Beitrag zum Medicinalunwesen in England 267.
- Hufeland'sche Gesellschaft zur Unterstützung nothleidender Aerzte u. Wundärzte XXII. 125.
- Notiz über das Medicinalwesen in Rußland 126.
- Die medico-chirurg. Akademie in Rußland 127.
- Zahl der Medicinalpersonen in London 127.
- Medicinalwesen bei den Chinesen auf Java 127.
- Ueber das Verhältniß d. Apothekergehülfen XXIII. 131.
- Ueber Haarvertilgungsmittel 252.
- Anzahl der Aerzte in Frankreich 253.
- Nachweis indischer Medicinalpolizei vor länger als zwei Jahrtausenden 253.
- Einige Erörterungen über den Aufsatz: »Das Verhält-



nifs der Apothekergehül-  
fen, von Dr. Geiseler. s.

XXIV. 266. 270. 273.

Melansäure XXIII. 188.

*Mentha viridis* XXI. 341.

Menthen XXIV. 209.

Messing XXI. 221.

Metaphosphorsaure Salze

XXIV. 44.

Meteorsteine, chemische Unter-

suchung zweier angeblicher

M. von Hinterkley bei Qued-

linburg XXII. 218.

Meteorwasser, Salpetersäure-

gehalt XXI. 218.

*Mikania Guaco* XXIV. 99.

Milch der Frauen u. der Thiere

XXI. 36. 188.

Milchsäure XXI. 20.

— Bildung XXIV. 49.

Mineralienverkauf XXI. 351.

XXIV. 92.

Mineralkermes XXIV. 182.

Mineralquelle zu Steinbeck im

Kreise Tecklenburg, chemi-

sche Analyse XXII. 333.

Mineralwässer XXII. 309.

Schwefeleisenquelle zu Ot-

schin bei Bräsa 326, Schwefel-

quelle auf dem Flecken

Putschos bei dem Dorfe Ser-

boneschte 328, bei dem Städt-

chen Kimpalungi 330, bei

d. Dorfe Glogowa 332, nahe

bei d. Dorfe Oloneschti 332.

— XXII. 211. Bemerkung über

das M. von Franzensbrunn

bei Eger 214, Notiz über das

M. der Moldau 215, heifse

Quellen in der Barberei 217.

— XXII. 309. Die Mineral-

quellen der Wallachei 309.

Schwefelquelle bei d. Dorfe

Bobotsch 311, bei dem Dorfe

Fineschti 313, die Eisen-

quelle bei dem Dorfe Sibit-

schudi Suz 315, die alkalisch.

Schwefelquelle 317, die Koch-

satzquelle unweit desselben

Dorfes 320, die Schwefel-

quelle bei d. Dorfe Re-

chemische 12.

der Salzquelle

Allen

schläge zur Darstell. nicht  
bildeter M., namentlich  
niger Thermen 325, des Ne-  
rienbader Kreuzbrunnens  
335, des Carlsbader Spru-  
dels 330, des Emser  
chen und Kesselbrunnens  
der Adelheidsquelle 336.

— Die Heilquellen von Dar-  
Vár im Pösegerer Comitat  
in Ungarn XXIV. 81, die  
Schwefelquelle zu Mergel-  
heim 81, die Therme auf  
Aegina 81, Mineralwasser  
Hammanmar Kutia 81.

Mittel zur Vertilgung der In-  
ten XXI. 25.

*Mixtura sulphurico-acida*  
XXIII. 8.

Moder XXII. 22.

Moosbeeren XXIII. 10.

Morison'sche Pillen XII. 25.

Morphin XXIV. 28.

Moschus XXIV. 28.

*Musa paradisiaca*, sapida  
XII. 28.

Myronsäure XXIII. 20.

Myrosin XXIII. 20.

## N.

Naphta XXIV. 28.

Naphten XXIV. 28.

Naphtol XXIV. 28.

Narcotin XXIV. 28.

Natrium, Schwefelnatrium

Darstellung des kry-

sten XXI. 183, Jodum

XXIV. 316.

Natron, chelidonicum XXIV. 28.

— chlors. XII. 25.

— Eisenoxydnatron XII. 25.

— kohlens., über 400°

kommen als Aushang

Mauern XII. 25.

— oxals. Eisenoxal XII. 25.

tron, titans. XXI. 93.  
 Thonerdenatron XXI. 92.  
 zinnsaures XXI. 93.  
*Natrum carbonicum*  
 XXIII. 89.  
 kel XXI. 91. 221.  
 robenzinsäure XXXIII. 15.  
 kohelenin XXIII. 23.  
 osalicyd XIII. 186.  
 enklatur XXIII. 36.  
 öl, Ausdehnung XXIII. 220.  
 zholz, über das Dämpfen  
 s N. XXIII. 126.

## O.

ten, mit Mennig gefärbt  
 XXIII. 59.  
 ätherische XXI. 104,  
 te 105. XXII. 160. XXIV.  
 l.  
 ätherische, Prüfung auf  
 rfälschung mit Alkohol  
 XXIV. 113.  
 Ausdehnung der O.  
 XXIII. 219.  
 ette, Vereinigung mit Sa-  
 nemulsionen, ohne Zusatz  
 i Gummi XXII. 110.  
 ette, Prüfung mittelst  
 orkalk XXIV. 107. 110.  
 bende Pflanzen Istriens  
 XXI. 345.  
*the pimpinelloid.* XXI. 339.  
*empyreumat. e ligno fos-*  
 XXII. 285.  
*lartis* XXI. 179.  
*mercurii diaphoret. dulc.*  
 XXI. 179.  
*ibii Rogeri Baconis*  
 XXI. 180.  
 XXI. 350.  
*a galbanifera* XXIV. 106.  
 enblüthwasser XXII. 308.  
 eige halt XXI. 254.  
 enöl XXIV. 17.  
 enölkampher XXIV. 18.  
 een, Keimen XXI. 22.  
 ure XXI. 105.  
 er die Constitution der  
 sauren Salze XXIV. 39.  
 anthin XXIV. 204.

## P.

*Papaver Rhoeas* XXI. 339.  
 Papier aus Fasern des Pisang-  
 baumes XXII. 245.  
 — Gypsgehalt XXIV. 115.  
 Pectin XXI. 85, XXIII. 215.  
 Pectinsäure XXI. 85, XXIII. 215.  
 Pereirarinde, über ein neues  
 Alkaloid in der P. XXIV. 38.

## Personalnotizen.

Agassiz XXI. 143.  
 E. F. Aschoff XXIV. 134.  
 L. Aschoff XXI. 144.  
 Bergemann XXIII. 180.  
 v. Berzelius XXIII. 150.  
 Bessel XXIII. 150.  
 Bünger XXIII. 150.  
 G. Bischof XXI. 268.  
 de Blainville XXI. 268.  
 Bley XXIV. 134.  
 Blumenbach XXI. 268.  
 Böhm XXII. 132.  
 Bolle XXI. 144.  
 Brandes XXI. 144. 268.  
 XXII. 132. XXIV. 134.  
 Brück XXI. 268.  
 L. v. Buch XXIII. 150.  
 Bucholz XXI. 144.  
 Caspar XXIII. 150.  
 v. Dechen XXI. 268.  
 Dieffenbach XXI. 143.  
 Dowe XXI. 143.  
 Dugend XXI. 144.  
 Dumont XXII. 252.  
 Ehrenberg XXI. 268.  
 XXIII. 150.  
 Endlicher XXI. 268.  
 Faber XXI. 144.  
 Dr. Fiedeler XXI. 144.  
 Fischer XXI. 268.  
 Focke XXIII. 150.  
 Fricke XXIII. 150.  
 Galle XXII. 132.  
 Geiseler XXI. 144.  
 XXIV. 134.  
 Glocker XXI. 268.  
 v. Gräfe XXIV. 134.  
 Gruner XXIV. 134.  
 Heinecke XXII. 131.  
 Hennemann XXII. 252.  
 Herzog XXI. 144. XXIV. 134.  
 Jacobi XXII. 252.

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Jäger             | XXII. 132.           |
| Jonas             | XXI. 144.            |
| v. Könen          | XXI. 268.            |
| Kruttge           | XXI. 268.            |
| Lessing           | XXI. 144. XXII. 132. |
| Magnus            | XXII. 252.           |
| Marder            | XXI. 144.            |
| Meurer            | XXIV. 134.           |
| Millingen         | XXII. 252.           |
| Mirbel            | XXI. 143.            |
| Mohs              | XXII. 132.           |
| Müller            | XXI. 144. XXI. 268.  |
| Niemann           | XXIII. 150.          |
| Orsini            | XXIII. 150.          |
| Osann             | XXI. 143.            |
| Overbeck          | XXI. 144.            |
| Paolo Savi        | XXIII. 150.          |
| Pickering         | XXII. 252.           |
| Pietro Savi       | XXIII. 150.          |
| Poisson           | XXIII. 150.          |
| Perier            | XXII. 132.           |
| Preiger           | XXII. 132.           |
| Prinsep           | XXII. 252.           |
| Rabenhorst        | XXIV. 134.           |
| Ritgen            | XXI. 268.            |
| Ritter            | XXI. 143.            |
| Robiquet          | XXIII. 150.          |
| Roer              | XXI. 268.            |
| Rudolphi          | XXI. 268.            |
| Rüppell           | XXI. 143.            |
| Rust              | XXIV. 134.           |
| Rufsegger         | XXII. 132.           |
| Schaffewik        | XXII. 252.           |
| Schimper          | XXIII. 150.          |
| Schönlein         | XXIII. 150.          |
| Schüler           | XXI. 268.            |
| Schweigger-Seidel | XXIV. 121.           |
| Sehlmeyer         | XXI. 144.            |
| Siebold           | XXIII. 150.          |
| Simon             | XXIII. 150.          |
| Steffen           | XXI. 268.            |
| Struve            | XXIV. 134.           |
| Tobias            | XXI. 268.            |
| Trommsdorff       | XXI. 144.            |
| Ulmann            | XXIII. 150.          |
| Visconi           | XXIII. 150.          |
| Voget             | XXI. 144.            |
| Wackenroder       | XXI. 144.            |
| Weber             | XXI. 268.            |
| Wenderoth         | XXIII. 150.          |
| Werneck           | XXIII. 150.          |
| Wilken            | XXI. 144.            |
| Wöhler            | XXI. 143.            |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Wurzer                                | XXI. 143.        |
| Zenzen                                | XXI. 143.        |
| Petersilienkampfer                    | XXIV. 134.       |
| Petersilienöl                         | XXIV. 134.       |
| Petrol                                | XXIV. 131. 161.  |
| Peucyl                                | XXII. 17.        |
| Peucylen                              | XXII. 17.        |
| Peucylenchlorhydr.                    | XXII. 151.       |
| Pflanzen, Nachforschungen, ob         |                  |
| Pfl., die verschiedenen Graden        |                  |
| der Verbreitung angehören,            |                  |
| sich auch durch besondere             |                  |
| chemische Verhältnisse cha-           |                  |
| cterisiren, von Dr. Wit-              |                  |
| ting                                  | XXI. 97.         |
| — über einige schädliche u.           |                  |
| verdächtige Pfl. Istriens             |                  |
|                                       | XXI. 33.         |
| Pflanzenfaser                         | XXI. 12.         |
| Pflanzensäuren                        | XXI. 16.         |
| Pfeffermünzöl                         | XXIV. 28.        |
| Pfefferöl                             | XXV. 2.          |
| Pfirsichkerne, Amygdalage-            |                  |
| halt                                  | XXIII. 142.      |
| Phloretin                             | XXIII. 196. 201. |
| Phloretinsäure                        | XXIII. 197. 201. |
| Phloridzein                           | XXIII. 196. 201. |
| Phloridzin                            | XXIII. 194. 195. |
| Phosphor                              | XXIV. 211. 316.  |
| Phosphoroxyd                          | XXIV. 21.        |
| Phosphorsäure, über die Con-          |                  |
| stitution der phosphorsauren          |                  |
| Salze                                 | XXIV. 2.         |
| — ihre Verbindungen mit               |                  |
| Wasser                                | XXIV. 2.         |
| Pigmente                              | XXI. 15.         |
| Pisangbaum                            | XXII. 15.        |
| <i>Pistacia Lentiscus</i> , chemische |                  |
| Beobachtungen über denselben          |                  |
|                                       | XXI. 15.         |
| <i>Pisum arvense</i>                  | XXI. 141.        |
| Platin, ursprüngliche Lager-          |                  |
| stätte im Ural                        | XXI. 2.          |
| Platingefäße                          | XXIII. 14.       |
| Platingewinnung in Rußland            |                  |
|                                       | XXII. 15.        |
| Polychromatinsäure                    | XXIII. 15.       |
| <i>Polygonum tinctor.</i>             | XXII. 15.        |
|                                       | XXIII. 15.       |
| — Indigpflanze                        | XXI. 2.          |
| Pommade des Dr. Dupuyren              |                  |
|                                       | XXI. 15.         |
| Pottasche                             | XXIII. 15.       |



*Prunus Armeniaca, Cerasus,*  
*Avium, domestica* XXI. 346.  
*Psilomelan* XXIV. 89.  
*Pulmonaria sacchar.* XXII. 226.  
*Pupille* XXII. 103.  
*Pulv. atterans Plumeri* XXI. 88.  
*Pyrolusit* XXIV. 85.  
*Pyrophosphorsaure Salze*  
 XXIV. 44.

## Q.

*Quecksilber* XXI. 146. 349.  
 — Notiz über die Q.-Berg-  
 werke von Almaden XXIV. 96.  
 — Jodkalium Quecksilberjo-  
 did XXIII. 175.  
 — *Hydrargyrum ammoniato-*  
*murial.* Zusammensetzung  
 und Bereitung XXI. 147.  
*Quecksilberchlorid*, Reduction  
 durch organische Substanzen  
 XXI. 88.; Verhalten zum  
 Goldschwefel 89, gegen Pflan-  
 zenstoffe 89.  
*Quecksilberchlorür* XXIII. 319.  
 — Reduction durch organische  
 Substanzen XXI. 88.  
*Quecksilberjodür* XXIII. 320.  
*Quecksilberoxydul*, reines, Dar-  
 stellung XXIII. 310.  
 — ammoniakalisches, schwar-  
 zes XXIII. 309.  
*Quecksilberpräcipitat*, weißes  
 XXIII. 311.  
*Quercus mannifera* XXIV. 103.

## R.

*Ranunculus Ficaria* XXI. 339.  
*Raphanus Landra* XXI. 340.  
 — *Raphanistrum, sativa, Lan-*  
*dra, Brassica* XXI. 346.  
*Retinit* XXII. 285.  
*Rettig* XXIII. 107.  
 — über das ätherische Oel  
 des R. XXIII. 301.  
*Rhusma* XXIV. 178.  
*Rindsklauenöl* XXIII. 220.  
*Rosenwasser* XXII. 308.  
*Rubine*, Darstellung künstli-  
 cher XXIII. 124.  
*Rüböl*, Ausdehnung XXIII. 220.  
*Rumex acutus* XXI. 340.  
*Runkelrübensaft* XXII. 208.

*Runkelrübenzucker s. Zucker.*  
*Ruscus aculeatus* XXI. 341.

## S.

*Salbe zur Erweiterung der*  
*Pupille* XXII. 103.  
*Salepwardeln* XXI. 256.  
*Salicin* XXIII. 185. 199. XXIV.  
 205.  
*Salicyl* XXIII. 185. XXIV. 205.  
*Salicylhydrür* XXIV. 205.  
*Salicylmetalle* XXIII. 187.  
*Salicylsäure* XXIII. 187.  
*Salicylwasserstoff* XXII. 185.  
*Saliretin* XXIII. 191.  
*Salpeter* XXIV. 191.  
*Salpeteräther*, Darstellung von  
 reinem XXIII. 218.  
*Salpetersäure* XXIV. 191.  
 — Prüfung auf S. XXI. 77.  
 — im Meteorwasser XXI. 218.  
 — Untersalpetersäure  
 XXIV. 162.  
 — über die Constitution der  
 salpeters. Salze XXIV. 39.  
*Sandarak* XXII. 109.  
*Sarsaparin* XXI. 187.  
*Sauerkrautlake* XXIII. 101.  
*Scammonium* XXII. 109.  
*Schiefspulv.*, Analyse XXIV. 57.  
*Schmiere*, Maschienen-schmiere  
 XXIII. 123.  
*Schwefel* XXIII. 236.  
 — einfache Methode, den  
 Schwefel in Pflanzen nach-  
 zuweisen XXIII. 34.  
 — Unterschweiflichtsäure  
 XXIV. 53.  
*Schwefelcyankalium*  
 XXIV. 214. 215.  
*Schwefelmilch* XXIII. 89.  
*Schwefelsäure* XXI. 311.  
 XXIV. 197.  
 — Vergiftung durch Schw.  
 XXII. 234.  
 — über die Constitution der  
 schwefels. Salze XXIV. 39.  
 — Wirkung auf Untersalpe-  
 tersäure, Theorie der Fabri-  
 cation XXIV. 162.  
*Schwefelwasserstoff*, Einwir-  
 kung auf Pflanzenfarben  
 XXI. 187.

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Schwefelweinsäure                                  | XXII. 190.             |
| <i>Scolymus maculatus</i>                          | XXI. 340.              |
| Seidenbau                                          | XXII. 245.             |
| Seife, Thonseife                                   | XXIII. 122.,           |
| Verbesserung im Seifensieden                       | 123.                   |
| Selen, selenhaltige Mineralien                     | XXIV. 97.              |
| Senf, über das ätherische Oel des S.               | XXIII. 301.            |
| — neue Versuche über den schwarzen und weißen      | XXIII. 210.            |
| Senfemulsin                                        | XXIII. 211.            |
| Senfsäure                                          | XXIII. 211.            |
| Silber                                             | XXI. 348.              |
| Silberoxyd                                         | XXIV. 57.              |
| — bernsteinsaures                                  | XXIV. 57.              |
| — bichlorisatins.                                  | XXII. 275.             |
| — chelidons.                                       | XXIII. 204.            |
| — chlorindoptens.                                  | XXII. 158.             |
| — chlorisatins.                                    | XXII. 258.             |
| — citrons.                                         | XXIV. 56.              |
| — honigsteins.                                     | XXIV. 56.              |
| — knallsaures                                      | XXI. 84.               |
| — melans.                                          | XXIII. 188.            |
| — salicyls.                                        | XXIII. 188.            |
| — polychromatins.                                  | XXII. 297.             |
| — oxalsaures                                       | XXIV. 56.              |
| — veratrums.                                       | XXIII. 214.            |
| Silberoxydul                                       | XXIV. 56.              |
| Siliciumsäure                                      | XXI. 107.              |
| Sinapisin                                          | XXIII. 210.            |
| <i>Smegma praepulii</i>                            | XXI. 203.              |
| 253.                                               |                        |
| Seignettsalz                                       | XXI. 309.              |
| <i>Sonchus oleraceus</i>                           | XXI. 340.              |
| Solanin                                            | XXIII. 209. XXIV. 204. |
| <i>Spirit. Salis tartari</i>                       | XXI. 181.              |
| <i>Spirit. Vini Lullian.</i>                       | XXI. 168.              |
| Stärke                                             | XXIV. 200.             |
| — Methode der Stärkefabrication aus Kartoffeln     | XXIII. 347.            |
| Stärkmehl                                          | XXI. 223. XXIV. 50.    |
| Stärkezucker-Bleioxyd                              | XXIV. 49.              |
| Stahl                                              | XXI. 220.              |
| — Kohlenstoffgehalt                                | XXIV. 55.              |
| Standgefäße, Bemerkungen über die Etiketten an St. | XXII. 116.             |
| <i>Statice Flores</i>                              | XXI. 110.              |

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Stearinlichter, über arsenikhaltige                                      | XXIII. 90.           |
| Steinkohle                                                               | XXI. 146. XXII. 201. |
| — Jodgehalt                                                              | XXI. 218.            |
| — über die Nachtheile des Nassmachens                                    | XXIII. 26.           |
| Stempelfarben für die chemische Bleiche                                  | XXII. 144.           |
| Stickgas, Darstellung                                                    | XXI. 311.            |
| Stickstoff, einfache Art, den St. in festen Pflanzentheilen nachzuweisen | XXII. 33.            |
| Strontian, chelidonsaur.                                                 | XXIII. 204.          |
| — Scheidung vom Baryt                                                    | XXI. 65.             |
| Strontiansalze, Verhalten vor dem Löthrohre                              | XXIV. 57.            |
| Strontianit                                                              | XXIV. 54.            |
| Strychnin                                                                | XXIV. 24.            |
| Strychnossäure                                                           | XXI. 106.            |
| Sublimat                                                                 | XXIII. 112.          |
| Succisterin                                                              | XXI. 25.             |
| Sulfoheleninsäure                                                        | XXIII. 2.            |
| Sumach                                                                   | XXII. 16.            |
| Syrup, Beobachtungen über die S.                                         | XXIII. 128.          |
| <i>Syrup. Conii</i>                                                      | XXII. 24.            |
| <i>Syrup. Ferri jodati</i>                                               | XXII. 5.             |
|                                                                          | XXII. 31.            |
| <i>Syrup. Violarum</i> , über Bereitung                                  | XXIII. 24.           |

## T.

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Tago                                | XXI. 27.  |
| Talkerde - Verbindungen in Pflanzen | XXI. 100. |
| <i>Tamus communis</i>               | XXI. 20.  |
| <i>Tartarus boracatus</i>           | XXIII. 4. |
| — <i>ferruginosus</i>               | XXI. 5.   |
| Taurin                              | XXIV. 27. |
| Tereben                             | XXII. 13. |
| Terebenkampher                      | XXIV. 4.  |
| Terebilen                           | XXII. 18. |
| Terebilenkampher                    | XXIV. 2.  |
| Temperaturerhöhung                  | XXII. 8.  |
| — durch Krystallisation             | XXI. 22.  |
| Terpentinöl                         | XXII. 17. |
|                                     | XXIV. 4.  |
| Terpentinkampher                    | XXII. 17. |

- Thee, Anbau in Assam XXI. 350.  
 — Anpflanzungen in Ostindien XXII. 117.  
 Theepflanzungen in Assam XXIII. 235.  
 Thonerde, basisch-schwefels. XXI. 94.  
 — Verhalten gegen kohlen. Natron XXI. 92. Scheidung von Eisenoxyd 93.  
 Thonseife XXIII. 122.  
*Tinct. corallorum* XXI. 177.  
 — *ferri acetici aetherea* XXIV. 217.  
 — *Rhei aquosa* XXI. 256.  
 — *Veneris* XXI. 178.  
 Tinte, Kobalttinten XXIII. 31.  
 Topase von außerordentlicher Grösse XXIII. 236.  
 Torf XXII. 202.  
 Traganth XXIV. 102.  
 Traganthstoff XXI. 103.  
 Trauben, Untersuchung der Clevener XXIV. 59.  
 Traubensaft XXII. 208.

## U.

- Ulmin XXII. 202.  
 Ultramarin, Anwendung XXII. 356.  
*Ungt. plumbicum* XXI. 215. 216.  
 Urinblase eines Pferdes, kreideartige Masse in ihrem Zellgewebe XXIV. 138.  
*Urtica dioica* XXI. 341.

## V.

- Vanadin, neues Vorkommen XXI. 87.  
 Vegetabiliengeschäft XXI. 244.  
 Vegetation der Insel Cuba XXI. 323.  
 Veratrin XXIV. 204.  
 Veratrumsäure XXIII. 213.  
 Verbrennungsappar. von Hef's XXII. 140.

## Vereinsangelegenheiten.

- Andeutungen über d. Werth, welcher der Versammlung des norddeutsch. Apo-

- thekervereins zu Pyrmont, so wie den Versammlungen des Vereins überhaupt beizulegen ist; von Dr. Geiseler XXII. 1.  
 Die Antrittszeit der Apothekergehülften betreffend XXIV. 236.  
 Anzeige XXIII. 4. XXIV. 220.  
 Aufruf und Bitte XXIII. 118. 251.  
 Bildung neuer Kreise XXIII. 130. XXIV. 235.  
 Bucholz - Gehlen - Trommsdorff'sche Stiftung zur Unterstützung armer ausgedienter und würdiger Apothekergehülften XXI. 135. XXIV. 221.  
 Circulare, der Jahresbeitrag der Vereinsmitglieder XXI. 236.  
 Correspondenz des Directoriums XXI. 116. 246. 347. XXII. 114. 240. 352. XXIII. 117. 231. XXIV. 118. 220. 326.  
 Dienstgesuche XXIV. 328.  
 Directorialconferenzen XXI. 16. 17. 249. XXII. 121. 249. XXIII. 1. XXIV. 233. 234.  
 Eintritt neuer Mitglieder XXI. 251. XXII. 9. 123. 250. XXIII. 3. 129. 250. XXIV. 132. 236.  
 Ehrenbezeugung für den Verein XXI. 131.  
 Ehrenmitglieder XXIII. 251.  
 Erfreuliche Verbreitung des Vereins und Eintritt neuer Mitglieder XXI. 14. 132. 133.  
 Erklärung XXIII. 252.  
 Fortsetzung des Verzeichnisses der eingegangenen Beiträge für Hrn. Apoth. Linke in Neustadt XXII. 251.  
 Gehülften - Unterstützungsangelegenheit XXIV. 326.  
 Gehülften - Unterstützungsanstalt XXII. 240.  
 Generalkasse XXI. 134. 251. XXII. 11. 250. XXIII. 3. XXIV. 236.  
 Generalrechnung des Apo-



thekervereins in Norddeutschland vom Jahre 1839 XXIV. 237.

Generalversammlung des Vereins XXIII. 2. 117. 129.

Hohes Wohlwollen für den Verein XXI. 130. XXII. 8. 9. 122. XXIII. 127. 128. XXIV. 125.

Die v. Humboldt'sche Versammlung, oder die Generalversammlung, gehalten zu Leipzig am 8. und 9. Sept. 1840. XXIV. 1. Die Droguen-Ausstellung bei dieser Versammlung 13. Bericht über die Kreisversammlung zu Blankenburg 126, zu Bernburg 128, in Driburg 131, zu Ronneburg 265.

Die Jussieu'sche Versammlung des Kreises Medebach, gehalten zu Corbach am 8. Juli 1839 XXI. 139.

Kreisversammlung in Bielefeld XXII. 251. XXIII. 239, im Vicedirectorium der Marken, des Kreises Paderborn 252, Münster 353. XXIII. 4. 241. Versammlung im Vicedirectorium Bernb. XXII. 352. XXIII. 4. 118. 232, der Kreise Gotha und Meiningen XXIII. 4, der Kreise des Vicedirectoriums Weimar 232, des Luckauer Kreises 247, des Mansfelder Kreises 249.

Nachricht an die Herren Mitglieder d. Kreises Bernburg, des Kreises Braunschweig, des Kreises Sondershausen XXIV. 235.

Portovergünstigung des Vereins im Königreich Sachsen XXIII. 128.

Rede, gehalten in d. Jussieu'schen Generalversammlung des Vereins, zu Pyrmont am 21. Sept. 1839,

von Dr. R. Brandes XI. 1, vom Dr. Bley: über einen allgemeinen deutschen Apothekerverein und darauf bezügliche Vervollkommnung der Pharmazie 121.

Statuten des Vereins, Anforderung in Bezug auf die nöthige neue Auflage XXII. 125, sechste Auflage XXIII. 5.

Todesfall XXI. 139.

XXIV. 132

Vereinskapital XXI. 135. 252. XXII. 11. 125.

Verkaufsanzeige von Naturalien XXI. 113, einer Schmetterlingssammlung, von Apotheken XXI. 115. XXII. 118. 247. XXIII. 126. 237, von Apothekerwaaren XXII. 119. 246, von Holzbüchsen 119, von Kautschukzeug 357, von Anis XXIII. 237.

— eines vollständ. Exempl. der Düsseldorfer Pflanzenabbildungen, u. v. Goebel's Waarenkunde mit illum. Kupfern XXII. 119. XXIV. 119, von Schmetterlingen XXIII. 349, Herbarienverkauf XXIV. 223, von Apotheken XXIII. 349. XXIV. 118. 223.

Verkaufsanzeige von arztischen Extracten XXIV. 323, von Apotheken 324, von seiden. Beutelgarn 325.

Verschiedene Nachrichten XXII. 10. XXIII. 130

Die Versammlung der Mitglieder des Kreises Gotha des Apothekervereins 3 Meiningen, am 9. Decr. 1839. XXI. 52

Vicedirectorium Weimar XXI. 134

Vicedirectorium im Königr. Sachsen XXII. 10

Volksmittel, über einige in  
der Wallachei gebräuch-  
liche XXIII. 228.  
Vergiftung durch Schwefel-  
säure XXII. 234.  
Verwesung, über die Erschei-  
nungen der V. und ihre Ur-  
sachen XXII. 197.  
*Vicia peregrina*, *grandiflora*,  
*hirta*, *narb.* XXI. 341.  
*Vitis viniferae Fermentoleum*  
XXIII. 212.  
Vogelbeeren XXIII. 103.  
Volks-Arzneimittel, russische  
XXIII. 101.

## W.


Wacholderöl XXIV. 21.  
Wacholderölkamph. XXIV. 22.  
Wachs XXI. 105.  
Wagenschmiere XXIV. 117.  
Wärme der Blumen XXI. 18.  
Wasser, über Bereitung, Prü-  
fung, Ursachen des Verder-  
bens und zweckmässigste  
Aufbewahrung der dest. W.  
XXI. 288.  
— destillierte, über Darstel-  
lung einiger XXII. 307.  
Wallfischthran XXIII. 220.  
Weinbau in Kaukasien  
XXII. 245.  
Weinbouquet XXIII. 212.  
Weine XXI. 350.  
Wein, Alkoholgehalt XXI. 145.  
Weinstein, Reinigungsmethode  
XXIII. 302.  
Weinsteinsäure XXI. 303.  
Wismuth XXI. 221. XXIII. 88.  
Wismuthoxyd, salpeters. basi-  
sches XXIII. 307.  
— salpeters., neutrales und  
basisches XXIV. 43.

## X.

Xyloidin XXIV. 202

## Z.

Zellgewebe XXI. 223.  
Zimintöl XXII. 27.  
— Zusammensetzung  
XXII. 168.  
Zimmtsäure XXI. 105. XXII. 27.  
Zinc. sulphuric. pur. XXIII. 90.  
Zink XXI. 179. 221. 348.  
Zinkoxyd XXI. 76. XXIII. 90.  
— chelidons. XXIII. 204.  
— knalls. XXI. 84.  
— oxals. XXIV. 40.  
— phosphors. dreibasisches  
XXIV. 45.  
— salpeters. XXIV. 43.  
— schwefels. bas. XXIV. 47.  
Zinkplatten, Amalgamirung  
zu Faraday'schen Säulen  
XXIV. 58.  
Zinn XXI. 221. XXIV. 117.  
Zinnober, Prüfung XXIII. 88.  
Zucker XXI. 104. 349. XXII.  
206. XXIV. 49. 50. 200. 201.  
— Umbildung in Milchsäure  
XXI. 20.  
— aus Kürbis XXII. 245.  
— Verbindungen mit Basen  
XXIV. 48.  
— über den Einfluss des  
Kalks bei der Darstellung  
XXIII. 151. Bemerkungen  
über Kürbis- und Runkel-  
rübenzucker 170.  
— Anwendung bei Steinbe-  
schwerden XXIV. 145.  
Zuckerrohr XXII. 12.  
— Anbau auf Ceylon XXII. 117.  
Zwiebelsaft XXII. 208.



## Textverbesserung.

### 2. Reihe Band XXI.

| Seite | Zeile | von   | oben | lies | getreten statt treten.                                       |
|-------|-------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------|
| 12    | 7     |       |      |      | haben statt hat.                                             |
| 15    | 17    |       |      |      | Liebeau statt Libcon.                                        |
| 27    | 4     | unten |      |      | Kohlenwasserstoffverbindung st. Chlornwasserstoffverbindung. |
| 69    | 2     |       |      |      | der st. per.                                                 |
| 101   | 18    | oben  |      |      | Aequatoriallinie st. Aequitoriallinie.                       |
| 124   | 9     | unten |      |      | kamen, an den st. kamen an die.                              |
| 219   | 12    |       |      |      | kalte st. eine.                                              |
| 252   | 19    | oben  |      |      | Rengel st. Renzel.                                           |
| 346   | 1     | unten |      |      | Schübler st. Schäbler.                                       |

### Band XXII.

| Seite | Zeile | von   | unten | lies | Brombenzoesäure st. Benzoesäure.     |
|-------|-------|-------|-------|------|--------------------------------------|
| 26    | 9     | oben  |       |      | in st. im.                           |
| 72    | 17    |       |       |      | filtratam st. filbratam.             |
| 80    | 6     | unten |       |      | fibrini st. fibrinae.                |
| 86    | 15    |       |       |      | braun st. brau.                      |
| 122   | 6     |       |       |      | sich zu st. zu sich.                 |
| 196   | 4     | oben  |       |      | Wasser st. Schwefelsäure.            |
| 206   | 15    |       |       |      | die Kohlensäure st. der Kohlenstoff. |
| 238   | 9     | unten |       |      | Angustur. st. Angustus.              |

### Band XXIII.

| Seite | Zeile | von   | oben | lies | arsenichtsaurer Eisenoxyd st. das Arsenik. |
|-------|-------|-------|------|------|--------------------------------------------|
| 103   | 6     | unten |      |      | Allium st. Album.                          |
| 108   | 2     |       |      |      | Anisi stellati st. Anisum sellati.         |
| 151   | 12    |       |      |      | geringeres st. geringes.                   |
| 162   | 10    |       |      |      | Arnoldi's st. Arnold's.                    |
| 164   | 10    | oben  |      |      | ein allgemein st. eine allgemeine.         |
| 165   | 19    | unten |      |      | Schwerspath st. Schwefelspath.             |
| 165   | 18    |       |      |      | unter st. mehrer.                          |
| 193   | 4     |       |      |      | 3,14 st. 13,14.                            |
| 216   | 22    | oben  |      |      | eine Verbrennung st. ein Verbrennen.       |
| 221   | 7     |       |      |      | Proctor st. Pecton.                        |
| 231   | 24    | unten |      |      | Neifse st. Meissen.                        |
| 251   | 22    |       |      |      | Buek st. Bulk.                             |

### Band XXIV.

| Seite | Zeile | von   | unten | lies | Demarcay st. Demarcet.                       |
|-------|-------|-------|-------|------|----------------------------------------------|
| 33    | 22    | oben  |       |      | nicht aus st. nicht sie aus.                 |
| 54    | 3     | unten |       |      | sich st. sie.                                |
| 72    | 14    |       |       |      | unrichtige st. unnöthige.                    |
| 131   | 8     | oben  |       |      | ambrosioides st. ambrasoides.                |
| 131   | 9     |       |       |      | tannicum st. tannicam.                       |
| 131   | 10    |       |       |      | Tellur st. Tellus.                           |
| 132   | 26    |       |       |      | Heermann st. Heimann.                        |
| 159   | 7     |       |       |      | versetzt st. zersetzt.                       |
| 178   | 19    |       |       |      | von st. ven                                  |
| 199   | 3     | unten |       |      | Loliin st. Lolium.                           |
| 236   | 15    | oben  |       |      | Vofs st. S tafs.                             |
| 264   | 14    | unten |       |      | F. Brendecke 5 rthlr. st. F. Brendek 1 rthl. |
| 288   | 5     |       |       |      | durchsehen st. durchseihen.                  |
| 300   | 1     |       |       |      | Krug st. Kunz.                               |
| 301   | 4     |       |       |      | aufser st. aus.                              |





Digitized by Google